

TOP SPALIO PASIŪLYMAI



-45%
9⁹⁹ € **5⁴⁹ €**



-45%
9⁹⁹ € **5⁴⁹ €**



AMBIO Vitaminų B kompleksas FORTE

90 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Subalansuotas B grupės vitaminų kompleksas, kuriame esantys:

- Riboflavinai, tiaminai, niacinai, vitamino B₆, vitamino B₁₂ ir biotinas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą;
- Tiaminai, niacinai, vitamino B₆, vitamino B₁₂ ir biotinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją;
- Riboflavinai, niacinai, pantoteno rūgštis, vitamino B₆, vitamino B₁₂ padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį;

AMBIO Cholesterol level balance

30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

- Sudėtyje yra raudonųjų ryžių, monokolino K, česnakų.
- Monokolino K iš raudonosios mielės fermentuotų ryžių padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 10 mg monokolino K iš raudonosios mielės fermentuotų ryžių gaminių.



-40%
10⁹⁹ € **6⁰⁵ €**

OLIDETRIM

OLIDETRIM 2000 TV, 60 minkštųjų kapsulių

MAISTO PAPILDAS

- Imunitetui – Vitamino D 2000 TV.
- Kaulams ir raumenims.

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Rekomenduojama vartoti 1 kapsulę per parą. GERIAUSIA GYNYBA – STIPRUS IMUNITETAS



nuo **2⁹⁹ €**

GRIPEX

325/30/10 mg, 12 plėvele dengtų tablečių 2⁹⁹ € 500/30/15 mg, 10 plėvele dengtų tablečių 4⁹⁹ €
325/30/10 mg, 24 plėvele dengtos tabletės 5⁹⁹ € 500/30/15 mg, 20 plėvele dengtų tablečių 7⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas. Viena „Gripex“ tabletėje yra: 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrinio hidrochlorido ir 10 mg dekstrometorfano hidrochlorido. Viena „Gripex 500/30/15 mg“ tabletėje yra: 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrinio hidrochlorido ir 15 mg dekstrometorfano hidrochlorido. **Indikacijos:** peršalimo ar gripo simptomų (karščiavimo, ryklės, galvos ar raumenų skausmo, nosies užgulimo, sauso kosulio) lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** „Gripex“ tabletės: suaugusiems pacientams ir vyresniems negu 12 m. vaikams įprastinė dozė yra 2 tabletės 3–4 kartus per parą, kas 4–6 val. tada, kada reikia. Neviršyti vienkartinės 2 tablečių dozės. „Gripex 500/30/15 mg“ tabletės: suaugusiems po 1–2 tabletes 3–4 kartus per parą. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. **Kontraindikacijos:** šių vaistų negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šių vaistų sudedamajai medžiagai; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; smarkiai padidėjęs kraujospūdis; lėtinis alkoholizmas. Negalima vartoti kartu su monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI) arba anksčiau negu 2 savaites baigus juos vartoti. „Gripex“ tablečių negalima vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams. „Gripex 500/30/15 mg“ tablečių negalima vartoti vaikams. **Specialūs įspėjimai:** esant sutrikusiai kepenų funkcijai, sergant alkoholizmu, sutrikus mišrybai yra didesnis kepenų toksiinio pažeidimo pavojus. Gydantis šiais vaistais, nepartartina vartoti alkoholio. Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Teksto parengimo data 2020-09-23.

GRIPEX. GALIŲ.

-35%
11⁹⁹ € **7⁷⁹ €**



bioMAGNESIUM FORTE

500 mg, 20 paketėlių

MAISTO PAPILDAI

Magnio maisto papildas milteliais geriamajam tirpalui ruošti. Sudėtyje – tik grynas magnio citratas! Be saldiklių, be konservantų, be dažiklių. Magnis išgaunamas iš Negyvosios jūros. Magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raumenų funkciją, padeda mažinti pavargimo jausmą, palaikyti normalią energijos apykaitą, 1 pakelyje – 500 mg magnio. Tinka veganams, nėščiosioms ir maitinančiosioms. Pagaminta Izraelyje.

MAGNIS IŠ NEGYVOSIOS JŪROS!

1⁴⁹ €



NEOCITRAMONAS

240 mg/200 mg/30 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Vienoje tabletėje yra 240 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg paracetamolio ir 30 mg kofeino. Vaistas vartojamas trumpalaikio lengvo ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių ir menstruacinio skausmo malšinimui. Tabletės reikia vartoti nekrantant, užgeriant ne mažesniu kaip 250 ml vandens kiekiu. Didžiausia paros dozė – 4 tabletės. Negalima vaisto gerti dažniau kaip kas 6 valandas ir ilgiau kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, esanti ar buvusi virškinamojo trakto opa ir (arba) kraujavimas iš virškinimo trakto, buvusi bronchų astma, kurią sukėlė salicilatai ar kiti nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, pacientas jaunesnis negu 12 metų, trys paskutiniai mėnesiai, žindymas, ligos, kurių metu yra padidėjęs kraujavimo pavojus, kraujo krešėjimo sutrikimas, vartojama 15 mg ar didesnė metotreksato savaitės dozė, sunkus širdies, kepenų, inkstų nepakankamumas, labai sunki didelio kraujo spaudimo liga, kamuoja nemiga, padidėjęs nervingumas, dirglumas, nerimas, baimė, sujaudinimas ar panašūs simptomai. **Specialūs įspėjimai:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergama podagra, bronchų astma, kolagenozėmis ar kraujodaros sistemos ligomis, yra sustiprėjusi skydliaukės veikla ar sergama cukriniu diabetu, yra virškinimo trakto, inkstų, kepenų ar širdies funkcijos sutrikimų, yra buvusi alergija kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, planuojama chirurginė operacija, pacientas yra jaunesnis kaip 16 metų ir serga virusinėmis ligomis, pacientas yra senyvas, planuojama pastoti, pakinta šlapimo kiekis, atsiranda patinimų ar skausmas juosmens srityje, pagelsta oda ar akys, patamsėja šlapimas, atsiranda bendras silpnumas, yra nerimo sutrikimas, panikos sutrikimas ar nemiga. Sudėtyje esantis kofeinas gali sukelti drebulį, dažną širdies plakimą, viduriavimą, susijaudinimą, stiprų širdies plakimą, nemigą, galvos skausmą, raumenų trūkčiojimą ir šlapimo išsiskyrimą padidėjimą. 2021.07.12 NEO-LT2107-34

**AMBIO vitaminas
D3 800 IU**

80 minkštųjų kapsulių

~~6,49 €~~
4,54 €

-30%


MAISTO PAPILDAS

- Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų bei dantų būklę, raumenų funkciją, kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą, kalcio koncentraciją kraujyje.
- Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.

**AMBIO Krilių
aliejus**

30 kapsulių

~~12,49 €~~
7,49 €

-40%


MAISTO PAPILDAS

- Sudėtyje yra vėžiagyvių krilių lipidų ekstrakto, fosfolipidų, ekozapentaeno ir dokozaheksaeno rūgščių.
- Tik 1 kapsulė per dieną.

**AMBIO
Gerkliai su
šaltalankių
ir medetkų
aliejais**

20ml

~~5,99 €~~
4,19 €

-30%


SKYSTASIS MAISTO PAPILDAS

- Levandiniai šalavijai ir vaistinės medetkos padeda palaikyti kvėpavimo takų funkciją.
- Dygliuotieji šaltalankiai ir kvapieji rozmarinai padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

**AMBIO Gerkliai
su islandine
kerpena
sirupas**

150ml

~~6,98 €~~
4,54 €

-35%


SKYSTASIS MAISTO PAPILDAS

- Paprastųjų saldymedžių ekstraktas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir kvėpavimo funkciją.
- Rutulinių eukaliptų ekstraktas padeda palaikyti normalią kvėpavimo sistemos funkciją.
- Islandinių kerpenų ir vaistinių ramunių ekstraktai padeda palaikyti normalią imuninės sistemos funkciją.

**AMBIO
Selenas ir cinkas
su vitaminais**

90 tablečių

~~9,98 €~~
6,49 €

-35%


MAISTO PAPILDAS

- Cinkas, selenas, vitaminai C, A ir B6 padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
- Cinkas, selenas, vitaminai C, A, E ir B6 padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinių pažeidimų.
- Cinkas padeda palaikyti normalią vitamino A apykaitą ir kartu su vitaminu A padeda išsaugoti normalų regėjimą.
- Cinkas padeda palaikyti normalų vaisingumą ir reprodukciją, o selenas – normalią spermatogenezę.
- Cinkas ir selenas padeda palaikyti normalią plaukų būklę.
- Tik 1 tabletė per dieną.

AMBIO Kepenims

50 tablečių

~~9,98 €~~
6,99 €

-30%


MAISTO PAPILDAS

- Artiškųjų lapų ekstraktas ir cholinas padeda palaikyti normalią kepenų veiklą.
- Tik 1 tabletė per dieną.



AMBIO Širdžiai 100ml



~~5,49€~~
3,84€

-30%

SKYSTASIS MAISTO PAPILDAS

- Tiaminas (vitaminas B1) padeda palaikyti normalią širdies ir nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją bei energijos apykaitą.
- Vitaminas B6 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą, normalią psichologinę funkciją ir imuninės sistemos veiklą.
- Vitaminas B6 padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą.
- Vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei reguliuoti hormonų aktyvumą.

AMBIO Magnis su B6 forte 30 tablečių



~~8,35€~~
5,85€

-30%

SKYSTASIS MAISTO PAPILDAS

- Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, kaulų ir dantų būklę, psichologinę funkciją, nervų sistemos veiklą ir energijos apykaitą.
- Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
- Vitaminas B6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją, energijos apykaitą ir imuninės sistemos veiklą.
- Vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei reguliuoti hormonų aktyvumą.

AMBIO Glucobalance complex 30 kapsulių



~~5,99€~~
3,89€

-35%

MAISTO PAPILDAS

- Kompleksinis maisto papildas, kurio sudėtyje yra baltųjų šilkmedžių (Morus alba) vaisių ir cėloninio cinamono (Cinnamomum zeylanicum) žievės ekstraktų, liuteino, vitaminų, mineralų ir aminorūgščių.
- Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje ir normalią maistinių makromedžiagų apykaitą.
- Cinkas padeda palaikyti normalią angliavandenių apykaitą bei normalią kaulų, plaukų, nagų ir odos būklę.
- Tiaminas, riboflavinai, niacinas, pantoteno rūgštis, biotinas, vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.

AMBIO Osteo complex 60 tablečių



~~9,98€~~
5,99€

-40%

MAISTO PAPILDAS

- Kalcis, magnis, cinkas ir manganas padeda palaikyti normalią kaulų būklę.
- Kalcis ir magnis padeda palaikyti normalią raumenų veiklą.
- Fosforas, manganas ir varis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.
- Fosforas padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę.
- Varis padeda palaikyti normalų geležies pernešimą organizme bei normalią odos ir plaukų pigmentaciją, padeda palaikyti normalią jungiamojo audinio būklę.
- Manganas padeda palaikyti normalų jungiamojo audinio formavimąsi.
- Tik 1 tabletė per dieną.

AMBIO Vitaminas B₁₂ 60 tablečių



~~5,99€~~
3,89€

-35%

MAISTO PAPILDAS

- Vitaminas B12 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, normalią nervų sistemos veiklą, normalią psichologinę funkciją, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą. Atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.
- Tik 1 tabletė per dieną.

AMBIO lakto- bifidobakterijos su s.boulardi 30 kapsulių



~~9,98€~~
6,99€

-30%

MAISTO PAPILDAS

- Papildo kasdienę mitybą gyvybingomis bakterijomis.
- Tik 1 kapsulė per dieną.

SUPER PASIŪLYMAI

NUO SPAZMINIO SKAUSMO



NO-SPA 40 mg, 24 tabletės
(Drotaverino hidrochloridas)

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 40 mg drotaverino hidrochlorido. **Indikacijos:** lygiųjų raumenų spazmams, susijusiems su tulžies latakų ligomis (tulžies pūslės ir (arba) latakų akmenimis, tulžies pūslės ir tulžies latakų dyliakapitės žarnos spazmai), šalinant. Inkstų ir (arba) šlapimtakio akmenimis, inkstų gėdulių ar šlapimo pūslės uždegimo sukeltą šlapimo takų lygiųjų raumenų spazmų šalinant, mėšlungiškam norui šlapintis slopinti. **Kaip pagalbinis gydymas** šalinant skrandžio ir žarnyno lygiųjų raumenų spazmus, jei yra skrandžio ir dyliakapitės žarnos opa, skrandžio, ploniosios ar storiosios žarnos uždegimas, įskrandžio ir priediavo spazmas bei esant skausmingoms mėnesinėms. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** reikia vartoti po 1–2 tabletes 1–3 kartus per parą. Įprastinė vidutinė suaugusio žmogaus paros dozė yra 3–6 tabletes. Vartoti per burną. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas. Negalima vartoti jaunesniems kaip 1 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: vaikams ir paaugliams iki 18 metų vartoti „No-spa“ nerekomenduojama. Jei kraujospūdis mažas, vaistą reikia vartoti labai atsargiai. Jeigu gydytojas jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Drotaverino vartojanti su levodopa, mažėja pastarojo vaisto poveikis parkinsonizmui, todėl stiprėja drebulys ir raumenų tingulys. **Teksto parengimo data:** 2020 m. gegužės mėn. **Reklamos teksto parengimo data:** 03/2021 MAT-T-2100122 V.1.0

PERSALIMO IR KARŠČIAVIMO, BŪKLĖS, PANĄŠIOS Į GRIPĄ, GYDYMOI



INFLUCID®, 40 tablečių

HOMEOPATINIS VAISTAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje (250 mg) yra šių veikliųjų medžiagų: Aconitum D3 25 mg, Gelsemium D3 25 mg, Ipecacuanha D3 25 mg, Phosphorus D5 25 mg, Bryonia D2 25 mg, Eupatorium perfoliatum D1 25 mg. **Indikacijos:** „Influcid“ yra homeopatinis vaistas persalimo ir karščiavimo, būklės, panąšios į gripą, gydymui. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Vartojimo būdas ir dozavimas. Suaugusiems ir paaugliams nuo 12 metų ūminės ligos metu vartoti po 1 tabletę kas valandą (iki 12 tablečių per dieną), kol pagerėja savijauta. Tolesniam gydymui vartoti po 1–2 tabletes 3 kartus per dieną. Jaunesniems nei 12 metų vaikams ūminės ligos metu vartoti po 1 tabletę kas 2 valandas (iki 6 tablečių per dieną), kol pagerėja savijauta. Tolesniam gydymui vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Nerekomenduojama vartoti šio vaisto su maistu ir gėrimais. Tabletes vartoti mažesniais, pusę valandos prieš valgį ar pusę valandos po jo. Rekomenduojama leisti tabletemis lėtai ištirpti burnoje. Mažiams vaikams tabletes galima ištirpinti nedideliam kiekyje vandens. **Kontraindikacijos:** Mergija veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai. Pastarūte su gydytoju, jeigu temperatūra nekrenta 3 dienas ar pakyla virš 39 °C, arba atsiranda neaiškūs negalavimai, arba savijauta negerėja, nes tai gali būti ligos, kuriai reikia gydytojo įvertinimo, požymiai. Kadangi šio vaisto vartojimas kudiškiams nėra pakankamai ištyrus, jo neturėtų vartoti jaunesni kaip 1 metų vaikai. Reklamos teksto parengimo data 2021-09-08.

PERSALAI? TAVO PASIRINKIMAS – „INFLUCID“!

KOSULIUI



HEDELIX

HEDELIX S.A. 40 mg/ml
geriamieji lašai, tirpalas (50 ml) 4⁹⁹ €
HEDELIX 8 mg/ml sirupas (100 ml) 5²⁵ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo (31 lašas) yra 40 mg *Hederas helicis* L. folium (gebenių lapų) tirštojo ekstrakto (2,2–2,9:1). 1 ml sirupo yra 8 mg *Hederas helicis* L. folium (gebenių lapų) tirštojo ekstrakto (2,2–2,9:1). **Terapinės indikacijos:** Vartojama atsisakėjimui lengvinti sergant persalimo ligomis ir lėtinio bronchito. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** **Hedelix sirupo:** suaugusiems ir vyresni nei 10 metų vaikams: 5 ml sirupo (1 matavimo šaukštą) tris kartus per parą; 4–10 metų amžiaus vaikams: 2,5 ml sirupo (1/2 matavimo šaukštą) keturis kartus per parą; 1–4 metų amžiaus vaikams: 2,5 ml sirupo (1/2 matavimo šaukštą) tris kartus per parą (atitinka 150 mg vaisto paros dozė); vaikams iki 1 metų: 2,5 ml sirupo (1/2 matavimo šaukštą) vieną kartą per parą. **Vartojimo būdas:** Vaistas vartojamas per burną. Tirpalą neskiestais, bet užgerkite dideliu kiekiu skysčio (rekomenduojama geriamųjų vandeniu). **Hedelix s.a. geriamųjų lašų suaugusiems ir vyresniems nei 10 metų vaikams:** po 31 lašą tris kartus per parą (atitinka 300 mg vaistinio preparato paros dozė); 4–10 metų amžiaus vaikams: po 21 lašą tris kartus per parą (atitinka 200 mg vaistinio preparato paros dozė); 2–4 metų amžiaus vaikams: po 16 lašą tris kartus per parą (atitinka 150 mg vaistinio preparato paros dozė). **Vartojimo būdas:** Vaistas vartojamas per burną. Hedelix s.a. reikia vartoti su pakankamu kiekiu vandens. Rekomenduojama, kad maži vaikai Hedelix s.a. suvartotų įmaišę į arbatą ar vaisių sultis. **Kontraindikacijos.** **Hedelix sirupo:** jeigu yra padidėjęs jautrumas gebenių lapų preparatams arba bet kuriai pagalbinei Hedelix medžiagai; jeigu yra argininsukcinsintetazės trūkumas (metabolinė šlapalo cirkuliacija). **Hedelix s.a. geriamųjų lašų** jeigu yra padidėjęs jautrumas gebenių lapų preparatams arba bet kuriai pagalbinei Hedelix medžiagai; jeigu yra argininsukcinsintetazės trūkumas (metabolinė šlapalo cirkuliacija) kudiškiams ir jaunesniems kaip 2 metų amžiaus vaikams rekomenduojama vartoti kitų preparatų. Bronchinė astma ar kita kvėpavimo takų liga, dėl kurios yra padidėjęs kvėpavimo takų jautrumas, įkvėpus mentolio, pipirmėties ir eukalipto aliejaus gali atsirasti bronchų spazmas. **Specialūs įspėjimai.** **Hedelix sirupo** sudėtyje yra sorbitolis. Sorbitolis gali neįmaitinti vidurių. **Hedelix s.a. geriamųjų lašų** sudėtyje yra augalų ekstrakcinės medžiagos, būtytės gali susidaryti dušios, skysčiai gali neįmaitinti vidurių.

nuo
4⁰⁹

microlife

3 MAM IHB AFIB sens

traukto pakuotė

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

microlife

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis.



ir nvaistine.lt

iki

-35%

MICROLIFE

Kraujospūdžio matuokliai

BP W1 Basic automatinis riešinis

BP A1 Easy

BP B2 BASIC

BP B3 Comfort PC

BP B6 Connect

MICROLIFE inovatyvios technologijos:

PAD – aritminių nustatymo technologija,

MAM – vidurkio technologija,

AFIB – prieširdžių virpėjimo aptikimo funkcija,

AFIB – technologija insulto prevencijai.

Inhaliatorius NEB 200

Inhaliatorius NEB PRO

Insulto prevencija su itin jautria prieširdžių virpėjimą aptinkančia technologija.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms



DEEP RELIEF 50 mg/ 30mg/g gelis, 50g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 g gelio yra 50 mg ibuprofeno ir 30 mg levomentolio. Terapinės indikacijos: Lokalus sąnario aplinkos minkštųjų audinių uždegimo ir (ar) traumos (pvz., patempimo, išnirimų) sukeltą skausmą mažinimas. Dozavimas. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: gelti vartoti iki 3 kartų per parą, bet ne dažniau kas 4 valandas. Tępti reikia apie 1–4 cm gelio iš 50 g pakuotės. Vienam centimetrui gelio iš 50 g tubelės yra vidutiniškai 50 mg ibuprofeno. 4 cm, iš 50 g tubelės yra vidutiniškai 125 mg ibuprofeno. Neįviršyti nurodytų dozių. Jeigu simptomai nepraeina per penkis dienas, kreiptis į gydytoją. Vaikų populiacija: Duomenų apie Deep Relief saugumą ir veiksmingumą jaunesniems kaip 12 metų vaikams nėra. Vartojimo metodas. Plonu gelio sluoksniu tepėti skaudamą vietą, švelniai masažuoti, kol susigers. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas aspirinui ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, įskaitant ir vartojamam per burną. Astma sergantiems pacientams, kuriems aspirinas arba kiti nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, gali sukelti astmos priepuolį, niežėjimą, rinitą ar dilgėlinę. Nubrodinta, pažeista infekcijos ar uždegimo oda arba plota bei viršutinis odos sluoksnis. Kiti toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu lokaliai vartojami vaistiniai preparatai. Vartojimo vietoje esanti infekcija. Paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: Deep Relief gelio sudėtyje yra propilenglikolio, kuris gali sukelti odos sudirginimą. Gelio netepti ant (arba) šalia gleivinės ir akių. Netinka tepti po sandarinamųjų varsių. Pirmą kartą išbandyti ant mažo odos ploto. Vartoti tik ant odos. Registruojamas: Colep Laupheim GmbH & Co. KG, Vokietija. Gamintojas: The Mentholum Company Limited, Jungtinė Karalystė arba Colep Laupheim GmbH & Co. KG, Vokietija

DEEP RELIEF – VĖSINANTIS IR GREITAI VEIKIANTIS TEPALAS NUO SKAUSMO!

MAGNIO ŠALTINIS



MAGNE B₆ 470 mg/5 mg, 60 dento tablečių 7⁶⁵ €
MAGNE B₆ geriamasis tirpalas, 10 ampulių 4⁷⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 470 mg magnio laktato dihidrato bei 5 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B₆). Vienoje 10 ml ampulėje yra 186 mg magnio laktato dihidrato, 936 mg magnio pidolato, 10 mg piridoksino hidrochlorido. **Indikacijos:** „Magne B₆“ skirtas magnio trūkumo sukeliamiems simptomams gydyti. Magnio trūkumas gali sukelti tam tikrus simptomus ar jų derinius: nervingumas, irzlumas, nidelis nerimas, trumpalaikis nuovargis, nedidelis miego sutrikimai; mėšlungis, dilgčiojimo pojūtis. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tabletes reikia nuryti užgeriant stikline vandens. Suaugusiems paros dozė yra 6–8 tabletės, kurias reikia išgerti per 2–3 kartus valgant. Vaikams paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno svorio. Geriamojo tirpalo ampulės turinys ištrinamas pusėje stiklinės vandens. Suaugusiems paros dozė yra 3–4 ampulės, kurias reikia išgerti per 2–3 kartus tarp valgių. Vaikams ir kudiškiams, svėriantiems daugiau kaip 10 kg, paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno svorio arba 1–4 ampulės per 2–3 kartus tarp valgių. **Kontraindikacijos:** preparato vartoti negalima, jeigu: yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Magne B₆“ medžiagai; sergate tam tikra inkstų liga; vartojama levodopa. **Specialūs įspėjimai:** nėštumo ir žindymo laikotarpiu vaistą galima vartoti tik tada, jei nurodo gydytojas. „Magne B₆“ dento tabletės skirtos suaugusiems žmonėms ir vyresniems nei 6 metų vaikams. „Magne B₆“ geriamojo tirpalo negalima duoti mažiau kaip 10 kg svėriantiems (iki 1 metų) kudiškiams. Jeigu sergate inkstų, širdies ir kraujagyslių liga, prieš pradėdami vartoti „Magne B₆“ preparatus, reikia pasitarti su gydytoju. Piknaudžiaujant vitaminu B₆, pakenkiami jutiminiai periferiniai nervai: atsiranda tirpimas ir padėties jautimo pablogėjimas, drebulys galūnėse ir koordinacijos sutrikimai. Nustojus vartoti vaistą, pažeidimai paprastai išnyksta. **Teksto parengimo data** 2020 balandžio mėn. **Reklamos teksto parengimo data** 07/2021.

MAT-T-2100347 V.1.0

MAGNE B₆ PADĖS ĮVEIKTI MAGNIO TRŪKUMĄ!

-40% 5⁹⁹



AMBIO IMUNITETUI SU PROPOLIU 60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

- Cinkas ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.
- Vitaminas C padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir normalią nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
- Produkto sudėtyje yra vitamino C, rausvųjų ąžuolų šaknų ekstrakto, cinko ir propolio.

NUO GERKLĖS ŠKAUSMO IR UŽDEGIMO

4⁹⁹



INOVOX

INOVOX MENTHOL, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, 24 kietosios pastilės
INOVOX ORANGE, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, 24 kietosios pastilės

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Sudėtis: 1 kietosioje pastilėje yra 2 mg lidokaino hidrochlorido, 0,6 mg amilmetakrezolio ir 1,2 mg 2,4-dichlorobenzilio alkoholio. Indikacijos: gerklės skausmas, malšinimas, vietinis antiseptinis gerklės ir burnos ertmės uždegiminių būklių (pvz., paraudimo, patinimo) gydymas. Vartojimas: čiulpti po 1 pastilę kas 2–3 valandas ir kai reikia, bet ne daugiau nei 8 pastiles per parą (didžiausia dozė vaikams – 4 pastilės per parą). Kontraindikacijos: alergija lidokaino hidrochloridui ar kitokiems amidų grupės lokalaus poveikio anestetikams, amilmetakrezoliui, 2,4-dichlorobenzilio alkoholiui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: pasakykite gydytojui, jeigu sergate astma, simptomai per 2 paras nepalengvėja arba karščiavate, skauda galvą, pasireiškia pykinimas ar odos bėrimas. Vaistas gali kenkti dantims. Vaistą draudžiama vartoti prieš valgant arba atsigertiant. Nerekomenduojama vartoti ilgai, kaip 5 paras, silpnais pacientams reikia pasitarti su gydytoju. Vaisto sudėtyje yra gliukozės, sacharozės, levomentolio terpenų, saulėgrąžų geltolio, košenilio raudonojo. Nevartoti vaisto, jei yra didelių ūmių burnos ar gerklės žaizdų, jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Teksto parengimo data: 2021-01-07.

INOVOX. EFEKTAS – JAU PO 1 MINUTĖS!

GERKLĖS UŽDEGIMUI GYDYTI

4⁹⁹




FURASOL 1 g, 5 paketėliai

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma: „Furasol 100/900 mg“ gargalas (milteliai tirpalui). Kokybinė ir kiekybinė sudėtis: 1 miltelių paketyje yra 100 mg furagino kalio druskos ir 900 mg natrio chlorido. Terapinės indikacijos: vietinis infekcijos sukeltos burnos ertmės ir ryklės uždegimo gydymas. Dozavimas ir vartojimo metodas: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 4 m. vaikams. Tirpalą reikia ruošti prieš pat vartojimą. Paketyje esančius miltelius reikia išsijoti stiklinėje karšto virinto vandens ir šiltu tirpalu 2–3 kartus per dieną skalauti juo burną arba gargaliuoti. Tirpalą reikia suvartoti iš karto. Jo laikyti negalima. Sergant burnos ertmės ligomis skalauti, o sergant ryklės ligomis – gargaliuoti apie 20–30 sekundžių, po to tirpalą išspjauti. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas furaginui, nitrofurano grupės junginiams. Pacientas yra jaunesnis negu 4 m. vaikas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: tirpalą burnai ir ryklės skalauti reikia ruošti prieš pat vartojimą. Nesuvaldomo vaisto likučių reikia išplinti. Sveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sveikata: jokios kliniškai reikšmingos sąveikos nepastebėta. Nėštumo ir žindymo laikotarpis: nežinoma, ar saugu vartoti šį preparatą nėštumo ir žindymo laikotarpiu, nes tokių tyrimų neatlikta. Todėl nėščiosioms ar žindydėms jo vartoti nerekomenduojama. Nepageidaujamas poveikis: kiekvienoje organų sistemoje pasireiškiantis nepageidaujamas poveikis apibūdinamas taip: labai dažnas: $\geq 1/10$, dažnas: nuo $\geq 1/100$ iki $< 1/10$, nedažnas: nuo $\geq 1/1000$ iki $< 1/100$, retas: nuo $\geq 1/10000$ iki $< 1/1000$, labai retas: $< 1/10000$, dažnis nežinomas: (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis). Odos ir poodinio audinio sutrikimai: labai reti. Alerginė reakcija. Nereceptinis vaistinis preparatas. Registravimo liudijimo turėtojas ir gamintojas: JSC „Olaifarm“, Rupnicu 5, LV-2114 Olaive, Latvija. Vietinis registravimo liudijimo turėtojas: UAB „Corpus Medica“, Sukilių pr. 61, LT-49333 Kaunas, Lietuva. Teksto peržiūros data 2013-09-30. Reklamos teksto parengimo data 2020-01-10.

NUO SUMUŠIMŲ

7⁹⁹



DOLOBENE™ gelis, 50 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g gėlio yra 500 TV heparino natrio druskos, 150 mg dimetilsulfoksido, 25 mg deksantenolio. Indikacijos: patinimo, hematomos ir uždegimo po bukus raumenų, sausgyslių, sausgyslių makių, raiščių, sąnarių traumos gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: geliu tepti pažeistą vietą 1–2 kartus per parą. Nereikia įtrinti, tik švelniai užtepti ir išlyginti. Nenaudoti su oro nepralaidžiais tvarščiais. „Dolobene“ geliu negalima tepti ant atviros žaizdos, pažeistos odos ir gleivinės. Gėlio nerekomenduojama naudoti vaikams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nepakanka. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas dimetilsulfoksido ar heparinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sergantiesiems raudonąja vilklige, astma, esant sunkiems inkstų ir (arba) kepenų pažeidimams, kraujotakos sutrikimams; jaunesniems kaip 5 metų vaikams. Specialūs įspėjimai: nepatariama tepti ant pažeistos odos ir gleivinės. Teksto peržiūros data 2019-05-14.

NUGALĖK MĖLYNES IR TRAUMAS!

ODOS IR LŪPŲ PUSLELINEI GYDYTI

4⁹⁹



ACIC 5 % kremas, 2 g


NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: viename grame „Acic“ 5 % kremo yra 50 mg acikloviro. Indikacijos: vaistas skirtas odos ir lūpų puslelinei, kurią sukelia Herpes simplex virusas, gydyti. Vartojimo būdas ir dozavimas: pažeistą odos vietą tepti plonu sluoksniu 5 kartus per parą kas 4 val. Kontraindikacijos: „Acic“ naudoti negalima esant padidėjusiam jautrumui aciklovirovi, valacikloviro, propilenglikoliui arba bet kurioms pagalbinėms „Acic“ medžiagoms. Krema negalima tepti ant gleivinės (burnos, akių, makšties). Specialūs įspėjimai: vaisto draudžiama nuryti. Specialių atsargumo priemonių reikia susilpnėjus imunitetui. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Seimyniškių g. 3A LT-09312 Vilnius, Lietuva. BS2011050402. Reklamos teksto parengimo data: 2020 11 05.

UŽBLOKUOK LŪPŲ PUSLELINĘ SU „ACIC“!

SKAUSMUI MALŠINTI

2⁹⁹



MIALDEX 25 mg, 10 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Mialdex yra vaistas skausmui malšinti, priklausantis nesteroidinių vaistų nuo uždegimo grupei (NVNU). Mialdex veiklioji medžiaga yra deksketoprofenas (deksketoprofeno trometamolio pavidalu). Mialdex vartojamas lengvio ir vidutinio stiprumo raumenų skausmų, skausmingų mėnesinių, dantų skausmų malšinti. Vartojimas: visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Įprastinė vaisto dozė yra pusė tabletės (12,5 mg) kas 4–6 valandas arba 1 tabletė (25 mg) kas 8 valandas, bet ne daugiau kaip 3 tabletes per parą (75 mg). Kontraindikacijos: jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) deksketoprofeno trometamolui arba bet kuriai pagalbinei Mialdex medžiagai. Įspėjimai: jeigu sergate arba sirgote inkstų, kepenų ar širdies ligomis, širdies nepakankamumu, jeigu sergate kraujodaros sistemos ligomis; jeigu sergate sisteminė raudonąja vilklige ar mišriomis jungiamojo audinio ligomis; jeigu sergate arba sirgote virškinimo trakto ligomis paskonsultuokite su gydytoju. Galimas šalutinis poveikis: šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

SUPER PASIŪLYMAI

GERKLĖS SKAUSMUI MALŠINTI

JOX 85/1 mg/ml burnos gleivinės,
gerklų ir ryklės purškalo, 30 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml purškalo yra 85 mg joduoto povidono ir 1 mg alantoino. **Indikacijos:** lengvoms burnos ir ryklės infekcinėms ligoms papildomai gydyti; bakterijų sukeltam tonzilitui papildomai gydyti su antibiotikais; burnos ertmės infekcijų profilaktika ligoniams, kuriems atliekamos burnos ar ryklės operacijos. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems negu 8 metų vaikams įprasta dozė yra 1–3 purškimai į dešinę ir kairę burnos ertmės pusę arba tiesiai į pažeistą vietą 2–4 kartus, bet ne dažniau kaip 6 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** jeigu yra padidėjęs jautrumas jodui arba bet kuriai pagalbinei „Jox“ medžiagai; jei nustatytas inkstų funkcijos ar dekompensuotas širdies sutrikimas; nėštumo ir žindymo laikotarpis; po tyrimo arba gydymo radioaktyviu jodu; esant skydliaukės funkcijos sutrikimui; vartojant ličio preparatus. **Specialūs įspėjimai:** saugotis, kad vaistinio preparato nepatektų į akis. Esant kepenų funkcijos nepakankamumui, „Jox“ vartoti atsargiai. Vartoti draudžiama, jei sutrikusi inkstų funkcija. „Jox“ sudėtyje yra 18,6 % etilo alkoholio. „Jox“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jeigu pasireiškia jautrumas arba vietinis dirginimas, „Jox“ vartojimą reikia nutraukti. Sergant laringitu, „Jox“ vartoti tik būtinu atveju. „Jox“ gali nudažyti gleivinę, dantis, odą ir drabužius. Reklamino teksto parengimo data 2020-08-03.

„Jox“ – VINIENTELIS TOKS!

KVĖPAVIMO TAKŲ GLEIVĖMS SKYSTINTI

RESPIFORTIN 600 mg, 10 šnypščiučių tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 šnypščiučioje tabletyje yra 600 mg acetilcisteino. **Indikacijos:** trumpalaikiam gleivių skystinimui sergant ūminėmis kvėpavimo takų ligomis (peršalimu), susijusiomis su padidėjusiu ir klampių gleivių išsiskyrimu. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Šnypščiąją tabletę reikia išstipinti 1/2 stiklinės vandens ir nedelsiant išgerti. Dėl galimo suskystėjusių gleivių susikaupimo bronchuose reikia vartoti likus bent 4 valandoms iki miego. Gydymo metu rekomenduojama vartoti daug skysčių. **Kontraindikacijos:** negalima vartoti padidėjusiam jautrumui veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, esant astmei, bėgiui, sergant fenilketonurija, esant skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opai, jaunesniems nei 2 metų vaikams; taip pat netinkamas vartoti vaikams ir paaugliams nuo 2 iki 18 metų. **Specialūs įspėjimai:** jei kurią reikia vartoti acetilcisteiną ir per burną vartojamus antibiotikus, šiuos vaistinius preparatus reikia vartoti su bent 2 valandų pertrauka. Gamintojo adstovas: „Natur Produkt Vilnius“, Konstitucijos pr. 12, Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2019-09-26.

ENTEROL®

ENTEROL®, 250 mg milteliai geriamajai suspensijai, 10 paketėlių **4⁹⁹ €**
ENTEROL®, 250 mg milteliai geriamajai suspensijai, 20 paketėlių **8⁹⁹ €**
ENTEROL®, 250 mg kietosios kapsulės, 10 kapsulių **4⁹⁹ €**
ENTEROL®, 250 mg kietosios kapsulės, 20 kapsulių **8⁹⁹ €**
ENTEROL®, 250 mg kietosios kapsulės, 30 kapsulių **12⁹⁹ €**

Saccharomyces boulardii CNCM 1-745

NERECEPTINIAI VAISTAI

Enterol vartojamas ūminio viduriavimo pagalbiniam gydymui kartu su kitais vaistais nuo viduriavimo. **Vartojimo būdas.** Kapsules nuryti užgeriant gurkūnų vandens arba ardomųjų kapsulių turinį supilį į nedidelį kiekį saldinio gerimo arba į maistą. Miltelius geriamajai suspensijai pakelti turinį supilį į nedidelį kiekį vandens ar saldinio gerimo, sumaišyti ir išgerti. Miltelius taip pat galima maišyti su maistu. Vaisto vartoti dar kelias paras, pasibaigus viduriavimo simptomams. **Dozavimas.** Suaugusiems ir vyresniems nei 2 metų amžiaus vaikams rekomenduojama dozė yra 1 kapsulė arba pakelėlis vartojama viena arba du kartus per parą. **Specialūs įspėjimai.** Pastarbkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Enterol. Šis vaistas nepakeičia rehidracijos (normalaus organizmo skysčio tūrio ir sudėties palaikymo), jei jos reikia. Enterol vartoti negalima jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu yra alergija mielii grybeliui, ypač Saccharomyces boulardii; jeigu nusilpusi imuninė sistema ar esant gydymui ligoninėje; jeigu įstatytas centrinės venos kateteris; jeigu pacientas yra jaunesnis kaip 2 metų amžiaus vaikas. Reklamos parengimo data: 2021/07/15. 80017771

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis.



5⁹⁹



4⁹⁹



MEZYM 20000V 20 skrandyje netirios tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Vienoje skrandyje netirioje Mezym 10000V tabletyje yra 80–111,11 mg kaulių kasos miltelių, kurių aktyvumas atitinka ne mažiau kaip: 10000 lipazės vienetų, 7500 amilazės vienetų, 375 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją.

Vienoje skrandyje netirioje Mezym 20000V tabletyje yra 160–222,22 mg kasos miltelių (6 kaulių kasos pagaminto pankreatino), kurių minimalus aktyvumas atitinka 20000 lipazės vienetų, 12000 amilazės vienetų, 900 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją.

Indikacijos: MEZYM vartojamas tuomet, kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentų ir tai sukelia virškinimo sutrikimų. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas (alergija) pankreatinui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Ūminis arba paūmėjęs lėtinis kasos uždegimas, kolikų požymiai yra stipriai išreikšti. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Cistinė fibrozė kartais gali komplikuotis žarnyno nepraeinamumu. Esant simptomams, panašioms į žarnyno nepraeinamumo požymius, reikia įvertinti žarnyno susiaurėjimo susidarymo galimybę. MEZYM sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas yra sakes kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. MEZYM 10000V sudėtyje esantis dažiklis azorubinas (E122) gali sukelti alerginių reakcijų. **Dozavimas:** MEZYM visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. MEZYM dozės priklauso nuo virškinimo sutrikimų laipsnio, optimali dozė nustatoma individualiai. Jeigu kitaip nurodyta, valgant išgeriamas 2–4 plevėle dengtos MEZYM 10000V tabletes arba 1–2 plevėle dengtos MEZYM 20000V tabletes. Dienos dozė 15000–20000 lipazės vienetų kilogramui kūno svorio neturėtų būti viršijama. Dozės vaikams turi paskirti gydytojas. Priklauso nuo matos ar virškinimo sutrikimo sunkumo, rekomenduojama dozė gali būti padidinta. Plevėle dengtos tabletes nuryjamas nekrmant ir užsigeriant dideliu skysčiu kiekiu. Ilgalaičio gydymo atveju vartojimo trukmę nustato gydytojas. Vartojimo trukmę vaikams taip pat nustato gydytojas.

Reklama paruošta: 2018 m. sausio mėn. LT_Mez_02_2018_v1

MEZYM – PADEDA PAGERINTI SUTRIKUSĮ VIRŠKINIMĄ!

* kai kasa išskiria nepakankamai virškinimo fermentų

PERŠALIMO IR GRIPO SIMPTOMAMS LENGVINTI

nuo

4⁹⁹



GRIPEX THERMAL

GRIPEX THERMAL, 300/20/5 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 12 paketėlių **6⁹⁹ €**

GRIPEX THERMAL, 650/50/10 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 8 paketėliai **4⁹⁹ €**

GRIPEX THERMAL, 650/50/10 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 12 paketėlių **6⁹⁹ €**

GRIPEX THERMAL, 1000/100/12.2 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 8 paketėliai **5⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: „Gripex Thermal 300/20/5 mg“: 1 paketėlyje yra 300 mg paracetamolio, 20 mg askorbo rūgšties, 5 mg fenilnifeno hidrochlorido; „Gripex Thermal 650/50/10 mg“: 1 paketėlyje yra 650 mg paracetamolio, 50 mg askorbo rūgšties, 10 mg fenilnifeno hidrochlorido; „Gripex Thermal 1000/100/12.2 mg“: 1 paketėlyje yra 1000 mg paracetamolio, 100 mg askorbo rūgšties, 12,2 mg fenilnifeno hidrochlorido. **Indikacijos:** peršalimo ir gripo simptomų (karščiavimo, galvos, gerklės, raumenų skausmo, nosies užgulimo, slogos) lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. „Gripex Thermal 300/20/5 mg“: paketėlio turinį išstipinti 100 ml karšto vandens; 6–12 metų vaikams: 1 paketėlis kas 4–6 val. (ne daugiau kaip 4 paketėliai per parą); suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams: 1–2 paketėliai kas 4–6 val. (ne daugiau kaip 6 paketėliai per parą). „Gripex Thermal 650/50/10 mg“ arba „Gripex Thermal 1000/100/12.2 mg“: paketėlio turinį išstipinti 100 ml karšto vandens; 6–12 metų vaikams: 1 paketėlis kas 4–6 val. (ne daugiau kaip 4 paketėliai per parą); suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams: 1–2 paketėliai kas 4–6 val. (ne daugiau kaip 6 paketėliai per parą). Nėpasirū su gydytoju, nevertokite ilgiau nei 7 d. Nevartokite didesnis nei rekomenduojama dozės. Pasakykite gydytoju, jei įsū įkštų ar kepenų veikla sutrikusi, nuolat vartojate alkoholi, kad dozė būtų pakoreguota. **Kontraindikacijos:** vartoti negalima esant alergijai veikliosioms arba pagalbinėms medžiagoms arba vaistams, kurių sudėtyje yra simpatomimetinių aminių; sergant širdies ligomis, padidėjusiu kraujospūdžiu; gliukozės-6-fosfodehidrogenazės arba metemoglobino reduktazės stoka; sunkių kepenų ar inkstų nepakankamumu; tirtokskozė (skydliaukės liga); šlapimo užsilaikymu arba feochromocitoma; vartojate zidovudiną, MAO inhibitorius; esate nėščia arba žindote kūdikį; „Gripex Thermal 300/20/5 mg“ negalima vartoti jaunesniems nei 6 metų vaikams, o „Gripex Thermal 650/50/10 mg“ arba „Gripex Thermal 1000/100/12.2 mg“ – jaunesniems nei 12 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai:** pastarbkite su gydytoju, jei sergate kepenų arba inkstų nepakankamumu, bronchine astma, prostatos hiperplazija, Rėno sindromu (rankų ar kojų pirštų, ausies kraštų ir nosies galuko išblyškimas, dažnai sukelias šalčio arba emocijų streso), širdies liga, padidėjusiu kraujospūdžiu, cukriniu diabetu. 2020-05-27.

GRIPEX. GALIŲ.

ESANT AKIŲ UŽDEGIMUI

9⁹⁹



DESODROP® 8ml akių lašai

MEDICINOS PRIEMONĖ

Liposominis ozonuotas tirpalas akims su LipozoneEye®
Ozonas - galingas natūralus antiseptikas, turintis plataus spektro antibakterinį, antivirusinį, antiparazitinį poveikį. Preparatas skirtas uždegimo simptomų gydymui taip pat ir infekcinės kilmės (konjunktivitui, keratitui, blefaritui ir pan.), sergantiems pasikartojančiomis akių infekcijoms, infekcijų profilaktikai po chirurginių intervencijų, traumų. Apisaugo ragenos epitelį, skatina gijimą, bei stabilizuoja sąsary plevėle. DES-12107-34

OZONO TERAPIJA AKIES PAVIRŠIAUS LIGOMS

NUO SKAUSMO

SOLPADEINE

500 mg/8 mg/30 mg,
12 tablečių 3⁹⁹ €
500 mg/8 mg/30 mg,
12 tirpinamųjų tablečių 4⁹⁹ €



nuo
3⁹⁹

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 tabletė arba tirpinamoji tabletė yra 500 mg paracetamolio, 8 mg kodeino fosfato hemihidrata ir 30 mg kofeino. **Terapinės indikacijos:** silpno ir vidutinio stiprumo skausmo (šarnių, nugaros, galvos ir migreninio, menstruacinio, neuralginio bei dantų) malšinimas. Persalimo ir gripo simptomų lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems: tirpinamosios tabletės, „Solpadeine“: po 2 tabletes išstiprinti ne mažiau kaip pusę stiklinės vandens ir gerti 3–4 kartus per parą (pagal poreikį); tabletes, „Solpadeine“: po 2 tabletes, jei reikia, 3–4 kartus per parą. Negalima dozės gerti dažniau nei kas 4 valandas ir ne daugiau kaip 8 tabletes per bet kurias 24 valandas. 12–15 m. paaugliams: po 1 tabletę kas 6 valandas. Neviršyti maksimalios paros dozės – 4 tablečių per parą. 16–17 m. paaugliams: po 1–2 tabletes kas 6 valandas. Neviršyti maksimalios paros dozės – 8 tablečių per parą. Gydytojo trumkė turi būti ne ilgesnė kaip 3 paros. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš pradėdami vartoti vaistą: jeigu sergate sunkia inkstų ar kepenų liga; jeigu sutrikusi žarnyno veikla, įskaitant žarnyno veiklos sustojimą; jeigu jums operacijos metu buvo pašalinta tulžies pūsle; jeigu vartojate vaistų nuo depresijos arba kvėpavimo sutrikimų; jeigu vartojate vaistų nuo pykinimo, vėmimo arba padidėjusio cholesterolio kiekio kraujyje, jei valgote maistą, kuriame yra mažai natrio (1 tirpinamoji tabletė yra 427 mg natrio). Nevartokite per daug produktų, kuriuose yra kofeino. Kartu su šiuo vaistu nevartokite kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio ar kodeino. Kaip ir kitų opioidų, kodeino reikia vartoti atsargiai, jeigu jūsų kraujui spaudimas yra žemas ar sergate hipotenzija, patyrėte galvos traumą ar turite padidėjusį intrakranijinį (kaukolės ertmės) spaudimą. **Kontraindikacijos:** „Solpadeine“ vartoti negalima: jeigu yra alergija veikliosioms medžiagoms (paracetamoliui, kodeino fosfato hemihidrui, kofeinui, skausmą malšantiems opioidams) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio; jeigu yra lėtinis vidurių užkietėjimas; jeigu yra kvėpavimo funkcijos nepakankamumas; jeigu buvo galvos trauma; jeigu yra padidėjęs intrakranijinis spaudimas; jeigu buvo atlikta tulžies latakų operacija; vaikams, jaunesniams kaip 12 m.; malšinti skausmą vaikams ir paaugliams (0–18 m.) po gerklės ir ryklės migdolų pašalinimo dėl obstrukcinės miego apnėjos sindromo operacijos; jeigu yra žinoma, kad organizme medžiagos labai greitai metabolizuojamos į morfiną; moterims nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Reklamos teksto parengimo data 2020-08-05.

GREITAI IR EFEKTYVIAI MALŠINA SKAUSMĄ IR MAŽINA KARŠČIAVIMĄ!

SKAUSMUI MALŠINTI



4⁹⁹

CAPSICAM® 12 pleistrai

MEDICINOS PRIEMONĖ

Sildomųjų hidrokelio pleistrai, skirti greitai numalšinti raumenų, šarnių, nugaros, kaklo ir kitokios kilmės skausmams.

- Malšina visų tipų skausmą.
- Veikliosios medžiagos glitai įsiskverbia.
- Pagerina kraujotaką ir kraujotaką.
- Poveikis ilgalaikis – iki 8 val.
- Malonius, galvus kvapo.

CAPSICAM® HIDROGELIO PLEISTRAI – INOVACIJOS ĮVEIKIA SKAUSMĄ!

NUGAROS, SPRANDO SKAUSMAMS IR RADIKULITUI GYDYTI

6⁹⁹



KAPSİKAM® vaistinis šildomasis tepalas, 50 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Tepalas Kapsikam®. Nereceptinis vaistas. 1 g tepalo yra 50 mg dimetilsulfoksido, 30 mg raceminio kamparo, 30 mg terpentino eterinio aliejaus, 20 mg benzilnikotinato, 2 mg nonivamido. **Terapinės indikacijos:** vietinis raumenų ir šarnių skausmų malšinimas. **Dozavimas ir naudojimo būdas:** norint sukelti skausmą malšinantį poveikį, ant skaudamos vietos aplikatoriumi užtepama 1–3 g (6–18 cm) tepalo 2–3 kartus per parą, atsivėlgiant į skausmo intensyvumą. Norint ilgiau išlaikyti šildomąjį tepalo poveikį, ant skaudamos vietos reikia uždėti tvarstį. Didžiausia vienkartinė dozė – 3 g. Didžiausia paros dozė – 9 g. Po kiekvienos procedūros reikia nusiplauti rankas šaltu vandeniu su muilu. Naudoti ant odos. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Odos opos, žaizdos bei ligos, kai yra pažeistas odos paviršius. **Vietinis rinkodaros teisės turėtojo atstovas:** AB „Grindeks“ filialas, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2020-12-05.

MANO JĖGA JUO DĖJIME!

VENŲ NEPAKANKAMUMUI GYDYTI IR SIMPTOMAMS LENGVINTI



nuo
3⁹⁹

TROXEVASIN

2 %, 40 g gels 3⁹⁹ €
2 %, 100 g gels 9⁹⁹ €
300 mg, 50 kapsulių 11⁹⁹ €
300 mg, 100 kapsulių 19⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: veikioji medžiaga yra trokserutinas. Kiekviena „Troxevasin“ kietoji kapsulė yra 300 mg trokserutino. Viename grame gėlio yra 20 mg trokserutino. **Indikacijos:** lėtinio venų nepakankamumo simptomų, pavyzdžiui, kojų sunkumo, sunkumo, patinimo lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Troxevasin“ kapsulės – suaugusiems pacientams rekomenduojama pradinė dozė yra 1 kapsulė 2 kartus per parą (600 mg) tolygiais intervalais. Šia doze gydoma tol, kol išnyksta simptomai ir tirimas, paprastai 2 savaites. Paskui dozė – 1 kapsulė (300 mg) per parą 2–4 savaites. Maksimali paros dozė yra 1500 mg. Kapsulės reikėtų vartoti valgio metu. „Troxevasin“ gėlis – suaugusiems pacientams iš ryto ir vakare ligos pažeistą vietą reikia patepti nedideliu gėlio kiekiu ir švelniai masažuoti tol, kol vaistinis preparatas visiškai įsigers į odą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Spec. įspėjimai: „Troxevasin“ kapsulių reikia atsargiai skirti sunkių kepenų nepakankamumui ar tulžies pūslės sutrikimams sergantiems pacientams. Šis vaistas neveiktyvų, jei tinimą sukelia kepenų, inkstų ar širdies-kraujagyslių sistemos ligos. Vaikams iki 18 metų „Troxevasin“ vartoti nerekomenduojama, kadangi duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra. Kapsulių negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – lapp laktaizės stypus arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Nėštumo metu „Troxevasin“ kapsulių vartoti nerekomenduojama. Žindymo gydymo metu reikia nutraukti „Troxevasin“ gėlio galimą vartoti tik ant nepažeistos odos. Juo negalima tepti atvirų žaizdų bei gleivinės, pvz., akių. Gėlio sudėtyje yra benzalkonio chlorido. Vartojant lokaliai gali dirginti, sukelti odos reakcijų. Nėštumo metu gėlio reikia vartoti atsargiai. Reklamos teksto parengimo data: 2018-08-19.

NEDELSKI! TEGUL KOJOS TAMPĄ LENGVOS IR SVEIKOS.

GREITAI ĮVEIKIA KOSULĮ



nuo
2⁹⁹

BRONTEX

BRONTEX 30 mg tabletės, 20 tablečių 2⁹⁹ €
BRONTEX 15 mg / 5 ml sirupas, 100 ml 3⁴⁹ €
BRONTEX 7,5 mg / ml geriamieji lašai, tirpalas, 100 ml 4⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletė yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido; 5 ml sirupo yra 15 mg ambroksolio hidrochlorido; 1 ml tirpalo (14–je lašų) yra 7,5 mg ambroksolio hidrochlorido. **Indikacijos:** kvėpavimo takų sekreto skystinimas ligoniams, sergantiems ūmine arba lėtine bronchių ar plaučių liga, kurios metu sutrinka sekreto išsiskyrimas ir šalinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** 2–5 metų vaikams skiriama 3 kartus per parą po 7,5 mg ambroksolio (1 ml lašų arba 2,5 ml sirupo); 6–12 metų vaikams – 2–3 kartus per parą po 15 mg ambroksolio (2 ml lašų arba 5 ml sirupo arba po pusę tabletes); suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams – 2–3 kartus per parą po 30 mg ambroksolio (4 ml lašų arba 10 ml sirupo arba 1 tabletė) arba inhaliuoti lašus 1–2 kartus per parą po 15–22,5 mg (po 2–3 ml lašų). Ligoniams, sergantiems sunkiu inkstų veiklos nepakankamumu, dozė reikėtų mažinti ir (arba) vartoti rečiau. Ambroksolio nepalariama vartoti ilgiau negu 4–5 paras. **Kontraindikacijos:** „Bronxex“ negalima vartoti, jei padidėjęs jautrumas ambroksoliui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Ambroksolio hidrochlorido negalima vartoti jaunesniems kaip 2 metų vaikams. Tablečių „Bronxex“ negalima vartoti jaunesniems kaip 6 metų vaikams. Specialūs įspėjimai: Jų reikia laikytis, jei sutrikusi bronchių motorika ir padidėjusi gleivių sekrecija, jei sutrikusi inkstų veikla arba sergant sunkia kepenų liga, būnus pepsinės opai arba nustačius fruktozės netoleravimą, taip pat sergantiems cukriniu diabetu (vartojant sirupą). Reklamos teksto parengimo data 2020-08-03.

IŠGYDYS NUO KOSULIO VISĄ ŠEIMĄ!

NAGŲ GRYBELIUI GYDYTI

19⁹⁹



EXCILOR® pieštukas nagų grybeliui gydyti, 3,3 ml
EXCILOR® teptukas nagų grybeliui gydyti, 3,3 ml

MEDICINOS PRIEMONĖS

Nagų grybelinės ligos sudetinga pasiekti ir gydyti, nes infekcija plinta ir nago viduje, ir paviršiuje. „Excilor“® buvo sukurtas specialiai nagų grybelinėms ligoms gydyti ir yra pagrįstas 3 principais: 1) efektyvus veikimo režimas: „Excilor“® pakeičia pH lygį nago viduje, sukurdamas nepalankią aplinką grybeliams (dermatofitams). Tai stabdo tolesnį grybelio augimą ir nagų pazeidimus; 2) optimalus ir visiškas prisiskverbimas į nagą: „Excilor“® greitai pasiekia grybelius, užtikrina sveiko nago ataugimą. „Excilor“® išdžiūsta per kelias sekundes, nepalikdamas matomos pėvelės; 3) patogumas: „Excilor“® paprasta naudoti, nereikia dildyti nago. Efektyvus gydymas užtikrinamas laikantis gydymo režimo: 1 kartą ryte ir 1 kartą vakare, iš viso 1 minutę per dieną.

NAUJOS KARTOS PRIEMONĖ NAGŲ GRYBELIUI GYDYTI!



4⁹⁹



FARINGODOL, 150 mg, 16 kietųjų pastilių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Vienoje kietosios pastilėje yra 150 mg cholino salicilato. **Terapinės indikacijos:** lokalis simptomis stomatito, faringito, gingivito ar periodontito gydymas. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams lėtai sučiulpti po 1 pastilę 4–6 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, salicilatams, kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo. Pacientams, kurių stemplėje yra veninių mažų. **Specialūs įspėjimai:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Faringodol“. Panašiai kaip ir gydantis kitais salicilatais, jei sergate virškinamojo trakto uždegimais, pepsine opalige ar bronchine astma, prieš pradėdami vartoti „Faringodol“, pasitarkite su gydytoju. „Faringodol“ sudėtyje yra medžiagų, iš kurių susidaro fenilalaninas. Gali būti kenksmingas sergantiems fenilketonurijai. **Reklamos teksto parengimo data:** 2020-10-19.

GREITAM IR EFEKTYVIAM SKAUSMO BEI KARŠČIAVIMO MALŠINIMUI

4⁹⁹



UPSARIN C 330 mg/200 mg, 20 šnypščiujų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Šnypščiosios tabletės, 20 vnt. **Sudėtis:** 330 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg askorbo rūgšties. **Terapinė indikacija:** silpno arba vidutinio stiprumo skausmo malšinimas ir (arba) karščiavimo mažinimas. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** suaugusiems ir paaugliams nuo 16 m. po 1–2 tabletes, ne dažniau kaip kas 4 val., ne daugiau kaip 9 tabletes per parą. Senyviems pacientams – ne daugiau kaip 6 tabletes per parą. Vartoti per burną. Prieš vartojimą ištrinti tabletes stiklinėje vandens. **Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai:** negalima vartoti moterims paskutinius 4 nėštumo mėnesius ir žindymo laikotarpį, vaikams ir paaugliams iki 16 m., asmenims, kurių padidėjęs jautrumas bent vienai sudedamajai medžiagai, sergant ūmine skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, esanti inkstų, kepenų, širdies nepakankamumui ir kt. Net vartojant mažaisiomis dozėmis, acetilsalicilo rūgštis didina kraujavimo pavojų, todėl negalima vartoti sergant hemofilija, hemochromatoze, su antikoagulantais, jei sergate opa, esant G6PD trūkumui. Atsargiai vartoti esant gausioms menstruacijoms, astmai, podagrai, šlapimtakii akmenligei, ilgai vartojant kitus vaistus nuo skausmo, senyvo amžiaus žmonėms. **Teksto parengimo data:** 2020.12.10. PM-LT-2020-12-1812.

4⁹⁹



DEEP HEAT KREMAS 67g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 g kremo yra 128 mg metilsalicilato, 59,1 mg levomentolio ir raceminio mentolio, 19,7 mg eukaliptų eterinio aliejaus ir 14,7 mg terpentino eterinio aliejaus. **Terapinės indikacijos:** Lokalis sąnario aplinkos minkštųjų audinių uždegimo ir (ar) traumos (pvz., sumušimo, patempimo) sukeltos skausmo malšinimas. **Dozavimas:** suaugusiems tepti reikia apie 4 cm kremo 2–3 kartus per parą. Vienoje dozėje (4 cm) yra vidutiniškai 0,026 g metilsalicilato ir vidutiniškai 0,12 g levomentolio. Neviršyti nurodytų dozių. Gydymo trukmė priklauso nuo indikacijų bei vaistinio preparato poveikio. Pacientą reikia informuoti, kad nepasitarus su gydytoju suaugusiems kremu negalima tepti ilgiau kaip 3 parų. Jeigu per 3 paras simptomai išlieka arba būklė pasunkėja, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Vaikų populiacija: Duomenų apie Deep Heat saugumą ir veiksmingumą jaunesniems kaip 18 metų vaikams nėra. **Vartojimo metodas:** Plonu gelio sluoksniu patepti skaudamą vietą ir švelniai įtrinti. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas aspirinui, ibuprofenui ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, įskaitant ir vartojamus per burną, ypač jei jautrumas vaistiniams preparatams buvo susijęs su astma. Astma sergantys pacientai, kuriems aspirinas arba kiti nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, gali sukelti astmos priepuolį, niežėjimą, rinitą ar dilgėlinę. Negalima tepti ant pažeistos odos, apie akis, ant gleivinės, atvirų žaizdų, egzemos pažeistų vietų. Kiti toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu lokaliai vartojami vaistiniai preparatai. Vartojimo vietoje esanti infekcija. Paskutinis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Krems netepti ant (arba) šalia gleivinės ir akių. Pirmą kartą išbandyti ant mažo odos ploto. Jei pasireiškia bet koks nepageidaujamas poveikis ar ligos požymiai užtepusia arba pasunkėja, pasitarti su gydytoju. Vartoti tik ant odos. **Registruotojas:** Colep Laupheim GmbH & Co. KG, Vokietija. **Gamintojas:** The Mentholatum Company Limited, Jungtinė Karalystė arba Colep Laupheim GmbH & Co. KG, Vokietija. **DEEP HEAT ŠILDANTIS KREMAS NUIMANTIS SKAUSMĄ IR RAUMENŲ SUSTINGIMĄ!**

2⁹⁹



OMEP UNO 20 mg, 14 skrandyje neiurių kietųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje skrandyje neiurio kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo. **Indikacijos:** „Omepr Uno“ vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refluksu simptomų gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** rekomenduojama vartoti vieną kapsulę per parą. Kapsules reikia nuryti nepažeistas ryte, užsigeriant puse stiklinės vandens. **Kontraindikacijos:** „Omepr Uno“ negalima vartoti kartu su nelfinaviru, jeigu yra padidėjęs jautrumas omeprazolui (o taip pat pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, ezomeprazolui) ar bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Sudėtyje yra sacharozės. Sandoz Pharmaceuticals d. d. filialas, Seimyniškų g. 3A, LT-09312 Vilnius, Lietuva. BS201124231. Reklamos teksto parengimo data: 2020 11 12.

STIPRI PAGALBA NUO RĖMENS!

ESANT SKAUSMUI

nuo

2⁹⁹



NALGESIN S

Natrio naprokseinas, 10 dengtųjų tablečių 2⁹⁹ €

Natrio naprokseinas, 20 dengtųjų tablečių 3⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: natrio naprokseinas – 275 mg. **Indikacijos:** galvos, dantų, mėnesinių, sąnarių, raumenų, potrauminių, pooperacinių skausmams malšinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 18 metų vaikams įprastinė paros dozė skausmui malšinti – 550–1100 mg. Iš pradžių vartojama 550 mg, vėliau – po 275 mg kas 6–8 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bet kuriai sudedamajai preparato medžiagai, buvusi alerginė reakcija, kurią sukėlė nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, aktyvi ar atsinaujanti skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, kraujavimas iš virškinamojo trakto, sunkūs širdies nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai:** naproksenu gydymą pacientą, sergantį epilepsija ar porfirią, kuriam buvo ar yra virškinamojo trakto sutrikimų, ypač opinis kolitas ar krono liga, privalo stebėti gydytojas. Naproksenu draudžiama vartoti, jei yra sunki nesena žaizda arba iki didelės operacijos liko mažiau kaip 48 valandos.

MALŠINA SKAUSMĄ IR UŽDEGIMĄ.

nuo

1⁴⁹



NUROFEN 200 mg, 12 tablečių 1⁴⁹ €

NUROFEN FORTE 400 mg, 12 tablečių 2⁴⁹ €

NUROFEN FORTE EXPRESS 400 mg, 12 tablečių 2⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Nurofen“ sudėtyje yra 200 mg ibuprofeno, „Nurofen Forte“ ir „Nurofen Forte Express“ sudėtyje yra 400 mg ibuprofeno. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, mėnesinių, sąnarių, mėnesinių sukeltos skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. **„Nurofen“ vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams pradinė dozė yra 2 tabletes, užgeriant vandeniu. Po to, jei reikia, gerti po 1–2 tabletes kas 4 valandas. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 6 tabletes (1200 mg). **„Nurofen Forte“ ir „Nurofen Forte Express“ vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vaikams pradinė dozė yra 1 tabletė, užgeriant vandeniu. Po to, jei reikia, gerti po vieną tabletę kas 8 valandas. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 3 tabletes (1200 mg). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai; jei praėjus 3 valandoms po padidėjusio jautrumo reakcijų (astma, rinitas, angioneurozinis patinimas, dilgėlinė) vartojant ibuprofeną, kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo (NVNU), įskaitant ir acetilsalicilo rūgšties darinius; sunkūs kepenų, inkstų, širdies nepakankamumas; paskutinis trijų nėštumo mėnesių laikotarpis; esama ar buvusi peptinė opa (du ar daugiau atskirų įrodymų išopėjimo ar kraujavimo epizodų); buvęs kraujavimas iš virškinamojo trakto ar jo prielaidos, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; kraujavimas į smegenis, virškinimo traktą arba kitos kraujavimas; jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai:** vaistų reikia atsargiai vartoti pacientams, kuriems yra sisteminė raudonoji vilkligė, taip pat kurie serga jungiamąjo audinio liga – didėja asptinio meningito rizika, anksčiau buvo padidėjęs kraujospūdis ir (arba) širdies nepakankamumas, jei yra nesunkus inkstų pakankamumas ar inkstų funkcijos pablogėjimas, jei yra nesunkus kepenų funkcijos sutrikimai; pacientams, kurie sirgo opinio kolito, krono ligos, pacientams, kurie vartoja kraujagyslinių vaistų bei vaistų, galinčių padidinti išopėjimo ar kraujavimo pavojų. Visi vaistai gali būti susiję su nedideliu širdies priepuolio (miokardo infarkto) ar insulto pavojiaus padidėjimu. Retais atvejais pastebėta sunkių odos reakcijų (kurios kuro iš jų buvo mirtinos), įskaitant ekfoliacinį dermatitą, Stivenso-Džonsono (Stevens-Johnson) sindromą bei toksišką epidermio nekrolizę – Lajelo (Lyell) sindromą. Gauta pranešimų apie ūminės generalizuotos egeantinės pustuliozės (GEP) atvejus, pasireiškusius vartojant ibuprofeno sudėtyje turinčių vaistinių preparatų. Pasireiškus pirmiesiems sunkių odos reakcijų požymiams ir simptomams, pažeidžiam, odos išbėrimui, gleivinės pažeidimams ar kitoms padidėjusio jautrumo požymiams, ibuprofeno vartojimą reikia nutraukti. Šių vaistų negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Kiekvienoje tablečiųje yra natrio, todėl būna atsargiai, jei kontroliuojamas natrio kiekis maiste. Reklamos teksto parengimas 2020-09-10.

VitirON™ Immunity

STRONG

**IMUNINĖS SISTEMOS APSAUGAI
IR KVĖPAVIMO SISTEMOS
PALAIKYMUI!**



Tai maistinės medžiagos ir vaistažolių ekstraktai, skirti organizmo imuninės sistemos apsaugai.

Sudėtyje yra bioflavanoidų, kurie padeda kovoti su virusais, vitaminų C, D3, B6, B12, folio rūgšties ir kitų svarbių medžiagų, kurios padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

Ežiulė padeda palaikyti normalią viršutinių kvėpavimo takų funkciją, malšina gerklės ir ryklės dirginimą.



MAISTO PAPILDAS

Vartojimas: vyresniems nei 12 metų vaikams ir suaugusiems po 1 kapsulę per dieną. Nerekomenduojama vartoti nėščiosioms ir žindančioms moterims.

MAISTO PAPILDAS NĖRA MAISTO PAKAITALAS. SVARBU ĮVAIRI IR SUBALANSUOTA MITYBA BEI SVEIKAS GYVENIMO BŪDAS



AUSIMS

5⁹⁹**OTINUM** 200 mg/g ausų lašai (tirpalas), 10g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: 1 g ausų lašų (tirpalo) yra 200 mg cholino salicilato.
Indikacijos. Ūmaus išorinės, vidurinės ausies ar būgnelio uždegimo sukeltos skausmo malšinimas. Sukietėjusiems sieros kamščiams suminkštinti, prieš šalinant juos iš išorinės ausies landos.
Dozavimas. Dozė suaugusiems sergant ūminiu išorinės, vidurinės ausies ar būgnelio uždegimu: 3–4 vaisto lašus lašinti į išorinę ausies landą 3–4 kartus per dieną. Prieš sieros kamščio šalinimo procedūrą: 3–4 vaisto lašus lašinti į išorinę ausies landą 2 kartus per dieną 4 dienas. Vaikams nuo 1 metų dozės koreguoti nereikia. **Vartojimo būdas.** Vaistai lašinami ant šono gulintį pacientui. Įlašinus vaisto, žmogus privalo kelias minutes ramiai pagulėti.
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Prakiuręs ausies būgnelis. Jaunesni nei 1 metų kūdikiai.
Specialūs įspėjimai. Kiekvienoje šio vaistinio preparato dozėje yra 100 mg alkoholio (etanolio), tai atitinka 100 mg/1 g. Ant pažastos odos plotų etanolis gali sukelti degimo pojūtį.
 Reklamos teksto parengimo data: 2021 metų kov mėn. MWL-LT-21-31

ATSIKOŠĖJIMUI PALENGVINTI

nuo 2⁴⁹

PERTUSINAS

PERTUSINAS, 100 ml 2⁴⁹ €
PERTUSINAS FORTE, 100 ml 2⁸⁹ €
PERTUSINAS SIRUPAS VAIKAMS, 100 ml 3⁵⁵ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Tradicioniai augaliniai vaistiniai preparatai, kurių indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. Vaistiniai preparatai vartojami peršalus, kaip atšikojėjimą lengvinanti priemonė. **„Pertusinas“.** Sudėtis: 1 ml tirpalo yra 162,5 mg Thymus vulgaris L ir (ar) Thymus zygis L, herba (džiovėlių žolė) skystojo ekstrakto (1:1). Ekstrahentas: 30 % (V/V) etanolis. Pagalbinės medžiagos: 1 ml tirpalo yra 1025 mg sacharozės ir 62,5 mg 80 % etanolio. **Dozavimas ir vartojimas:** suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams gerti 3–5 kartus per parą po 1 desertinį šaukštą (10 ml). **„Pertusinas Forte“.** Sudėtis: 1 ml tirpalo yra 307,5 mg Thymus vulgaris L ir (ar) Thymus zygis L, herba (džiovėlių žolė) skystojo ekstrakto (1:1). Ekstrahentas: 30 % (V/V) etanolis. Pagalbinės medžiagos: 1 ml tirpalo yra 919 mg sacharozės. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams gerti 3–5 kartus per parą po 1 arbatinį šaukštelį (5 ml). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas džiovėlių ar kitoms nortėlių (Uppalečių) šeimoms (Lamiaceae, s. Labiatae) augalams. **Specialūs įspėjimai:** nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams, nes trūksta tyrimų duomenų. Jei atsiranda dusulys, karščiavimas ar pūlingi skrepliai, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Reklamos teksto parengimo data 2019-01-23. **„Pertusinas sirupas vaikams“.** Sudėtis: 1 ml sirupo yra 0,2 ml Thymus vulgaris L ir (arba) Thymus zygis L, herba (vaistinių džiovėlių žolė) skystojo ekstrakto (1:2). Ekstrahentas: 10 % (m/m) amoniako tirpalas, 85 % glicerolis, 90 % (V/V) etanolis, vanduo (1/20/70/109). **Indikacijos:** tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. Vartojamas peršalus, kaip atšikojėjimą lengvinanti priemonė. **Sudėtis:** 4 m. ir vyresniems vaikams ir paaugliams. **Vartojimas:** vyresniems kaip 12 m. paaugliams: gerti po 10 ml sirupo (2 matavimo šaukštus) 3 kartus per dieną; 4–12 m. vaikams ir paaugliams: gerti po 5 ml sirupo (1 matavimo šaukštą) 3 kartus per dieną. **Specialūs įspėjimai:** jei atsiranda dusulys, karščiavimas ar pūlingi skrepliai, būtina pasitarti su gydytoju. Jei vartojant šio vaisto simptomai neišnyksta per savaitę, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 4 m. kūdikiams ir vaikams, nes tokio amžiaus kūdikiams ir vaikams turi konsultuotis gydytojas. Šio vaisto sudėtyje yra nuo 4 iki 6 % (V/V) etanolio (alkoholio). Reklamos teksto parengimo data 2019-06-01.

VIRUSINIŲ PERŠALIMO LIGŲ SIMPTOMAMS LENGVINTI

nuo 5²⁵

OSCILLOCOCCINUM

OSCILLOCOCCINUM, vienadozės talpyklės,
 6 piliulės 5²⁵ €
OSCILLOCOCCINUM, vienadozės talpyklės,
 30 piliulių 24⁹⁹ €

HOMEOPATINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 dozėje (1 g) yra 0,01 ml laukinių ančių (*Anos Barbariae*) kepenų ir širdies ekstrakto 200K potencijos. **Indikacijos:** virusinių peršalimo ligų simptomų lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Jei ligos eiga sunkesnė, jai gydyti reikia naudoti kliniškai tyrimais patikrintas priemones. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** dozė priklauso nuo ligos stadijos. Inkubacijos laikotarpiu ir kai tik atsiranda simptomų – 1 dozė. Kartoti 2 ar 3 kartus kas 6 valandas. Sergant – 1 dozė 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare) 1–3 paras. 1 dozės turinį suberti po liežuviu ir leisti ištirpti. Vartojimas vaikams: prieš vartojimą piliules ištirpinti vandenyje. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Taip pat tiems, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Teksto parengimo data 2018-11.
NELEISK PERŠALIMUI TAVĘS ĮVEIKTI! OSCILLOCOCCINUM!

1⁹⁹

PARACETAMOL ACTAVIS, 500 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tablete yra 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikis karščiavimų mažinimas. Lengvo ir vidutinio stiprumo skausmo (pvz., galvos, dantų, sąnarių, raumenų, mėnesinių) malšinimas. Dozavimas ir vartojimo būdas: suaugusiems (prasta dozė yra 500–1000 mg kas 4–6 val. pagal poreikį). Didžiausia paros dozė yra 3 g. didžiausia vienkartinė – 1000 mg. „Paracetamol Actavis“ saugumas ir veiksmingumas vaikams, senyviams iki 50 kg, neištyti. Pacientams, kurie nuolat vartoja alkoholį, intervalas tarp dozių vartojimo turi būti bent 8 val. Jiems negalima viršyti 2 g paros dozės. Jeigu, praėjus daugiau kaip 3 paroms nuo gydymo pradžios, didelis karščiavimas ar infekcijos požymiai išlieka arba, jeigu praėjus daugiau kaip 5 paroms nuo gydymo pradžios, tebejaustamas skausmas, pacientą reikia išsiųsti dėl simptomų sukelto sutrikimo. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai** ir atsargumo priemonės: ilgalaikis arba dažnas vartojimas nerekomenduojamas, negalima kartu vartoti kitokių paracetamolio turinčių vaistinių preparatų. Visą paros dozę vartojant vienu metu ar perdozavimo atveju gali pasireikšti sunki kepenų pažeida. Tokiu atveju sąmonės paciento neaparauda, tačiau jis turi nedelsiant kreiptis į gydytoją. Pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų nepakankamumas, lengvas arba vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumas (skaitant Gilbert sindromą), sunkus kepenų nepakankamumas ar ūminis hepatitas, vartojantiesiems kepenų funkciją veikiančių vaistinių preparatų, taip pat tiems, kuriems yra gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės trūkumas, hemolitinė anemija ar dehidratacija, sergantiems astma bei tiems, kurie piknuotūžiaja alkoholiu arba nuolat blogai maitinasi, paracetamolio patariama vartoti atsargiai. Po ilgalaikio (> 3 mėn.) gydymo, kurio metu paracetamolio buvo vartota kas antrą parą arba dažniau, gali pasireikšti arba sustiprėti galvos skausmas. „Paracetamol Actavis“ sudėtyje yra kietųjų kramolų. Tinka sergantiems celiakija. Šio vaistinio preparato negalima vartoti kietiems alergiškiems pacientams (ši liga skiriasi nuo celiakijos). Reklamos teksto parengimo data 2019-07-01.

NUO GERKLĖS SKAUSMO IR UŽDEGIMO

nuo 5⁹⁹

DECATYLEN™

DECATYLEN™, 0,25 mg/0,03 mg,
 20 kietųjų pastilių 5⁹⁹ €
DECATYLEN, 0,25 mg/0,03 mg,
 40 kietųjų pastilių 8⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 0,25 mg dekalvino chlorido, 0,03 mg cinchokaino hidrochlorido. **Indikacijos:** burnos ir ryklės uždegimo (gingivito, opinio ir aftinio stomatito, faringito) vietinis gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams kas 2 valandas 3–4 valandas letai sučiulpti po 1 pastilę, vaikams nuo 4 iki 11 metų kas 3 valandas letai sučiulpti po 1 pastilę. Kai uždegimo simptomų sumažėja, vartoti po 1 pastilę kas 4 valandas. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Pastilių nevališkai, kai yra alergija kevirtinams amonio dariniams (pvz., benzalkonio chloridui). **Specialūs įspėjimai:** „Decatylen“ sudėtyje yra dekalvito. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas. Reklamos teksto parengimo data 2019-11-25.

KAI REIKIA NE TIK MALŠINTI SIMPTOMUS, BET IR GYDYTI GERKLĖS SKAUSMĄ!

ir nvaistine.lt

-30%

ABC VIT VITAMINAS C

MAISTO PAPILDAI

Su saldikliais.

Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės ir nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. **Vartojimas:** suaugusiems po 1–2 tabletes per dieną.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

IMUNINEI SISTEMAI

-20% 16¹⁵ 20⁹⁹

CITROMIX, 50 ml

MAISTO PAPILDAS

Greičfrutų sėklų ekstraktas – galinga priemonė stipriam imunitetui. Sudėtyje esantys vitaminai A, C ir D3 padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Svarbu subalansuota mityba bei sveikats gyvenimo būdas.

ir nvaistine.lt

-30%



COSINUS, RHINOSOL, PROPOLINK, IMMUNO, POSITIVE, CITROIMUN, OMEGA-3, ZINC, MUKALTIN, ERŠKŲTUOGIŲ SIRUPAS, ŠALTALANKIŲ ALIEJUS

MAISTO PAPILDAI

NORMALIAI SAVIJAUTAI PALAIKYTI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.



-40% **3⁴⁷** **3⁷⁹**

AMBIO BRONCHO 20 tablečių
MAISTO PAPILDAS

- Islandinės kerpės, vitaminas C, čiobreliai, pušų ir rūbų ekstraktai.
- Čiobreliai, islandinių kerpės ir paprastųjų pušų ekstraktai padeda palaikyti kvėpavimo takų funkciją.
- Maisto papildas sudėtyje esantis vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.



-45% **4⁶⁷** **8⁴⁹**

AMBIO HOT HERBAL DRINK, milteliai karštam gėrimui, 20 pakelių
MAISTO PAPILDAS

- Avelių skonio tirpus milteliai su pelargonijų šaknų ekstraktu, skirti karštam gėrimui paruošti, su saldikiais.
- Sudėtyje yra vitamino C, rutino, cinko ir seleno.



-20% **2⁷⁹** **3⁴⁹**

VITADAY RUTINAS SU VITAMINU C, 90 tablečių
MAISTO PAPILDAS

NUO SLOGOS

VIRŠUTINIAMS KVĖPAVIMO TAKAMS



SINUSTRONG SPRAY
nosies purškalo, 20 ml
MEDICINOS PRIEMONĖ

SINUSTRONG+ 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

Paskarinės raktakolės ir vaistiniai čiobreliai padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų funkciją. Tikrieji imbierai ir juodogiai šėvamedžiai padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

Perkant pakuotę antra tokia pati DOVANŲ!

1+1

IMUNITETUI



-50% **9¹⁰** **18⁴⁹**

ACTIVE IMMUNE 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS

„Active Immune“ aprūpina organizmą imunitetui reikalingomis medžiagomis. „Active Immune“ gaminamas iš šėvamedžių uogų, beržų žievės, apynių spurgų, šaltalankių, rozmarinų ekstraktų ir vitamino D. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

RŪPINKITĖS SAVO IMUNITETUI!



-40%

AMBIO LIPOSOMINIS VITAMINAS C SU KVERCETINU
30 kietųjų kapsulių **15⁹⁹** **9⁵⁹** €

MAISTO PAPILDAS

- Pagaminta naudojant liposomų technologiją.
- Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

AMBIO VITAMINAS C
20 tirpiųjų tablečių
3⁹⁹ **2³⁹** €

MAISTO PAPILDAS

- Šnypščiosios apelsinų ir mandarinų skonio tabletės.
- Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo, mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, gerina geležies absorbciją.



OTOSAN
MEDICINOS PRIEMONĖS

„Saugios, efektyvios ir kokybiškos medicinos priemonės (CE) nosies, ausų ir gerklės priežiūrai. Su natūraliais augaliniiais ekstraktais ir eteriniais aliejais. Tinka vaikams ir nešėsioms. Pagaminta Italijoje.

OTOSAN – TAI NATŪRALUS RŪPĖTIS JUMIS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

ir nvaistine.lt

-20%



Perkant pakuotę antra tokia pati DOVANŲ!

1+1

IMMUNOHOT, 6 pakeliai
POWER C 1000MG, 10 pakelių
BIOVITAMIN C + ZN, 14 pakelių
IMUNOX POWER 300, 14 pakelių
MAISTO PAPILDAI

Cinkas, vitaminas C ir vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Produktų sudėtyje nėra konservantų, stabilizatorių ar dažiklių. Pagaminta Italijoje.

„Power C“ – vitaminas C miltelių pavidalu 1 pakelyje net 1000 mg vitamino C! Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. „IMMUNOHOT“ – karštas imbierinis gėrimas su 7 aktyviomis medžiagomis imunitetui ir kvėpavimo takams! Miltelių sudėtyje – imbierių šaknų, vaistinių čiobrelių, ežiuolių, liepų žiedų, aviečių uogų ekstraktai, taip pat džiovintų malpigųjų (acerolų) ekstraktas (iš jų – natūralus vitaminas C), grynas cinko citratas.

„BioVitamin C + Zn“ – VITAMINAS C ir CINKAS – vitaminas C išgautas iš laukinių vyšnių – krautuotųjų malpigųjų, papildytas cinko citratu! „Imunox POWER 300 mg“ – CINKAS, VITAMINAS C ir VITAMINAS D – Net 300 % dienos normos imunitetui naudingų medžiagų viename pakelyje.

GALINGAM IMUNITETUI!



SĄNARIAMS



VERSAN

MAISTO PAPILDAI

„Versan Shots“ – geriamos skystos dienos dozės sąnariams, sklandžiam jų darbui. Vienas buteliukas per dieną aprūpina sąnarius reikalingomis medžiagomis: kolagenu, hialurono rūgštimi, gliukozaminu, chondroitinu, vitaminais C ir D3.

„Versan HydroCollagen“ – geriamas skystas hidrolizuotas kolagenas sąnariams, raumenims, kaulams, praturtintas magniu, padedančiu palaikyti normalią raumenų funkciją ir normalią kaulų būklę, bei vitaminu C, padedančiu palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlės ir kaulų funkcijai, susidarymą.


„Versan“ kapsulės – specialioje formulėje sąnariams, kurios sudėtyje yra: patentuoto hidrolizuoto II tipo kolageno, sudėtyje turinčio hialurono rūgšties, chondroitino, kitų proteoglikanų; vitamino C, padedančio palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlės funkcijai, susidarymą.

„Versan Osteo“ tabletės – patobulinta formulė sąnariams, kurios sudėtyje yra: dar daugiau patentuoto hidrolizuoto II tipo kolageno, sudėtyje turinčio hialurono rūgšties, chondroitino, kitų proteoglikanų; patentuotų pieno baltymų; vitamino C, padedančio palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlės funkcijai, susidarymą.

„VERSAN“ – PROFESIONALI PAGALBA JŪSŲ SĄNARIAMS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

RAIŠČIAMS, SAUSGYSLĖMS, FASCIJOMS



CIGNON® 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAI

Raiščiai, sausgyslės, fascijos yra judėjimui būtini jungiamojo audinio dariniai: raiščiai lyg virvės suriša sąnariuose esančius kaulų galus ir garantuoja judesio tikslumą; sausgyslės raumenys jungiasi prie kaulų. Joms susitraukiant pritraukiami kaulai ir taip įvyksta judesys; fascijos lyg tinklas apsupa ir sujungia kaulus, raumenis, sąnarius, raiščius, sausgysles į visumą, padeda raumenims sąveikauti tarpusavyje atliekant judesius. Nuolat pasikartojantis arba netikėti, staigūs judesiai, didesnės, intensyvesnės raumenų apkrovos gali paveikti raiščius, sausgysles, fascijas. Todėl rūpinantis jų sveikata svarbu sureguliuoti darbo ir poilsio režimą, taikyti optimalius fizinius krūvius ir aprūpinti raiščius, sausgysles, fascijas reikiomis maisto medžiagomis: mukopolisacharidais, hidrolizuotu kolagenu, vitaminu C, manganu. Manganas padeda palaikyti normalų jungiamojo audinio formavimąsi. „Cignon“ rekomenduojama gerti vaikams nuo 3 metų po 1 kapsulę, vaikams nuo 12 metų ir suaugusiems – po 2 kapsules per dieną.

„CIGNON“ – NELĖTINK TEMPO!

Perkant pakuotę – antra tokia pati DOVANŲ!

1+1

SĄNARIAMS, KREMZLĖMS, KAULAMS



CEMIO GEMZĖ, 60 kapsulių

MAISTO PAPILDAI

Ypatingas derinys, kurio sudėtyje yra grynos formos kolagenai NC I®, NC II®. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlės funkcijai, susidarymą. I tipo kolagenas sudaro iki 90 % visų kolagenų, randamų kūne. II tipo kolagenas sudaro iki 70 % sausos kremzlės masės. Sukurtas ir pagamintas Šveicarijoje pagal patentuotą „CollPure“ technologiją, kuri užtikrina aukštą produkto grynumą ir kokybę. Tik 1 kapsulė per dieną, **pakuotės užtenka 2 mėnesių kursui.**

DŽIAUGSMAS SU KIEKVIENU ŠUOLIU!



OLIDETRIN 2000 D3 + K2 Omega-3, 30 minkštųjų kapsulių

MAISTO PAPILDAI

Vitamino D3 šaltinis.

- Imunitetui – Vitamino D 2000 TV.
- Širdžiai, smegenims – DHR+ EPR omega-3 rūgštys
- Kaulams ir raumenims.

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Vitaminas D padeda sumažinti riziką griūti, kuri yra siejama su nestabiliu laikysena ir raumenų silpnumu. Griuvimas yra 60 m. ir vyresnių vyrų ir moterų kaulų lūžių rizikos veiksnys. Omega-3 riebalų rūgštys DHR (dokozahexaeno) ir EPR (eikozapentaeno) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą. Siekiant maksimaliai padidinti vitamino D papildą naudoti, juos naudinga vartoti kartu su vitaminu K2. Rekomenduojama vartoti 1 kapsulę per parą.

GERIAUSIA GYNYBA – STIPRUS IMUNITETAS

-20% 8⁰⁷ 10⁰⁹

-15% 17⁹³ 21⁰⁹

SĄNARIAMS, KAULAMS, KREMZLĖMS



ATLANT, 28 pakeliai

MAISTO PAPILDAI

Naujienai „Atlant“ – tai kolageno, gliukozamino ir kalcio kompleksas su vitaminu C. Aktyviųjų medžiagų sinergija Jūsų kremzlės, kaulams, odai, raumenims. 1 pakelyje: net 12 200 mg kolageno, 1500 mg gliukozamino, 120 mg kalcio ir 12 mg vitamino C. Kolagenas – natūraliai žmogaus organizme sintetinamas baltymas. Šis baltymas yra odos bei sąnarių kremzlės ir kaulų sudedamoji dalis. Natūralios kilmės gliukozaminas išgaunamas iš vėžiagyvių. Gliukozaminas yra sąnario kremzlės struktūrinė dalis. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlės funkcijai, kaulų funkcijai ir odos funkcijai, susidarymą. Kalcis reikalingas normaliai kaulų ir dantų būklei palaikyti. Sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, stabilizatorių ar saldiklių. Pagaminta Izraelio.

„ATLANT“ – SUTEIK TITANIŠKOS GALIOS SĄNARIAMS!

SĄNARIAMS



LITOZIN

LITOZIN KOLAGENAS, 30 tablečių 17⁹⁹ 11¹⁷ € -35 %

LITOZIN STRONG, 90 kapsulių 16⁴⁹ 8²⁵ € -50 %

LITOZIN ACTIVE, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN COLLAGEN, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN KOLAGENAS, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN ACTIVE, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN COLLAGEN, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN KOLAGENAS, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN ACTIVE, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN COLLAGEN, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN KOLAGENAS, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN ACTIVE, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN COLLAGEN, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN KOLAGENAS, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN ACTIVE, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN COLLAGEN, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN KOLAGENAS, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN ACTIVE, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN COLLAGEN, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN KOLAGENAS, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN ACTIVE, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN COLLAGEN, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN KOLAGENAS, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN ACTIVE, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN COLLAGEN, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN KOLAGENAS, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN ACTIVE, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN COLLAGEN, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN KOLAGENAS, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN ACTIVE, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN COLLAGEN, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN KOLAGENAS, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN ACTIVE, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN COLLAGEN, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN KOLAGENAS, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN ACTIVE, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN COLLAGEN, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN KOLAGENAS, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN ACTIVE, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN COLLAGEN, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN KOLAGENAS, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN ACTIVE, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

LITOZIN COLLAGEN, 30 tablečių 17⁹⁹ 8⁶⁰ € -50 %

Ir toliau nepailstame skelbti daržovių teikiamos naudos mūsų organizmui – šį kartą norime atkreipti dėmesį į jų svarbą mūsų kaulams. Žaliuose, ypač lapiniuose, daržovėse esantis vitaminas K yra viena esminiųjų medžiagų, padedančių išsaugoti kaulus sveikus ir stiprius. Deja, šis vitaminas neretai lieka nustelbtas kitų, dažniau minimų mineralų. O be reikalo. Vitaminas K padeda „surišti“ kauluose esančius mineralus bei lėtinti kalcio praradimą, taip jis padeda išlaikyti kaulinio audinio tankumą ir mažina osteoporozės, taip pat ir kaulų lūžių riziką. Gausiausi šio

primiršto vitamino šaltiniai yra lapiniai (kale) bei bruseliniai kopūstai, brokoliai, tačiau, jeigu nesate dideli šių daržovių mėgėjai, galite rinktis kitus kopūstus (žiedinius, gūžinius), įvairias salotas, špinatus, šparagus, lapinius burokėlius, ropines daržoves. Pasirinkimas tikrai didelis – kiekvienas atras tai, kas tinka ir patinka.



PRIEMONĖMS SLAUGAI

iki
-30%



VITAMINO D IR KALCIO PREPARATAMS

iki
-40%



Pasiūlymai galioja **2021 10 01 - 2021 10 31**, perkant vaistinėje, pateikus PC NORFA kortelę. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą. Prekių kiekis ribotas. UAB „Norfos vaistinė“ pasilieka teisę bet kada keisti akcijos sąlygas. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.



AMBIO PATIRIANTIEMS ĮTAMPA, mikstūra, 100 ml 6⁹⁹ 5⁹⁹ €

SKYSTASIS MAISTO PAPILDAS

- Ramunės, valerijonų ir apynių ekstraktai bei melatoninas.
- Melatoninas padeda mažinti subjektyvų laiko juostų skirtumą pajautimą. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant ne mažiau kaip 0,5 mg prieš einant miegoti pirmą kelionės dieną ir kelias dienas po atvykimo į kelionės tikslo vietą.
- Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti.
- Paprastųjų apynių ir valerijonų ekstraktai gali padėti atsipalaiduoti.

-20%



AMBIO PATIRIANTIEMS ĮTAMPA, 15 kratomųjų tablečių 5⁹⁹ 4³⁹ €

MAISTO PAPILDAS

- Augalinių ekstraktų ir melatonino kompleksas.
- Maisto papildas sudėtyje esantys karčėvišų citrinmedžių ir ramunėlių ekstraktai padeda atsipalaiduoti.
- Raudonėdžių pasiflorų ekstraktas padeda nusiraminti.
- Vaistinių melisų ekstraktas padeda palaikyti normalią miego kokybę.
- Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti.

NERVINĖS ĮTAMPOS SIMPTOMAMS MALŠINTI



nuo

0⁹⁹

VALERIJONŲ TINKTŪRA VALENTIS

VALERIJONŲ TINKTŪRA VALENTIS, geriamasis tirpalas, 30 ml 0⁹⁹ €
VALERIJONŲ TINKTŪRA VALENTIS, geriamasis tirpalas, 50 ml 1⁴⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: valerijonų šaknų tinktūra, 1 ml/ml. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas nespėjus nervinės įtampos simptomams malšinti ir kaip miegą gerinanti priemonė. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Nervinės įtampos simptomams malšinti gerti iki 3 kartų per parą po 0,5–1 arbatinį šaukštelį. Miegui pagerinti gerti 1 arbatinį šaukštelį valandą ar pusę valandos prieš miegą. Jei reikia, galima gerti 2 kartus: vakare ir prieš miegą. Maksimali paros dozė – 4 vienkartinės dozės. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai. Specialūs įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams. Šio vaistinio preparato sudėtyje yra nuo 65 iki 70 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data 2018-08-20.

-30% 2⁷⁹ 3⁹⁸

VITADAY MELISOS EKSTRAKTAS 30 tablečių MAISTO PAPILDAS



RAMEVAL® 15 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„RAMEVAL“® – ramybės augalų puokštė sukurta iš valerijonų, melisų, pipirinių mėtų, ramunėlių ir apynių, kuri padeda:

- palaikyti normalią nervų sistemos būklę (vaistiniai valerijonai),
- atsipalaiduoti (vaistinės melisos, pipirinės mėtos, vaistinės ramunės),
- palengvinti užmigimą ir palaikyti miego kokybę (vaistinės melisos, paprastieji apyniai)

IEŠKAI RAMYBĖS? ATRASK JĄ SU RAMEVAL.

Perkant pakuotę – antra tokia pati DOVANŲ!

1+1

NERVINĖS ĮTAMPOS IR NERVINĖS KILMĖS ŠIRDIES NĖGALAVIMŲ SIMPTOMAMS PALENGVINTI



SUKATŽOLIŲ TINKTŪRA VALENTIS, geriamieji lašai (tirpalas), 25 ml

TRADICINIS AUGALINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: sukatžolių tinktūra, 1 ml/ml. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas nervinės įtampos simptomams malšinti. Taip pat šis tradicinis augalinis vaistinis preparatas gali būti vartojamas nervinės kilmės širdies negalavimų simptomams palengvinti, pvz., smarkiai širdies plakimui, jeigu gydytojas yra patvirtinęs, kad nėra sunkios medicininės būklės. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Preparatą prieš vartojimą reikia suplakti. Jeigu gydytojas nepaskyrė kitaip, reikia gerti 3–4 kartus per dieną prieš valgį po 30–50 lašų. Kontraindikacijos: jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, vaisto vartoti negalima. Negalima vartoti nešutumo laikotarpiu. Specialūs įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 m. asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip 4 savaites simptomai išlieka, būtina pasitariti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Vaisto sudėtyje yra nuo 64 iki 70 % (V/V) etanolio.

0⁹⁹

NERVŲ SISTEMAI, KOKYBIŠKAM MIEGUI IR GERAI NUOTAIKAI



NEUROMED

MAISTO PAPILDAI

Nervų sistemos: kapsulės „Neuromed“ esantys apyniai padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, o pasifloros padeda palaikyti atsparumą stresui. Tinka vartoti tiems, kurie dieną nuolat jaučia įtampą tam tikrose gyvenimo situacijose: darbe, namie ir pan.


Greitai užmigimui ir kokybiškam miegui – žulpiamiosios tabletės „Neuromed Sleep“ su melatoninu ir augalinių ekstraktų. Melatoninas padeda sutrumpinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti. Vaistinės melisos bei pipirinės mėtos, esančios „Neuromed Sleep“ sudėtyje, padeda atsipalaiduoti ir gerai pailsėti.

Gerai nuotaikai – „Neuromed Good Mood“ su šafrano. Ilgalaikio streso pasekmė gali būti užsitęsusi prasta nuotaika. Vienas iš būdų susigrąžinti gerą nuotaiką – šafrano, dažinės ciberžolės (kurkumino) ir baikalinių kalpokų ekstraktų, vitaminų ir mineralų kompleksas, esantis „Neuromed Good Mood“.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

Perkant pakuotę – antra tokia pati DOVANŲ!

1+1

-40% 5²¹ 8⁶⁹

NEURO BALANCE 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

NEURO BALANCE sudėtyje yra valerijono, melisos, apynių, pasifloros ekstraktų ir B grupės vitaminų.

- Vitaminai B₁, B₂, B₆, niacinas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.
- Vitaminai B₁, B₂, niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją.
- Vitaminai B₁, B₆, niacinas padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
- Vitaminas B₁₂ ir niacinas padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.
- Vitaminas B₁₂ padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.



-10%

UNITAL

Unital 1mg tab. N20 6⁹⁹ 5⁴⁸ €

Unital 1mg tab. N50 14⁹⁹ 12⁷⁷ €

MAISTO PAPILDAS

„Unital“ sudėtyje yra melatonino. Jis padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Vartojant melatoniną, sutrumpėja laikotarpis, per kurį užmiegame. Melatoninas padeda sumažinti organizmo paros ritmo sutrikimus, pavyzdžiui, dėl skrydžio. Vartojimas: 1 tabletė vakare prieš miegą. Gamintojas: „Vitalabans“, Suomija.

PADEDA UŽMIGTI!



TRIPTAN FORTE 30 kapsulių 13⁹⁹ 8⁰⁰ €

MAISTO PAPILDAS

„Triptan forte“ vienoje kapsulėje yra 150 mg 5-hidroksitriptofano (5-HTP). Tai natūrali medžiaga, gaunama iš Afrikoje augančių augalų – *Griffonia simplicifolia* – sėklų. Tai pat sudėtyje esantys vitaminai B1 ir B6 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą. Vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

TAI, KŲ REIKIA GYVENIMUI BE STRESO!

SALDUS MIEGAS 15 kapsulių 6⁹⁹ 3⁹⁶ € SALDUS MIEGAS eliksyras, 150 ml 7⁹⁹ 4⁸⁰ €

MAISTO PAPILDAS

Linija „Saldus miegas“ – dvejetainio poveikio, skirta padėti greičiau užmigti ir atsikelti pailsėjus. „Saldus miegas“ vartotojų jau įvertintas, dvejopo poveikio, net 7 aktyviųjų medžiagų kompleksas, skirtas greičiau užmigti ir atsikelti pailsėjus. Sudėtyje esantys šimtmečius naudojami ramunėlių, valerijonų ekstraktai ir morkos pagrįstos medžiagos – 5-hidroksitriptofanas ir melatoninas – bei B grupės vitaminai padės patiriantiems stresą ir jaučiantiems nerimą. Tik 1 kapsulė prieš miegą! „Saldus miegas eliksyras“ malonus karamėlių skonio, skystas maisto papildas miegui. Nepamiršimas daug keliaujantiems, dirbantiems pamaininį darbą bei intensyviai gyvenantiems žmonėms. Patogus vartoti, nes nereikia užgerti vandeniu. Unikaloje sudėtyje yra GASR (Gama-amino sviesto rūgštis), 5-hidroksitriptofano ir 1 mg melatonino, kuris padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti). Vartojimas: suaugusiems ir vaikams vyresniems kaip 12 metų gerti po 15 ml (3 arbatinius šaukštelius) 30 min prieš miegą.

GERAM POILSIUI – SALDUS MIEGAS



MAGNIS + B₆ COMPLEX 30 kapsulių 9⁹⁹ 6⁴³ € MAGNIS + B₆ SUPERIOR 30 kapsulių 10⁹⁹ 6⁷⁵ € B TOTAL + MAGNE 60 kapsulių 10⁹⁹ 6⁸² €

MAISTO PAPILDAS

„Magnis + B₆ complex“ sudėtyje magnis yra magnio oksido pavidalu, o „Magnis + B₆ superior“ naudojama ypatinga magnio forma – dvi magnio druskos (magnio oksidas ir magnio citratas), kurios organizme išlieka ilgiau, nes suvra skirtingu metu. Abiejų preparatų sudėtyje papildyta ir vitaminu B₆. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų ir nervų sistemos veiklą. Magnis ir vitaminas B₆ padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją bei mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, todėl ypač tinka aktyviai sportuojantiems. „B total + magne“ – B grupės vitaminų derinys, papildytas magniu, tiems, kurie jaučia nervinę įtampą bei nuovargį. Sudėtyje esantys B grupės vitaminai (B1, B6, B12, biotinas, niacinas) ir magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir psichologinę funkciją. Vartojimas: „Magnis + B₆ superior“ gerti po 1 kapsulę per dieną, „Magnis + B₆ complex“ gerti po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną, „B total + magne“ gerti po 1 kapsulę per dieną, valgio metu arba po valgio.

-35%

-35%



MAGNIS IŠ NEGYVOSIOS JŲROS – „BIOFARMACIJA“

BIOMAGNESIUM ŠEIMOS PAKUOTĖ, 179 g 20⁹⁹ 14⁶² € BIOMG DEAD SEA, 7 paketėliai 5⁹⁹ 3⁷⁷ €

MAISTO PAPILDAS

Unikalūs maisto papildai milteliais geriamajam tirpalui ruošti. Sudėtyje nėra konservantų, stabilizatorių, dažiklių. Magnis išgaunamas iš Negyvosios jūros. Magnis reikalingas normaliai nervų sistemos veiklai ir raumenų funkcijai palaikyti, padeda mažinti pavargimo jausmą, palaikyti normalią energijos apykaitą. Užtenka 1 pakelio per dieną.

„Biomg DEAD SEA“ – viename pakelyje net 400 mg magnio, papildyto vitaminais B6 ir B12. Pagaminta Izraelyje.

PRITRŪKO ENERGIJOS? NEPRITRŪK MAGNIO!

-30%

-30%

174



KORVALOOL-P tirpalas, 25 ml

MAISTO PAPILDAS

60-ye lašų (rekomenduojamame suvartojimo per parą kiekyje) yra: izovalerijonorūgšties mentioesterio – 183,60 mg, mentolio – 123 mg, α-bromizovalerijono rūgšties etilo esterio – 112,5 mg, pipirinės mėtės aliejaus – 7,80 mg, apynių aliejaus – 5,55 mg, RMV (referencinė maistinė vertė) – nenustatyta. Sudėtyje yra alkoholio – 55 %.

GAMINAME VAISTUS PAGAL INDIVIDUALIUS RECEPTUS

- Atneškite gydytojo receptą iki 13 val. į bet kurią „Gintarinę vaistinę“.
- Atsiimkite pagamintą vaistą kitą darbo dieną.

VAISTINĖ
VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS





URIAGE

DERMATOLOGINĖ KOSMETIKA

„Uriage Roseliane“ kremas, 40 ml – raustančiai, su išsiplėtusiais kapiliarais veido odai.
„Uriage Eau Thermale RICH“ kremas, 40 ml – drėkinamasis, maitinamasis kremas veido odai.

„Uriage Bariéderm Cica“ atkuriamasis kremas su variu ir cinku, 40 ml – sudirgintai ir pažeistai odai.

„Uriage Bariéderm“ rankų kremas, 50 ml – pažeistai, sausai rankų odai.

„Uriage Xemose“ lūpų pieštukas, 4 g – kasdieniui sausų ir suskilusių lūpų priežiūrai.

KIEKVIENO POREIKIAMS. VISAI ŠEIMAI.



BIOCELL

Naujiena! „Biocell“ paakių kaukė su kolagenu. Hidrolizuotas kolagenas, hialurono rūgštis, raudonųjų dobilų ekstraktas drėkina, maitina, išlaiko elastingą, o ryžių sėlenų ekstraktas skaidina paakių odą.

„Biocell“ drėkinamosios veido kaukės sudėtyje esanti hialurono rūgštis efektyviai atkuria odos drėgmės pusiausvyrą, maitina ją, sutraukia poras, išlaiko odą elastingą bei skaisčią. „Biocell“ regeneruojamoji veido kaukė tinka pavargusiai ar jautriai veido odai. „Biocell“ stangrinamoji veido kaukė suteikia odai jaunatviškesnę išvaizdą. „Biocell“ giliai valanti deguonies kaukė su aktyviais anglimi efektyviai pašalina nešvarumus, riebalų perteklių ir makižo likučius nuo veido odos.

„BIOCELL“ – TOBULA ESI TU.



ALPECIN ir PLANTUR

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Alpecin C1“ šampūnas skatina plaukų augimą ties plaukų šaknimis. Šampūne esantis kofeinas saugo plaukų šaknis nuo testosterono poveikio ir suteikia joms augti būtinos energijos, gali apsaugoti nuo paveldimo plikimo. Efektyvumui sustiprinti šampūną rekomenduojama naudoti kartu su losjonu „Alpecin“. Dvejojo poveikio „Alpecin“ šampūnas efektyviai pašalina pleiskanas nuo galvos odos. Pastaba profesionaliems sportininkams: kofeino „Alpecin“ gali būti rasta plaukų folikuluose. Gamintojas „Dr. K. Wolff“, Vokietija.

„ALPECIN“ – KOVOK UŽ SAVO PLAUKUS!

„Plantur 39“ šampūnas su aktyviu kofeino kompleksu nuo plaukų slinkimo. Moters plaukų šaknis iki menopauzės saugo didelė estrogenų koncentracija. Po to jų sumažėja, didėja testosterono poveikis. Plaukai darosi plonesni, anksti nuslenka, pradeda matytis galvos oda. Šampūne esantis kofeino kompleksas saugo plaukų šaknis nuo hormonų sukkelto nuovargio. Naudokite kiekvieną dieną „Plantur39“ šampūną arba „Plantur39“ toniką. „Plantur21“ šampūnas skirtas jaunoms moterims, kurios patiria stresą moksloje, darbe ar asmeniniame gyvenime. Gamintojas „Dr. K. Wolff“, Vokietija.

„PLANTUR“ – NUO PLAUKŲ SLINKIMO!



LINOLA

KOSMETIKOS PRIEMONĖS,
MEDICINOS PREKĖS

„LINOLA“ produktų sudėtyje yra linolo rūgšties. Tai nepakeičiama riebalų rūgštis, būtina sveikai odai: efektyviai drėkina, mažina niežulį, stiprina apsauginę epidermio funkciją. „Linola“ šampūnas sukurtas galvos odai ir plaukams trinti tuomet, kai oda sausa, jautri, linkusi į atopinį dermatitą. „Linola“ kūno emulsija skirta kasdieniai sausos odos priežiūrai. „Linola“ dušo ir prausimosi gelis neleidžia odai išdžiūti – oda sudrėkinta išlieka 24 valandas ir negraūžia akių net ir vaikams. „Linola F“ kremas skirtas simptominiams sausos, pažeistos, raustančios, niežtinčios arba išsitempusios odos gydymui. „Linola“ dušo ir vonios aliejus naudojamas išoriniams odos susirgimų požymiams gydyti, kai oda yra sausa ar labai sausa, niežti, yra tempimo pojūtis ar oda pleiskanoja. „Linola“ produktai tinka kūdikiams, vaikams, suaugusiems ir pagyvenusiems žmonėms, saugūs naudoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu.

„LINOLA“ – PAGALBA IŠSAUSĖJUSIAI ODAI!



DUCRAY

ODOS IR PLAUKŲ PRIEŽIŪRA,
LENGVINANTI GYVENIMĄ.

Ilgų metų tyrimai ir inovacijos leidžia didžiulius veiksmingomis priemonėmis plaukams ir odai. Jos yra nepamainomos kenčiant nuo psoriazės, atopinio ar seborėjinio dermatito, plaukų slinkimo ar aknės. Begalė patentuotų inovacijų padeda palengvinti daugelio žmonių gyvenimą jau 90 metų.



* Akcijos taikomos geltona etikele pažymėtoms prekėms.

BIODERMA

DERMATOLOGINĖS VEIDO IR KŪNO ODOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

Sausai odai būdingas tempimo pojūtis ir elastingumo trūkumas, šie simptomai kartais pasireiškia kartu su niežėjimu ir pleiskanojimu. „Bioderma“ sprendimas: „Atoderm“ produktų linija, skirta sausai, labai sausai ar atopiškai odai, tinka naudoti kasdien ir kartu su egzemos gydymu... Asortimente yra visi produktai, būtini, kad oda būtų švelni ir minkšta! Dėl sudėtyje esančių patentuotų kompleksų „Atoderm“ produktai biologiškai ir ilgam atkuria sveiką odą būdingą barjerinę funkciją. Po dušo atsivėikink su sausa ir niežtinčia oda!

BIOLOGIJOS MOKSLAS DERMATOLOGIJAI.



-25%

VICHY

DERMATOLOGINĖS VEIDO IR KŪNO ODOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

Vichy laboratorijas įkūrė gydytojas, todėl sveikata yra mūsų DNR dalis jau 90 metų. Vichy pirmąją odos ekspozicijos moksle ir daro didžiulę pažangą kasdien. Kurdami produktus mes remiamės dermatologų patikrintomis formulėmis bei visada laikomės 3 pagrindinių principų: dermatologinės veikliosios medžiagos, dermatologų užtikrintas saugumas bei dermatologų patvirtintas veiksmingumas. Vichy lydi moteris visais jų gyvenimo periodais, stiprindama sveikos odos išvaizdą, siūlydama priemones tinkamas tiek paauglystėje, tiek menopauzės laikotarpiu. Sveikata svarbiausia. Pradėk nuo odos.



VICHY AQUALIA

-25%



VICHY NEOVADIOL

-25%



VICHY LIFTACTIV

-25%



VICHY PURETE

-30%

* Akcijos taikomos geltona etikete pažymėtoms prekėms.

ŠIRDŽIAI, KRAUJOTAKAI

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ FUNKCIJOMS GERINTI



ŠIRDIES LAŠAI VALENTIS

geriamieji lašai (tirpalas), 40 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: valerijonų tinktūra, sukutolių tinktūra, gudobelų vaisių skystasis ekstraktas, 0,34 ml + 0,33 ml + 0,33 ml/ml. **Indikacijos:** tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti, ypač esant nevinei įtampai. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Iš pradžių, tris arba keturias dienas, reikia gerti 3–4 kartus per dieną po 20–30 lašų, vėliau dozė sumažinti (gerti 2–3 kartus per dieną po 15–20 lašų). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bent vieni iš sudedamųjų vaisto dalių, nėštumas. **Specialūs įspėjimai:** vaistinio preparato nerekomenduojama naudoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip dvi savaites simptomai šiek tiek pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu vartojant preparato širdies plotel atsi-randa duriantis skausmas arba labiau sutrinka širdies ritmas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 61,5 % (V/V) etanolio. **Reklaminio teksto parengimo data:** 2018-08-30.



CARDIOACE

Cardioace 30 tablečių **20⁵⁹ 14⁴¹ € -30%**

Cardioace Plus 60 tablečių **39⁹⁹ 31⁵⁹ € -20 %**

MAISTO PAPILDAI

CARDIOACE – sinerginio veikimo kompleksas, kuriame derinamos naudingosios česnakų ekstrakto savybės su vitaminais, mineralais bei antioksidantais.

Sudėtyje yra medžiagų normaliai širdies veiklai (vitaminas B1, EPR, DHR), kraujotakai (česnakai), ląstelių apsaugai nuo oksidacinio pažeidimo (varis, selenas, vitaminai C, E).

CARDIOACE PLUS – sudėtis papildyta net 1300 mg veiksmingųjų augalinių sterolių normaliai cholesterolio koncentracijai ir patentuotu Cardiol kompleksu. *Teigiama poveikis jaučiamas suvartojant per parą ne mažiau 0,8 g augalinių sterolių

„CARDIOACE“ – KIEKVIENAM ŠIRDIES DŪŽIUI!

iki
-30%

FERCELAN

202,8 mg/0,8 mg/100 mg, 30 kietųjų kapsulių **3⁷⁹ €**

202,8 mg/0,8 mg/100 mg, 100 kietųjų kapsulių **8⁷⁹ €**

Geležies (II) fumaratas/folio rūgštis/askorbo rūgštis

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Indikacijos. Kiekvienoje kapsulėje yra 202,8 mg geležies (II) fumarato, atitinkančio 66,7 mg elementinės geležies, 0,8 mg folio rūgštis ir 100 mg askorbo rūgštis. Geležis ir folio rūgštis organizme reikalingi normaliam raudonųjų kraujo kūnelių eritrocitų susidarymui, negavus pakankamo šių medžiagų kiekio, gali susiformuoti anemija. Kombinuoto geležies ir folio rūgštis įrodė trūkumo šalinimas, ypač vieną mėnesį iki pastojimo (arba planuojant nėštumą) ir pirmų trijų nėštumo mėnesių laikotarpiu. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** 1 kapsulė 1 kartą per parą, nuryjant nekamtytą, gausiai užsigeriant skysčiu prieš pusryčius, prieš kitą valgyimą ar valgio metu. **Įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Alergija geležies fumaratui, folio rūgščiai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, nustatytas geležies perteklius organizme, geležies apykaitos sutrikimas, sergant mažakraujyste, nesujususia su geležies arba folio rūgštis trūkumu ar virškinimo trakto ligomis. Negalima vartoti dvigubos dozės, norint kompensuoti praleistą dozę. Perdozavimo simptomai gali būti vėmimas, kraujavimas iš virškinimo trakto, viduriavimas, vėliau gali atsirasti cirkuliacinės kolapsas, galimas apsinuodijimas geležimi. Nedešiant pasakykite gydytojų, jeigu jums atsirado: pasunkėjęs kvėpavimas, išbėrimas, kolapsas. „Ferrelan“ gali sukelti alergines reakcijas. Šio vaistinio preparato sudėtyje yra laktozės. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas galaktazės netoleravimas, Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktazės malabsorbcija. Geležis gali sąlygoti tamsią išmatų spalvą. Tai natūrali klinikinė reikšmė. Nėra skirtas vartoti vaikams. **Nėštumo ir žindymo laikotarpis.** Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. „Ferrelan“ galima vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu. **Pakuotė.** 30 arba 100 kietųjų kapsulių. **Farmakoterapinė grupė** – vaistiniai preparatai nuo anemijos, geležis derinijai su folio rūgštimi. **ATC kodas** – B03AE10. Teksto peržiūros data 2018-02-08.



nuo
3⁴⁵

FERRETAB® COMP.

FERRETAB® COMP. 152,1 mg/0,5 mg, 30 pailginto

atpalaidavimo kietųjų kapsulių **3⁴⁵ €**

FERRETAB® COMP. 152,1 mg/0,5 mg, 100 pailginto

atpalaidavimo kietųjų kapsulių **8⁴⁵ €**

Geležies (II) fumaratas / folio rūgštis

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Ferretab“ comp. – vartojamas kombinuotam geležies ir folio rūgštis trūkumui šalinti bei jo profilaktikai, ypač nėštumo metu. „Ferretab“ comp. aktyviai padeda geležies ir folio rūgštis kieki, kai to negali užtikrinti savarankiškai organizmas. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams, esant nedideliam geležies trūkumui, gerti po 1 kapsulę per parą. Kai yra mažakraujystė, paros dozė galima padidinti iki 1 kapsulės 2–3 kartus per parą. Kartais nėštumo metu reikia gerti didelę geležies dozę. Kapsules nuryti nekamtytą, užsigeriant stikline vandens. Nekramtykite arba neduokite kapsulių, nes gali sustiprėti skausmo poveikis. Geriausia kapsules išgerti nevalgius. **Kontraindikacijos.** „Ferretab“ comp. vartoti negalima, jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) geležies fumaratui, folio rūgščiai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu nustatyta su geležies ir folio rūgštis stoka susijusi anemija; geležies perteklius organizme arba būklė, kuri sutrikdo normalų geležies įsijavinimą; hemoglobinoopatija; jeigu sergate hemolizine apaline ar pernicinga anemija; virškinimo trakto ligomis. **Įspėjimai ir atsargumo priemonės:** gydymas turi būti tęsiamas keletą savaičių (mažiausiai 8–12 sav.) po to, kai eritrocitų skaičius tampa normalus iki visiško geležies atkūrimo. Vartojant „Ferretab“ comp. kapsules, kartais šalinami spazmai įvairiose kūno dalyse, tačiau tai normalu. Šiurbi informacija apie kai kurias pagalbinės „Ferretab“ comp. medžiagas. Sudėtyje yra 34,7 mg laktozės monohidrato (pieno cukraus). Jeigu gydymas jums yra sauskas, kad netoleruotų kokių nors angliavandenių, kreipkitės į prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Sudėtyje yra dažiklio azorubino (E122). Gali sukelti alerginių reakcijų. **Pakuotė:** 30 arba 100 pailginto atpalaidavimo kietųjų kapsulių. **Farmakoterapinė grupė:** vaistiniai preparatai nuo anemijos, geležis kartu su folio rūgštimi. **ATC kodas** – B03AD02. **Rinkodaros teisės turėtojas** ir gamintojas: „G.L. Pharma GmbH“, Schloßplatz 1, 8502 Lannach, Austrija.



RAMI ŠIRDIS LINIJA

MAISTO PAPILDAI

Linija „Rami širdis“ – gausios sudėties, dvejopo poveikio maisto papildai, pagaminti ir pripažinti Lietuvos vartotojų. Šie preparatai išsiskiria puikiai suderinta sudėtimi, kuri, be vitaminų ir mineralų, papildyta natūraliais augalinių ekstraktais, šimtmečius naudojamais medicinoje. Maisto papilduose „Rami širdis“ esantis plunksnų gudo-belių ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies veiklą, vaistinių valerijonų ekstraktas – psichologinę funkciją, vitaminas B6 padeda mažinti nuovargį.

„Rami širdis cholesterolio balansui“ – maisto papildas širdį, nervų sistemai bei cholesterolio kontrolei. Šio preparato sudėtyje esantis monokolinis K iš raudonosios mieles fermentuotų ryžių padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje (teigiama poveikis pasireiškia per parą suvartojant 10 mg monokolino K iš raudonosios mieles fermentuotų ryžių gaminių). Sudėtis papildyta berberinu. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

ir nvaistine.lt
-35%

nuo
3⁷⁹



CITO® FERRUM

30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„CITO® ferrum“ sudėtis pasižymi inovatyvia liposominės formos geležimi. Pasirinktas geležies profosatas yra geriausias pasirinkimas lyginant su kitomis geležies formomis. Geležies įsijavinimas iš geležies profosato priklauso nuo geležies trūkumo laipsnio: kuo labiau šio mikroelemento trūksta organizme, tuo geresnis jos įsijavinimas. Nedidriga skrandžio bei neturi geležies poskonio. Geležis padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą bei normalų deguonies pernešimą organizme. Folio rūgštis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei padeda palaikyti normalią kraujodarą. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

-35%
9⁵⁵
14⁶⁹



KARDIOKALIS

30 tablečių **7⁴³ €**

60 tablečių **13⁹⁹ 7⁴¹ €**

MAISTO PAPILDAS

„Kardiokalijs“ esantys mineralai:

- Kalis:
 - padeda palaikyti normalų kraujospūdį;
 - padeda palaikyti normalią raumenų veiklą;
 - Magnis:
 - padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį;
 - padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą bei psichologinę funkciją.
- Apvalkalelių dengtos „Kardiokalijs“ tabletės nedidriga skrandžio gleivinės. Tableteje esantys mikroelementai išsiskiria iš lėto – taip užtikrinamas ilgalaikis ir tolygus jų pasisavinimas.

KOMPLEKSAS ŠIRDŽIAI SU GUDOBELĖMIS

30 kapsulių **8⁶⁹ 5²¹ €**

MAISTO PAPILDAS

„Kompleksas širdžiai su gudobelėmis“ papildoma organizmą augalinių biologinių aktyviųjų medžiagomis: gudobelė, almedžių lapų bei česnakų ekstraktais. Vartojimas: po 1 kapsulę vieną kartą per dieną.

-40%



IRONLINK

MAISTO PAPILDAS

Skystis vienkartiniuose buteliukuose. Geležis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalų deguonies pernešimą organizme, normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą, normalią pažinimo funkciją, normalią energijos apykaitą.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

ir nvaistine.lt
-30%



RANIGAST S-O-S, 12 kramtomųjų tablečių

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Ranigast S-O-S“ yra skirtas gastroezofaginio refliukso simptomams (rėmeniui, skrandžio skausmui, dispepsijai) malšinti.

- Veikia akimirksniu – nuo to momento, kai tik suvalgulsite ar išgersite tabletę.
- Dėl ypatingos sudėties apsaugo skrandžio gleivinę ir sumažina rėmens epizodų skaičių.
- Tinka naudoti ir kaip papildoma priemonė sergantiesiems gastritu, peptine opa.
- Galima naudoti nėštumo ir žindymo metu, prieš tai pasitarus su gydytoju.
- Suaugusiems ir vaikams nuo 12 metų rekomenduojama pavaldžius vartoti 2 tabletes. Vaikams (6–12 metų): rekomenduojama pavaldžius vartoti 1 tabletę.

3⁹⁹



ir nvaistine.lt

-20%

LEPICOL

MAISTO PAPILDAI

„Lepicol“ – unikalus baltųjų gyslių luobelų, pieno rūgšties bakterijų ir inulino kompleksas. Sveikatos poveikio baltųjų gyslių luobelės ypač naudingos esant vidurių užkietėjimui. Sudėtyje yra 5 rūšių bakterijų kultūrų (Bifidobacterijos ir Lactobacilos), kurių natūraliai yra sveiko žmogaus virškinimo sistemoje.

„Lepicol Plus“ – papildytas augalinės kilmės fermentais iš imbiero šaknų, pipirmėčių lapų ir pankolių sėklų, skirtas normaliai virškinimo funkcijai palaikyti.

„Lepicol Lighter“: natūralios kilmės medžiagų kompleksas svoriui mažinti.

GERA JAUSTIS LENGVAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMUI GYDYTI



DUPHALAC

DUPHALAC, 667 mg/ml, geriamasis tirpalas, 200 ml 5⁹⁹ €
 DUPHALAC, 667 mg/ml, geriamasis tirpalas, 500 ml 9⁹⁹ €
 DUPHALAC, 667 mg/ml, geriamasis tirpalas, 1000 ml 14⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Sudėtis: 1 ml geriamojo tirpalo „Duphalac“ yra 667 mg laktuliozės. **Terapinės indikacijos:** vidurių užkietėjimui (reči žarnų judesiai, kietos ir sausos išmatos, paviršiumi, sergant hemoroidais, po storosios žarnos ar išangės operacijos), kepenų encefalopatijai gydyti. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** vaistas gali būti vartojamas 1 kartą per parą, pavyzdžiui, pusryčiaujant, arba dozė gali būti padalyta į 2 dalis. Geriamąjį tirpalą „Duphalac“ galima gerti neskiedžiant arba truputį atskiesti. „Duphalac“, tiekiamam buteliukuose, galima naudoti matavimo laurelę. Pradinė paros dozė: suaugusiems ir paaugliams – 15–45 ml; 7–14 m. vaikams – 15 ml; 1–6 m. vaikams – 5–10 ml; kūdikiams iki 1 m. – iki 5 ml. Atsižvelgiant į gydymo poveikį, po keleto dienų pradinė dozė gali būti keičiama palaikomoja doze. Gydymasis poveikis gali pasireikšti tik po keleto (2–3) dienų. Dozavimas esant kepenų encefalopatijai (tik suaugusiems): pradinė dozė yra 30–45 ml geriamojo tirpalo 3–4 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** be gydytojo nurodymo ir atidžios priežiūros vaikams iki 14 m. „Duphalac“ vartoti negalima. Alergija (padidėjęs jautrumas) laktuliozei arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, galaktosemija, žarnyno nepraeinamumas ar uždegimas (Krono liga ar opinis kolitas), virškinimo trakto perforacija (prakiurimas) ar jos rūkš. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** prieš pradėdami vartoti vaistą, rekomenduojama pasitarti su gydytoju ar vaistininku, jei jums skauda pilvą dėl nepaaiškintų priežasčių, jei negalite suvirškinti pieno cukraus (laktosės); jei sergate cukriniu diabetu. Vaisto vartoti negalima, jei yra: galaktosės ar fruktozės netoleravimas, lėpų laktazės trūkumas, gliukozės ir galaktosės malabsorbcija. Ilgalaisks nepritaikytos dozės vartojimas (daugiau nei 2–3 ištuštinimai minkštomis išmatomis per dieną) arba piktnaudžiavimas vaistu gali sukelti viduriavimą bei elektrolitų pusiausvyros sutrikimą. „Duphalac“ galima vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Reklamos teksto parengimo data 2019-04. MYL-LT-19-30

LENGVA PERGALĖ UŽKIETĖJUS VIDURIAMS.

VIRŠKINIMUI



AKTYVINTA ANGLIS

10 tablečių

MAISTO PAPILDAS

1-oje tabletyje yra 250 g aktyvuoto anglies.

PIGU 0²⁷

KEPENIMS



nuo 5⁸⁵

LIVOSIL

140 mg, 30 kapsulių 5⁸⁵ €
 140 mg, 60 kapsulių 10⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino. **Indikacijos:** papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livosil“ dozė yra 280–420 mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekratyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. „Livosil“ rekomenduojama vartoti ilgiau nei 3 mėnesius. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livosil“ medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemija), bei tuos, kurie vartoja preparatų, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. Teksto peržiūros data 2017-07-12.

NATŪRALI KEPENŲ APSAUGA IR GYDYMAS!



ACIDOLAC®

MAISTO PAPILDAS

Acidolac® sudėtyje yra liofilizuoto pieno rūgšties bakterijų padėrmės *Lactobacillus rhamnosus* GG ir prebiotikų fruktooligosacharidų (FOS). Vartojamas: vyresniems nei 3 metų vaikams ir suaugusiems: 1–2 pakeliai per parą. Be karvės pieno baltymo, laktosės, gliuteno ir sacharosės.

Acidolac® Junior baltos šokolado skonio meščiuko formos tabletės – produktas, sujungiantis probiotinių bakterijų *Lactobacillus acidophilus* ir *Bifidobacterium lactis* padėrmės ir fruktooligosacharidus (FOS). Vartojamas: vyresniems kaip 3 metų amžiaus vaikams ir suaugusiems vartoti po 1 tabletę du kartus per parą. Be sacharosės, gliuteno.

Acidolac® Junior braškių skonio meščiuko formos tabletės. Jo sudėtyje papildomai yra vitamino B6, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

Perkant pakuotę antra tokia pati DOVANŲ!

1+1

KELIAUJANT



-30% 3⁰⁰

AMARIN 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

AMARIN sudėtyje yra imbiero ir vitamino B₆. VAŽIUOJANT, SKRENDANT, PLAUKIANT.



PROBIOTIKAI LACTOBEX®

MAISTO PAPILDAS

Gerosios bakterijos apsaugotos dvigubu apvalkalu DUOLAC®, todėl į žarnyną patenka stiprios ir gyvybingos. **Vartojimas:** tik 1 kartą per parą.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

GERAI SVEIKATAI

ŽVAKUTĖS TEMPERATŪRAI MAŽINTI



3⁹⁹


IBUGARD 60 mg, 10 žvakučių
IBUGARD 125 mg, 10 žvakučių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Kokybė ir kokybinė sudėtis. Kiekvienoje žvakutėje yra 60 mg arba 125 mg ibuprofeno. **Terapinės indikacijos.** Karščiavimo mažinimas. Slopinti ir vidutinio stiprumo skausmą mažinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** „Ibugard“ 60 mg arba 125 mg žvakučių rekomenduojama vartoti tada, kai ibuprofeno neįmanoma vartoti per burną. „Ibugard“ 60 mg žvakučių skirtas vaikams nuo 3 mėnesių (nuo 6 kg kūno svorio) iki 2 metų (12 kg kūno svorio). „Ibugard“ 125 mg žvakučių skirtas vaikams nuo 2 metų (125 kg kūno svorio) iki 6 metų (205 kg kūno svorio). Vienkartinė dozė neturi viršyti 10 mg/kg kūno svorio. Didžiausia ibuprofeno paros dozė yra 20–30 mg/kg kūno svorio, padalyta į 3–4 vienkartines dozes.

Jeigu šio vaistinio preparato reikia vartoti 3–5 mėnesių vaikams ir jei per 24 valandas simptomai pasunkėja ar nesnyksta, reikia pasitarti su gydytoju. Jeigu šio vaistinio preparato reikia vartoti vyresniems kaip 6 mėnesių vaikams ilgiau nei 3 paras arba jeigu simptomai pasunkėja, reikia pasitarti su gydytoju. **Kontraindikacijos.** Vartoti negalima, jei yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, aceticilicilo rūgščiai ir kitoms nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo. **Priešėjimai ir atsargumo priemonės.** Atsargiai vartoti, jei pacientui per lėtai krenta kraujas, sutrikusi kepenų ir inkstų veikla, pacientas vartoja krešėjimą mažinančių vaistų, serga širdies nepakankamumu, hipertenzija, cukriniu diabetu, bronchine astma arba kitokia liga, kurios metu galimas bronchių spazmas, vartojantysis medikamentų, galinčių didinti virškinimo trakto išopėjimo ar kraujavimo riziką. Reklamos teksto parengimo data 2021-08.

NUO SKAUSMO



nuo 6⁹⁹

OLFEN 140 mg vaistinis pleistras, diklofenako natrio druska
2 pleistrai 6⁹⁹ €
5 pleistrai 10⁹⁹ €
10 pleistrai 18⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Olfen 140 mg vaistinis pleistras. Viename vaistiniame pleistre yra 140 mg diklofenako natrio druskos. **Indikacijos:** lokalaus skausmo, sukieto (pvz., sporto traumos) dėl ūmaus sausgyslių, raščių, sąnarių ar raumenų patempimo, sumuimo ar sąnarių panirimo, mažinimas. Dozavimas ir vartojimo metodas: sausgysliams 1 vaistinį pleistrą reikia priklijuoti ant skausmos vietos 2 kartus per dieną – naktį ir vakare. Maksimali dienos dozė yra 2 vaistiniai pleistrai, net jeigu pažeista daugiau nei viena vieta. Vieną metą gydymo tik viena pažeista vieta. Naudoti ant odos. Pleistras neturėtų būti dalijamas. Jeigu reikia, pleistras prie skausmos vietos gali būti pritvirtinamas elastiniu tvarslu. Gydymo ne ilgiau kaip 7 dienas. „Olfen“ pleistro naudojimas gali 15 metų pacientams naudoti nerekomenduojama. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei kitoms skausmą ir uždegimą slopinantiems nesteroidiniams vaistiniams preparatams (NVNU) arba aceticilicilo rūgščiai; astma, dilgėlė ar ūminis rinitas, kurie pasireiškė vartojus aceticilicilo rūgšties arba kitų NVNU; esama skrandžio ar žarnų opa; aviros žaizdos, nudegimai, odos infekcijos ar egzema; pasunkinti trys nėštumo mėnesiai. Specialūs įspėjimai: jeigu simptomai išlieka ilgiau kaip 3 d. arba pablogėja, reikia kreiptis į gydytoją. Pacientams, kurie serga ar anksčiau sirgo bronchine astma arba alergijomis, gali būti bronchių spazmas. Jeigu pavartojus vaistinio pleistro atsirado išbėrimų, gydymą reikia nedelsiant nutraukti. Gydymą vietą reikia saugoti nuo tiesioginių saulės ir ultravioletinių spindulių (1 diena), kad nepasireikš padidėjusio jutrumo šviesai reakcija. Vaistinį pleistrą atsargiai turi naudoti pacientai, kurių inkstų, kepenų ar širdies funkcija yra sutrikusi arba jeigu praėjusio buvo pėsinė opa, žarnyno uždegimas ar yra polinkis kraujoti. Preparatą atsargiai reikia naudoti senyviems pacientams, kadangi yra didesnis nepageidaujamo poveikio pavojus. Reklamos parengimo data: 2019-11-25

TEISINGAS ĖJIMAS KOVOJANT SU SKAUSMU.

NUO SLOGOS



nuo 3⁴⁹

OLYNTH®

OLYNTH® HA, 0,5 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 4⁹⁹ €
OLYNTH® HA, 1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 4⁹⁹ €
OLYNTH®, 1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 4⁹⁹ €
OLYNTH®, 1 mg/ml, nosies lašai (tirpalas), 10 ml 3⁴⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 0,5 mg arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikis simptominis nosies gleivinės paburkimo lengvinimas, sergant rinitu ar sinusitu. „Olynth“ HA, 1 mg/ml ir „Olynth“, 1 mg/ml skiriamas vartoti suaugusiems, 12 m. ir vyresniems vaikams. „Olynth“ HA, 0,5 mg/ml skiriamas vartoti 2–12 m. vaikams. Vartojimo būdas ir dozavimas: purkšti po 1 įpurškimą arba lašinti po 1 lašą į kiekvieną nosies langą ne daugiau kaip 3 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; padidėjęs akispūdis, ypač pacientams, sergantiems uždarą kampo glaukoma; sausasis arba vazomotorinis nosies gleivinės uždegimas; pacientai, kuriems atlikta transsfenoidinė hipofizektomija; monoaminooksidazės inhibitorių vartojimas šiuo metu arba per pastarąsias 2 savaites; vaistų, galinčių padidinti kraujospūdį, vartojimas; pacientai, sergantys atrofiniu arba vazomotoriniu rinitu. Specialūs įspėjimai: jei gydytojo nepaskirta kitaip, negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Atsargiai vartoti pacientams, kurie jautriai reaguoja į simpatomimetikus, serga širdies ir kraujagyslių ligomis, hipertenzija, hipertiroze, cukriniu diabetu, esant prostatos hipertrofijai ar sergant feochromocitoma. Reklamos teksto parengimo data 2021-02-02. LT-OL-2000006

GREITAS PALENGVĖJIMAS NOSIAI IR SINUSAMS.

VIDURIAVIMO SIMPTOMŲ PALENGVINIMUI



8⁹⁹

XILAPLUS milteliai nuo viduriavimo, vaikams nuo 3 mėn., žemuogių skonio, 8 paketėliai

MEDICINOS PRIEMONĖ

Xilaplus vaikams vartojamas fiziologinėms žarnyno sienelių funkcijoms atkurti, siekiant kontroliuoti ir palengvinti įvairius kilmes viduriavimo simptomus (pavysčius, pilvo tempimą ir dažnų tuštinimą). **Novatoriškas, unikalus ūminio viduriavimo gydymo metodas:** šiam preparatui esantis ksiloglikolis ir želatinos darinys veikia sudarydamas plėvelę, kuri apsaugo žarnyno gleivinę ir sumažina viduriavimo epizodų dažnį bei trukmę. **Naudojimo instrukcijos:** Paketėlio turinį išstipinkite pusę šiklės vandens. Be to, miltelius galima suberti į nedidelį kiekį vaistų sulčių. Gerai išmaišykite ir šgerkite nedelsiant. **Dozavimas:** suaugusiems kaip 3 metų vaikams: 1 paketėlis kas 8 valandas. 3–14 metų vaikams: 1–2 paketėliai kas 6–8 valandas.

NUO ALERGIJOS



3⁹⁹

LORATADINE ACTAVIS 10 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 10 mg loratadino. **Indikacijos:** vartojama alerginės slogos ir lėtinės dilgėlinės simptomams mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems, paaugliams ir 2–12 m. vaikams, sveriantiems daugiau kaip 30 kg, – 1 tabletė (10 mg) 1 kartą per parą. Vaikams, sveriantiems mažiau kaip 30 kg, šis vaistas nerekomenduojamas. Tabletes reikia nuryti, užsigeriant vandeniu. **Kontraindikacijos:** tablečių „Loratadine Actavis“ vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaistinio preparato medžiagai bei pacientams, kuriems smarkiai sutrikusi inkstų funkcija. Specialūs įspėjimai: „Loratadine Actavis“ reikia atsargiai skirti pacientams, kuriems yra sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas. Vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Nėštumo ir žindymo laikotarpiu šio vaistinio preparato vartoti atsargiai. Antihistamininiai vaistai gali susilpninti odos hiperergines reakcijas arba neleisti joms pasireikšti, todėl loratadino tablečių vartojimą reikėtų nutraukti mažiausiai 48 val. iki alerginių odos mėginių. Teksto parengimo data 2020-12-28.

MĖGAUKIS ŽIEDAIS!

VENOMS



HESIO

Hesio 500 mg, 30 plėvele dengtų tablečių
Hesio 500 mg, 60 plėvele dengtų tablečių
Hesio 500 mg, 120 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Kiekvienoje tabletėje yra 500 mg mikronizuotų flavonoidų (atitinka 450 mg diosminio ir 50 mg kitų flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną). **Terapinės indikacijos:** Hesio skirtas suaugusiems: lėtinio kojų venų nepakankamumo simptomams (kojų sunkumui, kojų patinimui, skausmui, naktiniam kojų mėšlungiui) lengvinti; paūmėjusio hemoroidų simptomams (skausmui, kraujavimui ir patinimui išsąngę srityje) lengvinti. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** Lėtinis venų nepakankamumas. Rekomenduojama dozė suaugusiems yra dvi tabletės per 2 mėnesius: viena tabletė vidurdienį ir viena tabletė vakare, valgio metu. Jei simptomai išlieka, gydymas gali būti tęsiamas dar 2 mėnesius. Jeigu po 6 savaites Hesio vartojimo lėtinio venų nepakankamumo gydymui simptomai nepalengvėja arba pasunkėja, pasitarkite su gydytoju. Hemoroidų paūmėjimas. Pirmas 4 gydymo dienas rekomenduojama dozė suaugusiems yra 3 tabletės du kartus per parą (6 tablečių per parą). Kitas 3 dienas – 2 tabletės du kartus per parą (4 tablečių). Tabletes vartokite valgant, jeigu vartojate Hesio paūmėjusio hemoroidų gydymui ir po 7 dienų simptomai nepalengvėja arba pasunkėja, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. **Kontraindikacijos:** Hesio vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Vaikams ir paaugliams Hesio vartoti nerekomenduojama. Reklamos teksto parengimo data: 2021 m. rugsėjo mėn. ID 15119

AKIŲ LAŠAI SU HIALURONU IR ALAVIJŲ BE KONSERVANTŲ PARADUSIOMS IR IŠSAUSYJUSIOMS AKIMS, PO AKIŲ CHIRURGINIŲ OPERACIJŲ

BE KONSERVANTŲ



OCUTEARS® ALO+ 10 ml

MEDICINOS PREKĖ

OCUTEARS® ALO+ sudėtyje esantis hialuronas (klampumas, molekulinė masė, pasiskirstymas akies paviršiuje) veikia taip pat kaip ir natūralūs ašaros – regeneruoja, drėkina, sutepti ir saugo nuo išsausėjimo akies paviršių. Alavijas, kuris yra „Ocutears ALO+“ sudėtyje pasižymi priešūdegiminiu, antiseptiniu, žaizdų gijimą skatinančiu poveikiu – ypač tinka paraudusioms ir išsausėjusioms akims, po kataraktos, regėjimo korekcijos lazeriu ir kitų akių chirurginių operacijų, kai diagnozuojama ragenoje žaizdelės ir kiti ragenos pažeidimai.

OCUTEARS® ALO+ tinka naudoti asmenims, nešiojantiems visų rūšių kontaktinius lęšius. Atidarius OCUTEARS® ALO+ buteliuką galima vartoti 3 mėnesius.

RAUMENIMS IR SĄNARIAMS



ir nvaistine.lt

-30%

AXANOVA

Priemonių „Axanova“ pagrindas – eteriniai aliejai, kurie veikia raminamai, gali padėti mažinti maudimą ar skausmą. Atsivėliojant į priemonės sudėtį, turi šildomąjį arba šaldomąjį poveikį, gali būti naudojami esant sumušimams, patempimams, maudžiant sąnarius ar raumenis. Priemonių „Axanova“ veiksmingumas įrodytas moksliniais tyrimais. Pagaminta Šveicarijoje.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms





MARSIEČIAI®

MAISTO PAPILDAI

„Marsiečiai® Guminukai su ežiuole“ – skanūs guminukai vaikams. Sudėtyje yra rausvažiedžių ežiulių ekstrakto. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Sirupo „Marsiečiai Imunoforte“ sudėtyje yra beta-glukano, vitamino C, šėvamedžių uogų ir erškėtuogių. Tinka vaikams nuo 1 metų.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

ir nvaistine.lt

-30%



ir nvaistine.lt

-30%

WALMARK LINIJOS VITAMINAI IR MINERALAI VISAI ŠEIMAI

MAISTO PAPILDAI, MEDICINOS PRIEMONĖS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

PROENZI ARTHROSTOP

MAISTO PAPILDAI IR KOSMETIKOS PRIEMONĖ

„Proenzi Arthrostop Intensive“ – maistinių medžiagų kompleksas sąnariams. Baltųjų gliuosnių (*Salix alba*) ir ciberžolės (*Curcuma longa*) ekstraktų derinys padeda palaikyti normalią sąnarių būklę ir lankstumą. Pluoštinių bosvelių (*Bosvelia serrata*) žievių ekstraktas padeda palaikyti sąnarių lankstumą ir bendrą sąnarių būklę. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų funkcijai, susidarymą.

„Proenzi Arthrostop Plus“ sudėtyje yra gliukozamino ir MSM derinys kartu su žolelių ekstraktu iš pluoštinių bosvelių ir manganu. Pluoštinių bosvelių žievių ekstraktas padeda palaikyti sąnarių lankstumą ir bendrą sąnarių funkciją.

„Proenzi Arthrostop ASU“ – avokadų ir sojų ekstrakto bei Robovit® kompleksas. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų ir kremzlės funkcijai, susidarymą.

Sąnarių mityba, jų lankstumo palaikymas ir bendras gyvybingumas. + ASU neesterifikuotas avokadų ir sojų ekstraktas.

„Proenzi Arthrostop“ – masalinis kremas, skirtas odai sąnarių srityje ir aplink sąnarius.

Prekių skaičius ribotas. LT.Proenzi.70214

PROENZI – JUDĖK LAISVAI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



ir nvaistine.lt

-30%



MEGA C 600 mg,
30 apelsinų skonio
kratomų tablečių

MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIAMS

Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

SUPER VITAMINAS C
600 mg, 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS

IMUNITETUI

Perkant pakuotę
antra tokia pati
DOVANŲ!

1+1

ŠLAPIMO TAKŲ SISTEMAI



URINAL

MAISTO PAPILDAI

„Urinal“ – šlapimo takų sistemos. Unikalus spanguolių ekstrakto, paprastųjų rškienų ir vitamino D derinys.

„Urinal Akut“ – didelės koncentracijos spanguolių ekstrakto „CystiCran“, paprastųjų rškienų ekstrakto ir vitamino D derinys.

„Urinal sirupas“ – tinka vaikams nuo 1 metų.

Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. LT.Uri.70703

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

Perkant pakuotę
antra tokia pati
DOVANŲ!

1+1



MAGNETRANS

MAGNETRANS DRINK, granulės gėrimui ruošti, 20 paketėlių
MAGNETRANS DIRECT, burnoje tirpstančios granulės, 20 paketėlių

MAISTO PAPILDAI

1 paketėlyje yra 375 mg magnio. Tik 1 paketėlis per dieną. Magnis naudingas daugeliui procesų mūsų organizme: padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą, raumenų ir psichologinę funkciją, normalią kaulų ir dantų būklę. Dalies žmonių magnio poreikis yra didesnis, pavyzdžiui, žmonių, dirbančių sunkų protinį ir fizinį darbą, sportininkų, paauglių, nėščių moterų, vyresnio amžiaus žmonių. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

„MAGNETRANS“ – JUDĖK LAISVAI!

-20% **8²³**
10²⁹

IMUNITETUI, KAULAMS IR DANTIMS



MEGA VITAMIN D

MEGA VITAMIN D 2000 IU, 60 kapsulių **11⁹⁹ 7¹⁹ €**

MEGA VITAMIN D 2000 IU SPRAY, purškalkas, 8 ml **15⁹⁹ 9³⁵ €**

MAISTO PAPILDAI

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei normalią kaulų ir dantų būklę.

-40%

KAULAMS IR GROŽIUI



KALCIS, MAGNIS, CINKAS FORTE SU VITAMINU D

30 tablečių **7⁹⁹ 4⁷³ €**

100 tablečių **15⁹⁹ 9³⁵ €**

MAISTO PAPILDAS

Kalcis, magnis, cinkas ir vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų būklę. Kalcis, magnis ir vitaminas D padeda palaikyti normalią dantų ir raumenų būklę. Cinkas padeda palaikyti normalią plaukų, odos ir nagų būklę.

-40%

GERAI SAVIJAUTAI

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis.



IMUNITETUI IR GERAI SAVIJAUTAI

multivitamin pregnant and breastfeeding woman
Subalansuotas vitaminų, mineralų ir mikroelementų kompleksas nėščiosioms ir žindančioms moterims.
Šios medžiagos yra svarbios: Imunitetui – vitaminai A, C, E, B₆, folio rūgštis, geležis, varis, cinkas ir selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Tiesiogiai apsaugo ir vitaminai B₁₂, B₉, C ir magno padeda palaikyti normalią energijos gamybą, padeda mitybai.
Medžiagos apsaugo: – kraujotaką ir cholesterolio padeda palaikyti normalią kraujotaką, mažina cholesterolio padidėjimą.
Folkepillen, magno ir seleno padeda palaikyti normalią kraujotaką, magno ir seleno padeda palaikyti normalią kraujotaką, magno ir seleno padeda palaikyti normalią kraujotaką.

multivitamin active woman
Subalansuotas vitaminų, mineralų ir mikroelementų kompleksas aktyvioms moterims.
Šios medžiagos yra svarbios: Imunitetui – vitaminai A, C, E, B₆, folio rūgštis, geležis, varis, cinkas ir selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Tiesiogiai apsaugo ir vitaminai B₁₂, B₉, C ir magno padeda palaikyti normalią energijos gamybą, padeda mitybai.
Medžiagos apsaugo: – kraujotaką ir cholesterolio padeda palaikyti normalią kraujotaką, mažina cholesterolio padidėjimą.
Folkepillen, magno ir seleno padeda palaikyti normalią kraujotaką, magno ir seleno padeda palaikyti normalią kraujotaką, magno ir seleno padeda palaikyti normalią kraujotaką.

multivitamin active woman 55+
Vitaminų, mineralų ir mikroelementų kompleksas subalansuotas moterims nuo 55 metų amžiaus.
Šios medžiagos yra svarbios: Imunitetui – vitaminai A, C, E, B₆, folio rūgštis, geležis, varis, cinkas ir selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Tiesiogiai apsaugo ir vitaminai B₁₂, B₉, C ir magno padeda palaikyti normalią energijos gamybą, padeda mitybai.
Medžiagos apsaugo: – kraujotaką ir cholesterolio padeda palaikyti normalią kraujotaką, mažina cholesterolio padidėjimą.
Folkepillen, magno ir seleno padeda palaikyti normalią kraujotaką, magno ir seleno padeda palaikyti normalią kraujotaką, magno ir seleno padeda palaikyti normalią kraujotaką.

active man
Subalansuotas vitaminų, mineralų ir mikroelementų kompleksas aktyviems vyrams.
Šios medžiagos yra svarbios: Imunitetui – vitaminai A, C, E, B₆, folio rūgštis, geležis, varis, cinkas ir selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Tiesiogiai apsaugo ir vitaminai B₁₂, B₉, C ir magno padeda palaikyti normalią energijos gamybą, padeda mitybai.
Medžiagos apsaugo: – kraujotaką ir cholesterolio padeda palaikyti normalią kraujotaką, mažina cholesterolio padidėjimą.
Folkepillen, magno ir seleno padeda palaikyti normalią kraujotaką, magno ir seleno padeda palaikyti normalią kraujotaką, magno ir seleno padeda palaikyti normalią kraujotaką.

multi vegan GUMMIES
Subalansuotas vitaminų, mineralų ir mikroelementų kompleksas vegetariškiems žmonėms.
Šios medžiagos yra svarbios: Imunitetui – vitaminai A, C, E, B₆, folio rūgštis, geležis, varis, cinkas ir selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Tiesiogiai apsaugo ir vitaminai B₁₂, B₉, C ir magno padeda palaikyti normalią energijos gamybą, padeda mitybai.
Medžiagos apsaugo: – kraujotaką ir cholesterolio padeda palaikyti normalią kraujotaką, mažina cholesterolio padidėjimą.
Folkepillen, magno ir seleno padeda palaikyti normalią kraujotaką, magno ir seleno padeda palaikyti normalią kraujotaką, magno ir seleno padeda palaikyti normalią kraujotaką.

Folkepillen
Imunitetui, energingumui, išsivermei, protinei veiklai.
Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, magno padeda palaikyti normalią energijos gamybą, magno padeda palaikyti normalią energijos gamybą, magno padeda palaikyti normalią energijos gamybą.

MINERAL KULAMS
Kalcis, magnis ir selenas.
Kalcis, magnis ir selenas padeda palaikyti normalią kraujotaką, magno padeda palaikyti normalią kraujotaką, magno padeda palaikyti normalią kraujotaką.

ir nvaistine.lt

-25%



LIUBERIN

LIUBERIN + LUTEIN 35mg, 30 kapsulių **12⁹⁹ 8³⁸ €**
LIUBERIN SUPERIOR, 30 kapsulių **15⁹⁹ 10¹³ €**

MAISTO PAPILDAI

Linija „Liuberin“ skirta padėti išsaugoti normalią regėjimą bei palaikyti akies kraujotaką. „Liuberin superior“ net 18 aktyviųjų medžiagų kompleksas sausosios, pavargusių, daug į skaitmeninių įrenginių ekranus žiūrinčių akims. Sudėtis praturtinta ginkmedžiu, kuris padeda palaikyti akies kraujotaką. O „Liuberin + LUTEIN 35 mg“ – naujausia formulė akims! Šio preparato sudėtis praturtinta karotenoidais: net 35 mg luteino ir 3 mg zeaksantino, kurių su amžiumi koncentracija akyse mažėja. Gausi sudėtis išsiskiria ir melynų uogų ekstraktu, kuris padeda palaikyti normalią akių funkciją, vaizdo aiškumą ir kraujotaką. Normalų regėjimą padeda išsaugoti vitaminas A ir cinkas. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

RYŠKIOMS GYVENIMO SPALVOMS!

-35%



VITIRON™

VITIRON™ ACTIVE SUSCAPS, 30 kapsulių
VITIRON™ MAN MULTILONG, 30 kapsulių
VITIRON™ KIDS TOYS, 50 kramtomųjų guminukų
VITIRON™ KIDS FRUITS, 50 kramtomųjų guminukų
VITIRON™ KIDS IMMUNITY, 50 kramtomųjų guminukų
VITIRON™ IMMUNITY STRONG, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAI

„Vitiron™ Active Suscaps“ vitaminų ir mineralinių medžiagų komplekse esantys B grupės vitaminai, folio rūgštis, geležis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vitaminai D3, A, C, cinkas bei selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. „Vitiron™ Man MultiLong“ – 13 vitaminų ir 13 mineralinių medžiagų bei mikroelementų kompleksas ilgalaikiai vyro energijai palaikyti. Dėl specialios matricos vitaminai lėtai išsiskiria iš kapsulės, išleka organizmą net 5 val. Apūpinama medžiagomis, kurios yra būtinos vyrų sveikatai palaikyti. Vitaminas D padeda palaikyti normalią raumenų funkciją. Cinkas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją, taip pat normalią vaisingumą, reprodukciją bei normalią testosterono koncentraciją kraujyje. Selenas padeda palaikyti normalią spermatogenezę. „Vitiron™ Kids“ – tai vaisių ir uogų skonio, įvairių formų kramtomieji guminukai su vitaminais ir mineraliniais medžiagomis. Sudėtyje esantys vitaminai C, A, B12, folio rūgštis, selenas ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų būklę.

VITAMINŲ GALIA VISAI ŠEIMAI.

Perkant pakuotę – antra tokia pati DOVANŲ!

1+1

ENERGIJAI IR IMUNITETUI



VITAMINAS A (ABC VIT)

60 kapsulių **6⁹⁹ 4⁶¹ €**

VITAMINAS E (ABC VIT)

60 kapsulių **9⁹⁹ 6³⁶ €**

VITAMINAS A IR E (ABC VIT)

60 kapsulių **9⁹⁹ 6³⁶ €**

MAISTO PAPILDAI

Vitaminas A padeda palaikyti normalią odos būklę, išsaugoti normalų regėjimą, palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

ABC VIT VITAMINAS D

100 µg, 60 kapsulių **8⁹⁹ 5⁶⁶ €**

ABC VIT VITAMINAS D

50 µg, 60 kapsulių **8⁹⁹ 6³⁶ €**

MAISTO PAPILDAI

Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų, dantų ir raumenų būklę, kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) išsivimą, normalią imuninės sistemos veiklą.

-30%

Perkant pakuotę – antra tokia pati DOVANŲ!

1+1

ŠIRDŽIAI



VALIDOL SU GLIUKOZE

10 tablečių

MAISTO PAPILDAI

Su cukraus.
6-iose tabletėse yra: 0,36 g mentilvalerato (Methyl Valerate 24–30,5 % tirpalas, levomentolio tirpalas: levomentolio rūgšties mentilo esteris) (RMV (referencinė maistinė vertė) neužrašyta); 0,38 g gliukozės.

PIGU 0⁶⁵



ZIPPY® VITAMINAI PAAUGLIAMS IR PANELĖMS

30 kapsulių

MAISTO PAPILDAI

100% subalansuota vitaminų ir mikroelementų vertė per parą.

Vienoje kapsulėje esantys:

Geležis padeda palaikyti normalų hemoglobino susidarymą.

Vitaminai B₁ ir B₆ padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.

Vitaminas B₁₂ padeda išsaugoti normalų regėjimą.

Vitaminas B₉ padeda palaikyti normalią protinę veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

Vitaminas B₁₂ padeda palaikyti normalią raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą.

Folio rūgštis padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir imuninės sistemos veiklą.

Cinkas padeda palaikyti normalią kaulų, plaukų, nagų ir odos būklę, išsaugoti normalų regėjimą.

100% SUBALANSUOTA PAAUGLIAMS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

-40% **6⁴¹ 10⁶⁹**

MINERALŲ KOMPLEKSAS



bioCA + K + Mg + Zn su VITAMINU D₃ 28 paketėliai

MAISTO PAPILDAS

Unikalus maisto papildas milteliais geriamajam tirpalui ruošti. Sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos! Net 4 mineralų kompleksas: kalcis, kalis, magnis ir cinkas su vitaminu D₃. Kalcis ir magnis padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę, raumenų veiklą. Magnis mažina pavargimo jausmą, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. Cinkas padeda palaikyti normalią odos, plaukų ir nagų būklę, imuninės sistemos veiklą. Magnis išgaunamas iš Nėgyvosios jūros. Tinka veganams, nėščiosioms ir maitinančiosioms. Pagaminta Izraelyje.

NEPRARASK MINERALŲ – NEPRARASK ENERGIJOS!

-30% 8⁶⁷
12⁹⁹

ENERGIJAI



GERIMAX

MAISTO PAPILDAS

Nuolat jaučiatės pavargę ir trūksta energijos? Gausios sudėties „Gerimax“ vitaminai – gyvenimo kokybę gerinanti priemonė iš gamtos! Šią unikalią kompoziciją sukūrė Skandinavijos ekspertai. Ženšeniai padeda palaikyti protinę ir fizinę aktyvumą, atmintį, mažinti nuovargį, suteikia energijos kūniui ir protui. Vitaminai C, D ir geležis padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Pantoteno rūgštis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, padeda palaikyti normalią protinę veiklą.

„GERIMAX“ – ENERGIJĄ KIEKVIENAI DIENAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

ir nvaistine.lt
-40%



GINTARO RŪGŠTIS 10 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Vartojimas: suaugusiems gerti po 1 tabletę 2 kartus per dieną valgiui.
Gamintojas – Marbiofarm, Rusija.

PIGU 0⁵⁵



KVAPNIO EMILI ŽOLELIŲ ARBATOS

Šaltiems vakarams, darbingoms dienoms
Vaikams ir suaugusiems

Perkant pakuoje – antra tokia pati DOVANŲ!
1+1

Jamieson WILD SALMON žuvų taukai, 1000 mg, 90 kapsulių

Maisto papildas

- JAMIESON žuvų taukai išgauti iš laukinių Aljaskos lašišų, sardinių, ančiurių ir (arba) skumbrių.
- Iš lašišų, sardinių ir ančiurių išgautos EPR ir DHR grynosios naudojant švelnią molekulinę distiliacijos procesą, kurio metu pašalinami visi gyvsidabrio ir kitų mikroteršalų likučiai.



-40% 10⁷⁹
17⁹⁹

Jamieson Multi Complete moterims, 90 kapsulių

Maisto papildas

- Sukurtas moterims nuo 50 metų
- Krupopščiai parinktas derinys iš 27 svarbių komponentų – vitaminų, mineralų ir kitų veikliųjų medžiagų.



-40% 11⁶⁹
19⁹⁹

JAMIESON COLLAGEN 60 tablečių

Maisto papildas

- Per 28 dienas sumažėja raukšlų ir smulkių raukšlelių.
- Kovoja su senėjimo požymiais, gerina odos išvaizdą ir elastingumą.



-40% 11³⁹
18⁹⁹

JAMIESON BIOTIN 5000 µg, 60 tablečių

Maisto papildas

- Biotinas padeda palaikyti normalią plaukų ir odos būklę.
- Biotinas padeda palaikyti normalią maistinių makromolekulių apykaitą.



-40% 11³⁹
18⁹⁹



Pagaminta klevų šalyje



AMBIO OMEGA-3 ŠANARIAMS, 60 kapsulių 12⁹⁹ 7⁷⁹ €

MAISTO PAPILDAS

- Omega-3, imbierai, vitaminai E, C, D, varis ir manganas.
- Vitaminas C padeda palaikyti normalią kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių, kaulų, kremzlų, dantenų ir odos funkcijai, susidarymą.
- Vitaminas D padeda palaikyti normalią raumėnų funkciją, kaulų būklę, kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą.
- Manganas padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalią jungiamojo audinio formavimąsi.
- Varis padeda palaikyti normalią jungiamojo audinio būklę.
- Vitaminai D, C ir varis padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
- Vitaminas C, manganas ir varis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.
- Vitaminai E ir C, varis bei manganas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

AMBIO RYKLIO KREMZLĖS, 60 kapsulių 12⁹⁹ 7⁷⁹ €

MAISTO PAPILDAS

- Maisto papildas pagamintas iš džiovintų j miltelių susmulkintų ryklių kremzlių.

-40%



AMBIO LAXATIVE COMPLEX, 10 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

- Trūkštelės padeda palaikyti normalią kepenų ir žarnyno veiklą.
- Tikrieji margainiai padeda palaikyti normalią kepenų funkciją ir normalią kepenų ląstelių būklę.
- Imbierai padeda palaikyti normalią virškinimo trakto funkciją.

-35% 1⁹⁴ 2⁹⁹

AMBIO NAKVIŠŲ IR AGURKLIŲ ALIEJUS, 60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

- Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.
- Tik 1 kapsulė per dieną.

-35% 9⁷⁴ 14⁹⁸

AMBIO OMEGA-3 ŠIRDŽIAI, 60 kapsulių 12⁹⁹ 8⁴⁴ € -35 %

MAISTO PAPILDAS

- Omega-3, vitaminai E, B6, B12 ir folio rūgštis.
- Eikozapentaeno rūgštis (EPR) ir dokozahexaeno rūgštis (DHR) padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.
- Vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalią raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, normalią homosteino apykaitą, nervų sistemos veiklą, energijos apykaitą bei padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
- Foliatas padeda palaikyti normalią kraujodarą bei psichologinę funkciją.
- Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

AMBIO OMEGA-3 FORTE, 60 kapsulių 11⁹⁹ 8¹⁸ € -30 %

MAISTO PAPILDAS

- Dokozahexaeno rūgštis (DHR) padeda palaikyti normalią smegenų funkciją ir išsaugoti normalų regėjimą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg DHR.
- Eikozapentaeno rūgštis (EPR) ir DHR padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.
- Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

iki -35%



AMBIO EŽIUOLĖ, 100 tablečių 7⁹⁹ 4⁷⁹ €

MAISTO PAPILDAS

- Rausvažiedės ežiuiolės padeda palaikyti natūralią organizmo apsaugos funkciją.

AMBIO REISHI, 90 kapsulių 18⁹⁸ 11³⁹ €

MAISTO PAPILDAS

- Vitaminas C ir tikrinių blizgučių (Reishi grybų) ekstraktas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

AMBIO UNA DE GATO (gauruotoji unkarija), 45 tabletes 7⁹⁹ 4⁷⁹ €

MAISTO PAPILDAS

- Gauruotosios unkarijos padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

-40%



AMBIO GARCINIJA, 45 kapsulės 12⁹⁸ 7¹⁹ €

AMBIO SPIRULINA, 100 tablečių 7⁹⁹ 4⁷⁹ €

AMBIO SUPER GUARANA, 120 tablečių 9⁹⁹ 5⁹⁹ €

AMBIO ŽALIOJI ARBATA, 100 tablečių 8⁹⁹ 5⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAS

-40%



AMBIO AUGALINIAI POLIFENOLIAI, 60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

- Sudėtyje yra brokolių, žaliosios arbatos, granatų ir ciberžolių ekstraktų.
- Tik 1 tabletė per dieną.

-40% 13⁴⁹ 22⁴⁸

AMBIO GROŽIUI, 60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

- Vitaminų ir mineralų kompleksas, skirtas normaliai odos, plaukų ir nagų būklei palaikyti.
- Riboflavinai (vitaminas B2), niacinai, jodas ir vitaminas A padeda palaikyti normalią odos būklę.
- Selenas padeda palaikyti normalią plaukų ir nagų būklę.
- Varis padeda palaikyti normalią plaukų ir odos pigmentaciją.
- Biotinas padeda palaikyti normalią plaukų ir odos būklę.
- Cinkas padeda palaikyti normalią plaukų, nagų ir odos būklę.
- Cinkas, selenas, varis ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.
- Vitaminas C padeda palaikyti normalią kolageno, kuris reikalingas normaliai odos, kraujagyslių, kaulų, kremzlų, dantų ir dantenų funkcijai, susidarymą.

-30% 9⁷⁹ 13⁹⁸

KVĖPAVIMO IR IMUNINEI SISTEMAI



VOCAL

VOCAL, juodųjų serbentų skonio, 24 pastilės **5⁹⁹ 3⁸⁹ €**

VOCAL, neutralaus skonio, 24 pastilės **5⁹⁹ 3⁸⁹ €**

VOCAL, su hialurono rūgštimi, pipirmėčių skonio, 24 pastilės **6⁴⁹ 4⁸⁷ €**

VOCAL KIDS, braškių skonio, 24 pastilės **5⁹⁹ 3⁸⁹ €**

MAISTO PAPILDAI SU SALDIKLI AIS

Pastilių „Vocal“ sudėtyje yra islandinių kerpėnų, vitamino C ir cinko. Islandinės kerpės padeda palaikyti kvėpavimo takų – gerklės, ryklės gleivinės bei balso stygų – funkcijas. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Cinkas atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese. Rekomenduojamas vartojimas: 1 pastilė 4 kartus per dieną. Vyresniems nei 4 m. žmonėms.

„VOCAL“ – JŪSŲ GERKLEI, BALSUI IR IMUNITETUI!

-25%

NOSIES GLEIVINĖS APSAUGAI BEI GYDYMUI



RHINITIX, nosies purškalas, 10 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Rhinitix“ yra medicinos priemonė, išskirianti tikotropinėms ypatybėmis, kurios užtikrina tolygią pasiskirstymą ir ilgalaikį nosies gleivinės kontaktą su visomis produkto sudedamosiomis medžiagomis. „Rhinitix“ yra palaikomoji ir raminoji medicinos priemonė, skirta virusinei ir bakterinei nosies gleivinės infekcijai gydyti. Del savo tikotropinių ypatybių „Rhinitix“ padengia nosies gleivinę apsaugine plovele, kuri neleidžia prikibti, įsikvėbti ir plisti bakterijoms bei virusams, t. y. rinovirusams ir koronavirusams. Taip padedama atsikurti sudirgusiai gleivinei ir sustiprinama natūrali organizmo apsauga. „Rhinitix“ nesukelia pripratimo. Del savo unikalių tikotropinių ypatybių „Rhinitix“ suformuoja apsauginę plovele ant nosies gleivinės paviršiaus. Ji apsaugo nuo bakterijų prikibimo ir rinovirusų bei koronavirusų prasiskverbimo į nosies gleivinę, kuri yra pagrindinė nosies gleivinės infekcijų priežastis, taip pat stabdo peršalimo virusų dauginimąsi ir plitimą. Tai leidžia sumažinti farmakologinio gydymo poreikį sergant virusine nosies gleivinės infekcija ir sumažina antrosios bakterinės infekcijos riziką. „Rhinitix“ veiksmingai palaiko prienosinių sinusų gydymą.

-25% **7⁷⁹** **10⁷⁹**

ŽARNYNO MIKROFLORA



COMPLIFLORA

COMPLIFLORA FAMILY, 10 kapsulių **8⁹⁹ 6⁶³ €**

COMPLIFLORA FAMILY+, 10 paketėlių **8⁴⁹ 6⁷⁹ €**

COMPLIFLORA BABY DROPS, 5 ml **12⁸⁹ 10³¹ €**

COMPLIFLORA FEMINA, 10 kapsulių **9⁹⁹ 7⁵¹ €**

COMPLIFLORA IMMUNO, 30 kapsulių **12⁷⁹ 10²³ €**

MAISTO PAPILDAI

„Compliflora Family“ ir „Compliflora Family+“ – formulė „keturi viename“. Bakterijos, kolonizuojančios ir plonąjį, ir storąjį žarnyną. Didelė KSV (kolonijas sudaranti vienetų) dozė. Ypatingas gamybos metodas: bakterijos atsparios skrandžio rūgštim, todėl gali saugiai pasiekti žarnyną ir ten kolonizuotis. Vartojimas: 1 kapsulė arba 1 paketėlis per dieną. „Compliflora Baby Drops“ – formulė „du viename“. Bifidobacterium lactis BS01 ir Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 5301 kompleksas aliejinėje forma. Augalinės kilmės medžiagos suteikia malonų skonį vartojant, be to, nereikia specialų laikymo sąlygų. Vartojimas: kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – 5 lašai per dieną. „Compliflora Femina“ – formulė „keturi viename“, ją sudaro 4 specialiai atrinktos Lactobacillus genties bakterijų atmainos, būdingos natūraliai, sveikai šlapimo ir lyties organų sistemos mikroflorai. „Compliflora Immuno“ yra kompleksinis produktas, sukurtas siekiant palaikyti gerą imuninę organizmo būklę. 1 kapsulėje yra 4 mlrd. mikrokapsuluotų pieno rūgšties bakterijų, cinko bei vitamino D. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. Vartojimas: 1 kapsulė per dieną.

-20%

IMUNINEI SISTEMAI



SAMBUCUS

SAMBUCUS KIDS, sirupas, 120 ml **14²⁹ 10⁷² €**

SAMBUCUS KIDS, 60 guminukų **15²⁹ 11⁸⁴ €**

SAMBUCUS KIDS, 5 ledinukai **4⁶⁹ 3⁵² €**


SAMBUCUS ADULTS IMMUNOMIX, 60 kapsulių **9²⁹ 7³⁴ €**

MAISTO PAPILDAI, MAISTO PRODUKTAS

Juoduogiai, šėiamedžiai, čiobreliai, šalavijai padeda palaikyti kvėpavimo sistemos funkciją. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. „Sambucus Adults Immunomix“ yra produktas, vartojamas tais atvejais, kai jūsų imuninei sistemai reikia papildomos pagalbos. Jo sudėtyje esantis kompleksas „Immunomix“ – tai kruopščiai atrinktas 6 maistingųjų medžiagų, gerai žinomų dėl savo savybių, derinys: juoduogiai, šėiamedžiai, vitaminas D3, vitaminas C, rutozidas, selenas ir cinkas.

-25%

NUO KOSULIO



IVEX, nuo sauso ir šlapio (produktyvaus) kosulio, 100 ml + 5 ml matavimo indelis

MEDICINOS PRIEMONĖ

Sudėtyje esantys natūralūs ekstraktai (gebenių (Hedera Helix) ekstraktas (DER 1–2:1), poliflorinis medus, vaistinių svilvorių (Althaea officinalis) ekstraktas (1 %), vaistinių čiobrelų (Thymus vulgaris) ekstraktas (0,3 %)), kurių veiksmingumas įrodytas, suformuoja prie gleivinės prilipancią plovele, kuri ramina kosulį, apsaugo nuo dirginimo bei pagerina viršutinių kvėpavimo takų funkciją. Tai ypač aktualu žiemą arba kai reikia gydyti išorinių veiksnių (šaltis, smogas, dulkių ir dūmų) sukeltą sudirginimą. Naudinga esant sausam ir šlapiam (produktyviam) kosuliui, ramina dirginimą, saugo gleivinę ir lengvina gleivių šalinimą. Tinka vaikams nuo 1 m. amžiaus.

-25% **5⁶⁹** **7⁵⁹**

GERAI SAVIJAUTAI

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis.



UROSAN 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Urosan“ – subalansuotas augalinių ekstraktų derinys šlapimo pūslės ir imuninei sistemai. Sudėtyje yra net 300 mg stambiausių spanguolių ekstrakto. Normalią šlapimo pūslės funkciją padeda palaikyti mišinių mėškauogių ekstraktas, normalią imuniteto funkciją padeda palaikyti rausvazių ekstraktas, o palaikyti organizmo apsaugą nuo išorinių dirgiklių padeda paprastųjų rykštenių ekstraktas. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 2 kartus per dieną užgeriant stikline vandens.

ŠLAPIMO TAKŲ FUNKCIJAI



BIOKALIS 400 mg, 30 paketėlių 6⁹⁹ 4⁷⁹ €

BIOKALIS FORTE, 30 paketėlių 8⁹⁹ 6³⁷ €

MAISTO PAPILDAI

Grynas kalio citratas! Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį. Jis svarbus normaliai nervų sistemos ir raumenų veiklai palaikyti. „BioKalis 400 mg“ ir „BioKalis forte“ sudėtyje esantis kalis yra citrato formos, miltelių pavidalo. Sudėtyje – 100 % kalio citratas: be konservantų, be stabilizatorių, be kvapiųjų medžiagų ar saldiklių. Tinka veganams, nėščiosioms ir maitinančioms moterims. Pagaminta Izraelyje.

KALIO CITRATAS MILTELIAIS!

-25%

-35% 5⁹⁷ 9⁹⁹



NICORETTE

Nicorette coolmint 1 mg/išpurškime burnos gleivinės purškalas (tirpalas), 150 išpurškimų 19⁹⁹ €

Nicorette invivipatch 10 mg/16 h (15 mg/16 h; 25 mg/16 h) transderminis pleistras, 7 transderminiai pleistrai 19⁹⁹ €

Nicorette freshfruit 2 mg (4 mg) vaistinė kramtomoji guma, 30 vienetų 8⁹⁹ €

Nicorette freshmint 2 mg (4 mg) vaistinė kramtomoji guma, 30 vienetų 8⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI.

Veiklosios medžiagos, stiprumas: vienoje gumoje yra 2 mg (4 mg) nikotino (reinato pavidalu); viename pleistru yra 15,75 mg (23,62 mg; 39,37 mg) nikotino; kiekviename išpurškime (0,07 ml tirpalo) yra 1 mg nikotino. 1 ml tirpalo yra 13,6 mg nikotino. Indikacijos: vaistinė kramtomoji guma, transderminiai pleistrai: priklausomybei nuo tabako gydyti, lengvinant nutraukimo simptomus, kad būtų lengviau laikinai susilaikyti nuo rūkymo, o apsisprendus – mesti rūkyti; purškalo: priklausomybės nuo tabako gydymas, sumažinant potraukį nikotinui ir palengvinant nutraukimo simptomus, kurie atsiranda metant rūkyti staiga ar palaipsniui. Tiekias yra visam laikui nutraukti tabako vartojimą. Nicorette coolmint geriausia vartoti kartu su elgesio pakeičymo programa. Vartojimo būdas ir dozavimas: paprasta pakanka kramtyti 8–12 tam tikro stiprumo vaistinių kramtomųjų gumų per dieną. Pleistrą reikia priklijuoti ant odos ryte, o vakare į nuimti. Purškalo reikia išpurškinti 1–2 vaisto dozės tuo laiku, kai paprastai rūkoma, arba įkvėpus jaučiamas poreikis rūkyti. Galima vartoti iki 4 purškimų per valandą. Negalima puršksti daugiau kaip 2 špurškimus 15 karto, per 24 valandas neviršyti 64 purškimų (4 purškimai per valandą, 16 valandų periode). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas nikotinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Gumos negalima kramtyti vaikams iki 12 metų. Purškalo negalima vartoti jaunesniems kaip 18 m. pacientams, nerūkantiems pacientams. Specialūs įspėjimai: prieš vartodami nicorette, pasitarkite su gydytoju, jeigu turėjote širdies infarktą, insultą, sergate nestabilia arba progresuojančia krūtinės angina, sunkiomis širdies aritmijomis, yra nekontroliuojama hipertenzija. Pacientai, sergantys cukriniu diabetu, pradėję naudoti nikotino pakeičiamąją terapiją, turi atidžiau sekti savo cukraus kiekį kraujyje. Galima rūkyti ir laukiamą gydymo naudą turi būti apsaugota gydytoju, jeigu pacientai serga inkstų ir kepenų nepakankamumu, feochromocitoma ir nekontroliuojama hipertenzija, viršijimo trako ligomis. Jeigu sergate žvyneline, lėtiniu dermatitu ar dilgeline, nekiljuokite nicorette pleistro ant pažeistos odos. Norint išvengti nudegimų rizikos, pleistrą reikia nuimti prieš atliekant magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą. Kramtomoji guma gali prilipsti prie dantų protezo ir jį sugadinti. Kramtomųjų gumų ir purškalo sudėtyje yra butilhidroksitolueno, kuris gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginimą akis ir gleivines. Kramtomųjų gumų sudėtyje yra ksilitolio, kuris gali baltinti vidurius. Reklamos teksto parengimo data: 2021 04 12. LT-NI-2000003.

nuo 8⁹⁹

-40%

NORMALIAI KVĖPAVIMO TAKŲ FUNKCIJAI



ATMOSIL, 15 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

su vaistažolių ekstraktais, pterostilbeno, kvercetino, likopeno ir dumblių kvėpavimo funkcijai palaikyti. Sudėtyje esanti pluoštinė bosvelijų derva ir paprastųjų pušų žievių ekstraktas padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų funkciją. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 1 kartą per parą. Vartoti gali vaikai nuo 12 metų.

-30% 4⁶⁸ 6⁹⁹

ŠIRDŽIAI IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMAI



OMEGA-3 SUPER 1000, 30 kapsulių 9⁸⁹ 5⁹³ €

OMEGA-3 SUPER 1000, 60 kapsulių 15⁹⁹ 9¹⁷ €

ŽUVŲ TAUKAI, 50 kapsulių 8⁹⁹ 5¹⁵ €

MAISTO PAPILDAI

Omega-3 riebalų rūgšys svarbios geram širdies ir kraujagyslių sistemos darbui. Sudėtyje esančios EPR ir DHR padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR. Žuvų taukai skirti papildyti mitybą polinesočiosiomis riebalų rūgštimis. Ypač rekomenduojamas žmonėms, mažai valgantiems žuvis.

KAD ŠIRDIS NEPAIŠTŲ DIRBTI!

-40%



ir nvaistine.lt

-25%

BLEND-A-DENT KLIJAI DANTŲ PROTEZAMS

Fiksujamasis kremas pritvirtina protezus visai dienai, suteikdamas saugumo jausmą. Jis apsaugo gleivinę nuo mechaninių sužalojimų, kuriuos gali sukelti protezai, ir neleidžia maistui patekti po dantų protezus. Kasdien naudojami fiksuojamajam kremą „Blend-a-dent“, galėsite nevaržomai juoktis, kalbėti ir valgyti.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

RIBOKSIN

6buocuhmes



50 tablečių

1 tabletėje yra 200 mg inozino

PIGU 2¹⁹

RIBOKSIN 200 mg, 50 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Vartojimas: gerti po 1 tabletę 3–4 k. per dieną prieš valgį. Gamintojas – Biosintez, Rusija.

DRĖKINAMIEJI AKIŲ LAŠAI



STARAZOLIN

STARAZOLIN COMPLETE, 10ml
STARAZOLIN HYDROBALANCE, 5ml, 2vnt.

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Starazolin Complete“ yra sterilūs akių lašai, kurių sudėtyje yra natrio hialuronato ir dekspantenolio. Dekspantenolis žymiai sustiprina natrio hialuronato savybę išsaugoti drėgmę. Šių medžiagų derinys drėkina, atgaivina, palaiko regeneraciją, apsaugo ir maitina akies paviršių, esant: mechaniniam akies dirginimui, pvz., oftalmologinės apžiūros metu ir naudojant kontaktinius lęšius; žalingiems aplinkos veiksniams – oro kondicionieriui, šaltam, karštam, sausam orui; oro užterštumui tabako dūmais, taip pat būnant dulketose ar saulėtose vietose; stipriam nuovargiui, pvz., atsiradusiam dėl darbo su kompiuteriu, mikroskopu, ilgo vairavimo. „Starazolin Complete“ yra be konservantų, o buteliuke yra speciali vožtuvų sistema ir filtras, apsaugantis preparatą nuo mikroorganizmų taršos, todėl po pirmojo atidarymo medicinos priemonė galima naudoti 90 parų. „Starazolin HydroBalance PPH“ suteikia veiksmingą ir ilgalaikį akių drėkinimą. Rekomenduojamas esant akių aplinkos dirgikliams; sumažėjus mirksėjimo dažniui; kai yra nepakankama ašarų gamyba arba jų sudėties pokyčiai. „Starazolin Complete“ ir „Starazolin HydroBalance PPH“ gali naudoti žmonės, naudojančius visų tipų kontaktinius lęšius. Įprastinė dozė yra 1–2 lašai 3 kartus per parą į kiekvienos akies junginės maišelį.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

849

SKATINA ŽAIZDŲ GIJIMĄ



HELP4SKIN

HELP4SKIN WOUND HEALING
gelis tūbelėje, 20g 5⁹⁹ €
HELP4SKIN WOUND HEALING
aerolinis purškiklis, 75g 8⁹⁹ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Help4skin Wound Healing“ yra hidrokoloidinis gelis be parabenų, skirtas lokaliai sausi ir šlapių žaizdų priežiūrai. „Help4skin Wound healing“ – medicinos priemonė, kuri netiesiogiai skatina žaizdų gijimą, kontroliuojama žaizdos mikroaplinką. Skirtas gydyti ūminėms ar lėtinėms žaizdoms, tokioms kaip:

- žaizdos (skaitant chirurgines);
- įgyjimai, įbrėžimai;
- odos nubrozdinimai ir įtrūkimai;
- aviros kelių opos;
- paviršiniai nudegimai (I ir IIa laipsnio);
- pragulos.

Gali būti naudojamas vyresniems nei 2 metų amžiaus vaikams.

nuo 5⁹⁹



MONAFIT, 60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Augaliniai steroliai ir Monakolinas K iš raudonosios mielės fermentuotų ryžių padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje.

-30% 888 12⁶⁹



VITADAY MULTIVITAMINŲ KOMPLEKSAS, 60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

-30% 454 6⁴⁹

AKIMS



FORTE MĖLYNIŲ TABLETĖS SU CINKU

80 tablečių

MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIU

Rekomenduojama vartoti, kai akys pavargsta dirbant kompiuteriu, vairuojant, daug skaitant, nešiojant kontaktinius lęšius.

-30% 496 7⁶⁹



OBUOLIŲ SIDRAS su IMBIERU

60 kapsulių 11⁶⁹ 7⁰¹ €

MAISTO PAPILDAS

Obuolių sidras su imbieru – papildoma organizmą augalinių kilmės medžiagomis

NAKVIŠŲ ALIEJUS

100 kapsulių 21⁶⁹ 13⁰¹ €

MAISTO PAPILDAS

Vienoje kapsulėje yra net 1 000 mg nakvišų aliejaus, kuris gaminamas šaltai spaudžiant, todėl jame išlieka daugiau naudingųjų medžiagų. Nakvišų aliejus – polinesočiųjų riebiųjų rūgščių šaltinis. Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

MOTERS ŽAVESIO PASLAPTIS IŠ GAMTOS!

-40%




VALERIJONŲ EKSTRAKTAS 20 MG

50 tablečių

MAISTO PAPILDAS SU CUKRUMI

Vaistiniai valerijonai padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą bei normalią užmigimo funkciją.

PIGU 0⁸⁰



UNDEVIT 50 dražečių

MAISTO PAPILDAS

Tai A, C, E ir B grupės (B₁, B₂, B₆, B₁₂) vitaminų bei niacino, rutino, pantoteno rūgšties, folio rūgšties preparatas. Vitaminai C ir A padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo, vitaminas B₁ (tiaminas) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, vitaminas B₂ (riboflavinas) padeda išsaugoti normalią regėjimą, vitaminas B₆ (piridoksinas) padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, vitaminas B₁₂ (cianokobalaminas) padeda palaikyti normalią raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją, pantoteno rūgštis padeda palaikyti normalią proteinę veiklą. Vartojimas: gerti po 1 dražetę per dieną. Gamintojas: „Marbiofarm“, Rusija.

PIGU 1⁹⁹



BURNOS HIGIENAI



SUNSTAR GUM

Jau daugiau kaip 80 metų „Sunstar“ yra burnos ertmės higienos produktų gamybos lyderė. „Sunstar GUM“ misija – užtikrinti savo klientams sveikus dantis bei danteną, naudojant produktus, sukurtus remiantis naujausiais išradimais ir klinikiniais tyrimų rezultatais. „Sunstar GUM“ burnos higienos produktai sukurti, siekiant užkirsti kelią ne tik ligų simptomams, bet ir jų priežastims!

SVEIKOS DANTENOS, SVEIKESNIS GYVENIMAS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

ir nvaistine.lt

-20%

ir nvaistine.lt

-40%



VELYM

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

VELYM dantų kremas kasdienė dantų priežiūra ir natūraliam dantų balinimui/Veiklioji/ balinamoji medžiaga BILKYCON pagaminta 100% iš natūralios kilmės medžiagų. VELYM WHITENING dantų šepetėlis dviejų ilgų šerėlių su aktyviuota bambuko anglimi dantų ir tarpdančių valymui.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



ELGYDIUM

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

ir nvaistine.lt

-25%

PROTEZŲ PRIEŽIŪRAI



COREGA

Reguliariai naudojant valomąsias tabletes „Corega“, dantų protezai visada bus švarūs. Tinka pilniems ir daliniams dantų protezams.

- Sunaikina 99,9 % blogą kvapą sukeliančių bakterijų.
- Padeda pašalinti apnašas ir giliai įsigėrusias dėmes.
- Suteikia dantų protezams gaivų mėty kvapą.
- Veikia per 3 minutes.

Fiksujamieji kremai „Corega“ patikimai veikia iki 12 valandų ir neleidžia maisto likučiųms įstrigti po protezais. CHLT/CHPLD/0009/16; 2018/10

VALGYK, JUOKIS IR GYVENK!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

ir nvaistine.lt

iki -30%



FITTYDENT

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Fittydent“ – stiprus, ilgai laikantis fiksuojamas kremas, neleidžiantis protezams slysti ir slankioti. Neturp vandenį ir atsparus rūgščių, todėl nenuplaukiamas skysčių ar selių. „Fittydent“ dantų protezų fiksuojamas kremas garantuoja stiprų dantų protezų ir dantenų sukibimą.

NAUJAS PAKUOTĖS DIZAINAS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

ir nvaistine.lt

-20%

TOBULAI BURNOS HIGIENAI



CURAPROX

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Curaprox“ – šveicarškos burnos higienos priemonės tobulai burnos higienai: įvairių tipų ir švelnumo dantų šepetėliai, tarpdančių šepetėliai, dantų pastos, dantų siūlai. Taip pat specialiai vaikams, kūdikiams, protezų priežiūrai skirtos prekės. „Curaprox“ dantų šepetėlių šerėliai gaminami ne iš nailono, o iš „Curen“ patentuotos medžiagos, todėl šie šepetėliai itin efektyviai pašalina susikaupusias apnašas, netraumuodami aplink esančių audinių. Tarpdančių šepetėliai gaminami iš labai plonos, tačiau labai tvirtos „Cura“ patentuotos medicininės vielutės, todėl tarpdančių išvalysite kruopščiai ir be skausmo. Dantų pastų sudėtyje nėra kenksmingų putojimo agentų, jas galima rinktis pagal skirtingus natūrio fluorido kiekius ir skonį. Visa „Curaprox“ produkcija gaminama siekiant aukščiausios kokybės tobulai burnos higienai.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

ir nvaistine.lt

iki -25%

Pasiūlymai galioja 2021 10 01 – 2021 10 31.

Leidinyje nurodytos maisto papildų, medicininės paskirties prekių ir medicinos prietaisų kainos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis, o vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms.

Akcijs dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Daugiau informacijos Norfos vaistinėje, tel. 8 800 10008, MAŽYLIUI IR MAMAI

skirtas prekes ypatingomis kainomis greičiau ir patogiau užsisakykite internetinėje vaistinėje www.vaistine.lt. Užsisakius prekių (išskyrus vaistinius preparatus) už 28,96 € ir daugiau – pristatymas NEMOKAMAS! Reklaminių tekstų parengimo data – 2021 08 19.



ODOS IR LŪPŲ PŪSLELINEI GYDYTI



ACIC 200 MG, 25 tabletės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 200 mg acikloviro. **Indikacijos:** vaistas skirtas anksčiau gydytojo diagnozuotos pasikartojančios lūpų pūslelinės gydymui suaugusiems žmonėms. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** gerti po 1 tabletę 5 kartus per parą kas 4 valandas. Gydymo trukmė – 5 paros. **Kontraindikacijos:** „Acic“ naudoti negalima esant padidėjusiam jautrumui acikloviro, valacikloviro arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** po viruso pažeistos vietos palietimo reikia tuoj pat nusiplauti rankas. Iki tol reikia stengtis neliesiti kitų kūno vietų, ypač akių. „Sandoz Pharmaceuticals d. d.“ filialas, Seimynių g. 3A, LT-09312 Vilnius, Lietuva. B52109106339. Reklamos teksto patvirtinimo data: 2021 09 10.

UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSLELINĘ SU „ACIC“!

PAVIRŠINIŲ ODOS ŽAIZDŲ GIJIMO GERINIMUI



nuo

4⁹⁹

BEPANTHEN 50 mg/g kremas, 30 g 4⁹⁹ €
BEPANTHEN 50 mg/g tepalas, 30 g 4⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 g kremo arba tepalo yra 50 mg dekspantenolio. **Indikacijos:** paviršinių odos žaizdų (nedidelių nudegimų, nubrozdinimų) gijimo gerinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** nuvalyti žaizdą ar pažeistą odą tepalu kremu arba tepalu viena ar daugiau kartų per dieną, reikiamai esant. Gydymo trukmė priklauso nuo susirgimo pobūdžio ir eigos. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jei sergate kita liga, esate alergiškas arba vartojate kitus vaistus, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Naudojant Bepanthen tepalą reikia vengti kontakto su akimis. Reklamos teksto parengimo data: 2020-07. L.LT.MKT.07.2020.1756

BEPANTHEN PLUS 50 mg/5 mg/g kremas, 30 g 5⁴⁹ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 g kremo yra 50 mg dekspantenolio ir 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido. **Indikacijos:** vietinis įvairių paviršinių žaizdų (nubrozdinimų, įpjūimų, įbrėžimų, odos įtrūkių ir nedidelių nudegimų) gydymas, kai yra infekcijos pavojus. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** kildikams nuo 1 mėn., vaikams, paaugliams ir suaugusiems išvalyti žaizdą arba pažeistą odą vieta reikiama tepu plonu kremu sluoksniu viena arba kelis kartus per dieną, kol žaizda užgis. Venkite tepti didelius odos plotus. **Kontraindikacijos:** alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; gilių ar stipriai užkreštų žaizdų, jei trūkės ausies būgnelis, negalima tepti ausies srityje. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** saugokitės, kad kremas nepatektų į akis, ausis ir ant gleivinių. Negalima tepti ant sudirgintos, bet neriekuotos odos. Negalima vartoti kartu su kitomis antiseptinėmis medžiagomis, muilu, jei pasireiškia sunkios alerginės reakcijos simptomai, vartojimą nedelsiant nutraukite ir pasitarkite su gydytoju. Reklamos teksto parengimo data: 2020-07. L.LT.MKT.07.2020.1756

BEPANTHEN® – KIEKVIENŲ NAMŲ VAISTINĖLE!



-25% 1⁴⁹

AMEDIPLUS AROMATINIS PLEISTRAS, 5 vienetai
MEDICINOS PREKĖ

-30% 3⁸⁴

AMEDIPLUS

Šildantis arklų balzamas, 250ml
Šaldantis arklų balzamas, 250ml
KOSMETIKA



ir nvaistine.lt

-25%

911

„911“ produktų sudėtyje yra daugiau nei 40 % eterinių aliejų, įvairių žolelių ekstraktų, vitaminų, mikroelementų. Būtent todėl „911“ produkcija vertina daugybę vartotojų.

„911“ produkcijos asortimente rasite priemonių, skirtų kūniui, veidui, galvos odai. Priemonės lengvai ir greitai įsigeria į odą, nepaliekia nemalonaus pojūčio. Be to, jos itin ekonomiškos, jų užtenka ilgam laikui.

„911“ – Jūsų gelbėjimo tarnyba – tai ne iš piršto laužtas šūkis, tai tikras pagalbininkas, kuris visada gali būti šalia, kai jums reikia skubios pagalbos.

„911“ – JŪSŲ GELBĖJIMO TARNYBA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



ir nvaistine.lt

-25%

MYCOSAN

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Mycosan“ skirtas nagų ir pėdų grybelinėms infekcijoms gydyti ir apsaugoti nuo jų.

„Mycosan Fungal Nail“ – tai gydymui priemonių rinkinys, kurį sudaro vartotojui patogios tubelės esantys unikalios sudėties serumas, šepetelis, 10 vienkartinų nagų dildžių ir gydymo planas. Įrodyta, kad „Mycosan Fungal Nail“ veiksmingai padeda atsikratyti grybelio, kuris sukelia grybelinę nagų infekciją. Tai paprastas ir greitas sprendimas. 4 savaites iš eilės naudokite „Mycosan Fungal Nail“ 2 kartus per dieną, paskui – 1 kartą per dieną, kol pažeista nago dalis nuauš. Paaugusių nagų pradėkite dildyti po 2 savaitžių.

Pėdų gelis nuo grybelio „Mycosan“ sumažina odos pH. Sukuriamas nepalanki aplinka grybeliui maitintis keratinu, todėl grybelis žūsta. Sukaikina 99,9 % grybelių, sukeliančių „atleto pėdą“.

Gaivinamasis ir vandeniu nelaidus pėdų purškiklis „Mycosan Protect“ 12 valandų apgaubia pėdą apsaugine plovele, kuri saugo pėdas nuo grėsmės susirgti grybeline pėdų odos infekcija. Pūrkiamoji priemonė greitai įsigeria į pėdų odą, tuojau pat pašalina niežėjimą ir deginimo pojūtį, atsirandančius dėl drėgmės, įtampas ar per ankštų batų. „Mycosan Protect“ sumažina atsinajinančių infekcijų pavojų.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



Pirkdami **GINTARINĖJE** vaistinėje Jūs gausite čekį, kuriuo galėsite apmokėti net **iki 50 %** sumos už šį produktą:



TEPE SUPREME DANTŲ ŠEPETĖLIS

Unikalūs dantų šepetėlis su dviejų dydžių šereliais. Ilgesni šereliai geriau pasiekia tarp dantų esančius nesvarumus, o trumpesni efektyviai bei švelniai nuvalo likusį danties plotą. Tinka broketų priežiūrai.

-50% 2¹⁰

ŠIRDŽIAI IR KRAUJAGYSLĖMS, MOTERIMS MENOPAUZĖS METU.

iki -20%



EVELOR® 50 mg, 90 kapsulių 28⁹⁹ 22⁸⁷ € -20 %

EVELOR® H 200 mg, 30 tablečių 28⁹⁹ 18⁸⁷ € -10 %

MAISTO PAPILDAI

Auginamieji antioksidantai, kurie priklauso polifenolių grupei, „Evelor“ ir „Evelor H“ sudėtyje yra patentuota aktyvioji resveratrolio forma – mikronizuotas transresveratrolis. Jis išgautas iš didžiausių šios medžiagos kiekį kaupiančių augalų – plačialapių rūgčių (lot. *Polygonum cuspidatum*) – šaknių.

Mikronizacijos procesas (medžiagos susmulkimas iki labai mažų dalelių) padidina transresveratrolio biologinį prieinamumą ir veiksmingumą. Transresveratrolis padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą. Dėl panašios cheminės struktūros į hormoną estradiolį jis taip pat padeda palaikyti normalią moters sąvąją menopauzės metu.

Vartojimas. Gerti po 1 kapsulę arba tabletę rytinio valgio metu, užgeriant vandeniu.



AMBIO MULTIVITAMINAI MOTERIMS PLUS

60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

- Tiaminas, niacinas, biotinas, vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją.
- Riboflavinai, niacinas, pantoteno rūgštis, vitaminai B6 ir B12, foliatai padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
- Riboflavinai, tiaminas, niacinas, biotinas, vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.
- Riboflavinai padeda palaikyti normalią geležies apykaitą ir išsaugoti normalią regėjimą.
- Geležis padeda palaikyti normalią raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą bei deguonies pernešimą organizme.
- Cinkas padeda palaikyti normalią kaulų, plaukų, nagų ir odos būklę.
- Selenas padeda palaikyti normalią plaukų būklę.
- Cinkas, selenas, vitaminai C, D, A ir B6, geležis, foliatai padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
- Vitaminas D padeda palaikyti normalią kalcio koncentraciją kraujyje, normalią kaulų, raumenų ir dantų būklę.
- Vitaminas K padeda palaikyti normalią kraujavimo krešėjimą ir normalią kaulų būklę.
- Tik 1 tabletė per dieną.

-35% **9⁷⁴**
14⁹⁹


AMBIO MULTIVITAMINAI VYRAMS PLUS

60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

- Cinkas padeda palaikyti normalią vaisingumą ir reprodukciją, o selenas – normalią spermatozoidų koncentraciją kraujyje.
- Cinkas padeda palaikyti normalią testosterono koncentraciją kraujyje.
- Cinkas ir selenas padeda palaikyti normalią plaukų būklę.
- Selenas, cinkas, vitaminai A, B6 ir C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
- Tiaminas, riboflavinai, niacinas, pantoteno rūgštis, biotinas, vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.
- Tiaminas, niacinas, biotinas, vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją.
- Riboflavinai padeda palaikyti normalią geležies apykaitą ir išsaugoti normalią regėjimą.
- Riboflavinai, tiaminas, niacinas, biotinas, vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.
- Riboflavinai, niacinas, pantoteno rūgštis, vitaminai B6 ir B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

-30% **4⁴⁷**




PROSTAMIN

30 tablečių **6³⁹ 4⁴⁷ €**

MAISTO PAPILDAS

Rekomenduojamas vyresniems nei 45 metų vyrams. „Prostamin“ sudėtyje yra moliūgų sėklų, gulsčių sėrenų vaisių, afrikinių slyv žievės ekstraktų, padedančių palaikyti normalią prostatos, šlapimo pūslės ir šlapimtakio funkciją, cinko ir vitaminų B₃ ir E. **Vartojimas:** po 2 tabletes per dieną. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.



PANER

30 tablečių **7⁹⁹ 5⁵⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

Rekomenduojamas vyrams, norintiems išlikti aktyviems ir palaikyti normalią seksualinę gyvenimą. „Paner“ sudėtyje yra L-arginino, sauso juodųjų eleuterokoky šaknų bei sausų gulsčių ragelių lapų ekstraktų, cinko bei seleno. **Vartojimas:** po 1–2 tabletes per dieną.



MENOPACE 30 tablečių **16⁹⁹ 11⁷⁵ € -30 %**
MENOPACE PLUS 56 tabletės **27⁹⁹ 22¹⁵ € -20 %**

MAISTO PAPILDAI MOTERIMS MENOPAUZĖS PERIODU

„Menopace“ – biologiška aktyvių medžiagų kompleksas su sojų izoflavonais, kurie pagal savo struktūrą ir poveikį panašūs į moters lytinį hormoną estrogeną. Menopauzės laikotarpiu subalansuotas derinys pasižymi kompleksiniu poveikiu: hormonų balansui (vitaminas B1), psichologinei būsenai (foliatai, biotinas, magnis), kaulų funkcijai (cinkas, magnis), nuovargio mažinimui (geležis, pantoteno rūgštis) ir dar daugiau (vitaminas B12), psichologinei būsenai (foliatai, biotinas, magnis), kaulų funkcijai (cinkas, magnis), nuovargio mažinimui (geležis, pantoteno rūgštis). „Menopace Plus“ – dviguba jėga, vitaminų ir mineralų kompleksas, papildytas veiksmingais augaliniais ekstraktais – šalavijais, linų lignanais, žaliąja arbata ir dar didesniu sojų izoflavonų kiekiu.

„MENOPACE“ – NELEISK MENOPAUZEI TAVĘS SUSTABDYTI!

iki
-30%

MOTERIS INTYMAI HIGIENAI IR SVEIKATAI



ir nvaistine.lt

-20% **9⁹⁹**

LOTAMILE

KOSMETIKOS PRIEMONĖS, MEDICINOS PREKĖS

„Lotamile“ makšties ovulų sudėtyje yra polikarboflio, jis ilgai išlaiko veikliąsias medžiagas makštyje ir taip palaiko ovulų veikimą. „Lotamile Hialuronik“ makšties ovulų su hialuronu rūgštimi naudojamos esant makšties sausumui, atrofijam vaginitui. Ovulų mašina niežulį, skausmą lytinių santykių metu, drėkina, sutepa makštį, neleidžia išsausėti, saugo jos ekosistemą.

„Lotamile Bori“ makšties ovulų su boro rūgštimi naudojamos norint išvengti ar gydyti makšties infekcijas. Ovulų mašina sudirginimą, deginimą ir niežėjimą poji.

Naujienu – „Lotamile Girls“. Švelnus intymios higienos prausiklis moterims idealiai tinka naudoti kasdien, suteikia gaivumo, švaros poji. Prausiklis nedirgina gleivinės, švelnina bei ramina sudirgusią odą, turi drėkinamąjį poveikį, užtikrina natūralią apsauginę gleivinės funkciją, paliko tinkamą mergaitė lytinių sričių terpe. Puikiai pakeičia muilą, dušo gelius, kurie gali būti per stiprūs ir dirginantys.

Naujienu – „Lotamile Soft“. Intymios higienos prausiklis moterims idealiai tinka naudoti kasdien, suteikia gaivumo, švaros poji. Prausiklis nedirgina gleivinės, švelnina bei ramina sudirgusią odą, turi drėkinamąjį, šlapimo kvapą naikinantį poveikį, užtikrina natūralią apsauginę gleivinės funkciją, paliko intymių sričių rūgštinę terpe, kurios pH 4. Ypač rekomenduojamas ginekologinio gydymo metu, menstruacijų, nęstumo metu, po gimdymo.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms



ZENPROST FORTE, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Gulsčios serenos padeda palaikyti normalią prostatos funkciją, bei padeda palaikyti normalią šlapimo sistemos funkciją. Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese ir padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Cinkas padeda palaikyti normalią testosterono koncentraciją kraujyje. ID 15056

-20% **10³⁹**
12⁹⁹

SKUBIOS PAGALBOS KONTRACEPTIKAS



AVODELE 0,75 mg, 2 tabletės **9⁹⁹ €**
AVODELE 1,5 mg, 1 tabletė **12⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Avodele yra skubios pagalbos kontraceptikas, kurį galima pavartoti per 72 valandas (t. y. per tris paras) po lytinio akto, kurio metu kontraceptinės priemonės nebuvo naudotos arba naudota kontraceptinė priemonė nebuvo veiksminga. Avodele sudėtyje yra sintetinio hormono, veikliosios medžiagos, vadinamos levonorgestrelu. Suvartojus per 72 valandas po nesaugaus lytinio akto, jis 79 % atvejų apsaugo nuo nęstumo. Vartojimas šiais atvejais:

- lytinio akto metu nebuvo naudota kontraceptinė priemonė.
- jei kontraceptinė priemonė naudota netinkamai.

Kaip vartoti Avodele. Vsdada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Po nesaugaus lytinio akto išgerkite vieną tablete kuo greičiau, bet ne vėliau kaip po 72 valandų (3 parų). Tablete geriausia išgerti per 12 valandų. Antrą tablete išgerkite praėjus 12 val. (bet ne daugiau kaip 16 val.) po pirmosios tabletės išgėrimo. Jei žinote arba manote, jog nesate nėščia, Avodele galite vartoti bet kurio ciklo dieną. Tablete nurykite nekrūmty, užsėkite vandeniu. Jūs bus tuo veiksmingai, kuo greičiau ją išgėrėte. Avodele vartoti negalima, jeigu yra aktyvi leonorgestrelui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai (jos išvardytos informacinio lapelio 6 skyryje). Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Prieš vartojimą, pasitarkite su gydytoju, nes Avodele, kaip skubios kontracepcijos priemonė, jums gali netikti. Gydytojas gali jums skirti kitokią skubios kontracepcijos priemonę. Kaip dažnai galima vartoti Avodele. Avodele vartotina tik neatidėliotinu atveju ir nėra reguliaros kontracepcijos metodas. Galimas šalutinis poveikis. Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireškia ne visiems žmonėms. Labai dažnai: šleikštulys (pykinimas); Gali būti nereguliarus pakraujavimas iki prasidedant mėnesinėms; Gali skaudėti pilvo apačią; Nuovargis; Galvos skausmas. Dažnai: Vėmimas; Gali pakeisti mėnesinių ciklas; Išgerus šio vaisto, gali atsirasti krūtų jutrumas, viduriavimas, skausmingo poji. Labai retai: Bėrimas, dilgėlinė, niežulys, veido patinimas, dubens sritys skausmas, skausmingos mėnesinės. Prašome dėmėti perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu pasireškė šalutinis poveikis, įskaitant informaciniame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Ši informacija paskutini kartą peržiūrėta 2016-07-19.

nuo
9⁹⁹



MENOSTOP PAIRA 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Sudedamosios dalys: sojos pupelių aliejus, želatina, sojų izoflavonai, drėgmę išlaikanti medžiaga glicerolis, vanduo, dažiklis geležies oksidai. **Vartojimas:** suaugusiems po 2 kapsules per dieną valgio metu. *Be gliutimo.

-30% **5⁶⁶**
8⁹⁹

9⁹⁹



CANESTEN® 500 mg makšties minkštųjų kapsulė

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: makšties minkštųjų kapsulėje yra 500 mg klotrimazolo. **Indikacijos:** makšties ir moters išorinių lyties organų infekcijų, sukeltų klotrimazoliu jautrių mikroorganizmų, tokių kaip grybeliai, gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusioms moterims ir pasaugiems nuo 16 metų makšties minkštųjų kapsulę įdedama giliai į makštį, geriausia gulint, vakare prieš miegą. Jaunesnėms kaip 16 metų paauglėms vaistą galima vartoti tik po gydytojo konsultacijos. **Kontraindikacijos:** alergija klotrimazoliui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti Canesten, jeigu: infekcija pasireškia pirmą kartą; makšties infekcija pirmojo nęstumo trimestro metu, per pastaruosius šešis mėnesius infekcija pasikartoję daugiau nei du kartus; pasireškia karščiavimas (≥ 38,3°C); skauda apatinę pilvo dalį; nuagų; atsiranda nemalonus kvapo išskyų iš makšties; pasireškia pykinimas, kraujavimas iš makšties ir (arba) tuo pačiu metu pėjų skausmas; jeigu esate nėščia, žindote kūdikį. Canesten makšties minkštąja kapsule nerekomenduojama gydyti menstruacijų metu. Gydymas turi būti užbaigtas iki menstruacijų pradžios. Gydymo metu negalima naudoti tamponų, makšties ploviklių, spermicidinių ar kitokių makščių vartojamų preparatų, rekomenduojama vengti lytinių santykių. Reikalinga gydytojo konsultacija, jei simptomai nepalengvėja per 7 dienas. **Reklamos teksto parengimo data:** 2021-06. LMR-CH-20210617-61 Informacija sutrumpinta!

*Nr. 1 pasaulyje pagal pardavimus nerceptinių ginekologinių priešgrybelinių preparatų kategorijoje. Remiantis 2019 m. pasauline Nicholas Halls OTC duomenų baze DB6.

CANESTEN® – 1-OS DIENOS MAKŠTIES GRYBELINĖS INFEKCIJOS GYDYMAS!



AMEDIPLUS NEŠTUMO TESTAI

AMEDIPLUS neštumo testas, juostelė, 1 vnt. ~~1⁹⁹ 0⁹⁹ €~~ -20 %

AMEDIPLUS neštumo testas, kasetė, 1 vnt. ~~1⁹⁹ 1⁹⁹ €~~ -25 %

AMEDIPLUS neštumo testas, ypaz ankstyvas/srovinis, 1 vnt. ~~5⁹⁹ 3⁹⁹ €~~ -35 %

MEDICINOS PRIEMONĖS

Medicinos priemonės yra gamtiniai specifiniai hormonai, žmogaus chorioninį gonadotropiną (ZCG) tai yra glikoproteininis hormonas išskiriamas iškart po apvaisinimo besivystančios placentos. Neštumo testas Ameliplus yra skirtas nustatyti ZCG šlapime. Kaip ir atliekant kitus testus, galutinę diagnozę nustato gydytojas. Testo tikslumas 99%, jautrumas 99%.

iki
-35%

VITAMINO C POREIKIUI TENKINTI



CEVIKAP

CEVIKAP, geriamieji lašai, 10 ml ~~1⁷⁰ €~~

CEVIKAP, geriamieji lašai, 30 ml ~~2⁵⁰ €~~

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 ml geriamųjų lašų yra 100 mg askorbo rūgšties. 1 laše yra 5 mg askorbo rūgšties. **Indikacijos:** padidėjusio vitamino C poreikio tenkinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: kūdikiams (jaunesniams kaip 1 m. vaikams) per parą reikia gerti 5–8 lašus (maždaug 25–40 mg). Vyresniems kaip 1 m., bet jaunesniems negu 11 m. vaikams per parą reikia gerti 10 lašų (maždaug 50 mg). 11–17 m. paaugliams per parą reikia gerti 15–20 lašų (maždaug 75–100 mg). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** negalima maišyti su vaistinėmis preparatais, kurių sudėtyje yra geležies arba vario. Jei vartojama rekomenduojama askorbo rūgšties dozė, specialiu atsargumo priemonių laikytis nebūtina. Nevartoti didelės askorbo rūgšties dozės pacientams, kuriems yra inkstų akmenligė, hiperoksalaturija, polinkis į inkstų akmenų atsiradimą; žmonėms, kurių organizme yra geležies perteklius, ir pacientams, apsinuodijusiems geležies vaistinėmis preparatais. NBI Informacija vartotojui yra sutrumpinta. Teksto paruošimo data: 2018-04.

„CEVIKAP“ – KAI REIKIA VITAMINO C.

nuo
170



-30%

3⁸⁴
~~5⁴⁹~~

VITADAY MULTIVITAMINAI VAIKAMS

60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

IBUSTAR 20 MG/ML geriamoji suspensija vaikams, 100ml ~~3⁴⁹ €~~

IBUSTAR 40 MG/ML geriamoji suspensija vaikams, 100ml ~~5⁴⁹ €~~

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Viename geriamosios suspensijos ml yra 20 mg ibuprofeno. Viename geriamosios suspensijos ml yra 40 mg ibuprofeno. **Indikacijos:** Ibustar yra uždegimą slopinantis ir skausmą malšinantis vaistinis preparatas (nesteroidinis vaistas nuo uždegimo, NVNU), pasižymintis karščiavimą malšinančiomis savybėmis (antipiretikas). Ibustar vartojamas trumpalaikiam simptominiam gydymui: karščiavimo malšinimui; silpno ar vidutinio stiprumo skausmo malšinimui. Ibustar 20mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams, sveriantiems nuo 5 kg iki 29 kg (kurių amžius nuo 6 mėnesių iki 9 metų). Ibustar 40 mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams sveriantiems 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), paaugliams ir suaugusiems. Vartojimo būdas. Tinka vartoti tik per burną ir trumpai. Jeigu šio vaistinio preparato vaikams ir paaugliams reikia vartoti ilgiau kaip 3 dienas, arba jeigu ilgąs požymiai blogėja, reikia pasitarti su gydytoju. Prieš vartojimą būtina patikrinti vaisto vartojimo būdą. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu praėjusio laiko alerginių reakcijų vartojant acetylsalicilo rūgštį ar NVNU, puz., bronchių spazmas, astma, nosies gleivinės paburkimas; jeigu buvo odos reakcijų (pvz.: paraudimas, paburkimas, dilgėlinė ar kiti panašūs reiškiniai); jeigu yra neaiškių kraujodaros sutrikimų; jeigu yra ar buvo praėjusio skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa (pepsinė opa) arba kraujavimas (du ar daugiau atskirų įrodymų išopėjimo ar kraujavimo epizodų); jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakurimas, suaugusiesiems su ankstesniu NVNU vartojimu; jeigu yra kraujavimas iš smegenų arba kitokio kraujavimas; jeigu yra sunkus inkstų arba kepenų funkcijos nepakankamumas; jeigu nustatytas sunkus širdies nepakankamumas; netekus daug skysčių (dėl vemimo, viduriavimo ar dėl nepakankamo skysčių vartojimo); jeigu yra paskutinis neštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Pastaraitė su gydytoju artai stebint, prieš pradėdami vartoti Ibustar. Skausmo poveikis gali sumažėti vartojant mažesnius vaisto dozes trumpiausią laiką būtiną simptomų kontrolei. Ibustar reikia vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant COX-2 (ciklooksigenazės-2 selektyviuosius) inhibitorius. Jeigu jūsų vaikai atsiranda skrandžio kraujavimas ar išopėjimas, nutraukite Ibustar vartojimą. Nedelsiant informuokite gydytoją, jeigu atsiranda bet koks neįprastas simptomas plius: Pustė – bejus pirmųjų odos išbėrimo, gleivinės pažeidimo ar kitų padidėjusio jautrumo reakcijos požymių, Ibustar vartojimą reikia nutraukti. Sergant vėžraupiais reikia vengti vartoti Ibustar. LT-ibu-11-2020-V1 pharma Reklama paruošta 2020 m. Gruodžio mėn.

GREIT IR VĖL KARALYS!

nuo
3⁴⁹



ir nvaistine.lt
-20%



SKIEPAI NUO GRIPO



SU LOJALUMO KORTELE

20⁶⁰ €

Nuolaidos taikomos su PC Norfa kortele.
NV laimės valandų nuolaidos netaikomos.



SKIEPO KAINA
be kortelės

22⁴⁵ €

Skiepijantis
nuo gripo,
AMBIO vitamino C
tirpiosios tabletės
tik už

0,01 €



Galima išankstinė
registracija internetu
www.nvaistine.lt/skiepai