

TOP LAPKRIČIO PASIŪLYMAI



-45%
6⁴⁹ € **4⁵⁴ €**



-45%
24⁹⁹ € **13⁷⁴ €**



AMBIO Vitaminas C su citrusinių vaisių bioflavonoidais

60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

- Vitaminas C padeda palaikyti normalią: imuninės sistemos veiklą; energijos apykaitą; nervų sistemos veiklą ir psichologinę funkciją.
- Vitaminas C padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

BIODERMA ATODERM INTENSIVE BAUME

kremas emolientas labai sausai ir atopiškai odai, bekvapis, 500 ml

Biologiškai atkuria sveiką odai būdingą apsauginį barjerą, sugrąžina odai komfortą ir mažina nemalonių odos pojūčių paūmėjimo atvejus.

BIOLOGIJOS MOKSLAS DERMATOLOGIJAI



0⁹⁵ €

ŠIRDIES DARBĄ GERINANTYS LAŠAI VALENTIS

geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: valerijonų tinktūra, gudobelų vaisių tinktūra, sukatžolių tinktūra. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti, ypač esant nervinei įtampai. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Preparatą prieš vartojimą reikia suplakti. Iš pradžių 3 arba 4 dienas reikia gerti 3–4 kartus per dieną po 20–30 lašų, vėliau dozę sumažinti (gerti 2–3 kartus per dieną po 15–20 lašų). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bent vieni iš sudedamųjų vaisto dalių, nėštumas. Specialūs įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 m. asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip 2 savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu vartojant preparatą širdies plote atsiranda duriantis skausmas arba labiau sutrinka širdies ritmas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 61,5 % (V/V) etanolio. Teksto parengimo data 2018-08-30.



2⁹⁹ €

STREPSILS

STREPSILS Honey & Lemon 1,2 mg/0,6 mg, 24 kietosios tabletės
STREPSILS Vitamin C 1,2 mg/0,6 mg/100 mg, 24 kietosios tabletės
STREPSILS Menthol & Eucalyptus 1,2 mg/0,6 mg/8 mg, 24 kietosios tabletės

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Kiekvienoje kietojoje tabletėje yra 1,2 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio, 0,6 mg amilmetakrezolio, 100 mg askorbo rūgšties (Strepsils Vitamin C) ir 8 mg levomentolio (Strepsils Menthol&Eucalyptus). **Terapinės indikacijos:** lokalus simptominis ryklės uždegimo gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** Strepsils Menthol&Eucalyptus: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vaikams lėtai čiulpti po 1 tabletę kas 2–3 valandas, bet ne daugiau kaip 6 metų vaikams čiulpti po 1 tabletę kas 2–3 valandas, bet ne daugiau kaip 8 tabletės per 24 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Jaunesniems nei 12 metų vaikams (Strepsils Menthol&Eucalyptus). Jaunesniems nei 6 metų vaikams (Strepsils Honey & Lemon ir Strepsils Vitamin C). **Specialūs įspėjimai:** dėl užspringimo pavojaus šių vaistinių preparatų nerekomenduojama vartoti mažiems vaikams. Atsargumo priemonių reikia cukriniu diabetu sergantiems pacientams, nes vienoje tabletėje yra 2,4 g cukraus ir 2,5 g cukraus (Strepsils Menthol&Eucalyptus). Šių vaistų negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Strepsils Vitamin C sudėtyje yra azodaziklio – Ponso 4R (E124) ir saulėlydžio geltonojo (E110), kurie gali sukelti alerginių reakcijų. Reklamos tekstas parengtas 2020-09-10.

VIZIK

VIZIK LAŠAI SAUSOMS IR PAVARGUSIOMS AKIMS, 10ml 9⁹⁹ € 5⁹⁹ €

Be konservantų

MEDICINOS PRIEMONĖ

Užlašinus atnagrinio sudaro sterilią, be konservantų, elastingą, permatomą plėvelę. SUDĖTIS: 1 ml yra 0,15 proc. natrio hialuronato, 2 proc. dekspantenolio, natrio chlorido, natrio citrato, citrinų rūgšties, injekcinio vandens.

VIZIK LAŠAI SUDIRGUSIOMS IR PARAUDUSIOMS AKIMS, 10ml 8⁹⁹ € 4⁹⁹ €

Be konservantų

MEDICINOS PRIEMONĖ

Ilgam laikui pašalina diskomforto jausmą, atsiradusį dėl mechaninio poveikio, nešiojant kietus ar minkštesnius lęšius, atliekant akių patikrinimo procedūrą, aplinkos poveikio, sukkelto kondicionierių, vėjo, šalčio, sauso oro ar cigarečių dūmų užteršto oro, regėjimo įtampos, atsiradusios dėl įtempto žiūrėjimo į kompiuterio ekraną, mikroskopą ar dėl ilgo vaivairo. SUDĖTIS: 1 ml yra dekspantenolio, karbomero, citrinų rūgšties, bevandnio sorbitolio, injekcinio vandens.

VIZIK ALLERGY, 10ml 14⁹⁹ € 7⁹⁹ €

Be konservantų

MEDICINOS PRIEMONĖ

Sumažina akių junginės uždegimą, kurį sukelia alergenai, pašalina nemalonių pojūčių akyse (akių paraudimą, niežulį ir ašarojimą), kuriuos sukelia žiedadulkės, dulksės, gyvūnų kailis. Apsaugo nuo žalingo alergenų poveikio. Skatina dirglios ir jautrios junginės regeneraciją. Padidina ašarų klampumą ir veikia raminančiai. Tinka asmenims, nešiojantiems kontaktinius lęšius, jautriems akims, vaikams. SUDĖTIS: Akių lašai su 0,15 % natrio hialuronato ir 2 % ektino.



ATIDARIUS BUTELIUKUS GALIMA NAUDOTI NET 12 MĖNESIŲ!

SUPER PASIŪLYMAI

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis.



PERŠALIMO LIGŲ SIMPTOMAMS PALENGVINTI



FERVEX

FERVEX granulės geriamajam tirpalui, vaikams, 8 paketėliai
FERVEX granulės geriamajam tirpalui, suaugusiems, be cukraus, 8 paketėliai
FERVEX granulės geriamajam tirpalui, suaugusiems, 8 paketėliai

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Fervex suaugusiems ir suaugusiems be cukraus: 500 mg paracetamolio, 25 mg feniramino maleato, 200 mg askorbo rūgšties; Fervex vaikams: 280 mg paracetamolio, 10 mg feniramino maleato, 100 mg askorbo rūgšties. **Terapinės indikacijos.** Trumpalaikių ūminių peršalimo ligų simptomams (karščiavimo, nosies gleivinės paburkimo, skausmo) palengvinti. Fervex vaikams: trumpalaikių ūminių peršalimo ligų simptomams (karščiavimo, nosies gleivinės paburkimo, skausmo) palengvinti vaikams nuo 6 iki 15 metų. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Fervex suaugusiems ir suaugusiems be cukraus: gerti po vieną paketėlį 2-3 kartus per parą. Fervex vaikams: vaikams nuo 6 iki 10 metų gerti po 1 paketėlį 2 k./parą; nuo 10 iki 12 metų gerti po 1 paketėlį 3 kartus per parą; nuo 12 iki 15 metų gerti po 1 paketėlį 4 k./parą, bet ne dažniau kaip kas 4 val. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas vaisto sudedamosioms dalims, sunkus kepenų nepakankamumas, aktyvios kepenų ligos, uždarą kampo glaukoma, šlapimo susilaikymas, skrandžio prievartžio stenozė, šlapimo takų akmenys, vaikams ir paaugliams iki 15m; Fervex vaikams: vaikams iki 6 metų. **Specialios įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku jeigu jūs sergate pilbero sindromu, sunkia inkstų liga; hemolizine anemija, epilepsija, linke susidaryti akmenys šlapimo takuose, jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, piktnaudžiaujate alkoholiu, yra anoreksija, dehidracija, esate suaugęs svėriantis ≤ 50 kg, esant G6FD trūkumui ir sutrikusiai gelėties apykaitai. Nevartokite kartu jokio kito vaisto, kurio sudėtyje yra paracetamolio. Cukriniu diabetu sergantiems atsargiai vartoti Fervex suaugusiems ir sergantiems fenilketonurija atsargiai vartoti Fervex suaugusiems be cukraus. **Teksto parengimo data:** 2020.12.10. PM-LT-2020-12-1852.

3⁹⁹

KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIAI, INHALIATORIAI IR TERMOMETRAI

iki
-35%



OMRON

Hipertenzija ir prieširdžių virpėjimas (Afib) yra du pagrindiniai insulto rizikos veiksniai. Matuokite kraujospūdį kasdien. Jau 80 metų Omron yra naujausių technologijų lyderis. Su žingsniamačiu WLLI: atskratykite nereikalingo svorio, skatinkite medžiagų apykaitą, sutvirtinkite raumenis. Džiaukitės ir išlikite jauni! Naujiena Lietuvoje „Omron“ bekontaktis termometras GIT20. Saugus, patogus ir greitas matavimas. Ypač patogus tėvams, augantiems mažus vaikus. Gydyti inhaliacijomis – puikus pasirinkimas visai šeimai! Dažnas kosulys, švokštimas, dusulys, skausmas krūtineje, laringitas, astma ar tiesiog peršalimas... „Omron“ inhaliatoriai padės sušvelninti šiuos simptomus. Jie veikia tyliai, labai smulkios dalelės, greitas vaistų išspūrimas.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

IMUNITETUI

iki
-35%

NAUJIENA!



LIVOL

MAISTO PAPILDAI

Naujiena! LIVOL – tai sunderintos ir prie Jūsų priderintos vitaminų sistemos geriausias efektas. Tai holistinė sistema, kur vienas kitą papildantys produktai sudaro puikiai suderintą sistemą gerai savijautai. Skandinaviški LIVOL vitaminai – tai pirmos tokio tipo vitaminų sistemos: aiškos, paprastos bei visiems prieinamos.

LIVOL – VITAMINŲ SISTEMOS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

PLAUKAMS

-30%



HAIR VOLUME™

MAISTO PAPILDAI

„Hair Volume™“ ir „Hair Volume™ GUMMIES“ – biologikai veiklių maistinių medžiagų kompleksai su obuolių ekstraktu plaukams. Sudėtyje esantis biotinas ir cinkas padeda palaikyti normalią plaukų būklę. Tik 1 tabletė arba gėrimas 2 guminukai per dieną padės pasipildyti Jūsų plaukais! „Hair Gro™“ – biologikai veiklių maistinių medžiagų derinys su tokotrienoliais, maitinantis plaukų folikulus ir palaikantis normalią plaukų augimą, nes sudėtyje esantis biotinas ir cinkas padeda palaikyti normalią plaukų būklę.

PAGALBA JŪSŲ PLAUKAMS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

iki
-35%



MÖLLER'S OMEGA-3 kapsulės

MAISTO PAPILDAI

„Möller's“ žuvų taukų kapsulės išsiskiria kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyvių medžiagų deriniais. „Möller's Junior“ – skanaus žuvų taukai, turintys daug omega-3 riebiųjų rūgščių ir vitamino D. 250 mg omega-3 riebiųjų rūgščių DHR per parą padeda palaikyti normalią smegenų funkciją ir išsaugoti normalų regėjimą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų ir dantų būklę.

RŪPINAMĖS IR MAŽAIS, IR DIDELIAIS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

SAUSOMS AKIMS

-30%



ARTELAC®

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Artelac® Nature“ akimirksniu suteiks akims skausmą, baltumą ir švėtėjimą, bei užtikrins ilgalaikį drėkinimą. Sudėtyje esantis akišvečių ekstraktas numalšina akių sudirginimą ir greitai pašalina akių paraudimą, o hialuronas užtikrina ilgalaikį drėkinimą. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius. „Artelac® Splash“ pasirenkiamiausias mūsų produktas su hialuronu skirtas sausoms akims nedelsiant nuraminti ir sudrėkinti. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius.

„Artelac® Rebalance“ užtikrina maksimaliai drėkinantį poveikį ir palengvėjimą, esant nuolat pasikartojančiam akių sausumui. Drėkina akis ir apsaugo jų paviršių, papildoma ašarų plovėle puoselejančiais jonais, vitaminu B12, bei sureguliuoja osmosinį akių paviršiaus balansą ir tokiu būdu padeda ilgam sustabdyti sausų akių simptomų pasireiškimą.

„Artelac® TripleAction“ pažangiausias tirpalas, sukurtas taip, kad išliktų ant akių paviršiaus ir intensyviai drėkindamas akimirksniu ir ilgam numalšintų sausų akių simptomus. Sudėtyje esantys komponentai (hialuronas, glicerolis, karbomerai, lipidinis komponentas) atkuria visus tris ašarų plovėlės sluoksnius. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius.

„Artelac® Nighttime Gel“ atkuria ašarų plovėlę nakties metu. Produktas suteikia papildomą apsaugą tiems, kam pasireiškia didesnis ir nuolatinis akių sausumas. ART-LT2106-26.

„ARTELAC®“ – PAŽANGŲ SPRENDIMAI SAUSOMS AKIMS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

KOJŲ VENOMS



14⁹⁹

VELIOS 1000 mg plėvele dengtos tabletės, 30 tablečių

PATOGI DOZĖ. TIK VIENA TABLETĖ PER PARĄ

NERECEPTINIS VAISTAS

Veikioji medžiaga: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 1000 mg mikronizuoto diosmino. **Indikacijos:** suaugusiųjų lėtinio veninės kraujotakos nepakankamumo simptomų (kojų sunkumo, kojų skausmo, naktinio kojų mėšlungio) lengvinimas. Suaugusiųjų paūmėjusio hemorojaus simptomų lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** lėtinio veninės kraujotakos nepakankamumo simptominiams gydymui 1 tabletė per parą valgio metu. Paūmėjus hemorojui, pirmąsias 4 dienas gerti 3 tabletes per parą, 3 vėlesnes dienas – po 2 tabletes per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bet kuriai sudedamajai tablečių „VELIOS“ medžiagai. **Spec. įspėjimai:** paūmėjus hemorojaus simptomams, reikia prisiminti, kad „VELIOS“ veikia tik simptomus ir turi būti vartojamas trumpai. Jei simptomai nepaieina, reikia atlikti proktologinį tyrimą ir parinkti tinkamą gydymą. „VELIOS“ gydymai poveikį gali sustiprinti saulės bei ilgalaikio stovėjimo vengimas, tinkamo kūno svorio palaikymas, specialią kojinių nešiojimas. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba galaktozės malabsorbcija. „VELIOS“ sudėtyje yra saulėgėdžio geltonojo dažalo (E110), kuris gali sukelti alerginių reakcijų. Prašome įdomiai perskaityti pakutes lapelį ir vaistą naudoti kaip nurodyta. Nėtininkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsiradus šalutinį poveikį, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujama@wkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.wkt.lt. Teksto parengimo data 2021.06.18. VL-TL1206-28

PAJUSK KOJŲ LENGVUMĄ.

VIRŠKINIMUI GERINTI



3⁹⁹

KREON 10 000 V skrandyje neiros kietosios kapsulės, 20 kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: Vienoje Kreon 10 000 skrandyje neiros kietosios kapsulėje yra 150 mg kasos miltelių, kurių aktyvumas atitinka 10 000 vienetų lipazės, 8 000 vienetų amilazės, 600 vienetų proteazės.

Indikacijos: Suaugusiųjų kasos egzokrininės funkcijos nepakankamumo gydymas (fermentų pakeičiamoji terapija).

Dozavimas. Kreon 10000 V dozė priklauso nuo virškinimo sutrikimų laipsnio, tinkamiausia dozė nustatoma individualiai. Jeigu kitaip nenurodyta, valgant išgeriamos 2–4 skrandyje neiros kietosios kapsulės. Priklausomai nuo maisto ir virškinimo sutrikimo sunkumo, rekomenduojama dozė gali būti žymiai didesnė. Dozė galima didinti tik gydytoju leidus. Paros dozė neturi būti didesnė kaip 10 000 lipazės vienetų / paciento kūno svorio kilogramui arba 4000 vienetų lipazės / gramui suvartojamų riebalų. **Vartojimo būdas.** Vartoti per burną. Kapsulės reikia nuryti nepažeistas, nesutrupintas ir nesukramtytas, užsigeriant pakankamu skysčiu kiekiu, kiekvieno valgio ar užkandžio metu arba po jo. Tada fermentai galės visiškai susimaišyti su maistu ir padės suvirškinti žarnyną slenkantį maistą. Jeigu kapsulę sunku nuryti, atsargiai atidarykite ją ir supilkite granules į nedidelį kiekį skysto rūgštaus maisto (pvz., obuolių tyrės arba jogurto) arba sumaišykite jas su rūgščiais skysčiais (obuolių, apelsinų arba ananasų sultimis). Negalima granuliuoti dėti į karštą maistą ar skysčius. Mišinį reikia tuoj pat nuryti, jo laikyti negalima. Granulių sumaišymas su nerūgščiu maistu ar skysčiais, sutrynimai arba kramtymas gali sukelti burnos sudirginimą arba pakeisti Kreon poveikį Jūsų organizme. Nelaikykite vaisto burnoje. Kasdien būtina gerti daug skysčių.

Kontraindikacijos. Jeigu yra alergija kasos milteliams arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai.** Buvo gauta pranešimų apie klubinės, aklėsios ir storosios žarnos susiaurėjimo (fibrozės kolonopatijos) atvejus, kai cistine fibroze sergantys pacientai vartoję didelės kasos miltelių preparatų dozes (iki 10 000 vienetų lipazės / kg kūno svorio per parą). Jei jums atsiranda neįprastų pilvo simptomų arba pilvo simptomai pakinta, pasitarkite su gydytoju. Reklamos teksto parengimo data: 2021 metų kovo mėn. MYL-TL-21-29



8⁹⁹

CANIFUG CREMOLUM 200 mg, 3 ovulės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Vienoje ovulėje yra 200 mg klotrimazolo. „Canifug Cremolum“ vartojimas mialgrybių (dažniausiai baltšagrybių) sukeltam makišies uždegimui gydyti. Ligai pasireiškusi pirmą kartą arba jeigu liga pasireiškė dažniau nei 4 kartus per pastaruosius 12 mėnesių, vaisto galima vartoti tik gydytoju nurodžius ir jam prižiūrint. **Dozavimas.** Jeigu nenurodoma kitaip, 1 „Canifug Cremolum“ ovulė (tai atitinka 200 mg klotrimazolo) įkiškite kuo giliau į makšties vieną kartą per parą, vakare. Vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti vaikams, nes klinikinės patirties nepakanka bendroms dozavimo rekomendacijoms šiai amžiaus grupei nustatyti. Senyoms pacientėms dozės korektuoti nereikia. Dažniausiai pakanka 3 dienų gydymo šiuo vaistiniu preparatu kurso. Pirmausia galima pasikarti antrą 3 dienų trukmės gydymo kursą. **Vartojimo metodas.** „Canifug Cremolum“ – tai ovulė, skirta vartoti į makštį. Gerausia „Canifug Cremolum“ įdėti vakare, gulint ant nugaros šiek tiek sulenkus kojas. Norėdami išimti ovulę iš pakutės, nuplėskite plėvelę traukdam jį žemyn, naudokite aludarinę palengvinamą įtaisy – V formos plėvelės įtaisy. Po to galima ovulę išimti. Norinti išvengti riebiųjų dėmių susidarymo ant drabužių, ovulę vartojimo metu į kelnaites reikia įdėti į kiaušidę. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs atsargumo priemonių reiki:** jei esate nėščia, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate padėti, jeigu vartojami deodorantai ar intymiosios higienos priemonės, juos galima naudoti tik pastarus su gydytoju, nes gali sumažėti „Canifug Cremolum“ veiksmingumas; jeigu yra paraudimas, dilgčiojimas, niežėjimas, išsiskyros iš makties ir skausmingas makišies uždegimas, tai taip pat gali būti sukelta veiksmo, kuri „Canifug Cremolum“ neveikia. Tik gydytojas gali nustatyti teisingą diagnozę; kai tuo pačiu metu vartojate „Canifug Cremolum“ ir latekso produktus (pvz., prezervatyvus, diafragmas), nes dėl sudėtyje esančių pagalbinio medžiagų (ypač stearatų) gali būti sumažintas šių produktų veiksmingumas ir jie tampa mažiau patikimi. **Įspėjimai.** Gerausia gydytis ne mensesinių metu ir (arba) gydymą baigti prieš mensesinių pradę. Gydymą mensesinių metu galima tik esant sunkiems klinikiniais simptomais. Dėl to kreipkitės į gydytoją. Nėštumo metu gydymą gali skirti tik gydytojas. Jeigu jums kartu nustatyta lytinis lūpų ir aplinkinių sričių grybelinė infekcija, ir (arba) jeigu jūsų partneriui nustatyta varpos galutės arba apyvarpės grybelinė infekcija, reikia papildomai vartoti vietinį gydymą. Siekiant išvengti galimos pakartotinės infekcijos, tuo pat metu reikia mediciniškai tirti partnerį. Reklamos teksto parengimo data 2020.03.12.

NUO SKAUSMO



3⁹⁹

ADOBIL 500 MG/150 MG, 10 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: 500 mg paracetamolio ir 150 mg ibuprofeno.

Terapinė indikacija: Silpno ar vidutinio skausmo trumpalaikiam simptominiams malšinimui.

Dozavimas ir vartojimo būdas: Šio vaisto negalima vartoti vaikams iki 18 metų. Suaugusiems įprastinė dozė yra 1 tab. arba 2 tab. kas 6 val. pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 6 tab. per 24 val.

Vaistą rekomenduojama užgerti pilna stikline vandens.

Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai: Vaisto vartoti negalima jei yra alergija veikliosioms ar pagalbinėms medžiagoms, buvo kraujavimas virškinimo trakte ar suaugęs su NVNU vartojimu, sergate ar sirgote peptine opa, vartojate daug alkoholio, sergate sunkiu širdies ar kepenų ar inkstų nepakankamumu, organizme vyksta kraujavimas, sutrikus kraujo gamyba, pavartojus acetylsalicilo rūgšties arba kito NVNU, buvo pasireiškusi astma, dilgėlinė arba alerginė reakcija, paskutinis nėštumo trimestras ir jaunesniems kaip 18 metų pacientams. Vaistas didelėmis dozėmis gali trupučiai padidinti miokardo infarkto ir insulto riziką. Atsargiai skirti jeigu yra kardiovaskulinės rizikos faktorių. Nutraukite vaisto vartojimą, jei pasireiškė sunkios odos reakcijos, tokios kaip odos išbėrimas, gleivinių pažeidimas, pūsles ar kitą alergijos požymiai. Vaisto vartojimas gali paslėpti infekcijos požymius. Kad neperdozuotų vaisto, patikrinkite, ar kitų vartojamų vaistų sudėtyje nėra paracetamolio. Ilgai vartojant gali pasireikšti tam tikras galvos skausmas. Gali išsiskirti šlapimo tyrimas naudojant SHIA duomenis. Teksto parengimo data 2021.05.19. PM-LT-2021-5-994



2⁹⁹

LIUGOL KIDS

MEDICINOS PRIEMONĖ

Burnos ertmės ir gerklių purškiklis. **Sudėtis:** alantoinas, glicerolis, kalio sorbatas, amonio glicirizatas, joduotas povidonas, išgrynintas vanduo, polivinilpolidonas K90, natūralūs dažikliai: I paprastasis karamelizuotas cukrus, natūrali obuolių kvapioji medžiaga. **Paskirtis:** saugo burnos ertmės ir gerklių gleivinę nuo kenksmingų aplinkos veiksnių ir patogeninių mikroorganizmų; palaiko gerklių ir ryklės gleivinės drėgmę ir pagerina jos natūralią funkciją; padeda atsikratyti nemalonių pojūčių gerklyje (kai vaikas skundžiasi gerklių peršėjimu, skausmingu rijimu); naudojamas kaip pagalbinė priemonė esant gerklių arba burnos ertmės sudirginimui (kai yra peršalimas, tonzilitas, faringitas, laringitas, stomatitas, gingivitas). **Naudojimas:** skaitas burnos ertmės ir ryklės. Vyresniems nei 2 m. vaikams įpurškite 2–3 kartus per dieną. Purškuvu galvute su antgaliu nukreipkite į gerkles šritį ir atlikite reikiamą įpurškimų skaičių (1–2 paspaudimai). Purškdami buteliuką laikykite vertikaliai. Įpurškimo metu rekomenduojama sulaikyti kvėpavimą.



-30% 20⁰¹ 28⁹⁹

EXCILOR 2in1 priemonė karpoms gydyti

MEDICINOS PRIEMONĖ

Vienena įrenginyje derinama krioterapija ir gydymas geliu. Veikia karpą iš vidaus ir iš išorės. Efektyvus karpų gydymas per vieną 5 dienų trukmės seansą.*

* Du klinikiniai tyrimai, n = 82, duomenys byloje.

EXCILOR® – MEDICININĖS PĖDŲ PRIEŽIŪROS EKSPERTAS.

SUPER PASIŪLYMAI

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis.



-40%



AMBIO IMUNITETUI, mikstūra, 120 ml 7⁹⁹ 4⁹⁹ €

AMBIO IMUNITETUI SU EŽIUOLE, 30 tablečių 8⁹⁹ 5⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAI

PERŠALUS

8⁹⁹



VIRUPROTECT STADA burso purškalo, 7 ml.

MEDICINOS PRIEMONĖ

VirusProtect STADA yra burso purškalo nuo peršalimo. Gydo peršalimą ir sušvelnina jo simptomus. Jis sukuria apsauginį barjerą nuo peršalimą sukeliančių virusų, padengdamas burso gleivinę. Barjeras sulauko peršalimą sukeliančius virusus, juos nukreipia ir slopina jų plitimą bei dauginimąsi.

Vartoti esant galimam peršalimą sukeliančių virusų poveikiui arba vos tik pajuntami peršalimo simptomai. VirusProtect STADA yra tinkamas suaugusiems ir vaikams (vyresniems nei 4 metų amžiaus).

NUO KOSULIO

1⁹⁹



AMBROLAN 30 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tabletė yra 30 mg ambrosolio hidrochlorido. „Ambrolan“ yra labai veiksmingas vaistas, kurio veiklioji medžiaga ambrosolis yra bromheksino metabolitas. „Ambrolan“ mažina susikaupusių skreplių klampumą, gerina virpamojo epitelio aktyvumą ir taip skatina sekretą pašalinti iš bronchų, skystina pernelyg klampias gleives ir palengvina jų išsiskyrimą, vartojamas sergantiesiems ūmine arba lėtine bronchų ir plaučių liga, kurios metu sutrinka sekreto išsiskyrimas ir šalinimas, kvėpavimo takų sekretui skystinti. Vartojimas. Suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams įprastinė dozė yra 1 tabletė 3 kartus per parą. Vartojama po valgio, užgeriant pakankamu kiekiu skysčio. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. „Ambrolan“ vartoti negalima, jeigu yra: alergija ambrosoliui; skrandžio ir (arba) žarnyno opa; pirmuosius 3 nėštumo mėnesius ir maitinant krūtimi; jaunesniems nei 12 metų vaikams. Kiekvienoje tabletėje yra 100 mg laktozės (pieno cukraus).

NUGALĖKITE KOSULĮ!

-40%



AMBIO BETA KAROTENAS, 90 kapsulių 12⁹⁹ 7⁹⁹ €

AMBIO CHROMAS, 60 tablečių 7⁹⁹ 4⁹⁹ €

AMBIO OBUOLIŲ SIDRAS, 60 kapsulių 9⁹⁹ 5⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAI

NUO RAUMENŲ IR SĄNARIŲ
SKAUSMO

nuo
5⁹⁹



VIPROSAL B®

VIPROSAL B®, tepalas, 50 g 5⁹⁹ €

VIPROSAL B®, tepalas, 75 g 7⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo yra 0,05 V gyvačių nuodų, 10 mg salicilo rūgšties, 30 mg raceminio kamparo ir 30 mg terpentino eterinio aliejaus. **Indikacijos:** sąnarių ir raumenų skausmams malšinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** nedidelis „Viprosal B®“ kiekis (5–10 g, t. y. 1 ar 2 arbatiniai šaukštėliai, atsižvelgiant į pažeistos vietos ir įtrinamas į odą 1 arba 2 kartus per parą. Tepti ant odos. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, odos opa ar kitos odos ligos. **Specialūs įspėjimai:** „Viprosal B®“ negalima tepti ant pažeistos odos. Saugotis, kad tepalo nepatektų ant gleivinės ar į akis. Vietinis rinkodaros teisės turėtojas: AB „Grindeks“ filialas, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2021-09-15.

VIPROSAL B – IŠMINTINGAS PASIRINKIMAS NUO SKAUSMO!



nuo
2⁹⁹

ASPIRIN CARDIO 100 MG, 28 skrandyje neiros tabletės 2⁹⁹ €

ASPIRIN CARDIO 100 MG, 98 skrandyje neiros tabletės 6⁹⁹ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: vienoje tabletėje yra 100 mg acetylsalicilo rūgšties. **Indikacijos:** trombocitų agregacijos slopinimas šiais atvejais: nestabili krūtinės angina, ūminis miokardo infarktas, pakartotinis miokardo infarkto profilaktika, po perkutaninės arba kitokios chirurginės vainikinių arterijų operacijos (pvz., PTCA, VAJO); praeinančių smegenų išemijos priepuolių (PSIP) ir smegenų insulto profilaktika, pradinė pastorosios būklės stadija; pacientų, kuriems yra daug rizikos veiksnių, koronarijų arterijų trombozės profilaktika; venų trombozės ir plaučių embolijos po ilgalaikės imobilizacijos profilaktika. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** Vartojama nuo 100 iki 300 mg/parą priklausomai nuo indikacijos, mažesniais 30 minučių prieš valgį užgeriant dideliu kiekiu vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas acetylsalicilo rūgščiai, kitiems salicilatams arba bet kuriai pagalbinei vaistinio preparato medžiagai, jei anksčiau vartojant salicilatų arba panašiai veikiančių medžiagų (pvz., nesteroidinių vaistinių preparatų nuo uždegimo (NVNU)) pasireiškė astma; ūminis virškinimo trakto opos, hemoraginė diatezė; sunkus inkstų / kepenų funkcijos / širdies nepakankamumas; vartojimas kartu su 15 mg per savaitę ar didesne metotreksato doze; paskutinis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Acetylsalicilo rūgštis gali didinti polinkį kraujuoti chirurginės operacijos metu ir po chirurginių operacijų (skaitant mažas chirurgines operacijas, pavyzdžiui, danties ištraukimą). Sergant kai kuriomis virusinėmis ligomis, ypač A ir B tipo gripu, vežraupiais, yra Reye sindromo rizika. Atsargiai vartoti, jei kartu skiriami antikoagulantai; yra sutrikusi inkstų/širdies/kraujagyslių funkcija; yra gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka. **Sąveika su kitais vaistiniais preparatais:** Atsargiai vartoti su mašes kaip 15 mg metotreksato doze, NVNU, metimozolu, digoksinu, antikoagulantais ir kitais hemostazės inhibitoriais, vaistiniais preparatais nuo diabeto, diuretikais, sisteminio poveikio gliukokortikoidais, AKF inhibitoriais, selektyviais serotonininio reabsorbcijos inhibitoriais, urikoziniais vaistiniais preparatais, valproine rūgštimi. Pirmą ir antrąjį nėštumo trimestrais acetylsalicilo rūgšties turinčių preparatų vartoti negalima, nebent neabejotinai būtina. Mažas kiekis salicilatų ir jų metabolitų prasiskverbia į motinos pieną. **Salutinis poveikis:** Dažnas: virškinimo trakto sutrikimai (dispepsija, skrandžio ir pilvo skausmas). Nedėžnas: kraujavimas, hematomos. Retas ir labai retas: virškinimo trakto uždegimas, opa; sunkus kraujavimas; trumpalaikis kepenų funkcijos sutrikimas, padidėjusio jautrumo reakcijos. **Registravimas:** UAB „Bayer“, Sporto g. 18, LT-09328, Vilnius, Lietuva. **Teksto paskutinės peržiūros data:** 2020-02-18. **NB! Preparato charakteristikų santrauka trumpinama!** Jei norite sužinoti daugiau informacijos, skaitykite Preparato charakteristikų santrauką ir (arba) kreipkitės į UAB „Bayer“, Sporto g. 18, LT-09328, Vilnius, Lietuva, tel. 8 5 2336868. **Reklamos teksto parengimo data:** 2021-10. PP-ASP-LT-0018-1



4⁹⁹

SEPTABENE 3 mg/1 mg, 16 kietųjų pastilių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Septabene“ dezinfekuoja burną ir ryklę bei lengvina ryklės uždegimo požymius: skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. Kietosios pastilės „Septabene“ vartojamos uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti: jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas; sergant dantenų uždegimu (gingivitu), ryklės uždegimu (faringitu) ir gerklų uždegimu (laringitu); prieš dantų traukimą ir po jo. **Dozavimas:** suaugusiems rekomenduojama paros dozė yra 3–4 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3–6 valandas. 6–12 m. vaikams rekomenduojama paros dozė yra 3 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3–6 valandas. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 m. vaikas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Septabene“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydymo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Sąveika su kitais vaistinėmis preparatais ir kitokia sąveika. „Septabene“ negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Kietųjų pastilių negalima vartoti kartu su pienu, nes jis silpnina cetilpiridinio chlorido antimikrobinį poveikį.

TAVO GERKLĖ – TAVO JĖGA!

NATŪRALŪS AKIŲ LAŠAI



-30%

NAVI®VISION PLUS

MEDICINOS PREKĖS

Stipriai drėkinantys natūralūs akių lašai pagrindinėms akių problemoms spręsti. Pavargusioms akims: užtikrina greitą ir ilgalaikį palengvėjimą, esant sausų akių pojūčiui. Sudirgusioms akims: ramina dėl alergijos sudirgusias akis. Paraudusioms akims: padeda palengvinti paraudusių akių būklę, susijusią su uždegimu, niežėjimu, deginimu, svetimkūnio patekimu.

- Su natrio hialuronatu 0,3 %.
- Su natūraliais augaliniais ekstraktais.
- Be konservantų, kai patenka į akis.
- Tinka naudoti nešiojant visų rūšių kontaktinius lęšius.
- Atidarius galioja 3 mėn.
- Pakuotėje net 15 ml.
- Neutrūs pH.

TINKA NAUDOTI NEŠIOJANT VISŲ RŪŠIŲ KONTAKTINIUS LĘŠIUS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtos prekės.

NUO SKAUSMO IR UŽDEGIMO



nuo 6⁹⁹

ODIFLAN

ODIFLAN 20 mg/g gels, 50 g 6⁹⁹ €
ODIFLAN 20 mg/g gels, 100 g 10⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 g gels yra 232 mg diklofenako dietilamino, atitinkantis 20 mg diklofenako natrio druskos. **Terapinės indikacijos:** suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams skirtas lokaliai simptominiams skausmams malšinti, esant ūminiams šlepiams, patempimams ar sumušimams po buko traumos. 14 m. ir vyresniems paaugliams vaistinis preparatas skirtas gydyti trumpą laiką. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** „Odiflan“ reikia vartoti ant odos 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Atsivėlgiant į gydymo pakeistos vietos dydį, reikia nuo vėsinio iki graikiško riešuto dydžio gelso kremo, atitinkantis 1–4 g gels, kuris atitinka 14–80 mg diklofenako natrio druskos. Didžiausia paros dozė yra 8 g gels, kuris atitinka 160 mg diklofenako natrio druskos. Vartojimo trukmė priklauso nuo simptomų bei pagrindinės ligos. Be gydytojo patarimo „Odiflan“ negalima vartoti ilgiau kaip 1 savaitę. Jeigu per 3–5 dienas simptomai nepalengvėja arba net pasunkėja, būtina gydytojo konsultacija. **Kontraindikacijos:** „Odiflan“ vartoti negalima: jeigu yra alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu jums kada nors anksčiau pavertę acetilsalicilo rūgšties arba kitų NVNU (pvz., ibuprofeno) buvo sutrikęs kvėpavimas (astma, bronchų spazmas), pasireiškė dilgėlinė, sloga, veido arba liežuvio patinimas; esant odos arba gleivinių atimams žaizdoms, uždegimui arba infekcijai, taip pat sergant egzema; paskutiniuoju nėštumo trimestru; jaunesniems kaip 14 m. vaikams ir paaugliams. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės reikalingi, jei sergate astma, šienlige, nosies gleivinės patinimu ar lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis, lėtinėmis keupavimo takų infekcijomis arba yra padidėjęs jautrumas kitiems skausmą malšinantiesiems vaistams ir bet kuriems vaistams nuo reumato; taip pat pacientams, kurie yra alergiški kitoms medžiagoms ir kuriems būna odos reakcijų, pasireiškė niežulys arba dilgėlinė. Kai „Odiflan“ vartojama dideliam odos plotui ir ilgai gydyti, negalima paimti galimo sisteminio šalutinio poveikio. „Odiflan“ galima vartoti tik ant nepažeistos ir sveikos odos. Žiūrėkite, kad nepatektų į akis ir nekontaktuotų su gleivėmis. Nesinaudokite oro neapdirbančiais barščiais. „Odiflan“ vartojimą reikia nutraukti, jei atsiranda odos bėrimas. Vartodami šį vaistą venkite saulės spindulių, taip pat nesinaudokite soliariumu. Saugokite, kad vaikai negalėtų paliesti šio vaisto gydymui odos vietų. Teksto peržiūros data: 2020-09-30. *Palyginus su Ofen 1% gelsu.

MAKSIMALUS SKAUSMO MALŠINIMAS*

NUO RĖMENS IR PADIDĖJUSIO RŪGŠTINGUMO

nuo 2⁹⁹



ELFIMEST

ELFIMEST, 20 mg, 7 skrandyje neiros tabletės 2⁹⁹ €
ELFIMEST, 20 mg, 14 skrandyje neirių tablečių 3⁹⁹ €

Ezomeprazolas

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Elfimest, 20 mg“ skrandyje neiros tabletės. 1 skrandyje neiroje tabletėje yra 20 mg ezomeprazolo (atitinkantis 21,75 mg ezomeprazolo magnio druskos dihidrato). **Terapinės indikacijos:** „Elfimest“ skirtas suaugusių žmonių gastroezofaginio refliuksio simptomų (pvz., rėmens ir skrandžio rūgšties regurgitacijos) trumpalaikiam gydymui. Dozavimas: rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 tabletė) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, tabletes gali prireikti vartoti 2–3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Simptomams visiškai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Reikia nuryti visą tabletę, užgeriant puše stiklinės vandens. Tablečių negalima nei kramtyti, nei trauškyti. Kitas pasirinkimas – tabletę galima disperguoti pusėje stiklinės negazuoto vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pakeistiems benzimidazolams arba pagalbinei medžiagai. Ezomeprazolo negalima vartoti kartu su nelfinaviru. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pacientas reikia informuoti, kad kreiptųsi į gydytoją, jeigu jie patiria didelį kūno svorio mažėjimą dėl nežinomų priežasčių, pasikartojantį vėmimą, disragiją, vėmimą krauju ar melėnų arba jeigu įtariama ar diagnozuojama skrandžio opa, būtina iširti, ar nėra piktybinės ligos, nes gydymas ezomeprazolu gali palengvinti jos simptomus ir uždelsti diagnozės nustatymą; jie anksčiau sirgo skrandžio opa arba patyrė virškinimo trakto operaciją; jiems 4 savaites arba ilgiau buvo taikomas nepatraukiamas simptominis nevirškinimo arba rėmens gydymas; jie serga gelta arba sunkia kepenų liga; jie yra vyresni kaip 55 m. ir turi naujų arba senesnių pakitusių simptomų. Protonų siurblio inhibitoriai siejami su labai retais PORV atvejais. Dėl padidėjusios chromogranino A (CgA) koncentracijos gali būti sunkiau atlikti neuroendokrininių navikų tyrimus. Reklamos teksto parengimo data 2019-07-25.

GREITA IR INOVATYVI PAGALBA NUO RĖMENS!

ODOS PAŽEIDIMAMS GYDYTI

4⁹⁹



RECREOL® 50 mg/g, kremas, 50 g; tepalas, 50 g

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo yra 50 mg dekspantenolio. **Indikacijos:** paviršinių odos pažeidimų (tokių kaip maži nudegimai ir žaizdos, odos nubrozdinimai ir įtrūkimai), odos uždegimo (atsirandantis dėl spindulinio gydymo, fototerapijos ar ultravioletinių spindulių) pagalbiniis gydymais. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** vartoti išorškai. Įprastinis dozavimas yra vieną ar kelis kartus per parą plonu sluoksniu tepti pažeista oda. Gydymo trukmė priklauso nuo ligos kilmės ir eigos. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** reikia vengti atsitiktinio dekspantenolio kontakto su akimis.

Teksto peržiūros data: 2017-04-24

Vietinis rinkodaros teisės turėtojas AB GRINDEXS filialas, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius.

Reklamos teksto parengimo data: 2019-03-25.

EFEKTYVUS GYDYMAS IR RŪPESTINGA ODOS PRIEŽIŪRA!

INFEKČINĖS ODOS LIGOMS GYDYTI

9⁹⁹



NIZORAL 20 mg/g šampūnas, 60 ml

Ketokonazolas

VAISTAS INFEKČINĖS ODOS LIGOMS GYDYTI IR PROFILAKTIKAI

Indikacijos: šampūnas yra vaistas, vartojamas toliau išvardytiems infekcinėms odos ligoms, kurias sukelė grybeliai, gydyti:

- seleninis galvos odos pleiskanojimas (Pityriasis capitis);
- seborėjinis dermatitas (rausvai rudos dėmės, padengtos gelsvomis arba baltomis pleiskanomis);
- įvairiaspalvė dedervinė (Pityriasis versicolor) (ant liemens esančios mažos, rudos ar baltos spalvos, nelygiais kraštais dėmės).

Vartojimas: paaugliams ir suaugusiems. Pažeista oda reikia sudrėkinti „Nizoral“ šampūnu ir palaikyti 3–5 minutes, kad įsigertų (paprastai vienam kartui užtenka vienos saujos šampūno). Po to odą ir plaukus reikia gerai nuplauti vandeniu. Odos drėkinimo šampūnu dažnis priklauso nuo grybelių rūšies ir nuo to, ar vaistas vartojamas ilgai gydyti, ar jos profilaktikai. Gydančios galvos odos seborėjinį dermatitą ir pleiskanojimą; odą „Nizoral“ šampūnu reikia plauti 2 kartus per savaitę 2–4 savaites, ligos atsinajinimo profilaktikai – 1 kartą per savaitę arba kas dvi savaites.

Gydant įvairiaspalvę dedervinę: odą „Nizoral“ šampūnu reikia plauti 1 kartą per dieną, 1 dieną.

Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai: šampūno vartoti negalima, jeigu yra alergija ketokonazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (suderinkta šampūno oda parausta, pradeda niežėti).

Pakuotės lapelio peržiūros data 2019 06 20. Reklamos teksto parengimo data 2020 05 06.

SUPER PASIŪLYMAI

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis.



NUO RĖMENS

MAALOX


- MAALOX 400 mg/400 mg kramtomosios tabletės (be cukraus), 40 tablečių 2⁹⁹ €
- MAALOX 40 mg/35 mg/ml geriamoji suspensija, 250 ml 3⁹⁹ €
- MAALOX 460 mg/400 mg/4,3 ml geriamoji suspensija, 20 paketėlių 4⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: viename vienodoje 4,3 ml geriamosios suspensijos paketėlyje yra 460 mg aliuminio hidroksido ir 400 mg magnio hidroksido; vienoje kramtomosios tabletėje yra 400 mg magnio hidroksido ir 400 mg aliuminio hidroksido; viename ml geriamosios suspensijos yra 40 mg magnio hidroksido ir 35 mg aliuminio hidroksido. **Indikacijos:** rėmens ir skrandžio turinio kimo / stemplės simptomams malšinti suaugusiems ir paaugliams nuo 15 metų. **Vartojimo būdas ir dozavimas. Suspausimas:** geriami po 1 arba 2 vienodoji paketėlių turinį, pasireiškus rėmeniui arba refliuksui; negalima gerti daugiau kaip 8 paketėlių per parą; prieš atplėšiant paketėlį, jį reikėtų švelniai paspausti; venodujų reikėtų gerti neskiesiant. **Buteliuko suspensija** geriami po vieną valgomąjį šaukštą (15 ml) pasireiškus rėmeniui arba skrandžio turinio refliuksui / stemplės; negalima gerti daugiau kaip 6 valgomųjų šaukštų (90 ml) per parą; šio vaisto negalima vartoti ilgiau kaip 10 dienų. **Tabletės:** sučiūpti arba sukramtyti 1–2 tabletes, pajutus rėmę arba atsiradus refliuksui; negalima vartoti daugiau kaip 6 kartus per parą ir daugiau kaip 8 tablečių per parą. **Kontraindikacijos:** alergija (padidėjęs jautrumas) magnio hidroksido ar aliuminio hidroksido arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sunki inkstų liga; stiprus pilvo skausmas arba įtarimas žarnų nepažeidumams. **Specialūs įspėjimai:** vaistas galima vartoti tik pasitarus su gydytoju, jeigu mažėja kūno svoris, kraujavimas arba anksčiau yra kraujavę iš virškinimo trakto, sutrikęs rijimas arba nuolat jaučiate nemalonų pojūtį pilve, virškinimo sutrikimų atsiradimą pirmą kartą arba je neseniai pakito, sergate inkstų liga. Pacientams, kuriems nustatytas inkstų funkcijos sutrikimas, jaunesniems kaip 2 metų vaikams, senyviems pacientams bei kitoms pacientams, kuriems yra fosforo trūkumo pavojus, prieš pradėdami vartoti Maalox reikia kreiptis į gydytoją. Norint išvengti perdozavimo, negalima kartu vartoti vaistinių preparatų, savo sudėtyje turinčių aliuminio hidroksido ir magnio hidroksido. Atsargumo dėlei tarp bet kokių per burną vartojamo vaisto ir antacidinio vaisto vartojimo turi būti bent 2 valandų (vartojant fluorochinolonus – 4 valandų) intervalas, jeigu gydytojas jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Maalox (be cukraus) tabletės tinka cukriniu diabetu sergantiems pacientams. Teksto parengimo data: 2021 m. kovo mėn. Reklamos teksto parengimo data: 04/2021. MAT-IT-2100180 V.1.0

GREITA PAGALBA NUO RĖMENS!

NUO RĖMENS



PANZILAN® 20 mg, 14 skrandyje neišsiskiriančių tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Pantoprazolas. Vienoje tabletėje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos sėsahidratu pavidalu). **Indikacijos.** „Panzilan“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos pantoprazolo, kuri blokuoja skrandžio rūgšties gaminti, todėl skrandyje sumažėja rūgšties kiekis. „Panzilan“ vartojamas trumpalaikiam gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens, rūgščių atpylimo) suaugusiems pacientams gydymui. Refliuksas yra uždegimas ir skrandžio atgalinis patekimas į stemplę, kurioje gali prasidėti uždegimas ir sukelti skausmą. Dėl to gali atsirasti tokių simptomų, kaip skausmingas degimo pojūtis krūtineje kylantis iki ryklės (remus) ir rūgštus skonis burnoje (rūgšties atpylimas). **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Gerti po 1 tabletę per parą prieš valgį tuo pačiu paros laiku 2–3 dienas iš eilės, užsigeriant vandeniu. Tabletės reikia nuryti, negalima kramtyti ar laužyti. Nėvirkite rekomenduojamus 20 mg pantoprazolo dozes per parą. Nuraikite „Panzilan“ vartojimą, kai visai pranykęs ligos simptomai. Nepasitarus su gydytoju vartoti „Panzilan“ ilgiau kaip 4 savaites negalima. **Kontraindikacijos.** Jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) pantoprazolui, sojų lecitinui arba bet kuriai pagalbinei „Panzilan“ medžiagai, kartu vartojami vaistai. Jeigu sudėtyje yra aiazanahoro, amžius iki 18 metų, nėštumas arba kūdikio žindymas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu dėl rėmens arba virškinimo sutrikimo gydotes ilgiau kaip 4 savaites, esate kūdikio žindymas, 55 metai ir kasdien vartojate nereceptinius vaistus dėl sutrikusio virškinimo, atsiradusių naujų simptomų arba simptomai neseniai pasikartoję, anksčiau sirgote skrandžio opalige arba buvo atlikta skrandžio operacija; sutrikusi kepenų veikla arba atsiradę gelta; numatoma atlikti endoskopiją arba C-šlapalo mėginį. Jeigu numatyta atlikti kraujo mėginį, pasakykite gydytojui, kad vartojate šį vaistą. Atsiradusio rėmens simptomai gali palengvėti pavartojus „Panzilan“ vos viena diena, tačiau šis vaistas neturi sukelti pagerėjimo neįsėjant. Jo negalima vartoti profilaktikai. Jeigu jums gydytojas sakė, kad netoleruojate kai kurių angliavandenių, prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su gydytoju. „Panzilan“ sudėtyje yra sojų lecitino. Je esate alergiškas lėmės nėsėjamas ar sojai, vaisto vartoti negalima.

UŽGESINK GAISRA SKRANDYJE!

SLOGUOJANT



ILOXEN 200 mg/30 mg pėlele dengtos tabletės, 12 tablečių

NERECEPTINIS VAISTAS

Veiklosios medžiagos yra ibuprofenas ir pseudoefedrinio hidrochloridas. Kiekvienoje pėlele dengtoje tabletėje yra 200 mg ibuprofeno ir 30 mg pseudoefedrinio hidrochlorido. Vartojamas nosies užgulimo, susijusio su ūminiu rinosinustu (įtariama virusinės kilmės), simptominiams gydymui, kai yra galvos skausmas ir (arba) karščiavimas. Suaugusiems ir 15 metų bei vyresniems paaugliams po 1 tabletę kas 6 val. pagal poreikį, jeigu simptomai išsiskiria stipriau; po 2 tabletes kas 6 val. pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 6 tabletes per parą. Vaikams iki 15 metų vartoti negalima. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms ar pagalbinėms medžiagoms, moterims trečią nėštumo trimestrą, žindymo laikotarpiu, ankstesnės padidėjusio jautrumo reakcijos, sukeltos nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU), virškinimo trakto kraujavimas arba perforacija, anksčiau pasireiškę vartojant NVNU, esama aktyvi peptinė opa ar kraujavimas arba anksčiau buvę kraujavimo epizodai, hemopoezės anomalijos, kraujavimas iš smegenų arba kitų kraujagyslių, sunkūs kepenų ir (arba) inkstų, širdies nepakankamumas, sunkūs širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai, išeminė širdies liga (širdies liga ir kraujagyslių sutrikimai). Je pasireiškia stiprus pilvo skausmas, kraujavimas iš tiesiosios žarnos ar kitų išeminio kolkto simptomai, reikia nutraukti pseudoefedrinio vartojimą ir kreiptis medicininės pagalbos. Pradome įdomiai perskaityti pakutes lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Neturkima vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Je simptomai nespaieja ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtarate, kad jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir paštu Nepagaidujama!@ vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Parengimo data: 2021.06.18 ILX-IT2106-27

DVIGUBAS SMŪGIS SINUSITUI*

nuo 2⁹⁹

1⁹⁹



IBUPROFEN LANNACHER 400 mg pėlele dengtos tabletės, 10 tablečių

Vienoje pėlele dengtoje tabletėje yra 400 mg ibuprofeno.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Indikacijos: „Ibuprofen Lannacher“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos ibuprofeno. Ibuprofenas malšina uždegimo sukeltą skausmą, patinimą ir karščiavimą, vartojamas trumpą laiką silpno ar vidutinio stiprumo skausmui, tokiame kaip mėnesinių, galvos, dantų, raumenų, sąnarių, malšinti. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** tabletės reikia nuryti valgio metu arba pavaldžiu, užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: 0,5–1 pėlele dengtą tabletę 3 kartus per parą. Negalima viršyti didžiausios paros dozės 1200 mg ibuprofeno (3 pėlele dengtų tablečių). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofeniui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijų, vartojant kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo, acetalisalicilo rūgšties darinius. Sunkūs kepenų, inkstų ar širdies funkcijos nepakankamumas. Paskutinių trijų nėštumo mėnesių laikotarpis. Pėsinė opa. Kraujavimas iš smegenų, virškinimo trakto arba kt. Sisteminė raudonoji vilkligė. Jaunesni nei 12 m. vaikai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atargiai skirti pacientams, sergantiems širdies ir kraujagyslių, smegenų kraujagyslių ligomis, cukriniu diabetu ir jungiamųjų audinio ligomis, senyviems pacientams. Pacientams, sergantiems bronchine astma ar alerginėmis ligomis, gali išsivystyti bronchų spazmas. Virškinimo trakto sutrikimai ir lėtinis uždegiminis žarnyno ligos gali paūmėti. Atsiradus virškinimo trakto kraujavimui ar išopėjimui, gydymas turi būti nedelsiant nutrauktas. Vartojimas gali mažinti moters vaisiungumą. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Pakuotė:** 10 pėlele dengtų tablečių. **Farmakoterapinė grupė:** nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo. **ATC kodas:** M01AE01. **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:** „Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.“, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. **Paskutinė teksto peržiūros data:** 2021-04-22.

NUSIMESK SKAUSMO KAUKĘ!

ODAI



INO BIO HERBA BALM

šildantis kūno balzamas su eteriniais aliejais, 40 ml

pušis • eukaliptas • čiobrelis • arbatmedis • kamparo

Kūno balzmas tepamas ant krūtinės, nugaros bei padų turi efektyvų poveikį odai. Jis švelniai maitina odą dėl jame esančio sviesto medžio aliejaus ir Vit E. Puikiai tinka vaikų odos priežiūrai.

3⁹⁹

4⁹⁹

4⁹⁹



PANANGIN 158mg/140mg, 50 dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

PANANGIN. Kiekvienoje pėlele dengtoje tabletėje yra 158 mg kalio aspartato ir 140 mg magnio aspartato. Pakuotėje yra 50 tab. PANANGIN yra mineralų preparatas, kurio sudėtyje esantys kalis ir magnis yra svarbūs vidiniai ląstelių kationai. Jie reikšmingi daugelio fermentų veiklai, makromolekulių jungimuisi prie ląstelių elementų, raumenų ląstelių susitraukimui. **Indikacijos.** PANANGIN vartojamas magnio ir kalio trūkumo profilaktikai tuo atveju, jei šių jonų pasisavinama per maistą arba pernelyg daug netenka. **Vartojimas.** Paprastai skiriama po 2–3 tabletes 3 kartus per parą. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, ūminis ir lėtinis inkstų nepakankamumas, Addisono liga, hiperkalemija, kalį sulaukančių diuretikų vartojimas, atrioventrikulinė III laipsnio blokada, kardiogeninis šokas (kraujospūdis mažesnis negu 90 mm Hg). **Specialūs įspėjimai.** Pacientams, sergantiems ligomis, dėl kurių kraujyje padidėja kalio, preparato būtina skirti atargiai ir reguliariai kontroliuoti jonų koncentraciją kraujyje. **Galimas šalutinis poveikis.** Dažniausiai vaisto vartojimas nesukelia problemų. Vartojant didesnes dozes, gali padidėti tuštinimasis. Pradome įdomiai perskaityti pakutes lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. **Rinkodaros teisės turėtojas:** Gedeon Richter Plc. Vengrija. **Teksto peržiūros data:** PANANGIN tab.2017-11-03. Reklamos paruošimo data 2021-02-16

PANANGIN- PASIRŪPINK SAVO ŠIRDIMI

Dolmen®

deksketoprofeno trometamolis

GREITAI MALŠINA
SKAUSMĄ,
KAI TO LABIAUSIAI REIKIA!



Geriamas
iš pakėtelio

**BERLIN-CHEMIE
MENARINI**

UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIK“
Jasinskio g. 16a, Vilnius LT-03163
Tel. +370 5 269 19 47
LT@berlin-chemie.com



SKAUSMINGŲ MĖNESINIŲ, RAUMENŲ IR KAULŲ, DANTŲ SKAUSMO MALŠINIMAS

Dolmen. **Nereceptinis vaistas. Veiklioji medžiaga.** Deksketoprofeno trometamolis (dexketoprofenum). Vienoje plevėle dengtoje tabletėje / granulių geriamajam tirpalui paketelyje / geriamojo tirpalo paketelyje yra 25 mg deksketoprofeno. **Vaisto forma.** Plevėle dengtos tabletės / granulės geriamajam tirpalui / geriamasis tirpalas paketelyje. **Pakuotė.** Po 10 tablečių / po 10 paketėlių granulių / po 10 geriamųjų tirpalų paketelyje. **Indikacijos.** Dolmen vartojamas trumpalaikiam simptominiams lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų, sąnarių ir kaulų skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorejos), dantų skausmui malšinti. **Dozavimas.** Atsižvelgiant į skausmo priežastis ir intensyvumą, rekomenduojama gerti: po 1 tabletę / paketėlį / geriamąjį tirpalą paketelyje 1–3 kartus per parą kas 8 valandas. Didžiausia paros dozė neturi būti didesnė kaip 3 tabletės / paketėliai / geriamieji tirpalai paketelyje. Jei esate senyvo amžiaus ar sergate inkstų, kepenų ligomis, pradėkite vartoti ne daugiau kaip 2 tabletes / paketėlius / geriamuosius tirpalus paketelyje per parą. **Vartojimo būdas.** Jei vartojate granules, visą paketėlį turinį ištirpinkite stiklinėje vandens, suplakite. Išgerkite nedelsiant. Geriamasis tirpalas paketelyje gali būti geriamas tiesiai iš paketėlio. Jeigu jaučiate intensyvų skausmą ir reikia jį greičiau nuslopinti, vaistą vartokite prieš valgymą (ne vėliau kaip prieš 15–30 min.). Poveikis prasideda po 30 min. pavartojus vaisto. Skausmą malšinantis poveikis trunka 4–6 valandas. Šio vaisto neturėtų vartoti vaikai ir paaugliai (jaunesni kaip 18 metų). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas deksketoprofenui, kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aspirinui; vartojant ketoprofeno ar fi bratų buvę fotoalerginės ar fototoksinės reakcijos; pepsinė opa, buvęs kraujavimas iš virškinamojo trakto, lėtiniai virškinimo sutrikimai bei lėtinės virškinamojo trakto ligos; sunkus širdies nepakankamumas, vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų funkcijos, sunkus kepenų veiklos sutrikimas; esant sunkiai dehidratacijai; nėštumas bei žindymo laikotarpis. **Išėjimai.** Vaistą atsargiai turi vartoti vyresnio amžiaus ligoniniai, sergantieji alergija, astma, širdies, inkstų, kepenų ligomis, hipertenzija, sisteminė raudonąja vilklige, cukriniu diabetu, įvairiomis jungiamojo audinio ligomis, sutrikus kraujodarai; vartojant šlapimo išsiskyrimą skatinančius vaistus ar netekus daug skysčių. Pasitarkite su gydytoju jei vartojate kitų vaistų: geriamųjų steroidinių, nuo depresijos, apsaugančių nuo kraujo krešumo. Dolmen geriamojo tirpalo paketelyje ir granulių geriamajam tirpalui paketelyje yra sacharozė, todėl jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti Dolmen granules geriamajam tirpalui ar geriamąjį tirpalą paketelyje. Į tai turėtų atsižvelgti pacientai, sergantys cukriniu diabetu. Deksketoprofenas gali paslėpti tokių infekcijų požymius kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl gali būti, kad vartojant šį vaistą gali būti vėluojama pradėti tinkamą gydymą, o dėl to gali padidėti komplikacijų rizika.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojiui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt

Reklama paruošta: 2021 m. birželio mėn.

LT_Dol_10_2021_V1_press

Flavamed®

Ambroksolio hidrochloridas

Sprendimas šlapio kosulio gydymui

- Vartojamas sergant ūmiomis ar lėtinėmis plaučių ir bronchų ligomis, kai kosulio metu susidaro klampios gleivės.
- Suskystina klampias gleives ir jos gali lengviau kosulio metu pašalinti.
- Aviečių skonio.



Nereceptinis vaistas. Flavamed 30 mg/5 ml geriamasis tirpalas. Kiekviename matavimo šaukšte su 5 ml geriamojo tirpalo yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido. **Flavamed 15 mg/5 ml geriamasis tirpalas.** Kiekviename matavimo šaukšte su 5 ml geriamojo tirpalo yra 15 mg ambroksolio hidrochlorido. **Terapinės indikacijos.** Flavamed vartojamas sergant plaučių ir bronchų ligomis, kai susidaro klampios gleivės. Suskystina klampias gleives ir jos gali lengviau pašalinti. **Vartojimo būdas.** Geriamasis tirpalas vartojamas po valgio naudojant matavimo šaukštą. 6–12 metų vaikams po 15 mg ambroksolio hidrochlorido 2–3 kartus per parą, 2–5 metų vaikams po 7,5 mg 3 kartus per parą. Be gydytojo nurodymo ilgiau kaip 4–5 dienas Flavamed vartoti negalima. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams po 30 mg 3 kartus per parą pirmąsias 2 ar 3 dienas; vėliau — po 30 mg 2 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Flavamed 30mg/5ml ir 15 mg/5ml geriamojo tirpalo negalima vartoti vaikams iki 2 metų. **Specialūs įspėjimai.** Atsargiai reikėtų vartoti pacientams sutrikus bronchų epitelio motorikai ir esant gausiai sekrecijai; sutrikus inkstų funkcijai arba sergant sunkia kepenų liga; praėjusio buvus pepsinės opų; esant histamino netoleravimui. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Flavamed šnypščiasis tabletes, jeigu jums praėjusio pasitaikė labai sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų (Stivenso-Džonsono sindromas ir Lajelio sindromas). Kiekviename šio vaisto matavimo šaukšte (5 ml geriamojo tirpalo) yra 1,75 g sorbitolio. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad Jūs (ar Jūsų vaikas) netoleruojate kokių nors angliavandenių arba Jums (ar Jūsų vaikui) nustatytas retas genetinis sutrikimas įgimtas fruktozės netoleravimas (IFN), kurio atveju organizmas negali suskaidyti fruktozės, prieš vartodami šio vaisto (ar prieš duodami jo Jūsų vaikui), pasakykite gydytojui. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurių laisvinantį poveikį. Kiekviename šio vaisto – matavimo šaukšte (5 ml geriamojo tirpalo) yra 5,75 g benzenkarboksirūgšties.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie LR SAM el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, nurodytais jos interneto svetainėje www.vvkt.lt

NUO SLOGOS



OTRIVIN

OTRIVIN MENTHOL, 1 mg/ml nosies purškalo (tirpalas), 10 ml **4⁹⁹ €**
 OTRIVIN 1 mg/ml nosies purškalo (tirpalas), 10 ml **4⁹⁹ €**
 OTRIVIN 0,5 mg/ml nosies lašai (tirpalas), 10 ml **3⁴⁹ €**
 OTRIVIN 1 mg/ml nosies lašai (tirpalas), 10 ml **3⁴⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Kilometazolino hidrochloridas. **Indikacijos.** Nosies gleivinės paburkimo mažinimas, sergant sinusitu, šienlige ar kitokia alergine sloga. Nosies gleivinės paburkimo mažinimas, gydant vidurines ausies uždegimą. Nosies ertmės apibūtos atlikimo lengvinimas. **Vartojimas.** Otrivin 0,5 mg/ml nosies lašai. 2–5 m. vaikai: po 1–2 lašus į kiekvieną nosies landą 1–2 k/parą (kas 8–10 val.). 6–11 m. vaikai: po 2–3 lašus į kiekvieną nosies landą 2–3 k/parą, kai reikia. Otrivin 1 mg/ml nosies lašai. Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: po 2–3 lašus į kiekvieną nosies landą, kai reikia. Otrivin Menthol 1 mg/ml nosies purškalo: Otrivin 1 mg/ml nosies purškalo. Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: po 1 purškimo į kiekvieną nosies landą, kai reikia. Negalima lašinti/puršksti daugiau kaip 3 dozių per parą į kiekvieną nosies landą. **Kontraindikacijos.** Alergija ksilometazolinui arba bet kuriai pagalbine medžiaga, pacientams, kuriems neseniai buvo atlikta operacija per nosį, sergantiems uždarą kampo glaukoma (padidėjęs spaudimas akyje), lėtinio nosies uždegimo (sausųjų nosies gleivinės uždegimo arba atrofinio rinito). **Specialūs įspėjimai.** Negalima vartoti ilgiau kaip 7 d. iš eilės. Negalima viršyti rekomenduojamų dozių, ypač vaikams ir pagyvenusiems žmonėms. Atsargiai vartoti, jeigu yra padidėjęs kraujospūdis, širdies liga (pvz., paliejusio QT intervalo sindromas), cukrinis diabetas, padidėjęs skydlaukės aktyvumas, padidėjusi prostata, gerybinis antinksnių audys, jeigu vartojate arba per pastūlins 2 sav. vartojate vaistų nuo depresijos ar Parkinsono ligos, vadinamų MAOI. Pradome žemiau perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Nedideliam vartojamam vaistui gali pakenkti žvėrių sveikatai. Jei simptomai nepažeidžia ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujama@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Teksto parengimo data 2020 m. rugpjūčio 28 d. NP-LT-OTR-20-00001

nuo **3⁴⁹**



MIRAMILE

MIRAMILE KIDS, burnos ir gerklės sirupas, 100 ml
 MIRAMILE TONSIL, burnos ir gerklės purškalo, 30 ml
 MEDICINOS PRIEMONĖS

MIRAMILE, 12 kietųjų pastilių MAISTO PAPILDAS

„Miramile kids“ burnos ir gerklės sirupas vaikams malšina gerklės skausmą, palengvina kosulį. Sudėtyje yra gerklės ir kosuliui naudingų augalų ekstraktų: čiobrelių, sausųjų šėvamedžių, svilvaržių, juodųjų serbentų. Tinka vartoti vaikams nuo 1 metų. „Miramile Tonsil“ šaltalankių aliejus, miramedžių aliejus, medetkų aliejus, apelsininių citrinmedžių aliejus, karčiųjų migdolų aliejus, čiobrelių eterinis aliejus, pipirmėčių eterinis aliejus. Padės skaudančiai burnai ar gerklei, užkimus, mažinti uždegimo simptomus. Šis burnos ir gerklės purškalo tinka ir vaikams nuo 2 metų. „Miramile“ augalines pastiles gerklei, kvėpavimo takams ir imunitetui: sviaržės, mėtų, eukaliptų turi malonų poveikį burnos, gerklės ir ryklės gleivinei bei balso stygomis. Išsėdines kerpenos ir mentolis padeda palaikyti kvėpavimo takų veiklą. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vartojimas: rekomenduojama suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų 3–6 kartus per dieną po 1 pastilę laikyti burnoje, kol ištirps.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

iki **-25%**



EMILI ASKORBO RŪGŠTIS 50 mg (vitaminas C), 200 dražė

MAISTO PAPILDAS SU CUKRUMI

Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės, nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargę, apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

-30% **1⁴⁶**



IMMUNOHOT, 6 pakeliai

POWER C 1000MG, 10 pakelių

BIOVITAMIN C + ZN, 14 pakelių

BIOVITAMINAS D3, 20 pakelių

MAISTO PAPILDAS

Cinkas, vitaminas C ir vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Produktų sudėtyje nėra konservantų, stabilizatorių ar dažiklių. Pagaminta Izraelyje.

„Power C“ – vitaminas C miltelių pavidalu! 1 pakelyje net 1000 mg vitamino C! Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. „IMMUNOHOT“ – karštas imbierinis gėrimas su 7 aktyviomis medžiagomis imunitetui ir kvėpavimo takams! Miltelių sudėtyje – imbierių šaknų, vaistinių čiobrelių, ežiuolių, liepų žiedų, aviečių uogų ekstraktai, taip pat džiūvintų malpigių (acerola) ekstraktas (iš jų – natūralus vitaminas C), grynas cinko citratas. „bioVitamin C + Zn“ – VITAMINAS C ir CINKAS – vitaminas C išgautas iš laukinių vyšnių – kraštutųjų malpigių, papildytas cinko citratu!

„bioVitaminas D3“ – vitaminas D miltelių pavidalu. Vitaminas D svarbus kalcio ir fosforo įsisavinimui, normaliai imuninės sistemos veiklai, kaulų ir dantų būklei palaikyti. Pakelyje – net 3000 TV vitamino D3!

GLINGAM IMUNITETUI!

Perkant pakuotę antra tokia pati DOVANŲ!



LARINGOSPRAY, 20ml Purškalo skaudančiai gerklei.

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Laringospray“ naudojamas burnos ertmės ir ryklės gleivinės sudirginimui palengvinti uždegimo atvejais ar po atitiktų įvairių procedūrų. Propolis, kurio yra šios medicinos priemonės sudėtyje, yra vienas iš bitininkystės produktų, kuris medicinoje dažniausiai naudojamas kaip priemonė, pasižyminti priešmikrobinu, priešgrybeliniu ar priešvirusiniu veikimu. Priemonė padengia gleivinės paviršių ir tokiu būdu sulauko mikroorganizmų patekimą bei augimą, padeda palaikyti palankią mikroterapą, apsaugo nuo sudirginimų ir sudaro reikalingas sąlygas gleivinės atsinaujinimui, kad ji galėtų geriau atlikti savo funkcijas. Veikliosios medžiagos: propolio tirpalas etilo alkoholyje, medetkų žiedų tinktūra.

Perkant pakuotę antra tokia pati DOVANŲ!

1+1

SINUNORM DUO, 15 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Kapsulių „Sinunorm Duo“ sudėtyje yra sausųjų augalų ekstraktų. Vaistiniai čiobreliai, pavasarinės raktazolės ir paprastosios pušys padeda palaikyti kvėpavimo takų funkciją. Juoduogių šėvamedžiai, cinkas kartu su pilkųjų malpigių ekstrakto esančiu vitaminu C padeda palaikyti imuninę sistemą. Rekomenduojama „Sinunorm Duo“ paros dozė suaugusiems – 2 kapsulės, vaikams nuo 12 m. – 1 kapsulė.

KVĖPUOK LENGVAI, KVĖPUOK GLIAI!

-25% **5⁰⁹**



PAIRA ALTAI MUMIO, 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

2 tabletės yra 400 mg išvalyto mumijaus. **Vartojimas:** suaugusiems rekomenduojama vartoti po 1 tabletę 2 kartus per dieną, valgio metu.

PIGU **3⁵⁹**

IMUNITETUI



VITAMINAS D₃, 40 µg, 80 kapsulių **9⁴⁹ 5⁸¹ €**

VITAMINAS C, 500 mg, apelsinų skonio, 40 kramtomųjų tablečių **7⁹⁹ 4⁷⁹ €**

OMEGA 3 PLUS RESVERATROLIS, KOFEFERMENTAS Q10, 60 kapsulių **16⁴⁹ 9⁶⁵ €**

RYKLIŲ TAUKAI, 30 kapsulių **11⁴⁹ 6⁸⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

daugiau informacijos apie produktus www.gamtosnamai.lt

-40%

PERŠALUS



COLDREX

COLDREX, 500 mg/25 mg/5 mg/20 mg/30 mg, 12 tablečių 4⁴⁹ €
COLDREX, 500 mg/25 mg/5 mg/20 mg/30 mg, 24 tablečių 7⁴⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Kiekvienoje tablete yra 500 mg paracetamolio, 25 mg kofeino, 5 mg fenilefrino hidroklorido, 20 mg terpinhidrato, 20 mg askorbo rūgšties.

Terapinės indikacijos. Peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas.

Vartojimo būdas. Dozavimas. Suaugusiems (įskaitant senyvo amžiaus) ir 16 metų bei vyresniems paaugliams, kurių svoris didesnis nei 54 kg, gerti po 2 tabletes kas 4-6 val. Didžiausia paros dozė yra 8 tabletės per 24 valandas. 12-16 metų paaugliams, kurių kūno svoris 40-54 kg, po 1 tabletę kas 4-6 valandas. Negalima viršyti nurodytos dozės. Vartokite tabletes užsigerdami vandeniu.

Specialūs įspėjimai. Nevartokite kartu jokių kitų vaistų nuo kosulio ar peršalimo, gripo, nosies gleivinės paburkimo ar užgulios nosies. Per didelės paracetamolio dozės gali sukelti sunkių kepenų pažeidimą. Vaisto vartojimo metu nevartokite alkoholinių gėrimų, kitų produktų, kuriuose yra kofeino. Pastarąsias su gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, jeigu: padidėjusi prostatos arba jūms sunki šlapintis; sergate kraujagyslių ligą, vadinamą Raynaud; sergate inkstų ligą, yra lėtinis mišrios nepakankamumas; reguliariai vartojate alkoholi; sergate žilberio sindromą; vartojate kitų vaistų, kurie keičia kepenų funkciją; jūms trūksta fermento gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės; sergate hemolizine anemija; yra dehidratuoti; esate senyvo amžiaus; suaugęs ar vyresnis nei 16 metų paauglys, kurio kūno svoris mažesnis nei 54 kg; yra šlapimo susilaikymas ar šlapimo takų akmenys; sergate astma arba jūms yra padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, pasireiškiantis bronchų spazmu; sergate sunkia infekcine liga, nes gali padidėti metabolinės acidozės rizika.

Kontraindikacijos. Vaisto arčiau negalima vartoti, yra alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; padidėjęs kraujospaudimas; padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje; sergate cukriniu diabetu; širdies liga, uždarą kampo glaukomą, feochromocitomą, kepenų ar sunki inkstų liga, esate nėščia ar žindote kūdikį, vartojate vaistų, mažinančių nosies paburkimą, slopinančių apetitą, vaistų nuo peršalimo ar apetitą didinančių vaistų, vartojate tokius vaistus depresijai gydyti kaip trichiklus antidepressantus, betablockatorius arba monoaminooksidazės inhibitorius (MAOI) bei dvi savaites po MAOI vartojimo, jaunesniems kaip 12 metų vaikams ar 12 metų ir vyresniems vaikams ir paaugliams, kurių kūno svoris yra mažesnis nei 43 kg.

Reklamos teksto parengimo data: 2020-10-16.



COLDREX HOTREM

COLDREX HOTREM LEMON 750 mg/10 mg/60 mg milteliai geriamajam tirpalui, N5 3⁹⁹ €
COLDREX HOTREM LEMON 750 mg/10 mg/60 mg milteliai geriamajam tirpalui, N10 6⁹⁹ €
COLDREX HOTREM HONEY & LEMON 750 mg/10 mg/60 mg milteliai geriamajam tirpalui, N10 6⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Terapinės indikacijos. Trumpalaikis peršalimo ir gripo simptomų (karščiavimo, slogos ir skausmo) lengvinimas.

Vartojimo būdas. Dozavimas. Suaugusiems (įskaitant senyvo amžiaus) ir 16 metų bei vyresniems paaugliams, kurių svoris didesnis nei 54 kg, rekomenduojama dozė yra 1 paketėlis kas 4-6 valandas. Negalima viršyti nurodytos dozės. Suberti vieno paketėlio turinį į stiklinę ar puodelį, pripilti karšto vandens ir gerai išmaišyti. Jei reikia, įpilti šilto vandens. **Specialūs įspėjimai.** Nevartokite kartu jokių kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio, ar vaistų nuo kosulio ar peršalimo, gripo ir nosies gleivinės paburkimo ar užgulios nosies. Per didelės paracetamolio dozės gali sukelti sunkių kepenų pažeidimą. Pastarąsias su gydytoju, prieš pradėdami vartoti jeigu: padidėjusi prostatos arba jūms sunki šlapintis; sergate kraujagyslių ligą, vadinamą Raynaud fenomenu, inkstų ligą, žilberio sindromą, hemolizine anemija, sunkia infekcine liga, nes gali padidėti metabolinės acidozės rizika, astma arba jūms yra padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, pasireiškiantis bronchų spazmu; yra lėtinis mišrios nepakankamumas; reguliariai vartojate alkoholi; vartojate kitų vaistų, kurie keičia kepenų funkciją; jūms trūksta fermento gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės; yra dehidratuoti; esate senyvo amžiaus; suaugęs ar paauglys, kurio kūno svoris mažesnis nei 54 kg; yra šlapimo susilaikymas ar šlapimo takų akmenys.

Kontraindikacijos. Vaisto arčiau negalima vartoti, yra alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; padidėjęs kraujospaudimas; padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje; sergate cukriniu diabetu, širdies liga, uždarą kampo glaukomą, feochromocitomą, kepenų ar sunki inkstų liga, esate nėščia ar žindote kūdikį, vartojate vaistų, mažinančių nosies paburkimą, slopinančių apetitą, vaistų nuo peršalimo ar apetitą didinančių vaistų, vartojate tokius vaistus depresijai gydyti kaip trichiklus antidepressantus, betablockatorius arba monoaminooksidazės inhibitorius (MAOI) bei dvi savaites po MAOI vartojimo; jaunesniems kaip 16 metų vaikams ir paaugliams. Reklamos teksto parengimo data 2020-10-16

STIPRESNIS NEI PERŠALIMAS IR GRIPAS!



SLOGUOJANT

BE KONSERVANTŲ



RHINOLAYA

MEDICINOS PRIEMONĖS

Himalajų druskos purškalas jūms ir jūsių kūdikiui

Vienintelis Himalajų druskos nosies purškalas.

- Natūraliai išvalo, drėkina ir padeda atkurti užburkusią nosį
- Tinka šalčio, vėjo ir alergijų (namų dulkių, oro taršos, gyvūnų plaukų, žiedadulkių) pažeistoms nosies gleivinėms
- Nedirgina ir nesusausina nosies gleivinės
- Skausmingas
- Pasirūpinti greitu veikimu

RHINOLAYA nosies purškalas yra kelių rūšių:

RHINOLAYA PROTECT izotonis, 50 ml – alergijų pažeistai nosies gleivinei

RHINOLAYA izotoninis, 100 ml – kasdieninei nosies priežiūrai, išsaugojusiai nosies gleivinę

RHINOLAYA FORT hipertonišnis, 50 ml – sloguojant, peršalus, sinusito metu

RHINOLAYA KIDS izotoninis, 50 ml – užburkusiai ir išssausėjusiai kūdikiui nosies gleivinei

RHINOLAYA – IŠ HIMALAJŲ GELMIŲ PRIEŠ ALERGIJĄ IR SLOGĄ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



PERŠALUS



ACTIFED®

ACTIFED® 60 mg/2,5 mg/1,25 mg/5 ml sirupas, 100 ml

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 tabletė yra 60 mg pseudoefedrinio hidroklorido ir 2,5 mg triprolidino hidroklorido / 5 ml sirupo yra 30 mg pseudoefedrinio hidroklorido ir 1,25 mg triprolidino hidroklorido. **Indikacijos:** nosies ir viršutinio kepenų takų gleivinės užburkimo (užgulimo) peršalus mašinimas. Nosies tekėjimo ir čiaudulio slopinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: po 1 tabletę arba po 10 ml sirupo kas 4-6 val. iki 4 kartų per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Pacientai, kurie vartoja ar per pastarąsias 14 dienų vartoję monoaminooksidazės inhibitorius: halucinacijas, neramumas, miego sutrikimai, karščiavimas ir išplitusi raudona su smulkiais pilinėliais, staiga netekus regos arba sumažėjus regos aštrumo, staigus pilvo skausmas, kraujavimas iš išangės ar kiti išeminio kolito simptomai. Pacientai, sergantys kepenų liga, vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimu, ACTIFED® turėtų vartoti atsargiai. Vaistas negali būti vartojamas vaikams raminti. ACTIFED® tablečių sudėtyje yra laktozės – jeigu gydytojas jūms yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. ACTIFED® sirupo sudėtyje yra saulėlydžio tonojono (gali sukelti alerginių reakcijų), metilo parahidrosibenzoato (gali sukelti alerginių reakcijų, kurios gali būti uždelstos), sacharozės (jeigu gydytojas jūms yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Būtina atsivėgti cukriniiu diabetu sergantiems pacientams). Teksto peržiūros data: 2021.08.17. LT-MU-2100002.

GREITAS PALENGVĖJIMAS PERŠALUS.



NUO PERŠALIMO



DALERON GOLD3

DALERON GOLD3, 12 pėvelė dengtos tabletės 4⁴⁹ €
DALERON GOLD3, 24 pėvelė dengtos tabletės 7⁴⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Vienoje pėvelė dengtoje tablete yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrinio hidroklorido ir 15 mg dekstrometorforo hidrobromido. **Terapinės indikacijos:** peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, sąnarių, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** įprasta dozė suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vaikams yra 2 tabletės. Tokią dozę galima gerti daugiausia 4 kartus per parą. Tarp dozių vartojimo turi būti praėjusi mažiausiai 4 valandos. Didžiausia paros dozė yra 8 tabletės. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms: paracetamolui, pseudoefedrinio hidroklorido, dekstrometorforo hidrobromido. Sunki hipertenzija, sunki išeminė širdies liga (krūtinės angina). Vartojama kitų vaistinių preparatų, kuriuose yra paracetamolio. Pacientas yra jaunesnis kaip 12 metų. Sunkus kepenų arba inkstų funkcijos sutrikimas. Glaukoma.

PRADEDA VEIKTI JAU PER 20 MINUČIŲ!



SKAUDANČIAI GERKLEI



POLOVOX 8,75 mg/15 ml tirpalas


NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: Vienoje dozėje (3 išpurškimose) yra 8,75 mg flurbiprofeno. **Indikacijos:** skaudančios gerklės simptomų, tokių kaip gerklės skausmas, skausmingumas, sunkumas nuryti ir patinimas, trumpalaikiam malšinimui 18 metų ir vyresniems suaugusiems. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems nuo 18 metų ir vyresni: viena dozė (3 išpurškimai) į gerklę kas 3-6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 dozių per 24 valandas. Per įpurškimą neįkvėpti. Polovox skirtas vartoti tik trumpą laiką. **Kontraindikacijos.** Polovox vartoti negalima pacientams, kuriems: yra alergija (padidėjęs jautrumas) flurbiprofenui, ar kitoms nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aspirinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; anksčiau buvo pasireiškę alerginės reakcijos, pavojus nesteroidinių vaistų nuo uždegimo ar aspirino; yra arba buvo du ar daugiau skrandžio arba kraujavimo arba žarnų opų atvejų; anksčiau po nesteroidinių vaistų nuo uždegimo vartojimo pasireiškė kraujo krešėjimo arba kraujavimo sutrikimai; jeigu yra sunkių širdies, inkstų ar kepenų sutrikimų; paskutiniai 3 nėštumo mėnesiai. Šio vaisto negalima vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vartojant mažiausią veiksmingą vaistinio preparato dozę trumpiausią simptomų kontrolę būtina laikyti, galima sumažinti nepageidaujamus poveikius. Pasitarus su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Polovox jeigu jau yra vartojamas bet kuris kitas nesteroidinis vaistas nuo uždegimo ar aspirinas; jei yra bakterinis tonzilitas; jeigu pacientas servyo amžiaus; jeigu pacientas serga arba sirgo astma; sisteminė raudonagija; jeigu pacientas jungiamojo audinio liga; hipertenzija; žarnyno ligomis (opinis kolitas, Krono liga); jeigu yra širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų; pacientė neščia pirmuosius 6 mėnesius arba maitina krūtimi. Reklamos teksto parengimo data- 2020 m. 07 mėn.



ASKORUTINAS

Maisto papildas 50 tablečių



ASKORUTINAS, 50 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Tai askorbo rūgšties (vit. C) ir rutino preparatas. Askorbo rūgšties yra viena iš svarbiausių medžiagų, reikalingų normaliai žmogaus organizmo veiklai. Ji padeda palaikyti: normalią energijos apykaitą, normalią nervų sistemos veiklą, normalią imuninės sistemos veiklą, intensyviausią fizinio krūvio metu ir po jo; padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, gerina gėles absorbciją. Siurbtu jūrai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vartojimas: gerti po 1 tabletę 2 kartus per dieną valgant arba po valgio. Gamintojas – Marbiofarm, Rusija.



PREPARATAMS IMUNITETUI IR PERŠALIMUI

iki
-30%



Pasiūlymai galioja **2021 11 01 - 2021 11 30**, perkant vaistinėje, pateikus PC NORFA kortelę. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą. Prekių kiekis ribotas. UAB „Norfos vaistinė“ pasilieka teisę bet kada keisti akcijos sąlygas. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.



IMUNITETUI, KAULAMS, RAUMENIMS, SVEIKOMS LĄSTELĖMS



OILESEN D3

MAISTO PAPILDAS

„Oileesen D3“ – tai reikiamas vitamino D kiekis, išsirtintas natūraliame aliejuje.

„Oileesen D3 400“ – vitaminas D su alyvuogių aliejumi kūdikiams ir mažiems vaikams. Paprasta dozavoti pipete.

„Oileesen D3 Forte“ 1 kapsulėje yra net 4000 TV vitamino D3 ir kanapių aliejaus, kuris padeda palaikyti normalią imuninę sistemą ir raumenų funkciją.

Naujiena! „Oileesen D3 su juodųjų ąkų aliejumi“ – 4000TV vitamino D ir juodųjų ąkų aliejaus nauda gerai savių jautai.

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų būklę, normalią raumenų funkciją. Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.

DAUGIAU SAULĖS SU „OILESEN D3“!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-25%



ARTILANE FORTE skystis,
15 vienadozių buteliukų **16⁹⁹ 11⁸⁹ €**

MAISTO PAPILDAS SU SALDIKILIAIS

Maisto papildas sudėtyje yra fermentais hidrolizuoto ypač gyno kolageno, gliukozamino ir chondroitino, hialurono rūgšties, magnio, cinko, pluoštinės bosvelijos (Boswellia serrata), antioksidantų: kofermento Q10, likopeno, kvercetino, vitamino C.

ARTILANE CLASSIC skystis,
15 vienadozių buteliukų **11⁹⁹ 8³⁹ €**

MAISTO PAPILDAS SU SALDIKILIU

Maisto papildas sudėtyje yra fermentais hidrolizuoto ypač gyno kolageno, hialurono rūgšties, magnio, cinko, antioksidantų: kofermento Q10, likopeno, kvercetino, vitamino C.

Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

-30%



BONCEL 5600 TV, 12 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Vartojimas: vartoti po 1 kapsulę per savaitę.

Vitaminas D₃ padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese, padeda palaikyti normalią raumenų funkciją bei kaulų būklę. Sudedamosios dalys: vitaminas D₃ (cholekaliferolis), saulėgrąžų aliejus, kapsulės apvalkalas: želatina, glicerolis, vanduo, raudonasis geležies oksidas (dažiklis) (E172), riboflavinas (E101(i)), titano dioksidas (dažiklis) (E171). Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Nutraukti vartojimą atsiradus jautrumui kuriai nors sudedamajai daliai. Laikymo sąlygos: laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikyti 15–25 °C temperatūroje. Saugoti nuo šviesos ir drėgmės.

KAULAMS IR SĄNARIAMS



SUPER CAL500 MAG250 ZINC15

SUPER CAL500 MAG250 ZINC15,
30 tablečių **8⁹⁹ 4⁸⁵ €**

SUPER CAL500 MAG250 ZINC15, 100 tablečių **14⁹⁹ 8⁵¹ €**

**GLUKOZAMINAS PLIUS KOLAGENAS,
CHONDROITINAS, MSM**, 60 tablečių **15⁹⁹ 9²³ €**

MAISTO PAPILDAS

daugiau informacijos apie produktus www.gamtosnamai.lt

-40%

Perkant pakuotę –
antra tokia pati
DOVANŲ!

1+1

GAMINAME VAISTUS PAGAL INDIVIDUALIUS RECEPTUS

- Atneškite gydytojo receptą iki 13 val. į bet kurią „Gintarinę vaistinę“.
- Atsiimkite pagamintą vaistą kitą darbo dieną.



VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS



NUO RĖMENS



1⁷⁹

MANTI, mėtų skonio kramtomosios tabletės, 8 tabletės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 kramtomosios tabletėje yra 200 mg aliuminio hidroksido, 200 mg magnio hidroksido ir 25 mg simetikonos. Indikacijos: padidėjusio skrandžio rūgštingumo simptomams gydyti, kai yra dispepsija, rėmuo, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa, gastroezofaginis ir duodenogastriinis refluksas, gastroenteritas, diafragmos stemplinės dalies išvarža. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems negu 12 m. vaikams gerti po 1–3 tabletes tarp valgių, prieš miegą ar atsiradus ligos simptomų. Per dieną galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. Prieš nuryjant tabletes reikia gerai sukramtyti. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, sunkus ar lėtinis inkstų funkcijos nepakankumumas, fenilketonurija, Alzheimerio liga, sisteminės skeleto ligos, jaunesni kaip 6 m. vaikai. Specialūs įspėjimai: nevartoti ilgiau kaip 2 savaites, jei gydymo nepasiekia kitais. Kartu nevartoti citrusinių vaisių. Nevartoti pacientams, kuriems yra fruktozės netoleravimas. Sudėtyje yra aspartamo ir sorbitolio. Reklamos teksto parengimo data 2015-11-26.

MANTI. GRAŽINA GYVENIMO SKONI.

NORMALIAM VIRŠKINIMUI, SKRANDŽIO RŪGŠTINGUMUI IR SVEIKOMS KEPENIMS



-20%

GASTROVAL

MAISTO PAPILDAI

NAUJENA! Išbandykite naują! Gastroval Fluxus – tai išmanus sprendimas skrandžio rūgštingumo pusiausvyrai su naujos formos salymedžiu - DGL, magniu, augalų sėklų ir šaknų ekstraktais, fermentais, bifido bei laktobakterijomis.

Gastroval Hepar Formula – nuo šiol naujoje rėkioje pakutėje! Padėkite kepenims su stiprios koncentracijos ciberžolės, margalių, juodųjų pipirų ir kitų augalinių ekstraktų formule kepenims, kuri padeda jas apsaugoti bei atstatyti kepenų ląsteles.

Gastroval ir Gastroval Forte – tai originalūs augalinių fermentų ir ekstraktų deriniai sveikam virškinimui.

Ūrągų sėklų ekstraktas padeda palaikyti normalią skrandžio rūgštinę terpę; gėlonasas gėlonasas tradiciniai vartojamas virškinimui palaikyti; dažinė ciberžolė padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinių pažeidimų.

GASTROVAL SUPRANTA KO REIKIA JŪSŲ VIRŠKINIMUI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



Perkant pakutę antra tokia pati DOVAN!

1+1

HEPASAN FORTE, 30 ir 60 kapsulių

MAISTO PAPILDAI

„Hepasan Forte“ sudėtyje yra cholino ir augalinių (tikrųjų margaičių sėklų, kiaušieninių sėklų, artišokų) ekstraktų. Cholinai padeda palaikyti normalią lipidų ir homocisteino apykaitą bei normalią kepenų funkciją.

Vartojimas: rekomenduojama vartoti po 1 kapsulę 2 kartus per dieną.

Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.



-25%

LINEX

LINEX® COMPLEX, 14 kapsulių ~~11⁸⁹~~ **8⁹² €**

LINEX® FORTE, 14 kapsulių ~~9⁹⁹~~ **6⁸⁹ €**

LINEX® BABY lašai, 8 ml ~~13²⁹~~ **9⁹⁷ €**

LINEX® KIDS milteliai geriamajai suspensijai, 10 paketėlių ~~9⁹⁹~~ **6⁸² €**

MAISTO PAPILDAI

Vienoje **LINEX® COMPLEX** kapsulėje yra 10 mlrd. geriausių iki šiol pasaulyje moksliškai ištyrtytų *Lactobacillus rhamnosus* GG bakterijų, taip pat – vitamino B1, B2, B6 ir cinko. Vienoje **LINEX® FORTE** kapsulėje yra 2 mlrd. gerai žinomų ir moksliškai ištyrtytų *Lactobacillus acidophilus*, *DSM 13241* ir *Bifidobacterium animalis* subsp. *lactis*, *DSM 15954* bakterijų. Vienoje **LINEX® KIDS** paketėlėje arba 6-uose **LINEX® BABY** lašuose yra 1 mlrd. *Bifidobacterium animalis* subsp. *lactis*, *DSM 15954* bakterijų. **Vartojimas:** **LINEX® COMPLEX** suaugusiems ir vyresniems nei 6 metų vaikams gerti po 1–2 kapsules per dieną. **LINEX® FORTE** suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų paaugliams gerti po 1 kapsulę 1–3 kartus per dieną; vaikams nuo 3 iki 12 metų – po 1 kapsulę 1–2 kartus per dieną. **LINEX® KIDS** kūdikiams ir vaikams iki 12 metų – po 1 paketėlį 1 kartą per dieną. **LINEX® BABY** naujagimiams, kūdikiams ir vaikams iki 12 metų – po 6 lašus vieną kartą per dieną. „Sandoz Pharmaceuticals d. d.“ filialas, Seimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius, Lietuva. BS2011050411. Reklamos teksto parengimo data: 2020 11 05.

KOKYBĖ, KURIA GALIMA PASITIKĖTI!



nuo **4⁹⁹**

MICROLAX® 625 mg/90 mg/9 mg/ml

tiesiosios žarnos tirpalas, N4 ~~4⁹⁹~~ €

MICROLAX® 625 mg/90 mg/9 mg/ml

tiesiosios žarnos tirpalas, N12 ~~13⁹⁹~~ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 ml tirpalo (15 lašų) yra 7,5 mg natrio pikosulfato, 90 mg natrio citrato ir 9 mg natrio laurilsulfato. **Indikacijos.** Trumpalaikis vidurių užkietėjimo ar būklį, reikalaujantį palengvinto ištuštinimo, gydymas. Žarnų ištuštinimas prieš diagnostines ar gydymo procedūras galinėje žarnyno dalyje. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusieji ir vyresni kaip 3 metų vaikai: **MICROLAX®** vienos tabletes turintis suleidžiamas į tiesiąją žarną. Jaunesni kaip 3 metų vaikai: **MICROLAX®** vienos tabletes turintis suleidžiamas į tiesiąją žarną, įkūsus į ją pusę antgalio. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai.** Pacientams, sergantiems hemoroidais, norint išvengti sužeidimo, vaistą reikia vartoti atsargiai. Venėti ilgalaikio naudojimo. Gali sukelti lokalią odos reakciją (pvz., kontaktinį dermatitą). Reklamos teksto parengimo data 2021 04 15. LT-MX-2100001



GERDOFF

MEDICINOS PRIEMONĖS

GerdoFF – unikalus, patentuotas formulės preparatai, skirti simptominiam gastroezofaginio refluksų gydymui.

Pasirūpinti greitai ir ilgalaikiu poveikiu. Veikia stemplėje ir skrandyje.

Vaikams nuo 6 metų ir suaugusiems.

GerdoFF preparatai – sukurti, patentuoti ir pagaminti Šveicarijoje.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-20%

VIRŠKINIMO SISTEMAI



nuo **4⁴⁹**

GUTTALAX

GUTTALAX, 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 15 ml ~~4⁴⁹~~ €

GUTTALAX, 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml ~~6⁹⁹~~ €

(Natrio pikosulfatas)

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 ml tirpalo (15 lašų) yra 7,5 mg natrio pikosulfato. **Indikacijos.** Trumpalaikis vidurių užkietėjimo mažinimas, tuštinimosi lengvinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Guttalax geriamas vakare. Suaugusiems ir vyresniems nei 10 metų vaikams: 10–20 lašų per parą. 4–10 metų vaikams: 5–10 lašų per parą. Vartoti per burną. Rekomenduojama gydymą pradėti mažiausia doze. Didžiausios rekomenduojamos paros dozės viršyti negalima. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; žarnų nepraeinamumas ar obstrukcija; stiprus pilvo skausmas ir (arba) karščiavimas dėl ūminės pilvo būklės (pvz., apendicito), galimai susijęs su pykinimu, vėmimu; ūminė uždegiminė žarnų liga; sunki dehidratacija; jaunesni kaip 4 metų vaikai; retos paveldimos būklės, kurios gali būti nesusuderinamos su preparato pagalbine medžiaga. **Specialūs įspėjimai.** Nenustatius vidurių užkietėjimo priežasties, negalima vartoti nepertraukiamai kasdien ar ilgiau. Guttalax pavartojus žmogui buvo galvos svaigimo ir (arba) sinkopės atvejų. Vaikams be gydytojo nurodymo Guttalax vartoti negalima. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas fruktozės netoleravimas. Teksto parengimo data: 2017 m. spalio mėn. Reklaminio teksto parengimo data: 11/2020. MAT-LT-2000335 V.1.0

UŽKIETĖJUS VIDURIAMS VEIKIA PATIKIMAI IR NIEKAM NEPASTEIBINT.



nuo **1⁹⁹**

SIMETIGAST FORTE 240 mg

kapsulės, 10 kapsulių **1⁹⁹ €**

SIMETIGAST FORTE 240 mg

kapsulės, 60 kapsulių **6⁹⁹ €**

SIMETIGAST FORTE BABY geriamieji lašai, 30 ml **4⁴⁹ €**

MEDICINOS PRIETAISAI

„SIMETIGAST FORTE“ 240 mg kapsulės (simetikonas) skirtos vartoti vyresniems nei 12 m. pacientams, esant pilvo pūtimui, pilnumo jausmui pilve, raugėjimui. Taip pat galima naudoti prieš pilvo ertmės diagnostines procedūras, nes tai pagerina vaizdų kokybę. Vartoti: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. amžiaus jaunuoliai – po 1 kapsulę 2–3 kartus per parą. Prieš diagnostines procedūras: 1 kapsulę vakare dieną prieš tyrimą ir 1 kapsulę ryte tyrimo dieną.

„SIMETIGAST FORTE BABY“ geriamieji lašai (simetikonas) skirti kūdikiams nuo 28-os gyvenimo dienos ir vaikams iki 12 metų. Vartoti: kūdikiams nuo 28-os gyvenimo dienos ir vaikams iki 2 metų 3 lašai prieš, per ar po kiekvieno valgio. Negalima vartoti daugiau kaip 18 lašų per dieną.

GREITOJI PAGALBA IŠPŪSTAM PILVUI.

SMEGENŲ IR NERVŲ SISTEMAI

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis.



-40%

AMBIO ATMINČIAI PLUS 30 tablečių + 30 kapsulių **24⁹⁹ 14⁹⁹ €**
AMBIO ATMINČIAI 30 tablečių **15⁹⁹ 9⁵⁹ €**
MAISTO PAPILDAS



PERSEN

PERSEN, 40 dengtų tablečių.

PERSEN FORTE, 20 kietųjų kapsulių.

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas. PERSEN tablečių yra 35 mg valerijonų šaknų sausosio alkoholinio ekstrakto, 17,5 mg melisų lapų sausosio ekstrakto, 17,5 mg pipirmėčių lapų sausosio ekstrakto. PERSEN FORTE kapsulėse yra 87,5 mg valerijonų šaknų sausosio alkoholinio ekstrakto, 17,5 mg melisų lapų sausosio ekstrakto, 17,5 mg pipirmėčių lapų sausosio ekstrakto. **Indikacijos.** Vartoti laikinus nedaugels nervinės įtampos mažinimui, pasunkėjusio užmigimo lengvinimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** PERSEN: Nervinės įtampos atveju reikia gerti po 3-4 PERSEN tab. 3 kartus per parą. Pasunkėjusio užmigimo atveju reikia gerti 3-4 PERSEN tab. 1 kartą per parą 1 val. prieš miegą. Tabletes reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai nuo valgyimo laiko. **PERSEN FORTE:** Nervinės įtampos mažinimui reikia gerti po 2 PERSEN FORTE kaps. 2 kartus per parą. Pasunkėjusio užmigimo atveju reikia gerti 2 PERSEN FORTE kaps. 1 kartą per parą 1 val. prieš miegą. Kapsules reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai nuo valgyimo laiko. PERSEN ir PERSEN FORTE pradeda veikti palaipsniui, kad gydymo veiksmingumas būtų optimalus, vaisto rekomenduojama gerti mažiausiai 14 dienų. Gydymo trukmė neribojama. PERSEN ir PERSEN FORTE nėra skirtas jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** PERSEN tablečių sudėtyje yra laktozės ir sacharozės. PERSEN FORTE kapsulių sudėtyje yra laktozės. Reklamos teksto parengimo data: 2020 m. gruodžio mėn. ID11822

PERSEN- NURAMINK SAVO RŪPESČIUS!

6¹⁵

NORMALIAI RAUMENŲ FUNKCIJAI, NORMALIAI NERVŲ SISTEMOS VEIKLAI



MAGVIT B COMPLEX, 20 paketėlių

MAISTO PAPILDAS

„Magvit B Complex“ sudėtyje yra 400 mg magnio ir 8 B grupės vitaminai. Magnis, vitaminai B₁, B₆, niacinas, pantoteno rūgštis, folio rūgštis ir B₁₂ padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Magnis, vitaminai B₁, B₆, niacinas ir biotinas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją. Vartojimas: suaugusiems ir vaikams nuo 12 m. – po 1 paketėlį per dieną. Granulės išberti ant liežuvio, leisti lengvai išsirti, nuryti.

ĮKRAUK PROTĄ IR KŪNĄ!

Perkant pakuotę – antra tokia pati DOVANŲ!

1+1

-30%

EMILI ARBATOS ŠIRDŽIAI JŪSŲ GERAI SAVIJAUTAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



BIOFARMACIJA

MAISTO PAPILDAS

Puikūs maisto papildai milteliais geriamajam tirpalui ruošti. Sudėtyje nėra konservantų, stabilizatorių, dažiklių. Magnis išgaunamas iš Nėgyvosios jūros. Magnis ir kalis reikalingi normaliai nervų sistemos veiklai ir raumenų funkcijai palaikyti. Kalis padeda palaikyti normalią kraujospūdį. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą, palaikyti normalią energijos apykaitą. Dauguma mineralų – citratų formos, tai organizmo lengvai pasisavinama ir gerai toleruojama forma. Pagaminta Izraelyje.

GAMTOS ĮKVEPTI MINERALAI MILTELIAIS IS ISRAELIO!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-30%

NERVŲ SISTEMAI



PIGU

1⁶⁹

GLICIN AKTIV, 50 tablečių

MAISTO PAPILDAS

2-3 tabletes yra: 190-285 mg glicino. Vartojimas: rekomenduojama vartoti po 1 tabletę 2-3 kartus per dieną.

-30%

NERVŲ SISTEMAI



MAGNIS + B₆, 30 tablečių 8⁹⁹ 5²¹ €

MAGNIS PLUS B₁₂ ir C, 21 paketėlis 14⁹⁹ 7⁰¹ €

B KOMPLEKSAS SU VITAMINU C, 30 kapsulių 8⁹⁹ 4⁸⁵ €

MAISTO PAPILDAS

daugiau informacijos apie produktus www.gamtosnamai.lt



AMBIO GUDOBELĖ SU ALYVMEDŽIU IR ČESNAKU, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

- Papildo organizmą augalinėmis medžiagomis: gudobelės, alyvmedžių lapų bei česnakų ekstraktais.
- Gudobelės padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą.

-40% 4⁷⁹

NORMALIAI GLIUKOZĖS KONCENTRACIJAI KRAUJYJE PALAIKYTI




MULBERRY™, 60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

„Mulberry“ skirtas normaliai gliukozės koncentracijai kraujyje palaikyti. Jis gaminamas iš standartizuoto baltųjų šilkmedžių lapų ekstrakto ir chromo. Šilkmedžių lapų ekstraktas padeda palaikyti normalią angliavandenių apykaitą organizme. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje.

TIKRAS CUKRAUS PRIEŠAS!

-30% 16⁰²



RIBOXIN 200 mg, 50 tablečių

MAISTO PAPILDAS

3 tabletės yra: 600 mg inozino (% RMV*) -**

4 tabletės yra: 800 mg inozino (% RMV*) -**

*RMV % – referencinė maistinė vertė procentais

**RMV nenustatyta

Vartojimas: gerti po 1 tabletę prieš valgį 3–4 kartus per parą. Vartojimo kursas – nuo 1 iki 3 mėn.

PIGU 2¹⁹



KALCIO GLIUKONATAS

500 mg, 10 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Kalcis svarbus normaliai raumenų veiklai, kaulų, dantų būklei palaikyti, svarbus normaliam kraujo krešėjimui.

PIGU 0²⁰



GINGIUM 120 MG, 20 plėvele dengtų tablečių 8⁷⁵ €

GINGIUM 120 MG, 60 plėvele dengtų tablečių 16⁵⁹ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje „Gingium“ tabletėje yra 120 mg dviskaidžio ginkmedžio lapų (*Ginkgo biloba* L., folium) ekstrakto. Indikacijos: „Gingium“ vartojamas vyresnio amžiaus žmonių lengvo ir vidutinio sunkumo smegenų kraujotakos nepakankamumo simptomams (susilpnėjusi atmintis ir dėmesio koncentracija, bloga nuotaika, spengimas ar ūžimas ausyse, sąvaigūs ar galvos skausmas), protarpiniam šlubavimui (jei yra II laipsnio periferinių arterijų užkimas pagal Fontaine) mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti po 1 tabletę 1–2 kartus per parą. Kontraindikacijos: vaisto vartoti negalima jeigu yra padidėjęs jautrumas dviskaidžio ginkmedžio lapų ekstraktui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, esant nėštumui. Specialūs įspėjimai: „Gingium“ yra neskirtas vartoti jaunesniems nei 18 metų žmonėms. Atsargiai vaistą reikia vartoti jei yra nustatytas priepuolinis sutrikimas, patologiskai padidėjęs polinkis į kraujavimą, taikant gydymą anti-koagulantais, jei depresinė būseną ir galvos skausmas nėra susijęs su šilpnaprotystės sindromu. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Seimyniškių g. 3A LT-09312 Vilnius, Lietuva. BS2011091728. Reklamos teksto parengimo data: 2020 11 09.

SVARBIŲ DALYKŲ NEGALIMA PAMIRŠTI!

nuo 8⁷⁵

ŠIRDŽIAI IR KRAUJAGYSLĖMS



GUDOBELIŲ TINKTŪRA VALENTIS

GUDOBELIŲ TINKTŪRA VALENTIS, geriamieji lašai (tirpalas), 80 ml 1⁵⁹ €

GUDOBELIŲ TINKTŪRA VALENTIS, geriamieji lašai (tirpalas), 25 ml 0⁹⁹ €

TRADICINIAI AUGALINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: gudobelių vaisių tinktūra, 1 ml/ml. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistas, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti. Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. Vartojimo būdas ir dozavimas: jeigu gydytojas nepaskyrė kitaip, suaugusiems žmonėms reikia gerti praskiedus vandeniu po 20–30 lašų 3–4 kartus per dieną. Kontraindikacijos: alergija erškėtinii šeimai augalams. Specialūs įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 m. asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip 4 savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 65 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data 2018-08-21.

GYDOMOJI VAISTAŽOLIŲ GALIA!

nuo 0⁹⁹

ŠIRDŽIAI, KRAUJAGYSLĖMS, NERVŲ SISTEMAI



CARDOVAL® RITMO

MAISTO PAPILDAS

Normaliai širdies funkcijai palaikyti svarbus racionalus darbo ir poilsio režimas, alkoholio ir tabako vengimas, pakankamas fizinis aktyvumas, mėgstama veikla, mokyjamas atsipalaiduoti ir, be abejoj, visaverė mityba. Deja dažnai nerandame laiko padėti savo širdžiai!

„Cardoval Ritmo“ – maisto papildas, sukurtas pagal specialią formulę būtent jūsų širdžiai, kraujagyslėms ir nervų sistemai. Sudėtyje esantys elementai veikia kompleksiskai:

- GUDOBELĖ ir CESNAKAS padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių funkciją.
- MAGNIS padeda palaikyti normalią raumenų funkciją.
- CESNAKAS padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.
- VITAMINAI B₁ ir B₆ padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.

Tik 1 kapsulė per dieną!

CARDOVAL® RITMO – ŠIRDIES LENGVUMUI IR RAMYBEI

Perkant pakuotę antra tokia pati DOVANŲ!

1+1

BIOPANCOR X3, 44 pakeliai 5³⁹ 3⁶³ €

COR4 COMPLEX, 28 pakeliai 17⁹⁹ 12⁰³ €

MINERALVIT CARDIO, 20 pakelių 8⁹⁹ 5⁷³ €

MAISTO PAPILDAS

Pamatinkite savo širdį mineralais, vitaminais ir gudobelės ekstraktu! „Mineralvit CARDIO“: 1 miltelių pakelyje – net 200 mg gudobelės ekstrakto! Produkto sudėtyje esantis vitaminas B1 ir gudobelės padeda palaikyti normalią širdies veiklą. „BioPancor X3“ – magnio ir kalio citratas milteliais! Pakuotėje – 44 paketėliai. Magnis išgaunamas iš Negyvosios jūros. Magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raumenų funkciją. „Cor4 Complex“ – maisto papildas širdžiai ir kraujotakos sistemai, cholesteroliui. Sudėtyje esantys mineralai kalis ir magnis, vitaminas B1 ir augalinės kilmės medžiagos padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir kraujospūdį, cholesterolio koncentraciją kraujyje, gerina kraujo kokybę ir kraujotaką. Produkto sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, stabilizatorių, kvapiųjų medžiagų ar saldiklių. Tinka veganams ir vegetarams. Pagaminta Izraelyje.

MINERALAI, VITAMINAI IR GUDOBELIŲ EKSTRAKTAS JŪSŲ ŠIRDŽIAI!

-30%

Ambio Omega 3, 60 kapsulių

8,99 €

-40%

5,39 €



MAISTO PAPILDAS

• Eikozapentaeno rūgštis (EPR) ir dokozaheksaeno rūgštis (DHR) padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.

AMBIO BRONCHO COMPLEX mikstūra, 120 ml

6,98 €

-30%

4,89 €



SKYSTASIS MAISTO PAPILDAS

• Čiobrelių, islandinių kerpenų ir paprastųjų pušų ekstraktai padeda palaikyti kvėpavimo takų funkciją.
• Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.
• Vitaminas C padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir normalią nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

AMBIO KOMPLEKSAS PERSALUS, 20 tirpiųjų tablečių

5,99 €

-30%

4,19 €



MAISTO PAPILDAS

• Šnypščiosios apelsinų skonio tabletės.
• Selenas ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

AMBIO GERAU NUOTAikai, 30 kapsulių

12,49 €

-40%

7,49 €



MAISTO PAPILDAS

• Vitaminas B6 ir tiaminas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.
• Tik 1 kapsulė per dieną.

AMBIO CINKAS, 45 tabletės

5,99 €

-35%

3,89 €



MAISTO PAPILDAS

• Cinkas padeda palaikyti normalią plaukų, odos, nagų ir kaulų būklę.
• Cinkas padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų, riebalų rūgščių ir vitamino A apykaitą.
• Cinkas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo ir palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
• Cinkas padeda palaikyti normalų vaisingumą ir reprodukciją bei normalią DNR sintezę.
• Tik 1 kapsulė per dieną.

AMBIO MAGNIS tirpiosios granulės, 20 pakelių

9,99 €

-40%

5,99 €



MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLI AIS

• Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, kaulų ir dantų būklę, nervų sistemos veiklą bei psichologinę funkciją, energijos apykaitą, be to, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
• Vitaminas C padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą bei psichologinę funkciją, imuninės sistemos veiklą, kolageno, kuris reikalingas normaliai dantų funkcijai, susidarymą, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo bei padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
• Vitaminas B12 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą bei psichologinę funkciją, imuninės sistemos veiklą, normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.



AMBIO KEPENIMS SU MARGAINIU FORTE, 30 kapsulių

8⁹⁸ €

-30%

6²⁹ €

MAISTO PAPILDAS

- Tikrieji margainiai ir daržiniai artiškai padeda palaikyti normalią kepenų funkciją.
- Tik 1 kapsulė per dieną.

AMBIO LAKTO- BIFIDOBAKTERIJŲ KOMPLEKSAS EXTRA, 20 kapsulių

7⁹⁸ €

-30%

5⁵⁹ €

MAISTO PAPILDAS

- Papildo kasdienę mitybą gyvybingomis bakterijomis.

AMBIO KALCIS, MAGNIS, CINKAS, 100 tablečių

12⁹⁸ €

-40%

7⁷⁹ €

MAISTO PAPILDAS SU SALKIKLIU

- Kalcis reikalingas normaliai kaulų būklei palaikyti. Magnis ir cinkas padeda palaikyti normalią kaulų būklę.
- Kalcis ir magnis padeda palaikyti normalią raumenų veiklą.
- Cinkas padeda palaikyti normalią plaukų, odos ir nagų būklę, padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
- Vitaminas D padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą bei normalią kaulų būklę.

AMBIO SĄNARIAMS SU KOLAGENU, 60 kapsulių

15⁹⁸ €

-30%

11¹⁹ €

MAISTO PAPILDAS

- I ir II tipo kolagenas, vitaminas C, silicis, hialurono rūgštis.
- Maisto papildas sudėtyje yra I tipo „Peptan®“ kolageno. Peptanai – tai bioaktyvūs kolageno peptidai, lengviau įsisavinami dėl jų hidrolizuotos formos.
- Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių, kaulų, kremzlių, dantų ir dantenu, odos funkcijai, susidarymą.
- Vitaminas C padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.
- Vitaminas C padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.

AMBIO VITAMINAS D, 1600 TV, 40 kramtomųjų tablečių

8⁴⁹ €

-45%

4⁶⁷ €

MAISTO PAPILDAS

- Vitaminas D3 padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą, padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią dantų, kaulų ir raumenų būklę.

AMBIO PASIFLORA, 60 tablečių

8⁹⁸ €

-35%

5⁸⁴ €

MAISTO PAPILDAS

- Raudonžiedžių pasiflorų ekstraktas padeda atsipalaiduoti ir užmigti.



NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO



nuo
1⁹⁹

IBUPROM

IBUPROM, 200 mg, 10 dengtųjų tablečių **1⁹⁹ €**
IBUPROM, 200 mg, 20 dengtųjų tablečių **3⁹⁹ €**
IBUPROM, 400 mg, 10 plėvele dengtųjų tablečių **2⁴⁹ €**
IBUPROM, 400 mg, 20 plėvele dengtųjų tablečių **3⁹⁹ €**
IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 10 minkštųjų kapsulių **3⁴⁹ €**
IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 20 minkštųjų kapsulių **4⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg ir 200 mg. Indikacijos: skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Ibuprom Express, 400 mg“: suaugusiems pacientams ir vyresniems nei 12 m. vaikams kaip trumpalaikis pagalbinis gydymas kas 4 val. geriant 1 kapsulę (negerti daugiau kaip 3 kapsules per parą); „Ibuprom, 400 mg“: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1 plėvele dengtą tabletę 3 kartus per parą. Jaunesniems kaip 12 m. vaikams vartoti negalima; „Ibuprom, 200 mg“: 6–9 m. vaikams (kūno svoris 20–29 kg) vartoti po 1 tabletę kas 6–8 val. po valgio. Negalima vartoti daugiau nei 3 tabletes per parą (didžiausia paros dozė – 600 mg, vartojant per keis kartus). 10–12 m. vaikams (kūno svoris 30–39 kg) vartoti po 1 tabletę kas 6 val. po valgio. Negalima vartoti daugiau nei 4 tabletes per parą (didžiausia paros dozė – 800 mg, vartojant per keis kartus). Dozavimas suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams – pradinė dozė yra 2 tabletės, užteigiant vandeniu. Po to, jei būtina, rekomenduojama gerti po 1–2 tabletes kas 4 val. Negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių (1200 mg) per 24 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, taškinis kraujavimas, ūminės skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligės stadija; anksčiau buvusi alergija acetilsalicilo rūgščiai ir kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; sergant sunkiu širdies nepakankamumu; esant trečiajam nėštumo trimestrai. Specialūs įspėjimai: vartoti neparatina, jei sergate inkstu ar kepenų nepakankamumu, bronchių astma. Teksto parengimo data 2021-08-10.

YRA „IBUPROM“. NĖRA SKAUSMO.

NUO SKAUSMO



10⁹⁹

VOLTAREN AKTIGO

140 mg, vaistinis pleistras

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Diklofenako natrio druska. Indikacijos: trumpalaikis (ne ilgiau kaip 7 d.) vietinis simptominis ūminiu patempimų, audinių įtrūkimų, sumušimų, atsirandančių dėl rankų ir kojų traumų (pvz., sporto traumų), gydymas. Vartojimas: suaugusiems ir paaugliams nuo 16 m.: priklijuoti 1 vaistinį pleistrą ant skausmingos vietos 2 kartus per parą, ryte ir vakare. Negalima vartoti daugiau kaip 2 pleistru per parą. Kontraindikacijos: alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitiems vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo, aktyvi skrandžio ar žarnyno opa, paskutinis nėštumo trimestras, vaikai ir paaugliai, jaunesni nei 16 m., buvęs astmos priepuolis, dilgėlinė arba nosies gleivinės sudirginimas ir trinitas, pavartojus acetilsalicilo rūgšties ar kitių vaistų nuo skausmo ir uždegimo. Negalima pleistro klijuoti ant pažeistos odos. Specialūs įspėjimai: pastebėjus odos išbėrimą, reikia nedelsiant nuimti pleistrą. Salutinį poveikį galima sumažinti, vartojant mažiausią veiksmingą dozę trumpiausią laiką. Pleistras neturi būti klijuojamas ar kitaip kontaktuoti su akimis ar gleivinėmis, atsigarai naudoti serijoms pacientams dėl didesnio salutinio poveikio tikimybės. Nenaudokite šio pleistro ir kitių vaistų su diklofenaku tuo pačiu metu. Pastarąjį su gydytoju, jeigu sergate ar anksčiau sirgote bronchine astma arba alergija, kenčiate nuo inkstų, širdies ar kepenų sutrikimų, anksčiau esate kentę nuo skrandžio ar žarnyno opų, žarnyno uždegimo arba turite padidėjusį polinkį į kraujavimą. Nuklijavę pleistrą, venkite gydymo vietos kontakto su saulės ar soliariumo spinduliais. Teksto parengimo data 2020 m. rugpjūčio 14 d. NP-LT-VOLT-20-00003

NUO ALERGIJOS



3⁴⁹

CETIRIZIN ACTAVIS

10 mg, 10 dengtųjų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 plėvele dengtoje tabletėje yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. Indikacijos: vartojama sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito simptomams (nosies ir akių) bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės simptomams palengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir paaugliams nuo 12 m. – 10 mg (1 tabletė) 1 kartą per parą. 6–12 m. vaikams vartoti po 0,5 tabletes 2 kartus per parą. Tabletes reikia nurinti, užsigeriant stikline skysties. Kontraindikacijos: „Cetirizin Actavis“ vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) cetirizino dihidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaistinio preparato medžiagai bei pacientams, kuriems smarkiai sutrikę inkstų funkcija. Specialūs įspėjimai: cetirizinas gali didinti slėgio susilaikymo riziką. Vaistą atsigarai turėtų vartoti sergantieji epilepsija ir pacientai, kuriems yra traukulių pavojus. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 6 m. vaikams. „Cetirizin Actavis“ negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktozės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Nėštumo ir žindymo laikotarpiu šio vaistinio preparato vartoti atsigarai. Teksto parengimo data 2020-12-04.

NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO



nuo
1⁹⁹

APAP

APAP, 500 mg, 12 plėvele dengtųjų tablečių **1⁹⁹ €**
APAP, 500 mg, 24 plėvele dengtos tabletės **3⁴⁹ €**
APAP, 250 mg granulės pakėtylyje, vaikams, 10 pakėtylių **5⁴⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: paracetamolis, 250 mg ir 500 mg. Indikacijos: vaistai skirti silpnam ir vidutinio stiprumo skausmui malšinti ir temperatūrai mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Apap, 500 mg“ plėvele dengtos tabletės: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams gerti po 1–2 tabletes kas 4–6 valandas, ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. „Apap, 250 mg“ granulės pakėtylyje: skirti vaikams, vienkartinė dozė yra nuo 10 iki 15 mg/kg kūno svorio vyresniems nei 4 metų vaikams, ją vartoti ne dažniau kaip kas 4 valandas (didžiausia paros dozė – 4 pakėtyliai). Granulės supilti tiesiai į burną ant liežuvio ir praryti neužgerus vandens. Kontraindikacijos: vaistus vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: prieš vartojant paracetamolį būtina pasitarti su gydytoju, jei yra: pažeistos kepenys ar inkstai, astma, gliukozės 6-fosfatdehidrogenazės stoka, hemolizinė anemija, vartojami kai kurie kiti vaistai, skystųjų netekimas, mitybos nepakankamumas, vartojamas alkoholis bei nėštumo ir žindymo laikotarpiai. Didesnės nei rekomenduojamos dozės sukelia vidaus organų pažeidimus. Prašome įdėmiai perskaityti pakuočių lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepažeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Reklaminio teksto parengimo data: 2021-01-27.

„APAP“. KIEKVIENOJE VAISTINĖLĖJE.

NUO SKAUSMO

EMOX 100 mg/g gelis, 55 g

NERECEPTINIS VAISTAS

1 g gelio yra 100 mg naprokseno. Indikacijos: lokaliai minkštųjų audinių traumas, sukeliant skausmą malšinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: 2–6 kartus per dieną į odą virš skaudamos vietos reikia trinti maždaug 4 cm gelio juosteletę. Vaikams šio vaisto vartoti nerekomenduojama. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas naproksenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai ar kitiems nesteroidiniams vaistiniams preparatams nuo uždegimo, salicilatais; jei yra žinoma, kad acetilsalicilo rūgšties arba kiti nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo buvo sukelę astmos priepuolį, dilgėlinę arba ūminę nosies gleivinės uždegimą. Specialūs įspėjimai: gelis turi būti vartojamas tik ant nepažeistos odos. Jei pasireiškė alerginė reakcija, reikia nutraukti gydymą ir kreiptis į gydytoją. Jei EMOX ilgą laiką tepamas didelis odos plotas, gali pasireikšti sisteminis nepageidaujamas poveikis, todėl sergantiesiems inkstų arba kepenų veiklos nepakankamumu, reikėtų šio vaisto dozę mažinti. EMOX gelio negalima vartoti po sandarinamųjų varstų. Gydymo metu ir 2 savaites po gydymo reikia vengti tiesioginių saulės spindulių įtakojant soliariumu. Šis vaistas turėtų būti vartojamas atsigarai pacientams, sergantiems saugiu gydymu, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujam@vkt.lt. Arba kita: būdas, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Prašome įdėmiai perskaityti pakuočių lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepažeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. 2021.03.10 EMO-LT2103-12



4⁹⁹

NUO ALERGIJOS



6⁹⁹

MOMETASONE TEVA 50 µg dozėje, nosies purškalas (suspensija), 60 dozių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekvienoje pompoms išpurškamoje dozėje (0,1 ml) yra 50 µg mometazono furato (monohidrato pavidalo). Terapinės indikacijos: „Mometasone Teva“ nosies purškalo vartojimas nuo 18 m. suaugusiems. Sienligės (sezoninio alerginio rinito) simptomams šalinti. Dozavimas ir vartojimo metodas: pradinė rekomenduojama dozė yra 2 purškimai (50 µg [purškime]) kiekvieną nosies landą 1 kartą per parą (bendra dozė 200 µg). Palaikomoji dozė – 1 purškimas / kiekvieną nosies landą 1 kartą per parą (bendra dozė 100 µg). Kai kuriems pacientams pavartojus „Mometasone Teva“ lėgos simptomai pradeda mažėti per 12 val. po pirmosios dozės purškimo, tačiau visiškas poveikis pasireiškia per 4 pirmąsias dienas. Dėl to labai svarbu vaistą vartoti reguliariai, kad pasiektumėte visą vaisto gydymo poveikį. Jeigu narsėjimui po 14 parų vartojimo nėra arba je yra nepakankamas, reikalinga medicininė konsultacija. Vartojimo metodas: prieš kiekvieną vartojimą talpyklė reikia gerai papurtyti. Kontraindikacijos: „Mometasone Teva“ vartoti negalima: jeigu yra alergija mometazono furatui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu nosies gleivinėje yra neįgydytas infekcijos sukelias uždegimas; jeigu jums neseniai operuota arba sužeista nosis; nevarikite nosies purškalo, kol jūsų nosis sugys. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: reikalingi, jeigu sirgote arba sergate tuberkulioze; jeigu organizme yra bet kokia infekcija, jeigu vartojate geriamųjų arba švirkščiamųjų kortikosteroidų; jeigu sergate cistine fibroze. Pastarąjį su gydytoju, jeigu jūsų imuninė sistema yra nusilpusi (jeigu esate neatsparus infekcijoms) ir turite kontaktą su sergančiuoju tyms arba vejaragiais. Jūs turėtumėte vengti kontakto su šiomis infekcijoms užsikrėtusiais žmonėmis; jeigu jums yra nosies arba gerklės infekcija, jeigu vartojate šį vaistą kelis mėnesius ar ilgiau; jeigu nosyje ar gerklėje nuolat jaučiate dirginimą. Kortikosteroidų turinčius nosies purškalus vartojant ilgą laiką ir dideliais dozėmis, dėl vaisto patekimo į vida organimą gali pasireikšti šalutinis poveikis. Jeigu jums nieči arba suvirgusios ašys, gydytojas gali jums rekomenduoti kitoki gydymą kartu su „Mometasone Teva“ nosies purškalo. Jeigu pradėtumėte matyti lyg per miglą arba jums pasireiškė kiti regėjimo sutrikimai, kreipkitės į savo gydytoją. Teksto parengimo data 2021-02-05.

ĮKVĖPKITE, IŠKVĖPKITE – ALERGIJĄ NUGALĖTA.

SKAUSMUI MALŠINTI, TEMPERATŪRAI MAŽINTI



2⁴⁹

IBUGARD

200 mg, 10 minkštųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje kapsulėje yra 200 mg ibuprofeno. Indikacijos: trumpalaikis simptominis įvairios kilmės silpnų ir vidutinio stiprumo skausmo gydymas; simptominis įvairios kilmės karščiavimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: nustatant ibuprofeno dozę, reikia atsižvelgti į paciento kūno svorį ir amžių. Paprastai vienkartinė ibuprofeno dozė yra 7–10 mg/kg kūno svorio, maksimali paros dozė yra 20–30 mg/kg kūno svorio. Minimalus laiko tarpas tarp dozių – 4–6 valandos. Kontraindikacijos: „Ibugard“ nevartoti, jeigu yra padidėjęs jautrumas vaisto sudedamosioms medžiagoms, yra pasireiškęs šalutinis poveikis, vartojant bet kurį nesteroidinį vaistą nuo uždegimo (NVNU); jei yra neaiškūs kraujodaros sutrikimai; jei yra ar buvo pepsinė opa arba kraujavimas iš virškinamojo trakto; jei yra kraujavimas / smegenų ar kitoks kraujavimas; sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas; paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai: jeigu prasideda virškinamojo trakto kraujavimas arba išėjimas, gydytojas ibuprofenu reikia nedelsiant nutraukti. Sergant vėjaragiais reikia vengti vartoti ibuprofeno. Atsigarai skirti pacientams, kuriems yra buvęs virškinamojo trakto ligų, buvęs hipertenzija arba širdies nepakankamumas, sutrikusi inkstų, kepenų funkcija, nustatyta sisteminė raudonoji vilkligė ar serga obstrukcine kvėpavimo takų liga, alerginėmis ligomis. Ibuprofenas laikinai gali slopinti trombocitų funkciją. Nevartoti pacientams, kuriems yra retas paveldimas gliukozės netoleravimas. Teksto paruošimo data 2017 01 mėn.

ESANT VIDURIAVIMUI



3³⁹

LOPERAMIDUM WZF POLFA 2 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga: loperamido hidrochloridas. Indikacijos: simptominis suaugusių ir vyresnių negu 12 metų paauglių ūminio viduriavimo gydymas tokiu atveju, jei negalima pašalinti viduriavimo sukelusios priežasties. Dozavimas: pradžioje geriant 2 tabletes (4 mg), vėliau – po 1 tabletę (2 mg) po kiekvieno iššūtinimo nesuformuotomis išmatomis. Draudžiama per parą gerti daugiau kaip 6 tabletes (12 mg). Kontraindikacijos: Padidėjęs jautrumas loperamidui hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jaunesni negu 12 metų pacientai; paralyžinis žarnų nepažeinamumas, vidurių užkietėjimas; pilvo potūmas; organizme per mažai skystos; pseudomembraninis kolitas, kurį dažniausiai sukelia plataus poveikio antibiotikai; ūminė bakterinė disenterija, bei kitoks bakterinis viduriavimas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: loperamido hidrochlorido gydymas pacientams turi vartoti pakankamai vandens bei mineralinį medžiagų. Šio vaistinio preparato reikia atsigarai vartoti ligoniams, kuriems yra kepenų nepakankamumas. Sergant Krono liga, loperamido hidrochlorido reikia vartoti atsigarai. Jeigu pasireiškia vidurių užkietėjimas, pilvo potūmas ar atsiranda pirmųjų žarnyno obstrukcijos simptomų, šio vaistinio preparato vartojimą būtina nutraukti. Jeigu ligonis karščiuoja bei jo išmatose yra kraujo, prieš pradėdant vartoti loperamidą hidrochlorido, būtina išsiaiškinti tokio viduriavimo priežastį. Vartojant loperamidą hidrochlorido, gali pasunkėti šlapinėjimas. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktozės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Reklamos teksto parengimo data 2017-01.

GREITAI SUSTABDYS VIDURIAVIMĄ.

SMARTHIT IV® efektyvus pasisavinimo maisto papildai

MAISTO PAPILDAI

Dėl patentuotos efektyvus pasisavinimo technologijos „Miosol“ sukuriami mikrokapsulės, į kurią patalpinami vitaminai, mineralai ar augaliniai ekstraktai. Mikrokapsulės funkcija – apsaugoti viduje esančias medžiagas nuo skrandžio įgysčių. Taip pat maistinių medžiagų molekules linkusios laikytis mikrokapsulės ilduje, todėl nedirgina skrandžio. Toks įkapsulavimas būdas gali užtikrinti iki 6 artų efektyvesnį maistinių medžiagų pasisavinimą organizme. Mikrokapsuluotų maisto papildų SMARTHIT IV® liniją sudaro:

SMARTHIT IV® Ferrum® – normaliam hemoglobino ir raudonųjų kelių susidarymui;
SMARTHIT IV® Ferrum Liquid® – skystos formos geležis, tinkama ir vaikams uo 3 metų. Normaliam hemoglobino ir raudonųjų kelių susidarymui. Mikro-kapsuluota geležis neturi įprastai geležiai būdingų šalutinių reiškių (nedirgina skrandžio, nepalieka nemalonaus poskonio burnoje, nedaro dantų ir pan.);
„SMARTHIT IV® Vitamin D₃“ – vitaminas D₃ imuninei sistemai;
„SMARTHIT IV® Vitamins D₃+K₂“ – kaulams ir normaliam kraujo krešėjimui;
„SMARTHIT IV® Vitamin B₁₂“ – normaliai kraujodarai bei psichologinei funkci-jai palaikyti ypač daug dirbančioms ir besimokantiems žmonėms;
„SMARTHIT IV® Curcumin“ – mikrokapsuluotos formos kurkuminas imuninei sistemai, kepenų funkcijai, normaliam cholesterolio lygiui kraujyje palaikyti;
SMARTHIT IV® – MENAS VEIKTI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-25%

SAUSOMS, SUDIRGUSIOMS IR PAVARGUSIOMS AKIMS



BEPANTHEN® EYE

MEDICINOS PRIEMONĖS

Bepanthen® Eye akių lašų sudėtyje yra 0,15 % natrio hialuronato ir 2 % deks-pantenolio. Bepanthen® Eye saugo ir drėkina akies paviršių ir padaro jį slidžiu. Tokiu būdu ilgam sumažėja diskomfortas, susijęs su mechaniniu stresu, stresu dėl aplinkos poveikio arba intensyvaus žiūrėjimo. Sudėtyje nėra konservantų, todėl šie lašai gerai toleruojami, net jei vartojami ilgą laiką. Lašinti po 1 lašą į akies junginės maišelį 3–5 kartus per parą. Jei yra alergija bet kuriai sudėtyje esančiai medžiagai arba akių uždegimas ar pažeidimas, vartoti negalima. Akių lašų vartojimo metu kontaktinių lęšių išiminti nereikia. Vienadozės talpyklės skirtos vienkartiniam vartojimui. Pirmą kartą atidarius 10 ml akių lašų buteliuką galima vartoti ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Jei norite sužinoti daugiau, skaitykite pilną Bepanthen® Eye vartojimo instrukciją.

Reklamos teksto parengimo data: 2021-07. LMR-CH-20210727-08.

PAŠALINKITE SAUSŲ AKIŲ SIMPTOMUS IŠ KARTO!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



-10%

AKIMS IR REGĖJIMUI



BLUE BERRY™

MAISTO PAPILDAI

Originalių švediškių „New Nordic“ vitaminų akims ir regėjimui „Blue Berry Omega 3“, „Blue Berry Eye Stress“, „Blue Berry GUMMIES“ sudėtyje yra mėlynių, akšveičių ekstraktų, luteino, vitamino A. Vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą. Mėlynių uogų ekstraktas padeda palaikyti normalų regėjimą. „Blue Berry Omega 3“ sudėtyje papildomai yra omega-3 riebiųjų rūgščių – eikozapentaeno rūgšties (EPR) ir dokozahexaeno rūgšties (DHR). DHR padeda išsaugoti normalų regėjimą, kai jos per parą suvartojama 250 mg. Taip pat svarbu įvairi, subalansuota mitybą ir sveikas gyvenimo būdas.

ORIGINALŪS ŠVEDIŠKI VITAMINAI AKIMS IR REGĖJIMUI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-30%



MAGNIS+B6 OPTIMAL, FITOLIZIN, GLUKOZIN, ISEREN, EVENING PRIMROSE, OMEGA 3, URAGIN, VITAMINAI A, D3, E

MAISTO PAPILDAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-30%

AKIMS



OPTIC TOTAL, 30 tablečių 5⁹⁹ 3⁶³ €

OPTIC SENIOR, 30 tablečių 6⁹⁹ 4⁴⁷ €

OPTIC BIOLUTEINA 25, 30 tablečių 7⁹⁹ 5⁵⁹ €

MAISTO PAPILDAI

OPTIC TOTAL sudėtyje yra mėlynių uogų, luteino, cinko ir vitamino C, E, A, B₆, B₁₂, B₂, B₁, B₇, B₉, B₁₀, B₁₁, B₁₂, B₁₃, B₁₄, B₁₅, B₁₆, B₁₇, B₁₈, B₁₉, B₂₀, B₂₁, B₂₂, B₂₃, B₂₄, B₂₅, B₂₆, B₂₇, B₂₈, B₂₉, B₃₀, B₃₁, B₃₂, B₃₃, B₃₄, B₃₅, B₃₆, B₃₇, B₃₈, B₃₉, B₄₀, B₄₁, B₄₂, B₄₃, B₄₄, B₄₅, B₄₆, B₄₇, B₄₈, B₄₉, B₅₀, B₅₁, B₅₂, B₅₃, B₅₄, B₅₅, B₅₆, B₅₇, B₅₈, B₅₉, B₆₀, B₆₁, B₆₂, B₆₃, B₆₄, B₆₅, B₆₆, B₆₇, B₆₈, B₆₉, B₇₀, B₇₁, B₇₂, B₇₃, B₇₄, B₇₅, B₇₆, B₇₇, B₇₈, B₇₉, B₈₀, B₈₁, B₈₂, B₈₃, B₈₄, B₈₅, B₈₆, B₈₇, B₈₈, B₈₉, B₉₀, B₉₁, B₉₂, B₉₃, B₉₄, B₉₅, B₉₆, B₉₇, B₉₈, B₉₉, B₁₀₀, B₁₀₁, B₁₀₂, B₁₀₃, B₁₀₄, B₁₀₅, B₁₀₆, B₁₀₇, B₁₀₈, B₁₀₉, B₁₁₀, B₁₁₁, B₁₁₂, B₁₁₃, B₁₁₄, B₁₁₅, B₁₁₆, B₁₁₇, B₁₁₈, B₁₁₉, B₁₂₀, B₁₂₁, B₁₂₂, B₁₂₃, B₁₂₄, B₁₂₅, B₁₂₆, B₁₂₇, B₁₂₈, B₁₂₉, B₁₃₀, B₁₃₁, B₁₃₂, B₁₃₃, B₁₃₄, B₁₃₅, B₁₃₆, B₁₃₇, B₁₃₈, B₁₃₉, B₁₄₀, B₁₄₁, B₁₄₂, B₁₄₃, B₁₄₄, B₁₄₅, B₁₄₆, B₁₄₇, B₁₄₈, B₁₄₉, B₁₅₀, B₁₅₁, B₁₅₂, B₁₅₃, B₁₅₄, B₁₅₅, B₁₅₆, B₁₅₇, B₁₅₈, B₁₅₉, B₁₆₀, B₁₆₁, B₁₆₂, B₁₆₃, B₁₆₄, B₁₆₅, B₁₆₆, B₁₆₇, B₁₆₈, B₁₆₉, B₁₇₀, B₁₇₁, B₁₇₂, B₁₇₃, B₁₇₄, B₁₇₅, B₁₇₆, B₁₇₇, B₁₇₈, B₁₇₉, B₁₈₀, B₁₈₁, B₁₈₂, B₁₈₃, B₁₈₄, B₁₈₅, B₁₈₆, B₁₈₇, B₁₈₈, B₁₈₉, B₁₉₀, B₁₉₁, B₁₉₂, B₁₉₃, B₁₉₄, B₁₉₅, B₁₉₆, B₁₉₇, B₁₉₈, B₁₉₉, B₂₀₀, B₂₀₁, B₂₀₂, B₂₀₃, B₂₀₄, B₂₀₅, B₂₀₆, B₂₀₇, B₂₀₈, B₂₀₉, B₂₁₀, B₂₁₁, B₂₁₂, B₂₁₃, B₂₁₄, B₂₁₅, B₂₁₆, B₂₁₇, B₂₁₈, B₂₁₉, B₂₂₀, B₂₂₁, B₂₂₂, B₂₂₃, B₂₂₄, B₂₂₅, B₂₂₆, B₂₂₇, B₂₂₈, B₂₂₉, B₂₃₀, B₂₃₁, B₂₃₂, B₂₃₃, B₂₃₄, B₂₃₅, B₂₃₆, B₂₃₇, B₂₃₈, B₂₃₉, B₂₄₀, B₂₄₁, B₂₄₂, B₂₄₃, B₂₄₄, B₂₄₅, B₂₄₆, B₂₄₇, B₂₄₈, B₂₄₉, B₂₅₀, B₂₅₁, B₂₅₂, B₂₅₃, B₂₅₄, B₂₅₅, B₂₅₆, B₂₅₇, B₂₅₈, B₂₅₉, B₂₆₀, B₂₆₁, B₂₆₂, B₂₆₃, B₂₆₄, B₂₆₅, B₂₆₆, B₂₆₇, B₂₆₈, B₂₆₉, B₂₇₀, B₂₇₁, B₂₇₂, B₂₇₃, B₂₇₄, B₂₇₅, B₂₇₆, B₂₇₇, B₂₇₈, B₂₇₉, B₂₈₀, B₂₈₁, B₂₈₂, B₂₈₃, B₂₈₄, B₂₈₅, B₂₈₆, B₂₈₇, B₂₈₈, B₂₈₉, B₂₉₀, B₂₉₁, B₂₉₂, B₂₉₃, B₂₉₄, B₂₉₅, B₂₉₆, B₂₉₇, B₂₉₈, B₂₉₉, B₃₀₀, B₃₀₁, B₃₀₂, B₃₀₃, B₃₀₄, B₃₀₅, B₃₀₆, B₃₀₇, B₃₀₈, B₃₀₉, B₃₁₀, B₃₁₁, B₃₁₂, B₃₁₃, B₃₁₄, B₃₁₅, B₃₁₆, B₃₁₇, B₃₁₈, B₃₁₉, B₃₂₀, B₃₂₁, B₃₂₂, B₃₂₃, B₃₂₄, B₃₂₅, B₃₂₆, B₃₂₇, B₃₂₈, B₃₂₉, B₃₃₀, B₃₃₁, B₃₃₂, B₃₃₃, B₃₃₄, B₃₃₅, B₃₃₆, B₃₃₇, B₃₃₈, B₃₃₉, B₃₄₀, B₃₄₁, B₃₄₂, B₃₄₃, B₃₄₄, B₃₄₅, B₃₄₆, B₃₄₇, B₃₄₈, B₃₄₉, B₃₅₀, B₃₅₁, B₃₅₂, B₃₅₃, B₃₅₄, B₃₅₅, B₃₅₆, B₃₅₇, B₃₅₈, B₃₅₉, B₃₆₀, B₃₆₁, B₃₆₂, B₃₆₃, B₃₆₄, B₃₆₅, B₃₆₆, B₃₆₇, B₃₆₈, B₃₆₉, B₃₇₀, B₃₇₁, B₃₇₂, B₃₇₃, B₃₇₄, B₃₇₅, B₃₇₆, B₃₇₇, B₃₇₈, B₃₇₉, B₃₈₀, B₃₈₁, B₃₈₂, B₃₈₃, B₃₈₄, B₃₈₅, B₃₈₆, B₃₈₇, B₃₈₈, B₃₈₉, B₃₉₀, B₃₉₁, B₃₉₂, B₃₉₃, B₃₉₄, B₃₉₅, B₃₉₆, B₃₉₇, B₃₉₈, B₃₉₉, B₄₀₀, B₄₀₁, B₄₀₂, B₄₀₃, B₄₀₄, B₄₀₅, B₄₀₆, B₄₀₇, B₄₀₈, B₄₀₉, B₄₁₀, B₄₁₁, B₄₁₂, B₄₁₃, B₄₁₄, B₄₁₅, B₄₁₆, B₄₁₇, B₄₁₈, B₄₁₉, B₄₂₀, B₄₂₁, B₄₂₂, B₄₂₃, B₄₂₄, B₄₂₅, B₄₂₆, B₄₂₇, B₄₂₈, B₄₂₉, B₄₃₀, B₄₃₁, B₄₃₂, B₄₃₃, B₄₃₄, B₄₃₅, B₄₃₆, B₄₃₇, B₄₃₈, B₄₃₉, B₄₄₀, B₄₄₁, B₄₄₂, B₄₄₃, B₄₄₄, B₄₄₅, B₄₄₆, B₄₄₇, B₄₄₈, B₄₄₉, B₄₅₀, B₄₅₁, B₄₅₂, B₄₅₃, B₄₅₄, B₄₅₅, B₄₅₆, B₄₅₇, B₄₅₈, B₄₅₉, B₄₆₀, B₄₆₁, B₄₆₂, B₄₆₃, B₄₆₄, B₄₆₅, B₄₆₆, B₄₆₇, B₄₆₈, B₄₆₉, B₄₇₀, B₄₇₁, B₄₇₂, B₄₇₃, B₄₇₄, B₄₇₅, B₄₇₆, B₄₇₇, B₄₇₈, B₄₇₉, B₄₈₀, B₄₈₁, B₄₈₂, B₄₈₃, B₄₈₄, B₄₈₅, B₄₈₆, B₄₈₇, B₄₈₈, B₄₈₉, B₄₉₀, B₄₉₁, B₄₉₂, B₄₉₃, B₄₉₄, B₄₉₅, B₄₉₆, B₄₉₇, B₄₉₈, B₄₉₉, B₅₀₀, B₅₀₁, B₅₀₂, B₅₀₃, B₅₀₄, B₅₀₅, B₅₀₆, B₅₀₇, B₅₀₈, B₅₀₉, B₅₁₀, B₅₁₁, B₅₁₂, B₅₁₃, B₅₁₄, B₅₁₅, B₅₁₆, B₅₁₇, B₅₁₈, B₅₁₉, B₅₂₀, B₅₂₁, B₅₂₂, B₅₂₃, B₅₂₄, B₅₂₅, B₅₂₆, B₅₂₇, B₅₂₈, B₅₂₉, B₅₃₀, B₅₃₁, B₅₃₂, B₅₃₃, B₅₃₄, B₅₃₅, B₅₃₆, B₅₃₇, B₅₃₈, B₅₃₉, B₅₄₀, B₅₄₁, B₅₄₂, B₅₄₃, B₅₄₄, B₅₄₅, B₅₄₆, B₅₄₇, B₅₄₈, B₅₄₉, B₅₅₀, B₅₅₁, B₅₅₂, B₅₅₃, B₅₅₄, B₅₅₅, B₅₅₆, B₅₅₇, B₅₅₈, B₅₅₉, B₅₆₀, B₅₆₁, B₅₆₂, B₅₆₃, B₅₆₄, B₅₆₅, B₅₆₆, B₅₆₇, B₅₆₈, B₅₆₉, B₅₇₀, B₅₇₁, B₅₇₂, B₅₇₃, B₅₇₄, B₅₇₅, B₅₇₆, B₅₇₇, B₅₇₈, B₅₇₉, B₅₈₀, B₅₈₁, B₅₈₂, B₅₈₃, B₅₈₄, B₅₈₅, B₅₈₆, B₅₈₇, B₅₈₈, B₅₈₉, B₅₉₀, B₅₉₁, B₅₉₂, B₅₉₃, B₅₉₄, B₅₉₅, B₅₉₆, B₅₉₇, B₅₉₈, B₅₉₉, B₆₀₀, B₆₀₁, B₆₀₂, B₆₀₃, B₆₀₄, B₆₀₅, B₆₀₆, B₆₀₇, B₆₀₈, B₆₀₉, B₆₁₀, B₆₁₁, B₆₁₂, B₆₁₃, B₆₁₄, B₆₁₅, B₆₁₆, B₆₁₇, B₆₁₈, B₆₁₉, B₆₂₀, B₆₂₁, B₆₂₂, B₆₂₃, B₆₂₄, B₆₂₅, B₆₂₆, B₆₂₇, B₆₂₈, B₆₂₉, B₆₃₀, B₆₃₁, B₆₃₂, B₆₃₃, B₆₃₄, B₆₃₅, B₆₃₆, B₆₃₇, B₆₃₈, B₆₃₉, B₆₄₀, B₆₄₁, B₆₄₂, B₆₄₃, B₆₄₄, B₆₄₅, B₆₄₆, B₆₄₇, B₆₄₈, B₆₄₉, B₆₅₀, B₆₅₁, B₆₅₂, B₆₅₃, B₆₅₄, B₆₅₅, B₆₅₆, B₆₅₇, B₆₅₈, B₆₅₉, B₆₆₀, B₆₆₁, B₆₆₂, B₆₆₃, B₆₆₄, B₆₆₅, B₆₆₆, B₆₆₇, B₆₆₈, B₆₆₉, B₆₇₀, B₆₇₁, B₆₇₂, B₆₇₃, B₆₇₄, B₆₇₅, B₆₇₆, B₆₇₇, B₆₇₈, B₆₇₉, B₆₈₀, B₆₈₁, B₆₈₂, B₆₈₃, B₆₈₄, B₆₈₅, B₆₈₆, B₆₈₇, B₆₈₈, B₆₈₉, B₆₉₀, B₆₉₁, B₆₉₂, B₆₉₃, B₆₉₄, B₆₉₅, B₆₉₆, B₆₉₇, B₆₉₈, B₆₉₉, B₇₀₀, B₇₀₁, B₇₀₂, B₇₀₃, B₇₀₄, B₇₀₅, B₇₀₆, B₇₀₇, B₇₀₈, B₇₀₉, B₇₁₀, B₇₁₁, B₇₁₂, B₇₁₃, B₇₁₄, B₇₁₅, B₇₁₆, B₇₁₇, B₇₁₈, B₇₁₉, B₇₂₀, B₇₂₁, B₇₂₂, B₇₂₃, B₇₂₄, B₇₂₅, B₇₂₆, B₇₂₇, B₇₂₈, B₇₂₉, B₇₃₀, B₇₃₁, B₇₃₂, B₇₃₃, B₇₃₄, B₇₃₅, B₇₃₆, B₇₃₇, B₇₃₈, B₇₃₉, B₇₄₀, B₇₄₁, B₇₄₂, B₇₄₃, B₇₄₄, B₇₄₅, B₇₄₆, B₇₄₇, B₇₄₈, B₇₄₉, B₇₅₀, B₇₅₁, B₇₅₂, B₇₅₃, B₇₅₄, B₇₅₅, B₇₅₆, B₇₅₇, B₇₅₈, B₇₅₉, B₇₆₀, B₇₆₁, B₇₆₂, B₇₆₃, B₇₆₄, B₇₆₅, B₇₆₆, B₇₆₇, B₇₆₈, B₇₆₉, B₇₇₀, B₇₇₁, B₇₇₂, B₇₇₃, B₇₇₄, B₇₇₅, B₇₇₆, B₇₇₇, B₇₇₈, B₇₇₉, B₇₈₀, B₇₈₁, B₇₈₂, B₇₈₃, B₇₈₄, B₇₈₅, B₇₈₆, B₇₈₇, B₇₈₈, B₇₈₉, B₇₉₀, B₇₉₁, B₇₉₂, B₇₉₃, B₇₉₄, B₇₉₅, B₇₉₆, B₇₉₇, B₇₉₈, B₇₉₉, B₈₀₀, B₈₀₁, B₈₀₂, B₈₀₃, B₈₀₄, B₈₀₅, B₈₀₆, B₈₀₇, B₈₀₈, B₈₀₉, B₈₁₀, B₈₁₁, B₈₁₂, B₈₁₃, B₈₁₄, B₈₁₅, B₈₁₆, B₈₁₇, B₈₁₈, B₈₁₉, B₈₂₀, B₈₂₁, B₈₂₂, B₈₂₃, B₈₂₄, B₈₂₅, B₈₂₆, B₈₂₇, B₈₂₈, B₈₂₉, B₈₃₀, B₈₃₁, B₈₃₂, B₈₃₃, B₈₃₄, B₈₃₅, B₈₃₆, B₈₃₇, B₈₃₈, B₈₃₉, B₈₄₀, B₈₄₁, B₈₄₂, B₈₄₃, B₈₄₄, B₈₄₅, B₈₄₆, B₈₄₇, B₈₄₈, B₈₄₉, B₈₅₀, B₈₅₁, B₈₅₂, B₈₅₃, B₈₅₄, B₈₅₅, B₈₅₆, B₈₅₇, B₈₅₈, B₈₅₉, B₈₆₀, B₈₆₁, B₈₆₂, B₈₆₃, B₈₆₄, B₈₆₅, B₈₆₆, B₈₆₇, B₈₆₈, B₈₆₉, B₈₇₀, B₈₇₁, B₈₇₂, B₈₇₃, B₈₇₄, B₈₇₅, B₈₇₆, B₈₇₇, B₈₇₈, B₈₇₉, B₈₈₀, B₈₈₁, B₈₈₂, B₈₈₃, B₈₈₄, B₈₈₅, B₈₈₆, B₈₈₇, B₈₈₈, B₈₈₉, B₈₉₀, B₈₉₁, B₈₉₂, B₈₉₃, B₈₉₄, B₈₉₅, B₈₉₆, B₈₉₇, B₈₉₈, B₈₉₉, B₉₀₀, B₉₀₁, B₉₀₂, B₉₀₃, B₉₀₄, B₉₀₅, B₉₀₆, B₉₀₇, B₉₀₈, B₉₀₉, B₉₁₀, B₉₁₁, B₉₁₂, B₉₁₃, B₉₁₄, B₉₁₅, B₉₁₆, B₉₁₇, B₉₁₈, B₉₁₉, B₉₂₀, B₉₂₁, B₉₂₂, B₉₂₃, B₉₂₄, B₉₂₅, B₉₂₆, B₉₂₇, B₉₂₈, B₉₂₉, B₉₃₀, B₉₃₁, B₉₃₂, B₉₃₃, B₉₃₄, B₉₃₅, B₉₃₆, B₉₃₇, B₉₃₈, B₉₃₉, B₉₄₀, B₉₄₁, B₉₄₂, B₉₄₃, B₉₄₄, B₉₄₅, B₉₄₆

**MARSIEČIAI®****MAISTO PAPILDAS**

„Marsiečiai® Guminukai su ežiūle“ – skanūs guminukai vaikams. Sudėtyje yra rausvaziedžių ežiūlių ekstrakto. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Sirupo „Marsiečiai ImunoForte“ sudėtyje yra betaagliukanų, vitamino C, šėvamedžių uogų ir erškėtuogių. Tinka vaikams nuo 1 metų.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

Perkant pakuotę –
antra tokia pati
DOVANŲ!

1+1**IMUNITETUI, KAULAMS
IR DANTIMS****MEGA VITAMIN D**

MEGA VITAMIN D 2000 IU SPRAY, purškalo, 8 ml

MAISTO PAPILDAS

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei normalią kaulų ir dantų būklę.

-40%**9³⁵**
15³⁹**IMUNINEI SISTEMAI****HERBA-IMUNO RAPID, 30 tablečių****MAISTO PAPILDAS**

Rausvaziedžių ežiūlių, ciberžolių ir šėvamedžių uogų augaliniai ekstraktai padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir kvėpavimo takų veiklą. Vitaminas C bei cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir apsaugo ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

-40%**5⁷⁵**
9³⁹**IMUNITETUI IR ŠIRDŽIAI****ČESNAKO ALIEJUS, 30 kapsulių****MAISTO PAPILDAS**

Vartojimas: vartoti po 1 kapsulę per savaitę. Česnako aliejus padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių būklę, kraujospaudimą ir normalų cholesterolio lygį. Česnako aliejus padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir kvėpavimo takų veiklą.

Perkant pakuotę –
antra tokia pati
DOVANŲ!

1+1**IMUNITETUI**

MEGA C 600 mg,
30 apelsinų skonio
kramtomųjų tablečių

MAISTO PAPILDAS SU SALKIKLIAIS
Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

SUPER VITAMINAS C

600 mg, 30 tablečių **7⁸⁹ 5⁵² €**
MAISTO PAPILDAS

-30%**URINAL ACUT, 10 tablečių****MAISTO PAPILDAS**

Didelės koncentracijos spanguolių ekstrakto „Exocyan“, paprastųjų rykštenių ekstrakto ir vitamino D derinys.

Paprastųjų rykštenių ekstraktas padeda palaikyti normalią šlapimo takų būklę.

URINAL ACUT- ŠLAPIMO TAKŲ EKSPERTAS

Perkant pakuotę –
antra tokia pati
DOVANŲ!

1+1**VYRAMS****PERMEN MAX, 30 tablečių****MAISTO PAPILDAS**

„Permen® Max“ yra augalinių medžiagų derinys, papildytas L-argininu. Kininiai ženklai padeda palaikyti normalią erekcijos funkciją.

-35%**14⁴⁹**
22²⁹**GYVYBINGOSIOS
BAKTERIJOS****SALUTIL, 10 kapsulių****MAISTO PAPILDAS**

Sudėtyje yra pieno rūgšties ir bifido bakterijų bei Saccharomyces boulardii mielių. Salutil maisto papildas tinka nėščioms ir krūtimi maitinančioms moterims. Nereikia laikyti šaldytuve, tinka kelioms mėnesiams. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. LT.Sal.70821

-40%**5⁶³**
9³⁹



iki
-30%

VITABIOtics LINIJA

MAISTO PAPILDAI

Jungtinės Karalystės kompanija „Vitabiotics“ jau 5 dešimtmečius kuria inovatyvius, naujausiais moksliniais tyrimais paremtus, aukštos kokybės maisto papildus. Sukurti nepriklaistingai subalansuoti produktai visoms svarbiausioms žmogaus sveikatos sritims – širdies ir kraujagyslių sistemai, smegenų funkcijai, kraujodarai, imuniinei sistemai, kepenų funkcijai ir t.t.

KIEKVIENAM POREIKIUI – IDEALUS MAISTO PAPILDAS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



-30%

EMILIE VIENARŪŠĖS ŽOLELIŲ ARBATOS

NUMALŠINS TROŠKULĮ IR SUŠILDYS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



-20%

879
10⁹⁹

FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Fitolizyna Nefrocaps PLUS“ yra unikalus 7 koncentruotų augalinių ekstraktų mišinys, kuris:

- padeda palaikyti normalią inkstų ir šlapimo takų veiklą (petražolių šaknis, dirvinio asiūkliaus žolė, paprastųjų varpūčių šakniastiebiai, karpotųjų beržų lapai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė);
- padeda palaikyti normalią vandens pašalinimą iš organizmo, todėl skatinamas nepageidaujamo metabolizmo produktų šalinimas su šlapimu (dirvinio asiūkliaus žolė, paprastųjų varpūčių šakniastiebiai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė).

Rekomenduojamas vartojimas: 1 kapsulė 2 kartus per parą prieš valgį, užgeriant dideliu kiekiu vandens (ne mažiau kaip 2 stiklinės).



-30%
069
0⁹⁹

AMIEPLUS GARSTYČIŲ TRAUKLAPIAI, 10 vnt

VYRAMS IR MOTERIMS



-40%

NAKIŲ IR AGURKLIŲ ALIEJUS, 60 kapsulių 17⁹⁹ 10²⁵ €

PROVITAL, 30 tablečių 15⁹⁹ 9⁷⁷ €

MAISTO PAPILDAS

d daugiau informacijos apie produktus www.gamtosnamai.lt



ACORUS BALANCE

MAISTO PAPILDAS

Mokslininkų sukurtos formulės, naujausios technologijos bei dėmesys natūralioms medžiagoms leidžia sukurti inovatyvius maisto papildus, galinčius pasigirti mūsų gera savijauta. Asortimentą sudaro ne tik skirtingų sudėčių produktai, kurie orientuoti į: imunitetą, nervų sistemą, žarnyno veiklą, detoksikaciją ir dar daugiau, bet ir skirtingų vartojimo formų – kiekvienam pagal patogumą.

„ACORUS BALANCE“ – MOKSLO IR GAMTOS BALANSAS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-30%

-50%
038
0⁷⁵

AMIEPLUS PLEISTRAS PIPIRINIS 10x18cm, 1 vnt



iki
-35%



🇨🇦 JAMIESON vitaminai D

Maisto papildai

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-25%



🇨🇦 JAMIESON vitaminai C


Maisto papildai

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



Pagaminta klevų šalyje

-30% 14⁶⁹
20⁹⁹



🇨🇦 JAMIESON lakto-bifido bakterijų kompleksas, 60 kramtomų tablečių

Maisto papildas

-35%



🇨🇦 Jamieson kalcis su vitaminu D3 500 mg, 90 tablečių 11⁹⁹ 7⁷⁹ € Jamieson Stress Plex, 90 tablečių 12⁹⁹ 8⁴⁴ €

Maisto papildai



Pagaminta klevų šalyje

-35% 11³⁷
17⁴⁹



🇨🇦 JAMIESON Q10 KOFERMENTAS 30 MG, 60 KAPSULIŲ

Maisto papildas

-25%



🇨🇦 Jamieson geležis 50 mg, 60 tablečių 12⁹⁹ 9⁷⁴ € JAMIESON Lecitinas 1200 mg, 100 kapsulių 16⁹⁹ 12⁷⁴ €

Maisto papildai



Pagaminta klevų šalyje



-35% **1⁸⁸**
2⁸⁹

VITADAY VITAMINAS C 200 MG, 50 tablečių
MAISTO PAPILDAS



-40%

VITADAY MULTIVITAMINAI MOTERIMS, 60 tablečių ~~7⁹⁹~~ **4⁴⁹ €**
VITADAY MULTIVITAMINAI VYRAMS, 60 tablečių ~~7⁹⁹~~ **4⁷⁹ €**
MAISTO PAPILDAS



-30% **3⁴⁹**
4⁹⁸

VITADAY KALIO CHLORIDAS,
60 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
• Kalis padeda palaikyti normalią nervų sistemos bei raumenų veiklą.
• Kalis padeda palaikyti normalią kraujospūdį.



-30% **3⁸⁴**
5⁴⁹

VITADAY KOMPLEKSAS AKIMS,
30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS



-30% **2⁷⁹**
3⁹⁸

VITADAY KOMPLEKSAS NERVŲ SISTEMAI,
20 kapsulių
MAISTO PAPILDAS



-30% **2⁷⁹**
3⁹⁹

VITADAY VITAMINŲ B KOMPLEKSAS,
60 tablečių
MAISTO PAPILDAS



-30% **3⁸⁴**
5⁴⁹

VITADAY KOMPLEKSAS ŠLAPIMO TAKAMS,
60 tablečių
MAISTO PAPILDAS



-30% **2⁵⁸**
3⁶⁹

VITADAY MAGNIS SU VITAMINU B6,
60 tablečių
MAISTO PAPILDAS

Magnis ir vitaminas B6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, normalią psichologinę funkciją, mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, palaikyti normalią raumenų funkciją.



iki
-40%

AMBIO ALAUS MIELĖS, 500 mg, 150 tablečių **6⁹⁹ 4⁹⁹ € -30 %**
AMBIO ASIŪKLIS, 100 tablečių **9⁹⁹ 5⁹⁹ € -40 %**
MAISTO PAPILDAI

AKIMS



-30%

OCUVAL

Ocuval Strong, 30 minkštųjų kapsulių **15⁹⁹ 10⁹⁹ €**
Ocuval, 30 tablečių **10⁹⁹ 7⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

„Ocuval“ – vienintelis maisto papildas Lietuvoje su Klamato ežero dumblių ekstraktu, papildytas 25 mg luteino ir vitaminu A. Vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą. OCUVAL STRONG – populiariausias maisto papildas akims Lietuvoje su luteinu ir OMEGA-3 riebalų rūgštimis. Sudėtyje esantis vitaminas A, riboflavinis ir cinkas padeda išsaugoti normalų regėjimą.

OCUVAL – MATYK, KAI LABIAUSIAI REIKIA



-30%

STOP STRESS®, 30 kapsulių
STOP STRESS® NIGHT, 30 kapsulių
OSTEONOL®, 150 ml
FITESTEN®, 30 kapsulių
KARDIO START®, 30 kapsulių
IMMUNECO®, 30 kapsulių
BEAUTYNOL®, 30 kapsulių
BEAUTYNOL® EXCELLENCE, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAI

Pasimėgau gyvenimo akimirkomis su BF-ESSE...

JŪSŲ GERAI SAVIJAUTAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



-30%

DOCTOR FISH OMEGA-3 + VITAMINS D & E, 30 kapsulių **9⁹⁹ 6⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

Su saldikliu
Maisto papildas sudėtyje yra omega-3 riebalų rūgščių (EPR ir DHR) ir vitaminų D ir E.

- EPR (eikozapentaeno rūgštis) ir DHR (dokozaheksaeno rūgštis) padeda palaikyti normalią širdies veiklą;
- DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją, išsaugoti normalų regėjimą;
- vitaminas D padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų, raumenų, dantų būklę;
- vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės žalos.

Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.

CERUTIN JUNIOR DINO GUMINUKAI

50 guminukų **8⁹⁹ 5⁹⁹ €**

VAISTŲ SKONIO MAISTO PAPILDAS

Sudėtyje yra cukrų
10 vitaminų, cinko ir rutino šaltinis.

NAUJIENA!



-20% **13⁷⁵**
17⁹⁹

BLOXIVIR GELINIS NOSIES PURŠKALAS, 20 ml
BLOXIVIR GELINIS BURNOS PURŠKALAS, 20 ml

MEDICINOS PRIEMONĖS

Jpurškus ant nosies ar burnos gleivinės, Bloxivir suformuoja sluoksnį, kuris yra mechaninis patogenų barjeras, o jo sudėtyje esančios medžiagos – jona-karaginas, natrio hialuronatas ir ektoinas – panaikina patogenus. Todėl Bloxivir saugo nuo itin užkrečiamų koronavirusų ir gripo virusų, palengvina infekcijos simptomus ir sutrumpina jos trukmę. Jei šią priemonę vartojate užsikrėtę (taip pat besimptomiai) asmenys, Bloxivir sumažina riziką užkrėsti kitus. Tinka suaugusiems ir vyresniems nei 1-ly metų amžiaus vaikams. Vartojimas: nosies purškąlą vartoti po 1-ly gelio dozę į kiekvieną šnervę, burnos purškalo 1–2 dozes užpurkšti ant liežuvio. Vartoti kas 4–5 valandas. Apsauginis poveikis pasireiškia iš karto pavartojus. Pakuotėje yra net 200 preparato dozių.

„BLOXIVIR“ SAUGO NUO VIRUSŲ, KURIE SUKELIA COVID-19, PERŠALIMĄ IR GRIPĄ.



-40%

ŠALTALANKIŲ ALIEJUS PLUS

ŠALTALANKIŲ ALIEJUS PLUS, 100 ml **14⁹⁹ 6⁹⁹ €**

ŠALTALANKIŲ ALIEJUS PLUS, 50 ml **8⁹⁹ 5⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

Šaltalankių aliejus naudojamas organizmui papildyti beta karotenu. **Sudėtis:** dygliuotųjų šaltalankių (*Hippophae Rhamnoides*) aliejus, 50 %, saulėgrąžų aliejus, beta karotenas (vitaminas A). Sudėtyje nėra GMO, kveiklių, glitimo, sojų, kiaušinių, riešutų ir pieno. Nevartokite, jei yra padidėjęs organizmo jautrumas bet kuriai iš produkto sudedamųjų medžiagų. Maisto papildas yra notifikuotas. **Maistinės medžiagos:** 5 ml yra 1500 jg vitamino A (187,5 % referencinės maistinės vertės). **Vartojimas:** gerti po 1 arbatinį šaukštelį (5 ml) per dieną 15–20 min. prieš valgį. **Išpėjimai:** Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dienos dozės. Neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Laikyti ne aukštesnėje kaip +25 °C temperatūroje, vaikams neprieinamoje ir nepasiekiamoje vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Svarbi ištarti ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. **Pagaminta pagal UAB „West-Pharma-East“, Jurbarko g. 2, LT-47183 Kaunas, Lietuva, užsakymą.** Kilmės šalis: ES



VALERIJONŲ EKSTRAKTAS

20 mg tabletės, 50 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Vartojimas: gerti po 1 tabletę 2 kartus per dieną po valgio.
Gamintojas – Biosintez, Rusija.

PIGU **0⁹⁵**



MUKALTINAS

50 mg, 10 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Vartojimas: suaugusiems gerti po 1 tabletę, vyresniems nei 3 m. vaikams – po 0,5 tabletes 2–3 kartus per dieną (vaikams galima išslopinti 1/3 stiklinės šilto vandens). Gamintojas – „Viltech“, Rusija.

PIGU **0⁵⁰**

BIODERMA

DERMATOLOGINĖS ODOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

Prancūzijos dermatologijos laboratorija „Bioderma“ vadovaujasi požiūriu, kad odos priežiūros priemonės turi padėti atkurti natūralius biologinius procesus, šalinamos odos problemų kilmės priežastis bei simptomus. Priežiūros priemonės „Bioderma“ kuriamos tik iš gryniausių veikliųjų medžiagų, atliekančių svarbų vaidmenį odos veikloje. Dermatologai, pediatrai, vaistininkai – visi šie specialistai rekomenduoja „Bioderma“ net ir jautriausią odą turintiems pacientams.

BIOLOGIJOS MOKSLAS DERMATOLOGIJAI.



-25%

URIAGE

XEMOSE LŪPŲ PIEŠTUKAS, 4g

Kasdienei sausų ir suskilusių lūpų priežiūra. Lūpų pieštuko sudėtyje yra bičių vaško, vitamino E, sviestmedžio sviesto, agurkėlių aliejaus, hialurono rūgšties. Drėkina, maitina, padeda apsaugoti lūpų odą.



1+1

PERSPIREX ANTIPERSPIRANTŲ LINIJA

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Itin veiksmingi antiperspirantai „Perspirex“ skirti tiems, kam reikia specialių priemonių prakaitavimui mažinti. Jų veikloji medžiaga – aliuminio chlorido heksahidratas – užtikrina geriausią rezultatą, siekiant apsaugoti nuo padidėjusio prakaitavimo ir prakaito kvapo. Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad antiperspirantai „Perspirex“ užtikrina ypatingą ilgalaikę apsaugą nuo prakaitavimo ir gali padėti išspręsti prakaitavimo bei prakaito kvapo keliamas problemas.

GYVENIMĄ KEIČIANČI APSAUGA.



-35%

VICHY

DERMATOLOGINĖS VEIDO IR KŪNO ODOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

Vichy laboratorijas įkūrė gydytojas, todėl sveikata yra mūsų DNR dalis jau 90 metų. Vichy pirmąją odos ekspozicijos moksle ir daro didžiulę pažangą kasdien. Kurdami produktus mes remiamės dermatologų patikrintomis formulėmis bei visada laikomės 3 pagrindinių principų: dermatologinės veikliosios medžiagos, dermatologų užtikrintas saugumas bei dermatologų patvirtintas veiksmingumas. Vichy lydi moteris visais jų gyvenimo periodais, stiprindama sveikos odos išvaizdą, siūlydama priemones tinkamas tiek paauglystėje, tiek menopauzės laikotarpiu. Sveikata svarbiausia. Pradėk nuo odos.



VICHY DERCOS



VICHY PURETE THERMALE

-25%

**AMBIO MENOPAUSE COMPLEX,**

30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Raudonųjų dobilų ekstraktas, magnis, B grupės vitaminai. Maisto papildas sudėtyje harmoningai suderintas B grupės vitaminų ir magnio kompleksas kartu su raudonųjų dobilų izoflavonais.

Maisto papildas sudėtyje esantis:

- riboflavinai, tiaminai, niacinai, vitaminas B₆, vitaminas B₁₂, biotinas ir magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą;
- tiaminai, niacinai, vitaminas B₆, vitaminas B₁₂, biotinas ir magnis padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją;
- tiaminai, riboflavinai, niacinai, pantoteno rūgštis, vitaminas B₆, vitaminas B₁₂, biotinas ir magnis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą;
- riboflavinai, niacinai, pantoteno rūgštis, vitaminas B₆, vitaminas B₁₂ ir magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį;
- riboflavinai, niacinai ir biotinas padeda palaikyti normalią odos ir gleivinių būklę;
- magnis padeda palaikyti normalią kaulų ir raumenų būklę.

**AMBIO AUGALINIS KOMPLEKSAS
VYRIŠKUMUI,**

60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Afrikiniai pigiai padeda palaikyti normalią šlapimo takų ir pūslės funkciją. Juodasis eleuterokokas, peruvinių pipirinių ekstraktai padeda palaikyti normalią proteinę ir fizinę sveikatą. Sejamųjų linų sėklų ekstraktas padeda palaikyti normalią prostatos funkciją.

-35% **8⁴⁴**
12⁹⁸

-45% **9³⁴**
16⁹⁹

INTYMAI HIGIENAI**VAGISAN****KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS**

Priemonės „Vagisan“ su natūralia pieno rūgštimi skirtos tinkamai lytinių organų priežiūrai. Rūgštis aplinka – būtina sąlyga, kad laktobacilos galėtų pados gaminti pieno rūgštį ir daugintis. Taip užtikrinama optimali natūrali apsauga nuo infekcijos. Intymiosios higienos prausiklis „Vagisan“ tinka kasdieniui intymiai higienai. Drėkinamasis makšties kremas „Vagisan“ sumažina tokius simptomus kaip sausumas, niežulys, deginimo pojūtis ir skausmas. Ovulės su pieno rūgštimi, skirtos natūraliai makšties pH terpei palaikyti ir atkurti.

PASIRŪPINK SAVO INTYMIŲ KOMFORTUI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-20%

**MENOPAUSĖS
SIMPTOMAMS LENGVINTI****CLIMOFEMIN 6,5 mg, 30 tablečių****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje „Climofemin“ tabletyje yra 6,5 mg blakėžutėlių (Cimicifuga racemosa) šakniastiebių sausio ekstrakto (4,5–8,5:1), atitinkančio 29–55 mg blakėžutėlių šakniastiebių. Ekstrakcijos tirpalas: 60 % (V/V) etanolis. Indikacijos: menopauzės simptomų, tokių kaip karščio pylimas ar gausus prakaitavimas, lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: įprasta paros dozė – 1 tabletė. Tabletę nuryjama arba sukratomą, jos negalima čiulpti. Jeigu vartojant vaistinį preparatą simptomai nepalengvėja, reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku. „Climofemin“ be gydytojo leidimo negalima vartoti ilgiau kaip 6 mėnesius. Kontraindikacijos: vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: pacientės, kurioms yra buvę kepenų sutrikimų, šį vaistą turėtų vartoti atsargiai. Vartojimą reikia nedelsiant nutraukti ir kreiptis į gydytoją, jei atsiranda galimų kepenų pažeidimo požymių ar simptomų (pvz.: nuovargis, apetito netekimas, gelta arba stiprus viršutinės pilvo dalies skausmas, lydimas pykinimo ir vėmimo arba šlapinimosi tamsios spalvos šlapimu). Jeigu atsiranda kraujavimas iš makšties arba kitokių neaiškių ar naujų simptomų, reikia kreiptis į gydytoją. Šio vaisto be gydytojo leidimo negalima vartoti su vaistais, kurių sudėtyje yra estrogenų. Pacientėms, kurios buvo gydomos arba kurios yra gydomos dėl krūtų vėžio arba bet kokių kitos navikinės ligos, šio vaisto be gydytojo leidimo vartoti negalima. Reklamos teksto parengimo data 2019-08-14.

10⁸⁵

**MAKŠTIES MIKROFLOROS
ATSTATYMOI****ECOCILLIN ORAL,
15 geriamųjų kapsulių****MEDICINOS PRIEMONĖ**

Ecocillin Oral geriamųjų kapsulių sudėtyje yra 5 milijardai probiotinių pieno rūgšties bakterijų Lactobacillus plantarum P17630, Lactobacillus paracasei 11608, Lactobacillus salivarius 11794, kurias išgėrus, jos iš žarnyno migruoja į makšties aplinką ir tokiu būdu skatina makšties infekcijų simptomų (nemalonus kvapas, paraudimas, niežulys, skausmo pojūtis) išnykimą ir padeda užkirsti kelią pasikartojančioms infekcijoms. Vartojant Ecocillin Oral fiziologinė žarnyno ir makšties ekosistema aprūpinama atitinkamomis laktobakterijų rūšimis, kurios prisitvirtina prie gleivinės ir sukuria apsauginį barjerą nuo patogeninių mikroorganizmų sukeltamų ligų.

-35% **8¹⁸**
12⁹⁹

**PREMENSTRUACINIAM
SINDROMUI GYDYTI****PREFEMIN 20 mg, 90 plėvele dengtų tablečių****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**


Veiklioji medžiaga ir stiprumas: vienoje plėvele dengtoje tabletyje yra 20 mg tikrųjų skaidminių vaisių (Vitex agnus-castus L., fructus) sausio ekstrakto (6–12:1), atitinkančio 120–240 mg tikrųjų skaidminių vaisių. Ekstrakcijos tirpalas – 60 % (m/m) etanolis. Indikacijos: „Prefemin“ lengvina premenstruacinio sindromo negalavimus, kurių gali atsirasti 2 savaites prieš mėnesines ir kurie išnyksta įims prasidėjus. Šie simptomai pasireiškia kaip fizinis ir psichinis negalavimas, pvz., galvos skausmas, odos pokyčiai, šoks toks krūčių jautrumo padidėjimas, pilvo negalavimai, nuotakos nepastovumas, irzlumas, nervinė įtampa, depresija, nuovargis ir miego sutrikimas. Dozavimas ir vartojimo metodas: suaugusioms moterims gerti kasdien du pačius laiku po 1 tabletę, užsigeriant nedideliu kiekiu vandens. Rekomenduojama gydymo trukmė – ne mažiau kaip 3 mėnesiai. Jei simptomai išlieka ilgiau nei 3 mėnesius, būtina gydytojo konsultacija. „Prefemin“ neskirtas vartoti vaikams ir paaugliams. Kontraindikacijos: „Prefemin“ vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: prieš vartojant „Prefemin“, su gydytoju turi pasitarti pacientės, sergančios arba sirgusios nuo estrogenų priklausomais navikais, vartojančios dopamininio receptorių agonistus ir antipsichotikus, estrogenų ir antiepileptikus, pacientės, kurioms nustatyta hipofizės sutrikimų, jaunesnėms nei 18 metų mergaitėms ir paaugliams vaisto vartoti nerekomenduojama, nes duomenų apie vaisto vartojimą šios grupės pacientams nepakanka. Reklaminio teksto parengimo data: 2019-08-14.

16¹⁹

PROTO MANKŠTA.

Dažnai girdime apie fizinio aktyvumo naudą mūsų organizmui. Tačiau nepamirškime, kad mankštos reikia ne tik mūsų kūnui – ne mažiau svarbu išjudinti ir smegenis. Laimei, yra daugybė būdų (neretai itin malonių) jas pramankštinti. Nebijokite mesti iššūkį savo smegenims: išmokykite kalbą, kurią visuomet svajojote išmokti; perskaitykite knygą, kuriai įveikti pristigdavo drąsos; užsirašykite į dominančius kursus ar kitaip plėskite savo įgūdžių sąrašą; mažinkite laiką, skiriamą pasyviai, mažai smegenis stimuliuojančiai veiklai, to-

kiai kaip televizijos žiūrėjimas. Verčiau užsiimkite socialiai aktyvesne veikla (bendraukite su draugais, susipažinkite su naujais žmonėmis), spręskite kryžiažodžius, sudoku arba dėliokite dėliones. Šie pratimai nėra vien smagus laiko leidimas – stimuliuojami protą jie stiprina smegenis, gerina jų funkciją, lėtina nervų ląstelių praradimą, padeda kovoti su atminties silpnėjimu, prisideda mažinant riziką tokių diagnozių kaip depresija, silpnaprotystė. Smegenys – lyg raumuo, nenaudojamos jos nyksta, tad kuo daugiau jas įdarbinsime, tuo ilgiau jomis džiaugsimės.



PRIEMONĖMS INTYMAI HIGIENAI

iki
-30%



Pasiūlymai galioja **2021 11 01 - 2021 11 30**, perkant vaistinėje, pateikus PC NORFA kortelę. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą. Prekių kiekis ribotas. UAB „Norfos vaistinė“ pasilieka teisę bet kada keisti akcijos sąlygas.

Patikimi ir patogūs sprendimai esant šlapimo nelaikymui

Slaugote šeimos narį, kuris neišsiverčia be šlapimą sugeriančių priemonių? Šeimoje yra artimas vyras, kuriam po prostatos operacijos praverstų įklotai? Galbūt tyliai kenčiate nevalingą šlapimo ištekėjimą ir nedrįstate kreiptis pagalbos? Svarbu žinoti, kad tokiais atvejais, gydytojui diagnozavus šlapimo ir (arba) išmatų nelaikymą, galima tikėtis kompensuojamųjų sauskelnių, įklotų, vienkartinį paklodžių.

Itin svarbu rasti poreikius atitinkantį gaminį

Lovoje slaugomiems asmenims labai svarbi kokybiška priežiūra, taigi – ir higienos priemonės. Tai dar aktualiau sergantiems aktyviems pacientams, kurie pamiršta laiku nueiti į tualetą ir neretai nusiplėšia sauskelnes. Slaugantieji turėtų žinoti, kad kompensuojamos ne tik įprastos sauskelnės, bet ir sauskelnės-kelnaitės, pvz., „TENA Pants“. Jos mūvimos kaip įprastos apatinės kelnaitės, todėl nesikeičia nusistovėję įpročiai. Tai taip pat yra puikus pasirinkimas neramiems, demencija sergantiems pacientams, nepripažįstantiems įprastų sauskelnių. Be to, paprasčiau slaugyti gulinčius ligonius, nes sauskelnės-kelnaitės lengva užmauti ir numauti, o drėgmės indikatorius parodo, kada reikia keisti.

Nuo 2021 m. liepos 1 d. asmenims, kuriems nustatytas sunkus šlapimo nelaikymas, galima gauti 60 kompensuojamųjų sauskelnių per mėnesį.

„TENA Pants Night“ – skirtos nakčiai

Svarbu atkreipti dėmesį, kad su šlapimo nelaikymo problema tenka tvarkytis ne tik dieną, bet ir naktį. Dažnas kėlimasis į tualetą ar šlapimo pratekėjimas naktį trikdo miegą. Tai gali neigiamai paveikti savijautą, darbingumą ir sveikatos būklę. Laimei, yra sprendimų, kurie palengvina šlapimo nelaikančiųjų gyvenimą ir padeda ramiai išmiegoti visą naktį. „ProSkin“ gaminių serijos sauskelnės-kelnaitės „TENA Pants Night“ specialiai sukurtos naudoti naktį. Dėl didesnio sugeriamumo nugarinėje dalyje (tai itin svarbu gulint), puikiai sugeriančio dvigubo vidinio sluoksnio ir nuo pratekėjimo apsaugančių šoninių kraštelių, jos ilgiau išsaugo odą sausą. Kaip ir visas „TENA“ „ProSkin“ šlapimą sugeriančių gaminių serijos asortimentas, „TENA Pants Night“ pagamintos iš orui laidžių medžiagų, suteikiančių trigubą apsaugą: sausumą, švelnumą ir nepratekėjimą. Gaminiai patikrinti dermatologų ir sertifikuoti tarptautinės odos sveikatos organizacijos „Skin Health Alliance“ specialistų.

Nauja tvarka: daugiau kompensuojamųjų sauskelnių

Nuo **2020 m. liepos 1 d.** galioja Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) įsakymas, pagal kurį mažas pajamas gaunantiems senatvės pensininkams, negalią turintiems asmenims bei visiems 75 metų ir vyresniems senjorams nebereikia primokėti už kompensuojamąsias sauskelnes ir įklotus, nepaisant, kokius išsirenka. SAM patvirtino naują tvarką, pagal kurią nuo **šių metų liepos 1-osios** sunkų šlapimo nelaikymą patiriantys asmenys gali gauti **60 kompensuojamųjų sauskelnių** (vietoj iki šiol gautų 45) per mėnesį. Svarbu atkreipti dėmesį, kad ši tvarka taikoma tiems asmenims, kuriems gydytojas diagnozavo sunkų šlapimo nelaikymo laipsnį.



„TENA Pants“ sauskelnės-kelnaitės dėvimos kaip įprasti apatiniai, patikimai apsaugo nuo šlapimo pratekėjimo, nemalonaus kvapo ir drėgmės, o specialiai nakčiai sukurtos „TENA Pants Night“ padeda ilgiau išsaugoti odą sausą gulint.

www.tena.lt



JAUTRIŲ DANTŲ PRIEŽIŪRAI



SENSODYNE

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Dantų pastos Sensodyne yra specialiai sukurtos žmonėms, turintiems jautrius dantis. CHLT/CHIMULBRA/0004/18a/JUL
EKSPERTO PAGALBA JAUTRIEMS DANTIMS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-30%

iki
-30%

TENA

Sauskelinės, įklotai, paklotai ir kosmetika.

Patikimos, odos sveikatą užtikrinančios TENA sauskelinės, įklotai ir paklotai greitai sugeria šlapimą, apsaugo nuo pratekėjimo ir nemalonaus kvapo. Papildomai naudojamose TENA odos priežiūros priemonėse padeda pasirūpinti odos švara, higiena ir pragulų profilaktika.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



ZYLIA

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Zylia Whitening“ – nepriekiaštingai jūsų burnos higienai. Efektyviai mažina apnašas, balina dantis ir suteikia jiems blizgesio bei gaivų burnos kvapą.
„Zylia Parodont“ – parodontozės pažeistų dantų ir jautrių dantų profilaktikai. Su žaigiais, ramunėlėmis, dilgėlėmis ir čiobreliais.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-40%

-25%



JORDAN

Kiekvienas mūsų turime unikalius dantis, naudojame individualią jų valymo techniką, be to, mums patinka skirtingos spalvos ir stiliai. Atsižvelgiant į skirtingus vartotojų poreikius bei siekiant padėti efektyviai išvalyti burnos ertmę, „Jordan“ siūlo platias pasirinkimo dantų priežiūros priemonių liniją vaikams bei suaugusiems. Su „Jordan“ – brankiausių išsirinkti kiekvienas!

JORDAN – SKANDINAVIŠKA FORMULĖ JŪSŲ SVEIKIEMS DANTIMS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



CURASEPT ADS

Curasept ADS priemonių išskirtinumas – vienintelė pasaulyje patentuota ADS sistema – formulė, kuri patikrins, kad jūsų natūralių dantų spalva ir burnos receptorių veikla chlorheksidino preparato naudojimo metu nepakistų.

Curasept ADS chlorheksidinas pasižymi itin stipriomis antibakterinėmis savybėmis, efektyviai naikina pavojingas bakterijas, taip užkirsdamas kelią ir apnašų deimuisi. Curasept ADS produkcijos sudėtyje nėra alkoholio, SLS, tad išvengsite burnos ertmės sausėjimo, skilinėjimo bei dirglumo pojūčių. Curasept ADS sukurta ir subalansuota gingivitui, periodontitui malšinti, kraujuojančioms dantenoms gydyti, taip pat skatina burnos audinių gijimą prieš ir po intensyvių burnos higienos ar kitų sudėtingų stomatologinių intervencijų. Tikime, kad sveikas kūnas bei turiningas gyvenimas, pirmiausia prasideda nuo sveikos burnos bei spindinčios šypsenos. Mes ne tik kalbame apie unikalumą, mes jį jau sukūriame. Tu to dar nežinai, bet tai geriausia, kas galėjo nutikti tavo dantims...

PIRMI, NES MUMS RŪPI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-20%

Perkant pakuotę – antra tokia pati DOVANŲ!

1+1



ORALFLUX

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Reguliariai naudojamas „Oralflux“ saugo nuo ertmės. Be alkoholio ir parabenų. Inovatyvus dozatorius užtikrina tikslią skalavimo skysčio dozę ir ekonomišką naudojimą. „Oralflux“ turėtų būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė valant dantis. Naudojimas: norėdami gauti 10 ml skysčio, švelniai paspauskite butelį, kol skystis atsiras virš purškimo prietaiso. Skalaukite burną skysčiu apie 1 min., išspauskite. Kad poveikis būtų geresnis, nevalgykite ir negerkite 2 val. po skalavimo. Buteliukas turi INOVATVŲ DOZATORIŲ – TIKSLŲ IR EKONOMIŠKŲ!

STIPRESNI DANTYS. GAIVESNIS KVAPAS. PLATESNĖ ŠYPSENA!



Pirkdami NORFOS vaistinėje Jūs gausite čekį, kuriuo galėsite apmokėti net iki 30 % sumos už šiuos produktus:

-30%

AUSTRALIAN BODYCARE,
šampūnas, 250 ml

Šampūnas „Australian Bodycare“ veiksmingai valo galvos odą ir plaukus. Sudėtyje yra natūralaus Australijos arbatmedžių aliejaus (Melaleuca alternifolia). Arbatmedžių aliejaus išsiskiria plačia aktyvumų įvairovė, padeda išlaikyti higieninę odos švarą ir natūralią pH pusiausvyrą. Arbatmedžių aliejaus valomosios ypatybės padeda odai natūraliai valytis ir atsinaujinti, todėl puikiai tinka galvos odos priežiūrai, plaukų grožiui puoselėti. Naudojant kiekvieną dieną, plaukai tampa minkšti, švelni ir puikiai prižiūrimi. Tinka naudoti sausai galvos odai. Šampūnas „Australian Bodycare“ saugo nuo pleikanių susidarymo, plaukų nebalavimo. Naudojite ant šlapų plaukų, štrinkite, kol gausiai ims putoti, ir kruopščiai išskalaukite. Gamintojas: „Australian Bodycare Continental Aps“, DK-5492 Vissenbjerg, Danija.





AMBIO KALCIS VAIKAMS, mikstūra, 100 ml.

SKYSTASIS MAISTO PAPILDAS

- Kalcis reikalingas normaliai dantų ir kaulų būklei palaikyti.
- Kalcis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, raumenų veiklą, normalų nervų impulso perdavimą, virškinimo fermentų veikimą, kraujo krešėjimą.
- Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę, normalią raumenų funkciją, imuninės sistemos veiklą, kalcio koncentraciją kraujyje, kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą.

-45% 3⁸⁴

TRUMPALAIKIAM PIENINIŲ DANTŲ DYGIMO SUKELTAM SKAUŠMUI IR UŽDEGIMUI MAŽINTI



DENTINOX burnos gleivinės gelis, 10 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Profilaktinė skausmą malšinanti priemonė dygstant pirmiesiems dantims. Indikacija: trumpalaikiam pieninių dantų dygimo sukeltų simptomų mažinimui. Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 g gelio yra 150 mg Matricaria recutita L. (Chamomilla recutita (L.) Rauschert), 10s (ramunėlių žiedų) tinktūros 1:5, (ekstrakcijos tirpiklis 70 % v/v etanolis), 3,4 mg lidokaino hidroklorido, 3,2 mg makrogolio laurilo eterio. Vartojimo būdas ir dozavimas: švariu pirštu arba švariu vatos tamponėliu užtepti žirni dydžio Dentinox® burnos gleivinės gelio ant pažeistos dantų srities bei lengvai įtrinti. Šią procedūrą reikia pakartoti 2-3 kartus per dieną, ypač po valgio ir prieš miegą. Dentinox® burnos gleivinės gelis vaikams gali būti vartojamas tol, kol išdygę visi pieniniai dantys, taip pat ir vėliau, kai dygsta krūminiai dantys. Tūbelėje yra 10 g gelio. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) ramunėlėms arba kitoms graižžiedėjų (Asteraceae) medžiagoms, lidokainui ir jam panašioms (amidų grupės) anestetikams, bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Dentinox®. Reikia saugotis, kad vaisto nepatektų į akis. Jei parausta dantenos ar patinsta gleivinė arba atsiranda kitų požymių, reikia kreiptis į gydytoją. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Reklamos teksto parengimo data: 2017-11-17.

6⁹⁹



AMBIO GERKLEI VAIKAMS, sirupas, 150 ml

SKYSTASIS MAISTO PAPILDAS

- Vaistinių čobrelų ekstraktas padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų funkciją. Pipirmėčių ekstraktas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
- Tik 1 arbatinis šaukštelis per dieną.

-40% 3⁸⁹



AMBIO FOLIO RŪGŠTIS 1000μg, 90 tablečių

MAISTO PAPILDAS

-30% 3⁹⁸



PREGNAWISH, 30 paketėlių

FERTOWISH, 30 paketėlių

MAISTO PAPILDAS

„PregnaWish“ rekomenduojamas moterims, planuojančioms pastoti. Su mioinozitolu, aktyvia folio rūgšties forma ir vitaminu B12. Papildomas folio rūgšties vartojimas didina foliatų kiekį motinos organizme. Foliatai padeda palaikyti motinos audinių augimą nėštumo metu.

„FertoWish“ rekomenduojamas vyrams, besirūpinantiems savo reprodukcine sveikata. Su mioinozitolu, aktyvia folio rūgšties forma, vitaminais C, E, B6, aminorūgštimis L-argininu ir L-karnitinu, cinku, seleno ir gulsčių ragužių ekstraktu. Selenas padeda palaikyti normalią spermatogenezę. Cinkas padeda palaikyti normalų vaisingumą ir reprodukciją.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-25% 15²²

MOTERIMS



DIFOLIN

DIFOLIN+, 30 kapsulių 16⁴⁹ 12³⁷ €

DIFOLIN, 60 tablečių 7⁸⁹ 5⁹² €

MAISTO PAPILDAS

Difolin+ moters gerai savijautai: hemoglobiniui, energijai, nervams, imunitetui: mikrokapsuluota liposomose geležis + folio rūgštis + vitaminai B12, D3, C + varis.

Difolin+ sudėtyje naudojama mikrokapsuluota liposomose geležis, kuri organizme efektyviai pasisavinama, neturi geležies poskonių, nedirgina virškinamojo trakto, neturi sąveikos su maistu, geležis, folio rūgštis, vitaminas B12 – visi iš būtiniausių kraujo gamybai elementų. Vitaminas B12 padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, geležis – hemoglobino susidarymą, foliatai – kraujodarą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, varis – nervų sistemos veiklą, geležis, varis, vitaminai C, B12 – energijos apykaitą.

Difolin planuojančioms pastoti, neščioms, žindančioms: folio rūgštis + vitaminas D3.

Folio rūgštis padeda palaikyti normalią kraujodarą, mažinti nuovargį. Mažas foliatų kiekis neščios kraujyje endotrituose yra besivystančio vaisiaus nervinio vamzdelio defektų rizikos veiksnys. Teigiamas poveikis atsiranda per parą papildomai suvartojant 400 μg folio rūgšties ne trumpiau kaip vieną mėnesį iki pastojimo ir iki trijų mėnesių po jo. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, dalyvauja ląstelių dalijimosi procese.

-25%



HUMER

„Humer“ nosies higienos produktų iš natūralių vaistinių medžiagų ekspertas turi sprendimą kiekvienai užgulusiai nosiai.

„Humer“ naujienos kūdikiams ir vaikams

„Humer“ hipertoniškos jūros vanduo užsikimšusiai kūdikio ir vaiko nosytei – atkems nosį ir padeda pašalinti gleives, pasireiškus peršalimui, sinusitui bei alerginiam rinitui nuo 3 mėnesių ir vyresniems kūdikiams bei vaikams.

„Humer“ gleivių aspiratorius – skirtas naudoti pasireiškus peršalimui, sinusitui ar kitai infekcijai, kuri sukelia gausią sekreciją iš nosies. Nosies ploviklis leidžia vaikui vėl pradėti normaliai kvėpuoti ir geriau jaustis.

„HUMER“ – DAUGIAU NEI JŪROS VANDUO.

„HUMER“ JUS IŠLAISVINA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis.

-20%



SUDOCREM® MULTI-EXPERT, 125 g, 250 g

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Sudocrem“® skirtas iššutimų ir vystyklų bėrimų gydymui ir profilaktikai. Tinka kūdikiui ir suaugusiųjų odos priežiūrai. Šis kremas ne tik minkština ir ramina odą, bet ir sudaro vandeniui atsparią barjerą bei neleidžia toliau dirginti odos. Nesuserigia į sauskelines, todėl padeda užtikrinti odos apsaugą. Naudoti atsiradus iššutimams. Skirtas naudoti tik išorškai.

„SUDOCREM“® – TRIGUBAS EFEKTAS: GYDO. RAMINA. APSAUGO.

Perkant pakuotę – antra tokia pati DOVANŲ!

1+1



SKIEPAI NUO GRIPO



SU LOJALUMO KORTELE

20⁶⁰ €

Nuolaidos taikomos su PC Norfa kortele.
NV laimės valandų nuolaidos netaikomos.



SKIEPO KAINA
be kortelės

22⁴⁵ €

Skiepijantis
nuo gripo,
AMBIO vitamino C
tirpiosios tabletės
tik už

0,01 €



Galima išankstinė
registracija internetu
www.nvaistine.lt/skiepai