

TOP SAUSIO PASIŪLYMAI



-50%
~~11⁶⁹ €~~ **5⁸⁵ €**



-50%
~~6⁹⁸ €~~ **3⁴⁹ €**



AMBIO OMEGA-3 FORTE

60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

- Minkštažakauso rūgštis (DHR) padeda palaikyti normalią smegenų funkciją ir išsaugoti normalų regėjimą.
- Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg DHR.
- Eikozapentaeno rūgštis (EPR) ir DHR padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.
- Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimų.



**Perkant pakuotę – antra
tokia pati DOVANŲ!**

1+1

RAMI ŠIRDIS

30 kapsliu

MAISTO PAPILDAS

MAISTO PAPILDA – plačios sudetis, dviejopo poveikio maisto papildas, pamėgtas ir pripažintas Lietuvos vartotojų. Šis preparatas pasižymi puikiai suderintu sudėtimi, kuri be vitaminų ir mineralų papildyta natūraliais augaliniais ekstraktais, šimtmečius naudojamais medicinoje. Maisto papilduose „**Rami širdis**“ esantis plunksnalapės gudobelės ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies veiklą, vaistinio valerijono ekstraktas – psichologinę funkciją, taip pat vitaminas B₆ padeda mažinti nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną, užgeriant stikline vandens.

Ramiame kūne - rami širdis



nuovo **249 €**

IBUPROM EXPRESS

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

NĒKĀRŠĒJAS VAISTINIAI PREPARĀTI, 400 mg. Indikācijas: silpno ar vidutinio stiprums sāksms, tokio kaip mēnesinj, galvos, dantu, raumenj, sņārij, malšlīnīs, karšciavio māzīnās. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vjrēmies nējm 12 m. vaiksams trumpkalpiem pagabājīm gydymui kas 4 valandas geriami 1 kapslē (negerti daugiau kaip 3 kapslėj per parą). Kapslēj negalima kramtyti. Kapslėje reikia užgerti stikline vandens. Kontraindikacijos: vaisto vartoti negalima, jeigu yra alergija ibuprofenil arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, praetijje yra buve padidėjusio jautrumo reakcijų vartojant kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo, yra sunkus kepenų, inkstų ar širdies funkcijos nepakankamumas, yra ar praetijje buvo pepsinė opa, yra buvęs kraujavimas iš virškinamojo trakto ar jo prakiurimas, yra kraujavimas į smegenis, į viršinamajį traktą arba kitoks kraujavimas, yra sisteminė raudonoji vilkligė; paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai: specialų atsargum priemonių reikia, jeigu sutrikusi inkstų, kepenų, širdies ir viršinamojo trakto veikla, vartojama kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo, sergama bronchine astma, alerginėmis ligomis ar sistetine raudonąja vilklige; senyviems žmonėms. Teksto parengimo data: 2021-05-10.

YRA „IBUPROM“ NĖRA SĄKSMS.

IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 10 minkštųjų kapsulių 2⁴⁹ €
IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 20 minkštųjų kapsulių 3⁹⁹ €

AMBIO PATIRANTIEMS JTAMPA

20 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

MAISTO PAPILDAS
Raminų, valerijonų, apynių ekstraktai ir melatoninas.
Melatoninas padeda mažinti subjektyvų laiko juostų skirtumo pajautimą. Teigiamas poveikis pasireiškia suvotuojant ne mažiau kaip 0,5 mg prieš einant miegoti pirmą kelionės dieną ir kelias dienas po atvykimo į kelionės tikslo vietą. Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Teigiamas poveikis pasireiškia suvotuojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti. Paprastųjų apynių ekstraktas gali padėti atpalaiduoti.



**Perkant pakuotę – antra
tokia pati DOVANU!**

1+1

GASTROVAL HEPAR FORMULA

30 kapsliu

MAISTO PAPILDAS

- 1-oje kapsulėje net 300 mg augalinių medžiagų, kurios suteikia daugiakryptę naudą:
- kurkuminas iš ciberžolės padeda apsaugoti kepenis nuo oksidacinės pažeidos, palaikyti normalų cholesterolio lygį;
- silimarinas iš tikrųjų mairūnų padeda palaikyti normalią kepenų ląstelių regeneraciją;
- pipirinas iš juodųjų pipirų, kurie padeda palaikyti normalų virškinimą ir kūno svorį;
- gysločių žolės ekstraktas, bijūnų šaknų milteliai, dilgėlių lapai, medetkų žiedai padeda palaikyti normalią žarnyno veiklą.

GASTROVAL HEPAR FORMULA – tikras loobis kepenims.



4⁹⁹ €

DEEP RELIEF

50 mg/ 30mg/g gelis, 50g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

KĀRĒJĀS VAIŠTINĀIS REPARĀTIJS

1 g ieguva 50 mg buprofēnu ir 30 mg levomentolu. Terapiņas indikācijas: Lokālais sānario aplinkos mēģinātū augmī užeģimio (ar) traumas (pvz., patempmio), šnirimo) sukelto kausmas malmslmsns. Dozmē užeģimio 15-20 mg 3 reizes dienā 12 metū vaiksms; ģeļi 15-20 mg 3 reizes dienā 12 metū vaiksms. 6 valandas. Terapija rekla ar 4 cm ģeļo 15-20 mg 3 reizes dienā. Varat 1 centimetrio ģeļo 15-20 mg tūbeļos var vadiņutisķas 50 mg buprofēno 15-20 mg tūbeļos var vadiņutisķas 125 mg buprofēno. Nevirsūt noroduotū dozi. Jeļu simptomi nepreina per ķenks dias, kreipits j dydojta. Vaiku populacija: Dozumē apie De Relief saugumā ir veiksmīguma jaunesniems kal 12 metū vaiksms nēra. Vartojmo metasods: Plonu ģeļo sluskuņti tepti skaudamā vietā, švelniā masāžuoti, kol susiers. Kontraindikācijas: Padidēģes jāutrums veiklajār arba bet kurīār noruduotai pagabinei medžiagā. Padidēģes jāutrums aspiņurui ar kitims nesteroīdinams vastsims nu užeģimio, įskaitant īr vartojamus per būru. Astma sergantys pacientai, kuriems aspiņinas arba kiti nesteroīdinai vaištiniai preparatū nu užeģimio, gal sukelti astmos priepuoli, niežėjimai, rinīts ar dilgeline. Nubrodzinti, pazeista infekcijos ar užeģimio oda arba plaučiai be višutinio odos sluoksnio. Kiti toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu lokaliai vartojami vaistiniai preparatai. Vartojimo vieta esanti infekcija. Paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: De Relief ģeļo sudėtyje yra propilenglikolio, kuris gali sukelti odos sudirginimą. Gelo netepli ant (arba) šalio gleivinės ir akių. Netinka tepti po sandarinančiomuo tvarsčiu. Pirma kartū išbandyti ant mažo odos plotu. Vartoti tik ant odos. Registrutuojas: Colep Laupheim GmbH & Co. KG, Vokietija. Gamintojas: The Menphothalum Company Limited, Jungtinė Karalystė arba Colep Laupheim GmbH & Co. KG, Vokietija.

DE RELIEF – VĖSINANTIS IR GREITAI VEIKIANTIS TEPALAS NUO SKAUSMO!

Nuolaidos fizinēse vaistinēse galioja
su vaistinēs lojalumo kortelēm.



-40% **10¹⁹** **16⁹⁹**

JAMIESON VITA-VIM REGULAR, 90 tablečių

MAISTO PAPILDAS

- Kruopšiai parinktas derinys iš 25 svarbių komponentų – 12 vitaminų, 8 mineralų ir kitų veikliųjų medžiagų.
- Be pagrindinio vitaminų ir mineralų derinio, sudėtyje yra unikalių medžiagų: žaliosios arbatos lapų ir vynuogių kauliukų fitosomų, pipirmėčių lapų ekstrakto.
- VITA-VIM REGULAR taip pat papildytas karotinoidais, liuteinu ir likopenu, išgaunamu iš pomidorų vaisių ekstrakto.
- Pakuotės užtenka net trijms mėnesiams.



iki
-35%

MÖLLER'S OMEGA-3 kapsulės

MAISTO PAPILDAI

MÖLLER'S žuvis kapsulės išsiskiria kokybe, didele Omega-3 koncentracija ir efektyviu medžiagų deriniu. **MÖLLER'S D VITAMIN EXTRA** kapsulės apgalvotas pagamintas naudojant NO-FLUX technologiją, užtikrinančią kapsulės medžiagų pasisavinimą be atsisavimo ar žuvies kvapo. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Omega-3 riebalų rūgščių DHR ir EPR padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraują krešėjimą.

RŪPINAMĒS IR MAŽAIS. IR DĪDELIĀIS.

*Akcijs taikoma geltona etiķete pažymētiem produktiem

IMUNITETUI



-30%

MOLEKIN IMUNO vitaminas C 1000 mg, vitaminas D 2000 IU, cinkas 10 mg,
30 tablečių **14,99 €**

MOLEKIN IMUNO. 20 Šnypščiuų apelsinų skonio tablečių **12^{8g} 9⁰² €**

MAISTO PAPILDAI

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo, vitaminas C padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Tablettės sudaryta iš dviejų dalių, vienoje – vitaminas C, kitoje – vitaminas D ir cinkas, todėl vitaminai geriau įsisavinami. „Molekulinio Imuno“ maisto papildas yra didelis vitaminų C ir D kiekis. Tinka vegetarams. Sudėtyje nėra laktozės. Sudėtyje nėra glitimo. Rekomenduojama suvartoti po 1 tablete per dieną.

IMUNITETUI



iki
-40%

NAUJIENA

LIVOL

MAISTO PAPILDAI

Naujiena! LIVOL – tai suderintos ir prie Jūsų priderintos vitaminų sistemos geriausias efektui. Tai holistinė sistema, kur vienas kitą papildantis produktai sudaro puikiai suderintą sistemą gerai savijautai. Skandinaviški LIVOL vitaminai – tai pirmos tokio tipo vitaminų sistemos: aiškos, paprastos bei visiems priimanos.

LIVOL – VITAMINU SISTEMOS

*Akcijs taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.



299

OMEP UNO 20 mg, 14 skrandyje neirių kietųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosms mēdiāgos, stiprums: vienoje skrandyje neiroje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo. **Indikacijos:** „Omep Uno“ vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiai neinfekcinių simptomų gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** rekomenduojama vartoti vieną kapsulę per parą, kapsulės reikia nuryti nepaaukiant ryte, užgeriant pušel kūlins vandens. **Contraindikacijos:** „Omep Uno“ negalima vartoti kartu su nelfinaviru, jeigu yra padidėjęs jautrumas omeprazolui (o taip pat pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, ezomeprazolui) ar bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Sudėtyje yra sacharozės. **Sandoz Pharmaceuticals** užd. d. filialas, Seimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius, Lietuva. BS2011124231. Reklamos teksto parengimo data: 2020 m. 11 20.

STIPRI PAGALBA NUO RĖMENS!

PERŠALIMO LIGŲ SIMPTOMAMS PALENGVINTI



399

FERVEX

FERVEX granulēs geriamajam tirpalui, vaikams, 8 paketēļi
FERVEX granulēs geriamajam tirpalui, suaugusiems, be cukraus, 8 paketēļi
FERVEX granulēs geriamajam tirpalui, suaugusiems, 8 paketēļi

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos ir stiprumas. Ferex suaugusiems ir suaugusiems be cukraus: 500 mg paracetamolio, 25 mg feniramino maleato, 200 mg askorbo rūgšties, Ferex vaikams: 250 mg paracetamolio, 10 mg feniramino maleato, 100 mg askorbo rūgšties. **Terapinės indikacijos.** Ferex vartoti kaip patalpinamąjį ir pataisantį vaistą, nosies gleivinės paburkimu, skausmu) palengvinti. Ferex vaikams: trumpalaikį imunitų persėjimo ligų simptomams (karščiavimą, nosies gleivinės paburkimu, skausmu) palengvinti vaikams nuo 6 iki 15 metų. **Dovazavimas ir vartojimo būdas.** Ferex suaugusiems ir suaugusiems be cukraus: gerti po vieną tabletę 3-4 kartus per parą. Ferex vaikams: vaikams nuo 6 iki 10 metų gerti po 1 tabletę 2-3 parą; nuo 10 iki 12 metų gerti po 1 tabletę 3 kartus per parą; nuo 12 iki 15 metų gerti po 1 tabletę 4 kartus per parą, bet ne daugiau kaip kas 4 val. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas vaisto sudedamoms dalims, sunkių kepenų nepakankamumas, aktyvūs kepenų ligos, uždarą kiaušuko, šlapimo susilaikymas, skrandžio priveržio stenozė, šlapimo takų akmenys, draudžiama vartoti vaikams ir paaugliams iki 15 m; Ferex vaikams: draudžiama vartoti vaikams iki 6 metų. **Specialios įspėjimai.** Pastaraisiuose su gydymu ar vaistiniu įėjimu įsijungę židiniai serga židinio sindromu, sunkia inkstų liga; hemolizinė anemija, epilepsija, linkę susiję su akmenų šlapimo takuose, jautrumas acetilsalicilo rūgšties, piktnaudžiavimas alkoholiu, yra anoreksija, dehidratacija, esate suaugęs sergantis ≤ 50 kg, esant G6PD trūkumui ir sutrikusią gleivinę apykaitą. Nevartokite krūto pieno, kuro, sudėtyje yra paracetamolio. Cukriniai diabetai sergantiesiems atsargiai vartoti Ferex suaugusiems ir sergantiesiems fenilketonurija atsargiai vartoti Ferex suaugusiems be cukraus.

Teksto parengimo data: 2021.12.10. PM-IT-2021-12-2986.



4⁹⁹

SEPTABENE 3 mg/1 mg, 16 kietųjų pastilių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Septabene“ dezinfekuoja burną ir ryklę bei lengvina ryklės uždegimo požymius: skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. Kietosios pastilės „Septabene“ vartojamos uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti: jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas; sergant dantenų uždegimu (gingivitu), ryklės uždegimu (faringitu) ir gerklų uždegimu (laringitu); prieš dantų traukimą ir po jo. **Dozavimas:** suaugusiems rekomenduojama paros dozė yra 3–4 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia ištirpinti burnoje kas 3–6 valandas. 6–12 m. vaikams rekomenduojama paros dozė yra 3 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia ištirpinti burnoje kas 3–6 valandas. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 m. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Septabene“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydymo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Sąveika su kitais vaistinėmis preparatais ir kitokia sąveika. „Septabene“ negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Kietųjų pastilių negalima vartoti kartu su pienu, nes jis silpnina cetilpiridinio chlorido antimikrobinį poveikį.

TAVO GERKLĖ – TAVO JĖGA!

PERŠALUS



-40% 7³⁶
12²⁶

VIRUPROTECT STADA burnos purškalo, 7 ml.

MEDICINOS PRIEMONĖ

VirusProtect STADA yra burnos purškalo nuo peršalimo. Gydymo peršalimą ir sušvelnina jo simptomus. Jis sukuria apsauginį barjerą nuo peršalimą sukeliančių virusų, padengdamas burnos gleivinę. Barjeras sulaukia peršalimą sukeliančius virusus, juos nukenksmina ir slopina jų plitimą bei dauginimąsi.

Vartoti esant galimam peršalimą sukeliančių virusų poveikiui arba vos tik pajutami peršalimo simptomai. VirusProtect STADA yra tinkamas suaugusiems ir vaikams (vyresniems nei 4 metų amžiaus).

NOSIES GLEIVINĖS PABURKIMUI MAŽINTI



3⁴⁹

RHINO-STAS, 10 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 ml nosies purškalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. **Indikacijos:** „Rhino-stas“ yra simpatikomimetikas. Purškalo siurina kraujagysles, todėl mažina nosies gleivinės paburkimą. Vartojamas trumpalaikiam nosies gleivinės paburkimui mažinti, sergant sloga arba prienosinių ančių uždegimu (sinusitu). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 10 m. vaikams bei paaugliams reikia purkšti po 1 įvairios tūrio „Rhino-stas“ kiekvieną nosies landą 1–3 kartus per parą tada, kada reikia. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jei yra sausasis nosies gleivinės uždegimas (sausasis rinitas); pacientams, kuriems pro nosį neseniai buvo atlikta smegenų operacija; jaunesniems kaip 10 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** „Rhino-stas“ galima vartoti tik atidžiai įvertinus jo vartojimo riziką ir galimą naudą šiais atvejais: pacientams, kurie vartoja ar vartoja vaistų nuo depresijos (monoaminooksidazės inhibitorių) arba kitų vaistų, kurie gali labai padidinti kraujospūdį; kai padidėjęs akispūdis, ypač sergant uždarą kampo glaukoma; sergant sunkia širdies ir kraujagyslių sistemos liga (pvz., vainikinių širdies arterijų liga, hipertenzija); sergant feochromocitoma (antinksčių naviku); sergant porfirija; sergant medžiagų apykaitos ligomis (pvz., hipertiroidizmu, cukriniu diabetu). Pakuotės lapelio peržiūros data 2018-10-23. Reklamos teksto parengimo data 2020-02-03.

PURŠKALAS „RHINO-STAS“ – PIRMOJI PAGALBA SERGANT SLOGA AR SINUSITU!



4⁹⁹

DEEP HEAT KREMAS 67g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 g kremo yra 128 mg metilsalicilato, 59,1 mg levomentolio ir raceminio mentolio, 19,7 mg eukalipto eterinio aliejaus ir 14,7 mg terpentino eterinio aliejaus. **Terapinės indikacijos:** Lokalus sąnario aplinkos minkštųjų audinių uždegimo ir (ar) traumos (pvz., sumušimo, patempimo) sukeltos skausmo malšinimas. **Dozavimas:** suaugusiems tepti reikia apie 4 cm kremo 2–3 kartus per parą. Vienoje dozeje (4 cm) yra vidutiniškai 0,026 g metilsalicilato ir vidutiniškai 0,12 g levomentolio. Neviršyti nurodytų dozių. Gydymo trukmė priklauso nuo indikacijų bei vaistinio preparato poveikio. Pacientą reikia informuoti, kad nepasitarus su gydytoju suaugusiems kremo negalima tepti ilgiau kaip 3 parų. Jeigu per 3 paras simptomai išlieka arba būklė pasunkėja, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Vaikų populiacija: Duomenų apie Deep Heat saugumą ir veiksmingumą jaunesniems kaip 18 metų vaikams nėra. **Vartojimo metodas:** Plonu geliu sluoksniu patepti skaudamą vietą ir švelniai įtrinti. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas aspirinui, ibuprofenui ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, įskaitant ir vartojamus per burną, ypač jei jautrumas vaistiniams preparatams buvo susijęs su astma. Astma sergantys pacientai, kuriems aspirinas arba kiti nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, gali sukelti astmos priepuolį, niežėjimą, rinitą ar dilgėlinę. Negalima tepti ant pažeistos odos, apie akis, ant gleivinės, atvirų žaizdų, egzemos pažeistų vietų. Kiti toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu lokaliai vartojami vaistiniai preparatai. Vartojimo vietoje esanti infekcija. Paskutinis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Kremo netepti ant (arba) šalia gleivinės ir akių. Pirmą kartą išbandyti ant mažo odos ploto. Jei pasireiškia bet koks nepageidaujamas poveikis ar ligos požymiai užsisėja arba pasunkėja, pasitarti su gydytoju. Vartoti tik ant odos. **Registruotojas:** Colep Laupheim GmbH & Co. KG, Vokietija. **Gamintojas:** The Mentholatum Company Limited, Jungtinė Karalystė arba Colep Laupheim GmbH & Co. KG, Vokietija. **DEEP HEAT ŠILDANTIS KREMAS NUIMANTIS SKAUSMĄ IR RAUMENŲ SUSTINGIMĄ!**

NUO RĖMENS



2⁹⁹

PANZILAN® 20 mg, 14 skrandyje neišsiskiriančių tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Pantoprazolas. Vienoje tabletėje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos sėkvihidrato pavidalu). **Indikacijos:** „Panzilan“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos pantoprazolo, kuri blokuoja skrandžio rūgšties gamtinį „siurbimą“, todėl skrandyje sumažėja rūgšties kiekis. „Panzilan“ vartojamas trumpalaikiam gastroezofaginio refliksų simptomų (pvz., rėmens, rūgščių atpylimo) suaugusiems pacientams gydymui. Refliuksas yra rūgščių iš skrandžio atgalinis patekimas į stemplę, kurioje gali prasidėti uždegimas ir sukelti skausmą. Dėl to gali atsirasti tokių simptomų, kaip skausmingas deginimo pojūtis krūtinkausi, ypač ryte ir naktį, ir rūgštus skonis burnoje (rūgšties atpylimas). **Dozavimas ir vartojimo būdas:** Gerti po 1 tabletę per parą prieš valgį tuo pačiu paros laiku 2–3 dienas ir eiles, užsigeriant vandeniu. Tabletes reikia nuryti, negalima kramtyti ar laužyti. Neviršyti rekomenduojamos 20 mg pantoprazolo dozės per parą. Nutraukti „Panzilan“ vartojimą, kai visai pranykę ligos simptomai. Nepasitarus su gydytoju vartoti „Panzilan“ ilgiau kaip 4 savaites negalima. **Kontraindikacijos:** Jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) pantoprazolui, sojų lecitinui arba bet kuriai pagalbinei „Panzilan“ medžiagai, kartu vartojami vaistai, kurių sudėtyje yra azaanavirio, amžius iki 18 metų, nėštumas arba kūdikio žindymas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Jeigu dėl rėmens arba virškinimo sutrikimų gydotes ilgiau kaip 4 savaites, esant ypač vyresniems kaip 55 metų ir kasdien vartojate nereguliuojamus vaistus dėl sutrikusio virškinimo, atsiradusių simptomų, kaip simptomai neseniai pasikeitė; anksčiau sirgote skrandžio opa arba buvo atlikta skrandžio operacija; sutrikusi kepenų veikla arba atsirado gelta; numatoma atlikti endoskopiją arba C-šlapalo mėginį. Jeigu numatyta atlikti kraujo mėginį, pasakykite gydytojui, kad vartojate šį vaistą. Atsargiai ir rimtai rėmens simptomai gali palengvėti pavartojus „Panzilan“ vos viena diena, tačiau šis vaistas neturi sukelti pagereigimo nebesant. Jo negalima vartoti profilaktikai. Jei jums gydytojas sako, kad netoleruojate kai kurių angliavandenių, prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su gydytoju. „Panzilan“ sudėtyje yra sojų lecitino. Jei esate alergiškas žemės riešutams ar sojai, vaisto vartoti negalima.

UŽGESINK GAISRĄ SKRANDYJE!



1⁹⁹

IBUPROFEN LANNACHER 400 mg pėvele dengtos tabletės, 10 tablečių

Vienoje pėvele dengtoje tabletėje yra 400 mg ibuprofeno.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Indikacijos: „Ibuprofen Lannacher“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos ibuprofeno. Ibuprofenas mažina uždegimo sukeltą skausmą, patinimą ir karščiavimą, vartojamas trumpą laiką silpno ar vidutinio stiprumo skausmui, tokiu kaip mėnesinių, galvos, dantų, raumenų, sąnarių, malšinti. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** tabletes reikia nuryti valgio metu arba pavalyti, užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: 0,5–1 pėvele dengtą tabletę 3 kartus per parą. Negalima viršyti didžiausios paros dozės 1200 mg ibuprofeno (3 pėvele dengtų tablečių). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijų, vartojant kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo, acetalisalicilo rūgšties darinius. Sunkus kepenų, inkstų ar širdies funkcijos nepakankamumas. Paskutinių trijų nėštumo mėnesių laikotarpis. Pėpsinė opa. Kraujavimas į smegenis, virškinimo trakto arba kt. Sistemine raudonoji vilkligė. Jaunesni nei 12 m. vaikai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atargiai skirti pacientams, sergantiems širdies ir kraujagyslių, smegenų kraujagyslių ligomis, cukriniu diabetu ir jungiamojo audinio ligomis, senyviems pacientams. Pacientams, sergantiems bronchine astma ar alergine ligomis, gali išsivystyti bronchų spazmas. Virškinimo trakto sutrikimai ir lėtinis uždegiminis žarnyno ligos gali pabūti. Atsiradus virškinimo trakto kraujavimui ar išopėjimui, gydymas turi būti nedelsiant nutrauktas. Vartojimas gali mažinti moters vaisiingumą. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Pakuotė:** 10 pėvele dengtų tablečių. **Farmakoterapinė grupė:** nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo. **ATC kodas:** M01AE01. **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:** „Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.“, Schlosplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. **Paskutinė teksto peržiūros data:** 2021-04-22.

NUSIMESK SKAUSMO KAUKĘ!

KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIAI, INHALIATORIAI IR TERMOMETRAI

iki
-35%



OMRON

Hipertenzija ir prieširdžių virpėjimas (AFib) yra du pagrindiniai insulto rizikos veiksniai. Matuokite kraujospūdį kasdien, jau 80 metų Omron yra naujausių technologijų lyderis. Su žingsniamačiu WSLII: atskirytis nereikalingo svorio, skatinkite medžiagų apykaitą, sutvirtinkite raumenis. Džiaukitės ir išliktie jauni! Naujiena Lietuvoje „Omron“ bekontaktis termometras GT720. Saugus, patogus ir greitas matavimas. Ypač patogus tėvams, auginantiesiems mažus vaikus. Gydyti inhalacijomis – puikus pasirinkimas visai šeimai! Dažnas kosulys, švokštimas, dusulys, skausmas krūtineje, laringitas, astma ar tiesiog persilimas... „Omron“ inhalatoriai padės sušvelninti šiuos simptomus. Jie veikia tyliai, labai smulkios dalelės, greitas vaistų išsiskirkimas.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

NUO SKAUSMO IR UŽDEGIMO

nuo
6⁹⁹



ODIFLAN

ODIFLAN 20 mg/g gels, 50 g **6⁹⁹ €**
ODIFLAN 20 mg/g gels, 100 g **10⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 g gelio yra 23,2 mg diklofenako dietilamino, atitinkantis 20 mg diklofenako natrio druskos. **Terapinės indikacijos:** suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams skirtas lokaliai simptominiams skausmams malšinti, esant ūminiams reumtoidiniams, patempimams ar sumušimams po bėgimo traumoms. 14 m. ir vyresniems paaugliams vaistinis preparatas skirtas greitam trumpą laiką. **Dovazavimas ir vartojimo būdas:** „Odiflan“ reikia vartoti ant odos 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Atsivėlantį į gydymosi pabėtos vietas dydį, reikia nuo viršaus iki galios nedideliu kiekiu, atitinkančiu 1–4 g gels, kuris atitinka 20–80 mg diklofenako natrio druskos. Ūdžiausia paros dozė yra 8 g gels, kuris atitinka 160 mg diklofenako natrio druskos. Vartojimo trukmė priklauso nuo simptomų bei pagrindinės ligos. Be gydymo patarimo „Odiflan“ negalima vartoti ilgiau kaip 1 savaitę, jeigu per 3–5 dienas simptomai nepalengvėja arba net pasunkėja, būtina gydytojo konsultacija. **Kontraindikacijos:** „Odiflan“ vartoti negalima: jeigu yra alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu jums kada nors anksčiau pavartojus acetilsalicilo rūgšties arba kitų NVNU (pvz., ibuprofeno) buvo sutrikęs kvėpavimas (astma, bronchų spazmas), pasireiškė dilgėlinė, sloga, veido arba liežuvio patinimas; esant odos arba gleivinių atviroms žaizdoms, uždegimui arba infekcijai, taip pat sergant egzema, psoriatiniu nešūmo trimediu, jaunesniems kaip 14 m. vaikams ir paaugliams. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės reikalingi, jei sergate astma, šienlige, nosies gleivinės patinimu ar kitomis obstrukcinėmis plaučių ligomis, lėtinėmis kepenų ar inkstų funkcijomis arba yra padidėjęs jautrumas kitoms skausmą malšinantiems vaistams ir bet kuriems vaistams nuo reumatizmo; taip pat pacientams, kurie yra alergiški kitoms medžiagoms ir kuriems būna odos reakcijų, pasireiškia niežulys arba dilgėlinė. Kai „Odiflan“ vartojama dideliam odos plotui ir ilgai gydyti, negalima pakeičti galimo sisteminio šalutinio poveikio. „Odiflan“ galima vartoti tik ant nepažeistos ir sveikos odos. Žūreklė, kad nepatektų į akis ir nekontaktuoti su gleivėmis. Nesinaudojate oro nepaleidžiančiais tvarsčiais. „Odiflan“ vartojimą reikia nutraukti, jei atsiranda odos bėrimas. Vartodami šį vaistą venkite saulės spindulių, taip pat nesinaudojate soliariumu. Saugokite, kad vaikai negalėtų paliesti šio vaisto gydymo odos vietų. Teksto peržiūros data: 2020-09-30. *Palyginus su Ofilen 1% geliu.

MAKSIMALUS SKAUSMO MALŠINIMAS*

KVĖPAVIMO TAKŲ GLEIVĖMS SKYSTINTI

4⁹⁹



RESPIFORTIN 600 mg, 10 šnypščiujų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 šnypščiuje tablete yra 600 mg acetilcisteino. **Indikacijos:** trumpalaikiam gleivių skystinimui sergant ūminėmis kvėpavimo takų ligomis (persilimu), susijusiomis su padidėjusiu tiršty ir klampių gleivių išsiskyrimu. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Šnypščiuje tablete reikia ištrinti 1/2 stiklinės vandens ir nedelsiant išgerti. Dėl galimo suskystėjusių gleivių susikaupimo bronchuose reikia vartoti likus bent 4 valandoms iki miego. Gydymo metu rekomenduojama vartoti daug skysčių. **Kontraindikacijos:** negalima vartoti padidėjus jautrumui veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, esant astmei būklei, sergant fenilketonurija, esant skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, jaunesniems nei 2 metų vaikams; taip pat netinkamas vartoti vaikams ir paaugliams nuo 2 iki 18 metų. **Specialūs įspėjimai:** jei kai kuria reikia vartoti acetilcisteiną ir per burną vartojamus antibiotikus, šiuos vaistus preparatus reikia vartoti su bent 2 valandų pertrauka. Gamintojo atstovas: „Natur Produkt Vilnius“, Konstitucijos pr. 12, Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2019-09-26.

NUO RĖMENS

nuo
2⁹⁹



MAALOX

MAALOX 400 mg/400 mg kramtomosios tabletės (be cukraus), 40 tablečių **2⁹⁹ €**
MAALOX 40 mg/35 mg/ml geriamoji suspensija, 250 ml **3⁹⁹ €**
MAALOX 460 mg/400 mg/4,3 ml geriamoji suspensija, 20 pakėtelį **4⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: viename vienodoame 4,3 ml geriamosios suspensijos pakėtelėje yra 460 mg aliuminio hidroksido ir 400 mg magnio hidroksido; vienoje kramtomosios tablete yra 400 mg magnio hidroksido ir 400 mg aliuminio hidroksido; viename ml geriamosios suspensijos yra 40 mg magnio hidroksido ir 35 mg aliuminio hidroksido. **Indikacijos:** rėmens ir skrandžio turinio kilimo į stemplę simptomams malšinti suaugusiems ir paaugliams nuo 15 metų. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** **Suspensija:** gerama po 1 arba 2 vienodo pakėtelį turinį, pasireiškus rėmeniui arba refliksui; negalima gerti daugiau kaip 8 pakėtelį per parą; prieš atliekant pakėtelį, jį reikėtų švelniai paspausti; suspensiją reikėtų gerti neskiedžiant. Buteliuko suspensija gerama po vieną valgomąjį šaukštą (15 ml) pasireiškus rėmeniui arba skrandžio turinio refliksui į stemplę; negalima gerti daugiau kaip 6 valgomųjų šaukštų (90 ml) per parą. Šio vaisto negalima vartoti ilgiau kaip 10 dienų. **Tabletės:** sučiulpti arba sukramtyti 1–2 tabletes, pajutus rėmenį arba atsiradus refliksui; negalima vartoti daugiau kaip 6 kartus per parą ir daugiau kaip 8 tablečių per parą. **Kontraindikacijos:** alergija (padidėjęs jautrumas) magnio hidroksidui ar aliuminio hidroksidui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sunki inkstų liga; stiprus pilvo skausmas arba įtarimas žarnų nepriėmumams. **Specialūs įspėjimai:** vaista galima vartoti tik pastarais su gydytoju, jeigu mažėja kūno svoris, kraujavimas arba anksčiau yra kraujavę iš virškinimo trakto, sutrikęs rijimas arba nuolat jaučiate nemalonų pojūtį pilve, virškinimo sutrikimų atsiradimą pirmą kartą arba je neseniai pakito, sergate inkstų liga. Pacientams, kuriems nustatytas inkstų funkcijos sutrikimas, jaunesniems kaip 2 metų vaikams, senyviems pacientams bei kitoms pacientams, kuriems yra fosforo trūkumo pavojus, prieš pradėdami vartoti Maalox reikia kreiptis į gydytoją. Norint išvengti perdozavimo, negalima kartu vartoti vaistinių preparatų, savo sudėtyje turinčių aliuminio hidroksido ir magnio hidroksido. Atsargumo dėlei tarp bet kokių per burną vartojamų vaistų ir antacidinio vaisto vartojimo turi būti bent 2 valandų (vartojant fluorochinolonų – 4 valandų) intervalas, jeigu gydytojas jums yra sakęs, kad netoleruotumėte kokių nors anslavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Maalox (be cukraus) tabletės tinka cukriniu diabetu sergantiems pacientams. Teksto parengimo data: 2021 m. kovo mėn. Reklamos teksto parengimo data: 04/2021. MAT-LT-2100180 V.1.0

GREITA PAGALBA NUO RĖMENS!

INFEKČINĖMS ODOS LIGOMS GYDYTI

nuo
8⁹⁹



NIZORAL 20 mg/g šampūnas, 60 ml **8⁹⁹ €**
NIZORAL 20 mg/g šampūnas, 100 ml **12⁹⁹ €**

Ketokonazolas

VAISTAS INFEKČINĖMS ODOS LIGOMS GYDYTI IR PROFILAKTIKAI

Indikacijos: šampūnas yra vaistas, vartojamas toliau išvardytoms infekcinėms odos ligoms, kurias sukelė grybeliai, gydyti:
- sėleninis galvos odos pleiskanėjimas (Pityriasis capitis);
- seborėjinis dermatitas (rausvai rudos dėmės, padengtos gelsvomis arba baltomis pleiskanomis);
- įvairiaspalvė dedervinė (Pityriasis versicolor) (ant liemens esančios mažos, rudos ar baltos spalvos, nelygios kraštais dėmės). „Nizoral“ šampūnas tinka Pityriasis capitis ir seborėjinio dermatito profilaktikai.
Vartojimas: paaugliams ir suaugusiems. Pažeista oda reikia sudrėkinti „Nizoral“ šampūnu ir palaikyti 3–5 minutes, kad įsigytų (paprastai vienam kartui užtektina vienos šampūno). Po to odą ir plaukus reikia gerai nuplauti vandeniu. Odos drėkinimo šampūno dažnis priklauso nuo grybelių rūšies ir nuo to, ar vaistas vartojamas ligai gydyti, ar jos profilaktikai.
Gydant galvos odos seborėjinį dermatitą ir pleiskanojimą; odą „Nizoral“ šampūnu reikia plauti 2 kartus per savaitę 2–4 savaites, ligos atsinaujinimo profilaktikai – 1 kartą per savaitę arba kas dvi savaites.
Gydant įvairiaspalvę dedervinę; odą „Nizoral“ šampūnu reikia plauti 1 kartą per dieną, 1 dieną.
Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai: šampūno vartoti negalima, jeigu yra alergija ketokonazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (suderinta šampūno odą parausta, pradeda niežėti). Pakuotės lapelio peržiūros data 2019 06 20. Reklamos teksto parengimo data 2020 05 06.

4⁴⁹



TAVEGYL 1 mg, 20 tablečių.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: Vienoje tablete yra 1,34 mg klemastino fumarato, kuris atitinka 1 mg klemastino. **Indikacijos:** tinka šieno slogas ar kitokios alerginės rinopatijos, įvairių prietaisų sukeltos dilgėlinės, įskaitant dermatografinę dilgėlinę, niežulio, niežėjimą sukeliančios dermatozės, vazodilijavimo ir įkandimo gydymui. **Vartojimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams du kartus per parą iš ryto ir vakare gerti po 1 tabletę (1 mg). 6–12 metų vaikams reikia gerti prieš pusryčius ir vakare, prieš miegą, po pusės (0,5 mg) arba vienos (1 mg) Tavegyl tabletės. 3–6 metų vaikams reikia gerti prieš pusryčius ir vakare, prieš miegą, po pusės (0,5 mg) Tavegyl tabletes. Tabletes reikėtų gerti prieš valgį užsigeriant vandeniu. Vartoti tik per burną. **Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai:** padidėjęs jautrumas klemastinui, kitokiams antihistamininiams vaistiniams preparatams ar bet kuriai kitai pagalbinei medžiagai, porfirija, pacientas jaunesnis negu 3 metų vaikas, atsarčiai vartoti turi pacientai, sergantys: uždarą kampo glaukoma; stenozę sukeliančia peptine opa; dvylikapirštės žarnos obstrukcija; prostatos hipertrofija, dėl kurios susiaukio šlapimas; bei šlapimo pūslės kiaušelio obstrukcija. Tavegyl tablečių sudėtyje yra laktozės. Tavegyl negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktozės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Vaistinių preparatų reikia at-sargiai skirti epilepsijai sergantiems arba praėjus traukulius patyrusiems pacientams. Pakuotės lapelio peržiūros data: 2021-01-29. Reklamos teksto parengimo data: 2021 03 18.



iki
-40%



JAMIESON

Jamieson C 500mg, 100 tablečių **13⁹⁹ 8⁹⁹ € -40 %**

Jamieson C Mix 500mg, 120 tablečių **14⁹⁹ 8⁹⁹ € -40 %**

Jamieson cinkas su ežiuole ir vit. C & D, 30 tablečių **8⁹⁹ 5⁹⁴ € -30 %**

Jamieson Vitaminas C 1000mg, 10 tirpiųjų tablečių **6⁹⁹ 4⁹⁹ € -40 %**

MAISTO PAPILDAI

„BLOXIVIR“ SAUGO NUO VIRUSŲ*, KURIE SUKELIA COVID-19, PERŠALIMĄ IR GRIPĄ.

-20% **13⁷⁵**
17⁹⁹



BLOXIVIR GELINIS NOSIES PURŠKALAS, 20 ml
BLOXIVIR GELINIS BURNOS PURŠKALAS, 20 ml

MEDICINOS PRIEMONĖS

Įpurškus ant nosies ar burnos gleivinės, Bloxivir suformuoja sluoksnį, kuris yra mechaninis patogenų barjeras, o jo sudėtyje esančios medžiagos – jona-karageninas, natris hialuronatas ir ektoinas – panaikina patogenus. Todėl Bloxivir saugo nuo itin užkrečiamų koronavirusų ir B, C tipo gripo virusų, palengvina infekcijos simptomus ir sutrumpina jos trukmę. Jei šią priemonę vartojate užkirsti (taip pat besimptomiai) asmenys, Bloxivir sumažina riziką užkirsti kitus. Tinka suaugusiems ir vyresniems nei 1-ųjų metų amžiaus vaikams. Vartojimas: nosies purškalo vartoti po 1 gilio dozės / kiekvieną šnervę, burnos purškalo 1–2 dozes užpūsti ant liežuvio. Vartoti kas 4–5 valandas. Apsauginis poveikis pasireiškia iš karto pavartojus. Pakuotėje yra net 200 preparato dozių. *Koronavirusų ir B, C tipo gripo virusų.

BLOXIVIR. VIRUSŲ* BARJERAI!

-15% **875**
10⁹⁹



MAGNETRANS

MAGNETRANS DIRECT, granulės gėrimui ruošti, 20 paketėlių
MAGNETRANS DRINK, burnoje tirpstantios granulės, 20 paketėlių

MAISTO PAPILDAI

1 paketėlyje yra 375 mg magnio. Tik 1 paketėlis per dieną. Magnis naudingas daugeliui mūsų organizmo procesų: padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą, raumenų ir psichologinę funkciją, normalią kaulų ir dantų būklę. Dalies žmonių magnio poreikis yra didesnis, pavyzdžiui, žmonių, dirbančių sunkų protinį ir fizinį darbą, sportininkų, paauglių, neščių moterų, vyresnio amžiaus žmonių. Svarbu įvertinti subalansuotą mitybą bei sveiką gyvenimo būdą.

„MAGNETRANS“ – JUDĖK LAISVAI!

NUGAROS, SPRANDO SKAUSMAMS IR RADIKULITUI GYDYTI

5⁹⁹



KAPSIKAM® vaistinis šildomasis tepalas, 50 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Tepalas Kapsikam®. Nereceptinis vaistas. 1 g tepalo yra 50 mg dimetilsulfoksido, 30 mg raceminio kamparo, 30 mg terpentino eterinio aliejaus, 20 mg benzilnikotinato, 2 mg nonivamido. **Terapinės indikacijos:** vietinis raumenų ir sąnarių skausmo malšinimas. **Dozavimas ir naudojimo būdas:** norint sukelti skausmą malšinantį poveikį, ant skaudamos vietos aplikatoriumi užtepama 1–3 g (6–18 cm) tepalo 2–3 kartus per parą, atsižvelgiant į skausmo intensyvumą. Norint ilgiau išlaikyti šildomąjį tepalo poveikį, ant skaudamos vietos reikia uždėti tvarstį. Didžiausia vienkartinė dozė – 3 g. Didžiausia paros dozė – 9 g. Po kiekvienos procedūros reikia nusiplauti rankas šaltu vandeniu su muilu. Naudoti ant odos. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Odos opos, žaizdos bei ligos, kai yra pažeistas odos paviršius. **Vietinis rinkodaros teisės turėtojo atstovas:** AB „Grindeks“ filialas, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2020-12-05.

MANO JĖGA JUDĖJIME!

NUO RAUMENŲ IR SĄNARIŲ SKAUSMO

nuo
5⁹⁹



VIPROSAL B®

VIPROSAL B®, tepalas, 50 g **5⁹⁹ €**

VIPROSAL B®, tepalas, 75 g **7⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo yra 0,05 V gyvyčių nuodų, 10 mg salicilo rūgšties, 30 mg raceminio kamparo ir 30 mg terpentino eterinio aliejaus. **Indikacijos:** sąnarių ir raumenų skausmų malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** nedidelis „Viprosal B®“ kiekis (5–10 g, t. y. 1 ar 2 arbatiniai šaukšteliai, atsižvelgiant į pažeistos vietos plotą) užtepamas ant skaudamos vietos ir įtrinamas į odą 1 arba 2 kartus per parą. Tepti ant odos. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, odos opa ar kitos odos ligos. **Specialūs įspėjimai:** „Viprosal B®“ negalima tepti ant pažeistos odos. Saugotis, kad tepalo nepatektų ant gleivinės ar į akis. Vietinis rinkodaros teisės turėtojo atstovas: AB „Grindeks“ filialas, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2021-09-15.

VIPROSAL B – IŠMINTINGAS PASIRINKIMAS NUO SKAUSMO!

KEPENIMS

7⁷⁹



ESSENTIALE FORTE N 300 mg, 30 kietųjų kapsulių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje yra 300 mg arba 600 mg sojų fosfolipidų. **Indikacijos:** simptomų, tokių kaip apetito stoka, spaudimo pojūtis dešinėje pošonkaulinėje srityje, atsiradusių dėl toksinio ir mitybos kepenų pažeidimo ar hepatito, malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams vienkartinė dozė – dvi 300 mg kietosios kapsulės arba viena 600 mg kietoji kapsulė. Paros dozė – po dvi 300 mg kietosias kapsules arba po vieną 600 mg kietąją kapsulę 3 kartus per parą (1 800 mg sojų fosfolipidų). Essentiale forte N saugomas ir veiksmingas vaikams ir paaugliams iki 12 metų neiširti. Del šios priežasties Essentiale forte N neturėtų būti vartojamas vaikams ir paaugliams iki 12 metų. Kapsulės geriamos valgio metu, nekramtytos, užgeriant dideliu skysčiu (pvz., stikline vandens). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Padidėjęs jautrumas žemės riešutams arba sojomis arba sojų pupelių produktams, pvz., fosfatidilcholinui. **Specialūs įspėjimai:** Essentiale forte N neapsaugo nuo toksinio medžiagų (pvz., alkoholio) sukeltų kepenų pažeidimo. Jei yra kepenų pažeidimas, negalima vartoti alkoholio. Essentiale forte N gali silpninti kraują skystinančių vaistų poveikį, todėl gali prireikti koreguoti pastarųjų vaistų dozę. Essentiale forte N sudėtyje yra rafinuoto sojų aliejaus, hidrinto ricinos aliejaus ir etanolio. Ricinos aliejaus gali sukelti skrandžio sutrikimų ir viduriavimą. Šio vaisto sudėtyje yra mažas etanolio kiekis. Teksto parengimo data: 2018 m. kovo mėn. Reklamos teksto parengimo data: 01/2021. MAT-LT-2000340 V.1.1

MAKSIMALI PAGALBA KEPENIMS!

LAIMĖS VALANDOS



Darbo dienomis
8–9 val. ir 14–15 val.*

Šeštadieniais
8–9 val. ir 14–15 val.*

Sekmadieniais
14–15 val.*



-30%

Perkant 3**
ir daugiau prekių

** vaistams – 25 %

-25%

Perkant 2**
ir daugiau prekių

* vaistams – 20 %

-20%

Perkant 1* prekę

NORFOS vaistinėje akcijos „LAIMĖS VALANDOS“ metu perkant 1 prekę, taikoma 20 %, 2 ir daugiau prekių – 25 %, vaistams 20 %, 3 ir daugiau prekių – 30 % nuolaida, vaistams -25 %. Taikomos momentinės 20 ar 25 % nuolaidos vaistams ir vaistiniams preparatams, o kitoms prekėms – 20, 25 ar 30 % nuolaidos, priklausomai nuo atitinkamo pirkimo metu įsigijamų prekių bendro kiekio. Nuolaida taikoma perkant pilnas prekių pakuotes, kurių kiekvienos vertė ne mažesnė nei 1,50 €. Prekės, perkant pagal kompensuojamąjį receptą, vardiniai, kartiniai vaistai skaičiuojami į krepšelį, tačiau nuolaida netaikoma. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Nuolaidos netaikomos perkant pagal kompensuojamąjį receptą, pradinio maitinimo pieno mišinius, kartinius (gaminamius vaistinėje) ir vardinį vaistus, įsigyjant dovanų kuponus. Nuolaidos netaikomos perkant www.nvaistine.lt, neatsižvelgiant į tai, kad už prekes atsi- skaitoma jas atsiimant vaistinėse. Nuolaidos netaikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Visos nuolaidos galioja tik su PC NORFA lojalumo kortele. Informacija apie kitas akcijas ir prekes, kurioms netaikoma akcijos „LAIMĖS VALANDOS“ nuolaidos, suteikiama kiekvienoje vaistinėje, el.paštu info@nvaistine.lt arba nemokamu telefonu 8 800 10008. Informaciją apie kitu nei nurodyta laiku vykstančias LAIMĖS VALANDAS rasite www.nvaistine.lt.

5⁴⁹

STREPSILS

Honey & Lemon 1,2 mg/0,6 mg, 24 kietosios pastilės
Vitamin C 1,2 mg/0,6 mg/100 mg, 24 kietosios pastilės
Menthol & Eucalyptus 1,2 mg/0,6 mg/8 mg, 24 kietosios pastilės

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Kiekvienoje kietosioje pastilėje yra 1,2 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio, 0,6 mg amilmetakrezolio, 100 mg askorbo rūgšties (Strepsils Vitamin C) ir 8 mg levomentolio (Strepsils Menthol & Eucalyptus). **Terapinės indikacijos:** lokaliai simptominiams ryklės uždegimo gydymas. **Dovazimas ir vartojimo metodas:** Strepsils Menthol & Eucalyptus: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vaikams leisti čiulpti po 1 pastilę kas 2-3 valandas, bet ne daugiau kaip 8 pastiles per 24 val. Strepsils Vitamin C: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 6 metų vaikams čiulpti po 1 pastilę kas 2-3 valandas, bet ne daugiau kaip 8 pastiles per 24 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Jaunesniems nei 12 metų vaikams (Strepsils Menthol & Eucalyptus). Jaunesniems nei 6 metų vaikams (Strepsils Honey & Lemon ir Strepsils Vitamin C). **Specialūs įspėjimai:** dėl užspringimo pavojaus šių vaistinių preparatų nerekomenduojama vartoti mažiems vaikams. Atsargumo priemonių reikia cukriniu diabetu sergantiems pacientams, nes vienoje pastilėje yra 2,4 g cukraus ir 2,5 g cukraus (Strepsils Menthol & Eucalyptus). Šių vaistų negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Strepsils Vitamin C sudėtyje yra azodaktilių - Ponso 4R (E124) ir saulėlydžio geltonojo (E110), kurie gali sukelti alerginių reakcijų.

EMILI ASKORBO RŪGŠTIS
50 mg (vitaminas C), 200 dražė

MAISTO PAPILDAS SU CUKRUMI
Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninę, nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

-30% 1⁴⁶

FLAVAMED

FLAVAMED 30 mg, 20 tablečių 2⁹⁹ €
FLAVAMED 60 mg, 10 šnypščijų tablečių 4⁴⁹ €
FLAVAMED 30 mg/5 ml, geriamasis tirpalas, 100 ml 4²⁹ €
FLAVAMED 15 mg/5 ml, geriamasis tirpalas, 100 ml 3⁷⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Ambrosolio hidrochloridas. Nereceptinis vaistas. „Flavamed 30 mg“ tabletės: 1 tablete yra 30 mg ambrosolio hidrochlorido. „Flavamed 60 mg“ šnypščiosios tabletės: 1 tablete yra 60 mg ambrosolio hidrochlorido. „Flavamed 30 mg/5 ml“ geriamasis tirpalas: 1 matavimo šaukštė su 5 ml geriamojo tirpalo yra 30 mg ambrosolio hidrochlorido. „Flavamed 15 mg/5 ml“ geriamasis tirpalas: 1 matavimo šaukštė su 5 ml geriamojo tirpalo yra 15 mg ambrosolio hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** „Flavamed“ vartojamas sergant plaučių ir bronchių ligomis, kai susidaro klampios gleivės. Suskystina klampias gleives ir jos gali lengviau pašalinti. **Vartojimo būdas:** geriamasis tirpalas vartojamas po valgio, naudojant matavimo šaukštą. Šnypščiosios tabletės ištrinamos stiklineje vandens ir tirpalas geriamas po valgio. 30 mg tabletės reikia nuryti nesukramtytas po valgio, užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio. Suaugusiems ir vaikams, vyresniems kaip 12 m., po 30 mg ambrosolio hidrochlorido 3 kartus per parą pirmąsias 2 ar 3 dienas, vėliau – po 30 mg ambrosolio hidrochlorido 2 kartus per parą, 6–12 m. vaikams po 15 mg ambrosolio hidrochlorido 2–3 kartus per parą, 2–5 m. vaikams po 7,5 mg 3 kartus per parą. Be gydymo nurodymo ilgiau kaip 4–5 dienas „Flavamed“ vartoti negalima. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. „Flavamed 30 mg“ tablečių negalima vartoti vaikams iki 6 metų. „Flavamed 60 mg“ šnypščijų tablečių negalima vartoti vaikams iki 12 metų. „Flavamed 30 mg/5 ml“ ir 15 mg/5 ml geriamojo tirpalo negalima vartoti vaikams iki 2 metų. **Specialūs įspėjimai:** pastariktė su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Flavamed“, jeigu jums praėjusieji pastarieji labai sunkių padidėjusio jautrumo odos reakcijų (Siveroso-Urtensono sindromas ar Lajelo sindromas). Atsargiai reikėtų vartoti pacientams, sutrikus bronchių epitelio motorikai ir esant gausiai sekrecijai; sutrikus inkstų funkcijai arba sergant sunkia kepenų liga; praėjusieji buvus pepsinės opos; esant hidradidrosi. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas galaktozės arba fruktozės netoleravimas, laktozės trūkumas, gliukozės ir galaktozės absorbcijos sutrikimas. Reklamos teksto parengimo data 2020-01. LT. Fl. 03_2020

„FLAVAMED“ – EFEKTYVUS DRĖGNO KOSULIO PALENGVINIMAS.

nuo 2⁹⁹

NUO SLOGOS

OTRIVIN

OTRIVIN MENTHOL, 1 mg/ml nosies purškalo (tirpalas), 10 ml 4⁹⁹ €
OTRIVIN 1 mg/ml nosies purškalo (tirpalas), 10 ml 4⁹⁹ €
OTRIVIN 0,5 mg/ml nosies lašai (tirpalas), 10 ml 3⁴⁹ €
OTRIVIN 1 mg/ml nosies lašai (tirpalas), 10 ml 3⁴⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Ksilometazolino hidrochloridas. **Indikacijos:** Nosies gleivinės paburkimo mažinimas, sergant sinusitu, šienlige ar kitokia alergine sloga. Nosies gleivinės paburkimo mažinimas, gydant vidurines ausies uždegimas. Nosies ertmės užsikimšimo lengvinimas. **Vartojimas:** Otrivin 0,5 mg/ml nosies lašai: 2–5 m. vaikais: po 1–2 lašus į kiekvieną nosies landą 1–2 k./parą (kas 8–10 val.). 6–11 m. vaikais: po 2–3 lašus į kiekvieną nosies landą 2–3 k./parą, kai reikia. Otrivin 1 mg/ml nosies lašai: Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: po 2–3 lašus į kiekvieną nosies landą, kai reikia. Otrivin Menthol 1 mg/ml nosies purškalo ir Otrivin 1 mg/ml nosies purškalo: Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: po 1 purškimo į kiekvieną nosies landą, kai reikia. Negalima lašinti/purškinti daugiau kaip 3 dozes per parą į kiekvieną nosies landą. **Kontraindikacijos:** Alergija ksilometazolinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, pacientams, kuriems neseniai buvo atlikta operacija per nosį, sergantiems uždaruoju kampo glaukoma (padidėjęs spaudimas akyje), lėtinio nosies uždegimo (sausųjų nosies gleivinės uždegimo arba atrofiniu rinitu). **Specialūs įspėjimai:** Negalima vartoti ilgiau kaip 7 d. iš eilės. Negalima viršyti rekomenduojamos dozės, ypač vaikams ir pagyvenusiems žmonėms. Atsargiai vartoti, jeigu yra padidėjęs kraujospūdis, širdies liga, (pažeidusio QT intervalo sindromas), cukrinis diabetas, padidėjęs skydlaukės aktyvumas, padidėjusi prostata, gerybinis antinksnių auglys, jeigu vartojate arba per pastarūnes 2 sav. vartojate vaistų nuo depresijos ar Parkinsono ligos, vadinamų MAOI. Pradome išimtinai perskaityti pakutes lašelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Neįkramti vartojamas vaistas gali pakelti įsūję sveikata. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutiniai poveikiai, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininku ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujama@vkc.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkc.lt. Teksto parengimo data 2020 m. rugpjūtio 28 d. NP-LT-OTR-200-00001

nuo 3⁴⁹

PERŠALUS

ACTIFED®

ACTIFED® 60 mg/2,5 mg tabletės, 12 tablečių
ACTIFED® 30 mg/1,25 mg/5 ml sirupas, 100 ml

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 tablete yra 60 mg pseudoefedrinio hidrochlorido ir 2,5 mg tripolidino hidrochlorido / 5 ml sirupo yra 30 mg pseudoefedrinio hidrochlorido ir 1,25 mg tripolidino hidrochlorido. **Indikacijos:** nosies ir viršutinių kvėpavimo takų gleivinės užburkimo (užgulimo) peršalus mažinimas. Nosies tekėjimo ir čiaudulio slopinimas. **Dovazimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: po 1 tabletę arba po 10 ml sirupo kas 4–6 val. iki 4 kartų per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Pacientai, kurie vartoja ar per pastarūnes 14 dienų vartoję monoamino oksidazės inhibitorius. Širdies ir kraujagyslių ligos, hipertenzija, sunkus inkstų funkcijos sutrikimas, diabetas, feochromocitoma, hipertiroidizmas, uždaruoju kampo glaukoma. Draudžiama kartu vartoti kitus simptomatinius dekongestantus ir beta blokatorius. Vaikai iki 12 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „ACTIFED“ gali sukelti mieguistumą. Nevartoti kartu alkoholio. „ACTIFED“ vartojimą reikia nutraukti, jei pasireiškia šie sutrikimai: haliucinacijos, neramumas, miego sutrikimai, karščiavimas ir išplitusi raudona odos spalva, padidėjęs širdies ritmas, regos arba sumažėjęs regos aštrumas, staigus pilvo skausmas, kraujavimas iš išangės ar kitų išeminio kolito simptomai. Pacientai, sergantys kepenų liga, vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimu, „ACTIFED“ turėtų vartoti atsargiai. Vaistas negali būti vartojamas vaikams raminti. „ACTIFED“ tablečių sudėtyje yra laktozės – jeigu gydytąs jums yra sašes, kad netoleruotų kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „ACTIFED“ sirupo sudėtyje yra saulėlydžio geltonojo (gali sukelti alerginių reakcijų), metilo parahidroksibenzoato (gali sukelti alerginių reakcijų, kurios gali būti uždeltos), sacharozės (jeigu gydytąs jums yra sašes, kad netoleruotų kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Būtina atsivelti cukriniu diabetu sergantiems pacientams). **Teksto peržiūros data:** 2021.08.17. LT-MU-2100002.

GREITAS PALENGVĖJIMAS PERŠALUS.

7⁴⁹

ASKORUTINAS

Maisto papildas 50 tablečių

МАРБИОФАРМ

ASKORUTINAS, 50 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Tai askorbo rūgšties (vit. C) ir rutino preparatas. Askorbo rūgštis yra viena iš svarbiausių medžiagų, reikalingų normaliai žmogaus organizmo veiklai. Ji padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, normalią nervų sistemos veiklą, normalią imuninės sistemos veiklą intensyviausiu fiziniu krūviu metu ir po jo; padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, gerina geležies absorbciją. Siurbia įvairius ir subalansuota mityba bei sveikats gyvenimo būdas. Vartojamas: gerti po 1 tabletę 2 kartus per dieną valgant arba po valgio. Gamintojas – Marbiofarm, Rusija.

PIGU 1⁸⁹



MIRAMILE

MIRAMILE KIDS, burnos ir gerklės sirupas, 100 ml
MIRAMILE TONSIL, burnos ir gerklės purškalas, 30 ml
MEDICINOS PRIEMONĖS

MIRAMILE, 12 kietųjų pastilių
MAISTO PAPILDAS

„Miramile kids“ burnos ir gerklės sirupas vaikams malšina gerklės skausmą, palengvina kosulį. Sudėtyje yra gerklės ir kosuliui naudingų augalų ekstraktų: čiobrelių, sausųjų šėnavėdžių, svilarožių, juodųjų serbentų. Tinka vartoti vaikams nuo 1 metų.

„Miramile Tonsil“ – šaltalankių aliejus, miramedžių aliejus, medetkų aliejus, apelsininių citrinmedžių aliejus, karčiųjų migdolų aliejus, čiobrelių eterinis aliejus, pipirmėčių eterinis aliejus. Padės skaudančiai burnai ar gerklei, užkims, mažinti uždegimo simptomus. Šis burnos ir gerklės purškalkas tinka ir vaikams nuo 2 metų.

„Miramile“ augalinės pastilės gerklei, kvėpavimo takams ir imunitetui: svilarožių, metos, eukaliptai turi malonų poveikį burnos, gerklės ir ryklės gleivinei bei balso stygomis. Išlandinės kepenos ir mentolis padeda palaikyti kvėpavimo takų veiklą. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vartojimas: rekomenduojama suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų 3–6 kartus per dieną po 1 pastilę laikyti burnoje, kol ištirps.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

iki
-25%



VITIRON™

VITIRON™ Immunity Strong, 30 kapsulių

VITIRON™ MAN MULTILONG, 30 kapsulių

VITIRON™ D3 Olive SUN, 10ml

MAISTO PAPILDAI

„Vitiron“ Man MultiLong – 13 vitaminų ir 13 mineralinių medžiagų bei mikroelementų kompleksas specialiai sukurtas vyrams. Dėl specialios kapsulės matricos mikroelementai palaipsniui, per 5 val., išsiskiria į organizmą, todėl užtikrinamas ilgai trunkantis poveikis ir efektyvesnis mikroelementų pasisavinimas.

AKTYVIAM IR SAVIMI PASTITIKINČIAM VYRUI!

„Vitiron“ D3 Olive SUN – vitaminas D išdirptas tyrame alyvuogių aliejuje, o tai užtikrina dar geresnę vitamino absorbciją, pasisavinimą bei nedidina skrandžio ir tulžies rūgščių. Viet 3 šio produkto stiprumai: 2000 TV ir 4000 TV, patenkins visos šėmos vitamino D poreikis – nuo kaulinio kauli suaugusiojo. Patogus ir greitas vitaminas D kiekvienam!

„Vitiron“ Immunity strong – Imuninės sistemos apsaugai ir kvėpavimo sistemos palaikymui!

Tai maistinės medžiagos ir vaistažolių ekstraktai, skirti organizmo imuninės sistemos apsaugai. Sudėtyje yra vitaminų C, D3, B6, B12, niacino, folio rūgšties ir kitų svarbių medžiagų, kurios padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Užduolė padeda palaikyti normalią viršutinių kvėpavimo takų funkciją, malšina gerklės ir ryklės dirginimą. Vitaminų sudėtyje nėra alergenių, dirbtinių dažiklių ir konservantų. Tinka vegetarams ir diabetu sergantiems žmonėms.

Vartojimas: vyresniems nei 12 metų vaikams ir suaugusiems po 1 kapsulę per dieną. Nerekomenduojama vartoti nėščiosioms ir žindančioms moterims.

Perkant pakuotę
antra tokia pati
DOVANŲ!

1+1



ALSIROYAL

Alsiroyal Cistus PLUS Infect Blocker, 30
čiulpiamųjų pastilių **12⁹⁹ 10⁴⁵ €**

Alsiroyal Acerola Plus Vitamin C,
30 prailginto veikimo tablečių **8⁹⁹ 7³⁰ €**

MAISTO PAPILDAS

Produktai, esantys po Alsiroyal pavadinimu, išskirtinai tuo, jog pagaminti vadovaujantis gamtą tausojančiais principais, atitinka aukščiausius Vokietijoje keliamus kokybės reikalavimus, tinkami vartoti vegetarams ir veganams.

Naujiens **Alsiroyal Cistus plus Infect Blocker** – antivirusinio poveikio pastilės, suformuojančios fizinį barjerą nuo įvairių tipų bakterijų ir virusų, tokiu būdu užkertant kelią infekcinės ir uždegiminės kilmės kvėpavimo takų susirgimams. Cistus plus Infect Blocker galima vartoti tiek profilaktiškai, tiek jau pajutus pirmuosius peršalimo simptomus. O **Alsiroyal Acerola plus** prailginto poveikio vitaminą C su cinku ir rekomenduojama vartoti siekiant palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Tai vitaminas C, kuris veikia visą dieną. Prailginto poveikio vitaminas C su cinku bei šėnavėdžių ir šaltalankių milteliais, malpigijų (acerolos) bei erškėtuogių ekstraktais.

-15%



-20%



HUMER

Humer – nosies higienos produktų, iš natūralių vaistinių medžiagų, ekspertas. Sprendimus kiekvienai užgulusiai nosiai.

„Humer“ naujienos kūdikiams ir vaikams

„Humer“ hipertoninis jūros vanduo užsikimšusiai kūdikių ir vaikų nosytei – atkems nosį ir padeda pašalinti gleives, pasireiškus peršalimui, sinusitui bei alerginiam rinitui nuo 3 mėnesių ir vyresniems kūdikiams bei vaikams.

„Humer“ gleivių aspiratorius – skirtas naudoti pasireiškus peršalimui, sinusitui ar kitai infekcijai, kuri sukelia gausią sekreciją iš nosies. Nosies ploviklis leidžia vaikui vėl pradėti normaliai kvėpuoti ir geriau jaustis.

„HUMER“ – DAUGIAU NEI JŪROS VANDUO.

„HUMER“ JUS IŠLAISVINA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



PAIRA ALTAI MUMIO, 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

2 tabletės yra 400 mg išvalyto mumijaus. Vartojimas: suaugusiems rekomenduojama vartoti po 1 tabletę 2 kartus per dieną, valgio metu.

PIGU 3⁵⁹



VITAMINAS D₃

40 µg, 80 kapsulių **9⁹⁹ 5⁸¹ €**

MAISTO PAPILDAS

Vitaminas D padeda palaikyti:

- normalią imuninės sistemos veiklą;
- normalią kaulų bei dantų būklę;
- normalią raumenų funkciją;
- normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą;
- normalią kalcio koncentraciją kraujyje.

Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.

VITAMINAS C 500 mg, apelsinų skonio, 40 kramtomųjų tablečių 7⁹⁹ 4⁷⁹ €

MAISTO PAPILDAS

Vitaminas C padeda palaikyti:

- normalią imuninės sistemos veiklą;
- normalią kolageno, reikalingo normaliai kraujagyslių funkcijai, odos funkcijai, kaulų funkcijai, kremlių funkcijai, dantų ir dantų funkcijai, susidarymą;
- normalią energijos apykaitą;
- normalią nervų sistemos veiklą ir psichologinę funkciją.

Vitaminas C padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

RYKLIŲ TAUKAI, 30 kapsulių 11⁴⁹ 6⁸⁹ €

MAISTO PAPILDAS

Su alkilgliceroliais, 1 kapsulėje yra 500 mg ryklių taukų, iš jų 100 mg alkilglicerolių ir polinesočiųjų riebiųjų rūgščių, 5 mg skvaleno. Alkilglicerolių koncentracija išgaunama tik ypatingos technologijos būdu, išgryninant išvalytus ir kruopščiai patikrintus ryklių kepenų taukus.

-40%



Pirkdami **NORFOS** vaistinėje Jūs gausite čekį, kuriuo galėsite apmokėti net **iki 40 %** sumos už šiuos produktus:

-40%

MEGA C 600 mg, 30 apelsinų skonio kramtomųjų tablečių 6⁹⁹ 3⁹⁵ €

MAISTO PAPILDAS SU SALKIKLIAIS

Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.



SUPER VITAMINAS C 600 mg, 30 tablečių 7⁹⁹ 4⁷³ €

MAISTO PAPILDAS

IMUNITETUI

VAISTAI NUO SKAUSMO IR UŽDEGIMO BEI PUIKUS VIRŠKINIMAS – AR TAI SUDERINAMA?

Sklando įvairiausi įsitikinimai apie tai, kad tiek **stiprūs vaistai nuo skausmo**, tiek ir silpnesni **vaistai nuo uždegimo** neigiamai veikia virškinimo sistemą, todėl kai kurie gyventojai sąmoningai vengia jų vartojimo. Tačiau vaistininkai sako, kad tikslingas ir tinkamas vaistų nuo skausmo vartojimas yra suderinamas su geru virškinimu.

„Labai dažnai pacientai, kuriems reikalingi vaistai nuo skausmo, mūsų klausia, ar medikamentai nepakenks skrandžiui, mat jie turi problemų. Gyventojus nuraminame pabrėždami, kad virškinimo sistema bei vaistai nuo uždegimo ir skausmo yra suderinami, parinkus tinkamą vaistą bei racionalų vartojimą konkrečiu atveju“, – komentuoja „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Raimonda Truncė.

Subalansuota mityba bei virškinimas

Anot vaistininkės, vienas iš paprasčiausių būdų padėti savo virškinimo sistemai – tai aktyvumo didinimas, reguliarius skysčių vartojimas bei subalansuota mityba.

„Labai dažnai girdime, kad per dieną reikia suvartoti ne mažiau nei 3 litrus vandens. Šią

taisyklę labiau galėtume pritaikyti didelio aktyvumo ar didesnę kūno masę turintiems žmonėms. Tada kyla klausimas, o kiek išties reikia to vandens. Vienas iš paprasčiausių būdų nustatyti rekomenduojamą paros vandens normą – remtis formule: kūno svorį padauginti iš 0,035 l. Tai reiškia, kad 65 kg sveriančiam žmogui per dieną reikia 2,27 litrų vandens“, – pataria ji.

Subalansuota mityba turi būti įvairiapusė – joje turi būti pakankamas kiekis baltymų, riebalų, angliavandenių bei ląstelienos. Visų šių medžiagų reikia natūraliems organizmo biocheminiams procesams vykti. R. Truncė atkreipia dėmesį į šiuo metu ypač gausiai naudojamus hidrintus riebalus, palmių riebalus bei pridėtinius cukrus, kurių savo mityboje reikėtų vengti.

„Kalbant apie fizinį aktyvumą, nesmerkite savęs, jei nesate nuolatinis sporto klubo narys, kuriame treniruojatės penkis kartus per savaitę. Jūs esate šaunūs, jei liftą iškeičiate į lipimą laiptais, į parduotuvę einate pėstute vietoj važiavimo automobiliu ar išeinat 15–20 min. pasivaikščioti spartesniu nei įprasta žingsniu taip suaktyvindami širdies darbą bei raumenų sistemą“, – vardija vaistininkė.



Maisto papildai virškinimui ir vaistai nuo uždegimo

Virškinimo sistemos bei imuninės sistemos veiklą, anot R. Truncės, gali pagerinti ciberžolės ir bifido bei lakto bakterijų turintys preparatai. Besiskundžiantiems nuolatinio vidurių užkietėjimu rekomenduojama rinktis gerąsias bakterijas, kurių sudėtyje yra inulino, kuris skatina žarnyno mikrofloros augimą bei magnio ir kalcio įsisavinimą. Natūraliai jo randama šakniavaisiuose, o inulino turintys augalai nekaupia krakmolo.

„Jei paciento virškinimas yra apsunkintas, patarčiau naudoti kartumynų turinčias arbatas, tokias kaip kartusis kietis ar kiaulpienių šaknys, kurie paskatina kasos fermento išsiskyrimą. Esant skrandžio gleivinės sudirgimui ar erozijoms, rytais ant tuščio skrandžio vartokite linų sėmenų nuovirą bei šaltalankių aliejų“, – natūraliais metodai dalijasi ji.

Vaistai nuo skausmo ir uždegimo, pasak vaistininkės, gali būti išskirti į dvi dalis: gydymą ir simptomų malšinimą. Jei žmogų kamuoja trumpalaikis skausmas, pavyzdžiui, atsiradęs dėl uždegimo ar traumos, tai nesteroidinio vaisto vartojimą būtų galima traktuoti kaip gydymą. Tačiau jei skausmas yra nuolatinis, pavyzdžiui, kamuoiant sąnarių patologijoms, tai vartojami priešuždegiminiai vaistai laikomi simptominiu gydymu.

„Ypač dažnai nuskausminamieji vaistai vartojami trumpalaikiam, simptominiam skausmui malšinti, pavyzdžiui, galvos, pilvo ar danties, mat skausmas žmogui – vienas iš nemaloniausių potyrių. Vaistininkai visada atsižvelgia į paciento išsakomus simptomus ir dažnai tenka paraginti žmogų kreiptis pas gydytojus, kad nekiltų didesnių sveikatos problemų, taip dirbdami sveikatos komandoje galime geriausiai padėti pacientui“, – pažymi R. Truncė.

Kartais perdozuoja, o kartais vengia be reikalo

„Gintarinės vaistinės“ vaistininkė pasakoja daugiausia istorijų apie neracionalų vaistų nuo skausmo vartojimą išgirstanti iš pacientų, kuriems suskausta dantį.

„Yra pasitaikę praktikoje atvejų, kai žmogus per 15 min. išgėrė 3 ar 5 tabletes nuo skausmo, nes jam nuo vienos tabletės skausmas nepraėjo iš karto. Nors daugelio vaistų poveikis prasideda per 10–15 min.“, – atkreipia dėmesį ji.

Kadangi įsitikinimas, jog vaistai nuo skausmo kenkia skrandžiui, yra itin paplitęs, nemaža pacientų dalis, esant kai kurioms klinikinėms situacijoms, pavyzdžiui, skaudant nugarai, vos tik dingus simptomams, nutraukia vaistų nuo skausmo vartojimą. Tačiau neišgydžius uždegimo iki galo ir nustojus vaistus gerti per anksti, galimas greitas ligos ir simptomų pasikartojimas.

„Taip pat dažnai mažus vaikus auginančios mamos linkusios vengti vaistų nuo skausmo. Kartais tenka mamas įkalbinėti, kad vienkartinė vaisto dozė nuo skausmo kūdikiui ar mažam vaikui, kuriam, pavyzdžiui, dygsta dantukai, yra naudingiau, nei besiformuojanti uždegiminė reakcija ir patiriamas skausmas. Dažnai net pajuokauju, kad vaikams dantukų skausmas toks pat nemalonus kaip ir suaugusiam žmogui, o pastarieji dažniausiai nelinkę kentėti“, – teigia R. Truncė.



PREPARATAMS VIRŠKINIMUI BEI KEPENIMS

iki
-35%



Pasiūlymai galioja **2022 01 01 - 2022 01 31**, perkant vaistinėje, pateikus PC NORFA kortelę. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą. Prekių kiekis ribotas. UAB „Norfos vaistinė“ pasilieka teisę bet kada keisti akcijos sąlygas. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.



NORMALIAM KŪNO SVORIIUI PALAIKYTI



NEW NORDIC

MAISTO PAPILDAS

Organizmui valyti – „BodyDrain“. Sudėtyje esantis artišokų ekstraktas padeda palaikyti normalią kepenų veiklą ir žarnyno būklę, valyti organizmą. Korių apykaitai – „Chili Burn“. Sudėtyje esantis chromas padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų apykaitą. Riebalų apykaitai – „Apple Cider 600“. Jo sudėtyje esantis cholinis padeda palaikyti normalią lipidų apykaitą. Guminukai – „Apple Cider GUMMIES“ – skanus ir patogus būdas vartoti obuolių sidro actą. Normaliam kūno svoriui palaikyti – „Seaweed Diet“. Sudėtyje esantys jūrų dumblių Ascophyllum nodosum padeda palaikyti normalią kūno svorį laikantis sumažintos energinės vertės dietos. Riebalų deginimui – „Fat Burner“. Jo sudėtyje esantis cholinis padeda palaikyti normalią lipidų apykaitą ir kepenų veiklą, o parašajiniai bugieniai (Yerba mate) padeda palaikyti normalų kūno svorį. Taip pat svarbu įvairi, subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

-40%

ESANT VIDURIAMUI

LOPERAMIDUM WZF POLFA 2 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga: loperamido hidrochloridas. **Indikacijos:** simptomini suaugusių ir vyresnių negu 12 metų paauyliū ūminio viduriavimo gydymas tokiu atveju, jei negalima pašalinti viduriavimo sukėlusios priežasties. **Dozavimas:** pradžioje geriami 2 tabletės (4 mg), vėliau – po 1 tabletę (2 mg) po kiekvieno išsistūsinimo nesufurmuotomis išmatomis. Draudžiama per parą gerti daugiau kaip 6 tabletes (12 mg). **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas loperamido hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jaunesni negu 12 metų pacientai; paralyžinis žarnų neparaeinamumas; vidurių užkietėjimas; pilvo pūtimas; organizme per mažai skysčių; pseudomembraninis kolitas, kurį dažniausiai sukelia plataus poveikio antibiotikai; ūminė bakterinė dizenterija, bei kitoks bakterinis viduriavimas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** loperamido hidrochloridų gydymas pacientams turi vartoti pakankamai vandens bei mineralinių medžiagų. Šio vaistinio preparato reikia atsargiai vartoti ligoniams, kuriems yra kepenų nepakankamumas. Sergant Krono liga, loperamido hidrochlorido reikia vartoti atsargiai. Jėgu pasireiškia vidurių užkietėjimas, pilvo pūtimas ar atsiranda pirmųjų žarnyno obstrukcijos simptomų, šio vaistinio preparato vartojimą būtina nutraukti. Jėgu ligonis karščiuoja bei jo išmatose yra kraujo, prieš pradėdant vartoti loperamido hidrochlorido, būtina išsiaiškinti tokio viduriavimo priežastį. Vartojant loperamido hidrochlorido, gali pasunkėti šlapinimasis. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Reklamos teksto parengimo data 2017-01.

GREITAI SUSTABDYVS VIDURIAVIMĄ.

3³⁹



EMILI ARBATOS VIRŠKINIMUI

Ajerų šakniastiebiai, 1,5 g x 20 pak.
Ajerų šakniastiebiai, 40 g
FITO CHOLAGOGA, 1,5 g x 20 pak.
FITO CHOLO, 1,5 g x 20 pak.
FITO GASTRO, 1,5 g x 20 pak.
Kiečių karčiųjų žolė, 40 g

Kiečių karčiųjų žolė, 1,5 g x 20 pak.
Kmyņu vaisiai, 1,5 g x 20 pak.
Kmyņu vaisiai, 40 g
Linų sėklos, 200 g
Pankolių vaisiai, 1,5 g x 20 pak.
Pankolių vaisiai, 40 g

-30%

VIRŠKINIMUI



AKTYVINTA ANGLIS

10 tablečių

MAISTO PAPILDAS

1-oje tabletyje yra 250 g aktyvuoto anglies.

PIGU 0²⁷

VIRŠKINIMO SISTEMAI



nuo

4⁴⁹

GUTTALAX

GUTTALAX, 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 15 ml 4⁴⁹ €
GUTTALAX, 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml 6⁹⁹ €
(Natrio pikosulfatas)

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 ml tirpalo (15 lašų) yra 7,5 mg natrio pikosulfato. **Indikacijos.** Trumpalaikis vidurių užkietėjimo mažinimas, tuštinimo lengvinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Guttalax geriamas vakare. Suaugusiesiems ir vyresniems nei 10 metų vaikams: 10-20 lašų per parą. 4-10 metų vaikams: 5-10 lašų per parą. Vartoti per burną. Rekomenduojama gydymą pradėti mažiausia doze. Didžiausios rekomenduojamos paros dozės viršyti negalima. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; žarnų neparaeinamumas ar obstrukcija; stiprus pilvo skausmas ir (arba) karščiavimas dėl ūminės pilvo būklės (pvz., apendicito), galimai susijęs su pykinimu, vėmimu; ūminė uždegiminė žarnų liga; sunki dehidracija; jaunesni kaip 4 metų vaikai; retos paveldimos būklės, kurios gali būti nesuderinamos su preparato pagalbine medžiaga. **Specialūs įspėjimai.** Nenustatius vidurių užkietėjimo priežasties, negalima vartoti nepertraukiamai kasdien ar ilgiau. Guttalax pavartojus 2-3 mėnesius buvo galvos svaigimo ir (arba) sinkopės atvejų. Vaikams be gydytojo nurodymo Guttalax vartoti negalima. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas fruktozės netoleravimas. Teksto parengimo data: 2017 m. spalio mėn. Reklaminio teksto parengimo data: 11/2020. MAT-IT-2000335 V.1.0

UŽKIETĖJUS VIDURIAMS VEIKIA PATIKIMAI IR NIEKAM NEPASTEIBINT.



nuo

1⁹⁹

SIMETIGAST FORTE 240 mg kapsulės, 10 kapsulių 1⁹⁹ €

SIMETIGAST FORTE 240 mg kapsulės, 60 kapsulių 6⁹⁹ €

SIMETIGAST FORTE BABY geriamieji lašai, 30 ml 4⁴⁹ €

MEDICINOS PRIETAISAI

„SIMETIGAST FORTE“ 240 mg kapsulės (simetikonas) skirtos vartoti vyresniems nei 12 m. pacientams, esant pilvo pūtimui, pilnumo jausmui pilve, raugėjimui. Taip pat galima naudoti prieš pilvo ertmės diagnostines procedūras, nes tai pagerina vaizdų kokybę. Vartoti: suaugusiesiems ir vyresni nei 12 m. amžiaus jaunuoliams – po 1 kapsulę 2-3 kartus per parą. Prieš diagnostines procedūras: 1 kapsulę vakare dieną prieš tyrimą ir 1 kapsulę ryte tyrimo dieną. „SIMETIGAST FORTE BABY“ geriamieji lašai (simetikonas) skirti kūdikiams nuo 28-os gyvenimo dienos ir vaikams iki 12 metų. Vartoti: kūdikiams (nuo 28-os gyvenimo dienos) ir vaikams iki 2 metų 3 lašai prieš, per ar po kiekvieno valgio. Negalima vartoti daugiau kaip 18 lašų per dieną.

GREITOJI PAGALBA IŠPŪSTAM PILVUI.



SORBEX® 396MG, 20 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

1 kapsulėje – net 300 mg aktyviosios anglies. Padeda sumažinti per didelį dujų kaupimąsi pavojus. Aktyvintoji anglis „Sorbex“ išgaunama iš kokosų riešutų kėvalų. Rekomenduojama paros norma – 1-3 kapsulės. Teigiama poveikis dujų kaupimuisi pasireiškia tada, kai 1 g aktyviosios anglies suvartojama ne mažiau kaip 30 min. prieš valgį ir 1 g aktyviosios anglies – iškart po valgio.

-30%

3²¹

SMEGENŲ IR NERVŲ SISTEMAI

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis.



NERVŲ SISTEMAI



NEUROMULTIVIT

20 plėvele dengtų tablečių **3²⁵ €**
100 plėvele dengtų tablečių **10⁷⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Indikacijos: Neuromultivit yra vitamino B₁, vitamino B₆ ir vitamino B₁₂, kurie yra ypač svarbūs užtikrinant normalias nervų sistemos medžiagų apykaitos funkcijas, derinys. Vartojant nervų sistemos ligų gydymui B grupės vitaminai atstato jų stoką organizme ir skatina nervinio audinio natūralų gijimo procesą. Neuromultivit vartojamas esant B grupės vitaminų stokos sukeltiems negalavimams. Vitaminas B₁ pasižymi skausmą malšinančiu poveikiu. **Vartojimas:** rekomenduojama dozė yra viena tabletė kartą per parą. Pavieniais atvejais paros dozė galima padidinti iki 3 tablečių. Tabletes reikia nuryti nesuskaidytas po valgymo ir užsigeri truputį skysčio. **Kontraindikacijos:** retai pasitaiko nespecifinių pojūčių – vėmimas, galvos skausmas ir sąnysys. Mažiau tikėtinos padidėjusio jautrumo reakcijos, kurios vartojant vitaminus B₁ arba B₆ dažniausiai reiškiasi poymiais odoje. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Neuromultivit vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas vitaminui B₁, vitaminui B₆, vitaminui B₁₂ arba bet kuriai pagalbinei Neuromultivit medžiagai. Negalima vartoti vaikams ir paaugliams (jaunesniems negu 18 metų) dėl per didelio veikliųjų medžiagų kiekio. Nedešiant pranešti gydytojui, jei yra kontraindikacijų vaisto vartojimui, atsirado šalutinio poveikio požymių ar pastojote. Reikėtų vengti vartoti dideles vaisto dozes ilgiau nei 4 savaites. Vitaminas B₆ gali sumažinti kartu vartojamos L-dopos poveikį. **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:** G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria. Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį RTT atstovą: UAB „GL Pharma Vilnius“, A. Jasko g. 12, Vilnius, tel. (85) 261 0705, el. paštas: office@gl-pharma.lt; www.gl-pharma.lt

nuo **3²⁵**



-30% **2⁷⁹**
3⁹⁸

VITADAY MELISOS EKSTRAKTAS, 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS



ULTRA GINKGO, 60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

ULTRA GINKGO – subalansuota ginkmedžių ir sibirinių ženšenų (juodųjų eleuterokokų) kombinacija. Vienoje tabletėje yra 267 mg gyno ginkmedžių ekstrakto, kuris palaiko atmintį, protinį darbingumą, kraujotaką ir pažintinę funkciją senstant. Sibirinių ženšenų ekstraktas – natūralus biontonikas, palaikantis fizinis ir protinius resursus įtemptais ir reikalaujančiais daug energijos laikotarpiais. Palaiko normalią kraujotaką, kuri yra susijusi su smegenų veikla ir darbingumu.

ULTRA GINKGO tinka dirbantiems intensyvią protinį ar fizinį darbą bei vyresnio amžiaus žmonėms.

ENERGIJA IŠ GAMTOS!

-30% **12¹⁷**
17³⁹



GLICIN 100 mg, 50 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Vartojimas: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Tabletes laikyti po liežuviu kol ištirps. **Gamintojas:** MNPK Biotiki, Rusija.

PIGU **1⁷⁵**

ATMINČIAI IR PROTINEI VEIKLAI



CLEAR BRAIN™ 60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Kompleksas atminčiai ir protinei veiklai „Clear Brain“ gaminamas iš granatmedžių vaisių, graikinių riešutų, pajūriųjų pušų žievės, juodųjų pipirų ekstraktų, jodo ir vitaminų. Jodas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją ir nervų sistemos veiklą. Pantoteno rūgštis (vitaminas B₅) padeda palaikyti normalią protinę veiklą. Tiaminas, niacinas, vitaminai B₆, B₁₂ padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą. Taip pat svarbu įvairi, subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.


ŠVEDIŠKI VITAMINAI ATMINČIAI IR PROTINEI VEIKLAI!

-25% **17⁰⁹**
22⁷⁹



-30% **6²⁹**
8⁹⁹

VITADAY GINKMEDŽIO EKSTRAKTAS,
60 kapsulių
MAISTO PAPILDAS



HERBASTRESS®, 30 tablečių

12⁰⁹ 7²⁵ €

Dienai

MAISTO PAPILDAS

Standartizuotų augalų ekstraktų ir B grupės vitaminų derinys nervų sistemai.

Vartojimas: 1 tabletė per dieną.

HERBASTRESS® MIEGAM, 20 kapsulių

14⁹⁹ 6⁹⁵ €

Naktį

MAISTO PAPILDAS

Su melatoninu, valerijono ir apynių ekstraktu.

Vartojimas: 1 kapsulė vakare prieš miegą.

-40%



NEUROZAN

NEUROZAN, 30 tablečių **25⁴⁹ 17⁶³ € -30%**
NEUROZAN PLUS, 56 tablečių/kapsulės **42⁹⁹ 34³¹ € -20%**

MAISTO PAPILDAS

NEUROZAN – platus ir subalansuotas kompleksas normaliai protinei (pantoteno rūgštis) ir nervų sistemos (jodas, magnis, ir kt.) veiklai palaikyti. Vitaminai B1, B3 ir kt. palaiko normalią psichologinę būklę, o geležis ir cinkas – pažinimo funkciją. Sudėtis papildyta ginkmedžių ekstraktu ir 5 HTP. NEUROZAN PLUS – dviguba pakuotė su omega-3 riebiosiomis rūgštimis.

PAMAITINK SAVO PROTĄ!

iki **-30%**



Mūsų vaistinėse nuolat rasite

**DAUGIAU NEI
2000
KOMPENSUOJAMŲJŲ
VAISTŲ.**



AMBIO VITAMINAS C,
30 prailginto veikimo
tablečių

~~649 €~~

-40%

389 €

MAISTO PAPILDAS

- 500 mg vitamino C 1 tabletėje.
- Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą ir psichologinę funkciją.
- Vitaminas C padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

**AMBIO CHOLESTEROL
BALANCE COMPLEX,**
30 kapsulių

~~999 €~~

-30%

699 €

MAISTO PAPILDAS

- Monakolinas K iš raudonosiomis mielėmis fermentuotų ryžių padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 10 mg monakolino K iš raudonosiomis mielėmis fermentuotų ryžių gaminių.
- Tik 1 kapsulė per dieną po valgio, užgeriant stikline vandens.

**AMBIO HOT
HERBAL DRINK,**
milteliai karštam
gėrimui, 20 pakelių

~~1198 €~~

-40%

719 €

MAISTO PAPILDAS

- Aviečių skonio tirpus milteliai su pelargonijų šaknų ekstraktu, skirti karštam gėrimui paruošti, su saldikliais.
- Sudėtyje yra vitamino C, rutino, cinko ir seleno.

AMBIO GERKLEI,
su šaltalankių ir medetkų
aliejaus, purškalas, 20 ml

~~599 €~~

-30%

419 €

SKYSTASIS MAISTO PAPILDAS

- Levandiniai šalavijai ir vaistinės medetkos padeda palaikyti kvėpavimo takų funkciją.
- Dygliuotieji šaltalankiai ir kvapieji rozmarinai padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

AMBIO VITAMINAS D3,
4000 TV, 60 kapsulių

~~1449 €~~

-20%

1159 €

MAISTO PAPILDAS

- Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų bei dantų būklę, raumenų funkciją, kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą, kalcio koncentraciją kraujyje.
- Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.

**AMBIO AUGALINIS
KOMPLEKSAS
VYRIŠKUMUI,**
60 kapsulių

~~1799 €~~

-40%

1079 €

MAISTO PAPILDAS



AMBIO IMUNITETUI SU EŽIUOLE, 30 tablečių

~~898~~ €

-40%

5³⁹ €



MAISTO PAPILDAS

- Cinkas, selenas ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.
- Vitaminas C padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir normalią nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
- Produkto sudėtyje yra rausvažiedžių ežiulių šaknų ekstraktas.

AMBIO KALCIS, MAGNIS, CINKAS, 100 tablečių

~~1298~~ €

-40%

7⁷⁹ €



MAISTO PAPILDAS

- Kalcis reikalingas normaliai kaulų būklei palaikyti. Magnis ir cinkas padeda palaikyti normalią kaulų būklę.
- Kalcis ir magnis padeda palaikyti normalią raumenų veiklą.
- Cinkas padeda palaikyti normalią plaukų, odos ir nagų būklę, padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
- Vitaminas D padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą bei normalią kaulų būklę.

AMBIO SĄNARIAMS SU KOLAGENU, 60 kapsulių

~~1598~~ €

-40%

9⁵⁹ €



MAISTO PAPILDAS

- I ir II tipo kolagenas, vitaminas C, silicis, hialurono rūgštis.
- Maisto papildas sudėtyje yra I tipo „Peptan®“ kolageno. Peptanai – tai bioaktyvūs kolageno peptidai, lengviau įsisavinami dėl jų hidrolizuotos formos.
- Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių, kaulų, kremzlių, dantų ir dentenų, odos funkcijai, susidarymą.
- Vitaminas C padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.
- Vitaminas C padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.

AMBIO MAGNIS SU B6 FORTE, 30 tablečių

~~835~~ €

-30%

5⁸⁵ €



MAISTO PAPILDAS

- Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, kaulų ir dantų būklę, psichologinę funkciją, nervų sistemos veiklą ir energijos apykaitą.
- Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
- Vitaminas B6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją, energijos apykaitą ir imuninės sistemos veiklą.
- Vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei reguliuoti hormonų aktyvumą.

AMBIO GERAI NUOTAIKAI, 30 kapsulių

~~1249~~ €

-40%

7⁴⁹ €



MAISTO PAPILDAS

- Vitaminas B6 ir tiaminas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.
- Tik 1 kapsulė per dieną.

AMBIO VITAMINAS D3 VAIKAMS, 30 kramtomųjų kapsulių

~~799~~ €

-40%

4⁷⁹ €



MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIAIS

- Apelsinų skonio kramtomosios kapsulės.
- Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų bei dantų būklę, raumenų funkciją, kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą, kalcio koncentraciją kraujyje.
- Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.
- Tik 1 kapsulė per dieną.

KAULAMS, SĄNARIAMS

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis.



JAMIESON VITAMINAS D, KRAMTOMASIS, vaikams, 400 TV, 10 mg, 100 tablečių
14⁹⁹ 10¹⁴ €

MAISTO PAPILDAS

- Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę.
- Žaismingos braškių skonio tabletės.
- Net 400 TV vitamino D3 vienoje tabletėje.

-30%

JAMIESON VITAMINO D LASAI KŪDIKIAMS, 400 IU, 11,4 ml 7⁹⁹ 5⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAS

- Gaunamas iš kokybiško lanolino – gausaus vitamino D šaltinio. Lanolinas išgaunamas iš saulėje laikomos Australijos ir Naujosios Zelandijos aukštikalnių avių vilnos. Ši, nugabenta į Prancūziją, apdorojama taikant pažangiausias technologijas, kad būtų išgautas iškirtinai tyras, kristalų formos pirminis vitaminas D3.
- Vienas beskonis lašas patenkina visos dienos vitamino D poreikį.
- Lašus patogiu vartoti – tiesiog užlašinkite ant žinduko, spenelio ar svaraus piršto ir patrinkite kūdikio skruostą iš vidaus.
- Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę.

SĄNARIAMS



iki

-40%

VERSAN**MAISTO PAPILDAS**

„Versan Shots“ – geriamos skystos dienos dozės sąnariams, sklandžiam jų darbui. Vienas buteliukas per dieną aprūpina sąnarius reikalingomis medžiagomis: kolagenu, hialurono rūgštimi, gliukozaminu, chondroitinu, vitaminais C ir D3.

„Versan HydroCollagen“ – geriamas skystas hidrolizuotas kolagenas sąnariams, raumenims, kaulams, praturtintas magniu, padedanti palaikyti normalią raumenų funkciją ir normalią kaulų būklę, bei vitaminu C, padedanti palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremlių ir kaulų funkcijai, susidarymą.

„Versan“ kapsulės – speciali formulė sąnariams, kurios sudėtyje yra: patentuoto hidrolizuoto II tipo kolageno, sudėtyje turinčio hialurono rūgšties, chondroitino, kiti proteoglikanų; vitamino C, padedanti palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremlių funkcijai, susidarymą.

„Versan Osteo“ tabletės – patobulinta formulė sąnariams, kurios sudėtyje yra: dar daugiau patentuoto hidrolizuoto II tipo kolageno, sudėtyje turinčio hialurono rūgšties, chondroitino, kiti proteoglikanų; vitamino C, padedanti palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremlių funkcijai, susidarymą.

„VERSAN“ – PROFESIONALI PAGALBA JŪSŲ SĄNARIAMS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis



MAGNESIUM CITRATE N50, 50 pakelių 18⁹⁹ 12⁹⁷ €
KALIUM CITRATE N50, 50 pakelių 19⁹⁹ 13⁵⁰ €
STOPOROSE N50, 50 pakelių 23⁹⁹ 16³⁰ €
BIOKALCIS+FOSFORAS+VIT. D IR K, 15 pakelių 7⁹⁹ 4⁹⁰ €


MAISTO PAPILDAI

Net 50 pakelių vienoje pakuotėje, didelės dozės viename pakelyje. Mineralai citratų formos, geras biologinis įsisavinimas. „MAGNESIUM CITRATE“ – 375 mg magnio viename pakelyje. „KALIUM CITRATE“ – 500 mg kalio pusėje pakelio. „STOPOROSE“ – kalio (300mg) ir kalcio (800mg) citrato derinys. „BioKalcis + fosforas + vit. D ir K“ – pakelyje net 1200 mg gryno kalcio! Produkte naudojama žaliava – kalcio fosfatas – kuriame yra didelis kiekis gryno kalcio ir nėra jokių alergenų.

Mokslškai pagrįsta, kad kalio citratas svarbus ir naudingas kaulams po menopauzės, kalcis padeda lėtinti moterų po menopauzės kaulų mineralinio tankio mažėjimą. Produktų sudėtyje nėra konservantų, stabilizatorių ar dažiklių. Pagaminta Izraelyje.

MINERALAI MILTELIAIS IŠ IZRAELIO

-30%

RAIŠČIAMS, SAUSGYSLĖMS, FASCIJOMS

Perkant pakuotę – antra tokia pati DOVANŲ!

1+1

CIGNON® 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAI

Raiščiai, sausgyslės, fascijos yra judėjimui būtini jungiamojo audinio dariniai: raiščiai lyg virvės suriša sąnariuose esančius kaulų galus ir garantuoja judesio tikslumą; sausgyslės raumenys jungiasi prie kaulų. Joms susitraukiant pritraukiami kaulai ir taip įvyksta judesys; fascijos lyg tinklas apsupa ir sujungia kaulus, raumenis, sąnarius, sausgysles į visumą, padeda raumenims sąveikauti tarpusavyje atliekant judesius. Nuolat pasikartojantis arba netikėti, staigūs judesiai, didesnės intensyvės raumenų apkrovos gali paveikti raiščius, sausgysles, fascijas. Todėl rūpinantis jų sveikata svarbu sureguliuoti darbo ir poilsio režimą, taikyti optimalius fizinio krūvio ir aprūpinti raiščius, sausgysles, fascijas reikiomis maisto medžiagomis: mukopolisacharidais, hidrolizuotu kolagenu, vitaminu C, manganu. Manganas padeda palaikyti normalų jungiamojo audinio formavimąsi. „Cignon“ rekomenduojama gerti vaikams nuo 3 metų po 1 kapsulę, vaikams nuo 12 metų ir suaugusiems – po 2 kapsules per dieną.

„CIGNON“ – NELĖTINK TEMPO!

IMUNITETUI, KAULAMS, RAUMENIMS, SVEIKOMS LĄSTELĖMS

-25%

OILESEN D3**MAISTO PAPILDAI**

„Oilesen D3“ – tai reikiamas vitamino D kiekis, išdirpintas natūraliame aliejuje.

„Oilesen D3 400“ – vitaminas D su alyvuogių aliejumi kūdikiams ir mažiems vaikams. Paprasta dozavoti pipete.

„Oilesen D3 Forte“ 1 kapsulėje yra net 4000 TV vitamino D3 ir kanapių aliejaus, kuris padeda palaikyti normalią imuninę sistemą ir raumenų funkciją.

„Oilesen D3 su juodųjų ąžuolų aliejumi“ – 4000TV vitamino D ir juodųjų ąžuolų aliejaus nauda gerai sąvijausti.

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų būklę, normalią raumenų funkciją. Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.

DAUGIAU SAULĖS SU „OILESEN D3“!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis.

KAULAMS IR SĄNARIAMS

**SUPER CAL500 MAG250 ZINC15**

SUPER CAL500 MAG250 ZINC15, 30 tablečių 8⁹⁹ 4⁸⁵ €
SUPER CAL500 MAG250 ZINC15, 100 tablečių 14⁹⁹ 8⁵¹ €

MAISTO PAPILDAI

daugiau informacijos apie produktus www.gamtosnamai.lt

-40%

SĄNARIAMS, KAULAMS, KREMZLĖMS



ATLANT, 28 pakeliai 43⁹⁹ 30¹⁶ €
BIOGLUCOSAMINE MARINE 1500 mg, 20 pakelių 16⁹⁹ 7⁰⁹ €
BIOGLUCOSAMINE MARINE 1500 mg, 60 pakelių 21⁹⁹ 15⁰⁴ €

MAISTO PAPILDAI

Naujiena! „Atlant“ – tai kolageno ir gliukozamino kompleksas, papildytas kalciumu ir vitaminu C. 1 pakelyje: net 12200 mg kolageno, 1500 mg gliukozamino, 120 mg kalcio ir 12 mg vitamino C. Kolagenas – natūraliai žmogaus organizme sintetinamas baltymas. Šis baltymas yra odos bei sąnarių kremlių ir kaulų sudedamoji dalis. „BioGlucosamine Marine“ – natūralios jūrinės kilmės gliukozamino sulfatas! 1 pakelyje net 1500mg gliukozamino sulfato. Gliukozaminas yra sąnario kremzlės struktūrinė dalis. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremlių funkcijai, kaulų funkcijai ir odos funkcijai, susidarymą. Vitaminas D padeda palaikyti normalų kalcio įsisavinimą bei normalią kaulų būklę. Produktų sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, stabilizatorių ar saldiklių. Pagaminta Izraelyje.

SUTEIK TITANIKŠKOS GALIOS SĄNARIAMS!

-30%

-30%

PROENZI ARTHROSTOP**MAISTO PAPILDAI IR KOSMETIKOS PRIEMONĖ**

„Proenzi Arthrostop Intensive“ – maistinių medžiagų kompleksas sąnariams. Baltųjų gliuonų (*Salix alba*) ir ciberžolės (*Curcuma longa*) ekstraktų derinys padeda palaikyti normalią sąnarių būklę ir lankstumą. Pluoštinį bovelijų (*Boswellia serrata*) žievių ekstraktas padeda palaikyti sąnarių lankstumą ir bendrą sąnarių būklę. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų funkcijai, susidarymą.

„Proenzi Arthrostop Plus“ sudėtyje yra gliukozamino ir MSM derinys kartu su žolelių ekstraktu iš pluoštinio bovelijų ir mangano. Pluoštinio bovelijų žievių ekstraktas padeda palaikyti sąnarių lankstumą ir bendrą sąnarių funkciją.

„Proenzi Arthrostop ASU“ – avokadų ir sojų ekstrakto bei Robuvit® kompleksas. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų ir kremlių funkcijai, susidarymą.

Sąnarių mityba, jų lankstumo palaikymas ir bendras gyvybingumas. + ASU neesterifikuotas avokadų ir sojų ekstraktas.

„Proenzi Arthrostop“ – masazinis kremas, skirtas odai sąnarių srityje ir aplink sąnarius.

Prekių kaulškus ribotas. LT.Proen.70214

PROENZI – JUDĖK LAISVAI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

Dolmen®

deksketoprofeno trometamolis

GREITAI MALŠINA
SKAUSMĄ,
KAI TO LABIAUSIAI REIKIA!



Geriamas
iš paketėlio

**BERLIN-CHEMIE
MENARINI**

UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIČ“
Jasinskio g. 16a, Vilnius LT-03163
Tel. +370 5 269 19 47
LT@berlin-chemie.com



SKAUSMINGŲ MĖNESINIŲ, RAUMENŲ IR KAULŲ, DANTŲ SKAUSMO MALŠINIMAS

Dolmen. **Nereceptinis vaistas. Veiklioji medžiaga.** Deksketoprofeno trometamolis (dexketoprofenum). Vienoje plevėle dengtoje tabletėje / granulių geriamajam tirpalui paketėlyje / geriamojo tirpalo paketėlyje yra 25 mg deksketoprofeno. **Vaisto forma.** Plevėle dengtos tabletės / granulės geriamajam tirpalui / geriamasis tirpalas paketėlyje. **Pakuotė.** Po 10 tablečių / po 10 paketėlių granulių / po 10 geriamųjų tirpalų paketėlyje. **Indikacijos.** Dolmen vartojamas trumpalaikiam simptominiams lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų, sąnarių ir kaulų skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorejos), dantų skausmui malšinti. **Dozavimas.** Atsižvelgiant į skausmo priežastis ir intensyvumą, rekomenduojama gerti: po 1 tabletę / paketėlį / geriamąjį tirpalą paketėlyje 1–3 kartus per parą kas 8 valandas. Didžiausia paros dozė neturi būti didesnė kaip 3 tabletės / paketėliai / geriamieji tirpalai paketėlyje. Jei esate senyvo amžiaus ar sergate inkstų, kepenų ligomis, pradėkite vartoti ne daugiau kaip 2 tabletes / paketėlius / geriamuosius tirpalus paketėlyje per parą. **Vartojimo būdas.** Jei vartojate granules, visą paketėlio turinį ištirpinkite stiklinėje vandens, suplakite. Išgerkite nedelsiant. Geriamasis tirpalas paketėlyje gali būti geriamas tiesiai iš paketėlio. Jeigu jaučiate intensyvių skausmą ir reikia jį greičiau nuslopinti, vaistą vartokite prieš valgymą (ne vėliau kaip prieš 15–30 min.). Poveikis prasideda po 30 min. pavartojus vaisto. Skausmą malšinantis poveikis trunka 4–6 valandas. Šio vaisto neturėtų vartoti vaikai ir paaugliai (jaunesni kaip 18 metų). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas deksketoprofenui, kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aspirinui; vartojant ketoprofeno ar fi bratų buvę fotoalerginės ar fototoksinės reakcijos; pepsinė opa, buvęs kraujavimas iš virškinamojo trakto, lėtiniai virškinimo sutrikimai bei lėtinės virškinamojo trakto ligos; sunkus širdies nepakankamumas, vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų funkcijos, sunkus kepenų veiklos sutrikimas; esant sunkiai dehidratacijai; nėštumas bei žindymo laikotarpis. **Įspėjimai.** Vaistą atsargiai turi vartoti vyresnio amžiaus ligoniniai, sergantieji alergija, astma, širdies, inkstų, kepenų ligomis, hipertenzija, sisteminė raudonąja vilklige, cukriniu diabetu, įvairiomis jungiamojo audinio ligomis, sutrikus kraujodarai; vartojant šlapimo išsiskyrimą skatinančius vaistus ar netekus daug skysčių. Pasitarkite su gydytoju jei vartojate kitų vaistų: geriamųjų steroidinių, nuo depresijos, apsaugančių nuo kraujo krešumo. Dolmen geriamojo tirpalo paketėlyje ir granulių geriamajam tirpalui paketėlyje yra sacharozė, todėl jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti Dolmen granules geriamajam tirpalui ar geriamąjį tirpalą paketėlyje. Į tai turėtų atsižvelgti pacientai, sergantys cukriniu diabetu. Deksketoprofenas gali paslėpti tokių infekcijų požymius kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl gali būti, kad vartojant šį vaistą gali būti vėluojama pradėti tinkamą gydymą, o dėl to gali padidėti komplikacijų rizika.

Prašome įdomiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojiui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt

Reklama paruošta: 2021 m. birželio mėn.

LT_Dol_10_2021_V1_press

ŠIRDŽIAI, KRAUJOTAKAI

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis.



ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ FUNKCIJOMS GERINTI



ŠIRDIES LAŠAI VALENTIS

geriamieji lašai (tirpalas), 40 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: valerijonų tinktūra, sukatžolių tinktūra, gudobelų vaisių skystasis ekstraktas, 0,34 ml + 0,33 ml + 0,33 ml/ml. **Indikacijos:** tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti, ypač esant nevėinei įtampai. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Iš pradžių, tris arba keturias dienas, reikia gerti 3–4 kartus per dieną po 20–30 lašų, vėliau dozė sumažinti (gerti 2–3 kartus per dieną po 15–20 lašų). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bent vieni iš sudedamųjų vaisto dalių, nėštumas. **Specialūs įspėjimai:** vaistinio preparato nerekomenduojama naudoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip dvi savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu vartojant preparato širdies plote atsiranda duriantis skausmas arba labiau sutrinka širdies ritmas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 61,5 % (V/V) etanolio. Reklaminių teksto parengimo data: 2018-08-30.

1⁴⁹



GUDOBELIŲ SKYSTASIS EKSTRAKTAS VALENTIS

geriamieji lašai (tirpalas), 25 ml 1⁴⁹ €

TRADICINIS AUGALINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: gudobelų vaisių skystasis ekstraktas, 1 ml/ml. **Indikacijos:** tradicinis augalinis vaistas, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti. Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Jeigu gydytojas nepaskyrė kitaip, suaugusiems žmonėms reikia gerti praskiedus vandeniu po 20–30 lašų 3–4 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** alergija erškėtinii šeimai augalams. **Specialūs įspėjimai:** vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip 4 savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 55 % (V/V) etanolio. Reklaminių teksto parengimo data: 2018-08-21.

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ FUNKCIJŲ GERINIMUI.

nuo

1⁰⁵

SUKATŽOLIŲ TINKTŪRA VALENTIS, geriamieji lašai (tirpalas), 25 ml 1⁴⁵ €

TRADICINIS AUGALINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: sukatžolių tinktūra, 1 ml/ml. **Indikacijos:** tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas nervinės įtampos simptomams mažinti. Taip pat šis tradicinis augalinis vaistinis preparatas gali būti vartojamas nervinės kilmės širdies negalavimų simptomams palengvinti, pvz., smarkiam širdies plakimui, jeigu gydytojas yra patvirtinęs, kad nėra sunkios mechaninės būklės. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Preparatą prieš vartojimą reikia suplakti. Jeigu gydytojas nepaskyrė kitaip, reikia gerti 3–4 kartus per dieną prieš valgį po 30–50 lašų. **Kontraindikacijos:** jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, vaisto vartoti negalima. Negalima vartoti nėštumo laikotarpiu. **Specialūs įspėjimai:** vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 m. asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip 4 savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Vaisto sudėtyje yra nuo 64 iki 70 % (V/V) etanolio.

NERVINĖS KILMĖS ŠIRDIES NEGALAVIMŲ SIMPTOMAMS MAŽINTI.



-30%

EMILI ARBATOS ŠIRDŽIAI

JŪSŲ GERAI SAVIJAUTAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

nuo

3⁴⁵



FERRETAB® COMP.

FERRETAB® COMP. 152,1 mg/0,5 mg, 30 pailginto

atpalaidavimo kietųjų kapsulių 3⁴⁵ €

FERRETAB® COMP. 152,1 mg/0,5 mg, 100 pailginto

atpalaidavimo kietųjų kapsulių 8⁴⁵ €

Geležies (II) fumaratas / folio rūgštis

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Ferretab“ comp. vartojamas kombinuojant geležies ir folio rūgšties trūkumui šalinti bei jo profilaktikai, ypač nėštumo metu. „Ferretab“ comp. aktyviai padidina geležies ir folio rūgšties kiekį, kai to negali atlikti savarakiškai žmogaus organizmas. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams, esant nedideliam geležies trūkumui, gerti po 1 kapsulę per parą. Kai yra mažakraujystė, paros dozė galima padidinti iki 1 kapsulės 2–3 kartus per parą. Kartais nėštumo metu reikia gerti didelę geležies dozę. Kapsules nuryti nekrumtytas, užsigeriant stikline vandens. Nekreimtykite arba neįdulkite kapsulių, nes gali susidaryti šalutinės poveikis. Geriausia kapsules išgerti nevalgius. **Kontraindikacijos:** „Ferretab“ comp. vartoti negalima, jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) geležies fumaratui, folio rūgščiai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu nustatyta su geležies ir folio rūgšties stoka nesusijusi anemija; geležies perteklius organizme arba būklė, kuri sutrikdo normalų geležies įsivadinimą; hemoglobinopatija; jeigu sergate hemolizine anemija ar pernicinga anemija; virškinamojo trakto ligomis. **Įspėjimai ir atsargumo priemonės:** gydymas turi būti tęsiamas keletą savaičių (mažiausiai 8–12 sav.) po to, kai entrocitų skaičius tampa normalus ir išsioja geležies aktyvumas. Vartojant „Ferretab“ comp. kapsules kartais išmity spalva tampa juoda, tačiau tai normalu. Svarbi informacija apie kai kurias pagalbinės „Ferretab“ comp. medžiagas. Sudėtyje yra 34,47 mg laktozės monohidrata (pieno cukraus). Jeigu gydytojas jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Sudėtyje yra dažiklio azorubino (E122). Gali sukelti alerginių reakcijų. **Pakuotė:** 30 arba 100 pailginto atpalaidavimo kietųjų kapsulių. **Farmakoterapinė grupė:** vaistiniai preparatai nuo anemijos, geležis kartu su folio rūgštimi. **ATC kodas** – B03AD02. **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:** „G.L. Pharma GmbH“, Schloßplatz 1, 8502 Lammach, Austrija.



BIOKALIS 400 mg, 30 paketėlių

BIOKALIS FORTE, 30 paketėlių

MAISTO PAPILDAS

Grynas kalio citratas! Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį. Jis svarbus normaliai nervų sistemos ir raumenų veiklai palaikyti. „BioKalis 400 mg“ ir „BioKalis forte“ sudėtyje esantis kalis yra citrato formos, miltelių pavidalu. Sudėtyje – 100 % kalio citratas: be konservantų, be stabilizatorių, be kvapiųjų medžiagų ar saldiklių. Tinka veganams, nešėsioms ir maitinančioms moterims. Pagaminta Izraelyje.

KALIO CITRATAS MILTELIAIS!

Perkant pakuotę – antra tokia pati DOVANŲ!

1+1



BIOFERRUM ACEROLA, 28 pak.

MAISTO PAPILDAS

Unikalus tirpios geležies maisto papildas miltelių pavidalu su vitaminu C (ekologiška acerola). Geležis padeda palaikyti normalią raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą. Geležis ir vitaminas C padeda mažinti nuovargį, palaikyti normalią energijos apykaitą, imuninės sistemos veiklą. Sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, be stabilizatorių, be kvapiųjų medžiagų ar saldiklių. Pagaminta Japonijoje. **150% GELEŽIES DIENOS NORMOS!**

Perkant pakuotę – antra tokia pati DOVANŲ!

1+1



KALCIO GLIUKONATAS 500 mg, 10 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Kalcis svarbus normaliai raumenų veiklai, kaulų, dantų būklei palaikyti, svarbus normaliam kraujo krešėjimui.



-40%

9⁶⁵

16⁰⁰

OMEGA-3 PLUS RESVERATROLIS, KOFERMENTAS Q10 60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Eikozapentaeno rūgštis ir dokozaheksaeno rūgštis (EPR/DHR) padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR. **Tiaminas** padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir energijos apykaitą. **Vitaminas B6 ir vitaminas B12** padeda palaikyti raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, normalią nervų sistemos veiklą bei normalią psichologinę funkciją. **Foliatai** padeda palaikyti normalią kraujodarą, aminorūgščių sintezę, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. **Vitaminas D3 ir selenas** padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. **Selenas ir vitaminas E** padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinių pažeidimų.

PIGU

0²⁰

Onkologinės ligos - tikras iššūkis.

KARTU MES STIPRESNI



Su POLA kortele nuolaidos:

15% vaistams*

20% kitoms prekėms*



*Nuolaidos netaikomos perkant su kompensuojamuoju receptu, vardinius, kartinius vaistus, pradinio maitinimo mišinius, administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Nuolaidos nesumuojamos ir galioja perkant fizinėse NORFOS vaistinėse.



VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS



NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO



IBUPROM

IBUPROM, 200 mg, 10 dengtųjų tablečių **1⁹⁹ €**
 IBUPROM, 200 mg, 20 dengtųjų tablečių **3⁴⁹ €**
 IBUPROM, 400 mg, 10 pėlele dengtųjų tablečių **2⁹⁹ €**
 IBUPROM, 400 mg, 20 pėlele dengtųjų tablečių **3⁷⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg ir 200 mg. Indikacijos: skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Ibuprom, 400 mg“: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1 pėlele dengtąją tabletę 3 kartus per parą. Jaunesniems kaip 12 m. vaikams vartoti negalima. „Ibuprom, 200 mg“: 6–9 m. vaikams (kūno svoris 20–29 kg) vartoti po 1 tabletę kas 6–8 val. po valgio. Negalima vartoti daugiau nei 3 tabletes per parą (didžiausia paros dozė – 600 mg, vartojant per kelis kartus). 10–12 m. vaikams (kūno svoris 30–39 kg) vartoti po 1 tabletę kas 6 val. po valgio. Negalima vartoti daugiau nei 4 tabletes per parą (didžiausia paros dozė – 800 mg, vartojant per kelis kartus). Dozavimas suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams – pradinė dozė yra 2 tabletės, užgeriant vandeniu. Po to, jei būtina, rekomenduojama gerti po 1–2 tabletes kas 4 val. Negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių (1200 mg) per 24 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, tachinis kraujavimas, ūminis skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligės stadija, anksčiau buvusi alergija acetoilsalicilo rūgščiai ir kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; sergant sunkiu širdies nepakankamumu; esant trečiam nėštumo trimestriui. Specialūs įspėjimai: Prieš šį vaistą vartojant, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu, bronchių astma. Teksto parengimo data 2021-08-10.

YRA „IBUPROM“. NĖRA SKAUSMO.

SAUSOMS, SUDIRGUSIOMS IR PAVARGUSIOMS AKIMS

Bepanthen® Eye

BE KONSERVANTŲ

akių lašai

Drekinia, ramina ir apsaugo sausus akis. Tinka nešiojantiems kontaktinius lęšius.

20 x 0,5 ml vienadozių talpyklė



BEPANTHEN® EYE

MEDICINOS PRIEMONĖS

Bepanthen® Eye akių lašų sudėtyje yra 0,15 % natrio hialuronato ir 2 % dekspantenolio. Bepanthen® Eye saugo ir drėkina akies paviršių ir padaro jį slidžiu. Tokiu būdu ilgam sumažėja diskomfortas, susijęs su mechaniniu stresu, stresu dėl aplinkos poveikio arba intensyvaus žiūrėjimo. Sudėtyje nėra konservantų, todėl šie lašai gerai toleruojami, net jei vartojami ilgą laiką. Lašinti po 1 lašą į akies junginės maišelį 3–5 kartus per parą. Jei yra alergija bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai arba akių uždegimas ar pažeidimas, vartoti negalima. Akių lašų vartojimo metu kontaktinių lęšių išimti nereikia. Vienadozės talpyklės skirtos vienkartiniam vartojimui. Pirmą kartą atidarius 10 ml akių lašų buteliuką galima vartoti ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Jei norite sužinoti daugiau, skaitykite pilną Bepanthen® Eye vartojimo instrukciją. Reklamos teksto parengimo data: 2021-07. LMR-CH-20210727-08.

PAŠALINKITE SAUSŲ AKIŲ SIMPTOMUS IŠ KARTO!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis.

nuo **1⁹⁹**

EFFERALGAN - SKAUSMO IR/AR KARŠČIAVIMO MAŽINIMUI



EFFERALGAN

EFFERALGAN, 500 mg, 16 šnypščiučių tablečių **2⁹⁹ €**
 EFFERALGAN C, 330 mg/200 mg, 20 šnypščiučių tablečių **3⁹⁹ €**
 EFFERALGAN, 80 mg, 10 žvakučių **3⁹⁹ €**
 EFFERALGAN, 150 mg, 10 žvakučių **3⁹⁹ €**
 EFFERALGAN, 30 mg/ml, geriamasis tirpalas, vaikams, 90 ml **3⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos ir stiprumas: Efferalgan 80 mg žvakutės: 80 mg paracetamolio. Efferalgan 150 mg žvakutės: 150 mg paracetamolio. Efferalgan C 330 mg/200 mg šnypščiosios tabletės: 330 mg paracetamolio, 200 mg aspirino rūgšties. Efferalgan 500 mg šnypščiosios tabletės: 500 mg paracetamolio. Efferalgan 30 mg/ml geriamasis tirpalas, vaikams: 1 ml tirpalo 30 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos.** Trumpalaikis karščiavimo mažinimas. Lengvo ir vidutinio stiprumo skausmo malšinimas. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Geriamasis tirpalas: geriamasis tirpalas tinka tik 4–32 kg svorio (t.y. maždaug nuo 1 mėn. iki 12 metų amžiaus) vaikams. Dozė vaikams apskaičiuojama pagal kūno svorį. Leidžiama maksimali paracetamolio paros dozė – 60 mg/kg. Ji išgerama per 4–6 kartus lygiais intervalais (t.y. po 15 mg/kg kas 6 val. arba po 10 mg/kg kas 4 val.). Žvakutės: Nuo 2 mėnesių iki <24 mėnesių – 80 mg žvakutės kas 6 val. Nuo 24 mėnesių iki <3 metų – 150 mg žvakutės kas 6 val. Efferalgan 500 mg. Efferalgan C 330 mg/200 mg šnypščiosios tabletės: suaugusiems ir 50 kg ar daugiau sveriantiems paaugliams vienkartinė dozė yra 1–2 šnypščiosios tabletės kas 4–6 val., negalima gerti daugiau kaip 4–6 šnypščiučių tablečių/parą. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas vaisto sudedamoms dalims, sunkus kepenų nepakankamumas, dekompenzuotos aktyvios kepenų ligos. Žvakutės: viduriavimas, neseniai buvęs kraujavimas iš tiesiosios žarnos, uždegimas, padidėjęs jautrumas vaistams, žemės riešutams, sojų aliejui, acetilsalicilo ir, atitinkamai, Efferalgan C: inkstų akmenys. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jei jums yra lengvas ar vidutinio sunkumo kepenų sutrikimas, sergate žilberio sindromu, sunkia inkstų liga; yra anoreksija, dehidratacija, lėtinis alkoholizmas, esant G6PD trūkumui, atsiradus odos reakcijos požymių. Žvakutės: vaistinio preparato sudėtyje yra lecitino (išgauto iš sojų aliejaus). Jei esate alergiškas (alergiška) žemės riešutams arba sojų, jums šio vaistinio preparato vartoti negalima. Efferalgan C: sveriate <50 kg. Nevartokite kartu su kitu vaistu, kurio sudėtyje yra paracetamolio, NVNU, acetilsalicilo ir, atitinkamai, Efferalgan C ir Efferalgan 500 mg sudėtyje yra natrio benzoato, kuris gali sukelti gelą, natrio ir sorbitolio. Efferalgan geriamajame tirpale, vaikams yra sacharozės ir propilenglikolio. Prieš šį vaistą vartojimą pasitarkite su vaistininku arba gydytoju. Teksto parengimo data: 2021.12.16. PM-LT-2021-12-3031

nuo **2⁹⁹**

NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO



APAP

APAP, 500 mg, 12 pėlele dengtųjų tablečių **1⁹⁹ €**
 APAP, 500 mg, 24 pėlele dengtos tabletės **3⁴⁹ €**
 APAP, 250 mg granulės paketėlyje, vaikams, 10 paketėlių **5⁴⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: paracetamolis, 250 mg ir 500 mg. Indikacijos: vaistai skirti šilpam ir vidutinio stiprumo skausmui malšinti ir temperatūrą mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: Apap, 500 mg pėlele dengtos tabletės: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams gerti po 1–2 tabletes kas 4–6 valandas, ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. Apap, 250 mg granulės paketėlyje: skirti vaikams, vienkartinė dozė yra nuo 10 iki 15 mg/kg kūno svorio vyresniems nei 4 metų vaikams, ji vartoti ne dažniau kaip kas 4 valandas (didžiausia paros dozė – 4 paketėliai). Granules supilti tiesiai į burną ant liežuvio ir praryti neužgerus vandens. Kontraindikacijos: vaistus vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: prieš vartojant paracetamolį būtina pasitarti su gydytoju, jei yra, pakeičius kepenis ar inkstus, astma, gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka, hemolizė anemija, vartojami kai kurie kiti vaistai, skydžių netekimas, mitybos nepakankamumas, vartojamas alkoholis bei nėštumo ir žindymo laikotarpiai. Didesnės nei rekomenduojamos dozės sukelia vidaus organų pažeidimus.

Prašome įdėmiai perskaityti pakutes lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Neikimkite vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Reklaminio teksto parengimo data: 2021-01-27.

„APAP“. KIEKVIENOJE VAISTINĖLĖJE.

SKAUSMUI MALŠINTI, TEMPERATŪRAI MAŽINTI



IBUGARD

200 mg, 10 minkštųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje kapsulėje yra 200 mg ibuprofeno. Indikacijos: trumpalaikis simptominis įvairios kilmės šilpno ir vidutinio stiprumo skausmo gydymas; simptominis įvairios kilmės karščiavimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: nustatant ibuprofeno dozę, reikia atsižvelgti į paciento kūno svorį ir amžių. Paprastai vienkartinė ibuprofeno dozė yra 7–10 mg/kg kūno svorio, maksimali paros dozė yra 20–30 mg/kg kūno svorio. Minimalus laiko tarpas tarp dozių – 4–6 valandos. Kontraindikacijos: „Ibugard“ nevartoti, jei yra padidėjęs jautrumas vaisto sudedamoms medžiagoms; yra pasireiškęs šalutinis poveikis, vartojant bet kurį nesteroidinį vaistą nuo uždegimo (NVNU); jei yra neaiškų kraujodaros sutrikimų; jei yra ar buvo pepsinė opa arba kraujavimas iš virškinamojo trakto; jei yra kraujavimas į smegenis ar kitoks kraujavimas; sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas; paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai: jeigu prasidėjo virškinamojo trakto kraujavimas arba kraujavimas, gydymą ibuprofenu reikia nedelsiant nutraukti. Sergant vėjausraupiais reikia vengti vartoti ibuprofeno. Atsargiai skirti pacientams, kuriems praėjusio laiko buvo virškinamojo trakto ligų, buvusi hipertenzija arba širdies nepakankamumas, sutrikusi inkstų, kepenų funkcija, nustatyta sisteminė raudonoji vilkligė arba kita imuninio audinio liga, kai pacientas po sunkios chirurginės operacijos ar serga obstrukcine kepenų takų liga, alerginėmis ligomis. Ibuprofenas laikinai gali slopinti trombocitų funkciją. Nevartoti pacientams, kuriems yra retas paveldimas fruktozės netoleravimas. Teksto paruošimo data 2017 01 mėn.



AMEDIPLUS

Šildantis arklų balzamas, 250ml
 Šaldantis arklų balzamas, 250ml
 KOSMETIKA

-30% **3⁸⁴**

2⁴⁹

GAMINAME VAISTUS PAGAL INDIVIDUALIUS RECEPTUS

- Atneškite gydytojo receptą iki 13 val.
- Atsiimkite pagamintą vaistą kitą darbo dieną.



VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS

VAISTININKĖ: RYTINIS KAVOS PUODELIS – NE VIENINTELIS BŪDAS PABUSTI

Kiekvieno žmogaus fiziologiniai poreikiai yra skirtingi: ko pakanka vienam, kitam gali būti per mažai. Taip yra ir su miegu, kurio stygiumi skundžiasi daugelis. Vaistininkė pasakoja, kaip pasijusti žvaliam apsieinant be didelės kofeino dozės.

Dažniausiai jaunam ir vidutinio amžiaus žmogui rekomenduojama bent jau 7-8 val. poilsio, o vaikams – nuo 9 valandų, priklausomai nuo amžiaus. Jau nuo 30-ies metų ima trumpėti gilaus miego fazė, todėl vyresnio amžiaus žmonėms atsikelti yra kur kas lengviau nei jaunesniems.

„Mūsų organizmas turi labai gerą atmintį, todėl tinkamai nepailsėjus, nuovargis kaupiasi ir organizmas stengiasi patenkinti miego poreikį. Dažnu atveju daugelis žmonių miego stygių bando kompensuoti stimuliuojančiais produktais, tokiais kaip kava arba greitu energijos šaltiniu – cukrumi. Tai trumpalaikės priemonės, dažniausiai duodančios 30 minučių efektą, bet išbalansuojančios mūsų organizmą“, – sako „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Raimonda Truncė.

Per daug kofeino slopina

Pasak vaistininkės, kofeinas stimuliuoja centrinę nervų sistemą, taip pakeldamas kraujospūdį bei padidindamas širdies plakimo dažnį, todėl gali sukelti galvos spaudimo pojūtį. Kad ir kaip atrodytų keista, itin didelis kavos kiekis, jos perdozavimas, pradeda veikti priešingai – atsiranda slopinimo jausmas.

„Jei vis tiek neįsivaizduojate savo rytinės rutinos be kavos puodelio ir jos aromato, rinkitės kavos rūšį su nedideliu kiekiu vandens, pavyzdžiui, espresso. Vyrauja neteisinga nuomonė, kad espresso yra labai stipri kava – ji tik aromatinga dėl didelio eterinių aliejų kiekio, o kofeino joje mažai, nes kofeinas yra beskonė ir bekvapė medžiaga tirpi vandenyje, todėl kuo ilgesnis sąlytis su vandeniu, kuo ilgiau mes kavą geriamo, tuo daugiau kofeino suvartojame. Dėl tos pačios priežasties geriau rinktis kavą iš aparato, nei plikyti puodelyje. Jei visgi plikote kavą puodelyje, rekomenduočiau jau paruoštą gėrimą persipilti, kad nebebūtų sąlyčio su kavos pupelėmis“, – pataria R. Truncė.

Arbata ir stiklinė vandens

Kavą galima keisti arbatomis – juoda, žalia ar mačia. Tačiau jas taip pat būtina vartoti atsakingai, mat šiose arbatose irgi gausu kofeino, kurio dideli kiekiai veikia širdies, kraujagyslių bei nervų sistemą.

„Rekomenduojama kofeino paros norma – iki 300 mg. Tai maždaug 3 puodeliai kavos. Tačiau reikia neužmiršti, kad kofeino yra įvairiuose saldžiuose gėrimuose, kepinuose ir šokolade“, – vardiya vaistininkė.

Vienas iš jos patarimų – tik pabudus išgerti stiklinę vandens, geriausia kambario ar kūno temperatūros, nes organizmas per naktį ištrokšta ir reikia atstatyti skysčių balansą. Tuo pačiu suaktyvėja ir visos organizmo funkcijos.

Režimo korekcijos

„Jei jaučiatės nuolat pavargę ir neišsimiegoję, pirmiausiai derėtų peržvelgti režimą. Kad ir kaip banaliai tai skambėtų, režimas yra gero ir produktyvaus miego pagrindas. Labai svarbu pažinti savo organizmo ciklus, kada yra aktyvumo, o kada ramybės fazė. Pirmiausia reikėtų atsisakyti televizoriaus ir išmaniųjų įrenginių miegamajame, nes labai dažnai sau padarome meškos paslaugą, praradę laiko nuovoką praleidžiamo ramybės fazę ir aktyvuojame organizmą“, – akcentuoja R. Truncė.

Antras patarimas, anot jos, kasdien stengtis eiti miegoti tuo pat metu, įskaitant ir savaitgalius, nes taip įsijungia organizmo cikliškumas – organizmas tarsi užsiprogramuoja. Bandymas savaitgaliais atsigriebti taip pat trikdo miego režimą.

„Bandykite organizmą įvesti į režimą palaipsniui, kad nejaustumėte diskomforto ar staigių pokyčių. Kas keletą dienų ankstinkite atsigulimą pusvalandžiu, kol pasieksite ramybės laiką“, – aiškina vaistininkė.



Perkant pakuotę antra tokia pati DOVANŲ! **1+1**

ACONITUM
MAISTO PAPILDAI
AUKŠTOS KOKYBĖS LIETUVIŠKI PREPARATAI, KURIUOS SUKŪRĖME JUMS
 *Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

RAUMENIMS IR SĄNARIAMS



AXANOVA

Priemonių „Axanova“ pagrindas – eteriniai aliejai, kurie veikia raminamai, gali padėti malšinti maudimą ar skausmą. Atsivėlgiant į priemonės sudėtį, turi šildomąjį arba šaldomąjį poveikį, gali būti naudojami esant sumušimams, patempimams, maudžiant sąnarius ar raumenis. Priemonių „Axanova“ veiksmingumas įrodytas moksliniais tyrimais. Pagaminta Šveicarijoje.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-40%



FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Fitolizyna Nefrocaps PLUS“ yra unikalus 7 koncentruotų augalinių ekstraktų mišinys, kuris:

- padeda palaikyti normalią inkstų ir šlapimo takų veiklą (petražolių šaknis, dirvinių asiūklių žolė, paprastųjų varpūčių šakniastiebiai, karpotųjų beržų lapai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė);
- padeda palaikyti normalią vandens pašalinimą iš organizmo, todėl skatinamas nepageidaujimų metabolizmo produktų šalinimas su šlapimu (dirvinių asiūklių žolė, paprastųjų varpūčių šakniastiebiai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė).

Rekomenduojamas vartojimas: 1 kapsulė 2 kartus per parą prieš valgį, užgeriant dideliu kiekiu vandens (ne mažiau kaip 2 stiklinės).

-20% **8³¹** 10³⁹



NAKVIŠŲ IR AGURKLIŲ ALIEJUS, 60 kapsulių **17⁹⁹ 11⁹⁶ € -30 %**

MAISTO PAPILDAS

Nakvišų ir agurklių aliejai – polinesočiųjų riebiųjų rūgščių šaltiniai, juose ypač daug linoleno ir gama linoleno rūgščių bei kitų medžiagų, kurie ypač reikalingi moterims. Produkto sudėtyje esantis vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. Nakvišų ir agurklių aliejai kartu su vitaminu E veikia kompleksiškai bei sustiprina vienas kito poveikį. Šie aliejai išgaunami šaltojo spaudimo būdu, todėl išsaugomos jų vertingosios savybės.

Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

MOTERS ŽAVESIO PASLAPTIS IŠ GAMTOS!

PROVITAL, 30 tablečių **15²⁹ 9¹⁷ € -40 %**


MAISTO PAPILDAS

„Provital“ sudėtyje yra gulsčiųjų serenojų vaisių ekstrakto, paprastųjų moliūgų sėklų aliejaus, didžiųjų dilgėlių lapų miltelių, gulsčiųjų ragūžių vaisių ekstrakto, vitamino, vario, cinko, seleno, likopeno, aminorūgščių, **Vitaminas E, varis ir selenas** padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną. Maisto papildas nėra maisto pakeičiklis. Nevirškite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

iki -40%

KAULAMS IR SĄNARIAMS



GLIUKOZAMINAS PLUS KOLAGENAS, CHONDROITINAS, MSM, 60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

daugiau informacijos apie produktus www.gamtosnamai.lt

-40% **9²³** 15³⁹



GINTARO RŪGŠTIS

10 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Vartojimas: suvaagusiems gerti po 1 tabletę 2 kartus per dieną valgant. **Gamintojas** – Marbiofarm, Rusija.

PIGU 0⁵⁵



B KOMPLEKSAS SU VITAMINU C, 30 kapsulių **7⁹⁹ 4⁶⁷ € -40 %**

MAISTO PAPILDAS

Tiaminas, riboflavinai, vitaminai B₆, B₁₂, C, niacinas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. **Tiaminas, vitaminai B₆, B₁₂ ir niacinas** padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją. **Foliatai** padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. **Pantoteno rūgštis** padeda palaikyti normalią proteinų veiklą, padeda palaikyti normalią steroidinių hormonų, vitamino D ir kiti kurių neuromediatorių sintezę ir apykaitą. **Vitaminas E** padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.



MAGNIS PLUS B₁₂ IR C, 21 paketėlis **11⁶⁹ 8¹⁸ € -30 %**

MAISTO PAPILDAS SU SALKIDKLAIS

Žaliųjų citrinų skonio burnoje tirpstantis granulės. **Magnis, Vitaminas B₁₂, Vitaminas C** padeda palaikyti:

- normalią energijos apykaitą,
- normalią nervų sistemos veiklą bei psichologinę funkciją,
- padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

Magnis

- padeda palaikyti normalią raumenų funkciją bei normalią kaulų ir dantų būklę.

iki -40%

JAMIESON geležis, 50 mg, 60 tablečių

Maisto papildas

- Geležies maisto papildas gaminamas tik iš organinio geležies gliukonato, rečiau sukeliančio šalutinį poveikį. Gaminant ne-naudojama neorganinės geležies – geležies sulfato, nes šios formos geležis turi šalutinių poveikių.
- Specialios sudėties papildas leidžia reikalingas maistines medžiagas pasisavinti palaipsniui per 6–8 val., todėl sumažina šalutinį poveikį skrandyje ir žarnyne.
- Didelė dozė – net 50 mg geležies vienoje tabletėje!
- Pakuotės užtenka net dviem mėnesiams.
- Geležis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.
- Pakuotės užtenka trims mėnesiams.




-30% **9⁰⁹**
12⁹⁹

JAMIESON lakto-bifidobakterijų kompleksas, 60 tablečių

Maisto papildas

- Pieno rūgšties bakterijų ir bifidobakterijų kompleksas.
- Kramtomosios braškių skonio tabletės.
- Tinka ir vaikams nuo 3 metų amžiaus.
- Tik viena tabletė per dieną.
- Produktas sertifikuotas testavimo sistema TRU-ID® DNA.



-30% **14⁶⁹**
20⁹⁹



Pagaminta klevų šalyje

JAMIESON lecitinas, 1200 mg, 100 kapsulių

Maisto papildas

- JAMIESON lecitinas išgautas iš natūralių sojų (ne genetiškai modifikuotų).
- Pakuotės užtenka pusantro mėnesio.



-30% **11⁸⁹**
16⁹⁹

JAMIESON LUTEIN-Z, 20 mg, 45 kapsulės

Maisto papildas

- Produktas aprūpina antioksidantais, skirtais palaikyti optimalią akių sveikatą.
- Net 20 mg liuteino vienoje kapsulėje.
- Sudėtyje papildomai yra 1000 mcg zeaksantino.
- Liuteinas ir zeaksantinas yra išgauti iš didžiųjų serenčių žiedų.
- Produktas sertifikuotas testavimo sistema TRU-ID® DNA.



-40% **10¹⁹**
16⁹⁹



Pagaminta klevų šalyje



iki
-30%

VITABOTICS WELL LINIJA

MAISTO PAPILDAI

WELLWOMAN – nakvių, agurklių, vitaminų ir mineralų kompleksas moterims. WELLMAN – sibirinių ženšenų, amino rūgščių, vitaminų ir mineralų kompleksas vyrams. WELLTEEN – subalansuota paaugliams, o WELLKID – patiems mažiausiems.

GERA SAVIJAUTA VISAI ŠEIMAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



OPTIC TOTAL, 30 tablečių
OPTIC SENIOR, 30 tablečių
OPTIC BIOLUTEINA 25, 30 tablečių
MAGNEZ+B6 OPTIMAL, 100 tablečių
IMMUNO POSITIVE, 30 tablečių
MAISTO PAPILDAI

Perkant pakuotę
antra tokia pati
DOVANŲ!

1+1



LEVEREN, PROPOLINK, RHINOSOL, VALERIANAE FORTE, OMEGA-3, MENOSTOP, GLUKOZIN, ERŠKĖTUOGIŲ SIRUPAS

MAISTO PAPILDAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

iki
-40%



STOP STRESS®, 30 kapsulių
STOP STRESS® NIGHT, 30 kapsulių
OSTEONOL®, 150 ml
FITESTEN®, 30 kapsulių
KARDIO START®, 30 kapsulių
IMMUNECO®, 30 kapsulių
BEAUTYNOL®, 30 kapsulių
BEAUTYNOL® EXCELLENCE, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAI

Pasimėgauk gyvenimo akimirkomis su BF-ESSE...

JŪSŲ GERAI SAVIJAUTAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-30%



FONIX® EAR PAIN purškalas, 15 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

Pirmoji pagalba pasireiškus dažnoms ausų problemoms, tokioms kaip:

- skausmas
- infekcijos
- susikaupusi siera
- dirginimas

„Fonix® Ear Pain“ yra medicinos priemonė, kurios sudėtyje yra augalinių aliejų mišinio, skirta ausiai apsaugoti nuo dažnų problemų ir jas palengvinti. Sudėtis: alyvuogių aliejus, indinių sezamo aliejus, gulsčių serenojų ekstraktas, fitosterolių kompleksas, bisabololis, kriaušių murelių lapų aliejus, celiulonių cinamono lapų aliejus, vengrinių ekstraktas, mėty aliejus.

Suaugusiems ir vyresniems kaip 3 metų vaikams.

Vartojimas: puršksti po 1–2 įpurškimus į kiekvieną ausį 3 kartus per parą.

7⁹⁹

NERVŲ SISTEMAI



KORVALOOL-P tirpalas, 25 ml

MAISTO PAPILDAS

60-ye lašų (rekomenduojamame suvartoti per parą kiekyje) yra: izovalerijonrūgšties-mentiloesterio – 183,60 mg, mentolio – 123 mg, α-bromizovalerijono rūgšties etilo esterio – 112,5 mg, pipirinės mėtų aliejaus – 7,80 mg, agynių aliejaus – 5,55 mg, RMV (referencinė maistinė vertė) – nenustatyta. Sudėtyje yra alkoholio – 55 %.

-30% **174** **249**



ACTAVIT

MAISTO PAPILDAI

„Actavit“ Omega-3 žuvų taukų sudėtyje yra 150 mg eikozapentaeno rūgšties (EPR) ir 110 mg dokozahexaeno rūgšties (DHR). Teigiama poveikis širdžiai pasireiškia per parą suvartojus ne mažiau kaip 250 mg DHR ir EPR rūgščių. 250 mg DHR rūgšties padeda išsaugoti normalią regėjimą bei palaikyti normalią smegenų funkciją.

„Actavit“ nakvių aliejuje yra 1000 mg nakvių (Oenothera biennis) aliejaus, kuriame yra 100 mg gama linoleno rūgšties ir 10 mg vitamino E (83 % rekomenduojamos referencinės maistinės vertės).

„Actavit A+E“ sudėtyje yra 1500 µg vitamino A ir 67 mg vitamino E. Vitaminas A padeda palaikyti normalią geležies apykaitą ir normalią gleivinių bei odos būklę, padeda išsaugoti normalią regėjimą ir palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, atlieka tam tikrą funkciją ląstelių specializacijoje. Vitaminas E – antioksidantas, padedantis apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

GRŪŽIUI IR SVEIKATAI. VISAI ŠEIMAI.

Perkant pakuotę
antra tokia pati
DOVANŲ!

1+1



BIODERMA

Prancūzijos dermatologijos laboratorija „Bioderma“ vadovaujasi požiūriu, kad odos priežiūros priemonės turi padėti atkurti natūralius biologinius procesus, šalinamos odos problemų kilmės priežastis bei simptomus. Priežiūros priemonės „Bioderma“ kuriamos tik iš grynųjų veiklių medžiagų, turinčių svarbų poveikį odai. Dermatologai, pediatrai, vaistininkai – visi šie specialistai rekomenduoja „Bioderma“ net ir jautriausią odą turintiems pacientams.

BIOLOGIJOS MOKSLAS DERMATOLOGIJAI.



-25%

ABC TEA TREE OIL

„Australian Bodycare“ produktų pagrindą sudaro grynas Australijos arbatmedžių (Melaleuca alternifolia) aliejus „Tea Tree Oil“. Arbatmedžių aliejus išskiria plačią atkuriamųjų savybių gamą, padeda išlaikyti higieninę odos švarą ir natūralią pH pusiausvyrą. Arbatmedžių aliejaus valomosios ypatybės padeda odai natūraliai valytis ir atsinaujinti, todėl puikiai tinka veido ir galvos odos priežiūrai, plaukų grožiui puoselėti. „Australian Bodycare“ švelnus veido prausiklis ir veido tonikas apsaugo nuo odos nešvarumų ir veiksmingai juos valo. Veido kremas lengvai įsigeria, oda tampa švelni bei sudrėkinta. „Australian Bodycare“ pieštukas tinka spuogams, vabzdžių įgėlimams ir smulkiems nubrozdinimams. Šampūnas saugo nuo pleiskanų susidarymo, plaukų riebalavimosi. „Australian Bodycare“ kūno prausiklis veiksmingai pašalina nepageidaujamus nešvarumus nuo odos jos nesusausindamas, o naudojant losjoną su arbatmedžių aliejumi oda tampa elastinga, sveika, mažėja guzelių ir jaugusių plaukelių rizika. Arbatmedžių aliejus – puikus pagalbininkas buityje valant paviršius, naikinant nemalonių kvapų. Arbatmedžių aliejų rekomenduojama garinti namuose, jei norite atgaivinti patalpų orą.

„TEA TREE OIL“ – SUKURTAS GAMTOS!



-25%

SUPRA FORMULĖ GROŽIUI

MAISTO PAPILDAS

„Supra formule grožiui“ – maisto papildas odai, plaukams, nagams. Viskas, ko ieškojai grožiui puoselėti, viename produkte: net 7 g kolageno, hialurono rūgšties, selenas, silicis, biotinas, cinkas ir vitaminas C. Aktyviosios medžiagos sumaišytos su tikromis juodųjų serbentų sultimis, be pridėtinio cukraus, saldiklių ir dažiklių. Cinkas padeda palaikyti normalią odos būklę, selenas – normalią nagų ir plaukų būklę, o vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno susidarymą, kuris reikalingas normaliai odos funkcijai. Vartojimas: gerti po 25 ml per dieną.



1+1

Perkant pakuotę,
antra tokia pati –
DOVANŲ

URIAGE

Dermatologinė kosmetika „Uriage“ gimta Prancūzijos Alpių papėdėje. Ilgus metus kurtą, pagrįsta moksliniais tyrimais, naudojama kasdien ir esant odos problemų. Kūdikiams, vaikams, suaugusiems.

KIEKVIENO POREIKIAMS. VISAI ŠEIMAI.



iki -40%

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

URIAGE
EAU THERMALE

KAS YRA MASKNE?

ILGAI DĖVINT KAUKĘ, GALI ATSIKASTI VEIDO
ODOS PAKITIMŲ DĖL TRINTIES,
DRĖGMĖS IR PRAKAITO.

PAGRINDINIAI MASKNE POŽYMIAI:

odos paraudimas kaukės nutrintose vietose (ant nosies pertvaros, skruostų, smakro), papulės, pleiskanojimas, gali pasireikšti niežėjimas, deginimo pojūtis.



KOKIAS PRIEMONES NAUDOTI SIŪLO URIAGE?

URIAGE terminis vanduo:

PURKŠTI, NUSIPRAUSUS VEIDĄ,
PRIEŠ TEPANT KREMĄ

Bariéderm CICA gelinis prausiklis su Cu-Zn

PAŽEISTAI ODAI PRAUSTI

Bariéderm CICA kremas su Cu-Zn

PAŽEISTAI ODAI IZOLIuoti IR ATKURTI

KASDIENĖ VEIDO ODOS PRIEŽIŪRA, ESANT MASKNE

SAUSAI ODAI,
LINKUSIAI |
ATOPINĖ DERMATITĄRAUSTANČIAI ODAI
LINKUSIAI | KUPEROZĖ
IR RAUDONĮXémose
VEIDO
KREMASRoséliane
KREMAS
RAUSTANČIAI
ODAIHyséac
SERUMAS
NAUJIENAODAI, LINKUSIAI |
AKNĖ IR
SPUOGUS



ACICLOVIR ACTAVIS 5% kremas, 5 g NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

„Aciclovir Actavis“ 5% kremas. 1 g kremo yra 50 mg acikloviro.
Terapinės indikacijos. Lokalus odos ir lūpų pūslelinės gydymas. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems „Aciclovir Actavis“ 5% kremo reikia tepti 5 kartus per parą, vidutiniškai kas 4 valandas; naktį daroma pertrauka. Gydoma 4 paras. Jei per 5 laikotarpį nepasveikstama, gydymą reikia tęsti dar 6 paras. Jei pūslėlinės neišnyksta ir po 10 parų, rekomenduojama kreiptis į gydytoją. „Aciclovir Actavis“ 5% kremo nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Vartoti ant odos. Kontraindikacijos: „Aciclovir Actavis“ 5% kremo negalima skirti pacientams, kurie yra jautrūs aciklovirui, valaciklovirui, propilenglikoliui ar bet kuriai „Aciclovir Actavis“ 5% kremo pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. „Aciclovir Actavis“ 5% kremo nerekomenduojama tepti gleivinės, pvz., burnos, akių ar lyties organų, nes galimas sudirginimas. Būtina laikytis atsargumo priemonių ir saugoti akis, kad į jas nepatektų kremo. Jeigu jūsų imunitetas labai susilpnėjęs, (t. y. jūsų organizmo gebėjimas kovoti su infekcija yra sumažėjęs); tokiu atveju dėl bet kokios infekcijos gydymo reikia kreiptis į gydytoją ir įvertinti gydymo geriamųjų aciklovirų galimybę. Pagalbinės medžiagos: cetosteirilo alkoholis, natrio laurilsulfatas ir propilenglikolis gali sukelti vietinių odos reakcijų. Teksto peržiūros data 2020-02-08.



SUDOCREM® MULTI-EXPERT, 60g, 125g, 250g MEDICINOS PRIEMONĖ

„Sudocrem“ skirtas iššutimų ir vystyklų bėrimų gydymui ir profilaktikai. Tinka kūdikių ir suaugusiųjų odos priežiūrai. Šis kremas ne tik minkština ir ramina odą, bet ir sudaro vandeniui atsparų barjerą bei neleidžia toliau dirginti odos. Nesusigeria į sauskelines, todėl padeda užtikrinti odos apsaugą. Naudoti atsiradus iššutimams. Skirtas naudoti tik išorškai.

„SUDOCREM“ – TRIGUBAS EFEKTAS: GYDO. RAMINA. APSAUGO.

4⁹⁹

Perkant pakuotę antra tokia pati DOVANŲ! 1+1



SUPERČISTOTELO, 3 ml

KOSMETINIS SKYSTIS

Suragėjusios (nuo karpy ir papilomų) odos priežiūra.
Vartojimas. Suragėjusios odos lopinėlių rekomenduojama išmirkyti vandenyje, sritį apie lopinėlių sutepti riebiu kremu ar vazelinu, po to aplikatoriumi pagalba suvilgyti 1–2 lašais kosmetikos gaminio ir jo nenuplauti 1–2 valandas. Po 1–2 dienų suragėjęs odos sluoksnis pradeda atsiskirti ir nukrenta. Po ne mažiau kaip 3 dienas pertraukus procedūrą galima pakartoti. Visam šios odos lopinėlio priežiūros kursui gali prireikti nuo 1 iki 5 tokių procedūrų. Gamintojas – Dve linii, Rusija.

-20% 27¹ 3³⁹



ABC VIT VITAMINAS D-3, 100µg, 60 kapsulių

ABC VIT VITAMINAS D-3, 50µg, 60 kapsulių

MAISTO PAPILDAI

Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų, dantų ir raumenų būklę, kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą, normalią imuninės sistemos veiklą.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

VITAMINAS A (ABC VIT), 60 kapsulių

VITAMINAS A (ABC VIT) lašai, 10 ml

VITAMINAS A IR E, 60 kapsulių

VITAMINAS E (ABC VIT) lašai, 10 ml

VITAMINAS E (ABC VIT), 60 kapsulių

MAISTO PAPILDAI

Vitaminas A padeda palaikyti normalią odos būklę, išsaugoti normalų regėjimą, palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

-30%



VAZELINAS, 30 g

KOSMETIKOS GAMINYS

Paskirtis: lūpų ir kojų pėdų odos priežiūra. Vartojimas: tepti odą 2–3 kartus per dieną. Gamintojas – „Altajivitamin“, Rusija.

-20% 27¹ 3³⁹



VIŠNEVSKIO BALZAMINIS LINIMENTAS, 30 g

I KLASĖS MEDICINOS PRIETAISAS, PAGALBINĖ ODO PRIEŽIŪROS PRIEMONĖ.

Vartojimas: naudoti ant odos aplikacijų pavidalu. Gamintojas – „Altajivitamin“, Rusija.

-20% 4⁴⁷ 5³⁹

Pasiūlymai galioja 2022 01 01 – 2022 01 31.

Leidinyje nurodytos maisto papildų, medicininės paskirties prekių ir medicinos prietaisų kainos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis, o vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms.

Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvktu.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Daugiau informacijos Norfos vaistinėje, tel. 8 800 10008, MAŽYLIUI IR MAMAI

skirtas prekes ypatingomis kainomis greičiau ir patogiau užsisakykite internetinėje vaistinėje www.vaistine.lt. Užsisakius prekių (išskyrus vaistinius preparatus) už 28,96 € ir daugiau – pristatymas NEMOKAMAI! Reklaminio teksto parengimo data – 2021 08 19.





iki
-25%



JORDAN

Kiekvienas mūsų turime unikalius dantis, naudojame individualią jų valymo techniką, be to, mums patinka skirtingos spalvos ir stiliai. Atsižvelgiant į skirtingus vartotojų poreikius bei siekiant padėti efektyviai išvalyti burnos ertmę, „Jordan“ siūlo plataus pasirinkimo dantų priežiūros priemonių liniją vaikams bei suaugusiems. Su „Jordan“ – tinkamiausia išsirinkti kiekvienas!

JORDAN – SKANDINAVIŠKA FORMULĖ JŪSŲ SVEIKIEMS DANTIMS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



BELLA HERBS

Moterys higienos priemonės su vaistinėmis liepžiedžių ir gysločio žolelėmis. Neleidžia daugintis bakterijoms ir grybeliams, ramina sudirgimus – saugo moters lytinę sveikatą. Neutralizuoja intymų kvapą ir užtikrina komfortą naudojant.

-40%

BELLA COTTON

Bella Cotton vatos pagalvėlės ir pagalukai pagaminti iš 100% medvilnės. Pagalvėlių krašteliai apšliti ir nesilauksniuoją, o pagalukai turi popierinius kotelius.

PRIEMONĖS SLAUGAI



SENI

SENI sauskelnės ir sauskelnės kelnaitės – orui laidžios, su kvapo kontrolės sistema. SENI apsauginiai paklotai – tai papildoma apsauga, kuri išsaugo švarią patalynę. SENI kosmetika odos priežiūrai – nuvalo, naikina kvapus, matina ir apsaugo odą nuo dirgiklių.

*Sauskelnės negalioja nuolaida su kompensuojamų vaistų pasu.

PROFESIONALŲS UROLOGINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

iki
-20%

PROTEZŲ PRIEŽIŪRAI



COREGA

Reguliariai naudojant valomasias tabletes „Corega“, dantų protezai visada bus švarūs. Tinka plėniams ir daliniams dantų protezams.

- Sunaikina 99,9 % blogą kvapą sukeliančių bakterijų.

- Padeda pašalinti apnašas ir giliai įsigėrusias dėmes.

- Suteikia dantų protezams gaivų mėty kvapą.

- Veikia per 3 minutes.

Fiksuojamieji kremo „Corega“ patikimai veikia iki 12 valandų ir neleidžia maisto likučiams įstrigti po protezais. CHLT/CHPLD/0009/16; 2018/10

VALGYK, JUOKIS IR GYVENK!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

JAUTRIŲ DANTŲ PRIEŽIŪRAI



SENSODYNE

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Dantų pastos Sensodyne yra specialiai sukurtos žmonėms, turintiems jautrius dantis. CHLT/CHMULBRA/0004/18a/JUL

EKSPERTO PAGALBA JAUTRIEMS DANTIMS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-30%

INTYMAI HIGIENAI



LISTERINE

BURNOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

Burnos skalavimo skysčiai „Listerine“ veiksmingai naikina apnašas, apsaugo nuo danteny uždegimo ir palaido gaivų burnos kvapą. Pasiekdamas vietas, kurių dantų šepetėlis negali pasiekti, skystis sunaikina iki 99 % kenksmingų bakterijų.

SU ŠEPETĖLIU TIK PUSĖ DARBO – NAUDOK IR „LISTERINE“.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

iki
-30%




VAGISAN

KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS

Priemonės „Vagisan“ su natūraliu pieno rūgštimi skirtos tinkamai lytinių organų priežiūrai. Rūgštis aplinka – būtina sąlyga, kad laktobacilos gautų paties gaminti pieno rūgštį ir daugintis. Taip užtikrinama optimali natūrali apsauga nuo infekcijos. Intymios higienos prausiklis „Vagisan“ tinka kasdieninei intymiajai higienai. Drėkinamasis makšties kremas „Vagisan“ sumažina tokius simptomus kaip sausumas, niežulys, deginimo pojūtis ir skausmas. Ovulės su pieno rūgštimi, skirtos natūraliai makšties pH terpei palaikyti ir atkurti.

PASIRŪPINK SAVO INTYMIŲ KOMFORTU!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



JAMIESON MULTI FOR KIDS, 60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

- Tai vitaminų ir mineralų kompleksas vaikams.
- Sudėtyje yra ne tik vitaminų, bet ir mineralų: kalcio, vario, jodo, geležies.
- Pagaminta iš koncentruotų vaisių bei daržovių sulčių: pomidorų, morkų, apelsinų, spanguolių ir citrulinų vaisių.
- Keturių gardžių vaisinių skonių: vyšnių, apelsinų, citrinų ir aviečių.
- Tabletės smagių gyvūnų formų: liuto, dramblio, begemoto ir bedžionės.
- Galima vartoti nuo 4 metų.
- Pakuotės užtenka net 2 mėnesiams!

-40% 10¹⁹ 16⁹⁹



IBUSTAR 20 MG/ML geriamoji suspensija vaikams, 100ml 3⁴⁹ € IBUSTAR 40 MG/ML geriamoji suspensija vaikams, 100ml 5⁴⁹ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Viename geriamosios suspensijos ml yra 20 mg ibuprofeno. Viename geriamosios suspensijos ml yra 40 mg ibuprofeno. Indikacijos: Ibustar yra uždegimą slopinantis ir skausmą malšinantis vaistinis preparatas (nesteroidinis vaistas nuo uždegimo, NNNU), pasižymintis karščiavimą malšančiomis savybėmis (antipiretikas). Ibustar vartojamas trumpalaikiam simptominiams gydymui: karščiavimo malšinimui, silpno ar vidutinio stiprumo skausmo malšinimui. Ibustar 20mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams, svėrantiesiems nuo 5 kg iki 29 kg (kurių amžius nuo 6 mėnesių iki 9 metų). Ibustar 40 mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams svėrantiesiems 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), paaugliams ir suaugusiems. Vartojimo būdas. Tinka vartoti tik per burną ir trumpai. Jeigu šio vaistinio preparato vaikams ir paaugliams reikia vartoti ilgiau kaip 3 dienas, arba jeigu ligos požymiai blogėja, reikia pasitarti su gydytoju. Prieš vartojimą buteliuką reikia stipriai supurti. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu praeityje buvo alerginių reakcijų vartojant acetilsalicilo rūgštį ar NNNU, pvz., bronchių spazmas, astma, nosies gleivinės paburkimas; jeigu buvo odos reakcijų (pvz.: paraudimas, paburkimas, dilgėlinė ar kiti panašūs reiškiniai); jeigu yra neaštrų kraujodaros sutrikimų; jeigu yra ar buvo praeityje skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa (pepsinė opa) arba kraujavimas (du ar daugiau asikrų įrodymų išopėjimo ar kraujavimo epizodų); jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakurimas, sužalys su ankstesniu NNNU vartojimu; jeigu yra kraujavimas į smegenis arba kitoks kraujavimas; jeigu yra sunkus inkstų arba kepenų funkcijos nepakankamumas; jeigu nustatytas sunkus širdies nepakankamumas; netekus daug skysčių (dėl vėmimo, viduriavimo ar dėl nepakankamo skysčių vartojimo); jeigu yra paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Ibustar. Salutinės poveikis gali sumažėti vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką būdingų simptomų kontrolei. Ibustar reikia vengti vartoti kartu su kitais NNNU, įskaitant COX-2 (ciklooksigenazės-2 selektyviuosius) inhibitorius. Jeigu jūsų vaikai atsiranda skrandžio kraujavimas ar išopėjimas, nutraukite Ibustar vartojimą. Nedelsiant informuokite gydytoją, jeigu atsiranda bet koks neįprastas simptomas pike. Pastebėjus pirmųjų odos išbėrimo, gleivinės patėdimo ar kitų padidėjusio jautrumo reakcijos požymių, Ibustar vartojimą reikia nutraukti. Sergant vėjaupais reikia vengti vartoti Ibustar. LT-Ibu-11-2020-V1 Pharma Reklama paruošta 2020 m. Gruodžio mėn.

GREIT IR VĖL KARALIUS!

nuo 3⁴⁹



DOCTOR FISH OMEGA-3 + VITAMINS D & E, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

- Su saldikiu Maisto papildas sudėtyje yra omega-3 riebalų rūgščių (EPR ir DHR) ir vitaminų D ir E:
- EPR (eikozapentaeno rūgštis) ir DHR (dokosaheksaeno rūgštis) padeda palaikyti normalią širdies veiklą;
 - DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją, išsaugoti normalų regėjimą;
 - Vitaminas D padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų, raumenų, dantų būklę;
 - Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.
- Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.

-30% 6⁷¹ 9⁹⁹



FOLIO RŪGŠTIS

Folio rūgštis, 400 mcg, 30 tablečių
Folio rūgštis, 400 mcg, 270 tablečių

MAISTO PAPILDAI

Folio rūgštis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: po 1 tabletę per parą.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

Perkant pakuotę – antra tokia pati DOVANŲ!

1+1



MARSIEČIAI®

MAISTO PAPILDAI

„Marsiečiai® Guminukai su ežiule“ – skanūs guminukai vaikams. Sudėtyje yra rausvažiedžių ežiulių ekstrakto. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Sirupo „Marsiečiai ImunoForte“ sudėtyje yra betaglikanų, vitamino C, šėvamedžių uogų ir erškėtuogių. Tinka vaikams nuo 1 metų.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

-30%



HAPPY

HAPPY

Visos HAPPY sauskelnės yra orui laidžios, su natūralios kilmės žaliosios arbatos ekstraktu (lot. *Camelia sinensis*), kuris veikia antibakteriškai ir neutralizuoja nemalonius kvapus.

Mažiausių dydžių sauskelnės turi specialų iškirpimą bambutei ir yra pušesnės – teisingai kūdikio kolyčių padėčiai išlaikyti. Didelių dydžių – plonesnės, su elastingu juosmens dalimi ir apaukštinata apsauginiais kraštais.

Dregnos servetėlės – be alkoholio ir parabenų, su skirtingais ekstraktais – išsirink pagal poreikį. Ir nepamirškite vatos pagalvukų su apsauga!

*Sauskelnės negalioja nuolaida su kompensuojamųjų vaistų pasu.

HAPPY – SU MEILE JŪSŲ MAŽYLIUI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis.

-20%



AMEDIPLUS NĖŠTUMO TESTAI

- AMEDIPLUS nėštumo testas, juostelė, 1 vnt. 1⁹⁹ 0⁸⁴ € -20 %
AMEDIPLUS nėštumo testas, kasėtė, 1 vnt. 1⁹⁹ 1⁴⁴ € -25 %
AMEDIPLUS nėštumo testas, ypač ankstyvas/srovinis, 1 vnt. 5⁹⁹ 3⁹⁹ € -35 %
AMEDIPLUS nėštumo testas, srovinis, 1 vnt. 3⁹⁹ 2⁷⁹ € -30 %
AMEDIPLUS nėštumo testas, Ovuliacijos, 1 vnt. 1⁹⁹ 1³⁷ € -30 %

MEDICINOS PRIEMONĖS

Materiai pastojus įs organizmas ima gaminti specifinį hormoną „žmogaus chorioninį gonadotropiną“ (ŽCG) tai yra gliukoproteininis hormonas išskiriamas iškart po apvaisinimo bėvystančios placentos. Nėštumo testas Ameliplus yra skirtas nustatyti ŽCG šlapime. Kaip ir atliekant kitus testus, galutinę diagnozę nustato gydytojas. Testo tikslumas 99%, jautrumas 99%.

iki -35%



TEDIS SU EŽIUOLE

100 miško uogų skonio tablečių 14⁹⁹ 10³⁵ €
TEDIS SU EŽIUOLE

30 miško uogų skonio tablečių 9⁹⁹ 6⁷¹ €

MAISTO PAPILDAS

TEDIS SU EŽIUOLE papildo vaiko organizmą vitaminais ir mikroelementais. Sudėtyje yra ežiulių, liucernų, guobų, spanguolių ekstraktų ir vitamino C, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. TEDIS SU EŽIUOLE kramtomosios tabletės yra vaikų mėgstamos mešikiukų formos.

-30%

AMBIO MAISTO PAPILDAMS

iki
-40%



Pasiūlymai galioja 2022 01 01 - 2022 01 31, perkant vaistinę, pateikus PC NORFA kortelę. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą. Prekių kiekis ribotas. UAB „Norfos vaistinė“ pasilieka teisę bet kada keisti akcijos sąlygas. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.