VAISTINĖ

TOP RUGSĖJO PASIŪLYMAI

-50% **5,85 €** ~~11,69~~

AMBIO OMEGA-3 FORTE
60 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

- Dokozaheksaeno rūgštis (DHR) padeda palaikyti normalią smegenų funkciją ir išsaugoti normalų regėjimą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg DHR.
- Eikozapentaeno rūgštis (EPR) ir DHR padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.
- Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

NUO **2,99 €**

DOLMEN 25 mg, 10 tablečių **2,99 €**
DOLMEN 25 mg, 10 paketėlių **3,99 €**
DOLMEN 25 mg, geriamasis tirpalas, 10 paketėlių **4,49 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliojoi medžiaga. Deksketoprofeno trometamolis (dexketoprofenum). Vienoje plėvele dengtoje tabletėje arba granulių geriamajam tirpalui paketėlyje yra 25 mg deksketoprofeno. Vaisto forma. Plėvele dengtos tabletės arba granulės geriamajam tirpalui. Pakuotė. Po 10 tablečių arba po 10 paketėlių granulių. Indikacijos. „Dolmen" vartojamas trumpaalaikiam simptominiam lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų, sąnarių ir kaulų skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorėjos), dantų skausmui malšinti. Dozavimas. Atsižvelgiant į skausmo priežastis ir intensyvumą, rekomenduojama gerti: po 1 tabletę arba paketėlį 1–3 kartus per dieną kas 8 valandos. Didžiausia paros dozė neturi būti didesnė kaip 3 tabletės arba paketėliai. Jei esate senyvo amžiaus ar sergate inkstų, kepenų ligomis, pradėkite vartoti ne daugiau kaip 2 tablete arba paketėliu per parą. Vartojimo būdas. Jei vartojate granules, visą paketėlio turinį ištirpinkite stiklinėje vandens, suplakite. Išgerkite nedelsdami. Jeigu jaučiate intensyvų skausmą ir reikia jį greičiau nuslopinti, vaistą vartokite prieš valgymą (ne veliau kaip prieš 15–30 min.). Poveikis prasideda po 30 min. pavartojus vaisto. Skausmą malšinantis poveikis trunka 4–6 valandas. Šio vaisto neturėtų vartoti vaikai ir paaugliai (jaunesni kaip 18 metų). Kontraindikacijos. Padidėjes jautrumas deksketoprofenui, kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aspirinui; vartojant ketoprofeno ar fibratų buvę fotoalerginės ar fototoksinės reakcijos; pepsinė opa, buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto, letėjinai virškinimo sutrikimai bei lėtinės virškinimo trakto ligos; sunkus širdies nepakankamumas, vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų funkcijos, sunkus kepenų veiklos sutrikimas; esant sunkiai dehidratacijai; nėštumas bei žindymo laikotarpis. Įspėjimai. Vaistą atsargiai turi vartoti vyresnio amžiaus ligoniai, sergantieji alergija, astma, širdies, inkstų, kepenų ligomis, hipertenzija, sistemine raudonoja vilklige, cukriniu diabetu, įvairiomis jungiamojo audinio ligomis, sutrikus kraujodarai; vartojant šiapimo išsiskyrimą skatinančius vaistus ar netekus daug skysčių. Pasitarkite su gydytoju, jei vartojate kitų vaistų: geriamųjų steroidinių, nuo depresijos, apsaugančių nuo kraujo krešumo. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netolerituojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Sudėtyje yra 2,40–2,44 g sacharozės vienoje dozėje. Tai turėtų atsižvelgti pacientai, sergantys cukriniu diabetu. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepreaina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie ji praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.

-50% **7,25 €** ~~14,49~~

AMBIO VITAMINAS D_3
4000 IU, 60 kapsulių
MAISTO PAPILDAS



2,99 €

KREON 10 000 V skrandyje neirios kietosios kapsulės, 20 kapsulių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: Vienoje Kreon 10 000 skrandyje neirioje kietojoje kapsulėje yra 150 mg kasos miltelių, kurių aktyvumas atitinka 10 000 vienetų lipazės, 8 000 vienetų amilazės, 600 vienetų proteazės.
Indikacijos. Suaugusiųjų kasos egzokrininės funkcijos nepakankamumo gydymas (fermentų pakeičiamoji terapija).
Dozavimas. Kreon 10000 V dozė priklauso nuo virškinimo sutrikimų laipsnio, tinkamiausia dozė nustatoma individualiai. Jeigu kitaip nenurodyta, valgant išgeriamos 2–4 skrandyje neirios kietosios kapsulės. Priklausomai nuo maisto ir virškinimo sutrikimo sunkumo, rekomenduojama dozė gali būti žymiai didesnė. Dozę galima didinti tik gydytojui leidus. Paros dozė neturi būti didesnė kaip 10000 lipazės vienetų / paciento kūno svorio kilogramui arba 4000 vienetų lipazės / gramui suvartojamų riebalų. **Vartojimo būdas.** Vartoti per burną. Kapsules reikia nuryti nepaženistas, nesutrupintas ir nesukramtytas, užsigeriant pakankamu skysčio kiekiu, kiekvieno valgio ar užkandžio metu arba po jo. Tada fermentai galės visiškai susimaišyti su maistu ir padės suviršinti žarnynu slenkantį maistą. Jeigu kapsulę sunku nuryti, atsargiai atidarykite ją ir supilkite granules į nedidelį kiekį skysto rūgštaus maisto (pvz., obuolių tyrės arba jogurto) arba sumaišykite jas su rūgščiais skysčiais (obuolių, apelsinų arba ananasų sultimis). Negalima granulių dėti į karštą maistą ar skysčius. Mišinį reikia tuoj pat nuryti, jo laikyti negalima. Granulių sumaišymas su nerūgščiu maistu ar skysčiais, sutrynimas arba kramtymas gali sukelti burnos sudirginimą arba pakeisti Kreon poveikį Jūsų organizme. Nelaikykite vaisto burnoje. Kasdien būtina gerti daug skysčių.
Kontraindikacijos. Jeigu yra alergija kasos milteliams arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai.** Buvo gauta pranešimų apie klubinės, aklosios ir storosios žarnos susiaurėjimo (fibrozinės kolonopatijos) atvejus, kai cistine fibroze sergantys pacientai vartojo dideles kasos miltelių preparatų dozes (iki 10 000 vienetų lipazės / kg kūno svorio per parą). Jei Jums atsiranda neįprastų pilvo simptomų arba pilvo simptomai pakinta, pasitarkite su gydytoju.
Reklamos teksto parengimo data: 2021 metų kovo mėn. MYL-LT-21-29

-50% **3,75 €** ~~7,49~~

BIOSILYMARIN
105 g granulės, 28 paketėliai
MAISTO PAPILDAS

Ekologiški granuliuoti tikrieji margainiai – silimarinas! Tikrieji margainiai padeda palaikyti normalią kepenų ląstelių regeneraciją, kepenų funkciją, virškinimą, organizmo valymo funkciją. Užtenka 1 pakelio per dieną. Pagaminta Čekijoje. Turi ekologiškumo sertifikatą!
PASIRŪPINKITE SAVO KEPENIMIS!

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**

SALDUS MIEGAS
15 kapsulių **6,98 €**
MAISTO PAPILDAS

Linija **„Saldus miegas"** – dvejopo poveikio, skirta padėti greičiau užmigti ir atsikelti pailsėjus. **„Saldus miegas"** vartotojų jau įvertintas, dvejopo poveikio, net 7 aktyviųjų medžiagų kompleksas, skirtas greičiau užmigti ir atsikelti pailsėjus. Sudėtyje esantys šimtmečius naudojami ramunėlių, valerijonų ekstraktai ir mokslo pagrįstos medžiagos – 5-hidroksitriptofanas ir melatoninas – bei B grupės vitaminai padės patiriantiems stresą ir jaučiantiems nerimą. Tik 1 kapsulė prieš miegą!
GERAM POILSIUI – SALDUS MIEGAS

SUPER PASIŪLYMAI!

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO

NUO **1,99 €**

IBUPROM

IBUPROM, 200 mg, 10 dengtųjų tablečių **1,99 €**
IBUPROM, 200 mg, 20 dengtųjų tablečių **3,49 €**
IBUPROM, 400 mg, 10 plėvele dengtų tablečių **2,49 €**
IBUPROM, 400 mg, 20 plėvele dengtų tablečių **3,99 €**
IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 10 minkštųjų kapsulių **2,99 €**
IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 20 minkštųjų kapsulių **4,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg ir 200 mg. Indikacijos: skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Ibuprom Express, 400 mg“: suaugusiems pacientams ir vyresniems nei 12 m. vaikams kaip trumpalaikis pagalbinis gydymas kas 4 val. geriama 1 kapsulė (negerti daugiau kaip 3 kapsulių per parą); „Ibuprom, 400 mg“: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1 plėvele dengtą tabletę 3 kartus per parą. Jaunesniems kaip 12 m. vaikams vartoti negalima; „Ibuprom, 200 mg“: 6–9 m. vaikams (kūno svoris 20–29 kg) vartoti po 1 tabletę kas 6–8 val. po valgio. Negalima vartoti daugiau nei 3 tabletes per parą (didžiausia paros dozė – 600 mg, vartojant per kelis kartus). 10–12 m. vaikams (kūno svoris 30–39 kg) vartoti po 1 tabletę kas 6 val. po valgio. Negalima vartoti daugiau nei 4 tabletes per parą (didžiausia paros dozė – 800 mg, vartojant per kelis kartus). Dozavimas suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams – pradinė dozė yra 2 tabletės, užgeriant vandeniu. Po to, jei būtina, rekomenduojama gerti po 1–2 tabletes kas 4 val. Negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių (1200 mg) per 24 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, taškinis kraujavimas, ūminės skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligės stadija; anksčiau buvusi alergija acetilsalicilo rūgščiai ir kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; sergant sunkiu širdies nepakankamumu; esant trečiam nėštumo trimestrui. Specialūs įspėjimai: vartoti nepatartina, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu, bronchų astma. Teksto parengimo data 2022-03-03.
YRA „IBUPROM“. NĖRA SKAUSMO.

NUO SKAUSMO IR UŽDEGIMO

NUO **6,99 €**

ODIFLAN

ODIFLAN 20 mg/g gelis, 50 g **6,99 €**
ODIFLAN 20 mg/g gelis, 100 g **9,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI.
1 g gelio yra 23,2 mg diklofenako dietilamino, atitinkančio 20 mg diklofenako natrio druskos. **Terapinės indikacijos:** suaugusiesiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams skirtas lokaliai simptominiam skausmui malšinti, esant ūminiams įtempimams, patempimams ar sumušimams po bukos traumos. 14 m. ir vyresniems paaugliams vaistinis preparatas skirtas gydyti trumpą laiką. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** „Odiflan“ reikia vartoti ant odos 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Atsiželgiant į gydomos pažeistos vietos dydį, reikia nuo vyšnios iki graikiško riešuto dydžio gelio kiekio, atitinkančio 1–4 g gelio, kuris atitinka 20–80 mg diklofenako natrio druskos. Didžiausia paros dozė yra 8 g gelio, kuris atitinka 160 mg diklofenako natrio druskos. Vartojimo trukmė priklauso nuo simptomų bei pagrindinės ligos. Be gydytojo patarimo „Odiflan“ negalima vartoti ilgiau kaip 1 savaitę. Jeigu per 3–5 dienas simptomai nepalengvėja arba net pasunkėja, būtina gydytojo konsultacija. **Kontraindikacijos:** „Odiflan“ vartoti negalima: jeigu yra alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu Jums kada nors anksčiau pavartojus acetilsalicilo rūgšties arba kitų NVNU (pvz., ibuprofeno) buvo sutrikęs kvėpavimas (astma, bronchų spazmas), pasireiškė dilgėlinė, sloga, veido arba liežuvio patinimas; esant odos arba gleivinių atviroms žaizdoms, uždegimui arba infekcijai, taip pat sergant egzema; paskutiniuoju nėštumo trimestru; jaunesniems kaip 14 m. vaikams ir paaugliams. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės reikalingi, jei sergate astma, šienlige, nosies gleivinės patinimu ar letinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis, lėtinėmis kvėpavimo takų infekcijomis arba yra padidėjęs jautrumas kitiems skausmą malšinantiems vaistams ir bet kuriems vaistams nuo reumato; taip pat pacientams, kurie yra alergiški kitoms medžiagoms ir kuriems būna odos reakcija, pasireiškia niežulys arba dilgėlinė. Kai „Odiflan“ vartojama dideliam odos plotui ir ilgai gydyti, negalima paneigti galimo sisteminio šalutinio poveikio. „Odiflan“ galima vartoti tik ant nepažeistos ir sveikos odos. Žiūrėkite, kad nepatektų į akis ir nekontaktuotų su gleivinėmis. Nesinaudokite oro nepraleidžiančiais tvarsčiais. „Odiflan“ vartojimą reikia nutraukti, jei atsiranda odos bėrimas. Vartodami šį vaistą venkite saulės spindulių, taip pat nesinaudokite soliariumu. Saugokite, kad vaikai negalėtų paliesti šiuo vaistu gydomų odos vietų. Teksto peržiūros data: 2020-09-30. *Palyginus su Olfen 1% geliu.
TAIKLUS SKAUSMO MALŠINIMAS

NATŪRALŪS AKIŲ LAŠAI

-30%

NAVI®VISION PLUS

MEDICINOS PREKĖS
Stipriai drėkinantys natūralūs akių lašai pagrindinėms akių problemoms spręsti.
Pavargusioms akims: užtikrina greitą ir ilgalaikį palengvėjimą, esant sausų akių pojūčiui. Sudirgusioms akims: raminą dėl alergijos sudirgusias akis. Paraudusioms akims: padeda palengvinti paraudusių akių būklę, susijusią su uždegimu, niežėjimu, deginimu, svetimkūnio patekimu.
- Su natrio hialuronatu 0,3 %.
- Su natūraliais augaliniais ekstraktais.
- Tinka naudoti nešiojant visų rūšių kontaktinius lęšius.
- Atidarius galioja 3 mėn.
- Pakuotėje net 15 ml.
- Neutralus pH.

TINKA NAUDOTI NEŠIOJANT VISŲ RŪŠIŲ KONTAKTINIUS LĘŠIUS.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIAI, INHALIATORIAI IR TERMOMETRAI

IKI -35%

OMRON

OMRON

Hipertenzija ir priešširdžių virpėjimas (AFib) yra du pagrindiniai insulto rizikos veiksniai. Matuokite kraujospūdį kasdien. Jau 80 metų Omron yra naujausių technologijų lyderis. Su žingsniamačiu WSIII: atsikratykite nereikalingo svorio, skatinkite medžiagų apykaitą, sutvirtinkite raumenis. Džiaukitės ir išlikite jauni! Naujiena Lietuvoje „Omron“ bekontaktis termometras GT720. Saugus, patogus ir greitas matavimas. Ypač patogu tėvams, auginantiems mažus vaikus. Gydyti inhaliacijomis – puikus pasirinkimas visai šeimai! Dažnas kosulys, švokštimas, dusulys, skausmas krūtinėje, laringitas, astma ar tiesiog peršalimas... „Omron“ inhaliatoriai padės sušvelninti šiuos simptomus. Jie veikia tyliai, labai smulkios dalelės, greitas vaistų išpurškimas.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

KRAUJOTAKAI IR ATMINČIAI

NUO **5,86 €**

GINKOBIL 80 mg, 40 kietųjų kapsulių **5,86 €**
GINKOBIL 120 mg, 40 kietųjų kapsulių **8,24 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 80/120 mg rafinuoto ir kiekybiškai įvertinto ginkmedžių lapų sausojo ekstrakto. Indikacijos: lengvo ir vidutinio smegenų kraujotakos nepakankamumo, pasireiškiančio susilpnėjusia atmintimi ir dėmesio koncentracija, spengimu ar ūžimu ausyse, svaiguliu ar galvos skausmu, simptominiam gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: gerti po 1 kapsulę 2–3 kartus per dieną (atitinka 160–240 mg dienos dozę). Kontraindikacijos: vartoti negalima, jei yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Ginkobil“ medžiagai. Specialūs įspėjimai: kadangi dviskiaučių ginkmedžių lapų ekstrakto poveikis depresinei nuotaikai ir galvos skausmui, nesusijusiems su silpnaprotystės sindromu, kol kas nėra pakankamai ištirtas, medikamentų gydyti šiuos simptomus galima tik laikantis visų būtinų atsargumo priemonių. Teksto peržiūros data 2017-05-22
VEIKSMINGAI GERINA SUTRIKUSIĄ KRAUJOTAKĄ!

5,99 €

SEPTABENE 3 mg/1 mg, 16 kietųjų pastilių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
„Septabene“ dezinfekuoja burną ir ryklę bei lengvina ryklės uždegimo požymius: skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. Kietosios pastilės „Septabene“ vartojamos uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti: jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas; sergant dantenų uždegimu (gingivitu), ryklės uždegimu (faringitu) ir gerklų uždegimu (laringitu); prieš dantų traukimą ir po jo. **Dozavimas:** suaugusiesiems rekomenduojama paros dozė yra 3–4 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3–6 valandas. 6–12 m. vaikams rekomenduojama paros dozė yra 3 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3–6 valandas. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 m. vaikas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Septabene“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydomojo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. „Septabene“ negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Kietųjų pastilių negalima vartoti kartu su pienu, nes jis silpnina cetilpiridinio chlorido antimikrobinį poveikį.
TAVO GERKLĖ – TAVO JĖGA!

NUO 3,99 €

COLDREX

COLDREX, 500 mg/25 mg/5 mg/20 mg/30 mg, 12 tabletių **3,99 €**
COLDREX, 500 mg/25 mg/5 mg/20 mg/30 mg, 24 tabletės **5,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Kiekvienoje tabletėje yra 500 mg paracetamolio, 25 mg kofeino, 5 mg fenilefrino hidrochlorido, 20 mg terpinhidrato, 30 mg askorbo rūgšties. **Terapinės indikacijos:** peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. **Dozavimas:** *suaugusiesiems (įskaitant senyvo amžiaus) ir 16 metų bei vyresniems paaugliams, sveriantiems daugiau nei 54 kg* gerti po 2 tabletes kas 4–6 val., jei reikia. Didžiausia paros dozė yra 8 tabletės per 24 valandas. 12–16 metų paaugliams, kurių kūno svoris 43–54 kg gerti po vieną tabletę kas 4–6 val., jei reikia. Didžiausia paros dozė yra 4 tabletės per 24 val. Nevartoti dažniau nei kas 4 valandas. Negalima viršyti nurodytos dozės. Nevartoti ilgiau kaip 3 dienas. **Vartojimo būdas:** nuryti tabletę nekramčius, užgeriant reikiamu skysčio kiekiu. **Specialūs įspėjimai.** Nevartokite kartu jokių kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio, ar vaistų nuo kosulio ar peršalimo, gripo ir nosies gleivinės paburkimo ar užgulusios nosies. Per didelės paracetamolio dozės gali sukelti sunkų kepenų pažeidimą. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti Coldrex, jei: padidėjusi prostata arba Jums sunku šlapintis; sergate kraujagyslių liga, vadinama Raynaud fenomenu; sergate inkstų liga; yra lėtinis mitybos nepakankamumas; reguliariai vartojate alkoholį; sergate Žilberto sindromu; vartojate kitų vaistų, kurie veikia kepenų funkciją; Jums trūksta fermento gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės; sergate hemolizine anemija; yra dehidratacija; esate senyvo amžiaus, suaugęs ar vyresnis nei 16 metų paauglys, kurio kūno svoris mažesnis nei 54 kg; yra šlapimo susilaikymas ar šlapimo takų akmenys; sergate astma arba Jums yra padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, pasireiškiantis bronchų spazmu; sergate sunkia infekcine liga, nes gali padidėti metabolinės acidozės rizika. Vaisto sudėtyje yra kofeino. Vaisto vartojimo metu nevartokite kitų produktų, kuriuose yra kofeino (pvz., kavos, arbatos ir kai kurių energinių gėrimų, dažniausiai tiekiamų skardinėmis). **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliosiems arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu padidėjęs kraujo spaudimas; jeigu padidėjęs skydliaukės aktyvumas; jeigu sergate cukriniu diabetu; jeigu sergate širdies liga; jeigu sergate uždaro kampo glaukoma; jeigu sergate feochromocitoma; jeigu sergate kepenų ar sunkia inkstų liga; jeigu esate nėščia ar žindote kūdikį; jeigu vartojate vaistų, mažinančių nosies paburkimą, slopinančių apetitą, vaistų nuo peršalimo ar apetitą didinančių vaistų; jeigu vartojate tokius vaistus depresijai gydyti kaip triciklius antidepresantus, betablokatorius arba monoaminooksidazės inhibitorius (MAOI) bei dvi savaites po MAOI vartojimo; jaunesniems kaip 12 metų vaikams ar 12 metų ir vyresniems vaikams ir paaugliams, kurių kūno svoris yra mažesnis nei 43 kg. **Reklamos teksto parengimo data:** 2022-02-18

NUO 3,99 €

COLDREX MAXGRIP LEMON

1000 mg/10 mg/40 mg milteliai geriamajam tirpalui, 5 paketėliai **3,99 €**
1000 mg/10 mg/40 mg milteliai geriamajam tirpalui, 10 paketėlių **6,99 €**

COLDREX MAXGRIP MENTHOL & BERRIES

1000 mg/10 mg/70 mg milteliai geriamajam tirpalui, 10 paketėlių **6,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Terapinės indikacijos. Trumpalaikis peršalimo ir gripo simptomų (karščiavimo, slogos ir skausmo) lengvinimas. **Vartojimo būdas.** Vartoti per burną. Suberti vieno paketėlio turinį į stiklinę, pripilti karšto vandens (maždaug 125 ml), gerai išmaišyti, kol milteliai ištirps. Pagal poreikį pripilti šalto vandens. **Dozavimas.** *Suaugusiesiems (įskaitant senyvo amžiaus) ir 16 metų bei vyresniems paaugliams, kurių svoris didesnis nei 54 kg.* Rekomenduojama dozė yra 1 paketėlis kas 4–6 valandas, jei reikia. Nevartokite daugiau kaip 4 paketėlių per 24 valandas. Nevartokite dažniau nei kas 4 valandas. Negalima viršyti nurodytos dozės. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti vaistą, jeigu: padidėjusi prostata arba Jums sunku šlapintis; sergate kraujagyslių liga, vadinama *Raynaud* fenomenu; sergate inkstų liga; yra lėtinis mitybos nepakankamumas; reguliarai vartojate alkoholį; sergate Žilberto sindromu; vartojate kitų vaistų, kurie veikia kepenų funkciją; Jums trūksta fermento gliukozės 6-fosfato; sergate hemolizine anemija; yra dehidratacija; esate senyvo amžiaus, suaugęs ar paauglys, kurio kūno svoris mažesnis nei 54 kg; yra šlapimo susilaikymas ar šlapimo takų akmenys (negalima vartoti daugiau kaip 1 g vitamino C per parą); sergate astma arba Jums yra padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, pasireiškiantis bronchų spazmu; sergate sunkia infekcine liga, nes gali padidėti metabolinės acidozės rizika. Nevartokite kartu jokių kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio, ar vaistų nuo kosulio ar peršalimo, gripo ir nosies gleivinės paburkimo ar užgulusios nosies. Per didelės paracetamolio dozės gali sukelti sunkų kepenų pažeidimą. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliosiems arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu padidėjęs kraujo spaudimas; jeigu padidėjęs skydliaukės aktyvumas; jeigu sergate cukriniu diabetu; jeigu sergate širdies liga; jeigu sergate uždaro kampo glaukoma; jeigu sergate feochromocitoma; jeigu sergate kepenų ar sunkia inkstų liga; jeigu esate nėščia ar žindote kūdikį; jeigu vartojate vaistų, mažinančių nosies paburkimą, slopinančių apetitą, vaistų nuo peršalimo ar apetitą didinančių vaistų; jeigu vartojate tokius vaistus depresijai gydyti kaip triciklius antidepresantus, betablokatorius arba monoaminooksidazės inhibitorius (MAOI) bei dvi savaites po MAOI vartojimo; jaunesniems kaip 12 metų vaikams ar 12 metų ir vyresniems vaikams ir paaugliams, kurių kūno svoris yra mažesnis nei 43 kg. **Reklamos teksto parengimo data:** 2022-08-11

NUO SKAUSMO

3,99 €

ADOBIL 500 mg/150 mg, 10 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 500 mg paracetamolio ir 150 mg ibuprofeno. **Terapinė indikacija:** silpno ar vidutinio skausmo trumpalaikiam simptominiam malšinimui. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** Šio vaisto negalima vartoti vaikams iki 18 metų. **Suaugusiesiems** įprastinė dozė yra 1 tab. arba 2 tab. kas 6 val. pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 6 tab. per 24 val. vaistą rekomenduojama užgerti pilna stikline vandens. **Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai:** vaisto vartoti negalima jei yra alergija veikliosiems ar pagalbinėms medžiagoms, buvo kraujavimas virškinimo trakte ar susijęs su NVNU vartojimu, sergate ar sirgote peptine opa, vartojate daug alkoholio, sergate sunkiu širdies ar kepenų ar inkstų nepakankamumu, organizme vyksta kraujavimas, sutrikusi kraujo gamyba, pavartojus acetilsalicilo rūgšties arba kito NVNU, buvo pasireiškusi astma, dilgėlinė arba alerginė reakcija, paskutinis nėštumo trimestras ir jaunesniems kaip 18 metų pacientams. Vaistas didelėmis dozėmis gali truputi padidinti miokardo infarkto ir insulto riziką. Atsargiai skirti jei yra kardiovaskulinės rizikos faktorių. Nutraukite vaisto vartojimą, jei pasireiškšty sunkios odos reakcijos, tokios kaip odos išbėrimas, gleivinių pažeidimas, pūslės ar kiti alergijos požymiai. Vaisto vartojimas gali paslėpti infekcijos požymius. Kad neperdozuoti vaisto, patikrinkite, ar kitų vartojamų vaistų sudėtyje nėra paracetamolio. Ilgai vartojant gali pasireikšti tam tikras galvos skausmas. Gali išsikreipti šlapimo tyrimas naudojant 5HIAA duomenis. Reklamos teksto parengimo data 2022 02 10. PM-LT-2022-2-321

PERŠALIMUI

NUO 3,99 €

COLDREX HOTREM

COLDREX HOTREM LEMON 750 mg/10 mg/60 mg milteliai geriamajam tirpalui, 5 pak. **3,99 €**
COLDREX HOTREM LEMON 750 mg/10 mg/60 mg milteliai geriamajam tirpalui, 10 pak. **6,99 €**
COLDREX HOTREM HONEY & LEMON 750 mg/10 mg/60 mg milteliai geriamajam tirpalui, 10 pak. **6,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Terapinės indikacijos. Trumpalaikis peršalimo ir gripo simptomų (karščiavimo, slogos ir skausmo) lengvinimas. **Vartojimo būdas.** Vartoti per burną. Suberti vieno paketėlio turinį į stiklinę, pripilti karšto vandens (maždaug 125 ml), gerai išmaišyti, kol milteliai ištirps. Pagal poreikį pripilti šalto vandens. **Dozavimas.** *Suaugusiesiems (įskaitant senyvo amžiaus) ir 16 metų bei vyresniems paaugliams, kurių svoris didesnis nei 54 kg.* Rekomenduojama dozė yra 1 paketėlis kas 4–6 valandas, jei reikia. Nevartokite daugiau kaip 5 paketėlių per parą. Nevartokite dažniau nei kas 4 valandas. Negalima viršyti nurodytos dozės. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti vaistą, jeigu: padidėjusi prostata arba Jums sunku šlapintis; sergate kraujagyslių liga, vadinama *Raynaud* fenomenu; sergate inkstų liga; yra lėtinis mitybos nepakankamumas; reguliarai vartojate alkoholį; sergate Žilberto sindromu; vartojate kitų vaistų, kurie veikia kepenų funkciją; Jums trūksta fermento gliukozės 6-fosfato; sergate hemolizine anemija; yra dehidratacija; esate senyvo amžiaus, suaugęs ar paauglys, kurio kūno svoris mažesnis nei 54 kg; yra šlapimo susilaikymas ar šlapimo takų akmenys (negalima vartoti daugiau kaip 1 g vitamino C per parą); sergate astma arba Jums yra padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, pasireiškiantis bronchų spazmu; sergate sunkia infekcine liga, nes gali padidėti metabolinės acidozės rizika. Nevartokite kartu jokių kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio, ar vaistų nuo kosulio ar peršalimo, gripo ir nosies gleivinės paburkimo ar užgulusios nosies. Per didelės paracetamolio dozės gali sukelti sunkų kepenų pažeidimą. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliosiems arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu padidėjęs kraujo spaudimas; jeigu padidėjęs skydliaukės aktyvumas; jeigu sergate cukriniu diabetu; jeigu sergate širdies liga; jeigu sergate uždaro kampo glaukoma; jeigu sergate feochromocitoma; jeigu sergate kepenų ar sunkia inkstų liga; jeigu esate nėščia ar žindote kūdikį; jeigu vartojate vaistų, mažinančių nosies paburkimą, slopinančių apetitą, vaistų nuo peršalimo ar apetitą didinančių vaistų; jeigu vartojate tokius vaistus depresijai gydyti kaip triciklius antidepresantus, betablokatorius arba monoaminooksidazės inhibitorius (MAOI) bei dvi savaites po MAOI vartojimo; jaunesniems kaip 16 metų vaikams ir paaugliams. **Reklamos teksto parengimo data:** 2022-08-11

1,99 €

IBUPROFEN LANNACHER 400 mg, plėvele dengtos tabletės, 10 tablečių

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 400 mg ibuprofeno.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Indikacijos: „Ibuprofen Lannacher“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos ibuprofeno. Ibuprofenas malšina uždegimo sukeltą skausmą, patinimą ir karščiavimą, vartojamas trumpą laiką silpno ar vidutinio stiprumo skausmui, tokiam kaip mėnesinių, galvos, dantų, raumenų, sąnarių, malšinti.
Dozavimas ir vartojimo būdas: tabletes reikia nuryti valgio metu arba pavalgius, užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio. Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: 0,5–1 plėvele dengtą tabletę 3 kartus per parą. Negalima viršyti didžiausios paros dozės 1200 mg ibuprofeno (3 plėvele dengtų tablečių). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijų, vartojant kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo, acetilsalicilo rūgšties darinius. Sunkus kepenų, inkstų ar širdies funkcijos nepakankamumas. Paskutinių trijų nėštumo mėnesių laikotarpis. Pepsinė opa. Kraujavimas į smegenis, virškinimo traktą arba kt. Sisteminė raudonoji vilkligė. Jaunesni nei 12 m. vaikai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai skirti pacientams, sergantiems širdies ir kraujagyslių, smegenų kraujagyslių ligomis, cukriniu diabetu ir jungiamojo audinio ligomis, senyviems pacientams. Pacientams, sergantiems bronchine astma ar alerginėmis ligomis, gali išsivystyti bronchų spazmas. Virškinimo trakto sutrikimai ir lėtinės uždegiminės žarnyno ligos gali paūmėti. Atsiradus virškinimo trakto kraujavimui ar išopėjimui, gydymas turi būti nedelsiant nutrauktas. Vartojimas gali mažinti moters vaisingumą. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Pakuotė:** 10 plėvele dengtų tablečių. **Farmakoterapinė grupė:** nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo. **ATC kodas:** M01AE01. **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:** „Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.“, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. **Paskutinė teksto peržiūros data:** 2021-04-22.
NUSIMESK SKAUSMO KAUKĘ!

ESANT AKIŲ UŽDEGIMUI

-40% 14,99 € ~~24,99~~

DESODROP® akių lašai, 8 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ. Liposominis ozonuotas tirpalas akims su LipozonEye® Ozonas - galingas natūralus antiseptikas, turintis plataus spektro antibakterinį, antivirusinį, antigrybelinį poveikį. Preparatas skirtas uždegimo simptomų gydymui taip pat ir infekcinės kilmės (konjunktyvitui, keratitui, blefaritui ir pan.), sergantiems pasikartojančiomis akių infekcijoms, infekcijų profilaktikai po chirurginių intervencijų, traumų. Apsaugo ragenos epitelį, skatina gijimą, bei stabilizuoja ašarų plėvelę. 2022.01.17
OZONO TERAPIJA AKIES PAVIRŠIAUS LIGOMS

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis

-30%

VIZIK

ALLERGY, 10 ml ~~15,95~~ **11,19 €**
Lašai pavargusioms ir sausoms akims, 10 ml ~~11,99~~ **8,39 €**
Lašai sudirgusioms ir paraudusioms akims, 10 ml ~~12,25~~ **8,60 €**

MEDICINOS PRIEMONĖS
Be konservantų
ATIDARIUS BUTELIUKUS GALIMA NAUDOTI NET VIENERIUS METUS!

NUO 4,99 €

ENTEROL®

ENTEROL®, 250 mg kietosios kapsulės, 10 kapsulių **4,99 €**
ENTEROL®, 250 mg kietosios kapsulės, 20 kapsulių **8,99 €**
ENTEROL®, 250 mg kietosios kapsulės, 30 kapsulių **12,99 €**
ENTEROL®, 250 mg milteliai geriamajai suspensijai, 10 paketėlių **5,99 €**
ENTEROL®, 250 mg milteliai geriamajai suspensijai, 20 paketėlių **9,99 €**
Saccharomyces boulardii CNCM I-745.

NERECEPTINIAI VAISTAI
Enterol vartojamas ūminio viduriavimo pagalbiniam gydymui kartu su kitais vaistais nuo viduriavimo. **Vartojimo būdas.** Kapsules nuryti užgeriant gurkšniu vandens arba atidarytos kapsulės turinį supilti į nedidelį kiekį saldinto gėrimo arba į maistą. Miltelių geriamajai suspensijai paketėlio turinį supilti į nedidelį kiekį vandens ar saldinto gėrimo, sumaišyti ir išgerti. Miltelius taip pat galima maišyti su maistu. Vaisto vartoti dar kelias paras, pasibaigus viduriavimo simptomams. **Dozavimas.** Suaugusiesiems ir vyresniems nei 2 metų amžiaus vaikams rekomendujama dozė yra 1 kapsulė arba paketėlis vartojama vieną arba du kartus per parą. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Enterol. Šis vaistas nepakeičia rehidracijos (normalaus organizmo skysčio tūrio ir sudėties palaikymo), jei jos reikia. **Enterol vartoti negalima** jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu yra alergija mielių grybeliui, ypač Saccharomyces boulardii; jeigu nusilpusi imuninė sistema ar esate gydomas ligoninėje; jeigu įstatytas centrinės venos kateteris; jeigu pacientas yra jaunesnis kaip 2 metų amžiaus vaikas.
Reklamos parengimo data: 2021/01/15. 80017771

NUGAROS, SPRANDO SKAUSMAMS IR RADIKULITUI GYDYTI

6,99 €

KAPSIKAM® vaistinis šildomasis tepalas, 50 g

Nereceptinis vaistinis preparatas
Tepalas Kapsikam®. Nereceptinis vaistas. 1 g tepalo yra 50 mg dimetilsulfoksido, 30 mg raceminio kamparo, 30 mg terpentino eterinio aliejaus, 20 mg benzilnikotinato, 2 mg nonivamido. **Terapinės indikacijos:** vietinis raumenų ir sąnarių skausmo malšinimas. **Dozavimas ir naudojimo būdas:** norint sukelti skausmą malšinantį poveikį, ant skaudamos vietos aplikatoriumi užtepama 1–3 g (6–18 cm) tepalo 2–3 kartus per parą, atsižvelgiant į skausmo intensyvumą. Norint ilgiau išlaikyti šildomąjį tepalo poveikį, ant skaudamos vietos reikia uždėti tvarstį. Didžiausia vienkartinė dozė – 3 g. Didžiausia paros dozė – 9 g. Po kiekvienos procedūros reikia nusiplauti rankas šaltu vandeniu su muilu. Naudoti ant odos. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Odos opos, žaizdos bei ligos, kai yra pažeistas odos paviršius. **Vietinis rinkodaros teisės turėtojo atstovas:** AB „Grindeks“ filialas, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2020-12-05.
MANO JĖGA JUDĖJIME!

-30%

SMARTHIT IV® efektyvaus pasisavinimo maisto papildai

MAISTO PAPILDAI
Dėl patentuotos efektyvaus pasisavinimo technologijos „Miosol“ sukuriama mikrokapsulė, į kurią patalpinami vitaminai, mineraliai ar augaliniai ekstraktai. Mikrokapsulės funkcija – apsaugoti viduje esančias medžiagas nuo skrandžio rūgščių. Taip pat maistinių medžiagų molekulės linkusios laikytis mikrokapsulės viduje, todėl nedirgina skrandžio. Toks įkapsuliavimo būdas gali užtikrinti iki 6 kartų efektyvesnį maistinių medžiagų pasisavinimą organizme. Mikrokapsuliuotų maisto papildų **SMARTHIT IV®** liniją sudaro:
„SMARTHIT IV® Ferrum“ – normaliam hemoglobino ir raudonųjų kūnelių susidarymui;
„SMARTHIT IV® Ferrum Liquid“ – skystos formos geležis, tinkama ir vaikams nuo 3 metų. Normaliam hemoglobino ir raudonųjų kūnelių susidarymui. Mikrokapsuliuota geležis neturi įprastai geležiai būdingų šalutinių reiškinių (nedirgina skrandžio, nepalieka nemalonaus poskonio burnoje, nedažo dantų ir pan.);
„SMARTHIT IV® Vitamin D_3“ – kaulams, dantims, raumenims;
„SMARTHIT IV® Vitamins D_3+K_2“ – sinerginis, vitaminų D_3 ir K_2 poveikis kaulams ir kraujotakai;
„SMARTHIT IV® Vitamin B_{12}“ – normaliai kraujodarai bei psichologinei funkcijai palaikyti ypač daug dirbantiems ir besimokantiems žmonėms;
„SMARTHIT IV® Curcumin“ – mikrokapsuliuotos formos kurkuminas imuninei sistemai, kepenų funkcijai, normaliam cholesterolio lygiui kraujyje palaikyti;
SMARTHIT IV® – MENAS VEIKTI!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

PLAUKAMS

-30%

HAIR VOLUME™

MAISTO PAPILDAI
„Hair Volume™“ ir „Hair Volume™ GUMMIES“ – biologiškai veikliųjų maistinių medžiagų kompleksai su obuolių ekstraktu plaukams. Sudėtyje esantys biotinas ir cinkas padeda palaikyti normalią plaukų būklę. Tik 1 tabletė arba gardūs 2 guminukai per dieną padės pasirūpinti jūsų plaukais!
PAGALBA JŪSŲ PLAUKAMS!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

KAI VARGINA HEMOROJAUS SIMPTOMAI

-30% **7,48 €** ~~10,69~~

HEMAGEL® PROCTO 5 rektalinės žvakutės

MEDICININĖS PASKIRTIES PREKĖ
PASKIRTIS: kai vargina **hemorojaus simptomai:** skausmas, kraujavimas, išangės įtrūkimai, taip pat po Barono operacijos. **KAIP VEIKIA:** palaiko drėgną aplinką žaizdoje; suriša laisvuosius radikalus; mažina kraujavimą, skausmą, diskomforto pojūtį, deginimą bei perštėjimą išangės ir tiesiosios žarnos srityje; skatina gijimą. **PRIVALUMAI:** naudojamos **tik kartą per parą; nedirgina** tiesiosios žarnos gleivinės; veikia tik lokaliai; **nesirezorbuoja; gerai prisitvirtina** prie gleivinės; neišteka; nereikia naudoti iklotų. **Klinikiniais tyrimais pagrįstas** efektyvumas ir gydomasis poveikis: **po 2 savaičių** naudojimo maždaug **3 kartus sumažėjo skausmas; po 2 savaičių** naudojimo **išnyko kraujavimas.** (Atsitiktinių imčių dvigubai aklas lyginamasis bandomasis tyrimas, kuriame dalyvavo dvi lygiagrečios grupės („HemaGel® PROCTO“ ir „Placebo“). HemaGel® bandomasis tyrimas: „Hemagel procto“ naudojimas išangės įtrūkimų ir hemorojaus gydymui. Klinikinis tyrimas atliktas pagal ČSN EN ISO 14155, išduotą 2012 m.) **SUDĖTIS:** unikali patentuota formulė. Miltelių pavidalo kopolimeras HEMA-HAS. **NAUDOJIMAS:** žvakutes įstumti užapvalintu galu į tiesiąją žarną. Naudojamos kartą per parą, geriausia prieš einant miegoti.

SKAUSMINGŲ MĖNESINIŲ, RAUMENŲ IR KAULŲ, DANTŲ SKAUSMO MALŠINIMAS

Dolmen. **Nereceptinis vaistas. Veiklioji medžiaga.** Deksketoprofeno trometamolis (dexketoprofenum). Vienoje plėvele dengtoje tabletėje / granulių geriamajam tirpalui paketėlyje / geriamojo tirpalo paketėlyje yra 25 mg deksketoprofeno. **Vaisto forma.** Plėvele dengtos tabletės / granulės geriamajam tirpalui / geriamasis tirpalas paketėlyje. **Pakuotė.** Po 10 tablečių / po 10 paketėlių granulių / po 10 geriamųjų tirpalų paketėlyje. **Indikacijos.** Dolmen vartojamas trumpalaikiam simptominiam lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų, sąnarių ir kaulų skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorėjos), dantų skausmui malšinti. **Dozavimas.** Atsižvelgiant į skausmo priežastis ir intensyvumą, rekomenduojama gerti: po 1 tabletę / paketėlį /geriamąjį tirpalą paketėlyje 1-3 kartus per parą kas 8 valandos. Didžiausia paros dozė neturi būti didesnė kaip 3 tabletės / paketėliai / geriamieji tirpalai paketėlyje. Jei esate senyvo amžiaus ar sergate inkstų, kepenų ligomis, pradėkite vartoti ne daugiau kaip 2 tabletes/ paketėlius / geriamuosius tirpalus paketėlyje per parą. **Vartojimo būdas.** Jei vartojate granules, visą paketėlio turinį ištirpinkite stiklinėje vandens, suplakite. Išgerkite nedelsiant. Geriamasis tirpalas paketėlyje gali būti geriamas tiesiai iš paketėlio. Jeigu jaučiate intensyvų skausmą ir reikia jį greičiau nuslopinti, vaistą vartokite prieš valgymą (ne vėliau kaip prieš 15-30 min.). Poveikis prasideda po 30 min. pavartojus vaisto. Skausmą malšinantis poveikis trunka 4-6 valandas. Šio vaisto neturėtų vartoti vaikai ir paaugliai (jaunesni kaip 18 metų). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas deksketoprofenui, kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aspirinui; vartojant ketoprofeno ar fi bratų buvę fotoalerginės ar fototoksinės reakcijos; pepsinė opa, buvęs kraujavimas iš virškinamojo trakto, lėtiniai virškinimo sutrikimai bei lėtinės virškinamojo trakto ligos; sunkus širdies nepakankamumas, vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų funkcijos, sunkus kepenų veiklos sutrikimas; esant sunkiai dehidratacijai; nėštumas bei žindymo laikotarpis. **Įspėjimai.** Vaistą atsargiai turi vartoti vyresnio amžiaus ligoniai, sergantieji alergija, astma, širdies, inkstų, kepenų ligomis, hipertenzija, sistemine raudonąja vilklige, cukriniu diabetu, įvairiomis jungiamojo audinio ligomis, sutrikus kraujodarai; vartojant šlapimo išsiskyrimą skatinančius vaistus ar netekus daug skysčių. Pasitarkite su gydytoju jei vartojate kitų vaistų: geriamųjų steroidinių, nuo depresijos, apsaugančių nuo kraujo krešumo. Dolmen geriamojo tirpalo paketėlyje ir granulių geriamajam tirpalui paketėlyje yra sacharozės, todėl jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti Dolmen granules geriamajam tirpalui ar geriamąjį tirpalą paketėlyje. Į tai turėtų atsižvelgti pacientai, sergantys cukriniu diabetu. Deksketoprofenas gali paslėpti tokius infekcijų požymius kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl gali būti, kad vartojant šį vaistą gali būti vėluojama pradėti tinkamą gydymą, o dėl to gali padidėti komplikacijų rizika.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt

Reklama paruošta: 2021 m. birželio mėn.

LT_Dol_10_2021_V1_press

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis

NORMALIAM VIRŠKINIMUI, SKRANDŽIO RŪGŠTINGUMUI IR SVEIKOMS KEPENIMS

-30% **3,88 €** ~~5,54~~

GASTROVAL FORTE 12 kapsulių

MAISTO PAPILDAS
Tai sustiprintas, originalus, net 7-nių augalinių fermentų ir ekstraktų derinys, kurių naudą virškinimui lengva pajusti.
Geltonasis gencijonas tradiciškai vartojamas virškinimui palaikyti.
GASTROVAL - SUPRANTA, KO REIKIA.

NUO RAUMENŲ IR SĄNARIŲ SKAUSMO

NUO **4,99 €**

VIPROSAL B®

VIPROSAL B®, tepalas, 50 g **4,99 €**
VIPROSAL B®, tepalas, 75 g **6,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo yra 0,05 V gyvačių nuodų, 10 mg salicilo rūgšties, 30 mg raceminio kamparo ir 30 mg terpentino eterinio aliejaus. **Indikacijos:** sąnarių ir raumenų skausmui malšinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** nedidelis „Viprosal B®“ kiekis (5–10 g, t. y. 1 ar 2 arbatiniai šaukšteliai, atsižvelgiant į pažeistos vietos plotą) užtepamas ant skaudamos vietos ir įtrinamas į odą 1 arba 2 kartus per parą. Tepti ant odos. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosiems medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, odos opa ar kitos odos ligos. **Specialūs įspėjimai:** „Viprosal B®“ negalima tepti ant pažeistos odos. Saugotis, kad tepalo nepatektų ant gleivinės ar į akis. Vietinis rinkodaros teisės turėtojo atstovas: AB „Grindeks“ filialas, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2021-09-15.
IŠMINTINGAS SPRENDIMAS NUO SKAUSMO!

MODERNI KAPSULĖ NUO RĖMENS

2,99 €

ESCADRA 20 mg,

7 skrandyje neirios kietosios kapsulės

NERECEPTINIAI VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: ezomeprazolas, 20 mg. **Terapinės indikacijos:** vaistas skirtas suaugusiųjų gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens ir skrandžio rūgšties regurgitacijos) trumpalaikiam gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 kapsulė) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, kapsules gali prireikti vartoti 2–3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Simptomams visiškai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Jeigu per 2 savaičių nepertraukiamą gydymą simptomai neišnyksta, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Nėra tinkamų „Escadra“ vartojimo rekomendacijų jaunesnių kaip 18 metų vaikų populiaciojoje indikacijai „trumpalaikis gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens ir rūgšties regurgitacijos) gydymas“. Kapsulių negalima kramtyti ar smulkinti. Kapsules galima atidaryti ir granules išmaišyti pusėje stiklinės negazuoto vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pakeistiems benzimidazolams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Ezomeprazolo negalima vartoti kartu su nelfinaviru. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pacientus reikia informuoti, kad kreiptųsi į gydytoją, jeigu jie patiria didelį kūno svorio mažėjimą dėl nežinomų priežasčių, pasikartojantį vėmimą, disfagiją, vėmimą krauju ar meleną, arba jeigu įtariama ar diagnozuojama skrandžio opa, būtina ištirti, ar nėra piktybinės ligos, nes gydymas ezomeprazolu gali palengvinti jos simptomus ir uždelsti diagnozės nustatymą; jeigu jie anksčiau sirgo skrandžio opa arba patyrė virškinimo trakto operaciją; jeigu jiems 4 savaites arba ilgiau buvo taikomas nepertraukiamas simptominis nevirškinimo arba rėmens gydymas; jeigu jie serga gelta arba sunkia kepenų liga; jeigu jie yra vyresni kaip 55 metų ir turi naujų arba neseniai pakitusių simptomų. Pacientai, kurių pasikartojantys nevirškinimo ar rėmens simptomai ilgalaikiai, turi reguliariais intervalais lankytis pas savo gydytoją. Kaip ilgalaikio profilaktinio vaistinio preparato „Escadra“ pacientai neturi vartoti. Pacientai, kuriems reikia atlikti endoskopiją ar ureazės kvėpavimo testą, turi pasitarti su savo gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistinį preparatą. Ezomeprazolo skirti kartu su atazanaviru nerekomenduojama. Ezomeprazolo derinimas su klopidogreliu nepatartinas. Kitų PSI arba H2 receptorių blokatorių kartu su ezomeprazolu pacientams vartoti negalima. „Escadra“ sudėtyje yra sacharozės. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems yra fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2022-04-12.

KEPENIMS

NUO **4,97 €**

LIVOSIL

140 mg, 30 kapsulių **4,97 €**
140 mg, 60 kapsulių **8,75 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino. **Indikacijos:** papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livosil“ dozė yra 280–420 mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. „Livosil“ rekomenduojama vartoti ilgiau nei 3 mėnesius. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livosil“ medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemija), bei tuos, kurie vartoja preparatų, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. Teksto peržiūros data 2017-07-12.
NATŪRALI KEPENŲ APSAUGA IR GYDYMAS!

NUO RĖMENS

-40% **2,93 €** ~~4,93~~

RANIGAST S-O-S 12 kramtomųjų tablečių

MEDICINOS PRIEMONĖ
„Ranigast S-O-S“ yra skirtas gastroezofaginio refliukso simptomams (rėmeniui, skrandžio skausmui, dispepsijai) malšinti.
- Veikia akimirksniu – nuo to momento, kai tik sučiulpsite ar išgersite tabletę.
- Dėl ypatingos sudėties apsaugo skrandžio gleivinę ir sumažina rėmens epizodų skaičių.
- Tinka naudoti ir kaip papildoma priemonė sergantiesiems gastritu, peptine opa.
- Galima naudoti nėštumo ir žindymo metu, prieš tai pasitarus su gydytoju.

Suaugusiesiems ir vaikams nuo 12 metų: rekomenduojama pavalgius vartoti 2 tabletes.
Vaikams (6–12 metų): rekomenduojama pavalgius vartoti 1 tabletę.

BURNOS, RYKLĖS AR DANTENŲ UŽDEGIMUI IR PATINIMUI GYDYTI

6,99 €

TANTUM VERDE FORTE

3 mg/ml burnos gleivinės purškalas (tirpalas), 15 ml

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Benzidamino hidrochloridas. **Terapinės indikacijos:** TANTUM VERDE vartojami lokaliam simptominiam skausmingo burnos, ryklės bei dantenų uždegimo ir patinimo gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti į burną ir ryklę. Suaugusiems žmonėms: Purškalas: 2–6 kartus per parą purkšti TANTUM VERDE po 4–8 išpurškimus; 6–12 metų vaikams: 2–6 kartus per parą purkšti TANTUM VERDE po 4 išpurškimus; 3–5 metų vaikams: 2–6 kartus per parą purkšti TANTUM VERDE po 1 išpurškimą. **Specialūs įspėjimai:** per apsirikimą pavartojus (pvz., vaikui) labai daug TANTUM VERDE, būtina nedelsiant informuoti gydytoją. Pirmoji pagalbinė gydymo priemonė gali būti vėmimo sukėlimas. Jeigu trumpalaikis gydymas benzidaminu reikiamo poveikio nesukelia, būtina kreiptis į gydytoją. **Kontraindikacijos:** alergija benzidaminui arba bet kuriai pagalbinei TANTUM VERDE medžiagai. Alergija salicilo rūgščiai arba (ir) bet kuriam nesteroidiniam vaistui nuo uždegimo. Reklamos teksto parengimo data: 2022-08-09.
„TANTUM VERDE“. GREITAI NUMALŠINS GERKLĖS SKAUSMĄ.

-35%

AMBIO

AMBIO ŠIRDŽIAI, 100 ml ~~5,49~~ **3,57 €**
AMBIO ŠIRDŽIAI, 30 kramtomųjų tablečių ~~8,49~~ **5,52 €**

MAISTO PAPILDAI

-40% **5,99 €** ~~9,98~~

VITADAY KOMPLEKSAS SĄNARIAMS SU GLIUKOZAMINU

60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

1,62 €

RAMEVAL® geriamieji lašai (tirpalas), 50 ml

VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: valerijonų šaknų, sukatžolių žolės, apynių spurgų, pipirmėčių lapų tinktūra (1:5), (3/3/2/2), 1 ml/ml. **Indikacijos:** tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas nestipriems nervinės įtampos simptomams malšinti ir kaip miegą gerinanti priemonė. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Gerti 1–3 kartus per dieną po 20–30 lašų. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas preparato sudėtyje esančioms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip 2 savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu turite akmenų tulžies pūslėje ar kitokių tulžies pūslės funkcijos sutrikimų, šį vaistą turėtumėte vartoti atsargiai. Jeigu sergate gastroezofaginiu refliuksu (rėmens graužimu), šį vaistą turėtumėte vartoti atsargiai, nes gali padidėti rėmens graužimas. Vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 m. asmenims. Šio vaistinio preparato sudėtyje yra ne mažiau kaip 63 % (V/V) etanolio. Reklamos tekste parengimo data 2018-08-21.

„RAMEVAL“ MAŽINA DIRGLUMĄ IR NERIMĄ, GYDO NEMIGĄ.

22,30 €

PIASCLEDINE® 300 mg, 30 kietųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 100 mg neesterefikuoto avokadų aliejaus, 200 mg neesterefikuoto sojų aliejaus. **Terapinės indikacijos:** papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui, pvz.: skausmui ir apsunkintam judėjimui, lengvinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vieną kapsulę per parą reikia nuryti visą, užgeriant pilna stikline vandens, valgio metu. Kapsulių kramtyti negalima. Įprastinė gydymo trukmė yra 3–6 mėnesiai. Gydymą galima tęsti tol, kol vaistą gerai toleruojate ir simptomai vis dar lengvėja. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu yra alergija žemės riešutams arba sojai. **Specialūs įspėjimai:** vaistas skirtas tik suaugusiesiems. Atsiradus bet kokių kepenų ar tulžies organų sutrikimo požymių ar simptomų (pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas, nuovargis, apetito praradimas, odos ir akių pageltimas (gelta), šlapimo patamsėjimas), alerginės reakcijos požymių ar simptomų (dilgėlinė, niežėjimas ir (arba) odos išbėrimas/paraudimas, veido patinimas ir (arba) kvėpavimo pasunkėjimas), kraujo krešėjimo sutrikimo požymių ar simptomų (raudonų ar purpurinių odos dėmių, savaiminių mėlynių, dėminių kraujosruvų ar gleivinės kraujavimas) gydymą nutraukite ir tuoj pat kreipkitės į savo gydytoją. Pacientams, kurie yra jautrūs žemės riešutų baltymams, yra didesnė rizika pasireikšti sunkioms reakcijoms į sojų preparatus. Reklamos teksto parengimo data 2021-08-02

ŠIRDŽIAI IR KRAUJAGYSLĖMS

NUO **1,99 €**

THROMBO ASS

THROMBO ASS 50 mg, 100 skrandyje neirių tablečių **1,99 €**
THROMBO ASS 75 mg, 100 skrandyje neirių tablečių **2,99 €**
THROMBO ASS 100 mg, 100 skrandyje neirių tablečių **3,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: acetilsalicilo rūgštis. **Terapinės indikacijos:** miokardo infarkto rizikos mažinimas sergantiesiems krūtinės angina. Antrinė miokardo infarkto profilaktika. Trombozės profilaktika po vainikinių arterijų nuosrūvio operacijos. Antrinė praeinančiojo smegenų išemijos priepuolio (PSIP) ar insulto profilaktika. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti po 1 tabletę 1 kartą per dieną (patariama vakare). Skrandyje neirią tabletę reikia nuryti nesukramtytą, užsigeriant pakankamu skysčio kiekiu valgio metu arba tarp valgymų tuo pačiu paros metu. Įprastinė paros dozė ilgalaikiam vartojimui yra 50–150 mg. Dalyti į dalis „Thrombo ASS“ skrandyje neirios tabletės negalima, nes bus pažeista skrandyje neiri plėvelė. Norint, kad tiktų individualiam vartojimui, reikia rinktis atitinkamo stiprumo preparatą (50 mg, 75 mg ir 100 mg). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei salicilatams ir kitiems NVNU; bronchų spazmas; ūminė pepsinė opa; polinkis į kraujavimą, hemofilija; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; sunkus, nepakankamai kontroliuojamas širdies nepakankamumas; nėštumas; vaikai ir paaugliai iki 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Atsargumo reikia laikytis šiais atvejais: sergant bronchine astma, sienlige, esant nosies gleivinės paburkimui ir esant kito pobūdžio alergijai; vartojant kartu su vaistais, mažinančiais kraujo krešumą; sergant hemolizine anemija; esant skrandžio ir žarnų sutrikimams, esant anamnezėje duomenims apie opaligę ar kraujavimą iš virškinimo trakto; esant inkstų ligoms ir (arba) kepenų funkcijos sutrikimui; turintiems polinkį podagrai. Prieš numatytą operaciją 10 dienų acetilsalicilo rūgšties reikia nevartoti. Šio vaisto sudėtyje yra laktozės monohidrato, todėl vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pakuotė. **50 mg, 75 mg arba 100 mg; 100 skrandyje neirių tablečių.** Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas. G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. Reklamos parengimo data: 2022-05

AKIMS DRĖKINTI

-30%

SYSTANE ULTRA

10 ml ~~13,99~~ **9,79 €**

Pagalba sausoms akims. Drėkinamieji akių lašai, kurių sudėtyje yra hidroksipropilo guaro, skirti sausoms, pavargusioms, skaudančioms ir sudirgusioms akims. Gali būti naudojami kontaktinių lęšių dėvėjimo metu. Galiojimo laikas: 6 mėnesiai nuo atidarymo dienos.

SYSTANE HYDRATION

10 ml ~~15,99~~ **11,19 €**

Ilgalaikė pagalba sausoms akims. Drėkinamieji ilgalaikiu poveikiu pasižymintys akių lašai, kurių sudėtyje yra hidroksipropilo guaro ir hialurono rūgšties, skirti sausoms, pavargusioms, skaudančioms ir sudirgusioms akims. Gali būti naudojami kontaktinių lęšių dėvėjimo metu. Galiojimo laikas: 3 mėnesiai nuo atidarymo dienos.

MEDICINOS PRIEMONĖS

SYSTANE GEL DROPS

10 ml ~~16,69~~ **11,68 €**

Pagalba sausoms akims nakties metu. Didžiausiu hidroksipropilo guaro kiekiu pasižymintys drėkinamieji akių lašai iš „Systane“ produktų linijos, ant akies paviršiaus suformuoja gelinį sluoksnį ir sušvelnina akių sausumą, skausmą, deginimo jausmą bei sudirginimą. Galiojimo laikas: 3 mėnesiai nuo atidarymo dienos.

SYSTANE BALANCE

10 ml ~~16,99~~ **11,89 €**

Papildo ašarų plėvelės lipidinį sluoksnį. Drėkinamieji akių lašai pacientams, kurių akių sausumas yra susijęs su Meibomijaus liaukų disfunkcija. Lašai skirti sausoms, pūlingoms, lipnioms, sudirgusioms bei ašarojančioms akims. Galiojimo laikas: 6 mėnesiai nuo atidarymo dienos.

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**

AMBIO NERVŲ SISTEMAI mikstūra, 100 ml **4,99 €**

SKYSTASIS MAISTO PAPILDAS

- Vitaminas B_6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją, imuninės sistemos veiklą ir energijos apykaitą.
- Vitaminas B_6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei reguliuoti hormonų aktyvumą.

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**

AMBIO ŠLAPIMO TAKAMS SU LAKTO-BIFIDOBAKTERIJOMIS 20 kapsulių **7,98 €**

MAISTO PAPILDAS

- Papildo kasdienę mitybą gyvybingomis bakterijomis ir spanguolių ekstraktu.

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**

VITADAY KALIO CHLORIDAS 60 kapsulių **4,98 €**

MAISTO PAPILDAS

- Kalis padeda palaikyti normalią nervų sistemos bei raumenų veiklą.
- Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį.

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**

AMBIO

Alaus mielės, 150 tablečių **6,99 €**
Asiūklis, 100 tablečių **9,95 €**
Garcinija, 45 kapsulės **11,98 €**
Spirulina, 100 tablečių **7,99 €**
Super Guarana, 120 tablečių **9,99 €**
Žalioji arbata, 100 tablečių **8,99 €**

MAISTO PAPILDAI

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**

VITADAY KOMPLEKSAS KEPENIMS 30 kapsulių **4,99 €**

MAISTO PAPILDAS

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**

AMBIO VITAMINAS D 400TV, 20 kramtomųjų tablečių vaikams **3,99 €**

MAISTO PAPILDAI

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**

SEDANORM 30 kapsulių **9,89 €**
SEDANORM SPRAY 30 ml **14,59 €**

MAISTO PAPILDAI

„Sedanorm“ sudėtyje yra L-triptofano, paprastųjų raudonėlių ekstrakto bei grifonijų sėklų ekstrakto. **„Sedanorm“ vartojimas:** suaugusiesiems ir vaikams nuo 12 m. po 1 kapsulę per dieną. **„Sedanorm Spray“** sudėtyje esantis grifonijų sėklų ekstraktas ir raudonžiedžių pasiflorų žolės skystasis ekstraktas padeda palaikyti normalią nervų sistemos funkciją. Sudėtis papildyta L-teaninu. **„Sedanorm Spray“ vartojimas:** suaugusiesiems ir vaikams nuo 12 m. po 1–2 papuškimus po liežuviu 2–3 kartus per dieną. Po papuškimų rekomenduojama 30 minučių nevartoti gėrimų.

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**

ACORUS BALANCE BRAIN BOOST SHOTS skystis, 25 ml, 14 vnt. **30,19 €**

MAISTO PAPILDAS

ACORUS BALANCE BRAIN BOOST SHOTS maisto papildas skirtas aktyviems ir protinį darbą dirbantiems žmonėms. Produkto sudėtyje yra ginkmedis, bacopa ir ženšenis, kurie padeda palaikyti normalią protinę veiklą, pažinimo funkciją, kraujotakos funkciją, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**

ACONITUM

MAISTO PAPILDAI
AUKŠTOS KOKYBĖS LIETUVIŠKI PREPARATAI, KURIUOS SUKŪRĖME JUMS
*Akcija taikoma raudonu skirtuku pažymėtoms prekėms

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**

ACTAVIT

ActaVit Omega 3 žuvų taukai 1000mg, 60 kapsulių **14⁰⁰ €**
ActaVit Nakvišų aliejus 1000mg, 60 kapsulių **16⁴⁹ €**

MAISTO PAPILDAI
„Actavit“ Omega-3 žuvų taukų sudėtyje yra 150 mg eikozapentaeno rūgšties (EPR) ir 110 mg dokozaheksaeno rūgšties (DHR). Teigiamas poveikis širdžiai pasireiškia per parą suvartojus ne mažiau kaip 250 mg DHR ir EPR rūgščių. 250 mg DHR rūgšties padeda išsaugoti normalų regėjimą bei palaikyti normalią smegenų funkciją.
„Actavit“ nakvišų aliejuje yra 1000 mg nakvišų (Oenothera biennis) aliejaus, kuriame yra 100 mg gama linoleno rūgšties ir 10 mg vitamino E (83 % rekomenduojamos referentinės maistinės vertės).
GROŽIUI IR SVEIKATAI. VISAI ŠEIMAI.

ODOS PRIEŽIŪRAI IR APSAUGAI

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**

VITIRON™

VITIRON™ IMMUNITY STRONG, 30 kapsulių
VITIRON™ MAN MULTILONG, 30 kapsulių
VITIRON™ D3 OLIVE SUN 4000 IU purškalas, 10 ml
VITIRON™ D3 OLIVE SUN 2000 IU purškalas, 10 ml

MAISTO PAPILDAI
„VitirON™ D3 Olive SUN“ – vitaminas D ištirpintas tyrame alyvuogių aliejuje, kuris užtikrina geresnį jo pasisavinimą. Patogus ir greitas vitaminas D kiekvienam! „VitirON™ Man MultiLong“ – 13 vitaminų ir 13 mineralinių medžiagų bei mikroelementų kompleksas specialiai sukurtas vyrams. Aktyviam ir savimi pasitikinčiam vyrui! „VitirON™ Immunity STRONG“ – tai vitaminai ir vaistažolių ekstraktai, skirti organizmo imuninės sistemos apsaugai. Vitaminai C, D3, B6, B12, niacinas, folio rūgštis, cinkas, selenas ir ežiuolės padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Didelė ežiuolių ekstrakto koncentracija padeda palaikyti ir viršutinių kvėpavimo takų būklę. Speciali kapsulių technologija užtikrina gerą medžiagų pasisavinimą. VTR-LT-00049
VITAMINŲ GALIA VISAI ŠEIMAI

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**

GOOD SLEEP CAPS 30 kapsulių **9⁰⁰ €**
GOOD SLEEP SPRAY su saldikliu, 30 ml **9³⁹ €**

MAISTO PAPILDAI
„Good Sleep Caps“ ir **„Good Sleep Spray“** sudėtyje yra melatonino.
„Good Sleep Caps“ – raudonžiedžių pasiflorų žolės ekstraktas ir apyniai padeda palaikyti normalią nervų sistemos funkciją. Vaistiniai valerijonai padeda palaikyti normalią nervų sistemos būklę ir miego kokybę. **„Good Sleep Caps“ vartojimas:** suaugusiesiems nuo 18 metų rekomenduojama vartoti po 1 kapsulę 20 minučių prieš miegą. **„Good Sleep Spray“ vartojimas:** papurkškite aerozolio 1 kartą po liežuviu. Taip įpurškiama 150 mg produkto ir tai yra 1 dozė. Rekomenduojama vartoti 1 dozę 20 minučių prieš miegą. Prieš naudojimą gerai suplakite.

GERKLEI IR IMUNINEI SISTEMAI

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**

PROPODEZAS

MAISTO PAPILDAI
PROPODEZAS reaguodamas į vis didėjančius sveikatos išbandymus pristato Naujieną - PROPODEZAS FORTE. Tai dar stipresnė bičių jėga ir gerklei, ir imunitetui, kuri padės išlikti sveikam. Sudėtyje:
- 2x - dvigubai daugiau propolio,
- bičių pienelis,
- šeivamedžio uogų ekstraktas ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą,
- dedešvų lapų ekstraktas padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų veiklą.

PROPODEZAS FORTE – DAR STIPRESNĖ BIČIŲ JĖGA IR GERKLEI IR IMUNITETUI. PARAGAUKITE!
*Akcija taikoma raudonu skirtuku pažymėtoms prekėms

DANTŲ PROTEZŲ KLIJAI

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**

BLEND-A-DENT

BLEND-A-DENT REGULAR, 47 g (x2 pakuotės) **8⁵⁹ €**
BLEND-A-DENT FRESH, 47 g (x2 pakuotės) **8⁵⁹ €**

Fiksuojamasis dantų protezų kremas „Blend-a-dent“ – puikus pasirinkimas, jei nenorite galvoti apie savo protezus. Nesvarbu, ką darote ar valgote, galite pasitikėti savimi, nes dantų protezai savo vietoje laikosi tvirtai ir patogiai. „Blend-a-dent“ suteikia stiprią fiksaciją visą dieną, užtikrina komfortą, sukurdamas pagalvėlę tarp dantenų bei dantų protezų, ir apsaugo nuo maisto dalelių patekimo po protezais. Galite atsipalaiduoti ir mėgautis gyvenimu nesivaržydami.

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**

DINADAX KRAMTOMOSIOS LAZDELĖS **1²⁹ €**

MAISTO PAPILDAI
„DinadaxActive“ – maisto papildas su laktobakterijomis, fruktooligosacharidais, bičių pieneliu, vitaminais B_1 ir B_6.
„Dinadax Energy“ – maisto papildas su bičių pieneliu, želatina ir B grupės vitaminais.
„Dinadax Sapiens“ – maisto papildas su cholino bitartratu, omega-3, linolo ir oleino rūgštimis, vitaminais, folio rūgštimi, biotinu ir cinku.
KRIMSK PASIGARDŽIUODAMAS!

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

NUO 6,99 €

STREPSILS INTENSIVE 8,75 mg, 16 kietųjų pastilių **6,99 €**
STREPSILS INTENSIVE 8,75 mg, 24 kietosios pastilės **9,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg flurbiprofeno. **Terapinė indikacija:** trumpalaikis simptominis gerklės skausmo gydymas suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų amžiaus vaikams. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams kas 3–6 valandas (kai reikia) lėtai sučulpti (leisti ištirpti burnoje) po vieną kietąją pastilę. Per 24 valandas galima suvartoti ne daugiau kaip 5 kietąsias pastiles. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; anksčiau buvusios acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) sukeltos padidėjusio jautrumo reakcijos (pvz., astma, bronchų spazmas, rinitas, angioneurozinė edema ar dilgelinė); yra ar anksčiau buvo peptinė opa ar kraujavimas iš opos (nustatyti du ar daugiau nesusijusių opaligės epizodų) bei žarnyno opos; anksčiau buvęs kraujavimas iš virškinamojo trakto ar jo perforacija, sunkus kolitas, kraujavimo ar kraujodaros sutrikimai, susiję su ankstesniu NVNU vartojimu; paskutinis nėštumo trimestras; sunkus širdies, inkstų, kepenų nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai:** vartoti atsargiai pacientams, kurie serga sistemine raudonąja vilklige ir mišria jungiamojo audinio liga; serga tonzilitu (tonzilių uždegimu) ar mano, kad serga bakterijų sukelta gerklės infekcine liga; sirgo virškinimo trakto ligomis (pvz., opiniu kolitu, Krono liga); vartoti atsargiai nėščiosioms pirmuosius 6 mėnesius ar žindyvėms; senyviems pacientams. Tokie vaistai gali būti susiję su nedideliu širdies priepuolio (miokardo infarkto) ar insulto rizikos padidėjimu. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldėtas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos tekstas parengtas 2020-09-10.

NOSIES GLEIVINĖS PABURKIMUI MAŽINTI

3,99 €

RHINO-STAS nosies purškalas, tirpalas, 10 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
1 ml nosies purškalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. **Indikacijos:** „Rhino-stas“ yra simpatikomimetikas. Purškalas siaurina kraujagysles, todėl mažina nosies gleivinės paburkimą. Vartojamas trumpalaikiam nosies gleivinės paburkimui mažinti, sergant sloga arba prienosinių ančių uždegimu (sinusitu). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 10 m. vaikams bei paaugliams reikia purkšti po 1 ipurškimą tirpalo „Rhino-stas“ į kiekvieną nosies landą 1–3 kartus per parą tada, kada reikia. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jei yra sausasis nosies gleivinės uždegimas (sausasis rinitas); pacientams, kuriems pro nosį neseniai buvo atlikta smegenų operacija; jaunesniems kaip 10 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** „Rhino-stas“ galima vartoti tik atidžiai įvertinus jo vartojimo riziką ir galimą naudą šiais atvejais: pacientams, kurie vartojo ar vartoja vaistų nuo depresijos (monoaminooksidazės inhibitorių) arba kitų vaistų, kurie gali labai padidinti kraujospūdį; kai padidėjes akispūdis, ypač sergant uždaro kampo glaukoma; sergant sunkia širdies ir kraujagyslių sistemos liga (pvz., vainikinių širdies arterijų liga, hipertenzija); sergant feochromocitoma (antinkščių naviku); sergant porfirija; sergant medžiagų apykaitos ligomis (pvz., hipertireoze, cukriniu diabetu). Pakuotės lapelio peržiūros data 2018-10-23. Reklamos teksto parengimo data 2020-02-03.
PURŠKALAS „RHINO-STAS“ – PIRMOJI PAGALBA SERGANT SLOGA AR SINUSITU!

NUO SLOGOS

4,99 €

GALANAS 1 mg/50 mg/ml, nosies purškalas, 10 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido ir 50 mg dekspantenolio. Indikacijos: „Galanas“ skirtas suaugusiesiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) ir kaip pagalbinė priemonė odos bei gleivinės pažeidimams gydyti, ne alerginės kilmės išskyroms iš nosies (vazomotoriniam rinitui) mažinti ir kvėpavimui per nosį palengvinti esant nosies užgulimui po nosies operacijos; nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu ir iširniu prienosinių ančių uždegimu (rinosinusitu). Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams 1 purškalo tirpalo dozė į kiekvieną šnervę pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Dozavimas priklauso nuo individualaus paciento jautrumo ir klinikinio atsako. „Galanas“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 paras, nebent gydytojas nurodė kitaip. Dėl vaikų gydymo trukmės reikia pasikonsultuoti su gydytoju. Kontraindikacijos: šio vaistinio preparato vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliosiems ar pagalbiniems medžiagoms; jeigu yra sausasis nosies gleivinės uždegimas (rinitis sicca); po chirurginio posmegeninės liaukos pašalinimo per nosį (transsfenoidalinės hipofizektomijos) arba po kitų chirurginių intervencijų, pažeidžiančių smegenų dangalą; kūdikiams ir jaunesniems kaip 6 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: pasitarti su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Galanas“, jeigu esate gydomas monoaminooksidazės (MAO) inhibitoriais; jei yra padidėjes akispūdis; jeigu sergate sunkia širdies ar kraujagyslių sistemos liga; jeigu yra antinkščių navikas; sergate cukriniu diabetu ar yra suaktyvėjusi skydliaukės veikla; jei yra padidėjusi prostata (prostatos hiperplazija). Reklamos tekto parengimo data 2021-08.
ATKEMŠA NOSĮ IR ATKURIA PAŽEISTĄ NOSIES GLEIVINĘ.

-30% 3,63€ ~~5,19~~

RHINOSOL aliejiniai nosies lašai, 10 ml

RhinoSol – aliejų mišinys, esant sausai nosies gleivinei. Padeda palengvinti kvėpavimą, drėkina ir apsaugo nosies gleivinę nuo išsausėjimo.
Sudedamosios dalys: alyvuogių aliejus, medetkų aliejus, eteriniai kėnių, eukaliptų ir arbatmedžio aliejai.

NUO 2,99 €

FLAVAMED
FLAVAMED 30 mg, 20 tabletių **2,99 €**
FLAVAMED 60 mg, 10 šnypščiųjų tablečių **4,49 €**
FLAVAMED 30 mg/5 ml, geriamasis tirpalas, 100 ml **4,29 €**
FLAVAMED 15 mg/5 ml, geriamasis tirpalas, 100 ml **3,79 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Ambroksolio hidrochloridas. Nereceptinis vaistas. „Flavamed 30 mg“ tabletės: 1 tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido. „Flavamed 60 mg“ šnypščiosios tabletės: 1 tabletėje yra 60 mg ambroksolio hidrochlorido. „Flavamed 30 mg/5 ml“ geriamasis tirpalas: 1 matavimo šaukšte su 5 ml geriamojo tirpalo yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido. „Flavamed 15 mg/5 ml“ geriamasis tirpalas: 1 matavimo šaukšte su 5 ml geriamojo tirpalo yra 15 mg ambroksolio hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** „Flavamed“ vartojamas sergant plaučių ir bronchų ligomis, kai susidaro klampios gleivės. Šuskystina klampias gleives ir jos gali lengviau pasišalinti. **Vartojimo būdas:** geriamasis tirpalas vartojamas po valgio, naudojant matavimo šaukštą. Šnypščiosios tabletės ištirpinamos stiklinėje vandens ir tirpalas geriamas po valgio. 30 mg tabletes reikia nuryti nesukramtytas po valgio, užsigerti pakankamu kiekiu skysčio. Suaugusiesiems ir vaikams, vyresniems kaip 12 m., po 30 mg ambroksolio hidrochlorido 3 kartus per parą pirmąsias 2 ar 3 dienas, vėliau – po 30 mg ambroksolio hidrochlorido 2 kartus per parą. 6–12 m. vaikams po 15 mg ambroksolio hidrochlorido 2–3 kartus per parą, 2–5 m. vaikams po 7,5 mg 3 kartus per parą. Be gydytojo nurodymo ilgiau kaip 4–5 dienas „Flavamed“ vartoti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. „Flavamed 30 mg“ tablečių negalima vartoti vaikams iki 6 metų. „Flavamed 60 mg“ šnypščiųjų tablečių negalima vartoti vaikams iki 12 metų. „Flavamed 30 mg/5 ml“ ir 15 mg/5 ml geriamojo tirpalo negalima vartoti vaikams iki 2 metų. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Flavamed“, jeigu jums praeityje pasitaikė labai sunkių padidėjusio jautrumo odos reakcijų (Stivenso-Džonsono sindromas ar Lajelio sindromas). Atsargiai reikėtų vartoti pacientams, sutrikus bronchų epitelio motorikai ir esant gausiai sekrecijai; sutrikus inkstų funkcijai arba sergant sunkia kepenų liga; praeityje buvus pepsinei opai; esant histamino netoleravimui. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas galaktozės arba fruktozės netoleravimas, laktazės trūkumas, gliukozės ir galaktozės absorbcijos sutrikimas. Reklamos teksto parengimo data 2020-01. LT_Fla_03_2020
„FLAVAMED“ – EFEKTYVUS DRĖGNO KOSULIO PALENGVINIMAS.

NUO SLOGOS

NUO 3,49 €

OTRIVIN
OTRIVIN 0,5 mg/ml nosies lašai (tirpalas), 10 ml **3,49 €**
OTRIVIN 1 mg/ml nosies lašai (tirpalas), 10 ml **3,49 €**
OTRIVIN 1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml **5,29 €**
OTRIVIN MENTHOL, 1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml **5,49 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Ksilometazolino hidrochloridas. **Indikacijos.** Nosies gleivinės paburkimo mažinimas peršalus, sergant sinusitu, šienlige ar kitokia alergine sloga. Nosiaryklės gleivinės paburkimo mažinimas, gydant vidurinės ausies uždegimą. Nosies ertmės apžiūros atlikimo lengvinimas. **Vartojimas.** Otrivin 0,5 mg/ml nosies lašai. 2–5 m. vaikai: po 1–2 lašus į kiekvieną nosies landą 1–2 k./parą (kas 8–10 val.). 6–11 m. vaikai: po 2–3 lašus į kiekvieną nosies landą 2–3 k./parą, kai reikia. Otrivin 1 mg/ml nosies lašai. Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: po 2–3 lašus į kiekvieną nosies landą, kai reikia. Otrivin Menthol 1 mg/ml nosies purškalas: Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: po 1 ipurškimą į kiekvieną nosies landą, kai reikia. Negalima lašinti/purkšti daugiau kaip 3 dozių per parą į kiekvieną nosies landą. **Kontraindikacijos.** Alergija ksilometazolinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, pacientams, kuriems neseniai buvo atlikta operacija per nosį, sergantiems uždaro kampo glaukoma (padidėjes spaudimas akyje), lėtiniu nosies uždegimu (sausuoju nosies gleivinės uždegimu arba atrofiniu rinitu). **Specialūs įspėjimai.** Negalima vartoti ilgiau kaip 7 d. iš eilės. Negalima viršyti rekomenduojamos dozės, ypač vaikams ir pagyvenusiems žmonėms. Atsargiai vartoti, jeigu yra padidėjes kraujospūdis, širdies liga (pvz., pailgėjusio QT intervalo sindromas), cukrinis diabetas, padidėjęs skydliaukės aktyvumas, padidėjusi prostata, gerybinis antinkščių auglys, jeigu vartojate arba per paskutines 2 sav. vartojote vaistų nuo depresijos ar Parkinsono ligos, vadinamų MAOI. Teksto parengimo data 2020 m. rugpjūčio 28 d.
NP-LT-OTRI-20-00001

SKAUDANČIAI GERKLEI

8,99 €

POLOVOX
8,75 mg/dozėje burnos gleivinės purškalas (tirpalas), 15 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Sudėtis: Vienoje dozėje (3 išpurškimuose) yra 8,75 mg flurbiprofeno. **Indikacijos:** skaudančios gerklės simptomų, tokių kaip gerklės skausmas, skausmingumas, sunkumas nuryti ir patinimas, trumpalaikiam malšinimui 18 metų ir vyresniems suaugusiesiems. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusieji nuo 18 metų ir vyresni: viena dozė (3 išpurškimai) į gerklę kas 3–6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 dozių per 24 valandas. Per ipurškimą neįkvėpti. PoloVox skirtas vartoti tik trumpą laiką. **Kontraindikacijos.** PoloVox vartoti negalima pacientams, kuriems: yra alergija (padidėjęs jautrumas) flurbiprofenui, ar kitiems nesteroiediniams vaistams nuo uždegimo, aspirinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; anksčiau buvo pasireiškę alerginės reakcijos, pavartojus nesteroidinių vaistų nuo uždegimo ar aspirino; yra arba buvo du ar daugiau skrandžio opos arba kraujavimo arba žarnų opos atvejų; anksčiau po nesteroidinių vaistų nuo uždegimo vartojimo pasireiškė kraujo krešėjimo arba kraujavimo sutrikimų; jeigu yra sunkių širdies, inkstų ar kepenų sutrikimų; paskutiniai 3 nėštumo mėnesiai. Šio vaisto negalima vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vartojant mažiausią veiksmingą vaistinio preparato dozę trumpiausią simptomų kontrolei būtina laiką, galima sumažinti nepageidaujamus poveikius. Pasitarti su gydytoju arba vaistininku, prieš pradedant vartoti PoloVox: jeigu jau yra vartojamas bet kuris kitas nesteroidinis vaistas nuo uždegimo ar aspirinas; jei yra bakterinis tonzilių uždegimas; jeigu pacientas senyvo amžiaus; jeigu pacientas serga arba sirgo astma; sistemine raudonąja vilklige ar mišria jungiamojo audinio liga; hipertenzija; žarnyno ligomis (opinis kolitas, Krono liga); jeigu yra Širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų; pacientė nėščia pirmuosius 6 mėnesius arba maitina krūtimi. Reklamos teksto parengimo data– 2020 m. 07 mėn.

PERŠALUS

7,99 €

ACTIFED® 60 mg/2,5 mg tabletės, 12 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
1 tabletėje yra 60 mg pseudoefedrino hidrochlorido ir 2,5 mg triprolidino hidrochlorido. **Indikacijos:** nosies ir viršutinių kvėpavimo takų gleivinės užburkimo (užgulimo) peršalus mažinimas. Nosies tekėjimo ir čiaudulio slopinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: po 1 tabletę kas 4–6 val. iki 4 kartų per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Pacientai, kurie vartoja ar per pastaraąsias 14 dienų vartojo monoaminooksidazės inhibitorių. Širdies ir kraujagyslių ligos, hipertenzija, sunkus inkstų funkcijos sutrikimas, diabetas, feochromocitoma, hipertirozė, uždaro kampo glaukoma. Draudžiama kartu vartoti kitus simpatomimetinius dekongestantus ir beta blokatorius. Vaikai iki 12 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „ACTIFED®“ gali sukelti mieguistumą. Nevartoti kartu alkoholio. „ACTIFED®“ vartojimą reikia nutraukti, jei pasireiškia šie sutrikimai: haliucinacijos, neramumas, miego sutrikimai, karščiavimas ir išplitusi raudonė su smulkiais pūlinėliais, staiga netekus regos arba sumažėjus regos aštrumui, staigus pilvo skausmas, kraujavimas iš išangės ar kiti išeminio kolito simptomai. Pacientai, sergantys kepenų liga, vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimu, „ACTIFED®“ turėtų vartoti atsargiai. Vaistas negali būti vartojamas vaikams raminti. „ACTIFED®“ tablečių sudėtyje yra laktozės – jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. **Teksto peržiūros data:** 2021.08.17. LT-MU-2100002.
GREITAS PALENGVĖJIMAS PERŠALUS.

-30% 3,49 € ~~4,99~~

AMBIO GERKLEI SU ISLANDINE KERPENA IR EUKALIPTU
20 čiulpiamųjų tablečių
AMBIO GERKLEI SU ISLANDINE KERPENA IR IMBIERU
20 čiulpiamųjų tablečių
MAISTO PAPILDAI

-30%

AMBIO KOMPLEKSAS IMUNITETUI SU GEROSIOMIS BAKTERIJOMIS 30 kapsulių ~~9,98~~ 6,99 €
AMBIO VITAMINAI C IR D SU CINKU 30 kapsulių ~~6,99~~ 4,89 €
MAISTO PAPILDAI

-30% 2,72 € ~~3,89~~

ZINC 60 tablečių
MAISTO PAPILDAS
Cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią maistinių makromedžiagų apykaitą, normalią riebalų rūgščių ir angliavandenių apykaitą, normalią pažinimo funkciją, normalią kaulų, plaukų, nagų ir odos būklę bei apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
Vartojimas: gerti po 1 tabletę per parą, geriausiai po valgio.

1+1 Perkant Cordyceps pakuotę, Imunitetui su ežiuole – **DOVANŲ** 14,98 €

AMBIO CORDYCEPS
100 tablečių **14,98 €**
MAISTO PAPILDAS
- 750 mg kordicepsų (Cordyceps Sinensis) micelių ekstrakto 1 tabletėje.
- Tik 1–2 tabletės per dieną.

AMBIO IMUNITETUI SU EŽIUOLE
30 tablečių **8,98 €**
MAISTO PAPILDAS
- Cinkas, selenas ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
- Vitaminas C padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir normalią nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
- Produkto sudėtyje yra rausvažiedžių ežiuolių šaknų ekstrakto.

-30%

EMILI FITO ARBATOS PERŠALIMUI
EMILI FITO GRIP TEA, 20 paketėlių po 1,5 g
EMILI FITO IMUNO TEA, 20 paketėlių po 1,5 g
EMILI FITO BRONCHO TEA, 20 paketėlių po 1,5 g
GERAI JŪSŲ SAVIJAUTAI.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-30%

TERMOMETRAS BE GYVSIDABRIO ~~4,79~~ 3,35 €
TERMOMETRAS SKAITMENINIS LANKSČIŲ GALIUKU ~~7,99~~ 5,59 €
MEDICININĖS PREKĖS

-40%

BALZAMAS ŽVAIGŽDUTĖ 4 g ~~3,29~~ 1,97 €
BALZAMAS ŽVAIGŽDUTĖ aromatinis pieštukas, 1,3 g ~~3,69~~ 2,21 €
Balzamas ir aromatinis pieštukas „Žvaigždutė“ seniai žinomas tradicinis produktas iš Vietnamo, plačiai naudojamas liaudies medicinoje:
- Kaip pagalbinė priemonė esant slogai ar užgultai nosiai prižiūrėti;
- Kaip pagalbinė priemonė peršalimo simptomams lengvinti;
- Kaip pagalbinė priemonė skaudant galvai.

KVĖPAVIMO SISTEMAI

-30%

COSINUS NOSE AND SINUSES
30 tablečių ~~6,59~~ 4,61 €
MAISTO PAPILDAS
Juoduogis šeivamedis *padeda palaikyti normalią kvėpavimo sistemą. **Vaistinė verbena ir skėstašaknis kamro** *padeda apsaugoti ląsteles ir audinius nuo oksidacinės pažaidos. Vitaminas B_2 padeda palaikyti normalią gleivinių būklę, raudonųjų kraujo kūnelių būklę, apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. **Vitaminas B12** padeda palaikyti normal raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, normalią imuninės sistemos veiklą. **Vitaminas A** padeda palaikyti normalią gleivinių būklę, imuninės sistemos veiklą.
* EFSA-Q-2008-2870, EFSA-Q-2008-4554, EFSA-Q-2008-3121, EFSA-Q-2008-4451.

COSINUS NOSE AND SINUSES
purškalas, 60 ml ~~6,19~~ 4,33 €
Purškalas drėkina nosies gleivinę dėl jo sudėtyje esančių aktyvių komponentų: **raudondumlių ekstrakto, krūminės perilės sėklų ekstrakto, pipirmėčių aliejaus bei glicerino**, taip pat padeda pašalinti sekreto perteklių, pasižymi švelniu antibakteriniu poveikiu, padeda mažinti nosies užgulimą. Reguliarus vartojimas padeda išsaugoti sveiką nosies gleivinę, sinusus.

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

-30%

IMUNITAL

IMUNITAL HOT DRINK su islandine kerpena, 5 paketėliai ~~6,37~~ **4,46 €**
IMUNITAL HOT DRINK su imbieru ir citrina, 5 paketėliai ~~6,37~~ **4,46 €**
IMUNITAL PLUS, 30 kapsulių ~~9,73~~ **6,81 €**
IMUNITAL SHOTS, 20 geriamų dozių po 10 ml ~~28,53~~ **19,97 €**

MAISTO PAPILDAI
Imuninė sistema – tai žmogaus organizmo atsakas neigiamiems aplinkos veiksniams. Tam tikru metų laiku ar pasikeitus įprastoms gyvenimo sąlygoms (pvz.,esant peršalimo ligų sezonui), gali prireikti stipresnio palaikymo imuninei sistemai. **Imunital** skirtingų vartojimo formų ir sudėčių produktai skirti imuninei sistemai. **Imunital plus** kapsulės su kininiu kordicepsu. **Imunital Shots** itin stipri programa imunitetui su bičių pieneliu, priešpienio koncentratu, reishi ir shitake grybų ekstraktais bei vitaminu B6. Tik 1 buteliukas per dieną! Ir **Imunital hot drink** karštas gėrimas rekomenduojama vartoti pajutus pirmuosius peršalimo simptomus. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
IMUNITAL – NEVAIKIŠKAS PALAIKYMAS TAVO IMUNITETUI.

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**

HUMER STOP VIRUS nosies purškalas, 15 ml **10,79 €**

MEDICINOS PRIEMONĖ
Nosies purškalas „Humer Stop Virus“ eliminuoja 99,99 % peršalimo* ir gripo virusų*. Ypač rekomenduojama, kai ESATE APLINKOJE, KELIANČIOJE PAVOJŲ SUSIRGTI (UŽSIKRĖSTI) VIRUSAIS: jūsų aplinkoje yra sergantis žmogus; lankotės viešose erdvėse, kuriose yra daug žmonių, vyksta ryškūs aplinkos temperatūros svyravimai (šaltas ir karštas oras, oro srautai ir kt.); PASIREIŠKĖ PIRMIEJI PERŠALIMO SIMPTOMAI: gerklės perštėjimas, nosies niežulys ar bėganti nosis, čiaudulys.
* Veiksmingumas patvirtintas moksliniais tyrimais: in vitro pagal NF EN 14476 metodologiją Rhino, Parainfluenza 3 ir gripo (Influenzavirus) virusams.
SUSIKURK BARJERĄ NUO VIRUSŲ!

IKI **-40%**

IMMUNO POSITIVE
30 tablečių ~~5,79~~ **3,47 € -40%**

MAISTO PAPILDAS
Tikrųjų alavijų lapai, juodavaisių aronijų vaisiai, paprastųjų aviečių vaisiai, stambiauogių spanguolių vaisiai, paprastųjų eršketių vaisiai, juodųjų eleuterokokų šaknys, vitaminai ir mineralai.
Vartojimas: rekomenduojama vartoti po 1 tabletę per parą.

CITROIMUN greipfrutų sėklų ekstraktas, 50 ml ~~17,59~~ **12,31 € -30%**

MAISTO PAPILDAS
Sudedamosios dalys: Greipfrutų sėklų ekstraktas (84 %), drėgmę išlaikantis medžiaga glicerolis (augalinės kilmės), išgrynintas vanduo, L-askorbo rūgštis. 800 mg bioflavonoidų / 100 ml

ABC VIT VITAMINAS C 500 mg, 50 tablečių ananasų, braškių, apelsinų skonio ~~5,89~~ **4,12 € -30%**

MAISTO PAPILDAI
Su saldikliais. Trijų skonių: braškių, apelsinų, ananasų.
Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės ir nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. **Vartojimas:** suaugusiesiems po 1–2 tabletes per dieną.

-15%

ALSIROYAL

Alsiroyal Cistus PLUS Infect Blocker,
30 čiulpiamųjų pastilių ~~12,29~~ **10,45 €**

MEDICININĖ PRIEMONĖ
Alsiroyal Acerola Plus Vitamin C,
30 prailginto veikimo tablečių ~~8,59~~ **7,30 €**

MAISTO PAPILDAS
Produktai, esantys po Alsiroyal pavadinimu, išskirtiniai tuo, jog pagaminti vadovaujantis gamtą tausojančiais principais, atitinka aukščiausius Vokietijoje keliamus kokybės reikalavimus, tinkami vartoti vegetarams ir veganams.
Naujiena **Alsiroyal Cistus plus Infect Blocker** – antivirusinio poveikio pastilės, suformuojančios fizinį barjerą nuo įvarių tipų bakterijų ir virusų, tokiu būdu užkertant kelią infekcinės ir uždegiminės kilmės kvėpavimo takų susirgimams. Cistus plus Infect Blocker galima vartoti tiek profilaktiškai, tiek jau pajutus pirmuosius peršalimo simptomus. O **Alsiroyal Acerola plus** prailginto poveikio vitaminą C su cinku ir rekomenduojama vartoti siekiant palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Tai vitaminas C, kuris veikia visą dieną. Prailginto poveikio vitaminas C su cinku bei šeivamedžiu ir šaltalankių milteliais, malpigijų (acerolos) bei eršketuogių ekstraktais.

NUO PERŠALIMO

NUO **4,99 €**

DALERON COLD3

DALERON COLD3, 12 plėvele dengtų tablečių **4,99 €**
DALERON COLD3, 24 plėvele dengtos tabletės **7,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido ir 15 mg dekstrometorfano hidrobromido. **Terapinės indikacijos:** peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, sąnarių, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** įprasta dozė suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vaikams yra 2 tabletės. Tokią dozę galima gerti daugiausia 4 kartus per parą. Tarp dozių vartojimo turi būti praėjusios mažiausiai 4 valandos. Didžiausia paros dozė yra 8 tabletės. **Kontraindikacijos:** padidėjes jautrumas veikliosiems medžiagoms paracetamoliui, pseudoefedrino hidrochloridui, dekstrometorfeno hidrobromidui. Sunki hipertenzija, sunki išeminė širdies liga (krūtinės angina). Vartojama kitų vaistinių preparatų, kuriuose yra paracetamolio. Pacientas yra jaunesnis kaip 12 metų. Sunkus kepenų arba inkstų funkcijos sutrikimas. Glaukoma.
PRADEDA VEIKTI JAU PER 20 MINUČIŲ!

-20%

HUMER

Humer – nosies higienos produktų, iš natūralių vaistinių medžiagų, ekspertas. Sprendimas kiekvienai užgulusiai nosiai.
„Humer“ naujienos kūdikiams ir vaikams
„Humer“ hipertoninis jūros vanduo užsikimšusiai kūdikių ir vaikų nosytei – atkemša nosį ir padeda pašalinti gleives, pasireiškus peršalimui, sinusitui bei alerginiam rinitui nuo 3 mėnesių ir vyresniems kūdikiams bei vaikams.
„Humer“ gleivių aspiratorius – skirtas naudoti pasireiškus peršalimui, sinusitui ar kitai infekcijai, kuri sukelia gausią sekreciją iš nosies. Nosies ploviklis leidžia vaikui vėl pradėti normaliai kvėpuoti ir geriau jaustis.
„HUMER“ – DAUGIAU NEI JŪROS VANDUO. „HUMER“ JUS IŠLAISVINA!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-30%

IMMUNACE

IMMUNACE su ežiuolėmis, 30 tablečių ~~19,99~~ **13,99 €**
IMMUNACE EXTRA, 30 tablečių ~~26,59~~ **18,61 €**

MAISTO PAPILDAI
„Immunace“ – subalansuotas ežiuolių ir antioksidantų kompleksas. Ežiuolės palaiko natūralią organizmo apsaugą. Antioksidantai – cinkas, selenas, vitaminas C ir kiti – padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Geležis, folio rūgštis ir kitos medžiagos palaiko normalią imuninės sistemos veiklą. „Immunace Extra“ sudėtis papildyta inovatyviomis medžiagomis – resveratroliu, astaksantinu, alfa-lipo rūgštimi, likopenu. Pakanka 1 tabletės per dieną.
„IMMUNACE“ – NEMATOMAS IMUNITETO RŪBAS!

IMUNITETUI

-30%

MOLEKIN IMUNO vitaminas C 1000 mg, vitaminas D 2000 IU, cinkas 10 mg, 30 tablečių ~~11,74~~ **8,22 €**

MOLEKIN IMUNO 20 šnypščiųjų apelsinų skonio tablečių ~~10,67~~ **7,47 €**

MAISTO PAPILDAI
Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą,Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, vitaminas C padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.Tabletė sudaryta iš dviejų dalių, vienoje – vitaminas C, kitoje – vitaminas D ir cinkas,todel vitaminai geriau įsisavinami. „Molekin Imuno“ maisto papilde yra didelis vitaminų C ir D kiekis.Tinka vegetarams.Sudėtyje nėra laktozės.Sudėtyje nėra glitimo.Rekomenduojama suvartoti po 1 tabletę per dieną.

LAIMĖS VALANDOS

Darbo dienomis
8–9 val. ir **14–15 val.***

Šeštadieniais
8–9 val. ir **14–15 val.***

Sekmadieniais
14–15 val.*

-30 %

Perkant 3**
ir daugiau prekių

** vaistams – 25 %

-25 %

Perkant 2**
ir daugiau prekių

* vaistams – 20 %

-20 %

Perkant 1* prekę

NORFOS vaistinėje akcijos „LAIMĖS VALANDOS“ metu perkant 1 prekę, taikoma 20 %, 2 ir daugiau prekių – 25 %, vaistams 20 %, 3 ir daugiau prekių – 30 % nuolaida, vaistams -25 %.
Taikomos momentinės 20 ar 25 % nuolaidos vaistams ir vaistiniams preparatams, o kitoms prekėms – 20, 25 ar 30 % nuolaidos, priklausomai nuo atitinkamo pirkimo metu įsigijamų prekių bendro kiekio. Nuolaida taikoma perkant pilnas prekių pakuotes, kurių kiekvienos vertė ne mažesnė nei 1,50 €. Prekės, perkant pagal kompensuojamąjį receptą, vardiniai, kartiniai vaistai skaičiuojami į krepšelį, tačiau nuolaida netaikoma.
Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Nuolaidos netaikomos perkant pagal kompensuojamąjį receptą, pradinio maitinimo pieno mišinius, kartinius (gaminamius vaistinėje) ir vardiniu vaistus, įsigyjant dovanų kuponus. Nuolaidos netaikomos perkant www.nvaistine.lt, neatsižvelgiant į tai, kad už prekes atsiskaitoma jas atsiimant vaistinėse. Nuolaidos netaikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Visos nuolaidos galioja tik su PC NORFA lojalumo kortele.
Informacija apie kitas akcijas ir prekes, kurioms netaikoma akcijos „LAIMĖS VALANDOS“ nuolaidos, suteikiama kiekvienoje vaistinėje, el.paštu info@nvaistine.lt arba nemokamu telefonu 8 800 10008.
Informaciją apie kitu nei nurodyta laiku vykstančias LAIMĖS VALANDAS rasite www.nvaistine.lt.

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

MAGNIO ŠALTINIS

NUO **5**44 €

MAGNE B$_6$ 470 mg/5 mg , 60 dengtų tablečių **8**49 €
MAGNE B$_6$ geriamasis tirpalas, 10 ampulių **5**44 €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: tabletėje yra 470 mg magnio laktato dihidrato bei 5 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6). Vienoje 10 ml ampulėje yra 186 mg magnio laktato dihidrato, 936 mg magnio pidolato, 10 mg piridoksino hidrochlorido. **Indikacijos:** MAGNE B6 skirtas magnio trūkumo sukeltiems simptomams gydyti. Magnio trūkumas gali sukelti tam tikrus simptomus ar jų derinius: nervingumas, irzlumas, nedidelis nerimas, trumpalaikis nuovargis, nedideli miego sutrikimai; mešlungis, dilgčiojimo pojūtis. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tabletes reikia nuryti užgeriant stikline vandens. Suaugusiesiems paros dozė yra 6–8 tabletės, kurią reikia išgerti per 2–3 kartus valgant. Vaikams paros dozė yra 10–30 mg/kg küno svorio. Geriamojo tirpalo ampulės turinys ištirpinamas pusėje stiklinės vandens. Suaugusiesiems paros dozė yra 3–4 ampulės, kurias reikia išgerti per 2–3 kartus tarp valgymų. Vaikams ir küdikiams, sveriantiems daugiau kaip 10 kg, paros dozė yra 10–30 mg/kg küno svorio arba 1–4 ampulės per 2–3 kartus tarp valgymų. **Kontraindikacijos:** preparato vartoti negalima, jeigu: yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei MAGNE B6 medžiagai; sergate tam tikra inkstų liga; vartojama levodopos. **Specialūs įspėjimai:** neštumo ir žindymo laikotarpiu vaistą galima vartoti tik tada, jei nurodo gydytojas. MAGNE B6 dengtos tabletės skirtos suaugusiems žmonėms ir vyresniems nei 6 metų vaikams. MAGNE B6 geriamojo tirpalo negalima duoti mažiau kaip 10 kg sveriantiems (iki 1 metų) küdikiams. Jeigu sergate inkstų, širdies ir kraujagyslių liga, prieš pradedant vartoti MAGNE B6 preparatus, reikia pasitarti su gydytoju. Piktnaudžiaujant vitaminu B6, pakenkiami jutiminiai periferiniai nervai: atsiranda tirpimas ir padėties jutimo pablogėjimas, drebulys galūnėse ir koordinacijos sutrikimai. Nustojus vartoti vaistą, pažeidimai paprastai išnyksta. Teksto parengimo data: 2022 m. sausio mėn. **Reklaminio teksto parengimo data:** 2201_SB_Magne_B6_V01_LT
MAGNE B$_6$ PADĖS ĮVEIKTI MAGNIO TRŪKUMĄ!

IKI **-50**%

MÖLLER'S

MAISTO PAPILDAI
Skysti žuvų taukai – tai šimtmečiais puoselėjama klasikinė žuvų taukų forma. **„Möller's" žuvų taukų kapsulės** išsiskiria kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyvių medžiagų deriniais.
TRADICINIS BŪDAS RŪPINTIS IMUNITETU.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

NUO **4**15 €

FERCELAN

202,8 mg/0,8 mg/100 mg, 30 kietųjų kapsulių **4**15 €
202,8 mg/0,8 mg/100 mg, 100 kietųjų kapsulių **9**26 €
Geležies (II) fumaratas/folio rūgštis/askorbo rūgštis

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Indikacijos. Kiekvienoje kapsulėje yra 202,8 mg geležies (II) fumarato, atitinkančio 66,7 mg elementinės geležies, 0,8 mg folio rūgšties ir 100 mg askorbo rūgšties. Geležis ir folio rūgštis organizme reikalingi normaliam raudonųjų kraujo kūnelių eritrocitų susidarymui, negavus pakankamo šių medžiagų kiekio, gali susiformuoti anemija. Kombinuoto geležies ir folio rūgšties įrodyto trūkumo šalinimas, ypač vienų menesį iki pastojimo (arba planuojant nėštumą) ir pirmų trijų nėštumo mėnesių laikotarpiu. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** 1 kapsulė 1 kartą per parą, nuryjant nekramtytą, gausiai užsigeriant skysčiu prieš pusryčius, prieš kitą valgymą ar valgio metu. **Įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Alergija geležies fumaratui, folio rūgščiai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; nustatytas geležies perteklius organizme; geležies apykaitos sutrikimas; sergant mažakraujyste, nesusijusia su geležies arba folio rūgšties trūkumu ar virškinimo trakto ligomis. Negalima vartoti dvigubos dozės, norint kompensuoti praleistą dozę. Perdozavimo simptomai gali būti vėmimas, kraujavimas iš virškinimo trakto, viduriavimas, veliau gali atsirasti cirkuliacinis kolapsas, galimas apsinuodijimas geležimi. Nedelsiant pasakykite gydytojui, jeigu Jums atsirado: pasunkėjęs kvėpavimas, išberimas, kolapsas. „Fercelan" gali sukelti alergines reakcijas. Šio vaistinio preparato sudėtyje yra laktozės. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas galaktozės netoleravimas, Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Geležis gali sąlygoti tamsią išmatų spalvą. Tai neturi klinikinės reikšmės. Nėra skirtas vartoti vaikams. **Neštumo ir žindymo laikotarpis.** Jeigu esate nėščia, žindote küdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. „Fercelan" galima vartoti neštumo ir žindymo laikotarpiu. **Pakuotė.** 30 arba 100 kietųjų kapsulių. Farmakoterapinė grupė – vaistiniai preparatai nuo anemijos, geležis derinyje su folio rūgštimi. ATC kodas – B03AE10. Teksto peržiūros data 2018-02-08.

NUO **3**47 €

FERRETAB® COMP.

FERRETAB® COMP. 152,1 mg/0,5 mg,
30 pailginto atpalaidavimo kietųjų kapsulių **3**47 €
FERRETAB® COMP. 152,1 mg/0,5 mg,
100 pailginto atpalaidavimo kietųjų kapsulių **8**18 €
Geležies (II) fumaratas / folio rūgštis

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
„Ferretab® comp." vartojamas kombinuotam geležies ir folio rūgšties trūkumui šalinti bei jo profilaktikai, ypač nėštumo metu. „Ferretab® comp." atkuria arba papildo geležies ir folio rūgšties kiekį, kai to negali atlikti savarankiškai žmogaus organizmas. **Dozavimas ir vartojimo būdas**: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams, esant nedideliam geležies trūkumui, gerti po 1 kapsulę per parą. Kai yra mažakraujystė, paros dozę galima padidinti iki 1 kapsulės 2–3 kartus per parą. Kartais nėštumo metu reikia gerti didelę geležies dozę. Kapsules nuryti nekramtytas, užsigeriant stikline vandens. Nekramtykite arba nečiulpkite kapsulių, nes gali sustprėti šalutinis poveikis. Geriausia kapsules išgerti nevalgius. **Kontraindikacijos:** „Ferretab® comp." vartoti negalima, jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) geležies fumaratui, folio rūgščiai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu nustatyta su geležies ir folio rūgšties stoka nesusijusi anemija; geležies perteklius organizme arba būklė, kuri sutrikdo normalų geležies įsisavinimą; hemoglobinopatija; jeigu sergate hemolizine aplazine ar perniciozine anemija; virškinamojo trakto ligomis. **Įspėjimai ir atsargumo priemonės:** gydymas turi būti tęsiamas keletą savaičių (maždaugiausiai 8–12 sav.) po to, kai eritrocitų skaičius tampa normalus iki visiško geležies atkūrimo. Vartojant „Ferretab® comp." kapsules kartais išmatų spalva tampa juoda, tačiau tai normalu. Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines „Ferretab® comp." medžiagas. Sudėtyje yra 34,47 mg laktozės monohidrato (pieno cukraus). Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Sudėtyje yra dažiklio azorubino (E122). Gali sukelti alerginių reakcijų. **Pakuotė:** 30 arba 100 pailginto atpalaidavimo kietųjų kapsulių. **Farmakoterapinė grupė:** vaistiniai preparatai nuo anemijos, geležis kartu su folio rūgštimi. **ATC kodas** – B03AD02. **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:** „G.L. Pharma GmbH", Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija.

-30%

IRONLINK 14 mg, 10 x 8 ml ~~8,78~~ **6**15 €
IRONLINK FORTE 40 mg, 10 x 10 ml ~~9,00~~ **6**30 €
IRONLINK KIDS 10 mg, 10 x 8 ml ~~8,29~~ **5**80 €
MAISTO PAPILDAI

IKI **-40**%

OMEGA-3 1000 mg, 60 kapsulių ~~9,89~~ **6**71 € -30 %
OMEGA-3 1000 mg plus Vitamin D3, E, 60 kapsulių ~~10,29~~ **6**17 -40 %
MAISTO PAPILDAI
EPA (lat. EPR – eikozapentaeno rūgštis) ir DHA (lat. DHR – dokozaheksaeno rūgštis) padeda palaikyti normalią širdies veiklą. DHR (dokozaheksaeno rūgštis) padeda palaikyti normalią smegenų funkciją, išsaugoti normalų regėjimą.
Vitaminas D3 padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų, dantų ir raumenų būklę.
Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

VAISTINĖ

Mūsų vaistinėse nuolat rasite

DAUGIAU NEI 2000
KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ.

DRĖKINAMIEJI AKIŲ LAŠAI

-20%

STARAZOLIN

STARAZOLIN COMPLETE, 10 ml ~~11,95~~ 9,59 €
STARAZOLIN HYDROBALANCE, 5 ml, 2 vnt. ~~11,49~~ 9,19 €

MEDICINOS PRIEMONĖS
„Starazolin Complete“ yra sterilūs akių lašai, kurių sudėtyje yra natrio hialuronato ir dekspantenolio. Dekspantenolis žymiai sustiprina natrio hialuronato savybę išsaugoti drėgmę. **Šių medžiagų derinys drėkina, atgaivina, palaiko regeneraciją, apsaugo ir maitina akies paviršių, esant:** mechaniniam akies dirginimui, pvz., oftalmologinės apžiūros metu ir naudojant kontaktinius lęšius; žalingiems aplinkos veiksniams – oro kondicionieriui, šaltam, karštam, sausam orui; oro užterštumui tabako dūmais, taip pat būnant dulkėtose ar saulėtose vietose; stipriam nuovargiui, pvz., atsiradusiam dėl darbo su kompiuteriu, mikroskopu, ilgo vairavimo. **„Starazolin Complete“** yra be konservantų, o buteliuke yra speciali vožtuvų sistema ir filtras, apsaugantys preparatą nuo mikroorganizmų taršos, todėl po pirmojo atidarymo medicinos priemonę galima naudoti 90 parų.
„Starazolin Hydrobalance PPH“ suteikia veiksmingą ir ilgalaikį akių drėkinimą. Rekomenduojamas esant akių aplinkos dirgikliams; sumažėjus mirksėjimo dažniui; kai yra nepakankama ašarų gamyba arba jų sudėties pokyčiai. **„Starazolin Complete“** ir **„Starazolin Hydrobalance PPH“** gali naudoti žmonės, naudojantys visų tipų kontaktinius lęšius. Įprastinė dozė yra 1–2 lašai 3 kartus per parą į kiekvienos akies junginės maišelį.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-20% 18,63 € ~~23,29~~

SUPEROPTIC 60 minkštųjų kapsulių

MAISTO PAPILDAS
Sudėtyje gausu omega-3 riebalų rūgščių, taip pat yra vitaminų (A, B grupės, C, E) ir mikroelementų (cinko, mangano, vario, seleno). Maisto papildas turi liuteino ir zeaksantino, kurių natūraliai yra akių geltonojoje dėmėje. Dėl sudedamųjų dalių „Superoptic“ padeda išsaugoti normalų regėjimą ir apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. 1 kapsulė per parą nuryti užsigeriant nedideliu kiekiu skysčio. Rekomenduojama produktą vartoti valgio metu.
VISAPUSĖ APSAUGA TAVO AKIMS.

-30% 3,84 € ~~5,49~~

VITADAY KOMPLEKSAS AKIMS 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

SAUSOMS, SUDIRGUSIOMS IR PAVARGUSIOMS AKIMS

NUO 11,99 €

BEPANTHEN® EYE

BEPANTHEN® EYE akių lašai, 10 ml **13,99 €**
BEPANTHEN® EYE akių lašai, 20 × 0,5 ml vienadozių talpyklių **11,99 €**

MEDICINOS PRIEMONĖS
Bepanthen® Eye akių lašų sudėtyje yra 0,15 % natrio hialuronato ir 2 % dekspantenolio. Bepanthen® Eye saugo ir drėkina akies paviršių ir padaro jį slidžiu. Tokiu būdu ilgam sumažėja diskomfortas, susijęs su mechaniniu stresu, stresu dėl aplinkos poveikio arba intensyvaus žiūrėjimo. Sudėtyje nėra konservantų, todėl šie lašai gerai toleruojami, net jei vartojami ilgą laiką. Lašinti po 1 lašą į akies junginės maišelį 3–5 kartus per parą. Jeigu yra alergija bet kuriai sudėtyje esančiai medžiagai arba akių uždegimas ar pažeidimas, vartoti negalima. Akių lašų vartojimo metu kontaktinių lęšių išsiimti nereikia. Vienadozės akių lašų talpyklės skirtos tik vienkartiniam vartojimui. Bepanthen® Eye buteliukas yra ekonomiškas sprendimas: ypatinga akių lašų buteliuko technologija leidžia produktą suvartoti net per 12 mėnesių po jo atidarymo. Jei norite sužinoti daugiau, skaitykite pilną Bepanthen® Eye vartojimo instrukciją.
Reklamos teksto parengimo data: 2022-06, CH-20220601-89
PAŠALINKITE SAUSŲ AKIŲ SIMPTOMUS IŠ KARTO!

-30%

OPTIC TOTAL 30 tablečių ~~5,19~~ 3,63 €
OPTIC SENIOR 30 tablečių ~~6,39~~ 4,47 €
OPTIC BIOLUTEINA 25 30 tablečių ~~7,99~~ 5,59 €

MAISTO PAPILDAI
OPTIC TOTAL sudėtyje yra mėlynių uogų, liuteino, cinko ir vitaminų C, E, A.
OPTIC SENIOR sudėtyje yra mėlynių uogų, vynuogių sėklų ekstrakto, liuteino, zeaksantino, cinko ir vitaminų C, E, A, B_6, B_2, B_1, B_{12}.
OPTIC BIOLUTEINA 25 –sudėtyje yra mėlynių uogų, vynuogių sėklų ekstrakto, liuteino, zeaksantino, cinko, seleno ir vitaminų: C, E, A, B_6, B_2, B_1, B_{12}.
VARTOJIMAS: po 1 tabletę per dieną.

FORTE MĖLYNIŲ TABLETĖS SU CINKU 80 tablečių ~~7,99~~ 4,96 €

MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIU
Rekomenduojama vartoti, kai akys pavargsta dirbant kompiuteriu, vairuojant, daug skaitant, nešiojant kontaktinius lęšius.

-25%

AKINIAI SKAITYMUI

Vis daugiau skaitotome ne spausdintą tekstą, o iš ekranų. Pristatome naujieną – skaitymo akiniai su Blue Control lęšiais. Jų privalumai:
- Apsaugo akis nuo kenksmingų mėlynos šviesos spindulių, kurią skleidžia skaitmeniniai prietaisai (išmanusis telefonas; kompiuteris; planšetinis kompiuteris; televizorius; LED apšvietimas)
- Panaikina atspindžius tiek iš išorės, tiek iš vidinės lęšio pusės.
- Mažina akių nuovargį.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

Pasiūlymai galioja **2022 09 01 – 2022 09 30.**
Leidinyje nurodytos maisto papildų, kosmetikos, medicininės paskirties prekių ir medicinos prietaisų kainos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortele, o vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį/informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvktu.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.
Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Daugiau informacijos NORFOS vaistinėje, tel. 8 800 10008, www.nvaistine.lt MAŽYLIUI IR MAMAI skirtas prekes ypatingomis kainomis greičiau ir patogiau užsisakykite internetinėje vaistinėje www.nvaistine.lt. Užsisakius prekių (išskyrus vaistinius preparatus) už 28,96 € ir daugiau – pristatymas NEMOKAMAS! Reklaminio teksto parengimo data – 2022 08 16.

-40%

AMBIO VITAMINAS C
56 kramtomosios tabletės

~~7,49 €~~ **4,49 €**

MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIAIS
- 500 mg vitamino C 1 kramtomojoje apelsinų skonio tabletėje.
- Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
- Vitaminas C padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą bei mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

-45%

AMBIO KOFERMENTAS Q10
100 mg, 30 kapsulių

~~17,99 €~~ **9,89 €**

MAISTO PAPILDAS

-30%

AMBIO HOT HERBAL DRINK
milteliai karštam gėrimui, 20 pakelių

~~11,98 €~~ **8,39 €**

MAISTO PAPILDAS
- Aviečių skonio tirpūs milteliai su pelargonijų šaknų ekstraktu, skirti karštam gėrimui paruošti, su saldikliais.
- Sudėtyje yra vitamino C, rutino, cinko ir seleno.

-30%

AMBIO BRONCHO COMPLEX
20 tablečių

~~5,99 €~~ **4,19 €**

MAISTO PAPILDAS
- Islandinės kerpenos, vitaminas C, čiobrelių, pušų ir tūbių ekstraktai.
- Čiobrelių, islandinių kerpenų ir paprastųjų pušų ekstraktai padeda palaikyti kvėpavimo takų funkciją.
- Maisto papildo sudėtyje esantis vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

-40%

AMBIO RYKLIO KREMZLĖS
60 kapsulių

~~12,99 €~~ **7,79 €**

MAISTO PAPILDAS
- Maisto papildas pagamintas iš džiovintų ir į miltelius susmulkintų ryklių kremzlių.

-30%

AMBIO GERKLEI SU ČIOBRELIU
150 ml

~~7,49 €~~ **5,24 €**

SKYSTAS MAISTO PAPILDAS BE CUKRAUS

AMBIO LAKTO-BIFIDOBAKTERIJŲ KOMPLEKSAS EXTRA 20 kapsulių

-40%

~~7,98 €~~ **4,79 €**

MAISTO PAPILDAS
- Papildo kasdienę mitybą gyvybingomis bakterijomis.

AMBIO VIRŠKINIMO FERMENTAI 12 kramtomųjų tablečių

-35%

~~2,99 €~~ **1,94 €**

MAISTO PAPILDAS
- Fermentų ir augalinių ekstraktų kompleksas.

AMBIO VITAMINAS B_{12} 60 tablečių

-25%

~~5,99 €~~ **4,49 €**

MAISTO PAPILDAS
- Vitaminas B12 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, normalią nervų sistemos veiklą, normalią psichologinę funkciją, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą. Atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.
- Tik 1 tabletė per dieną.

AMBIO MAGNIS FORTE 375 mg, 30 tablečių

-35%

~~6,95 €~~ **4,52 €**

MAISTO PAPILDAS
- Magnis padeda palaikyti normalią: raumenų funkciją, kaulų ir dantų būklę, psichologinę funkciją, nervų sistemos veiklą, energijos apykaitą.
- Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

AMBIO GERAM POILSIUI 30 kapsulių

-35%

~~7,98 €~~ **5,19 €**

MAISTO PAPILDAS
- Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti.
- Tik 1 kapsulė per dieną.

AMBIO PASIFLORA 60 tablečių

-40%

~~8,98 €~~ **5,39 €**

MAISTO PAPILDAS
- Raudonžiedžių pasiflorų ekstraktas padeda atsipalaiduoti ir užmigti.

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

NORMALIAM VIRŠKINIMUI, SKRANDŽIO RŪGŠTINGUMUI IR SVEIKOMS KEPENIMS

-20%

GASTROVAL

Gastroval, 15 kapsulių ~~4,57~~ **3,66 €**
Gastroval Fluxus rūgštingumui, 15 kapsulių ~~5,54~~ **4,43 €**
Gastroval Hepar formula, 30 kapsulių ~~8,95~~ **7,16 €**

MAISTO PAPILDAI
Gastroval – daugiau nei 10 metų populiariausias* maisto papildas virškinimui Lietuvoje. Sudėtyje net 7 augalinių fermentų ir ekstraktų derinys, kurių naudą lengva pajusti. Gastroval Fluxus – pirmasis ir vienintelis Lietuvoje su inovatyviu DGL saldymedžiu – verta išbandyti. Išmaniai palaiko skrandžio rūgštingumo pusiausvyrą dėka plačios sudėties su augalų sėklų ir šaknų ekstraktais, magniu, virškinimo fermentais, bifido bei lakto bakterijomis, inulinu.
Gastroval Hepar Formula – geresnio pasisavinimo augalinė formulė – rimtesnė kepenų apsauga nuo oksidacinės pažaidos, kepenų ląstelių regeneracija, organizmo valymo funkcija, normalaus cholesterolio lygio palaikymas.
GASTROVAL – SUPRANTA, KO REIKIA.
Geltonasis gencijonas tradiciškai vartojamas virškinimui palengvinti. Ožragių sėklų ekstraktas padeda palaikyti normalią skrandžio rūgštinę terpę. Dažinės ciberžolės padeda apsaugoti kepenis nuo oksidacinės pažaidos, palaikyti normalų cholesterolio lygį kraujyje. Tikrieji margainiai padeda palaikyti normalią kepenų ląstelių regeneraciją, palaikyti normalią organizmo valymo funkciją.*Gastroval yra populiariausias maisto papildas virškinimui Lietuvoje, remiantis 2021 m. Softdent pardavimų duomenimis.

KEPENIMS

-30% **4,61 €** ~~6,59~~

LEVEREN 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS
Daržinio artišoko ekstraktas *padeda palaikyti normalią kepenų funkciją, normalią lipidų apykaitą. **Trūkažolės šaknų ekstraktas** *padeda palaikyti normalią virškinimo sistemos veiklą. **Vitaminas B6** padeda palaikyti normalią baltymų ir glikogeno, homocisteino apykaitą, normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. **Folio rūgštis** padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
*- EFSA-Q-2008-4424, EFSA-Q-2010-00256, EFSA-Q-2008-3918.

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMUI GYDYTI

NUO **5,99 €**

DUPHALAC

DUPHALAC, 667 mg/ml, geriamasis tirpalas, 200 ml **5,99 €**
DUPHALAC, 667 mg/ml, geriamasis tirpalas, 500 ml **9,99 €**
DUPHALAC, 667 mg/ml, geriamasis tirpalas, 1000 ml **15,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Sudėtis: 1 ml geriamojo tirpalo „Duphalac" yra 667 mg laktuliozės. **Terapinės indikacijos:** vidurių užkietėjimui (reti žarnų judesiai, kietos ir sausos išmatos, pavyzdžiui, sergant hemorojumi, po storosios žarnos ar išangės operacijos); kepenų encefalopatijai gydyti. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** vaistas gali būti vartojamas 1 kartą per parą, pavyzdžiui, pusryčiaujant, arba dozė gali būti padalyta į 2 dalis. Geriamąjį tirpalą „Duphalac" galima gerti neskiestą arba truputį atskiestą. „Duphalac", tiekiamam buteliukuose, galima naudoti matavimo taurelę. Pradinė paros dozė: suaugusiesiems ir paaugliams – 15–45 ml; 7–14 m. vaikams – 15 ml; 1–6 m. vaikams – 5–10 ml; kūdikiams iki 1 m. – iki 5 ml. Atsižvelgiant į gydymo poveikį, po keleto dienų pradinė dozė gali būti keičiama palaikomąja doze. Gydomasis poveikis gali pasireikšti tik po keleto (2–3) dienų. Dozavimas esant kepenų encefalopatijai (tik suaugusiesiems): pradinė dozė yra 30–45 ml geriamojo tirpalo 3–4 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** be gydytojo nurodymo ir atidžios priežiūros vaikams iki 14 m. „Duphalac" vartoti negalima. Alergija (padidėjęs jautrumas) laktuliozei arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, galaktozemija, žarnyno nepraeinamumas ar uždegimas (Krono liga ar opinis kolitas), virškinimo trakto perforacija (prakiurimas) ar jos rizika. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** prieš pradedant vartoti vaistą, rekomenduojama pasitarti su gydytoju ar vaistininku, jei: jums skauda pilvą dėl nepaaiškinamų priežasčių; jei negalite suvirškinti pieno cukraus (laktozės); jei sergate cukriniu diabetu. Vaisto vartoti negalima, jei yra: galaktozės ar fruktozės netoleravimas, Lapp laktazės trūkumas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Ilgalaikis nepritaikytos dozės vartojimas (daugiau nei 2–3 išsituštinimai minkštomis išmatomis per dieną) arba piktnaudžiavimas vaistu gali sukelti viduriavimą bei elektrolitų pusiausvyros sutrikimą. „Duphalac" galima vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Reklamos tekto parengimo data 2019-04. MYL-LT-19-30
LENGVA PERGALĖ UŽKIETĖJUS VIDURIAMS.

VIRŠKINIMUI

PIGU 0,27 €

AKTYVINTA ANGLIS 10 tablečių

MAISTO PAPILDAS
1-oje tabletėje yra 250 g aktyvuotos anglies.

PILVO SKAUSMUI, PŪTIMUI, DUJŲ KAUPIMUISI ŽARNYNE PALENGVINTI

4,49 €

METEOSPASMYL® 60 mg/300 mg minkštosios kapsulės, 20 minkštųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Terapinės indikacijos. Žarnyno funkcijos sutrikimų, lydimų meteorizmo ir dujų kaupimosi žarnyne (esant dirgliosios žarnos sindromui) simptominis gydymas. **Dozavimas.** Suaugusiesiems nuo 18 metų amžiaus: paprastai vartojama po 1 kapsulę 2–3 kartus per dieną pradedant valgyti. Vaistinis preparatas vartojamas 3–4 savaites. Meteospasmyl nėra skirtas vartoti jaunesniems kaip 18 metų pacientams. **Vartojimo būdas.** Vartoti per burną. Kapsulės geriamos prieš pradedant valgyti, jos yra nuryjamos nekramtytos užsigeriant pakankamu skysčio kiekiu. **Kontraindikacijos.** Alergija alverino citratui, simetikonui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; žarnų nepraeinamumas; vartojimas vaikams ir paaugliams iki 18 metų. **Specialūs įspėjimai.** Atsargiai vaistą reikia vartoti tais atvejais, kai yra galimo žarnyno nepraeinamumo simptomai (pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas, dujų ir (arba) išmatų susilaikymas). Meteospasmyl gali padidinti kepenų fermentų koncentraciją kraujyje. Gydymo eigoje, norėdamas patikrinti kepenų būklę, gydytojas gali skirti kraujo tyrimus. Esant padidėjusiai šių fermentų koncentracijai, gydytojas gali nutraukti gydymą. Reklamos teksto parengimo data 2021 m. vasario 12 d.

-20%

SIMETIGAST FORTE
240 mg kapsulės, 10 kapsulių ~~2,99~~ **2,39 €**
SIMETIGAST FORTE
240 mg kapsulės, 60 kapsulių ~~9,49~~ **7,59 €**
SIMETIGAST FORTE BABY
geriamieji lašai, 30 ml ~~5,49~~ **4,39 €**

MEDICINOS PRIETAISAI
„SIMETIGAST FORTE" 240 mg kapsulės (simetikonas) skirtos vartoti vyresniems nei 12 m. pacientams, esant pilvo pūtimui, pilnumo jausmui pilve, raugėjimui. Taip pat galima naudoti prieš pilvo ertmės diagnostines procedūras, nes tai pagerina vaizdų kokybę. Vartoti: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. amžiaus jaunuoliai – po 1 kapsulę 2–3 kartus per parą. Prieš diagnostines procedūras: 1 kapsulė vakare dieną prieš tyrimą ir 1 kapsulė ryte tyrimo dieną.
„SIMETIGAST FORTE BABY" geriamieji lašai (simetikonas) skirti kūdikiams nuo 28-os gyvenimo dienos ir vaikams iki 12 metų. Vartoti: kūdikiams (nuo 28-os gyvenimo dienos) ir vaikams iki 2 metų 3 lašai prieš, per ar po kiekvieno valgio. Negalima vartoti daugiau kaip 18 lašų per dieną.
GREITOJI PAGALBA IŠPŪSTAM PILVUI.

PAGALBA NUO VIDURIAVIMO

3,99 €

LOPEDIUM EXPRESS 2 mg, kietosios kapsulės, 10 kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje „Lopedium express" 2 mg kietojoje kapsulėje yra 2 mg loperamido hidrochlorido. **Indikacijos:** vaistas skirtas simptominiam suaugusiųjų ir vyresnių kaip 12 metų paauglių ūminio viduriavimo gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** iš pradžių reikia gerti 2 kapsules, vėliau (po kiekvieno išsituštinimo beformėmis išmatomis) - po 1 kapsulę. Kapsules reikia nuryti nekramtytas, užsigeriant šiek tiek skysčio. **Kontraindikacijos:** „Lopedium express" vartoti negalima jaunesniems kaip 12 metų vaikams ir paaugliams; taip pat jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai; jei reikia vengti žarnų veiklos sulėtėjimo; jei pasireiškia viduriavimas, kurio metu padidėja temperatūra bei išmatose atsiranda kraujo; jei paūmėja opinis kolitas; jei yra bakterijų sukeltas žarnyno uždegimas; jei viduriavimas atsirado antibiotikų vartojimo metu arba po jų. **Specialūs įspėjimai:** atsargiai vaisto turėtų vartoti pacientai, sergantys kepenų ligomis arba AIDS. Jeigu per 48 val. po vaisto išgėrimo viduriavimas nesusilpnėja, jo vartojimą reikia nutraukti ir kreiptis į gydytoją. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.", filialas Šeimyniškių g. 3A LT-09312 Vilnius, Lietuva. BS2011091731. Reklamos teksto parengimo data: 2020 11 09.

-30% **3,70 €** ~~5,29~~

SORBEX® 396 mg, 20 kapsulių

MAISTO PAPILDAS
1 kapsulėje – net 300 mg aktyvintosios anglies.
Padeda sumažinti per didelį dujų kaupimąsi pavalgius**.
Aktyvintoji anglis **„Sorbex"** išgaunama iš kokosų riešutų kevalų.
Rekomenduojama paros norma – 1–3 kapsulės.
** Teigiamas poveikis dujų kaupimuisi pasireiškia tada, kai 1 g aktyvintosios anglies suvartojama ne mažiau kaip 30 min. prieš valgį ir 1 g aktyvintosios anglies – iškart po valgio.

-40%

AMBIO VITAMINAS D3 3200, 30 kramtomųjų kapsulių ~~9,99~~ 5,99 €
AMBIO VITAMINAS D3 800 TV, 80 kapsulių ~~6,49~~ 3,89 €

MAISTO PAPILDAI
- Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų bei dantų būklę, raumenų funkciją, kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą, kalcio koncentraciją kraujyje.
- Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.

VITAMINO D3 ŠALTINIS

-20%

OLIDETRIM
OLIDETRIM 2000 TV, 60 minkštųjų kapsulių ~~10,95~~ 8,07 €
Olidetrim 2000 D3 + K2 Omega-3, 30 minkštųjų kapsulių ~~10,99~~ 8,79 €

MAISTO PAPILDAI
- Imunitetui – Vitamino D 2000 TV.
- Širdžiai, smegenims – DHR+ EPR omega-3 rūgštys
- Kaulams ir raumenims.

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Vitaminas D padeda sumažinti riziką griūti, kuri yra siejama su nestabilia laikysena ir raumenų silpnumu. Griuvimas yra 60 m. ir vyresnių vyrų ir moterų kaulų lūžių rizikos veiksnys. Omega-3 riebalų rūgštys DHR (dokozaheksaeno) ir EPR (eikozapentaeno) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą.
Siekiant maksimaliai padidinti vitamino D papildo naudą, juos naudinga vartoti kartu su vitaminu K2.
Rekomenduojama vartoti 1 kapsulę per parą.
GERIAUSIA GYNYBA – STIPRUS IMUNITETAS

SĄNARIAMS

9,91 €

GLUCOSAMIN-RATIOPHARM
1,5 g milteliai geriamajam tirpalui, 20 paketėlių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Viename paketėlyje yra 1,5 g gliukozamino sulfato, tai atitinka 1,884 g gliukozamino sulfato natrio chlorido arba 1,178 g gliukozamino. **Indikacijos.** Lengvo ar vidutinio sunkumo kelio osteoartrito sukeltų simptomų lengvinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Paketėlio turinį ištirpinti stiklinėje vandens ir gerti vieną kartą per parą. Gliukozaminas netinka vartoti ūminio skausmo simptomų slopinimui. Simptomų palengvėjimas (ypač skausmo) gali pasireikšti tik po kelių savaičių, kartais ir dar ilgesnio, vartojimo. Jei simptomai nepalengvėja po 2–3 mėnesių vartojimo, reikia iš naujo spręsti, ar gydymą gliukozaminu tęsti toliau. Milteliuos galima vartoti tiek valgio metu, tiek nevalgant. Gliukozamino negalima vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas gliukozaminui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Glucosamin-ratiopharm negalima skirti ligoniams, alergiškiems kiautuotiesiems vėžiagyviams, nes iš jų išgaunama preparato veikliojі medžiaga. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei pacientui yra sutrikusi gliukozės tolerancija, prieš skiriant gydymą ir vėliau periodiškai rekomenduojama stebėti gliukozės kiekį kraujyje ir, jei reikia, insulino poreikį. Jei pacientai turi širdies ir kraujagyslių ligų rizikos faktorių, rekomenduojama stebėti lipidų kiekį kraujyje, nes vartojantiems gliukozaminą ligoniams buvo nustatyti keli hipercholesterolemijos atvejai. Buvo aprašytas atvejis, kai pradėjus gliukozamino terapiją, pablogėjo astmos simptomai. Gliukozamino negalima vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams, nes neištirtas vartojimo saugumas ir veiksmingumas. Atsargumas reikalingas, jei pacientui yra fenilketonurija, paveldimas fruktozės netoleravimas. **Teksto peržiūros data** 2020-12-21.

-40% 5,87 € ~~9,79~~

BONCEL D3 5600 TV, 12 kapsulių

MAISTO PAPILDAS
Vartojimas: vartoti po 1 kapsulę per savaitę.
Vitaminas D3 padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese, padeda palaikyti normalią raumenų funkciją bei kaulų būklę. Sudedamosios dalys: vitaminas D3 (cholekalciferolis), saulėgrąžų aliejus, kapsulės apvalkalas: želatina, glicerolis, vanduo, raudonasis geležies oksidas (dažiklis) (E172), riboflavinas (E101(i)), titano dioksidas (dažiklis) (E171). Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Nutraukti vartojimą atsiradus jautrumui kuriai nors sudedamajai daliai. Laikymo sąlygos: laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikyti 15–25 °C temperatūroje. Saugoti nuo šviesos ir drėgmės.

-35% 2,59€ ~~3,98~~

VITADAY KOMPLEKSAS NERVŲ SISTEMAI 20 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

-50% 3,75 € ~~7,49~~

VITADAY KOMPLEKSAS ATMINČIAI 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

-30%

HERBASTRESS® dienai, 30 tablečių ~~12,09~~ 8,46 €
HERBASTRESS® MIEGAM nakčiai, 20 kapsulių ~~11,59~~ 8,11 €

MAISTO PAPILDAI
HERBASTRESS®. Standartizuotų augalų ekstraktų ir B grupės vitaminų derinys nervų sistemai. **Vartojimas:** 1 tabletė per dieną.
HERBASTRESS® MIEGAM. Su melatoninu, valerijono ir apynių ekstraktu. **Vartojimas:** 1 kapsulė vakare prieš miegą.

MODUS 30 tablečių ~~6,39~~ 4,47 €
MODUS DREAM MELATONIN 30 tablečių ~~6,39~~ 4,47 €

MAISTO PAPILDAI
„Modus" sudėtyje yra vaistinių melisų, paprastųjų apynių ir tikrųjų levandų ekstraktų, magnio ir vitamino B_6. **Vartojimas:** po 1 tabletę per dieną.
„Modus Dream Melatonin" sudėtyje yra vaistažolių ir vitaminų. Rekomenduojama vartoti normalaus miego funkcijai palaikyti. Maisto papildas rekomenduojamas ir žmonėms, kurių maisto racione yra vitamino B_6 trūkumas. **Vartojimas:** rekomenduojama paros dozė – 1 tabletė per parą. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti.

-30% 4,26 € ~~6,09~~

VALERIANA FORTE 50 tablečių

MAISTO PAPILDAS
3-ose tabletėse yra 600 mg valerijonų šakniastiebių su šaknimis.
Vartojimas: po 1 tabletę 3 kartus per dieną valgio metu, užgeriant pakankamu kiekiu skysčio.
Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO

NUO 1,99 €

APAP

APAP, 500 mg, 12 plėvele dengtų tablečių **1,99 €**
APAP, 500 mg, 24 plėvele dengtos tabletės **3,79 €**
APAP, 250 mg granulės paketėlyje, vaikams, 10 paketėlių **5,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: paracetamolis, 250 mg ir 500 mg. Indikacijos: vaistai skirti silpnam ir vidutinio stiprumo skausmui malšinti ir temperatūrai mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Apap, 500 mg" plėvele dengtos tabletės: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams gerti po 1–2 tabletes kas 4–6 valandas, ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. „Apap, 250 mg" granulių paketėliuose, skirtų vaikams, vienkartinė dozė yra nuo 10 iki 15 mg/kg küno svorio vyresniems nei 4 metų vaikams, ją vartoti ne dažniau kaip kas 4 valandos (didžiausia paros dozė – 4 paketėliai). Granules supilti tiesiai į burną ant liežuvio ir praryti neužgėrus vandens. Kontraindikacijos: vaistus vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: prieš vartojant paracetamolį būtina pasitarti su gydytoju, jei yra: pažeistos kepenys ar inkstai, astma, gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka, hemolizinė anemija, vartojami kai kurie kiti vaistai, skysčių netekimas, mitybos nepakankamumas, vartojamas alkoholis bei nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Didesnės nei rekomenduojamos dozės sukelia vidaus organų pažeidimus. Reklaminio teksto parengimo data: 2021-01-27.
„APAP". KIEKVIENOJE VAISTINĖLĖJE.

NUO SKAUSMO

4,99 €

EMOX 100 mg/g gelis, 55 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
1 g gelio yra 100 mg naprokseno. Indikacijos: lokaliam minkštųjų audinių traumos sukeltam skausmui malšinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: 2–6 kartus per dieną į odą virš skaudamos vietos reikia įtrinti maždaug 4 cm gelio juostelę. Vaikams Šio vaisto vartoti nerekomenduojama. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas naproksenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai ar kitiems nesteroidiniams vaistiniams preparatams nuo uždegimo, salicilatams; jei yra žinoma, kad acetilsalicilo rūgštis arba kiti nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo buvo sukėlę astmos priepuolį, dilgėlinę arba ūminį nosies gleivinės uždegimą. Specialūs įspėjimai: gelis turi būti vartojamas tik ant nepažeistos odos. Jei pasireiškė alerginė reakcija, reikia nutraukti gydymą ir kreiptis į gydytoją. Kai EMOX ilgą laiką tepamas didelis odos plotas, gali pasireikšti sisteminis nepageidaujamas poveikis, todėl sergantiems inkstų arba kepenų veiklos nepakankamumu, reikėtų Šio vaisto dozavima riboti. EMOX gelio negalima vartoti po sandarinamuoju tvarsčiu. Gydymo metu ir 2 savaites po gydymo reikia vengti tiesioginių saulės spindulių, įskaitant soliariumo. Šis vaistas turėtų būti vartojamas atsargiai pacientams, sergantiems kepenų ir inkstų nepakankamumu, virškinamojo trakto išopėjimu ar linkusius kraujuoti. 2022.01.17

4,99 €

ACICLOVIR ACTAVIS 5 % kremas, 5 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
„Aciclovir Actavis" 5 % kremas. 1 g kremo yra 50 mg acikloviro. **Terapinės indikacijos. Lokalus odos ir lūpų pūslelinės gydymas.** Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiesiems „Aciclovir Actavis" 5 % kremo reikia tepti 5 kartus per parą, vidutiniškai kas 4 valandas; naktį daroma pertrauka. Gydoma 4 paras. Jei per šį laikotarpį nepasveikstama, gydymą reikia tęsti dar 6 paras. Jei pažeidimas neišnyksta ir po 10 parų, rekomenduojama kreiptis į gydytoją. „Aciclovir Actavis" 5 % kremo nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Vartoti ant odos. Kontraindikacijos: „Aciclovir Actavis" 5 % kremo negalima skirti pacientams, kurie yra jautrūs aciklovirui, valaciklovirui, propilenglikoliui ar bet kuriai „Aciclovir Actavis" 5 % kremo pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. „Aciclovir Actavis" 5 % kremu nerekomenduojama tepti gleivinės, pvz., burnos, akių ar lyties organų, nes galimas sudirginimas. Būtina laikytis atsargumo priemonių ir saugoti akis, kad į jas nepatektų kremo. Jeigu jūsų imunitetas labai susilpnėjęs, (t. y. jūsų organizmo gebėjimas kovoti su infekcija yra sumažėjęs); tokiu atveju dėl bet kokios infekcijos gydymo reikia kreiptis į gydytoją ir įvertinti gydymo geriamuoju acikloviru galimybę. Pagalbinės medžiagos cetostearilo alkoholis, natrio laurilsulfatas ir propilenglikolis gali sukelti vietinių odos reakcijų. Teksto peržiūros data 2020-02-08.

SKATINA ŽAIZDŲ GIJIMĄ

-20%

HELP4SKIN

HELP4SKIN WOUND HEALING gelis tūbelėje, 20 g ~~6,99~~ **5,59 €**
HELP4SKIN WOUND HEALING aerozolinis purškiklis, 75 g ~~11,99~~ **9,59 €**

MEDICINOS PRIEMONĖS
„Help4skin Wound Healing" yra hidrokoloidinis gelis be parabenų, skirtas lokaliai sausų ir šlapių žaizdų priežiūrai. „Help4skin Wound healing" – medicinos priemonė, kuri netiesiogiai skatina žaizdų gijimą, kontroliuodama žaizdos mikroaplinką. Skirtas gydyti ūminėms ar lėtinėms žaizdoms, tokioms kaip:
- žaizdos (įskaitant chirurgines);
- odos nubrozdinimai ir įtrūkimai;
- paviršiniai nudegimai (I ir IIa laipsnio);
- įpjovimai, įbrėžimai;
- atviros kojų opos;
- pragulos.

Gali būti naudojamas vyresniems nei 2 metų amžiaus vaikams.

NUO ALERGIJOS

4,99 €

CLARITINE 10 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas. Vienoje tabletėje yra 10 mg loratadino. **Indikacijos.** Alerginės slogos (pvz., šienligės) simptomų (čiaudulio, slogos, nosies ir akių niežulio bei peršėjimo) lengvinimas; lėtinės dilgėlinės sukelto odos niežulio, paraudimo ir pūkšlių mažinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 6 metų, kurie sveria daugiau nei 30 kg, gerti po 1 tabletę vieną kartą per parą su maistu ar be jo, užgeriant stikline vandens. Jaunesniems kaip 6 metų vaikams arba sveriantiems mažiau negu 30 kg, tabletių vartoti nerekomenduojama. **Kontraindikacijos.** Alergija veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei sergate kepenų liga, prieš pradedant vartoti vaistą pasitarkite su gydytoju. Nevartokite Claritine 2 dienas iki numatomų alerginių odos mėginių. Claritine tablečių negalima vartoti jaunesniems kaip 6 metų vaikams arba vaikams, kurie sveria mažiau nei 30 kg. Claritine saugumas ir veiksmingumas neištirti jaunesniems kaip 2 metų vaikams, duomenų nėra. Reklamos teksto parengimo data: 2020-12. LIT.MKT.12.2020.1806 Informacija sutrumpinta.

NUO ALERGIJOS

3,99 €

LORATADINE ACTAVIS 10 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Kiekvienoje tabletėje yra 10 mg loratadino. **Terapinės indikacijos.** Simptominis alerginio rinito ir lėtinės idiopatinės dilgėlinės gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusieji ir vyresni kaip 12 metų vaikai: 10 mg 1 kartą per parą. 2 iki 12 metų vaikai: sveriantiems daugiau kaip 30 kg -10 mg 1 kartą per parą. Tabletes galima vartoti nepriklausomai nuo valgymo laiko. Pacientams, sergantiems sunkiu kepenų funkcijos nepakankamumu, skiriama pradinė 10 mg dozė kas antrą dieną. **Kontraindikacijos.** Loratadino tablečių vartoti negalima, jeigu padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Loratadine Actavis, jeigu yra sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas (tokiems pacientams gydytojas gali skirti vartoti šio vaisto kas antrą dieną). Antihistamininiai vaistiniai preparatai gali susilpninti odos hiperergines reakcijas arba neleisti joms pasireikšti, todėl loratadino tablečių vartojimą reikėtų nutraukti mažiausiai prieš 48 valandas iki alerginių odos mėginių. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Reklamos peržiūros data 2022 m. balandis. OTC-LT-00036

RAUMENIMS IR SĄNARIAMS

-40%

AXANOVA

Priemonių „Axanova" pagrindas – eteriniai aliejai, kurie veikia raminamai, gali padėti malšinti maudimą ar skausmą. Atsižvelgiant į priemonės sudėtį, turi šildomąjį arba šaldomąjį poveikį, gali būti naudojamį esant sumušimams, patempimams, maudžiant sąnarius ar raumenis. Priemonių „Axanova" veiksmingumas įrodytas moksliniais tyrimais. Pagaminta Šveicarijoje.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

AUSŲ UŽDEGIMUI GYDYTI

4,49 €

OTIPAX® 40 mg/10 mg/1 g ausų lašai (tirpalas), 16 g

Fenazonas, lidokaino hidrochloridas

NERECEPTINIS VAISTAS
Sudėtis: veikliosios medžiagos yra fenazonas ir lidokaino hidrochloridas. 1 g ausų lašų yra 40 mg fenazono ir 10 mg lidokaino hidrochlorido. **Farmacinė forma:** ausų lašai (tirpalas). **Terapinės indikacijos:** ūminiam neperforuotam (kai ausies būgnelis nėra įtrūkęs) vidurinės ausies uždegimo gydymui; pūslinio virusinio ausies uždegimo gydymui; slėgio pokyčių metu atsiradusios traumos sukelto ausies uždegimo gydymui. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Paprastai lašinama po 4 lašus 2–3 kartus per dieną į išorinę ausies landą. **Kontraindikacijos:** jeigu yra ausies būgnelio įtrūkimas, atsiradęs dėl traumos ar infekcinių susirgimų; jeigu yra alergija fenazonui, lidokaino hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti OTIPAX. Prieš vartojant OTIPAX ausų lašus Jūsų gydytojas turi patikrinti, ar nėra pažeistas ausies būgnelis. Jei jis yra pažeistas, lašų į ausis vartoti negalima dėl galimo jų patekimo į vidurinę ausį ir galimos sąveikos su vidurinės ausies struktūromis. **Įspėjimas:** šio vaisto negalima nuryti ar įkvėpti. Saugokitės, kad vaisto nepatektų į akis ar ant gleivinių. Informacija sutrumpinta. **Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą:** Biocodex UAB, Savanorių pr. 345, LT-51480 Kaunas, tel. +370 37 408681, el. paštas info@biocodex.lt. 20220318_98070570 Reklamos teksto parengimo data: 2022-03-18
ABRAKADABRA, IR AUSŲ SKAUSMO KAIP NEBŪTA!

-35%

AMBIO KALCIS, MAGNIS, CINKAS 100 tablečių ~~12,98~~ 8,44 €
AMBIO CA+K+MG+ZN+D3 (milteliai geriamajam tirpalui ruošti), 30 paketėlių ~~11,49~~ 7,47 €

MAISTO PAPILDAI

- Kalcis reikalingas normaliai kaulų būklei palaikyti. Magnis ir cinkas padeda palaikyti normalią kaulų būklę.
- Kalcis ir magnis padeda palaikyti normalią raumenų veiklą.
- Cinkas padeda palaikyti normalią plaukų, odos ir nagų būklę, padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
- Vitaminas D padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą bei normalią kaulų būklę.

-30% 4,54€ ~~6,49~~

VITADAY MULTIVITAMINŲ KOMPLEKSAS 60 tablečių
MAISTO PAPILDAS

-30% 3,84€ ~~5,49~~

AMEDIPLUS
Šildantis arklių balzamas, 250 ml
Šaldantis arklių balzamas, 250 ml
KOSMETIKA

-50% 1,60 € ~~3,19~~

VITADAY VITAMINAI A IR E 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

-30%

BIOFARMACIJA LINIJA

MAISTO PAPILDAI
Unikalūs maisto papildai milteliais. Išsirinkite Jums reikalingiausią: nuovargiui mažinti, energijai, sportui, raumenims, nervų sistemai, kraujospūdžiui, imunitetui, stipriems nagams ir plaukams, kaulams. Magnis išgaunamas iš Negyvosios jūros. Mineralai yra citratų formos, dažniausiai gerai toleruojami ir organizmo lengvai pasisavinami. Sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, stabilizatorių ar saldiklių. Tinka veganams, nėščiosioms ir maitinančioms motinoms. Pagaminta Izraelyje.
GAMTOS ĮKVĖPTI MINERALAI MILTELIAIS IŠ IZRAELIO!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-25%

STOP STRESS® 30 kapsulių
STOP STRESS® NIGHT 30 kapsulių
OSTEONOL® 150 ml
FITESTEN® 30 kapsulių
KARDIO START® 30 kapsulių
IMMUNECO® 30 kapsulių
BEAUTYNOL® 30 kapsulių
BEAUTYNOL® EXCELLENCE 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAI
Pasimėgauk gyvenimo akimirkomis su BF-ESSE...
JŪSŲ GERAI SAVIJAUTAI!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-20%

VITABIOTICS WELL LINIJA

MAISTO PAPILDAI
WELLWOMAN – nakvišų, agurklių, vitaminų ir mineralų kompleksas moterims. WELLMAN – sibirinių ženšenių, amino rūgščių, vitaminų ir mineralų kompleksas vyrams. WELLTEEN – subalansuota paaugliams, o WELLKID – patiems mažiausiems.
GERA SAVIJAUTA VISAI ŠEIMAI!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-30% 2^{37}€ ~~3,39~~

VITAMIN D3 su lašintuvu, 10 ml
MAISTO PAPILDAS

-30%

PIPIRINIS PLEISTRAS 10 x 18 cm ~~0^{75}~~ 0^{53} €
SKAUSMĄ MALŠINANTIS PLEISTRAS 9 x 14 cm N10 ~~16^{90}~~ 11^{83} €

SKIEPAI NUO PNEUMOKOKO

SKIEPO KAINA **85^{00} €**

SU LOJALUMO KORTELE **77^{00} €**

Galima išankstinė registracija internetu
www.nvaistine.lt/skiepai

Nuolaida taikoma Norfos vaistinėje
su PC NORFA kortele.
NV laimės valandų nuolaidos netaikomos.

GAMINAME VAISTUS PAGAL INDIVIDUALIUS RECEPTUS

- Atneškite gydytojo receptą iki 13 val.
- Atsiimkite pagamintą vaistą kitą darbo dieną.

VAISTINĖ

VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS

NAUJIENOS

JAMIESON fermentai, 90 tablečių
Maisto papildas

- Virškinimo fermentai sudaro maisto medžiagų virškinimo ir įsisavinimo pagrindą. Virškinimo sistema gamina ir išskiria virškinimo fermentus, kad suskaidytų angliavandenius, riebalus ir baltymus.
- Sudėtyje yra augalinių fermentų: papaino, bromelaino, lipazės, amilazės, laktazės ir celiuliozės.

JAMIESON imbieras, 30 kapsulių
Maisto papildas

- Paprastieji imbierai padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią savijautą kelionės metu, normalią virškinimo sistemos funkciją.
- Produktas sertifikuotas testavimo sistema TRU-ID® DNA dėl sudedamųjų medžiagų autentiškumo.

JAMIESON MUSHROOM COMPLEX, 60 kapsulių
Maisto papildas

- „Jamieson“ grybų komplekso sudėtyje yra: grynųjų tikrinių blizgučių (Reishi), hericium erinaceus (Lion's Mane), įžulniųjų skylenių (Chaga), valgomųjų dantenių (Shiitake) vaisiakūnių miltelių bei valgomųjų česnakų ekstrakto.
- Valgomieji česnakai ir tikriniai blizgučiai padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
- Produktas sertifikuotas testavimo sistema TRU-ID® DNA dėl sudedamųjų medžiagų autentiškumo.

JAMIESON kolagenas su ciberžole, 30 tablečių
Maisto papildas

- Sudėtyje yra 600 mg hidrolizuoto kolageno ir 10 mg dažinių ciberžolių ekstrakto.

Pagaminta Kanadoje.

ŽARNYNO MIKROFLORAI

-20%

COMPLIFLORA

COMPLIFLORA FAMILY, 10 kapsulių ~~8,29~~ 6,63 €
COMPLIFLORA FAMILY+, 10 paketėlių ~~8,49~~ 6,79 €
COMPLIFLORA BABY DROPS, 5 ml ~~12,89~~ 10,31 €
COMPLIFLORA FEMINA, 10 kapsulių ~~9,39~~ 7,51 €
COMPLIFLORA IMMUNO, 30 kapsulių ~~12,79~~ 10,23 €

MAISTO PAPILDAI

„Compliflora Family" ir „Compliflora Family+" – formulė „keturi viename". Bakterijos, kolonizuojančios ir plonąjį ir storąjį žarnyną. Didelė KSV (kolonijas sudarančių vienetų) dozė. Ypatingas gamybos metodas: bakterijos atsparios skrandžio rūgštims, todėl gali saugiai pasiekti žarnyną ir ten kolonizuotis. Vartojimas: 1 kapsulė arba 1 paketėlis per dieną. „Compliflora Baby Drops" – formulė „du viename". Bifidobacterium lactis BS01 ir Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 5301 kompleksas aliejine forma. Augalinės kilmės medžiagos suteikia malonų skonį vartojant, be to, nereikia specialių laikymo sąlygų. Vartojimas: kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – 5 lašai per dieną. „Compliflora Femina" – formulė „keturi viename", ją sudaro 4 specialiai atrinktos Lactobacillus genties bakterijų atmainos, būdingos natūraliai, sveikai šlapimo ir lyties organų sistemos mikroflorai. „Compliflora Immuno" yra kompleksinis produktas, sukurtas siekiant palaikyti gerą imuninę organizmo būklę. 1 kapsulėje yra 4 mlrd. mikrokapsuliuotų pieno rūgšties bakterijų, cinko bei vitamino D. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Vartojimas: 1 kapsulė per dieną.

IMUNINEI SISTEMAI

-20%

SAMBUCUS

SAMBUCUS KIDS, sirupas, 120 ml ~~14,29~~ 11,43 €
SAMBUCUS KIDS, 60 guminukų ~~15,79~~ 12,63 €
SAMBUCUS KIDS, 5 ledinukai ~~4,69~~ 3,75 €
SAMBUCUS ADULTS IMMUNOMIX, 60 kapsulių ~~9,79~~ 7,83 €

MAISTO PAPILDAI, MAISTO PRODUKTAS

Juodaugiai šeivamedžiai, čiobreliai, šalavijai padeda palaikyti kvėpavimo sistemos funkciją. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. „Sambucus Adults ImmunoMix" yra produktas, vartojamas tais atvejais, kai jūsų imuninei sistemai reikia papildomos pagalbos. Jo sudėtyje esantis kompleksas „ImmunoMix" – tai kruopščiai atrinktas 6 maistingųjų medžiagų, gerai žinomų dėl savo savybių, derinys: juodaugiai šeivamedžiai, vitaminas D3, vitaminas C, rutozidas, selenas ir cinkas.

NUO KOSULIO

-20% 6,23 € ~~7,79~~



IVEX nuo sauso ir šlapio (produktyvaus) kosulio, 100 ml + 5 ml matavimo indelis

MEDICINOS PRIEMONĖ

Sudėtyje esantys natūralūs ekstraktai (gebenių (Hedera Helix) ekstraktas (DER 1–2:1), poliflorinis medus, vaistinių svilarožių (Althaea officinalis) ekstraktas (1 %), vaistinių čiobrelių (Thymus vulgaris) ekstraktas (0,3 %), kurių veiksmingumas įrodytas, suformuoja prie gleivinės prilimpančią plėvelę, kuri ramina kosulį, apsaugo nuo dirginimo bei pagerina viršutinių kvėpavimo takų funkciją. Tai ypač aktualu žiemą arba kai reikia gydyti išorinių veiksnių (Salčio, smogo, dulkių ir dūmų) sukeltą sudirginimą. Naudinga esant sausam ir šlapiam (produktyviam) kosuliui, ramina dirginimą, saugo gleivinę ir lengvina gleivių šalinimą. Tinka vaikams nuo 1 m. amžiaus.

GERKLEI

-20%

VOCAL

VOCAL juodųjų serbentų skonio, 24 pastilės ~~5,49~~ 4,39 €
VOCAL vyšnių skonio, 24 pastilės ~~5,49~~ 4,39 €
VOCAL pipirmėčių skonio, 24 pastilės ~~6,59~~ 5,27 €
VOCAL citrinų skonio, 24 pastilės ~~5,49~~ 4,39 €
VOCAL KIDS braškių skonio, 24 pastilės ~~5,49~~ 4,39 €

MAISTO PAPILDAI SU SALDIKLIAIS

Pastilių „Vocal" sudėtyje yra išlandinių kerpenų, vitamino C ir cinko. Išlandinės kerpenos padeda palaikyti kvėpavimo takų – gerklės, ryklės gleivinės bei balso stygų – funkcijas. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Cinkas atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese. Rekomenduojamas vartojimas: 1 pastilė 4 kartus per dieną. Vyresniems nei 4 m. žmonėms.

„VOCAL" – JŪSŲ GERKLEI, BALSUI IR IMUNITETUI!

VAIKAMS NUO PIRMŲJŲ GYVENIMO METŲ

-20% 8,52 € ~~10,65~~

HUSTAGIL balzamas, 30 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

„Hustagil" balzamas su čiobrelių, eukaliptų ir levandų eteriniais aliejais kvėpavimui palengvinti. Balzamas yra švelnios konsistencijos, lengvai paskirstomas ir įtrinamas į odą. „Hustagil" švelniai veikia jautrią odą dėl jame esančio migdolų aliejaus, pantenolio ir vitamino E. Naudojimas: balzamu kelis kartus švelniai įtrinkite krūtinę ir nugarą. Malonus eterinių aliejų kvapas atpalaiduoja kvėpavimą.

KVĖPAVIMUI PALENGVINTI!

NOSIES GLEIVINĖS APSAUGAI BEI GYDYMUI

-20% 8,63 € ~~10,79~~

RHINITIX nosies purškalas, nuo 1 metų amžiaus, 10 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Rhinitix" yra medicinos priemonė, turinti raminamąjį ir palaikomąjį poveikį gydant virusines ir bakterines nosies gleivinės infekcijas taip pat ir alerginį rinitą. Produkto sudėdamosios dalys padengia nosies gleivinę apsaugine plėvele, kuri neleidžia prikibti, įsiskverbti ir plisti bakterijoms ir virusams, pvz., rinovirusams ir koronavirusams. „Rhinitix" taip pat padeda atsikurti sudirgusiai gleivinei. Tiksotropinės savybės saugo, kad priemonė nenutekėtų nuo nosies gleivinės.

- Rekomenduojama naudoti pasireiškus pirmiesiems peršalimo ir į gripą panašiems simptomams;
- pagalbinė priemonė gydant alerginės, bakterinės ir virusinės kilmės rinitą;
- tinka kaip profilaktinė priemonė esant padidėjusiai nosies gleivinės infekcijos rizikai.

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis



-25%

BIODERMA

DERMATOLOGINĖS VEIDO ODOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

Prancūzijos dermatologijos laboratorija „Bioderma“ vadovaujasi požiūriu, kad odos priežiūros priemonės turi padėti atkurti natūralius biologinius procesus, šalindamos odos problemų kilmės priežastis bei simptomus. Priežiūros priemonės „Bioderma“ kuriamos tik iš gryniausių veikliųjų medžiagų, atliekančių svarbų vaidmenį odos veikloje. Dermatologai, pediatrai, vaistininkai – visi šie specialistai rekomenduoja „Bioderma“ net ir jautriausią odą turintiems pacientams.

BIOLOGIJOS MOKSLAS DERMATOLOGIJAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-25%

URIAGE

DERMATOLOGINĖ KOSMETIKA

„Uriage“ dermatologinės kosmetikos pagrindas – terminis vanduo iš Prancūzijos Alpių, prisotintas mineralų ir mikroelementų. Ilgus metus kurta „Uriage“ kosmetika yra pagrįsta moksliniais tyrimais, skirta naudoti kasdien ir esant odos problemų.

KIEKVIENO POREIKIAMS. VISAI ŠEIMAI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-20%

PHARMACERIS

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Prekių ženklas „Pharmaceris“ – tai saugi, specializuota, dermatologinė kosmetika, kuri suteikia galimybę rūpintis oda su dažniausiai pasitaikančiomis problemomis. Dermatologinės kosmetikos produktai yra susisteminti į 13 linijų, jie sudaro visapusiškas odos priežiūros programas, kurios išsiskiria įrodytu dideliu efektyvumu ir saugumu.

PHARMACERIS. SVEIKOS ODOS EKSPERTAI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-25%

LA ROCHE-POSAY VALIKLIAI

Profesionalus odos ir makiažo valymas, tinkamas jautriai odai. Valomosios priemonės, kurių skirtingos formulės bei formos.

GERESNIS GYVENIMAS JAUTRIAI ODAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

IKI -30%

INSIGHT

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

INSIGHT produktuose naudojamos pagrindinės veikliosios sudedamosios medžiagos yra atkeliavusios iš ekologiškų sertifikuotų ūkių. Šie ekstraktai veikia kartu su natūralios kilmės aliejų ir sviestų kompleksais, kurie ypač lygina ir maitina plaukus. Pasirinkdami ekologiškas medžiagas, pasirenkate saugoti savo gerą savijautą, saugoti darbininkų, kurie dalyvauja gamyboje, sveikatą ir saugoti mūsų planetą.

INSIGHT ekologiško tvarumo projektas apima ne tik produktų sudėtis, bet ir pakuotes – visiems **INSIGHT** linijos buteliukams ir indeliams pasirinkome naudoti tik jau panaudotą, 100 % perdirbtą PET.

GAMTA – MŪSŲ ĮKVĖPIMO ŠALTINIS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

IKI -30%

NOREVA

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Prancūzų dermatologų sukurta kosmetika Jums padės susigrąžinti sveiką odą – greitai ir ilgam.

Gydytojų dermatologų palankiai vertinamos priemonės tinka naudoti probleminei odai: esant sausai, raustančiai, seborėjinio dermatito ar žvynelinės pažeistai odai; nuramina jautrią ir atopišką odą. Inovatyvios sudėties priemonės padeda apsisaugoti nuo raukšlių, pigmentinių dėmių atsiradimo ir išlaikyti sveiką odą.

JŪSŲ ŠVYTINTI IR SVEIKA ODA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-25%

VICHY DERCOS

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

VICHY DERCOS tai tiksliné plaukų priežiūros linija, kuri apima visas plaukų problemas- pleiskanas, plaukų slinkimą bei pažeistus plaukus. Tyrimai atlikti su jautrią galvos odą turinčiais žmonėmis. Priemonės papildytos aktyviaisiais ingredientais. Dercos šampūnai ir kondicionieriai užtikrina efektyvią priežiūrą plaukams ir galvos odai.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-25%

VICHY DEZODORANTAI

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

VICHY dezodorantų linijos produktai padeda išlaikyti gaivumą visa dieną. Tinka įvairaus amžiaus moterims ir vyrams, užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo prakaitavimo ir blogo kvapo.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

ODAI, PLAUKAMS IR NAGAMS

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**

BIOCELL SILICIUM BOOSTER 300 ml 26,79 €

MAISTO PAPILDAS

Naujos kartos biologiškai aktyvus silicis, būtent stabilizuotos ortosilicio rūgšties forma, yra ypač gerai ir greitai pasisavinamas organizme. Leisk sau tai pajusti.

Silicis dažnai vadinamas „jaunystės“ eliksyru. Papildytas dilgėlių lapų ekstraktu, kuriame gausu bioaktyvių medžiagų (fitosterolių, flavonoidų, rūgščių, mineralų ir vitaminų), padeda palaikyti normalią odos, nagų ir plaukų būklę.

TOBULA ESI TU. BIOCELL TAI IŠSAUGO.

-40% 2,99 € ~~4,95~~

VITADAY VITAMINAI GROŽIUI 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

-30%

ETERINIAI ALIEJAI skirti išoriniam naudojimui

ARBATMEDŽIO ALIEJUS, 10 ml, 30 ml

Tinka inhaliacijoms, masažams, kompresams bei vonelėms.

EUKALIPTŲ ALIEJUS, 10 ml, 30 ml

Gali būti naudojamas inhaliacijoms, vonioms ir masažams, pirtyse.

KĖNIŲ ALIEJUS, 10 ml, 30 ml

Rekomenduojama naudoti pirtyse ir voniose – aromatizuoti juo patalpas.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-30%

ARBATOS FITO FIGURA

FITO FIGURA 1, 3 g, 20 pakelių
FITO FIGURA 2, 3 g, 20 pakelių
FITO FIGURA 3, 2 g, 20 pakelių

LENGVUMO POJŪTIS IR GERA SAVIJAUTA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

-40% 8,99 € ~~14,99~~

AMBIO MULTIVITAMINAI MOTERIMS PLIUS 60 tablečių
AMBIO MULTIVITAMINAI VYRAMS PLIUS 60 tablečių
MAISTO PAPILDAI

-35% 8,44 € ~~12,98~~

AMBIO MENOPAUSE COMPLEX 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS
Raudonųjų dobilų ekstraktas, magnis, B grupės vitaminai. Maisto papildo sudėtyje harmoningai suderintas B grupės vitaminų ir magnio kompleksas kartu su raudonųjų dobilų izoflavonais.

-30%

EMILI ŽOLELIŲ ARBATOS ŠLAPIMO TAKAMS IR PROSTATAI
GERAI JŪSŲ SAVIJAUTAI
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

8,99 €

CANIFUG CREMOLUM 200 mg, 3 ovulės
Klotrimazolas
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje ovulėje yra 200 mg klotrimazolo. **Indikacijos:** mieliagrybių (dažniausiai Candida albicans) sukelto makšties uždegimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** 1 „Canifug Cremolum" ovulę (tai atitinka 200 mg klotrimazolo) įkišti kuo giliau į makštį vieną kartą per parą, vakare. Dažniausiai pakanka 3 dienų gydymo šiuo vaistiniu preparatu kurso. Prireiktus galima paskirti antrą 3 dienų trukmės gydymo kursą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Canifug Cremolum" medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** specialių atsargumo priemonių reikia nėštumo ir žindymo laikotarpiu; jeigu vartojami dezodorantai arba intymiosios higienos priemonės; jeigu kartu yra lytinių lūpų ir gretimos srities odos infekcinė liga: šiais atvejais reikia papildomai skirti lokalų gydymą tinkamais vaistiniais preparatais; jeigu atsiranda tokių požymių – paraudimas, dilgčiojimas, nieželjimas, makšties išskyros, makšties uždegimas su skausmu: šie požymiai taip pat gali būti dėl to, kad ligos sukėlėjas nejautrus „Canifug Cremolum"; jeigu tuo pačiu metu vartojamas „Canifug Cremolum" su latekso produktais (pvz., prezervatyvais, diafragmomis), dėl preparato sudėtyje esančių pagalbinių medžiagų (ypač stearatų) šių produktų veiksmingumas gali sumažėti ir jie tampa mažiau patikimi. Vaistinio preparato sudėtyje yra cetostearilo alkoholio. (cetostearilo alkoholis gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą). Geriausia gydytis ne mėnesinių metu ir (arba) gydymą baigti prieš mėnesinių pradžią. Gydyti mėnesinių metu galima tik esant sunkiems klinikiniams simptomams. Nėštumo metu gydymą gali skirti tik gydytojas. Jeigu kartu yra lytinių lūpų ir gretimų sričių infekcija ir (arba) partneriui medicininiškai diagnozuotas varpos galvutės ir apyvarpės uždegimas, partneriui reikia papildomai vartoti lokaliam gydymui tinkamas vaistinio preparato formas. Siekiant išvengti galimos pakartotinės infekcijos, tuo pat metu reikia mediciniškai tirti ir partnerį. Ligai pasireiškus pirmą kartą arba jeigu liga pasireiškė dažniau nei 4 kartus per paskutinius 12 mėnesių vaistinio preparato galima vartoti tik gydytojui nurodžius ir jam prižiūrint. **Reklamos teksto parengimo data** 2021-12-16

MENOPAUZĖS SIMPTOMAMS LENGVINTI

8,98 €

CLIMOFEMIN 6,5 mg, 30 tablečių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje tabletėje yra 6,5 mg *Cimicifuga racemosa* (L.) Nutt., rhizoma (blakėžudžių šakniastiebių) sausojo ekstrakto (4,5–8,5:1), atitinkančio 29–55 mg blakėžudžių šakniastiebių. **Indikacijos:** menopauzės simptomų, tokių kaip karščio pylimas ar gausus prakaitavimas, lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** per parą reikia gerti vieną tabletę. Tabletę galima nuryti arba sukramtyti, jų negalima čiulpti. „Climofemin" be gydytojo leidimo negalima vartoti ilgiau kaip 6 mėnesius. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Climofemin" medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pacientės, kurioms yra buvę kepenų sutrikimų, „Climofemin" turėtų vartoti atsargiai. „Climofemin" vartojimą reikia nedelsiant nutraukti ir kreiptis į gydytoją, jei atsiranda galimų kepenų pažeidimo požymių ar simptomų (pvz., nuovargis, apetito netekimas, odos ir akių pageltimas arba stiprus viršutinės pilvo dalies skausmas, lydimas pykinimo ir vėmimo arba šlapimo patamsėjimo). Jeigu atsiranda kraujavimas iš makšties arba kitokių neaiškių arba naujų simptomų, reikia kreiptis į gydytoją. „Climofemin" be gydytojo leidimo negalima vartoti su su vaistais, kurių sudėtyje yra estrogenų. Pacientėms, kurios buvo arba yra gydomos dėl krūties vėžio arba bet kokio kitokio nuo hormonų priklausomo naviko, „Climofemin" be gydytojo leidimo vartoti negalima. „Climofemin" sudėtyje yra laktozės monohidrato. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Jeigu vartojant vaistą simptomai pasunkėja, reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Reklamos teksto parengimo data: 2021-10-19

PRIEŠMENSTRUACINIO SINDROMO NEGALAVIMAMS LENGVINTI

NUO 6,47 €

PREFEMIN
20 mg, 30 plėvele dengtų tablečių **6,47 €**
20 mg, 90 plėvele dengtų tablečių **14,68 €**
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg Vitex agnus-castus L., fructus (tikrųjų skaistminių vaisių) sausojo ekstrakto (6–12:1), atitinkančio 120–240 mg tikrųjų skaistminių vaisių. Indikacijos: priešmenstruacinio sindromo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti po 1 tabletę per parą. Geri kasdien tuo pačiu laiku, užsigeriant nedideliu kiekiu vandens. Rekomenduojama gydymo trukmė yra ne mažiau kaip 3 mėnesiai. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Prefemin" medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: jei sergate arba sirgote nuo estrogenų priklausomais navikais, prieš vartodami „Prefemin" turite pasitarti su gydytoju. Jei vartojate dopamino receptorių agonistus ir antagonistus, estrogenus ir antiestrogenus, prieš vartodami „Prefemin" turite pasitarti su gydytoju. Jaunesnioms nei 18 metų mergaitėms ir paauglėms vaisto vartoti nerekomenduojama, kadangi duomenų apie vaisto vartojimą šios grupės pacientams nepakanka. Jei vartojant „Prefemin" simptomai pasunkėjo, reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Manoma, kad tikrųjų skaistminių vaisių ekstraktas turi įtakos pogumburio - hipofizės veiklai, todėl pacientės, kurioms nustatyti hipofizės sutrikimai, prieš vaisto vartojimą turi pasitarti su gydytoju. Sergant prolaktiną išskiriančiais hipofizės navikais, tikrųjų skaistminių vaisių ekstrakto vartojimas gali maskuoti naviko sukeltus simptomus. Todėl „Prefemin" nerekomenduojama vartoti. „Prefemin" sudėtyje yra laktozės monohidrato. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Reklamos teksto parengimo data: 2021-10-19

-30%

FITOLIZIN
valgomoji pasta 100 g ~~6,49~~ 4,54 €
MAISTO PAPILDAS
Vartojimas: 1 arbatinį šaukštelį valgomosios pastos ištirpinti ½ stiklinės šilto, pasaldinto vandens. Gerti 3-4 kartus per dieną po valgio.

URAGIN 30 tablečių ~~6,39~~ 4,47 €
MAISTO PAPILDAI
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

NATŪRALUS BAKTERINĖS VAGINOZĖS SIMPTOMŲ GYDYMAS

12,99 €

CANESBALANCE makšties ovulės, 7 vnt.
MEDICINOS PRIEMONĖ
Canesbalance veiksmingai sumažina dėl bakterinės vaginozės atsiradusį nemalonų kvapą, nejprastas išskyras ir nemalonius pojūčius intymioje zonoje. Natūralios gydomosios medžiagos (pieno rūgštis ir glikogenas) atstato normalią šarmų ir rūgščių pusiausvyrą (pH) ir makšties mikroflorą. Canesbalance tinka ir nėščiosioms. Be konservantų. Be hormonų. Be kvapiųjų medžiagų. Reklamos teksto parengimo data: 2022.02 CH-20220210-84

PRIEMONĖS SLAUGAI

IKI -20%

SENI

SENI sauskelnės ir sauskelnės kelnaitės – orui laidžios, su kvapo kontrolės sistema.
SENI apsauginiai paklotai – tai papildoma apsauga, kuri išsaugo švarią patalynę.
SENI kosmetika odos priežiūrai – nuvalo, naikina kvapus, maitina ir apsaugo odą nuo dirginklių.
*Sauskelnėms negalioja nuolaida su kompensuojamų vaistų pasu.
PROFESIONALŪS UROLOGINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAI
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

MOTERS INTYMIAI HIGIENAI IR SVEIKATAI

-20%

LOTAMILE

KOSMETIKOS PRIEMONĖS, MEDICINOS PREKĖS
„Lotamile“ – ovulės netepa, neišbėga, ilgiau veikia! Makšties ovulių sudėtyje yra polikarbofilo. Jis ilgiau išlaiko veikliąsias medžiagas makštyje ir taip pailgina ovulės veikimą.
„Lotamile Hialuronic“ makšties ovulės su hialurono rūgštimi naudojamos esant makšties sausumui, atrofiniam vaginitui. Ovulės mažina niežulį, skausmą lytinių santykių metu, drėkina, sutepa makštį, neleidžia išsausėti, saugo jos ekosistemą.
„Lotamile Boric“ makšties ovulės su boro rūgštimi naudojamos norint išvengti ar gydant makšties infekcijas. Ovulės mažina sudirgimą, deginimo ir niežėjimo pojūtį.
„Lotamile Girls“ švelnus intymios higienos prausiklis yra specialiai sukurtas mergaitėms nuo 1 metų. Prausiklis patikrintas dermatologų, nedirgina gleivinės, švelnina bei ramina sudirgusią odelę, turi drėkinamąjį poveikį, užtikrina natūralią apsauginę gleivinės funkciją, palaiko tinkamą mergaičių intymių sričių terpę. Puikiai pakeičia muilą, dušo gelius, kurie gali būti per stiprūs ir dirginantys.
„Lotamile Soft“ intymios higienos prausiklis moterims idealiai tinka naudoti kasdien, suteikia gaivumo, švaros pojūtį. Prausiklis nedirgina gleivinės, švelnina bei ramina sudirgusią odą, turi drėkinamąjį, šlapimo kvapą naikinantį poveikį, užtikrina natūralią apsauginę gleivinės funkciją, palaiko intymių sričių rūgštinę terpę, kurios pH 4. Ypač rekomenduojamas ginekologinio gydymo metu, menstruacijų, nėštumo metu, po gimdymo.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-20%

BELLA

BELLA moterų higienos linija – orui laidūs kasdieniai įklotai, higieniniai paketai ir vatos gaminiai.
Higienos priemonės - plonos ir diskretiškos, su kvapo kontrolės sistema. BELLA BIO BASED – ekologiškos, su natūralaus bambuko paviršiumi. Vatos gaminiai – iš 100% medvilnės.
UŽTIKRINTA APSAUGA!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-25%

JORDAN

Visi esame skirtingi. Turime unikalius dantis, naudojame unikalią jų valymo techniką, renkamės dantų šepetėlius pagal savo individualius poreikius. „Jordan“ burnos higienos priemonės sukurtos siekiant užtikrinti maksimalų dantų priežiūros rezultatą. Platus asortimentas apima dantų šepetėlius, tarpdančių siūlus bei šepetėlius, dantų pastą suaugusiems ir vaikams.
JORDAN RŪPINASI ŠYPSENOMIS NUO 1927-ŲJŲ!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

IKI -25%

COREGA

Reguliariai naudojant valomąsias tabletes „Corega“, dantų protezai visada bus švarūs. Tinka pilniems ir daliniams dantų protezams.
- Sunaikina 99,9 % blogą kvapą sukeliančių bakterijų.
- Padeda pašalinti apnašas ir giliai įsigėrusias dėmes.
- Suteikia dantų protezams gaivų mėtų kvapą.
- Veikia per 3 minutes.

Fiksuojamieji kremai „Corega“ patikimai veikia iki 12 valandų ir neleidžia maisto likučiams įstrigti po protezais. CHLT/CHPLD/0009/16; 2018/10
VALGYK, JUOKIS IR GYVENK!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-25%

TEPE

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS
Produkcija „TePe“ pagaminta bendradarbiaujant su Švedijos ir tarptautiniais odontologijos specialistais. Visi tarpdančių šepetėliai turi unikalius laikiklius, specialiai parinktus šerelius ir plastiku padengtą vielutę, todėl tarpdančių valymas labai veiksmingas. Dantų šepetėliai „TePe“ patikimi ir kokybiški.
„TEPE“ RŪPINASI SVEIKA ŠYPSENA!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

PIRKDAMI **NORFOS VAISTINĖJE**
JŪS GAUSITE ČEKĮ, KURIUO GALĖSITE APMOKĖTI
NET **IKI 30 %** SUMOS UŽ ŠĮ PRODUKTĄ:

-30%

AUSTRALIAN BODYCARE

šampūnas, 250 ml ~~13,99~~ 9,79 €

KOSMETIKOS PRIEMONĖ
„Australian Bodycare“ šampūnas veiksmingai valo galvos odą ir plaukus, saugo nuo pleiskanų susidarymo, plaukų riebalavimosi.
Sudėtyje yra natūralaus Australijos arbatmedžių aliejaus (Melaleuca alternifolia).

VAISTINĖ

VAIKŲ MAISTO PAPILDAMS IR PRIEŽIŪROS PRIEMONĖMS

IKI -30%

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**

AMBIO VITAMINAS C VAIKAMS
50 guminukų **9,78 €**
AMBIO KALCIS VAIKAMS
36 guminukai **9,98 €**
AMBIO MULTIVITAMINAI VAIKAMS
50 guminukų **9,98 €**
MAISTO PAPILDAI

-30% **1,81 €** ~~2,59~~

VITADAY FOLIO RŪGŠTIS
400 µg, 90 tablečių
MAISTO PAPILDAS

-30%

LIVOL VAIKAMS
MAISTO PAPILDAI
„Livol" rūpinasi, kad sparčiai augantys, maistui labai išranktūs ar nevalgūs vaikai papildytų kasdienę mitybą kokybiškais vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis. „Livol" sudėtis sukurta atsižvelgiant į vaikų amžiaus grupės poreikius ir rekomenduojamas vitaminų bei mineralų paros normas.
„LIVOL" ŽAISMINGI, IMUNITETUI NAUDINGI!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

NUO 3,99 €

IBUSTAR 20 mg/ml geriamoji suspensija vaikams, 100 ml **3,99 €**
IBUSTAR 40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams, 100 ml **5,99 €**
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Viename geriamosios suspensijos ml yra 20 mg ibuprofeno. Viename geriamosios suspensijos ml yra 40 mg ibuprofeno. Indikacijos: Ibustar yra uždegimą slopinantis ir skausmą malšinantis vaistinis preparatas (nesteroidinis vaistas nuo uždegimo, NVNU), pasižymintis karščiavimą mažinančiomis savybėmis (antipiretikas). Ibustar vartojamas trumpalaikiam simptominiam gydymui: karščiavimo mažinimui; silpno ar vidutinio stiprumo skausmo malšinimui. Ibustar 20mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams, sveriantiems nuo 5 kg iki 29 kg (kurių amžius nuo 6 mėnesių iki 9 metų). Ibustar 40 mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams sveriantiems 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), paaugliams ir suaugusiesiems. Vartojimo būdas. Tinka vartoti tik per burną ir trumpai. Jeigu šio vaistinio preparato vaikams ir paaugliams reikia vartoti ilgiau kaip 3 dienas, arba jeigu ligos požymiai blogėja, reikia pasitarti su gydytoju. Prieš vartojimą buteliuką reikia stipriai supurtyti. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu praeityje buvo alerginių reakcijų vartojant acetilsalicilo rūgšti ar NVNU, pvz., bronchų spazmas, astma, nosies gleivinės paburkimas; jeigu buvo odos reakcijų (pvz.: paraudimas, paburkimas, dilgėlinė ar kiti panašūs reiškiniai); jeigu yra neaiškių kraujodaros sutrikimų; jeigu yra ar buvo praeityje skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa (pepsinė opa) arba kraujavimas (du ar daugiau atskirų įrodytų išopėjimo ar kraujavimo epizodų); jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; jeigu yra kraujavimas į smegenis arba kitoks kraujavimas; jeigu yra sunkus inkstų arba kepenų funkcijos nepakankamumas; jeigu nustatytas sunkus širdies nepakankamumas; netekus daug skysčių (dėl vėmimo, viduriavimo ar dėl nepakankamo skysčių vartojimo); jeigu yra paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Ibustar. Šalutinis poveikis gali sumažėti vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką būtiną simptomų kontrolei. Ibustar reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant COX-2 (cikloksigenazės-2 selektyviuosius) inhibitorius. Jeigu Jūsų vaikui atsiranda skrandžio kraujavimas ar išopėjimas, nutraukite Ibustar vartojimą. Nedelsiant informuokite gydytoją, jeigu atsiranda bet koks nejprastas simptomas pilve. Paste- bėjus pirmųjų odos išbėrimo, gleivinės pažeidimo ar kitų padidėjusio jautrumo reakcijos požymių, Ibustar vartojimą reikia nutraukti. Sergant vėjaraupiais reikia vengti vartoti Ibustar. LT-Ibu-11-2020-VI pharma Reklama paruošta 2020 m. Gruodžio mėn.
GREIT IR VĖL KARALIUS!

-30%

FOLICUM ACIDUM
Folio rūgštis, 400 µg, 30 tablečių ~~2,59~~ **1,81 €**
Folio rūgštis, 400 µg, 270 tablečių ~~8,99~~ **6,29 €**
MAISTO PAPILDAI
Folio rūgštis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. **Vartojimas:** po 1 tabletę per parą.

-20%

HAPPY
Visos HAPPY sauskelnės yra orui laidžios, su natūralios kilmės žaliosios arbatos ekstraktu (lot. *Camelia sinensis*), kuris veikia antibakteriškai ir neutralizuoja nemalonius kvapus.
Mažiausiu dydžių sauskelnės turi specialų iškirpimą bambutei ir yra putlesnės – teisingai kūdikio kojyčių padėčiai išlaikyti. Didesnių dydžių – plonesnės, su elastine juosmens dalimi ir paaukštintais apsauginiais krašteliais.
Drėgnos servetėlės – be alkoholio ir parabenų, su skirtingais ekstraktais – išsirink pagal poreikį. Ir nepamirškite vatos pagaliukų su apsauga!
* Sauskelnėms negalioja nuolaida su kompensuojamų vaistų pasu.
HAPPY – SU MEILE JŪSŲ MAŽYLIUI!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-30%

EMILI FITO ARBATOS MAŽYLIUI IR MAMAI
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-30%

CERUTIN JUNIOR DINO GUMINUKAI 50 guminukų ~~8,99~~ **5,66 €**
VAISIŲ SKONIO MAISTO PAPILDAS
Sudėtyje yra cukrų
10 vitaminų, cinko ir rutino šaltinis.

DOCTOR FISH OMEGA-3 + VITAMINS D & E 30 kapsulių ~~11,99~~ **8,39 €**
MAISTO PAPILDAS
Su saldikliu
Maisto papildo sudėtyje yra omega-3 riebalų rūgščių (EPR ir DHR) ir vitaminų D ir E:
EPR (eikozapentaeno rūgštis) ir DHR (dokozaheksaeno rūgštis) padeda palaikyti normalią širdies veiklą;
DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją, išsaugoti normalų regėjimą;
vitaminas D padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų, raumenų, dantų būklę;
vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.

Jamieson
NATURAL SOURCES
Since 1922

JAMIESON turi ilgametę patirtį - savo produkciją eksportuoja po visą pasaulį jau nuo 1922 metų. JAMIESON naudoja išskirtinę „360 Pure“ technologiją, kuri apima net 360 gamybos proceso kontrolės etapų.

IKI -50%

„JAMIESON“ MAISTO PAPILDAMS

Pagaminta klevų šalyje