

TOP SAUSIO PASIŪLYMAI



-50% **4⁴⁹ €**
~~8⁹⁸~~

AMBIO KEPENIMS SU MARGAINIU FORTE, 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS



-50%

AMBIO SINUREN COMPLEX (mikstūra), 120ml, **5⁹⁸ 2⁹⁹ €**
AMBIO SINUREN COMPLEX, 60 tablečių, **8⁹⁸ 4⁴⁹ €**
MAISTO PAPILDAS



4⁹⁹ €

MEZYM 20000V, 20 skrandyje neirių tablečių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS



-50% **6^{00€}**
~~11⁹⁹~~

STARAZOLIN COMPLETE, 10 ml
MEDICINOS PRIEMONĖ



Indikacijos: MEZYM vartojamas tuomet, kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentų ir tai sukelia virškinimo sutrikimų. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas (alergija) pankreatinui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Ūminis arba paūmėjęs lėtinis kasos uždegimas, kol ligos požymiai yra stipriai išreikšti. Specialūs spėjimai ir atsargumo priemonės: Cistinė fibrozė kartais gali komplikuotis žarnyno nepraeinamumu. Esant simptomams, panašiams į žarnyno nepraeinamumo požymius, reikia įvertinti žarnyno susiaurėjimo susidarymo galimybę. MEZYM sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas yra sėkmingas, kad netoleruotumėte kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Dozavimas: MEZYM visada vartokite likusiai laisvai, kaip nurodė gydytojas. MEZYM dozės priklauso nuo virškinimo sutrikimų laipsnio, optimali dozė nustatoma individualiai. Jeigu kitaip nenurodyta, vartojant šeriamas 1-2 pėvelės dengtos MEZYM 20000V tabletes. Dienos dozė 15000-20000 lipazės vienetų kilogramui kūno svorio neturėtų būti viršijama. Dozės vaikams turi būti paskirti gydytojas. Priėmusimai nuo maisto ar virškinimo sutrikimo sunkumo, rekomenduojama dozė gali būti padidinta. Pėvelės dengtos tabletes nuryjamos nekrantant ir užgeriant dideliu skysčiu kiekiu. Ilgalakio gydymo atveju vartojimo trukmę nustato gydytojas. Vartojimo trukmė vaikams taip pat nustato gydytojas.

Reklama paruošta 2021 m. lapkričio mėn. LT-Mez-05-2021-VI-pharma

MEZYM – PADEDA PAGERINTI SUTRIKUSĮ VIRŠKINIMĄ*

* kai kasa išskiria nepakankamai virškinimo fermentų

„Starazolin Complete“ yra sterilūs akių lašai, kurių sudėtyje yra natrio hialuronato ir deksantenolio. Dekspantenolis žymiai sustiprina natrio hialuronato savybę išsaugoti drėgmę. Šių medžiagų derinys drėkina, atgaivina, palaiko regeneraciją, apsaugo ir maitina akies paviršių, esant: mechaniniam akies dirginimui, pvz., oftalmologinės apžiūros metu ir naudojant kontaktinius lęšius; žalingiems aplinkos veiksniams – oro kondicionierius, šaltam, karštam, sausam orui; oro užterštumui tabako dūmais, taip pat būnant dulkėtose ar saulėtose vietose; stipriam nuovargiui, pvz., atsidariusiam dėl darbo su kompiuteriu, mikroskopių, ilgo vairavimo. „Starazolin Complete“ yra be konservantų, o buteliuke yra speciali vožtuvų sistema ir filtras, apsaugantis preparatą nuo mikroorganizmų taršos, todėl po pirmojo atidarymo medicinos priemonė galima naudoti 90 parų. „Starazolin Complete“ gali naudoti žmonės, naudojantys visų tipų kontaktinius lęšius. Įprastinė dozė yra 1-2 lašai 3 kartus per parą į kiekvienos akies jungtinę maišėlį.

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

8⁹⁵ €

GASTROVAL HEPAR FORMULA

30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS



Gastroval Hepar Formula – geresnis pasisavinimo augalinė formulė – rimbetinė kepenų apsauga nuo oksidacinės pažeidimo, kepenų ląstelių regeneracija, organizmo valymo funkcija, normalaus cholesterolio lygio palaikymas.
GASTROVAL – SUPRANTA, KO REIKIA.



-50% **3^{20€}**
~~6⁴⁰~~

DETRICAL 2000 IU, 60 pėvelės dengtų tablečių
MAISTO PAPILDAS

Didelė vitamino D dozė tableteje imuniteitui, kaulams ir dantims. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų bei raumenų funkciją ir dantų būklę. 1 tabletė per dieną. Užgerti stikline vandens.



IKI -35%



MÖLLER'S

MAISTO PAPILAI

Skysti žuvų taukai – tai šimtmečiais puoselėjama klasikinė žuvų taukų forma. „Möller's“ žuvų taukų kapsulės išsiskiria kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyviu medžiagų deriniu.

TRADICINIS BŪDAS RŪPINTIS IMUNITETU.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

NUO SKAUSMO

5⁹⁹ €

PERSEN

PERSEN, 40 dengtų tablečių.

PERSEN FORTE, 20 kietųjų kapsulių.

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas. PERSEN tablečių yra 35 mg valerijonų šaknų sausosio alkoholinio ekstrakto, 17,5 mg melisų lapų sausosio ekstrakto, 17,5 mg pipirmėčių lapų sausosio ekstrakto. PERSEN FORTE kapsulėje yra 87,5 mg valerijonų šaknų sausosio alkoholinio ekstrakto, 17,5 mg melisų lapų sausosio ekstrakto, 17,5 mg pipirmėčių lapų sausosio ekstrakto. **Indikacijos.** Vartoti laikinos nedidelės nervinės įtampos mažinimui, pasunkėjusio užmigimo lengvinimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** PERSEN: Nervinės įtampos atleidimo vietai gerti po 3-4 PERSEN tab. 3 kartus per parą, pasunkėjusio užmigimo atvejais gerti 3-4 PERSEN tab. 1 kartą per parą 1 val. prieš miegą. Tabletes reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai nuo valgymo laiko. PERSEN FORTE: Nervinės įtampos mažinimui reikia gerti po 2 PERSEN FORTE kaps. 2 kartus per parą, pasunkėjusio užmigimo atvejais reikia gerti 2 PERSEN FORTE kaps. 1 kartą per parą 1 val. prieš miegą. Kapsules reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai nuo valgymo laiko. PERSEN ir PERSEN FORTE pradedama vartoti palaipsniui, kad gydymo veiksmingumas būtų optimalus, vaisto rekomenduojama gerti mažiausiai 14 dienų. Gydymo trukmė neribojama. PERSEN ir PERSEN FORTE nėra skirtas jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** PERSEN tablečių sudėtyje yra laktozės ir sacharozės. PERSEN FORTE kapsulių sudėtyje yra laktozės. Reklamos tekstas parengtas data: 2022 m. gruodžio mėn. ID000557059

PERSEN – NURAMINK SAVO RŪPESKUI!

NUO SKAUSMO IR UŽDEGIMO

NUO 6⁹⁹ €

ODIFLAN

ODIFLAN 20 mg/g gelis, 50 g 6⁹⁹ €
ODIFLAN 20 mg/g gelis, 100 g 9⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI.

1 g gelio yra 23,2 mg diklofenako dietilamino, atitinkancio 20 mg diklofenako natrio druskos. **Terapinės indikacijos:** suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams skirtas lokaliu simptominiu skausmui malšinti, esant ūminiams įtempimams ar sumušimams po buko traumos. 14 m. bei vyresniems paaugliams vaistinis preparatas skirtas gydyti trumpą laiką. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** „Odiflan“ reikia vartoti ant odos 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Atsivėlijant į gydymosi pažeistos vietos dydį, reikia nuo vyšnios iki graikiško riešuto dydžio gelio kiekio, atitinkancio 1-4 g gelio, kuris atitinka 20-80 mg diklofenako natrio druskos. Didžiausia paros dozė yra 8 g gelio, kuris atitinka 160 mg diklofenako natrio druskos. Vartojimo trukmė priklauso nuo simptomų bei pagrindinės ligos. Be gydymojo patarimo „Odiflan“ negalima vartoti ilgiau kaip 1 savaitę. Jeigu per 3-5 dienas simptomai nepalengvėja arba net pasunkėja, būtina gydytojo konsultacija. **Kontraindikacijos:** „Odiflan“ vartoti negalima: jeigu yra alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu Jums kada nors anksčiau pavartojus acetilsalicilo rūgšties arba kitų NVNU (pvz., ibuprofeno) buvo sutrikęs kvėpavimas (astma, bronchų spazmas), pasireiškė dilgėlinė, sloga, veido arba liežuvio patinimas; esant odos arba gleivinių atviroms žaizdoms, uždegimui arba infekcijai, taip pat sergant egzema; paskutiniuoju nėštumo trimestru; jaunesniems kaip 14 m. vaikams ir paaugliams. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės reikalingi, jeigu sergate astma, šienlige, nosies gleivinės patinimu ar lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis, lėtinėmis kvėpavimo takų infekcijomis arba yra padidėjęs jautrumas kitiems skausmą malšinantiems vaistams ir bet kuriems vaistams nuo reumato; taip pat pacientams, kurie yra alergiški kitoms medžiagoms ir kuriems būna odos reakcijų, pasireiškia niežulys arba dilgėlinė. Kai „Odiflan“ vartojama dideliais odos plotiu ir ilgai gydyti, negalima paneigti galimo sisteminio šalutinio poveikio. „Odiflan“ galima vartoti tik ant nepažeistos ir sveikos odos. Žiūrėkite, kad nepatektų į akis ir nekontaktuotų su gleivinėmis. Nesinaudokite oro nepalaidintaisiais tvaraisiais. „Odiflan“ vartojimą reikia nutraukti, jei atsiranda odos bėrimas. Vartodami šį vaistą venkite saulės spindulių, taip pat nesinaudokite soliariumu. Saugokitės, kad vaikai negalėtų paliesti šio vaisto gydymui odos vietų. Teksto peržiūros data: 2020-09-30. *Palyginus su Ofen 1% geliu.

TAIKLUS SKAUSMO MALŠINIMAS

NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO

NUO 1⁹⁹ €

IBUPROM

IBUPROM, 200 mg, 10 dengtųjų tablečių 1⁹⁹ €
IBUPROM, 200 mg, 20 dengtųjų tablečių 3⁴⁹ €
IBUPROM, 400 mg, 10 plėvele dengtųjų tablečių 2⁴⁹ €
IBUPROM, 400 mg, 20 plėvele dengtųjų tablečių 3⁹⁹ €
IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 10 minkštųjų kapsulių 2⁹⁹ €
IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 20 minkštųjų kapsulių 4⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg ir 200 mg. **Indikacijos:** skausmo (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Ibuprom Express, 400 mg“: suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 1 kapsulę kas 4 val. (negeri daugiau nei 3 kapsulių per parą, nekramtyti). „Ibuprom, 400 mg“: suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 1 tabletę 3 kartus per parą. „Ibuprom, 200 mg“: 6-9 m. vaikams (kūno svoris 20-29 kg) gerti po 1 tabletę kas 6-8 val. (negeri daugiau nei 3 tablečių per parą); 10-12 m. vaikams gerti po 1 tabletę kas 6 val. (negeri daugiau nei 4 tablečių per parą); suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams pradine doze yra 2 tabletės, po to galima gerti po 1-2 tabletes kas 4 val. (negeri daugiau nei 6 tablečių per parą). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, taikinis kraujavimas, ūminės skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opalės stadija; anksčiau buvusi alergija acetilsalicilo rūgščiai ir kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; sergant sunkiu širdies nepakankamumu; esant trečiam nėštumo trimestrai. Specialūs įspėjimai: vartoti nepatartina, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu, bronchių astma. Reklamos teksto parengimo data 2022-03-03.

YRA „IBUPROM“. NĖRA SKAUSMO.

NUO RĖMENS

2⁹⁹ €

PANZILAN® 20 mg, 14 skrandyje neiuri tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Pantoprazolas. Vienoje tablečių yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidrato pavidalu). **Indikacijos.** „Panzilan“ sudėtyje yra veiklosios medžiagos pantoprazolo, kuri blokuoja skrandžio rūgšties gamtinį „siurbimą“, todėl skrandyje sumažėja rūgšties kiekis. „Panzilan“ vartojamas trumpalaikiam gastroezofaginio refliksų simptomų (pvz., rėmens, rūgščių atpylimo) suaugusiems pacientams gydymui. Refliksus yra rūgščių iš skrandžio atgalinis patekimas į stemplę, kurioje gali prasidėti uždegimas ir sukelti skausmą. Dėl to gali atsirasti tokių simptomų, kaip skausmingas deginimo pojūtis krūtinei kylantis iki ryklės (rėmuo) ir rūgštus skonis burnoje (rūgšties atpylimas). **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Gerti po 1 tabletę per parą prieš valgį tuo pačiu paros laiku 2-3 dienas iš eilės, užsigeriant vandeniu. Tabletes reikia nuryti, negalima kramtyti ar laužyti. Neviršykite rekomenduojamos 20 mg pantoprazolo dozės per parą. Nutraukite „Panzilan“ vartojimą, kai visai pranykęs ligos simptomai. Nepasitarus su gydytoju vartoti „Panzilan“ ilgiau kaip 4 savaites negalima. **Kontraindikacijos.** Jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) pantoprazoliui, sojų lecitiniui arba bet kuriai pagalbinei „Panzilan“ medžiagai, kartu vartojami vaistai, kurių sudėtyje yra alazanavirio, amžius iki 18 metų; nėštumas arba kūdikio žindymas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu dėl rėmens arba virškinimo sutrikimo gydotes ilgiau kaip 4 savaites, esate vyresnis kaip 55 metai ir kasdien vartojate nereceptinius vaistus dėl sutrikusio virškinimo, atsirado naujų simptomų arba simptomai neseniai pasikėlė; anksčiau sirgote skrandžio opa arba buvę atlikta skrandžio operacija; sutrikusio kepenų veikla arba atsirado gelta; numatoma atlikti endoskopiją arba C-šlapalo mėginį. Jeigu numatyta atlikti kraujo mėginį, pasakykite gydytojui, kad vartojate šį vaistą. Atsirgimo ir rėmens simptomai gali palengvėti pavartojus „Panzilan“ vos vieną dieną, tačiau šis vaistas neturi sukelti pagerėjimo nedelsiant. Jo negalima vartoti profilaktikai. Jei jums gydytojais sakė, kad netoleruojate kai kurių angliavandenių, prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su gydytoju. „Panzilan“ sudėtyje yra sojų lecitino. Jei esate alergiškas žemės riešutams ar sojai, vaisto vartoti negalima.

UŽGESINK GAISRĄ SKRANDYJE!

SKAUDANČIAI GERKLĖ

6⁹⁹ €

POLOVOX

8,75 mg/dozėje burnos gleivinės purškalo (tirpalas), 15 ml

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Sudėtis: Vienoje dozėje (3 išpuškimuose) yra 8,75 mg flurbiprofeno. **Indikacijos:** skaudančios gerklės simptomų, tokių kaip gerklės skausmas, skausmingas, sunkumas nuryti ir patinimas, trumpalaikiam malšinimui 18 metų ir vyresniems suaugusiems. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusieji nuo 18 metų ir vyresni: viena dozė (3 išpuškimai) į gerklę kas 3-6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 dozių per 24 valandas. Per įprastą neįkvėpti. Polovox skirtas vartoti tik trumpą laiką. **Kontraindikacijos.** Polovox vartoti negalima pacientams, kuriems yra alergija (padidėjęs jautrumas) flurbiprofenui, ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aspirinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; anksčiau buvo pasireiškę alerginės reakcijos, pavartojus nesteroidinių vaistų nuo uždegimo ar aspiriną; yra arba buvo du ar daugiau skrandžio opų arba kraujavimo arba žarnos opų atvejų; anksčiau po nesteroidinių vaistų nuo uždegimo vartojimo pasireiškė kraujo krešėjimo arba kraujavimo sutrikimų; jeigu yra sunkių širdies, inkstų ar kepenų sutrikimų; paskutiniai 3 nėštumo mėnesiai. Šio vaisto negalima vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vartojant mažiausią veiksmingą vaistinio preparato dozę trumpiausią simptomų kontrolės būtiną laiką, galima sumažinti nereceptinius poveikius. Pasitarti su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Polovox: jeigu jau yra vartojamas bet kuris kitas nesteroidinis vaistas nuo uždegimo ar aspirinas; jei va bakterinis tonzilitas uždegimas; jeigu pacientas senyvo amžiaus; jeigu pacientas serga arba sirgo astma; sisteminė raudonoji vilkligė ar mšria jungiamojo audinio liga; hipertenzija; žarnyno ligos (opinis kolitas, Krono liga); jeigu yra širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų; pacientė nėščia pirmuosius 6 mėnesius arba maitina krūtimi. Reklamos teksto parengimo data-2020 m. 07 mėn.

1⁹⁹ €**PARACETAMOL ZENTIVA 500 MG, 20 tablečių****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Kiekvienoje tabletėje yra 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos.** Trumpalaikiai simptomai lengvo ar vidutinio stiprumo skausmo ir (arba) karščiavimo malšinimas. Paracetamol Zentiva 500 mg tabletės skirtos suaugusiems, paaugliams ir 6 metų bei vyresniems vaikams, sveriantiems daugiau kaip 21 kg. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Reikia vartoti mažiausią veiksmingą dozę kiek galima trumpesnę laiką. Didžiausios paros dozės viršyti negalima. Paracetamolius dozuojamas atsiviegiant į kūno svorį ir amžių, paprastai skiriamas vienkartinę 10-15 mg/kg kūno svorio dozę, nevirsiant didžiausios paros dozės – 60 mg/kg kūno svorio. Tabletes reikia nuryti užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio, vartoti valgio metu arba nevalgius. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbine medžiagai. Sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas. Ūminis hepatitas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Paracetamol Zentiva nevartokite kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio. Vartojant didesnes nei rekomenduojama vaisto dozes, padidėja sunkaus kepenų pažeidimo pasireiškimo rizika. Vartodami šį vaistą negerkite alkoholinių gėrimų. **Reklamos teksto parengimo data:** 2022 m. gruodžio mėn. ID00056231

GERKLĖS UŽDEGIMUI GYDYTI4⁹⁹ €**FURASOL 1 g, 5 paketėliai****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma: „Furasol 100/900 mg“ gargalas (mintalio tirpalas). **Kokybinė ir kiekybinė sudėtis:** 1 mililitrų paketėlyje yra 100 mg furagino kalio druskos ir 900 mg natrio chlorido. **Terapinės indikacijos:** vietinis infekcijos sukkelto burnos ertmės ir ryklės uždegimo gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 4 m. vaikams. Tirpalą reikia ruošti prieš pat vartojimą. Paketėlyje esančius mililitrus reikia išpilti į stiklinę karšto virinto vandens ir šilto tirpalo 2-3 kartus per dieną skalauti juo burną arba gargaliuoti. Tirpalą reikia suvartoti iš karto. Jo laikyti negalima. Sergant burnos ertmės ligomis skalauti, o sergant ryklės ligomis – gargaliuoti apie 20-30 sekundžių, po to tirpalą išspjauti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas furaginui, nitrofurano grupės junginiams. Pacientas yra jaunesnis negu 4 m. vaikas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** tirpalą burnai ir ryklės skalauti reikia ruošti prieš pat vartojimą. Nesuvaldus vaisto likučius reikia išpilti. Sąveika su kitais vaistais: vaistiniai preparatai ir kitokia sąveika: jokios kliniškai reikšmingos sąveikos nepastebėta. Nešutumo ir žindymo laikotarpis: nežinoma, ar saugu vartoti šį preparatą nešutumo ir žindymo laikotarpiu, nes tokie tyrimai neįvykė. Todėl nešutoms ar žindymui jos vartoti nerekomenduojama. **Nepageidaujamas poveikis:** kiekvienoje organų sistemoje pasireiškiantis nepageidaujamas poveikis apibūdinamas taip: labai dažnas: $\geq 1/10$, dažnas: nuo $\geq 1/100$ iki $< 1/10$, nedažnas: nuo $\geq 1/1000$ iki $< 1/100$, retas: nuo $\geq 1/10000$ iki $< 1/1000$, labai retas: $< 1/10000$, dažnis nežinomas: (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis). Odos ir poodinio audinio sutrikimai: labai reti. Alerginė reakcija. **Nereceptinis vaistinis preparatas. Registravimo liudijimo turėtojas ir gamintojas:** JSC „Olanfarm“, Rūpnieki 5, LV-2114 Olaine, Latvija. **Vietinis registravimo liudijimo turėtojas:** UAB „Corpus Medica“, Sukilių pr. 61, LT-49333 Kaunas, Lietuva. Teksto peržiūros data 2013-09-30. Reklamos teksto parengimo data 2020-01-10.

4⁹⁹ €**WINTROZEN**

600 mg, 10 šnypščiučių tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekvienoje šnypščiučioje tabletėje yra 600 mg acetilsisteino.

Terapinės indikacijos. „Wintrozene“ skirtas gleivėms skystinti ir atsisakyti lengvinti sergant persalimo sukeltu bronchitu, suaugusiems ir vyresniems kaip 14 metų paaugliams. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems ir vyresniems kaip 14 metų paaugliams: rekomenduojama dozė yra 1 tabletė (600 mg) 1 kartą per parą, vakare. Jūsų gydytojas gali pakeisti vartojimo dažnį ir dozę, nevirsydamas 600 mg didžiausios paros dozės. „Wintrozene“ negali būti vartojamas ilgiau nei 5 dienas. **Vartojimo metodas.** 1 šnypščiučioje tabletę išpilti stiklinėje vandens. Paruoštą tirpalą reikia išgerti per kelias minutes. Rekomenduojama nemaityti. **Vartojimo metodas.** 1 šnypščiučioje tabletę išpilti stiklinėje vandens. Paruoštą tirpalą reikia išgerti per kelias minutes. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Wintrozene“, jeigu: atsiranda naujų odos ir gleivinės pokyčių. Labai retai gauta pranešimų apie sunkių odos reakcijų, sergant uždegimine bronchiu liga, netoleruojanti histaminą, yra ar anksčiau buvo skrandžio ar žarnyno problemų, vadinamų skrandžio ar dvilypkapištes žarnos opomis, ypač kai kartu su „Wintrozene“ vartojami kiti skrandžio gleivinę dirginantys vaistai. Jeigu jaučiate sėros kvapą, nesijaudinkite, nes tai yra acetilsisteino savybė ir nereiškia, kad vaistas pakito. **Reklamos teksto parengimo data:** 2022 m. gruodžio mėn. ID 000551327

5⁹⁹ €**SEPTABENE**

3 mg/1 mg, 16 kietųjų pastilių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Septabene“ dezinfekuoja burną ir ryklę bei lengvina ryklės uždegimo požymius: skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. Kietosios pastilės „Septabene“ vartojamos uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti: jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas; sergant dantenų uždegimu (gingivitu), ryklės uždegimu (faringitu) ir gerklų uždegimu (laringitu); prieš dantų traukimą ir po jo. **Dozavimas:** suaugusiems rekomenduojama paros dozė yra 3-4 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai išpilti burnoje kas 3-6 valandas. 6-12 m. vaikams rekomenduojama paros dozė yra 3 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai išpilti burnoje kas 3-6 valandas. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 m. vaikas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Septabene“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydymo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Sąveika su kitais vaistais: vaistiniai preparatai ir kitokia sąveika. „Septabene“ negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Kietųjų pastilių negalima vartoti kartu su pienu, nes jis silpnina celiulinio chlorido antimikrobinį poveikį. Reklamos teksto parengimo data 2022-10-12. **TAVO GERKLĖ – TAVO JĖGA!**

ODAI-30% 4^{54€}**INO BIO HERBA BALM**

šildantis kūno balzamas su eteriniais aliejais, 40 ml

PUSIS – EUKALPTAS – ČOBRELIS – ARBATMEDIS – KAMPARO

Kūno balzamas tepamas ant krūtinės, nugaros bei padų turi efektyvų poveikį odai. Jis švelniai maitina odą dėl jame esančio sviesto medžio aliejaus ir Vit E.

AKIŲ DIRGINIMO, AŠAROJIMO, PERVERGIMO, VOKŲ KRAŠTŲ UŽDEGIMO LENGINIMAS6⁹⁹ €**OCULOHEEL, 3 paketėliai, kurių kiekviename yra 5 vienodosios talpyklės.****AKIŲ LAŠAI (TIRPALAS)****HOMEOPATINIS NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Vienoje talpyklėje (0,45 ml tirpalo) yra veikliųjų medžiagų: Euphrasia D5 110,7 mg, Cochlearia officinalis D5 110,7 mg, Pilocarpus D5 110,7 mg, Echinacea D5 110,7 mg.

Terapinės indikacijos. Akių dirginimo, ašarojimo, smėlio akys pojūtis, pervingimo, jautrumo šviesai ir vokių kraštų uždegimo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Vaikams nuo 6 metų ir suaugusiems žmonėms paprastai reikia lašinti į pažeistą akį po 1 lašą 3 kartus per dieną. Jei vartojama ir kitokių akių lašų, tarp jų ir „Oculoheel“ akių lašų vartojimo rekomenduojama daryti 15 minučių pertrauką. Kadangi šio vaistinio preparato sudėtyje yra etilolio (Echinacea), prieš skiriant jį ligoniams kaip 8 savaitų laikotarpį, rekomenduojamas individualus įvertinimas. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbine medžiagai, arba astrinai (grubiai) dirkinti šėnos augalams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pagalbinės medžiagos: Fosfatinai, laktiniai. Kiekvienoje šio vaistinio preparato viena dozėje talpyklėje yra 2,81 mg fosfatų, tai atitinka 6,25 mg/g. Kadangi šio vaistinio preparato sudėtyje yra etilolio (Echinacea), prieš skiriant jį pacientams, turintiems imuninės sistemos funkcijos sutrikimų (pvz., progresuojančių sisteminių sutrikimų, autoimuninių ligų, imunodeficitų, imunosupresijos ir baltųjų kraujo ląstelių sistemos ligų atvejais), rekomenduojamas individualus įvertinimas. Talpyklės turinį galima vartoti tik vieną kartą, t. y. kartą lašinti į kairiąją ir (arba) dešiniąją akį tiek, kiek reikia. Talpyklė reikia atidaryti tik prieš pat vaisto vartojimą. Naudojta talpyklė reikia išmesti, net jeigu joje yra vaistinio preparato likučius. **Registravimas.** „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). **Registravimo atžados.** UAB „Farmahel“, www.heel.lt. Reklamos teksto parengimo data 2022-09-12.



NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO

NUO 1⁹⁹ €

APAP

APAP, 500 mg, 12 pėvelė dengtų tablečių 1⁹⁹ €APAP, 500 mg, 24 pėvelė dengtos tabletės 3⁹⁹ €APAP, 250 mg granulės pakeltyje, vaikas, 10 pakelčių 5⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: paracetamolis, 250 mg ir 500 mg. Indikacijos: vaistai skirti silpnai ir vidutinio stiprumo skausmui malšinti ir temperatūrai mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Apap, 500 mg“ pėvelė dengtos tabletės: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams gerti po 1–2 tabletes kas 4–6 valandas, ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. „Apap, 250 mg“ granuliu pakeltyje, skirti vaikams, vienkartinė dozė yra nuo 10 iki 15 mg/kg kūno svorio vyresniems nei 4 metų vaikams, ją vartoti ne dažniau kaip kas 4 valandos (didžiausia paros dozė – 4 pakelčiai). Granulės supilti tiesiai į burną ant liežuvio ir praryti neužgėrus vandens. Kontraindikacijos: vaistus vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: prieš vartojant paracetamolį būtina pastirti su gydytoju, jei yra: paeistos kepenys ar inkstai, astma, gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka, hemolizinė anemija, vartojami kai kurie kiti vaistai, skydliaukės netekimas, mitybos nepakankamumas, vartojamas alkoholis bei nęstumo ir žindymo laikotarpis. Didesnės nei rekomenduojamos dozės sukelia vidaus organų pažeidimus. Reklamos teksto parengimo data: 2022-08-24.

„APAP“. KIEKVIENOJE VAISTINELĖJE.

NUO SKAUSMO

3⁹⁹ €

METAFENEX 200 mg/500 mg,

10 pėvelė dengtų tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Kiekvienoje pėvelė dengtoje tablete yra 200 mg ibuprofeno ir 500 mg paracetamolio. Terapinės indikacijos. „Metafenex“ skirtas trumpalaikiam lengvo ar vidutinio stiprumo skausmui, siejamam su migrena, galvos skausmu, nugaros skausmu, mėnesinių skausmu, dantų skausmu, reumatiniu bei raumenų skausmu, nęsturiu artro skausmu, peršalimo ir gripo simptomams, gerklės (ryklės) skausmu bei karščiavimu, malšinti. Šis vaistinis preparatas ypač tinka skausmui, kuriam reikia stipresnės analgezijos nei vartojant vien ibuprofeną ar paracetamolį. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems gerti po 1 tabletę ne dažniau kaip 3 kartus per parą valgio metu užgeriant vandeniu. Tarp dozių išlaikyti ne mažiau kaip 6 valandų tarpą. Jei, vartojant po 1 tabletę, simptomai neišnyksta, daugiausia galima vartoti po 2 tabletes ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių per bet kurį 24 valandų laikotarpį. „Metafenex“ negalima vartoti ilgiau kaip 3 dienas. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų asmenims. Kontraindikacijos. Šio vaistinio preparato vartoti negalima pacientams, kuriems yra padidėjęs jautrumas ibuprofenui, paracetamolii arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio ar kitų NVNU, skaitant COX-2 inhibitorius ir didesnę kaip 15 mg acetilsalicilo rūgšties paros dozes, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumo reakcijai, susijusiai su acetilsalicilo rūgštimi arba kitais nesteroidiniais vaistais, preparatus nuo uždegimo, jeigu anksčiau buvo aktyvi arba buvusi pasikartojanti peptinė opa; buvo ar yra virškinimo trakto ęropėjos ir (arba) ar jo prakurimas ar kraujavimas, susijęs su ankstesniu gydymu NVNU. Pacientams, kuriems yra kraujo krešėjimo sutrikimų, kuriems yra sunkus kepenų, inkstų arba širdies nepakankamumas. Negalima vartoti paskutinio nęstumo trimestro metu. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Būtinai ypatingas atsargumas: jei pacientas serga infekcine liga, pacientas yra senyvo amžiaus; serga ar anksčiau sirgo astma; yra inkstų, širdies, kepenų arba žarnyno sutrikimas; serga sisteminė raudonoji vilkligė; yra virškinimo trakto sutrikimų arba lėtinė uždegiminė žarnyno liga; pacientė nėščia pirmuosius 6 nęstumo mėnesius arba žindo. Reklamos teksto parengimo data 2022-03.

SKAUSMĄ KEISK | METAFENEX!

3⁹⁹ €

SEPTANAZAL 1 mg/50 mg/ml

nosies purškalo (tirpalas), 10 ml

Ksilometazolino hidrochloridas / dekspantenolis

Suaugusiems

Su dekspantenoliu

Su sidabro apsauga

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Septanazal“ nuo 6 metų amžiaus vartojamas:

- nosies gleivinės pažeidimams mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) bei gleivinės pažeidimo gijimui skatinti;

- nealerginiam nosies gleivinės uždegimui (vazomotoriniam rinitui) lengvinti;

- kvėpavimo pro nosį pasunkėjimui po nosies operacijos šalininti.

Rekomenduojama dozė 6 metų bei vyresniems vaikams yra po 1 purškimo / kiekvieną šnervę iki 3 kartų per parą.

„Septanazal“ suaugusiems vartoti negalima, jeigu yra alergija ksilometazolino hidrochloridui, dekspantenoliui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu Jums arba Jūsų vaikui yra sausasis nosies gleivinės uždegimas ir atskrandu šauž (sausasis rinitas), jeigu Jums arba Jūsų vaikui buvo chirurginiu būdu pašalinta posmegeninė liauka arba buvo atlikta kita operacija, susijusi su smegenų dangalais.

„SEPTANAZAL“ GREITAI ATKĖMS UŽGULUSIĄ NOSĮ, SKATINA NOSIES GLEIVINĖS GIJIMĄ.

NUO PERŠALIMO

NUO 3⁹⁹ €

DALERON GOLD3

DALERON GOLD3, 12 pėvelė dengtų tablečių 3⁹⁹ €DALERON GOLD3, 24 pėvelė dengtos tabletės 6⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Vienoje pėvelė dengtoje tablete yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudofedrinio hidrochlorido ir 15 mg deksmetorfanio hidrobrodido. Terapinės indikacijos: peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, sąnarių, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Dozavimas ir vartojimo būdas: įprasta dozė suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vaikams yra 2 tabletės. Tokia dozė galima gerti daugiausia 4 kartus per parą. Tarp dozių vartojimo turi būti praėjusios mažiausiai 4 valandos. Didžiausia paros dozė yra 8 tabletės. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms paracetamolii, pseudofedrinio hidrochloridui, deksmetorfanio hidrobrodido. Sunki hipertenzija, sunki išeminė širdies liga (krūtinės angina). Vartojama kitų vaistinių preparatų, kuriuose yra paracetamolio. Pacientas yra jaunesnis kaip 12 metų. Sunkus kepenų arba inkstų funkcijos sutrikimas. Glaukoma. Reklamos teksto parengimo data 2022 10 12.

PRADEDA VEIKTI JAU PER 20 MINUČIŲ!

4⁹⁹ €

DEEP HEAT KREMAS 67g

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. 1 g kremo yra 128 mg metilsalicilato, 59,1 mg levomentolio ir raceminio mentolio, 19,7 mg eukaliptų eterinio aliejaus ir 14,7 mg terpeninio eterinio aliejaus. Terapinės indikacijos: Lokalus sąnario aplinkos minkštųjų audinių uždegimo ir (ar) traumos (pvz., sumušimo, patempimo, patempimo) sukeltą skausmą malšinti. Dozavimas: Suaugusiems tepėti reikia apie 4 cm kremo 2–3 kartus per parą. Vienoje dozėje (4 cm) yra didžiausias 0,026 g metilsalicilato ir vidutiniškai 0,12 g levomentolio. Neviršyti nurodytų dozių. Gydymo trukmė priklausys nuo indikacijų bei vaistinio preparato poveikio. Pacientą reikia informuoti, kad nepasitarus su gydytoju suaugusiems kremo negalima tepėti ilgiau kaip 3 parų. Jeigu per 3 paras simptomai išlieka arba būklė pasunkėja, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Vaikų populiacijai. Duomenų apie Deep Heat saugumą ir veiksmingumą jaunesniems kaip 18 metų vaikams nėra. Vartojimo metodas: Plonu geliu sluoksniu patepti skaudamą vietą ir švelniai įtrinti. Kontraindikacijos: Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas aspirinui, ibuprofenui ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, įskaitant ir vartojamus per burną, ypač jei jautrumas vaistiniams preparatams buvo susijęs su astma. Astma sergantys pacientai, kuriems aspirinas arba kiti nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, gali sukelti astmos priepuolį, niežėjimą, rinitą ar dilgėlinę. Negalima tepėti ant paeistos odos, apie akis, ant gleivinės, aburų žaizdų, egzemos pažeistų vietų. Kiti toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu lokaliai vartojami vaistiniai preparatai. Vartojimo vietoje esanti infekcija. Paskutinis nęstumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: Kremo netepti ant (arba) šalia gleivinės ir akių. Pirmą kartą išbandyti ant mažo odos ploto. Jei pasireiškia bet koks nepageidaujamas poveikis ar ligos požymiai užtešia arba pasunkėja, pastarai su gydytoju. Vartoti tik ant odos. Registracijos kodas: Colep Laupheim GmbH & Co. KG, Vokietija. Gamintojas: The Mentholatum Company Limited, Jungtinė Karalystė arba Colep Laupheim GmbH & Co. KG, Vokietija. DEEP HEAT ŠILDANTIS KREMAS NUIMANTIS SKAUSMĄ IR RAUMENŲ SUSTINGIMĄ!

MODERNI KAPSULĖ NUO RĖMENS

2⁹⁹ €

ESCADRA 20 mg,

7 skrandyje neirios kietosios kapsulės

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: ezomeprazolas, 20 mg. Terapinės indikacijos: vaistas skirtas suaugusiųjų gastroezofaginio refliksio simptomų (pvz., rėmens ir skrandžio rūgšties reguliacijos) trumpalaikiam gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 kapsulė) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, kapsules gali prireikti vartoti 2–3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Simptomams visiškai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Jeigu per 2 savaites nepertraukiamą gydymą simptomai neišnyksta, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Nėra tinkama „Escadra“ vartojimo rekomendacijai jaunesniui kaip 18 metų vaikų populiacijai indikacijai „trumpalaikis gastroezofaginio refliksio simptomų (pvz., rėmens ir rūgšties reguliacijos) gydymas“. Kapsulių negalima kramtyti ar smulkinti. Kapsules galima atidaryti ir granulės išmaisyti pusėje stiklinės negazuoto vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pakeistiems benzimidazolams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Ezomeprazolo negalima vartoti kartu su neflinaviru. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pacientus reikia informuoti, kad kreiptusi į gydytoją, jeigu jie patiria didelį kūno svorio mažėjimą dėl nežinomų priežasčių, pasikartojantį vėmimą, distagiją, vėmimą krauju ar mėleną, arba jeigu įtariama ar diagnozuojama skrandžio opa, būtina iširti, ar nėra piktybinės ligos, nes gydymas ezomeprazolu gali palengvinti jos simptomus ir uždelsti diagnozės nustatymą; jeigu jie anksčiau sirgo skrandžio opa arba patyrė virškinimo trakto operaciją; jeigu jiems 4 savaites arba ilgiau buvo taikomas nepertraukiamas simptomatinis nevirškinimo arba rėmens gydymas; jeigu jie serga gelta arba sunkia kepenų liga; jeigu jie yra vyresni kaip 55 metų ir turi naują arba neseniai pakitusių simptomų. Pacientai, kurių pasikartojantis nevirškinimo ar rėmens simptomai ilgalaikiai, turi reguliarius intervalus lankytis pas savo gydytoją. Kaip ilgalaikio profilaktinio vaistinio preparato „Escadra“ pacientai neturi vartoti. Pacientai, kuriems reikia atlikti endoskopiją ar ureazės kvėpavimo testą, turi pasitariti su savo gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistinį preparatą. Ezomeprazolo skirti kartu su atazanaviru nerekomenduojama. Ezomeprazolo derinimas su klopidogrelu nepatartinas. Kitų PSl arba H2 receptorių blokatorių kartu su ezomeprazolu pacientams vartoti negalima. „Escadra“ sudėtyje yra sacharozės. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems yra fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktazės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2022-04-12.

Dolmen®

deksketoprofeno trometamolis

GREITAI MALŠINA
SKAUSMĄ,
KAI TO LABIAUSIAI REIKIA!



Geriamas
iš paketėlio

**BERLIN-CHEMIE
MENARINI**

UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“
Jasinskio g. 16a, Vilnius LT-03163
Tel. +370 5 269 19 47
LT@berlin-chemie.com



SKAUSMINGŲ MĖNESINIŲ, RAUMENŲ IR KAULŲ, DANTŲ SKAUSMO MALŠINIMAS

Dolmen. **Nereceptinis vaistas. Veiklioji medžiaga.** Deksketoprofeno trometamolis (dexketoprofenum). Vienoje plevėle dengtoje tabletėje / granulių geriamajam tirpalui paketėlyje / geriamojo tirpalo paketėlyje yra 25 mg deksketoprofeno. **Vaisto forma.** Plevėle dengtos tabletės / granulės geriamajam tirpalui / geriamasis tirpalas paketėlyje. **Pakuotė.** Po 10 tablečių / po 10 paketėlių granulių / po 10 geriamųjų tirpalų paketėlyje. **Indikacijos.** Dolmen vartojamas trumpalaikiam simptominiams lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų, sąnarių ir kaulų skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorejos), dantų skausmui malšinti. **Dozavimas.** Atsižvelgiant į skausmo priežastis ir intensyvumą, rekomenduojama gerti: po 1 tabletę / paketėlį / geriamąjį tirpalą paketėlyje 1-3 kartus per parą kas 8 valandas. Didžiausia paros dozė neturi būti didesnė kaip 3 tabletės / paketėliai / geriamieji tirpalai paketėlyje. Jei esate senyvo amžiaus ar sergate inkstų, kepenų ligomis, pradėkite vartoti ne daugiau kaip 2 tabletes / paketėlius / geriamuosius tirpalus paketėlyje per parą. **Vartojimo būdas.** Jei vartojate granules, visą paketėlio turinį ištirpinkite stiklinėje vandens, suplakite. Išgerkite nedelsiant. Geriamasis tirpalas paketėlyje gali būti geriamas tiesiai iš paketėlio. Jeigu jaučiate intensyvų skausmą ir reikia jį greičiau nuslopinti, vaistą vartokite prieš valgymą (ne vėliau kaip prieš 15-30 min.). Poveikis prasideda po 30 min. pavartojus vaisto. Skausmą malšinantis poveikis trunka 4-6 valandas. Šio vaisto neturėtų vartoti vaikai ir paaugliai (jaunesni kaip 18 metų). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas deksketoprofenui, kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aspirinui; vartojant ketoprofeno ar fi bratų buvę fotoalerginės ar fototoksinės reakcijos; pepsinė opa, buvęs kraujavimas iš virškinamojo trakto, lėtiniai virškinimo sutrikimai bei lėtinės virškinamojo trakto ligos; sunkus širdies nepakankamumas, vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų funkcijos, sunkus kepenų veiklos sutrikimas; esant sunkiai dehidratacijai; nėštumas bei žindymo laikotarpis. **Įspėjimai.** Vaistą atsargiai turi vartoti vyresnio amžiaus ligoniniai, sergantieji alergija, astma, širdies, inkstų, kepenų ligomis, hipertenzija, sisteminė raudonąja vilklige, cukriniu diabetu, įvairiomis jungiamojo audinio ligomis, sutrikus kraujodarai; vartojant šlapimo išsiskyrimą skatinančius vaistus ar netekus daug skysčių. Pasitarkite su gydytoju jei vartojate kitų vaistų: geriamųjų steroidinių, nuo depresijos, apsaugančių nuo kraujo krešumo. Dolmen geriamojo tirpalo paketėlyje ir granulių geriamajam tirpalui paketėlyje yra sacharozė, todėl jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti Dolmen granules geriamajam tirpalui ar geriamąjį tirpalą paketėlyje. Į tai turėtų atsižvelgti pacientai, sergantys cukriniu diabetu. Deksketoprofenas gali paslėpti tokių infekcijų požymius kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl gali būti, kad vartojant šį vaistą gali būti vėluojama pradėti tinkamą gydymą, o dėl to gali padidėti komplikacijų rizika.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt

Reklama paruošta: 2021 m. birželio mėn.

LT_Dol_10_2021_V1_press

PADEDA



SUVIRŠKINTI



MAISTĄ!



MEZYM – GERESNIAM VIRŠKINIMUI.

Vartojamas tuomet, kai kasa gamina bei išskiria nepakankamai virškinimo fermentų ir tai sukelia virškinimo sutrikimų.

MEZYM 10 000V, MEZYM 20 000V. Nereceptinis vaistas. MEZYM 10 000V, MEZYM 20 000V skrandyje neiros tabletės. **Indikacijos:** Mezym vartojamas tuomet, kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentų ir tai sukelia virškinimo sutrikimų. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija kasos milteliams, kiaušės (baltymams) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Šio vaisto negalima vartoti, jeigu jūs sergate ūminiu kasos uždegimu (pankreatitu) arba jums paūmėjo lėtinis kasos uždegimas, kai ligos požymiai yra stipriai išreikšti. **Sudėtis:** vienoje Mezym 10 000V skrandyje neiroje tabletėje yra 80,00 mg–111,11 mg kiaušinių kasos miltelių, kurių aktyvumas atitinka ne mažiau kaip 10 000 lipazės vienetų, 7500 amilazės vienetų, 375 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. Vienoje MEZYM 20000V skrandyje neiroje tabletėje yra 160,00 – 222,22 mg kasos miltelių (iš kiaušinių kasos pagaminto pankreatino), kurių minimalus aktyvumas atitinka 20 000 lipazės vienetų, 12 000 amilazės vienetų, 900 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. **MEZYM 10 000V dozavimas ir vartojimo būdas:** optimali dozė nustatoma individualiai. Dažniausiai valgio metu išgeriamos 2–4 tabletės. **Mezym 20 000V rekomenduojama dozė yra:** 1–2 tabletės vienam valgiui. Sergantiems cistine fibroze, dozė neturi viršyti fermento kiekio, kuris reikalingas suvalgytame maiste esančių riebalų kiekiui suvirškinimui. Vaisto dozė gali būti didinama tik gydytojo prižiūrint. Dienos dozė (15 000–20 000 lipazės vienetų kūno svorio kilogramui) neturėtų būti viršijama. Dozės vaikams turi nustatyti gydytojas. Tabletės praryjamos nesukramčius ir užsigeriant dideliu kiekiu skysčio. Šio vaisto sudėtyje yra fermentų, kuriems atsipalaidavus burnos ertmėje (tablečių sukramčius), gali būti pažeista burnos gleivinė (pvz., atsirasti opos). **Specialūs įspėjimai:** cistinė fibrozė kartais gali komplikuotis žarnyno nepraeinamumu. Esant simptomams, panašioms į žarnyno nepraeinamumo požymius, reikia įvertinti žarnyno susiaurėjimo susidarymo galimybę. Mezym sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Mezym 10 000V sudėtyje yra dažiklio azorubino (E 122), kuris gali sukelti alergines reakcijas kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepašalina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie LR SAM el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, nurodytais jos interneto svetainėje www.vvkt.lt

UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ J. Jasinskio g. 16a, Vilnius LT-03163 Tel. +370 5 269 19 47

Reklama paruošta 2020 m. sausio mėn. LT_Mez_02_2020_V1

BERLIN-CHEMIE
MENARINI

SKAUSMUI IR KARŠČIAVIMUI MALŠINTI

4⁹⁹ €



UPSARIN C 330 mg/200 mg, 20 snypsčiųjų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. Veikliosios medžiagos stiprumas: 330 mg aceticilo rūgšties, 200 mg askorbo rūgšties. **Indikacijos:** silpno arba vidutinio stiprumo skausmo malšinimas ir (arba) karščiavimo malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir 16 m. bei vyresniems paaugliams – po 1–2 snypsčiąsias tabletes, ne dažniau kaip kas 4 val., ne daugiau kaip 9 tabletes per parą. Senyviems pacientams – po 1–2 snypsčiąsias tabletes, bet ne daugiau kaip 6 tabletes per parą. Vartoti per burną. Prieš vartojimą išstiprinti tablete stiklinėje vandens. **Kontraindikacijos:** paskutiniai 4 nėštumo mėnesiai (< 100 mg/parą), vaikai ir paaugliai iki 16 m. (ypač mažinti karščiavimui ir virusinėms ligoms gydyti), padidėjęs jautrumas bent vienu sudedamajai medžiagai, sergant ūmine skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, esant inkstų, kepenų, širdies nepakankamumui ir kt. Net vartojant mažiausiomis dozėmis, aceticilo rūgštis didina kraujavimo pavojų, todėl negalima vartoti sergant hemofilija, hemochromatoze, su antikoaguliantais, jei sirgote opa, esant G6PD trūkumui. Esant akmenims inkstuose, neviratoti > 1 g vitamino C per parą. Didelės aceticilo rūgšties dozės, jei vartojama daugiau kaip 20 mg metotretaksato per savaitę. **Specialūs įspėjimai:** vartoti atsargiai jei sutrikusi inkstų, kepenų arba širdies veikla, ligai skauda pilvą nei ligai vartojant vaistus nuo skausmo, sergant astma, ir jei yra dilgėlinės bėrimas, susijęs su nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo arba aceticilo rūgštimi. Atsargiai vartoti esant gausioms menstruacijoms, sergant podagra, sergant ar sirgus šlapimo takų akmenlige, ligai vartojant kitus vaistus nuo skausmo, senyvo amžiaus žmonėms, esant mažam kūno svoriui, 330 mg tabletes netinka vaikams, sveriantiems mažiau nei 20 kg. Reklamos teksto parengimo data 2022-04-28. PM-IT-2022-4-1630.

3⁹⁹ €



DR. THEISS HUSTICUM sirupas, 50 mg/g, 100 ml

AUGALINIAI VAISTAI

„Dr. Theiss“ Husticum, sirupas: siauralapių gysločių lapų skystasis ekstraktas, skirtas burnos ir ryklės dirginimui ir sausam kosuliui lengvinti. Gerti 4–6 kartus per parą vienodais intervalais. 3–6 metų amžiaus vaikams po 2,5 ml, 6–12 metų vaikams – po 5 ml, nuo 12 metų – po 15 ml. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai. Vaikams iki 3 metų amžiaus vartoti nepatariama. „DR. THEISS“ – NUO PERSALIMO IR KOSULIO.

PERŠALIMO, YPAČ SUSIJUSIO SU VIRUSINE INFEKCIJA, GYDYMAS

6⁹⁹ €



ENGYSTOL, 50 tablečių

HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tablete yra veikliųjų medžiagų: Vincetoxicum hirundinaria D6 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D10 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D30 75 mg, Sulfur D4 375 mg, Sulfur D10 375 mg. **Indikacijos. Peršalimo, ypač susijusio su virusine infekcija, gydymas.** Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: paprastai reikia vartoti po 1 tablete 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps), ūminiais atvejais – po 1 tablete kas 0,5–1 val. (iki 12 kartų per dieną). 6–11 metų vaikams: paprastai reikia vartoti po 1 tablete 2 kartus per dieną, ūminiais atvejais – po 1 tablete kas 0,5–1 val. (iki 8 kartų per dieną). 1–5 metų vaikams: pasitarus su gydytoju, vartoti po 0,5 tabletes 3 kartus per dieną, ūminiais atvejais – po 0,5 tabletes kas 0,5–1 val. (iki 12 kartų per dieną). Tablete lėtai išstiprinti burnoje. Ją reikia vartoti ne valgio metu. Vaikams tablete galima susmulkinti ir išstiprinti nedideliame kiekyje vandens. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Registruotojas.** Biologische Heilmittel Heel GmbH (Vokietija). **Registruotojo atstovas.** UAB „Farmahelis“. www.heel.lt Teksto parengimo data 2022-12-07. KOVOJA SU VIRUSAIS. TINKA IR VAIKAMS.

NUGAROS, SPRANDO SKAUSMAMS IR RADIKULITUI GYDYTI

4⁹⁹ €



KAPSIKAM® vaistinis šildomasis tepalas, 50 g

Nereceptinis vaistinis preparatas

Tepalas Kapsikam®. Nereceptinis vaistas. 1 g tepalo yra 50 mg dimetilsulfoksido, 30 mg raceminio kamparo, 30 mg terpentino eterinio aliejaus, 20 mg benzilnikotinato, 2 mg nonivamido. **Terapinės indikacijos:** vietinis raumenų ir sąnarių skausmo malšinimas. **Dozavimas ir naudojimo būdas:** norint sukelti skausmą malšinantį poveikį, ant skaudamos vietos aplikatoriumi užtepama 1–3 g (6–18 cm) tepalo 2–3 kartus per parą, atsižvelgiant į skausmo intensyvumą. Norint ilgiau išlaikyti šildomąjį tepalo poveikį, ant skaudamos vietos reikia uždėti tvarstį. Didžiausia vienkartinė dozė – 3 g. Didžiausia paros dozė – 9 g. Po kiekvienos procedūros reikia nusiplauti rankas šaltu vandeniu su muilu. Naudoti ant odos. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Odos opos, žaizdos bei ligos, kai yra pažeistas odos paviršius. **Vietinis rinkodaros teisės turėtojas atstovas:** AB „Grindex“ filialas, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2020-12-05. **MANO JĖGA JUDEJIME!**

SĄNARIAMS

11⁹⁹ €



GLUCOSAMIN-RATIOPHARM

1,5 g milteliai geriamajam tirpalui, 20 paketėlių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Viename paketėlyje yra 1,5 g gliukozamino sulfato, tai atitinka 1,884 g gliukozamino sulfato natrio chlorido arba 1,178 g gliukozamino. **Indikacijos.** Lengvo ar vidutinio sunkumo kelio osteoartrito sukeltų simptomų lengvinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Paketėlių turinį išstiprinti stiklinėje vandens ir gerti vieną kartą per parą. Gliukozaminas netinka vartoti ūminio skausmo simptomų slopinimui. Simptomų palengvėjimas (ypač skausmo) gali pasireikšti tik po kelių savaičių, kartais ir dar ilgesnio, vartojimo. Jei simptomai nepalengvėja po 2–3 mėnesių vartojimo, reikia iš naujo spręsti, ar gydymą gliukozaminu tęsti toliau. Miltelius galima vartoti tiek valgio metu, tiek nevalgant. Gliukozaminą negalima vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas gliukozaminui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Gliukozamin-ratiopharm negalima skirti ligoniams, alergiškiems kiaušiniams vėžėjusiems, nes iš jų išgaunama preparato veiklioji medžiaga. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei pacientui yra sutrikusi gliukozės tolerancija, prieš skiriant gydymą ir vėliau periodiškai rekomenduojama stebėti gliukozės kiekį kraujyje ir, jei reikia, insulino poreikį. Jei pacientai turi širdies ir kraujagyslių ligų rizikos faktorių, rekomenduojama stebėti lipidų kiekį kraujyje, nes vartojantiems gliukozaminą ligoniams buvo nustatyti keli hipercholesterolemijos atvejai. Buvo aprašyti atvejai, kai pradėjus gliukozaminą terapiją, pablogėjo astmos simptomai. Gliukozaminą negalima vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams, nes neįstirtas vartojimo saugumas ir veiksmingumas. Atsargumas reikalingas, jei pacientui yra fenilketonurija, paveldimas fruktozės netoleravimas. **Teksto peržiūros data** 2020-12-21.

-45% 13^{46€} 24^{46€}



JAMIESON WILD SALMON ŽUVŲ TAUKAI, 1000 mg, 90 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

• JAMIESON žuvų taukai išgauti iš laukinių Aliaskos lašišų, sardinijų, ančiuvų ir (arba) skumbrių.
• Iš lašišų, sardinijų ir ančiuvų išgautas EPR ir DHR gryninamas naudojant švelnų molekulinę distiliacijos procesą, kurio metu pašalinami visi gyvsidabrio ir kitų mikroteršalų likučiai.



-40%



AMBIO

AMBIO OMEGA-3, 60 kapsulių **8⁹⁹ 5³⁹ €**
AMBIO OMEGA-3 ŠIRDŽIAI, 60 kapsulių **12⁹⁸ 7⁷⁹ €**
MAISTO PAPILDAS

ŠIRDŽIAI IR KRAUJAGYSLĖMS

NUO **1⁹⁹ €**



THROMBO ASS

THROMBO ASS 50 mg, 100 skrandyje neirių tablečių **1⁹⁹ €**
THROMBO ASS 75 mg, 100 skrandyje neirių tablečių **2⁹⁹ €**
THROMBO ASS 100 mg, 100 skrandyje neirių tablečių **3⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: acetylsalicilo rūgštis. **Terapinės indikacijos:** miokardo infarkto rizikos mažinimas sergantiems krūtinės angina. Antrinė miokardo infarkto profilaktika. Trombozės profilaktika po vainikinių arterijų nuosėdų operacijos. Antrinė praeinančio smegenų išemijos priepuolio (PSIP) ar insulto profilaktika. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti po 1 tabletę 1 kartą per dieną (patariama vakare). Skrandyje neirių tablečių reikia nuryti nesukramtyta, užsigeriant pakankamu skysčiu kiekį valgio metu arba tarp valgių tuo pačiu paros metu. Ipratine paros dozė ilgalaikiam vartojimui yra 50–150 mg. Dalyti į dalis „Thrombo ASS“ skrandyje neiros tabletes negalima, nes bus pažeista skrandyje neiri plevelė. Norint, kad tikty individualiam vartojimui, reikia rinktis atitinkamo stiprumo preparatą (50 mg, 75 mg ir 100 mg). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei salicilatams ir kitiems NVNU; bronchų spazmas; ūminė pepsinė opa; polinkis į kraujavimą, hemofiliją; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; sunkus, nepakankamai kontroliuojamas širdies nepakankamumas; nėštumas; vaikai ir paaugliai iki 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Atsargumo reikia laikytis šiais atvejais: sergant bronchine astma, šienlige, esant nosies gleivinės paburkimui ir esant kito pobūdžio alergijai; vartojant kartu su vaistais, mažinančiais kraujo krešumą; sergant hemolizine anemija; esant skrandžio ir žarnų sutrikimams, esant anamnezėje duomenims apie opaligę ar kraujavimą iš virškinimo trakto; esant inkstų ligoms ir (arba) kepenų funkcijos sutrikimui; turintiems polinkį podagrai. Prieš numatytą operaciją 10 dienų acetylsalicilo rūgštis reikia nevartoti. Šio vaisto sudėtyje yra laktozės monohidrata, todėl vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas lėpų laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pakuotė: 50 mg, 75 mg arba 100 mg; 100 skrandyje neirių tablečių. Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas: G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria. Paskutinė teksto peržiūros data: 2020-05-13.

ŠIRDIES VEIKLAI IR NORMALIAI CHOLESTEROLIO KONCENTRACIJAI KRAUJYJE

-40%



RAMI ŠIRDIS

MAISTO PAPILDAS

„Rami širdis“ – gausios sudėties dviejų poveikio maisto papildai, pripažinti Lietuvos vartotojų. Šios linijos preparatai pasižymi puikiai suderinta sudėtimi, kuri, be vitaminų ir mineralų, papildyta natūraliais augaliniais ekstraktais, šimtmečius naudojami medicinaje. „Rami širdis“ maisto papildai padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir psichologinę funkciją, taip pat padeda mažinti nuovargį.

„Rami širdis cholesterolio balansui“ sudėtyje esantis patentuotas ABG25[®] juodojo česnakų ekstraktas padeda palaikyti normalų cholesterolio kiekį kraujyje. Plunksnalapių gudobelės ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Vaistinių valerijonų šaknų ekstraktas padeda atsipalaiduoti ir palaikyti normalią psichologinę būseną. Folio rūgštis, B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Sudėtis praturtinta berberinu.

RAMIAME KŪNE-RAMI ŠIRDIS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-40% **4^{49€}**



VITADAY KOMPLEKSAS ATMINČIAI 30 kapsulių MAISTO PAPILDAS

INKSTAMS IR ŠLAPIMO TAKAMS

-20% **8^{79€}**
~~10⁹⁹~~



FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Fitolizyna Nefrocaps PLUS“ yra unikalus 7 koncentruotų augalinių ekstraktų mišinys, kuris:
– padeda palaikyti normalią inkstų ir šlapimo takų veiklą (petražolių šaknis, dirvinų asiūklių žolė, paprastųjų varpūčių šakniastiebiai, karpotųjų beržų lapai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė);
– padeda palaikyti normalų vandens pašalinimą iš organizmo, todėl skatinamas nepageidaujimų metabolizmo produktų šalinimas su šlapimu (dirvinų asiūklių žolė, paprastųjų varpūčių šakniastiebiai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė).
Rekomenduojamas vartojimas: 1 kapsulė 2 kartus per parą prieš valgį, užgeriant dideliu kiekiu vandens (ne mažiau kaip ½ stiklinės).

VENOMS

NUO **8⁹⁹ €**



HESIO

HESIO 500 mg, 30 plevele dengtų tablečių **8⁹⁹ €**
HESIO 500 mg, 60 plevele dengtų tablečių **15⁹⁹ €**
HESIO 500 mg, 120 plevele dengtų tablečių **27⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. Kiekvienoje tablete yra 500 mg mikronizuotų flavonoidų (atitinka 450 mg diosmino ir 50 mg kitų flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną). **Terapinės indikacijos.** Hedio skirtas suaugusiųjų: lėtinio kojų venų nepakankamumo simptomams (kojų sunkumui, kojų patinimui, skausmui, naktiniam kojų mėšlungiui) lengvinti; paūmėjusio hemorojaus simptomams (skausmui, kraujavimui ir patinimui išangės srityje) lengvinti. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Lėtinis venų nepakankamumas. Rekomenduojama dozė suaugusiems yra dvi tabletės per parą 2 mėnesius: viena tabletė vidurdienį ir viena tabletė vakare, valgio metu. Jei simptomai išlieka, gydymas gali būti tęsiamas dar 2 mėnesius. Jeigu po 6 savaitų Hedio vartojimo lėtinio venų nepakankamumo gydymui simptomai nepalengvėjo arba pasunkėjo, pasitarkite su gydytoju. Hemorojaus paūmėjimas. Pirmas 4 gydymo dienas rekomenduojama dozė suaugusiems yra 3 tabletės du kartus per parą (6 tabletės per parą). Kitas 3 dienas – 2 tabletės du kartus per parą (4 tabletės). Tabletes vartokite valgio metu. Jeigu vartojate Hedio paūmėjusio hemorojaus gydymui ir po 7 dienų simptomai nepalengvėjo arba pasunkėjo, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. **Kontraindikacijos.** Hedio vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vaikams ir paaugliams Hedio vartoti nerekomenduojama. **Reklamos teksto parengimo data:** 2022 m. gruodžio mėn ID000562234

VAISTINĖJE ATLIEKAME KRAUJO ĮSOTINIMO DEGUONIMI MATAVIMUS PULSOKSIMETRU



KODĖL REIKIA MATUOTIS?

Pasimatavus įvertinama, ar kraujas pakankamai įsotinamas deguonimi. Tokie matavimai yra pagalbinė simptomų vertinimo priemonė, sergant kvėpavimo takų ir kraujotakos ligomis.

KADA REIKIA MATUOTIS?

Stebint savo sveikatos būklę, kai sergama peršalimo ligomis ar jaučiami tokie simptomai kaip dusulys, nuovargis, mieguistumas, spaudimas krūtinėje.



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!**LIVOL EXTRA****MAISTO PAPILDAS**

Skandinaviški LIVOL vitaminai – tai pirmos tokio tipo vitaminų sistemos: aiškos, paprastos bei visiems prieinamos. Produktai sukurti remiantis holistiniu požiūriu į Jūsų organizmo sveikatą, todėl maksimaliai veiksmingi. Visi LIVOL maisto papildai susijungia į visumą. Taip Jūs galite išsirinkti sau ar savo šeimos nariams tinkamiausius vitaminus.

LIVOL - MAKSIMALIAM REZULTATUI!

*Akcija taikoma 1+1 skirtuku pažymėtoms prekėms.

ENERGIJAI IR IMUNITETUI

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!**VITIRON™ KIDS**VITIRON KIDS GROWUP, 50 guminukų vaikams **12⁹⁹ €**VITIRON KIDS IMMUNITY, 50 guminukų vaikams **13⁷⁹ €**VITIRON KIDS SCHOOL, 50 guminukų vaikams **14⁴⁹ €**VITIRON KIDS SPORTS FOR ENERGY, 50 guminukų vaikams **14⁴⁹ €**

MAISTO PAPILDAS. „VitrON™ Kids“ – tai vaikių ir uogų skonių, įvairių formų kramtomieji guminukai su vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis. „VitrON™ Kids grow UP“ skirti vaikų kaulų augimui ir vystymuisi, „VitrON™ Kids School for BRAIN“ – smegenims, normaliai psichologinei būklei, pažinimo funkcijai, „VitrON™ Kids Sports for ENERGY“ – normaliai energijos apykaitai, o „VitrON™ Kids Immunity su šeimamedžio sultimis – imunitetui. VTR-LT-00053

PATENKINS AUGANČIO VAIKO MIKROELEMENTŲ POREIKIUS IR PAĖS PALAIKYTI NORMALIĄ IMUNINĖS SISTEMOS VEIKLĄ!**GYVYBINGOSIOS BAKTERIJOS**

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!10²⁹ €**SALUTIL, 10 kapsulių****MAISTO PAPILDAS**

Sudėtyje yra pieno rūgšties ir bifido bakterijų bei Saccharomyces boulardii mielių. Salutil maisto papildas tinka nešėms ir krotimi maitinančioms moterims. Nereikia laikyti šaldytuve, tinka keičioms. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. LT.Sal.70821

VITADAY ACAI UOGOS SU CHROMU,**30 tablečių****MAISTO PAPILDAS****SU SPANGUOLIŲ PROANTOCIANIDINAI (PAC), D-MANOZE IR MIELIŲ BETA-GLIUKANAI**

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!21⁹⁹ €**MANOSPAN, 10 paketėlių****MAISTO PAPILDAS**

Grynasis kiekis: 40 g (10 paketėlių po 4 g). ManoSpan yra maisto papildas, kurio sudėtyje yra stambiauogių spanguolių vaisių sausos ekstrakto, D-manozės ir beta-gliukano. Be dažiklių. Vartojimas. Po 1 paketėlio per parą. Paketelio turinį ištirpinkite stiklinėje vandens ir išgerkite, geriausia prieš miegą. Jeigu kyla klausimų dėl produkto vartojimo, pasitarkite su specialistu. Produkto teisių savininkas: Difass International s.r.l., Via Ausa, 181, Loc. Cerasolo, Coriano (RN), Italija. Pagaminta ir supakuota: Via L. da Vinci, 23 - Loc. Sambuca V.P. - Barberino Tavarnelle (FI) - Italija.

SPANGUOLIŲ EKSTRAKTAS PAĖDA PALAIKYTI NORMALIĄ ŠLAPIMO TAKŲ FUNKCIJĄ.**ŠIRDŽIAI IR KRAUJOSPŪDŽIUI**

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!**BIOKALIS 400 mg, 30 paketėlių 7⁹⁹ €****BIOKALIS FORTE, 30 paketėlių 8⁷⁵ €****BIOFERRUM ACEROLA, 28 pak. 17⁹⁹ €****MAISTO PAPILDAS**

Maisto papildai milteliais geriamajam tirpalui ruošti. „bioKalis 400 mg“ ir „bioKalis forte“ sudėtyje – grynas kalio citratas! Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį, svarbus normaliai nervų sistemos ir raumenų veiklai palaikyti. „bioFERRUM ACEROLA“ – tirpios geležies maisto papildas miltelių pavidalu su vitaminu C (ekologiškos malpigiijos – acerola). Geležis padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą. Produktų sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be dažiklių, konservantų ir stabilizatorių.



PIRKDAMI **NORFOS VAISTINĖJE**
JŪS GAUSITE ČEKĮ, KURIUO GALĖSITE ĮSIGYTI
DU TOKIUS PAČIUS PRODUKTUS UŽ VIENO KAINĄ:

1+1

**BIOCELL, bioceliuliozinė paakių kaukė su kolagenu, N1 3⁹⁹ €****KOSMETINIS PRIEMONĖ**

Tai pažangios liposominės technologijos paakių kaukė. Kaukės lapelių serume esančios liposomos leidžia aktyviasias sudedamąsias dalis pernėti į giliosios odos sluoksnius, taip pat užtikrinamas intensyvus odos drėkinimas ir stangrinimas. Kaukės sudėtyje esanti hialurono rūgštis, raudonųjų dobilių ekstraktas ir hidratizuotas kolagenas efektyviai atkuria ypatingos priežiūros reikalaujančios paakių odos drėgmės balansą, stangrina, maitina ir ją laiko elastingą.

TOBULA ESI TU. BIOCELL TAI IŠSAUGO.

Flavamed®

Ambroksolio hidrochloridas

Sprendimas šlapio kosulio gydymui

- **Vartojamas sergant ūmiomis ar lėtinėmis plaučių ir bronchų ligomis, kai kosulio metu susidaro klampios gleivės.**
- **Suskystina klampias gleives ir jos gali lengviau kosulio metu pašalinti.**
- **Aviečių skonio.**



Nereceptinis vaistas. Flavamed 30 mg/5 ml geriamasis tirpalas. Kiekviename matavimo šaukšte su 5 ml geriamojo tirpalo yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido. **Flavamed 15 mg/5 ml geriamasis tirpalas.** Kiekviename matavimo šaukšte su 5 ml geriamojo tirpalo yra 15 mg ambroksolio hidrochlorido. **Terapinės indikacijos.** Flavamed vartojamas sergant plaučių ir bronchų ligomis, kai susidaro klampios gleivės. Suskystina klampias gleives ir jos gali lengviau pašalinti. **Vartojimo būdas.** Geriamasis tirpalas vartojamas po valgio naudojant matavimo šaukštą. 6–12 metų vaikams po 15 mg ambroksolio hidrochlorido 2–3 kartus per parą, 2–5 metų vaikams po 7,5 mg 3 kartus per parą. Be gydytojo nurodymo ilgiau kaip 4–5 dienas Flavamed vartoti negalima. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams po 30 mg 3 kartus per parą pirmąsias 2 ar 3 dienas; vėliau — po 30 mg 2 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Flavamed 30mg/5ml ir 15 mg/5ml geriamojo tirpalo negalima vartoti vaikams iki 2 metų. **Specialūs įspėjimai.** Atsargiai reikėtų vartoti pacientams sutrikus bronchų epitelio motorikai ir esant gausiai sekrecijai; sutrikus inkstų funkcijai arba sergant sunkia kepenų liga; praeityje buvus pepsine opa; esant histamino netoleravimui. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Flavamed šnypščiasias tabletes, jeigu jums praeityje pasitaikė labai sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų (Stivenso-Džonsono sindromas ir Lajelio sindromas). Kiekviename šio vaisto matavimo šaukšte (5 ml geriamojo tirpalo) yra 1,75 g sorbitolio. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad Jūs (ar Jūsų vaikas) netoleruojate kokių nors angliavandenių arba Jums (ar Jūsų vaikui) nustatytas retas genetinis sutrikimas įgimtas fruktozės netoleravimas (IFN), kurio atveju organizmas negali suskaidyti fruktozės, prieš vartodami šio vaisto (ar prieš duodami jo Jūsų vaikui), pasakykite gydytojui. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurių laisvinantį poveikį. Kiekviename šio vaisto – matavimo šaukšte (5 ml geriamojo tirpalo) yra 5,75 g benzenkarboksirūgšties.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie LR SAM el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, nurodytais jos interneto svetainėje www.vvkt.lt

-30%

5^{24€}
~~7^{49€}~~



AMBIO GERKLEI SU GYSLOČIU IR ČIOBRELIU (mikstūra be cukraus) 150ml
MAISTO PAPILDAS

-30%

4^{54€}
~~6^{49€}~~



AMBIO VITAMINAS C SU CITRUSINIŲ VAISIŲ BIOFLAVANOIDAIŠ, 30 prailginto veikimo tablečių

MAISTO PAPILDAS

- 500 mg vitamino C 1 tableteje.
- Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą ir psichologinę funkciją.
- Vitaminas C padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

2^{89€}



VITADAY VITAMINAS C 200 MG, 50 tablečių
MAISTO PAPILDAS

IKI -45%



AMBIO CORDYCEPS, 100 tablečių ~~14^{99€}~~ **8^{99€} -40 %**
AMBIO IMUNITETUI (MIKSTŪRA), 120ml ~~7^{49€}~~ **4^{49€} -40 %**
AMBIO RYKLIŲ TAUKAI 500MG, 60 kapsulių ~~11^{99€}~~ **6^{59€} -45 %**
MAISTO PAPILDAS

NVAISTINĖ

NORFOS VAISTINĖJE
PASISKIEPYKITE NUO:

GRIPO

18^{17€}

SU LOJALUMO
KORTELE

19^{99€}

SKIEPO
KAINA

PNEUMOKOKO

77^{00€}

SU LOJALUMO
KORTELE

85^{00€}

SKIEPO
KAINA



Nuolaidos taikomos Norfos
vaistinėje su PC NORFA kortele.
NV laimės valandų nuolaidos
netaikomos.




Registracija internetu: www.nvaistine.lt/skiepai

Telefonu: **8 800 10 008**

PREPARATAMS ŠIRDŽIAI IR VENOMS

IKI **-40%**



-40%



AMBIO ŽUVŲ TAUKAI NATŪRALAUS SKONIO, 250ml **9⁴⁹ 5⁶⁹ €**
AMBIO ŽUVŲ TAUKAI CITRINŲ SKONIO, 250ml **9⁹⁸ 5⁹⁹ €**
MAISTO PAPILDAS

-35%



AMBIO KALIS IR MAGNIS (milteliai geriamajam tirpalui ruošti), 30 paketėlių **11⁹⁹ 7⁷⁹ €**
AMBIO MAGNIS (milteliai geriamajam tirpalui ruošti), 30 paketėlių **9⁹⁸ 6⁴⁹ €**
MAISTO PAPILDAS

-50% 11^{25€} 22⁴⁹


JAMIESON GELEŽIS SKYSTOJI 10MG, 200 ml
MAISTO PAPILDAS

-40% 3^{89€} 6⁴⁸


VITADAY KOMPLEKSAS ŠIRDŽIAI SU GUDOBELE IR KOFERMENTU Q10, 40 tablečių
MAISTO PAPILDAS

-30%



AMBIO PATIRIANTIEMS ĮTAMPĄ, 15 kramtomųjų tablečių **5⁴⁹ 3⁸⁴ €**
AMBIO PATIRIANTIEMS ĮTAMPĄ (mikstūra), 100ml **6⁹⁸ 4⁸⁹ €**
MAISTO PAPILDAS

ATMINČIAI IR PROTINEI VEIKLAI

-25% 19^{49€} 25⁹⁹


CLEAR BRAIN™, 60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Kompleksas atminčiai ir protinei veiklai „Clear Brain“ gaminamas iš granatmedžių vaisių, graikinių riešutų, pajūrinio pušų žievės, juodųjų pipirų ekstraktų, jodo ir vitaminų. Jodas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją ir nervų sistemos veiklą. Pantoteno rūgštis (vitaminas B₅) padeda palaikyti normalią protinę veiklą. Tiaminas, niacinas, vitaminai B₆, B₁₂ padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą. Taip pat svarbų įvairi, subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

SVEDISKI VITAMINAI ATMINČIAI IR PROTINEI VEIKLAI!

-30%




GINKOPRIM®

MAISTO PAPILDAS

Unikalūs dviskiaučių ginkmedžių lapų ekstrakto ir magnio derinys. Dviskiaučiai ginkmedžiai padeda palaikyti normalią kognityvinę funkciją, smegenų veiklą, psichinę būklę ir atmintį.
LT.Gink.80907

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-40%



HERBASTRESS®, 30 tablečių **12⁹⁹ 7²⁵ €**

Dienai
MAISTO PAPILDAS

Standartizuotų augalų ekstraktų ir B grupės vitaminų derinys nervų sistemai.
Vartojimas: 1 tabletė per dieną.

HERBASTRESS® MIEGAM, 20 kapsulių **11⁹⁹ 6⁹⁵ €**

Naktį
MAISTO PAPILDAS

Su melatoninu, valerijono ir apynių ekstraktu.
Vartojimas: 1 kapsulė vakare prieš miegą.

**AMBIO ŠLAPIMO
TAKAMS SU LAKTO-
BIFIDOBAKTERIJOMIS,**
20 kapsulių

1+1

~~998~~
798 €
**MAISTO PAPILDAS**

• Papildo kasdienę mitybą gyvybingomis bakterijomis ir spanguolių ekstraktu.

**AMBIO
TRIBULUS
FORTE,**
30 tablečių

-45%

~~1499~~
824 €
**MAISTO PAPILDAS**

• Gulsčiosios ragužės padeda palaikyti lytinę funkciją.

**AMBIO
ČESNAKAS,**
60 kapsulių

-40%

~~998~~
599 €
**MAISTO PAPILDAS**

• Valgomieji česnakai padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių funkciją, normalų cholesterolio kiekį kraujyje.

**AMBIO LAKTO-
BIFIDOBAKTERIJŲ
KOMPLEKSAS
EXTRA,**
20 kapsulių

-40%

~~798~~
479 €
**MAISTO PAPILDAS**

• Papildo kasdienę mitybą gyvybingomis bakterijomis.

**AMBIO SĄNARIAMS
SU CIBERŽOLE,**
30 tablečių

-40%

~~998~~
599 €
**MAISTO PAPILDAS**


• Bosvelijos, imbierai, ciberžolės.
• Bosvelijų ekstraktas padeda išlaikyti sąnarius vėsius ir jaustis patogiai.

**AMBIO GERAI
NUOTAIKAI,**
30 kapsulių

-30%

~~1249~~
874 €
**MAISTO PAPILDAS**

• Vitaminas B6 ir tiaminas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.
• Tik 1 kapsulė per dieną.



AMBIO URO COMPLEX, 30 kapsulių

~~949 €~~
569 €
-40%



MAISTO PAPILDAS

• Takažolių žolės ir karpotųjų beržų lapų ekstraktai padeda palaikyti normalią šlapimo takų veiklą.

AMBIO NAKVIŠŲ ALIEJUS SU SPANGUOLĖMIS 60 kapsulių

~~998 €~~
599 €
-40%



MAISTO PAPILDAS

• Pirmojo šalto spaudimo dvimečių nakvišų aliejus ir spanguolių uogų ekstraktas.
• Stambiauogių spanguolių (*Vaccinium macrocarpon*) ekstraktui būdinga didelė proantocianidinų koncentracija.

AMBIO BRONCHO KOMPLEKSAS su gerosiomis bakterijomis kramtomosios, 20 kramtomųjų tablečių


~~798 €~~
479 €
-40%



MAISTO PAPILDAS

AMBIO GLUCOBALANCE COMPLEX, 30 kapsulių

~~599 €~~
389 €
-35%



MAISTO PAPILDAS

• Kompleksinis maisto papildas, kurio sudėtyje yra baltųjų šilkmedžių (*Morus alba*) vaisių ir ceiloninio cinamono (*Cinnamomum zeylanicum*) žievės ekstraktų, liuteino, vitaminų, mineralų ir aminorūgščių.
• Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje ir normalią maistinių makromedžiagų apykaitą.
• Cinkas padeda palaikyti normalią angliavandenių apykaitą bei normalią kaulų, plaukų, nagų ir odos būklę.
• Tiaminas, riboflavinas, niacinas, pantoteno rūgštis, biotinas, vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.

AMBIO GELEŽIS SU B12, 30 tablečių

~~899 €~~
629 €
-30%



MAISTO PAPILDAS

• Geležis padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą bei deguonies pernešimą organizme.
• Geležis atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.
• Vitaminas B12 padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą.
• Vitaminas B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
• Foliatai padeda palaikyti normalią kraujodarą, homocisteino apykaitą, aminorūgščių sintezę, psichologinę funkciją.
• Foliatai padeda palaikyti motinos audinių augimą nėštumo metu.
• Vitaminas C gerina geležies absorbciją.
• Varis padeda palaikyti normalų geležies pernešimą organizme.
• Manganas padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.

AMBIO MAGNIS FORTE 375MG, 30 tablečių

~~695 €~~
487 €
-30%



MAISTO PAPILDAS

Onkologinės ligos - tikras iššūkis.

KARTU MES STIPRESNI



Su POLA kortele nuolaidos:

15% vaistams*

20% kitoms prekėms*



*Nuolaidos netaikomos perkant su kompensuojamuoju receptu, vardinius, kartinius vaistus, pradinio maitinimo mišinius, administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Nuolaidos nesumuojamos ir galioja perkant fizinėse NORFOS vaistinėse.



VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS



-35%



AMBIO KALCIS CITRINŲ SKONIO, 60 tablečių **8⁹⁹ 5⁸⁴ €**
AMBIO KALCIS SU VITAMINAIŠ K IR D, 60 tablečių **8³⁹ 5⁴⁵ €**
AMBIO OSTEOPLEX, 60 tablečių **9⁹⁶ 6⁴⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

-35%



AMBIO VITAMINAI D3 IR K2, 60 kapsulių **14⁸⁸ 9⁷⁴ €**
AMBIO VITAMINAS D3 1600TV, 40 tablečių **8⁴⁹ 5⁵² €**

MAISTO PAPILDAI

SĄNARIAMS, KAULAMS, KREMZLĖMS

-30%



ATLANT, 28 pakeliai **49²⁹ 34⁵⁰ €**
BIOGLUCOSAMINE MARINE 1500 mg,
 20 pakelių **11¹⁹ 8⁰⁴ €**
BIOGLUCOSAMINE MARINE 1500 mg,
 60 pakelių **22²⁹ 16⁰⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

Didžiausia kolageno kiekį turintis produktas Lietuvoje – „Atlant“. 1 pakelyje: net 1200 mg kolageno, 1500 mg gliukozamino, 120 mg kalcio ir 12 mg vitamino C. Kolagenas – natūraliai žmogaus organizme sintetinamas baltymas, kuris yra odos bei sąnarių kremzlės ir kaulų sudedamoji dalis. „BioGlucosamine Marine“ – natūralios jūros kilmės gliukozamino sulfatas! 1 pakelyje net 1500 mg gliukozamino sulfato. Gliukozaminas yra sąnario kremzlės struktūrinė dalis. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlės, kaulų ir odos funkcijai, susidarymą. Vitaminas D padeda palaikyti normalų kalcio įsivsinimą bei normalią kaulų būklę. Maisto papildų sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos! Be konservantų, dažiklių ar stabilizatorių. Pagaminta Izraelyje.

* Lyginant su Lietuvos rinkoje 2018-2021 m. platintais produktais, sudėtyje turinčiais kolageno (tokių produktų sąrašas nustatytas pagal UAB „Softdent“ 2018-2021 m. ataskaitą), „Atlant“ yra daugiau kolageno.

SUTEIK TITANIKSKOS GALIOS SĄNARIAMS!

-30%



PROENZI ARTHROSTOP

MAISTO PAPILDAI IR KOSMETIKOS PRIEMONĖ

„Proenzi Arthrostop Intensive“ – maistinių medžiagų kompleksas sąnariams. Baltųjų gliuonijų (*Salix alba*) ir ciberžolių (*Curcuma longa*) ekstraktų derinys padeda palaikyti normalią sąnarių būklę ir lankstumą. Pluoštinių bosvelijų (*Bosvelia serrata*) žievių ekstraktas padeda palaikyti sąnarių lankstumą ir bendrą sąnarių būklę. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų funkcijai, susidarymą.

„Proenzi Arthrostop Plus“ sudėtyje yra gliukozamino ir MSM derinys kartu su žolelių ekstraktu iš pluoštinių bosvelijų ir manganu. Pluoštinių bosvelijų žievių ekstraktas padeda palaikyti sąnarių lankstumą ir bendrą sąnarių funkciją.

„Proenzi Arthrostop“ – masažinis kremas, skirtas odai sąnarių srityje ir aplink sąnarius.

Prekių skaičius ribotas. LT.Proen.70214

PROENZI – JUDEK LAISVAI.

* Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-30%



BIOCALCIUM FORTE + vitaminas D, 600 mg, 30 pakelių **10⁹⁹ 7⁶⁹ €**
BIOKALCIS + fosforas + vitaminai K ir D, 1200 mg, 15 pakelių **7⁵⁹ 5³¹ €**
BIOCA + K + Mg + Zn su VITAMINU D3, 28 pakeliai **13⁹⁹ 9⁴⁴ €**

MAISTO PAPILDAI

Maisto papildai milteliais geriamam tirpalui ruošti. „bioCALCIUM FORTE 600 mg“ ir „bioKALCIS 1200 mg“ sudėtyje – grynas kalcio citratas! Išsirinkite reikalingiausią: 600 mg kalcio su vitaminu D3 bei 1200 mg kalcio su fosforu, vitaminu K ir D3. Kalcis reikalingas kaulų ir dantų būklei palaikyti, padeda palaikyti normalią raumenų veiklą, nervų impulso perdavimą, virškinimo fermentų veikimą bei energijos apykaitą. Vitaminas D padeda palaikyti normalų kalcio ir fosforo įsivsinimą. Fosforas ir vitaminai D, K padeda palaikyti normalią kaulų būklę. „bioCa+K+Mg+Zn su vitaminu D3“ – net 4 mineralų kompleksas: kalcis, kalis, magnis ir cinkas su vitaminu D. Magnis mažina pavargimo jausmą, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, raumenų funkciją. Cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, odos, plaukų ir nagų būklę. Produktų sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be dažiklių, konservantų ir stabilizatorių. Pagaminta Izraelyje.

STIPRIEMS KAULAMS, DANTIMS IR IMUNITETUI!

IMUNITETUI, KAULAMS, RAUMENIMS, SVEIKOMS LAŠTELĖMS

-25%



OILESEN D3

MAISTO PAPILDAI

„Oileesen D3“ – tai reikiamas vitamino D kiekis, ištirpintas natūraliame aliejuje.

„Oileesen D3 400“ – vitaminas D su alyvuogių aliejumi kūdikiams ir mažiesiems vaikams. Paprasta dozuoti pipete.

„Oileesen D3 su juodųjų ąrų aliejumi“ – 4000TV vitamino D ir juodųjų ąrų aliejaus nauda gerai savijautai.

„Oileesen D3 MAX“ – dar daugiau vitamino D ir kanapių aliejaus naudos imunitetui, sveikoms ląstelėms, kaulams ir raumenims. Tik 1 kapsulė per savaitę!

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų būklę, normalią raumenų funkciją. Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelėse dalijimosi procese.

DAUGIAU SAULĖS SU „OILESEN D3“!

* Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

VITAMINO D3 ŠALTINIS

-25%



OLIDETRIM

OLIDETRIM 2000 TV, 60 minkštųjų kapsulių **10⁸⁹ 7⁵⁷ €**Olidetrin 2000 D3 + K2 Omega-3, 30 minkštųjų kapsulių **10⁹⁹ 7⁷⁶ €**

MAISTO PAPILDAI

• Imunitetui – Vitaminas D 2000 TV.

• Širdžiai, smegenims – DHR+ EPR omega-3 rūgštys

• Kaulams ir raumenims.

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Vitaminas D padeda sumažinti riziką griūti, kuri yra siejama su nestabilia laikysena ir raumenų silpnumu. Griuvimas yra 60 m. ir vyresnių vyrų ir moterų kaulų lūžių rizikos veiksnys. Omega-3 riebalų rūgštys DHR (dokozaheksaeno) ir EPR (eikozapentaeno) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą.

Siekiant maksimaliai padidinti vitamino D papildą naudoti, juos naudojant vartoti kartu su vitaminu K2.

Rekomenduojama vartoti 1 kapsulę per parą.

GERIAUSIA GYNYBA – STIPRUS IMUNITETAS

-40%

5^{87€}

BONCEL D3

5600 TV vitaminas D3, 12 kapsulių


MAISTO PAPILDAS

Vitaminas D3 padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų, dantų ir raumenų būklę, bei atlieka tam tikrą funkciją ląstelėse dalijimosi procese. Vartojimas: vartoti po 1 kapsulę per savaitę.

SAULĖ, KAI NĖRA SAULĖS!

PREPARATAMS KAULAMS IR SĄNARIAMS

IKI **-40%**





-30%

6^{99€}
~~998~~



AMEDIPLUS ACTIVE GEL
ŠALDOMAS-ŠILDOMAS
KŪNO GELIS. 100ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

-25%



PLEISTRAS TAMPRUS 7x2cm, 200 vnt. **16⁰⁰ 12⁰⁰ €**
PLEISTRAS TAMPRUS 7x3,8cm, 200 vnt. **24⁰⁰ 18⁰⁰ €**

MEDICINOS PREKĖS

■ RAUMENIMS, SANARIAMS IR ODAI

-25%



DR.THEISS PREPARATAI

KOSMETIKOS PRIEMONĖS IR MEDICINOS PRIEMONĖ

KAUĻAŽOLIŅU PREPARĀTI drudzetā pacientu reģenerējošajiem savienībām pasīzīnīna alantoino tinkta nugarai, raumenim, šķiņķim [trinti]. Tāpat pat sumuim, patēpimam, ožām pāzēidimam, skilīnējantiem kulkam prižūrēti. Pagal poreikj galima rinktis kauļažoliu tepala, gelj ar šildantj krema. DR. THEISS ŠILDOMĀSIS PLEISTRAS. Šildo ir mālsina skausmā kryžkaulio ir juosmens, reumatini, raumeny, šķariy, neuralģija.

DR. THEISS KAULĄŽOLIŲ PREPARATAI – SENOLIŲ IŠMINTIS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-20%

8⁶³€

**FONIX® EAR PAIN** purškalas, 15 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

Pirmoji pagalba pasireiškus dažnoms ausy problemoms, tokioms kaip:

- skausmas
- infekcijos
- susikaupusi siera
- dirginimas

Sudėtis: alyvuogių aliejus, indinių sezamų aliejus, gulsčiųjų serenojų ekstraktas, fitosterolių kompleksas, bisabololis, kvapiųjų murejų lapų aliejus, ceiloninių cinamonų lapų aliejus, vinorūnių ekstraktas, mėty aliejus.

Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 3 metų vaikams.

Vartojimas: purkšti po 1–2 įpurškimus į kiekvieną ausį 3 kartus per parą.

1⁹⁹ €

IBUPROFEN LANNACHER

400 mg, plėvele dengtos tabletės, 10 tablečių

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 400 mg ibuprofeno.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS


Indikacijos: „Ibuprofen Lannacher“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos ibuprofeno. Ibuprofenas malšina uždegimo sukeltą skausmą, patinimą ir karščiavimą, vartojamas trumpą laiką silpno ar vidutinio stiprumo skausmui, tokiam kaip mėnesinių, galvos, dantų, raumenų, sąnarių, malšinti.

Dzīvianais ir vājotīgo būdas: tabletes reiknā nūrti valgu metu arba pavaiģus, uģziņarip pakankamu kieku skyģģo. Saugauģiesiems ir vyrsniems kaip 12 m. vaiķams; 0,5–1 pēvēle dengtā tableģē 3 kartus par paŗa. Negalima virģģyti diģģizģasjos paros doŗēs 1200 mg ibuprofeno (3 pēvēļu dengtu tableģu). **Kontraindikacijas:** padidēģes jautrumis ibuprofenai arba bet kurijai pagalbinei medģģiai; ja vyrģ būvę padēģusio jautrumo reakcijų, vajortoj kitą nesteroidinę vaistų nu uģđģimo, acetilsalicilģ rūģģsties duriņius. Sunkus kepenų, įastny ar širdies funkcijos nenakankamumas. Paskutinįj trijų nėštumo mėnesių laikotarpis. Pėpsinė opa. Kraujavimai i smėoneis. Virģģinio trakta arba kt. Sistēmne raudonoji vilķģģe. Įastny nei 12 m.

[illegible]


Paskutinė teksto peržiūros data: 2021-04-22.

NUSIMESK SKAUSMO KAUKĘ!



◀ SKENUOKITE QR KODĄ IR
**NORFOS VAISTINĖS
LEIDINIUS VARTYKITE
TELEFONE.**



4⁹⁹ €**ACICLOVIR ACTAVIS 5 % kremas, 5 g****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

„Aciclovir Actavis“ 5 % kremas. 1 g kremo yra 50 mg acikloviro. **Terapinės indikacijos.** Lokalus odos ir lūpų pūslelinės gydymas. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems „Aciclovir Actavis“ 5 % kremo reikia tepti 5 kartus per parą, vidutiniškai kas 4 valandas; naktį daroma pertrauka. Gydoma 4 paras. Jei per šį laikotarpį nepasveikstama, gydymą reikia tęsti dar 6 paras. Jei pažeidimas neišnyksta ir po 10 parų, rekomenduojama kreiptis į gydytoją. „Aciclovir Actavis“ 5 % kremo nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Vartoti ant odos. Kontraindikacijos: „Aciclovir Actavis“ 5 % kremo negalima skirti pacientams, kurie yra jautrūs aciklovirui, valaciklovirui, propilenglikoliui ar bet kuriai „Aciclovir Actavis“ 5 % kremo pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. „Aciclovir Actavis“ 5 % kremo nerekomenduojama tepti gleivinės, pvz., burnos, akių ar lyties organų, nes galimas sudirginimas. Būtina laikytis atsargumo priemonių ir saugoti akis, kad į jas nepatektų kremo. Jeigu jūsų imunitetas labai susilpnėjęs, (t. y. jūsų organizmo gebėjimas kovoti su infekcija yra sumažėjęs); tokiu atveju dėl bet kurios infekcijos gydymo reikia kreiptis į gydytoją ir įvertinti gydymo geriamuoju acikloviru galimybę. Pagalbinės medžiagos cetosteirilo alkoholis, natrio laurilsulfatas ir propilenglikolis gali sukelti vietinių tik reakcijų. Teksto peržiūros data 2020-02-08.

8⁹⁹ €**CANIFUG CREMOLUM 200 mg, 3 ovulės****Klotrimazolas****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veikimo medžiagos, stiprumas: vienoje ovulėje yra 200 mg klotrimazolo. **Indikacijos:** mielagrybių (dažniausiai Candida albicans) sukulto makšties uždegimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** 1 „Canifug Cremolum“ ovulė (tai atitinka 200 mg klotrimazolo) įkisti kuo giliau į makštį viena karta per parą, vakare. Dažniausiai pakanka 3 dienų gydymo šiuo vaistiniu preparatu kursu. Pirektus galima paskirti antrą 3 dienų trukmės gydymo kursą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Canifug Cremolum“ medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** specialų atsargumo priemonių reikia nėštumo ir žindymo laikotarpiu; jeigu vartojami dezodorantai arba intymiosios higienos priemonės; jeigu kartu yra lytinis lūpų ir gretimos srities odos infekcinė liga. Šiais atvejais reikia papildomai skirti lokalių gydymą tinkamais vaistais: jeigu atsiranda tokių požymių – paraudimas, dilgčiojimas, niežėjimas, makšties išskyros, makšties uždegimas su skausmu: šie požymiai taip pat gali būti dėl to, kad ligos sukėlėjas neįautrus „Canifug Cremolum“; jeigu tuo patu metu vartojamas „Canifug Cremolum“ su latekso produktais (pvz., prezervatyvais, diafragmomis), dėl preparato sudėtyje esančių pagalbinių medžiagų (ypač steroidų) šiu produktų veiksmingumas gali sumažėti ir jie tampa mažiau patikimi. Vaistinio preparato sudėtyje yra cetosteirilo alkoholio. Cetosteirilo alkoholis gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą). Geriausia gydytis ne mėnesinių metu ir (arba) gydymą baigti prieš mėnesinių pradžią. Gydyti mėnesinių metu galima tik esant sunkiems klinikiniams simptomams. Nėštumo metu gydymą gali skirti tik gydytojas. Jeigu kartu yra lytinis lūpų ir gretimų sričių infekcija ir (arba) partneriui mediciniškai diagnozuotas varpos galvutės ir apyvarpės uždegimas, partneriui reikia papildomai vartoti lokalių gydymui tinkamas vaistinio preparato formas. Siekiant išvengti galimos pakartotinės infekcijos, tuo pat metu reikia mediciniškai tirti ir partnerį. Ligai pasireiškus pirmą kartą arba jeigu liga pasireiškė dažniau nei 4 kartus per paskutinius 12 mėnesių vaistinio preparato galima vartoti tik gydytojų nurodžius ir jam prižiūrint. **Reklamos teksto parengimo data:** 2021-12-16

-25%

1^{84€} 245**NOSIES PLEISTRAS NUO KNARKIMO, 10 vnt.****MEDICINOS PREKĖ****NATŪRALUS BAKTERINĖS VAGINOZĖS SIMPTOMŲ GYDYMAS**12⁹⁹ €**CANESBALANCE makšties ovulės, 7 vnt.****MEDICINOS PRIEMONĖ**

Canesbalance veiksmingai sumažina dėl bakterinės vaginozės atsiradusį nemalonų kvapą, neįprastą išskyros ir nemalonių pojūčių intymioje zonoje. Natūralios gydymosi medžiagos (pieno rūgštis ir gliukogenas) atstato normalią sarmų ir rūgščių pusiausvyrą (pH) ir makšties mikroflorą. Canesbalance tinka ir neščioms. Be konservantų. Be hormonų. Be kvapiųjų medžiagų. Reklamos teksto parengimo data: 2022.02.02 CH-2020210-84

SAUSOMS, SUDIRGUSIOMS IR PAVARGUSIOMS AKIMSNUO 11⁹⁹ €**BEPANTHEN® EYE**

BEPANTHEN® EYE akinių lašai, 10 ml 13⁹⁹ €
BEPANTHEN® EYE akinių lašai, 20 x 0,5 ml vienadozių talpyklių 11⁹⁹ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

Bepanthen® Eye akinių lašų sudėtyje yra 0,15 % natrio hialuronato ir 2 % dekspantenolio. Bepanthen® Eye saugo ir drėkina akies paviršių ir padaro jį slidžiu. Tokiu būdu ligam sumažėja diskomfortas, susijęs su mechaniniu stresu, stresu dėl aplinkos poveikio arba intensyvaus žiūrėjimo. Sudėtyje nėra konservantų, todėl šie lašai gerai toleruojami, net jei vartojami ilgą laiką. Lašinti po 1 lašą į akies junginės maišelį 3-5 kartus per parą. Jeigu yra alergija bet kuriai sudėtyje esančiai medžiagai arba akių uždegimas ar pažeidimas, vartoti negalima. Akių lašų vartojimo metu kontaktinių lęšių išimti nereikia. Vienadose akinių lašų talpyklės skirtos tik vienkartiniam vartojimui. Bepanthen® Eye buteliukas yra ekonomiškas sprendimas: ypatinga akių lašų buteliuko technologija leidžia produktą suvartoti net per 12 mėnesių po jo atidarymo. Jei norite sužinoti daugiau, skaitykite pilną Bepanthen® Eye vartojimo instrukciją.

Reklamos teksto parengimo data: 2022-06, CH-2020601-89
PAŠALINKITE SAUSŲ AKIŲ SIMPTOMUS IŠ KARTO!

NUO ALERGIJOS3⁹⁹ €**LORATADINE ACTAVIS 10 mg, 10 tablečių****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Kiekvienoje tabletėje yra 10 mg loratadino. **Terapinės indikacijos.** Simptominis alerginio rinito ir lėtinės idiopatinės dilgėlinės gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusieji ir vyresni kaip 12 metų vaikai: 10 mg 1 kartą per parą. 2 iki 12 metų vaikai: sveriantiems daugiau kaip 30 kg - 10 mg 1 kartą per parą. Tabletes galima vartoti nepriklausomai nuo valgyimo laiko. Pacientams, sergantiems sunkiu kepenų funkcijos nepakankamumu, skiriama pradinė 10 mg dozė kas antrą dieną. **Kontraindikacijos.** Loratadino tablečių vartoti negalima, jeigu padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Loratadine Actavis, jeigu yra sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas (tokiems pacientams gydytojas gali skirti vartoti šio vaisto kas antrą dieną). Antihistamininiai vaistiniai preparatai gali susilpninti odos hiperergines reakcijas arba neleisti joms pasireikšti, todėl loratadino tablečių vartojimą reikėtų nutraukti mažiausiai prieš 48 valandas iki alerginių odos mėginių. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Reklamos peržiūros data 2022 m. balandis. OTC-LF-00036

- Jamieson C 500mg, 100 tablečių 16⁹⁸ 9³⁴ €
 Jamieson C Mix 500mg, 120 tablečių 18⁹⁸ 10⁴⁴ €
 Jamieson cinkas su ežiuole ir vit. C & D,
 30 tablečių 11⁹⁸ 6⁵⁹ €
 Jamieson Vitaminas C 1000mg, 10 tablečių 8⁹⁸ 4⁹⁴ €

Maisto papildai

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



- Jamieson D vitaminas kramtomas 1,000 IU,
 100 tablečių 14⁹⁸ 8²⁴ €
 Jamieson vitaminas D guminukai 1000 TV,
 60 guminukų 19⁹⁸ 10⁹⁹ €
 Jamieson vitaminas D vaiksams, 400mg, TV 10μg,
 100 tablečių 16⁹⁸ 9³⁴ €
 Jamieson Vitamino D lašai 1000IU, 11,4ml 18⁴⁸ 10¹⁶ €
 Jamieson Vitamino D lašai kūdikių 400IU, 11,7ml 12⁹⁸ 7¹⁴ €

Maisto papildai

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



Pagaminta klevų šalyje

- Jamieson Melatonin 1mg purškalas,
 58ml 18⁹⁸ 12³⁴ € -35 %
 Jamieson Relax&Sleep, 60 kapsulių 16⁴⁸ 10⁷² € -35 %
 Jamieson Stress Plex, 90 tablečių 15⁹⁸ 7⁹⁹ € -50 %

Maisto papildai

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



IKI -50%

- Jamieson Coenzyme Q10 30mg,
 60 kapsulių 21⁴⁸ 10⁷⁴ €
 Jamieson Selenas 100mcg,
 100 tablečių 12⁹⁸ 6⁴⁹ €

Maisto papildai

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



-50%



Pagaminta klevų šalyje

-40%**ACONITUM**

MAISTO PAPILDAI
AUKŠTOS KOKYBĖS LIETUVIŠKI PREPARATAI, KURIUOS SUKŪRĖME JUMS
 *Akcija taikoma raudonai skirtu pažymėtomis prekėms

-40%

VITADAY MULTIVITAMINAI MOTERIMS, 60 tablečių **7⁴⁹ 4⁴⁹ €**
VITADAY MULTIVITAMINAI VYRAMS, 60 tablečių **7⁹⁹ 4⁷⁹ €**
 MAISTO PAPILDAI

-30%**2⁷⁹€**

VITADAY VITAMINŲ B KOMPLEKSAS, 60 tablečių
 MAISTO PAPILDAS

-30% **15⁵³€****NAKVIŠŲ ALIEJUS**

100 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
 Vienoje kapsulėje yra net 1 000 mg nakvių aliejaus, kuris gaminamas šaltai spaudžiant, todėl jame išlieka daugiau naudingųjų medžiagų. **Nakvių aliejus** – polinesočiųjų riebalų rūgščių šaltinis. **Vitaminas E** padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
MOTERS ŽAVESIO PASLAPTIS IŠ GAMTOS!

-20%**VITABIOTICS WELL LINIJA**

MAISTO PAPILDAI
WELLWOMAN – nakvių, agurklių, vitaminų ir mineralų kompleksas moterims. **WELLMAN** – sibirinių ženšenio, amino rūgščių, vitaminų ir mineralų kompleksas vyrams. **WELLTEEN** – subalansuota paauglių, o **WELLKID** – patiems mažiausiems.
GERA SAVIJAUTA VISAI ŠEIMAI!
 *Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-30%

STOP STRESS® 30 kapsulių **9³⁹ 6⁴³ €**
STOP STRESS® NIGHT 30 kapsulių **9³⁹ 6⁴³ €**
OSTEONOL® 150 ml **13²⁹ 9³⁰ €**
FITESTEN® 30 kapsulių **14⁹⁹ 10²⁸ €**
KARDIO START® 30 kapsulių **15⁴⁹ 10⁶³ €**
IMMUNECO® 30 kapsulių **13⁷⁹ 9⁶⁵ €**
BEAUTYNOL® 30 kapsulių **14⁴⁹ 9⁹³ €**
BEAUTYNOL® EXCELLENCE 30 kapsulių **22⁹⁹ 15⁶⁷ €**

MAISTO PAPILDAI
 Pasimėgauk gyvenimo akimiromis su BF-ESSE...
JŪSŲ GERAI SAVIJAUTAI!
 *Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-40%**9⁵³€**

TOP 4 HERBS, 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS
 daugiau informacijos apie produktus www.vitaminai.lt.

**Pagrindinis sutrikimas, kai kalbame apie miegą, yra nemiga. Tačiau ką reiškia, jei miegame per ilgai ar per giliai? Gydytoja ir vaistininkė atsako, apie ko-
kias sveikatos problemas byloja miego sutrikimai ir kaip su jais susidoroti.**

Vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės teigimu, kasdien vaistinėje parduodami dešimtys cheminių vaistų, maisto papildų ir vaistažolių nemigos problemai spręsti. Deja, migdomieji gali padėti tik tada, kai nemigos priežastys labai aiškios ir trumpalaikės, pvz., žmogus išgyvena stresą, patiria įtampą, miegas sutriko dėl dažnų kelionių keičiantis laiko juostoms.

„Daug dažniau nemigos priežastys būna neištirtos, o pati liga tęsiasi ilgą laiką. Kuo ilgiau skiriami migdomieji, tuo didesnis priklausomybės jiems pavojus. Į dažno maisto papildų nemigai gydyti sudėtį įeina melatoninas – natūrali medžiaga, kuri gaminasi mūsų smegenyse ir padeda užmigti. Tačiau vartojant ilgą laiką ir didesnėmis dozėmis, net ir melatoninas nėra toks jau nekalta“, – atkreipia dėmesį ji.

Vaistininkė pasakoja, kad kartą pagalbos ieškojo jaunas vaikiną, ką tik grįžęs po studijų užsienyje, kur porą metų vartojo gydytojo paskirtą melatoniną, mat dėl didelio darbo krūvio atsirado miego problemų. Po studijų baigimo be tabletės užmigti jam nebepavykdavo.

„Nemigos priežastimi gali būti širdies ritmo sutrikimai, nekontroliuojamas naktinis kraujospūdis, neurologinės problemos, apie kurias žmogus gali ir nežinoti. Štai viena jauna mama pasiskundė, kad visai nemiega ketvirtą para iš eilės, nors dienos metu jautėsi neblogai. Vėliau paaiškėjo, kad nemiga buvo pirmasis pogimdyvinės depresijos požymis. Todėl jei nepavyksta miego problemų išspręsti sutvarkius poilsio ir darbo režimą, padidinus fizinį aktyvumą, sumažinus stresą keliančius veiksnius, verta kreiptis į gydytoją. Ilgalaikiai nemigai gydyti geriau rinktis ne tabletes, o psichoterapiją“, – pataria K. Šnirpūnienė.

ILGAS MIEGAS IR KRAUJOSPŪDIS

Pasak vaistininkės, kenksmingas sveikatai ne tik per trumpas, bet ir per ilgas miegas. Ji pasakoja, kad kai kurie pacientai, nors ir miega labai ilgai, atėję į vaistinę ieško preparatų darbingumui padidinti, nes dienos metu nesijaučia pailsėję.

„Kartą kreipėsi moteris, kuri skundėsi kas rytą skaudančia galva, nors miega tikrai ilgai ir kietai. Pradėjus klausinėti apie kitas moters sveikatos bėdas paaiškėjo, kad ji turi aukštą kraujospūdį ir kas rytą po pusryčių išgeria trijų rūšių kardiologo paskirtus vaistus. Dieną, kol vaistai veikdavo, ji jausdavosi gerai, bet naktį vaistų veikimas baigdavosi, sti-

priai pakildavo spaudimas, tik ji miegodama to nejausdavo. Problema išsprendė, kai paaiškinome, kad nereikia nakčiai skiriamų vaistų nuo kraujospūdžio gerti ryte. Per ilgas moters miegas sutrumpėjo, o galvos rytais nebeskaudėdavo“, – dalijasi K. Šnirpūnienė.

Dėl miego sutrikimų būtina apsilankyti pas šeimos gydytoją, kuris pagal situaciją nukreips pas neurologą, psichologą, kardiologą ar pasiūlys kreiptis į specialią miego kliniką.

KIEK LAIKO PRALEISTI LOVOJE?

Vilniaus „Kardiolitos klinikų“ Neurologijos centro gydytoja neurologė Rasa Stonkutė-Gailienė sako dažniausiai susidurianti su pacientais, kenčiančiais nuo nemigos, knarkimo bei obstrukcinės miego apnėjos.

„Miego trukmės sumažėjimas viena valanda didina mirtingumo riziką 6 proc., tačiau miego trukmės padidėjimas 1 val. mirtingumo riziką didina net 13 proc. Miego trukmei ilgėjant dar labiau, mirtingumo rizika irgi išauga. Taigi persimiegoti yra dar pavojingiau nei miegoti per trumpai“, – aiškina ji.

Neurologė tęsia sakydama, kad miego trukmės pokyčiai taip pat didina riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, cukriniu diabetu, patirti kognityvinės veiklos sutrikimų. Miegant per trumpai – mažiau nei 6-7 val. – reikšmingai padidėja rizika patirti traumą darbe. Miegant mažiau nei 6 val., net 38 proc. padidėja sergamumas nutukimu. Tuo tarpu miegant 8 val. ir daugiau, reikšmingai padaugėja susirgimų osteoporoze. Sveikatai optimali miego trukmė suaugusiam žmogui yra 7-8 val.

SVARBUS IR MIEGO GILUMAS

Miegas skirstomas į lėtąjį (NREM) ir paradoksinį (REM) miegą, o lėtas miegas dalijamas dar į tris stadijas. Sveiko jauno suaugusio žmogaus miegas turėtų atrodyti taip: 1 stadija (negilus miegas) – 2-5 proc., 2 stadija – 45-55 proc., 3 stadija (gilus miegas) – 13-23 proc., o paradoksinis miegas – 20-25 proc.

„Miego kokybei ypač svarbi yra gilaus miego trukmė. Esant jo trūkumui, žmogus gali jaustis nuvargęs, pablogėja atmintis, gali atsirasti sunkumų susikaupti, mokyti, įsisavinti naują informaciją, taip pat gali susilpnėti imunitetas. Kadangi gilaus miego metu vyksta aktyvūs medžiagų apykaitos atliekų šalinimo iš smegenų procesai, jo stoka gali paskatinti Alzheimerio ar Parkinsono ligų vystymąsi. Miego stoka taip pat susijusi su hormonų pokyčiais, todėl didėja apetitas kaloringam maistui, gali didėti atsparumas insulinui ir būti skatinamas diabeto bei širdies-kraujagyslių ligų vystymasis. Dėl gilaus miego trūkumo santykinai padaugėja negilaus miego. Todėl net ir miegodamas, atrodytų, pakankamai valandų, žmogus gali jaustis labai išvargęs, nepailsėjęs ir mieguistas dienos metu“, – atkreipia dėmesį R. Stonkutė-Gailienė.

Anot jos, gilaus miego trukmė gali padidėti, jei žmogus gauna progą pailsėti po prieš tai kurį laiką buvusios miego stokos. Ilgiau trunkantis gilus miegas gali būti ir sėkmingai gydomos obstrukcinės miego apnėjos požymis, kai organizmas bando atsigriebti už prieš tai buvusį sutrikdytą miegą.

Paradoksinis miegas vaidina svarbų vaidmenį sapnuojant, atminties procesams, emocijų apdorojimui smegenyse, smegenų vystymuisi. Jo trukmė padidėja po intensyvesnio mokymosi ir atvirkščiai – esant paradoksinio miego trūkumui, žmogus gali patirti su atmintimi susijusių sunkumų.

„Paradoksinio miego trukmė gali pailgėti ir tais atvejais, kai žmogus prieš tai patyrė miego trūkumą. Retesniais atvejais tai gali būti susiję su tam tikrais miego sutrikimais, pvz., narkolepsija. Yra duomenų, jog paradoksinio miego trukmę gali trumpinti ir alkoholio vartojimas“, – akcentuoja R. Stonkutė-Gailienė.

Išmaniosios technologijos miegui stebėti tampa vis populiareesnės – jos gali būti naudingos stebint bendrą miego trukmę, su miegu susijusius įpročius, tačiau tiksliai įvertinti miego kokybės jos negali. Miego stadijas nustatyti galima tik registruojant ir vertinant smegenų aktyvumą polisomnografijos tyrimo metu.

„Jei žmogus įtaria, kad miegas yra sutrikęs, reikėtų apie tai pasikalbėti su gydytoju. Diagnozės, remiantis programėlėmis, nėra nustatomos. Kartais miegui stebėti skirtų programėlių ar įrenginių naudojimas sukelia priešingą efektą – žmogui padidėja nerimas, vėliau atsigulama miegoti, nes nuolat tikrinama programėlė, todėl miego kokybė nukenčia. Tada geriau jų išvis atsisakyti“, – reziumuoja neurologė.





DOVANA

PERKANT VEIDO
KREMĄ SU
DUMBLIAIS,
DOVANOJAME
VEIDO PRAUSIKLĮ24⁹⁹ €

DOVANA

ŽIEDĖ NEUROKOSMETINIS VEIDO KREMAS SU DUMBLIAIS, 50 ml **24⁹⁹ €**
DOVANA! ŽIEDĖ VEIDO PRAUSIKLIS SU ŠALTALANKIŲ
ALIEJUMI, 100 ml **14⁹⁹ €**
 KOSMETIKOS PRIEMONĖS

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!9⁹⁹ €

ŽIEDĖ SLYVŲ KAULIUKŲ ALIEJUS, 50 ml
 KOSMETIKOS PRIEMONĖ

DOVANA

PERKANT
VEIDO KAUKĘ,
DOVANOJAME
NAGŲ SERUMĄ
SU AVOKADŲ
KAULIUKŲ ALIEJUMI15⁹⁹ €

DOVANA

ŽIEDĖ VEIDO DRĖKINAMOJI KAUKĖ SU COQ10, 50 ml **15⁹⁹ €**
DOVANA! ŽIEDĖ NAGŲ SERUMAS SU AVOKADŲ KAULIUKŲ ALIEJUMI, 10 ml
13⁹⁹ €
 KOSMETIKOS PRIEMONĖS

-30%



AMBIO

Ambio Cinkas 15mg, 45 tablečių **5⁹⁹ 4¹⁹ €**Ambio Selenas ir cinkas su vitaminais, 90 tablečių **9⁹⁹ 6⁹⁹ €**Ambio Selenas, 90 tablečių **7⁹⁹ 5⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

-25%



BIODERMA

DERMATOLOGINĖS VEIDO ODOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

Prancūzijos dermatologijos laboratorija „Bioderma“ vadovaujasi požiūriu, kad odos priežiūros priemonės turi padėti atkurti natūralius biologinius procesus, šalinamos odos problemų kilmės priežastis bei simptomus. Priežiūros priemonės „Bioderma“ kuriamos tik iš grynų veikliųjų medžiagų, atliekančių svarbų vaidmenį odos veikloje. Dermatologai, pediatrai, vaistinėinkai – visi šie specialistai rekomenduoja priemones „Bioderma“ net ir jautriausia odą turintiems pacientams.

BIOLOGIJOS MOKSLAS DERMATOLOGIJAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-50% 13^{49€}

JAMIESON COLLAGEN ANTI-WRINKLE, 60 tablečių
 MAISTO PAPILDAS

- Per 28 dienas sumažėja raukšlų ir smulkių raukšlelių.
- Kovoja su senėjimo požymiais, gerina odos išvaizdą ir elastingumą.

GAMINAME VAISTUS PAGAL INDIVIDUALIUS RECEPTUS

- Atneškite gydytojo receptą iki 13 val.
- Atsiimkite pagamintą vaistą kitą darbo dieną.



VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS



PRIEMONĖS SLAUGAI

IKI -20%



SENI

SENI sauskelnės ir sauskelnės keičiamosios – orui laidžios, su kvapo kontrolės sistema.

SENI apsauginiai paketai – tai papildoma apsauga, kuri išsaugo švarią patalynę.

SENI kosmetika odos priežiūrai – nuvalo, naikina kvapą, maitina ir apsaugo odą nuo dirgiklių.

*Sauskelnės nesugadina nuolaidos su kompensacijų vaistų gausu.

PROFESIONALŲ UROLOGINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis.

INTYMAI HIGIENAI

IKI -30%



VAGISAN

KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS. Priemonės „Vagisan“ su natūralia pieno rūgštimi skirtos tinkamai lytinių organų priežiūrai. Rūgštis aplinka – būtina sąlyga, kad laktobacilos galėtų pačios gaminti pieno rūgštį ir daugintis. Taip užtikrinama optimali natūrali apsauga nuo infekcijos. Intymiosios higienos priemonės „Vagisan“ tinka kasdieni intymiajai higienai. Drėkinamasis makšties kremas „Vagisan“ sumažina tokius simptomus kaip sausumas, niežulys, deginimo pojūtis ir skausmas. Ovulės su pieno rūgštimi, skirtos natūraliai makšties pH terpei palaikyti ir atkurti.

TAVO INTYMAI SVEIKATAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis.

JAUTRIŲ DANTŲ PRIEŽIŪRAI

-30%



SENSODYNE

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Dantų pastos Sensodyne yra specialiai sukurtos žmonėms, turintiems jautrius dantis.

CHLT/CHMULBRA/0004/18a/JUL

EKSPERTO PAGALBA JAUTRIEMS DANTIMS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis.

IKI -25%



COREGA

Reguliariai naudojant valomąsias tabletes „Corega“, dantų protezai visada bus švarūs. Tinka pilniems ir daliniams dantų protezams.

- Sunaikina 99,9 % blogą kvapą sukeliančių bakterijų.

- Padeda pašalinti apnašas ir giliai įsigerusias dėmes.

- Suteikia dantų protezams gaivų mėtų kvapą.

- Veikia per 3 minutes.

Fiksuojamieji kramtai „Corega“ patikimai veikia iki 12 valandų ir neleidžia maisto likučiams įstrigti po protezais. CHLT/CHPLD/0009/16; 2018/10

VALGYK, JUOKIS IR GYVENK!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis.

-30%

-20%



BELLA

BELLA moterų higienos linija – orui laidžios kasdieniai įklotai, higieniniai paketai ir vatų gaminiai.

Higienos priemonės – plonos ir diskretiškos, su kvapo kontrolės sistema. BELLA BIO BASED – ekologiškos, su natūralaus bambuko paviršiumi. Vatų gaminiai – iš 100% medvilnės.

UŽTIKRINTA APSAUGA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis.

VELYM

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

VELYM dantų kremas kasdieni dantų priežiūrai ir natūraliam dantų balinimui.

Veiklioji balinamoji medžiaga BILYCON pagaminta 100% iš natūralios kilmės medžiagų.

VELYM WHITENING dantų šepetėlis dviejų ilgų šerėlių su aktyvuota bambuko anglimi dantų ir tarpdančių valymui.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis



SUAUGUSIŲJŲ IR VAIKŲ DANTŲ PRIEŽIŪRAI

-25%



ELGYDIUM DANTŲ PASTOS

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Dantų pastos „Elgydium“ siūlo specializuotus sprendimus dantų priežiūrai suaugusiems ir vaikams: dantų problemoms spręsti, dantis balinti, jautriems dantis, dantų apnašų kontrolei bei danties prevencijai.

„ELGYDIUM“ – TOBULAI JŪSŲ SĄSPENA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

-30%



INTIMOHELP

MEDICINOS PRIEMONĖS

Makšties tabletės „IntimoHELP“ atkuria ir palaiko fiziologinį makšties pH, slopina bakterijų plitimą. Priemonės sudėtyje esantis inulinas skatina natūralios bakterinės floros augimą, sugeria pagausėjusias išskyras, naikina blogą kvapą. Sudėtyje yra inulino, hialurono rūgšties ir vitamino E. Naudojimo instrukcija: naudokite po 1 makšties tabletę 2 kartus per savaitę.

Intymios higienos emulsija „IntimoHELP“ su rožių vandeniu ir hialurono rūgštimi padeda atkurti natūralią mikroflorą. Sudėtyje yra pieno rūgšties ir prebiotikų. Rožių vanduo veikia antiseptiškai ir ramina. Nedidelį kiekį emulsijos užtepti ant rankos, nuplauti intymias vietas, paskui nuskalauti šiltu vandeniu.

Drėgnos intymios higienos servetėlės „IntimoHELP“ su alavijų lapų ekstraktu ir D-pantenoliu švelniai valo ir nedirgina odos, užtikrina optimalią higieną bet kokiomis aplinkybėmis.

„INTIMOHELP“ – MOTERS INTYMIOS SVEIKATOS RECEPTAS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

DOVANA

PERKANT
MULTIVITAMINŲ
SIRUPĄ,
DOVANOJAME
KALCIO MIKSTURĄ

6⁹⁸ €

DOVANA



AMBIO MULTIVITAMINAI VAIKAMS (sirupas), 150ml **6⁹⁸ €**
DOVANA! AMBIO KALCIS VAIKAMS (mikstūra), 100ml **6⁹⁸ €**

MAISTO PAPILDAS

-30%

6^{97€} ~~98€~~


AMBIO MULTIVITAMINAI NĖŠČIOSIOMS IR MAITINANČIOMS, 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

- Foliatai padeda palaikyti motinos audinių augimą nėštumo metu, padeda palaikyti normalią kraujodarą;
- Riboflavinai, tiaminas, niacinas, vitaminas B6, vitaminas B12, biotinas ir magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą;
- Foliatai, riboflavinai, niacinas, pantoteno rūgštis, vitaminas B6, vitaminas B12 ir magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį;

-40%



AMBIO BIFIDOBAKTERIJOS VAIKAMS, 16 tablečių **6⁴⁵ 3⁸⁹ €**
AMBIO VITAMINAS D3, 400, 30 kapsulių **7⁹⁵ 4⁷⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

-50%

12^{49€} ~~24⁹⁸~~


JAMIESON MULTI FOR KIDS, 60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

- Tai vitaminų ir mineralų kompleksas vaikams.
- Sudėtyje yra ne tik vitaminų, bet ir mineralų: kalcio, vario, jodo, geležies.
- Pagaminta iš koncentruotų vaisių bei daržovių sulčių: pomidorų, morkų, apelsinų, spanguolių ir citrusinių vaisių.
- Keturių gardžių vaisinių skonių: vyšnių, apelsinų, citrinų ir aviečių.
- Tabletės smagių gyvūnų formų: liuto, dramblio, begemoto ir beždžionės.
- Galima vartoti nuo 4 metų.
- Pakuotės užtenka net 2 mėnesiams!

TEMPERATŪRAI MAŽINTI IR SKAUSMUI MALŠINTI

-25%

1^{46€} ~~1⁹⁵~~


AMEDIPLUS OVULIACIJOS TESTAS, N1

MEDICINOS PRIEMONĖ

-25%



AMEDIPLUS NĖŠTUMO TESTAI

MEDICINOS PRIEMONĖS

Materiali pastojus į organizmą ima gaminti specifinį hormoną „žmogaus chorioninį gonadotropiną“ (ŽG) tai yra glikoproteininis hormonas išskiriamas iš kiaušinio po apvaisinimo besivystančios placentos. Nėštumo testas Amediplus yra skirtas nustatyti ŽG šlapime. Kaip ir atliekant kitus testus, galutinę diagnozę nustato gydytojas. Testo tikslumas 99%, jautrumas 99%.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

Pasiūlymai galioja 2023 01 01 – 2023 01 31.

Leidinyje nurodytos maisto papildų, kosmetikos, medicininės paskirties prekių ir medicinos prietaisų kainos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortele, o vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai tarti kaip spaudos klaidą.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį/informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojiui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vktu.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt.

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakeičiamas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Daugiau informacijos NORFOS vaistinėje, tel. 8 800 10008, www.nvaistine.lt MAŽYLIUI IR MAMAI skirtas prekes ypatingomis kainomis greičiau ir patogiau užsisakykite internetinėje vaistinėje www.nvaistine.lt. Užsisakius prekių (išskyrus vaistinius preparatus) už 28,96 € ir daugiau – pristatymas NEMOKAMAI! Reklaminių tekstų parengimo data – 2022 10 16.



LAIMĖS VALANDOS



Darbo dienomis
8–9 val. ir 14–15 val.*

Šeštadieniais
8–9 val. ir 14–15 val.*

Sekmadieniais
14–15 val.*



-30%

Perkant 3**
ir daugiau prekių

** vaistams – 25 %

-25%

Perkant 2**
ir daugiau prekių

* vaistams – 20 %

-20%

Perkant 1* prekę

NORFOS vaistinėje akcijos „LAIMĖS VALANDOS“ metu perkant 1 prekę, taikoma 20 %, 2 ir daugiau prekių – 25 %, vaistams 20 %, 3 ir daugiau prekių – 30 % nuolaida, vaistams -25 %.

Taikomos momentinės 20 ar 25 % nuolaidos vaistams ir vaistiniams preparatams, o kitoms prekėms – 20, 25 ar 30 % nuolaidos, priklausomai nuo atitinkamo pirkimo metu įsigijamų prekių bendro kiekio. Nuolaida taikoma perkant pilnas prekių pakuotes, kurių kiekvienos vertė ne mažesnė nei 1,50 €. Prekės, perkant pagal kompensuojamąjį receptą, vardiniai, kartiniai vaistai skaičiuojami į krepšelį, tačiau nuolaida netaikoma.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujantioms prekėms. Nuolaidos netaikomos perkant pagal kompensuojamąjį receptą, pradinio maitinimo pieno mišinius, kartinius (gaminamius vaistinėje) ir vardinį vaistą, įsigyjant dovanų kuponus. Nuolaidos netaikomos perkant www.nvaistine.lt, neatsižvelgiant į tai, kad už prekes atsiskaitoma jas atsiimant vaistinėse. Nuolaidos netaikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Visos nuolaidos galioja tik su PC NORFA lojalumo kortele. Informacija apie kitas akcijas ir prekes, kurioms netaikoma akcijos „LAIMĖS VALANDOS“ nuolaidos, suteikiama kiekvienoje vaistinėje, el. paštu info@nvaistine.lt arba nemo-kamu telefonu 8 800 10008.

Informaciją apie kitu nei nurodyta laiku vykstančias LAIMĖS VALANDAS rasite www.nvaistine.lt.