

VAISTINĖ

TOP BALANDŽIO PASIŪLYMAI



-50%

AMBIO
AMBIO PATIRIANTIEMS ĮTAMPA, 20 kapsulių ~~7,88~~ 3,74 €
AMBIO NERVŲ SISTEMAI, 15 tablečių ~~5,98~~ 2,74 €
MAISTO PAPILDAS




-50% **4,24€** ~~8,48~~

AMBIO GERKLEI SU GYSLOČIU IR ČIOBRELIU,
(mikstūra be cukraus), 150ml
MAISTO PAPILDAS



IKI **-67%**

RAMI ŠIRDIS
MAISTO PAPILDAS
„Rami širdis“ – gausios sudėties dviejų poveikių maisto papildai, pripažinti Lietuvos vartotojų. Šios linijos preparatai pasižymi puikiai suderinta sudėtimi, kuri, be vitaminų ir mineralų, papildyta natūraliais augaliniais ekstraktais. Simptomiškai naudojami medicinoje. „Rami širdis“ maisto papildai padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir psichologinę funkciją, taip pat padeda mažinti nuovargį.
„Rami širdis cholesterolo balansui“ sudėtyje esantis patentuotas ABG25+® juodojo česnakų ekstraktas padeda palaikyti normalų cholesterolio kiekį kraujyje. Plunksnapių gudobelėlių ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Vaistinių valerijonų šaknų ekstraktas padeda atsipalaiduoti ir palaikyti normalią psichologinę būseną. Folio rūgštis, B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Sudėtis praturtinta berberinu.
RAMIAME KŪNE-RAMI ŠIRDIS



1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



ATEROLIP® COMPLEX CAPS
MAISTO PAPILDAS
„Aterolip® complex caps“ sudėtyje esantis ciberžolės ekstraktas padeda palaikyti normalų cholesterolio kiekį kraujyje, širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą, taip pat normalizuoti keptųjų lipidų kiekį. **Vartojimas:** rekomenduojama „Aterolip® complex caps“ paros dozė suaugusiems – 1 kapsulė per dieną.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

NUO **2,99€**

HJERTEMAGNYL
150 mg, 30 plėvelė dengtų tablečių **2,99€**
150 mg, 90 plėvelė dengtų tablečių **4,99€**
75 mg, 100 plėvelė dengtų tablečių **3,99€**
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veiklioji medžiaga: 1 tabletyje yra 75 mg arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties. **Indikacijos:** trombozės profilaktika, sergant išimine širdies liga, po miokardo infarkto, išeminio smegenų insulto ar praeinančio smegenų išemijos (kraujotakos sutrikimo) priepuolio. Vaistas slopina trombocitų (draujų plokštelių) agregaciją (sukibimą), todėl jo vartojama krešuliui, susidarantį iš sukibusių kraujui plokštelių, atsidavimo rizikai mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną, užsigeriant stikline vandens; įprastinė dozė ilgalaikiam vartojimui yra 75 – 150 mg viena kartą per parą. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, padidėjęs jautrumas kitiems salicilatams; jei neseniai kraujavo | virškinamajam traktui; yra polinkis į kraujavimą, ūminė pepsinė opa, sunkūs inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas. Šlapime padidėjęs oksalatų, jeigu yra trys paskutiniai mėnesiai, žindymas; vaikams ir paaugliams; jaunesniems kaip 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai vartoti, jei pacientas serga bronchų astma, šienlige, nosies polipais ar kita lėtine kvėpavimo takų liga, gydymui atsparia hipertenzija, podagra, esant gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stokai, sutrikusiai kepenų ir (ar) inkstų arba virškinimo trakto funkcijai, ilkus 10 parų iki chirurginės operacijos, senyvo amžiaus pacientams nepaartina ilgai vartoti dėl galimos kraujavimo ir virškinamojo trakto rizikos, esant vaikui ir paauglių virusinėms infekcijoms. Teksto parengimo data: 2022-04-07. LI-HJERT-2200001



NUO **1,99€**

NOLPAZA
20 mg, 7 skrandyje neiros tablečių **1,99€**
20 mg, 14 skrandyje neirių tablečių **2,99€**



NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veiklioji medžiaga, stiprumas. Kiekvienoje skrandyje neirioje tabletyje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidrato pavadinu). Terapinės indikacijos. Trumpalaikis suaugusių žmonių gastroezofaginio refliksų simptomų (ovz., rėmens, rūgšties regurgitacijos) gydymas. Dozavimas ir vartojimo būdas. Rekomenduojama pantoprazolo paros dozė yra 20 mg (viena tabletyje). Kad simptomai palengvėtų, tablečių gali reikėti gerti 2-3 dienas iš eilės. Kai simptomai visiškai išnyksta, gydymas turi būti nutraukiamas. Nepasitarus su gydytoju, gydymas negali trukti ilgiau kaip 4 savaites. Nolpaza nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nepakanka. Nolpaza 20 mg skrandyje neirių tablečių negalima kramtyti arba smulkinti, jas reikia nuryti nesmulkinčius užgeriant skysčiu prieš valgį. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nerekomenduojama pantoprazolo vartoti kartu su ŽIV proteazės inhibitoriais, pvz., atazanaviru, nelinaviru, nes kepsminga sunašėja tokiu vaistiniu preparatu biologinis priėmimas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pacientai turi būti pasiskaidinti, kad toliau išvairytės atvejais, jeigu priėmęs gydymoju netikėtai mažąja kūno svoris, yra anemija, kraujavimas iš virškinimo trakto, distagija, nuolatini vėmimas ar vėmimas krauju. Tokie simptomai gali palengvėti, todėl sunki liga gali būti diagnozuojama vėliau. Tokiu atveju būtina paneigti vėžinio susirgimo diagnozę; yra buvusi skrandžio opa arba operuotas virškinimo traktas; 4 savaites ar ilgiau nuolat vartojama nevirškinimo ar rėmens simptomus lengvinančių vaistinių preparatų; yra gelta, kepenų funkcijos sutrikimas arba kepenų liga; yra bet kokia kita sunki liga, bloginanti bendrąjį savijautą; pacientas vyresnis kaip 55 metų ir anksčiau simptomu nebuvo arba buvo simptomai paskelė. Simptomai gali pradėti lengvėti po maždaug vienos gydymo pantoprazolo dienos, tačiau kad rėmus išnyktų visiškai, vaistinio preparato gali tekti vartoti 7 dienas. Pantoprazolo pacientai negali vartoti profilaktikai. Dėl padidėjusio chromogranino A (CgA) koncentracijos gali būti sunkiau atlikti neuroendokrininių navikų tyrimus. Nolpaza tabletes yra sorbitolio ir natrto. Geriamojo vaistinio preparato sudėtyje esantis sorbitolis gali paveikti kitų kartu vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį priėmimą. Šio vaistinio preparato tabletyje yra mažiav kaip 1 mmol (23 mg) natrto, t. y. jis beveik neturi reikšmės. Reklamos teksto parengimo data. 2024-01-10.
PIRMAS ŽINGSNIS, KAI VARGINAI RĖMUO!



NUO 6⁹⁹ €



VOLTAREN EMULGEL

Voltaren Emulgel 23,2 mg/g gelis, 50g 6⁹⁹ €

Voltaren Emulgel 23,2 mg/g gelis, 150g 18⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Diklofenako dietilaminas. **Indikacijos.** Suaugusiesiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: skausmo ir uždegimo mažinimas, kai yra minkštųjų audinių sužalojimas (sausgyslių, raiščių, raumenų ir sąnarių trauma, pavyzdžiui, patempimas, sumušimas); vietinis minkštųjų audinių uždegimas (nugaros skausmas, tendinitas, bursitas). Tik suaugusiesiems (18 m. ir vyresniems): sąnarių (pvz., kelių) degeneracinės ligos sukeltam skausmui malšinti. **Vartojimas.** Vartoti ant odos. Tepti 2 k. per parą (geriausia ryte ir vakare). Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje. **Kontraindikacijos.** Alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitoms vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo; paskutinis nėštumo trimestras; jaunesniems kaip 14 m. paaugliams. **Specialūs įspėjimai.** Netepiti ant pažeistos odos, atviros žaizdos, odos išbrimo ar egzemos vietos, didelių odos plotų, saugoti, kad nepatektų į akis ir ant gleivinės, pvz., burnos, nenuryti. Jeigu pasireiškia bėrimas, gydymą nutraukti; nenaudoti su oro nepraleidžiančiais tvarščiais. Sudėtyje yra propilenglikolio ir butilhidroksitoleno. Teksto parengimo data 02/2023. Prekių ženklai priklauso GSK arba GSK turi jiems licenciją. ©2023 GSK arba licencijos turėtojas. NP-LT-VOLT-23-0001

-40%



BIOFARMACIJA LINIJA

MAISTO PAPILDAI

Išsirkinkite Jums reikalingiausią: nuovargiui mažinti, energijai, sportui, imunitetui, raumenims, nervų sistemai, širdžiai, kraujospūdžiui, imunitetui, odai, stipriems nagams ir plaukams, kaulams. Sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, be kvapiųjų medžiagų. Dauguma mineralų – citratų formos, tai organizmo lengvai pasisavinama ir gerai toleruojama forma. Magnis išgaunamas iš Negyvosios jūros. Pagaminta Izraelyje. **GAMTOS ĮKVEPINTI MINERALAI IS IZRAELIO!**

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

SLENKA PLAUKAI? PASITIKĖK VAISTO GYDOMĄJĄ GALIĄ!

NUO 14⁹⁹ €



BEOTEBAL

BEOTEBAL 10 mg, 30 tablečių 14⁹⁹ €

BEOTEBAL 10 mg, 60 tablečių 24⁹⁹ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

BEOTEBAL 10 mg tabletes. Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino.

Terapinės indikacijos. „BEOTEBAL“ priklauso B vitaminų preparatų grupei ir vartojamas biotino trūkumo gydymui suaugusiesiems. Biotino trūkumas gali sukelti plaukų retėjimą, plaukų slinkimą, nagų ir plaukų augimo sutrikimus bei padidėjusį trapumą, dermatitą (odos uždegimą, kuriam paprastai būdingas niežulys ir paraudimas) aplink akis, nosi, burną, ausis ir kirkšnis, konjunktyvitą (akies junginės uždegimą, dėl kurio akys atrodo paraudusios), nuovargio, parastėžijos (nenormalaus odos pojūčio, pasireiškiančio tokiais simptomais kaip dilgčiojimas, perštėjimas, šalimas, deginimas, tirpimas) simptomus. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiesiems, įskaitant senyvus pacientus, vartoti 10 mg biotino, ty, 1 tabletę „BEOTEBAL“ per parą. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jeigu yra numatoma atlikti laboratorinius tyrimus, turite pasakyti savo gydytojui arba laboratorijos darbuotojams, kad vartojate arba neseniai vartojote „BEOTEBAL“, nes biotinas gali turėti įtakos tokių tyrimų rezultatams. Atsižvelgiant į tai, koks tyrimas atliekamas, dėl biotino poveikio tyrimų rezultatai gali būti klaidingai didesni arba klaidingai mažesni. Reklamos teksto parengimo data 2022-04.

*Slenkantis, silpnai, trapūs plaukai yra viena iš biotino trūkumo išraiškų. „Beotebel“ yra nereceptinis vaistas skirtas biotino trūkumo gydymui.

DRĖKINAMIEJI AKIŲ LAŠAI

-40%



STARAZOLIN SAUSOMS IR SUDIRGUSIOMS AKIMS Natrio hialuronatas / deks-pantenolis, 10 ml (be konservantų) 14⁹⁷ 8⁹⁸ €

STARAZOLIN HYDROFORTE Natrio hialuronatas, 10 ml (be konservantų) 14⁹⁷ 8⁹⁸ €

STARAZOLIN HYDROBALANCE PPH Natrio hialuronatas, 2 x 5 ml 11⁴⁸ 6⁸⁹ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

Drėkinamoji, raminamoji ir apsauginė poveikio lašai, palengvinantys akies paviršiaus regeneraciją.

„Starazolin sausoms ir sudirgusioms akims“ akių lašai skirti padėti sumažinti simptomus, esant lengvam ar vidutiniam sunkumo sausų akių sindromui ir (arba) sudirgintam akies paviršiui. **Lašai drėkina akį, stabilizuoja ašarų plėvelę ir regeneruoja akies paviršių.**

„Starazolin Hydroforte“ – intensyviai drėkinantys akių lašai, skirti vartoti esant sunkiam sausų akių sindromui, o „Starazolin Hydrobalance PPH“ suteikia veiksmingą ir ilgalaikį akių drėkinimą kiekvieną dieną.

Lašai rekomenduojami: esant akių aplinkos dirgikiliams; sumažėjus mirksėjimo dažniui; kai yra nepakankama ašarų gamyba arba jų sudėties pokyčiai. „Starazolin sausoms ir sudirgusioms akims“ ir „Starazolin Hydrobalance PPH“ gali naudoti žmonės, nešiojantys visų tipų kontaktinius lęšius. Prieš vartojant „Starazolin Hydroforte“ reikia išimti kontaktinius lęšius. Įprasta dozė – 1–2 lašai 3 kartus per parą į kiekvienos akies junginę maišėlį.

NUO 12⁹⁷ €



DETRALEX

500 mg, 30 plevėle dengtų tablečių 12⁹⁷ €

500 mg, 60 plevėle dengtų tablečių 22⁹⁷ €

500 mg, 120 plevėle dengtų tablečių 42⁹⁹ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

SUDĖTIS: Vienoje plevėle dengtoje tabletėje yra 500 mg mikronizuotos ir išgrynintos flavonoidų frakcijos (atitinka 450 mg diosmino ir 50 mg flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną). **INDIKACIJOS:** Apatinių galūnių venų nepakankamumo simptomai: kojų sunkumo, skausmo bei ankstyvo rytinio nedarumo, lengvinimas. Simptomų, susijusių su hemorojais paūmėjimu, lengvinimas. **DOZAVIMAS IR VARTOJIMO METODAS:** Rekomenduojama dozė yra 2 tabletės per parą – viena vidurdienį, antra – vakare, valgio metu. Paimėjusio hemorojaus atveju – 6 tabletės per parą pirmas 4 dienas, po to 4 tabletės per parą 3 dienas. **NĖŠTUMAS IR ŽINDYMO LAIKOTARPIS** Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Nėštumas laikantis atsargumo reikėtų vengti vartoti detralex nėštumo metu. **Žindymo laikotarpis** kadangi nėra duomenų apie vaisto išsiskyrimą į motinos pieną, žindyti gydymo laikotarpiu nerekomenduojama. **KONTRAINDIKACIJOS:** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **ĮSPĖJIMAI:** Pastartikite su gydytoju arba vaistininku prieš pradėdami vartoti detralex. Jeigu Jums yra simptomų, susijusių su hemorojais paūmėjimu, detralex galima vartoti trumpai. Jei simptomai neišnyksta, kreipkitės į gydytoją. Pagalbinės medžiagos: be natrio. Teksto peržiūros data: 2021-09 REKLAMOS PARENGIMO DATA: 2024-03-14 **PAJUSK KOJŲ LENGVUMĄ SU DETRALEX!**

KELIO SĄNARIO OSTEORTRITUI GYDYTI

19⁹⁹ €



PIASCLIDINE® 300 mg, 30 kietųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 100 mg neesterefikuo avokadų aliejaus, 200 mg neesterefikuojo sojų aliejaus. **Terapinės indikacijos:** papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui, pvz.: skausmui ir apsunskintam judėjimui, lengvinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vieną kapsulę per parą reikia nuryti visa, užgeriant pilna stikline vandens, valgio metu. Kapsulių kramtyti negalima. Įprastinė gydymo trukmė yra 3–6 mėnesiai. Gydymą galima tęsti tol, kol vaistas gerai toleruojamas ir simptomai vis dar lengvėja. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu yra alergija žemės riešutams arba sojai. **Specialūs įspėjimai:** vaistas skirtas tik suaugusiesiems. Atsiradus bet kokių kepenų ar tulžies organų sutrikimo požymių ar simptomų (pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas, nuovargis, apėtito praradimas, odos ir akių pageltimas (gelta), šlapimo patamsėjimas), alerginės reakcijos požymių ar simptomų (dilgėlinė, niežėjimas ir (arba) odos išbrimas/paraudimas, veido patinimas ir (arba) kvėpavimo pasunkėjimas), kraujo krešėjimo sutrikimo požymių ar simptomų (raudonų ar purpurinių odos dėmių, savaiminių mėlynių, dėmių kraujosruvų ar gleivinės kraujavimas) gydymą nutraukite ir tuoj pat kreipkitės į savo gydytoją. Pacientams, kurie yra jautrūs žemės riešutų baltymams, yra didesnė rizika pasireikšti sunkioms reakcijoms į sojų preparatus. Reklamos teksto parengimo data 2021-08-02 **PIASCLIDINE MAŽINA SKAUSMĄ IR PALENGVINA JUDĖJIMĄ!**

NUO SLOGOS

NUO 3⁹⁹ €



XYMELIN

XYMELIN, 1 mg/ml, nosies lašai (tirpalas), 10 ml 3⁹⁹ €
 XYMELIN MENTHOL, 1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 4⁹⁹ €
 XYMELIN, 1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 4⁹⁹ €

NERCEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. Indikacijos: rinito ar sinusito sukeltos nosies gleivinės paburkimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: nosies purškalas „Xymelin“ ar „Xymelin Menthol“ vryresniems kaip 10 m. vaikams ir suaugusiems: 1-2 įkvepiamosios nosies lašai 2-3 kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bei kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, uždaro kampo glaukoma, sausasis nosies gleivinės uždegimas, jei hipofizės ar smegenų operacija atlikta po nosi arba burną, jaunesniems kaip 10 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: sergant cukriniu diabetu ar esant hipertiroidizmui vartoti atsargiai. Sergant sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis ar ligomis, kurių metu susiaurėja kraujagyslės, vartoti tik su gydytojo leidimu. Ilgiau kaip 7 paras šio vaisto vartoti draudžiama. Dažnai ir ilgai vartojant „Xymelin“, gali atsinaujinti nosies gleivinės paburkimas, susilpnėti jo slopinimas ir atsirasti nosies užgulimas. Reklamos teksto parengimo data 2020-06-16. LY/XYL0/0619/0003

NUO 3⁹⁹ €



NALGESIN S

Natrio naproksenas, 10 dengtųjų tablečių 3⁹⁹ €
 Natrio naproksenas, 20 dengtųjų tablečių 5⁹⁹ €

NERCEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: natrio naproksenas – 275 mg. Indikacijos: galvos, dantų, mėnesinių, sąnarių, raumenų, potrauminiams, pooperaciūnams skausmams malšinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 18 metų vaikams įprastinė paros dozė skausmui malšinti – 550-1100 mg. Iš pradžių vartojama 550 mg, vėliau – po 275 mg kas 6-8 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bei kuriai sudedamajai preparato medžiagai, buvusi alerginė reakcija, kurią sukėlė nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, aktyvi ar atsinaujinti skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, kraujavimas iš virškinamojo trakto, sunkus širdies nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: naproksenu gydymą pacientai, sergantys epilepsija ar porfirija, kuriam buvo ar yra virškinamojo trakto sutrikimų, ypač opinis kolitas ar Krono liga, privalo stebėti gydytojas. Naproksenu draudžiama vartoti, jei yra sunki nesena žaizda arba iki didelės operacijos liko mažiau kaip 48 valandos. Reklamos teksto parengimo data: 2022 12 07. MALŠINA SKAUSMĄ IR UŽDEGIMĄ.

4⁹⁹ €



NEO-ANGIN

NEO-ANGIN, 1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg, 24 kietosios pastilės
 NEO-ANGIN be cukraus, 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg, 24 kietosios pastilės

NERCEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas. Vienoje kietojoje pastilėje yra: „neo-angin“ – 1,20 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio, 0,60 mg aminmetakrezolio ir 5,90 mg levomentolio, „neo-angin“ be cukraus – 1,20 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio, 0,60 mg aminmetakrezolio ir 5,72 mg levomentolio. Indikacijos: „neo-angin“ sukelia vietinį mikrobų naikinantį ir skausmą mažinantį poveikį. 2,4-dichlorbenzilo alkoholis ir aminmetakrezolis turi dezinfekuojamąjį, levomentolis – šaldantįjį ir skausmą mažinantį poveikį. „neo-angin“ kietosios pastilės vartojamos vietiniam ryklės gleivinės uždegimo gydymui. Jeigu per 3-4 dienas lėtai savijauta nepagerėja arba net pablogėja, kreiptis į gydytoją. Vartojimo būdas ir dozavimas. Suaugę žmonės, paauguliai ir vyresni nei 6 metų vaikai kas 2-3 valandas turėtų sučiulpti po vieną kietąją pastilę. Didžiausia paros dozė yra 6 pastilės. Nepasitarus su gydytoju, „neo-angin“ vartoti ilgiau nei 3-4 dienas negalima. Kontraindikacijos. Alergija bei kuriai veikliajai arba bei kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „neo-angin“. Reklamos teksto parengimo data 2024-03-12.

NUO 4⁹⁹ €



OLFEN

OLFEN, 1 % gelis, 50 g 4⁹⁹ €
 OLFEN, 1 % gelis, 100 g 8⁹⁹ €
 OLFEN, 23,2 mg/g gelis, 50 g 5⁹⁹ €
 OLFEN, 23,2 mg/g gelis, 100 g 9⁹⁹ €

NERCEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas. 1 g gelio yra 10 mg diklofenako natrio druskos arba 33,2 mg diklofenako dietilamino, atitinkantis 20 mg diklofenako natrio druskos. Terapinės indikacijos. Suaugusiems ir 14 metų bei vyresniems paauguliams skirtas: lokalaus skausmo simptomams malšinti, esant uminams (šepetims, palemėms ar sumušimams po bukus, traumoms; minkštųjų audinių uždegimui slopinti (esant tendinitui, bursitui), 14 metų ir vyresniems paauguliams vaistinis preparatas skirtas trumpalaikiam gydymui. Dozavimas ir vartojimo metodas. Atsižvelgiant į gydymo kono dalies dydį, 2-4 g (maždaug 1-2 pilnus antpirštius) „Olfen 1%“ gelio tepama 3-4 kartus per parą ir tolygiai paskirstoma (trininti nereikia). Neviršyti 16 g gelio paros dozės. Gydymo trukmė priklauso nuo terapinių indikacijų bei vaistinio preparato poveikio. Nepasitarus su gydytoju, suaugusiems „Olfen 1%“ gelio negalima tepti ilgiau kaip 14 parų, o paauguliams – ilgiau kaip 7 paras. Jeigu per 7 dienas simptomai išlieka arba būklė pasunkėja, reikia kreiptis į gydytoją. „Olfen 23,2 mg/g“ reikia vartoti ant odos 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Atsižvelgiant į gydymo paželsos vietos dydį, reikia nuo viršaus iki apačios nušluostyti dydžio dydžio kiekio, atitinkantis 1-4 g gelio, kuris atitinka 20-80 mg diklofenako natrio druskos. Didžiausia paros dozė yra 6 g gelio, kuris atitinka 185,6 mg diklofenako dietilamino (atitinkantis 100 mg diklofenako natrio druskos). Vartojimo trukmė priklauso nuo simptomų bei pagrindinės ligos. Be gydytojo patarimo „Olfen“ negalima vartoti ilgiau kaip 1 savaitę. Jeigu per 3-5 dienas simptomai nepagerėja arba net pablogėja, būtina gydytojo konsultacija. Kontraindikacijos. „Olfen“ vartoti negalima: jeigu yra alergija diklofenakui arba bei kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu Jums kada nors anksčiau pavartojus acetilsalicilo rūgšties arba kitų NVNU (pvz., ibuprofeno) buvo sutrikęs kvėpavimas (astma, bronchų spazmas), dilgėlinė sloga, veido arba liežuvio patinimas; esant odos arba gleivinių atviroms žaizdoms, uždegimui arba infekcijai, taip pat sergant egzema; paskutiniuoju nėštumo trimestru; jaunesniems kaip 14 metų vaikams ir paauguliams. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės reikalingi, jei sergate astma, šerlige, nosies gleivinės patinimu ar lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis, lėtinėmis kvėpavimo takų infekcijomis arba yra padidėjęs jautrumas kitiems skausmą mažinantiems vaistams ir bei kuriems vaistams nuo reumato; taip pat pacientams, kurie yra alergiški kitoms medžiagoms ir kuriems būna odos reakcija, niežulys arba dilgėlinė. Kai „Olfen“ vartojamas dideliam odos plotui ir ilgai gydyti, negalima paneigti galimo sisteminio šalutinio poveikio. „Olfen“ galima vartoti tik ant nepažeistos ir sveikos odos. Venkite patekimo į akis bei kontakto su gleivinėmis. Nesinaudokite ortonepraliziniais vaistais. „Olfen“ vartojimą reikia nutraukti, jei atsiranda odos bėrimas. Vartojami šio vaisto venkite saulės spindulių, taip pat nesinaudokite soliariumu. Saugokite, kad vaikai negalėtų paliesti šiuo vaistu gydymo odos vietų. „Olfen 1%“ vartoti atsargiai, jeigu inkstai, širdis ar kepenų funkcija sutrikusi, arba turite ar buvo anksčiau skrandžio opa, žarnyno uždegimas ar esate linkęs į kraujavimą. Tęskite peržiūros data. „Olfen 1%“: 2022-06-28; „Olfen 23,2 mg/g“: 2023-01-19. OLF-LI-00055. Reklaminis medžiagos parengimo data 2023 m. liepa.

RANDŲ PROFILAKTIKAI IR PRIEŽIŪRAI

-30%



DERMATIX® ULTRA

DERMATIX® ULTRA, gelis, 6 g 23⁹⁹ 16⁷⁹ €
 DERMATIX® ULTRA, gelis, 15 g 49⁹⁹ 34⁹⁹ €

MEDICINOS PRIEMONĖS.

Vietinio vartojimo silikono gelis šviežiai užgyjusių žaizdų randų susiformavimo profilaktikai ir apsaugai nuo iškilų, matomų randų atsiradimo. „Dermatix“ Ultra“ yra vietiška naudojamas skaidrus silikono gelis. Jis greitai išdžiūva ir padeda išlaikyti odos drėgmės balansą, skirtas odos randams, susidariusiems po chirurginių procedūrų, nudegimų bei kitų sužalojimų, prižiūreti. Gelis „Dermatix“ Ultra“ lygina, minkština ir mažina randus, naikina niežulį ir diskomforto jausmą rando vietoje, taip pat sumažina dėl randų atsiradusios odos spalvos nelygumus. Gelis „Dermatix“ Ultra“ naudojamas keloidiniams ir hipertrofiniams randams (susiformavusiems po bendrųjų chirurginių procedūrų, trauminių žaizdų ar nudegimų) gydyti ir ju profilaktikai, kai žaizda bei odos paviršius jau sugijo. Jis taip pat gali būti vartojamas, esant raudonos spalvos randams, kurie greitai gyja; dažniausiai žaizdoms, kurios užgyja prieš dvejus metus. Naudokite du kartus per dieną vieną kartą ryte ir vieną vakare ne trumpiau kaip 2 mėnesius. Didelius randus gali tekti gydyti ilgiau. Geliai „Dermatix“ Ultra“ išdžiūvus, galima naudoti kosmetiką. „Dermatix“ Ultra“ taip pat tinka naujoti ir vaikams. Kada negalima vartoti gelio „Dermatix“ Ultra? • „Dermatix“ Ultra“ negalima naudoti ant atvirų ar šviežių žaizdų. • „Dermatix“ Ultra“ negalima tepti ant gleivinių arba ant prie akių. • „Dermatix“ Ultra“ negalima tepti ant kitų odą gydančių priemonių nepasitarus su gydytoju. Koks gelimas gelio „Dermatix“ Ultra“ šalutinis poveikis? Reikia atsvaigti gelis gali sukelti odos paraudimą, skausmą ar sudirginimą. Jei rūpinatės dėl šių ar kitų šalutinių reiškinių, pasitarkite apie tai su gydytoju arba vaistininku. Daugiau apie gelį „Dermatix“ Ultra“ galite sužinoti iš vaistininko arba gydytojo. Reklamos teksto parengimo data: 2023 02. DER-2023-0001

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

NAGŲ GRYBELIUI GYDYTI

19⁹⁹ €



ONYTEC® 80 mg/g vaistinis nagų lakas, 3,3 ml

NERCEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: 1 g vaistinio nagų lako yra 80 mg ciklopiroksolo. Terapinės indikacijos: „Onytec“ gydymas lengvos ar vidutinio sunkumo grybelių sukeltos suaugusiųjų nagų ligos, neapimamos nagų matricos, t. y. mėnuliuo (balto nagų pusrėmelio). Vartojimo būdas ir dozavimas: naudoti ant odos, tepti tik nagus ir odą aplink juos. Rekomenduojama 1 kartą per parą patepti pažeista nagą (nagus), aplink esančią odą bei paviršių. Nenuplauti mažiausiai 6 valandas. Nagų lako „Onytec“ nereikia pašalinti tirpikliais ar silijuojančiomis priemonėmis. Gydymą tęsti, kol problema išnyks ir atauga sveikas nagas. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija ciklopiroksoliui arba bei kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Ne jaunesniems nei 18 metų pacientams. Specialūs įspėjimai: vengti preparato patekimo į akis ar ant gleivinių „Onytec“ naudojamas tik išorškai. Gydymą nagų nepoliurkite ir nenaudokite kitų nagų kosmetikos priemonių. Šis preparatas yra degus, saugokite nuo karščio ir audijos liepsnos. Reklamos teksto parengimo data 2024-02-20. NEGAISIŠ LAIKO NEEFETYVIAM GYDYMUI. RINKIS VAISTA „ONYTEC“!



NUO **1⁹⁹** €



IBUPROFEN ZENTIVA 400 MG

10 pėvele dengtų tablečių **1⁹⁹** €
20 pėvele dengtų tablečių **3⁹⁹** €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Kiekvienoje pėvele dengtoje tableteje yra 400 mg ibuprofeno. **Terapinės indikacijos.** Ibuprofen Zentiva skirtas trumpalaikiam simptominiam lengvo ar vidutinio stiprumo skausmo, migrenos, pirminės dismenorėjos ir (arba) karščiavimo mašinimui suaugusiems ir paaugliams. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** 1 tablete 1-3 kartus per parą mažiausiai 4-6 valandų intervalu. Didžiausia paros dozė negali viršyti 3 tablečių. **Kontraindikacijos.** Vartoti draudžiama: jeigu yra alergija ibuprofeniui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; yra alergija aspirinui arba kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; yra ar buvo pasikartojanti skrandžio arba plonosios žarnos opa arba kraujavimas; jeigu praėlyje yra buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; yra kraujodaros ar kraujo krešėjimo sutrikimų; yra sunkus širdies, kepenų ar inkstų nepakankamumas; yra sunki dehidratacija; yra aktyvus kraujavimas; yra paskutiniai 3 nėštumo mėnesiai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Specialių atsargumo priemonių reikia imtis, esant: virškinimo trakto ligoms, įskaitant lėtinę uždegiminę žarnyno ligą (opinis kolitas, Krono liga); širdies nepakankamumui ir hipertenzijai; sutrikusiai inkstų funkcijai; kepenų disfunkcijai; kraujo krešėjimo sutrikimams; alergijai, šienligei, lėtiniam nosies gleivinės paburkimui, adenoidams, lėtinei obstrukcinei plaučių ligai arba astmai; iš karto po didelės apimties chirurginės intervencijos. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024 m. kovo mėn. ID 000574195

NUO **2⁹⁹** €



BRONTEX

BRONTEX, 15 mg/5 ml, sirupas, 100 ml **3⁹⁹** €
BRONTEX, 30 mg, 20 tablečių **2⁹⁹** €
BRONTEX, 7,5 mg/ml, geriamieji lašai, tirpalas, 100 ml **4⁹⁹** €
BRONTEX, 60 mg snypščiosios tabletės, 10 tablečių **4⁹⁹** €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 5 ml sirupo yra 15 mg, 1 tableteje yra 30 mg, 1 ml tirpalo (4 lašai) yra 7,5 mg, 1 snypščiojoje tableteje yra 60 mg ambrosolio hidroklorido. **Terapinės indikacijos:** kvėpavimo takų sekreto skystinimas pacientams, sergantiems ūmine arba lėtine bronchitu ar plaučių liga, kurios metu sutrinka išsiskyrimas ir šalinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** 2-5 m. vaikams 3 kartus per parą po 7,5 mg ambrosolio (1 ml lašai arba 2,5 ml sirupo); 6-12 m. vaikams – 2-3 kartus per parą po 15 mg (2 ml lašai arba 5 ml sirupo, arba po 1/2 tabletes); suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams – 2-3 kartus per parą po 30 mg (4 ml lašai arba 10 ml sirupo, 1 tablete arba 1/2 snypščiosios tabletės) arba inhaliuoti lašai 1-2 kartus per parą po 15-22,5 mg (po 2-3 ml lašų). Sergantiems sunkiu inkstų veiklos nepakankamumu dozė mažinti ir (arba) vartoti rečiau. Ambrosolio nepatariama vartoti ilgiau negu 4-5 paras. Jei simptomai negerėja arba po 5 parų pablogėja, reikalinga gydytojo konsultacija. Snypščiasias tabletes reikia ištrinti stiklinėje vandens. **Kontraindikacijos:** „Bronxet“ (visu formu) negalima vartoti jaunesniems kaip 2 m. vaikams, tablečių – jaunesniems kaip 6 m. vaikams, snypščiojū tableteje – jaunesniems kaip 12 m. vaikams. „Bronxet“ negalima vartoti, jei padidėjęs jautrumas ambrosoliui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** reikalingi, jei sutrikus bronchų motorika ir padidėjus gleivių sekrecijai, sutrikusi inkstų veikla, sergant sunkia kepenų liga, buvus postopinei opai, nustadus fruktozės netoleravimą, sergantiems cukriniu diabetu (vartojant sirupą). Pasireiškus odos išbėrimui (įskaitant gleivines, pvz., burnos, gerklės, nosies, akių, lyties organų, pažaiždimus), „Bronxet“ vartojimą reikia nutraukti ir kreiptis į gydytoją. „Bronxet“ 60 mg snypščiojū tablečių sudėtyje esantis benzilo alkoholis gali sukelti alerginių reakcijų. Vartoti atsargiai nėščioms moterims ir žindydviems. Dėl sudėtyje esančio sorbitolio šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas gimtas fruktozės netoleravimas. „Bronxet“ tablečių (dėl sudėtyje esančios laktozės) ir snypščiojū tablečių (dėl sudėtyje esančių laktozės ir maltodekstrino) negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas galaktozės netoleravimas, visiškas laktozės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Reklamos teksto parengimo data:** 2023 m. rugpjūtis. BR0-11-0026

GREITAIJ PAGALBA NUO KOSULIO VISAI ŠEIMAI!

NUO ALERGIJOS

NUO **5⁹⁹** €



FENKAROL 25 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. Vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma. Fenkarol 25 mg tabletes. **Kokybinė ir kiekybinė sudėtis.** Kiekvienoje tableteje yra 25 mg kvifenadino hidroklorido. **Terapinės indikacijos.** Simptominiis alerginės slogos (su konjunktyvitu ar be jo), dermatito (egzemos, dilgėlinės) ir niežulio gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Vartoti per burną. Fenkarol tabletes yra geriamos iš karto po valgio. Suaugusiems žmonėms. Dozė yra 25-50 mg (1-2 tabletes) 2-4 kartus per dieną. Didžiausia paros dozė yra 200 mg. Gydoma 10 - 20 parų. Prireikus gydymo kursą galima pakartoti. Jeigu per 3 dienas. Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Vaikams ir paaugliams. Vyresniems negu 12 metų vaikams dozė yra 25 mg (1 tablete) 2 - 3 kartus per dieną. Gydoma 10 - 15 parų. Prireikus gydymo kursą galima pakartoti. Fenkarol netinka vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas kvifenadino hidrokloridui ar preparate esantiems pagalbinėms medžiagoms. Pirmasis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Atsargiai vaistinio preparato reikia vartoti ligoniams, sergantiems sunkiomis širdies ir kraujagyslių sistemos, virškinimo trakto, kepenų ir (arba) inkstų ligomis. Nevartoti jeigu, nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltozės stygius. Pirmąjį nėštumo trimestrą kvifenadino vartoti draudžiama. Antruoju ir trečiuoju nėštumo trimestrais kvifenadino vartoti nerekomenduojama. Pradžioje įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieša ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu tariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar įstatybinėms vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujama@vkk.lt ir arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkk.lt. Reklamos teksto parengimo data: 2020 sausio mėn. 06 d.

6⁹⁹ €



LINEX® 16 kietųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje „Linex“ kapsulėje yra ne mažiau kaip 1,2 x 107 KSV liofilizuotų gyvybingų bakterijų (Lactobacillus acidophilus (sp.L.gasser), Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium). **Indikacijos:** „Linex“ vartojamas viduriavimui, pilvo pūtimui ar kitokiam virškinimo sutrikimui gydyti kaip pagalbinė priemonė. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** mažiems kaip 2 metų vaikams gerti po 1 kapsulę 3 kartus per parą (kapsulės sutrikimui išberti į šauktąjį ir sumaišyti su skysčiu); 2-12 metų vaikams – po 1-2 kapsules, o vyresniems nei 12 metų pacientams – po 2 kapsules 3 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** „Linex“ vartoti negalima, jei yra padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pieno baltymams ar bet kuriai vaisto pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** specialiu atsargumo priemonių reikia, jei išmatose yra kraujo ar gleivių; jei sergama lėtine liga arba imuninė sistema susilpnėjusi (pvz., jei yra ŽIV, AIDS). „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Seimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius, Lietuva. BS212097785. Teksto patvirtinimo data: 2022 12 09.

NORMALIZUOJA ŽARNYNO VEIKLĄ

NUGAROS, SPRANDO SKAUSMAMS IR RADIKULITUI GYDYTI

7⁹⁹ €



KAPSİKAM® vaistinis šildomasis tepalas, 50 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo yra 50 mg dimetilсульfoxido, 30 mg raceminio kamparo, 30 mg terpentino eterinio aliejaus, 20 mg benzilokotolono, 2 mg mentilamido. **Terapinės indikacijos:** vietinis raumenų ir sąnarių skausmo mašinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** ant skaudamos vietos, naudojant aplikatorių, užtepama 1-3 g tepalo 2-3 kartus per parą, atsivėlijant 1 skausmo intensyvumą. Norint ilgiau išlaikyti šildantį tepalo poveikį, ant skaudamos vietos reikia uždėti tvarstį. Didžiausia vienkartinė dozė – 5 g. Didžiausia paros dozė – 9 g. Po kiekvienos procedūros reikia nusiplauti rankas šaltu vandeniu su muilu. Vartoti ant odos. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Odos opos, žaizdos bei ligos, kai yra pažeistas odos paviršius. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Nerekomenduojama naudoti karštų procedūrų (piršties, vonios ir kt.) prieš ar iš karto po Kapsikam pavartojimo. Kapsikam tepalo negalima tepti ant pažeistos odos, atvirų žaizdų, egzemos pažeistų vietų. **Vietinis rinkodaros teisės turėtojas atstovas:** AB „Grindeks“ filialas, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius. **Reklamos teksto parengimo data:** 2023-10-06. **MANO JĖGA JUDEJIME!**

KRAUJOTAKAI IR ATMINČIAI

9⁹⁹ €



GINKOBIL 120 mg, 40 kietųjų kapsulių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 120 mg rafinoto ir kiekybiškai įvertinto ginkmedžių lapų sausuojo ekstrakto. **Indikacijos:** lengvo ir vidutinio smegenų kraujotakos nepakankamumo, pasireiškiančio susilpnėjusia atmintimi ir dėmesio koncentracija, spengimu ar ūzmu ausyse, svajonių ar galvos skausmu, simptominiams gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** gerti po 1 kapsulę 2-3 kartus per dieną (atitinka 160-240 mg dienos dozė). **Kontraindikacijos:** vartoti negalima, jei yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Ginkobil“ medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** kadangi dviviskiačių ginkmedžių lapų ekstrakto poveikis depresinei nuotakai ir galvos skausmui, nesujusius su silpnoprotytes sindromu, kol kas nėra pakankamai ištyrta, medikamentu gydyti šiuos simptomus galima tik laikantis visų būtinų atsargumo priemonių. Teksto peržiūros data 2017-05-22

VEIKSMINGAI GERINA SUTRIKUSIĄ KRAUJOTAKĄ!

2⁹⁹ €



OMEP UNO 20 mg, 14 skrandyje neirių kietųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje skrandyje neierioje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo. **Indikacijos:** „Omep Uno“ vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refluksio simptomų gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** rekomenduojama vartoti vieną kapsulę per parą. Kapsulės reikia nuryti nepažeistas ryte, užsigeriant puše stiklinės vandens. **Kontraindikacijos:** „Omep Uno“ negalima vartoti kartu su neflinaviru, jeigu yra padidėjęs jautrumas omeprazolui (o taip pat pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, ezomeprazolui) ar bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Sudėtyje yra sacharozės. Sandoz Pharmaceuticals d. d. filialas, Seimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius, Lietuva. B52212191495. Reklamos teksto parengimo data: 2022.12.19. **STIPRI PAGALBA NUO RĖMENS!**

SKAUDANČIAI GERKLEI

9⁹⁹ €



POLOVOX

8,75 mg/dozėje burnos gleivinės purškalkas (tirpalas), 15 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: vienoje dozėje (3 išpuškimuose) yra 8,75 mg flurbiprofeno. **Indikacijos:** skaudančios gerklės simptomų, tokių kaip gerklės skausmas, skausmingumas, sunkumas nuryti ir palinimas, trumpalaikiam malšinimui 18 metų ir vyresniems suaugusiems. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusieji nuo 18 metų ir vyresni: viena dozė (3 išpuškimai) į gerklę kas 3-6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 dozių per 24 valandas. Per įpusėjimą neįkvėpti. PoloVox skirtas vartoti tik trumpą laiką. **Kontraindikacijos.** PoloVox vartoti negalima pacientams, kuriems: yra alergija (padidėjęs jautrumas) flurbiprofenui, ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo ar aspirinui, yra arba buvo du ar daugiau skrandžio opos arba kraujavimo opa arba žarnų opos atvejai; anksčiau po nesteroidinių vaistų nuo uždegimo vartojimo pasireiškė kraujui krešėjimo arba kraujavimo sutrikimų; jeigu yra sunkių širdies, inkstų ar kepenų sutrikimų; paskutiniai 3 mėnesiai. Šio vaisto negalima vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paauguliams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vartojant mažiausią veiksmingą vaistinio preparato dozę trumpiausių simptomų kontrolei būtina laiką, galima sumažinti nepageidaujamus poveikius. Pasitarti su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti PoloVox, jeigu jau yra vartojamas bet kuris kitas nesteroidinis vaistas nuo uždegimo ar aspirinas; jei yra bakterinės tonzilitų uždegimas; jeigu pacientas sergo arba sirgo astma; sisteminė raudonajai vilkige ar mišria jungiamojo audinio liga; hipertenzija; žarnyno ligomis (opinis kolitas, Krono liga); jeigu yra širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų; paciento nešėja pirmuosius 6 mėnesius arba maitina krūtimi. Reklamos teksto parengimo data – 2020 m. 07 mėn.

NUO REFLUKSO

-30%



NEOBIANACID

NeoBianacid pediatric, granulės, 36 paketėliai **24⁹⁷ 17⁴⁸ €**
NeoBianacid, 14 tablečių **12⁹⁷ 9⁰⁸ €**
NeoBianacid, 45 tabletes **26⁹⁷ 18⁸⁸ €**

MEDICINOS PRIEMONĖS

- Malšina rėmenį, skausmą, gastrozofaginį refluksą
- Malšina funkcinės dispepsijos simptomus
- Saugo skrandžio ir stemplės gleivinę
- Gali būti vartojamas profilaktiškai, kai sudirginama skrandžio gleivinė
- 100% natūralus
- tinka vartoti nėštumo, žindymo metu

SVORIO MAŽINIMUI

19⁹⁹ €



ORLISTAT POLPHARMA

60mg 42 kietosios kapsulės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Vienoje kietojoje kapsulėje yra 60 mg orlistato. **Indikacijos:** Orlistat Polpharma yra skirtas antsvorio turintiems (kūno masės indeksas $KMI \geq 28 \text{ kg/m}^2$) suaugusiems žmonėms svorį mažinti. Vartojant šį vaistinį preparatą reikia laikytis šiek tiek sumažinto kaloriningumo ir sumažinto riebiųjų kiekių dietos. **Dozavimas:** rekomenduojama Orlistat Polpharma dozė yra viena 60 mg kapsulė tris kartus per parą. Per 24 valandas galima išgerti ne daugiau kaip tris 60 mg kapsules. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; kartu taikomas gydymas ciklosporinu; lėtinės malabsorbcijos sindromas; cholestazė; nėštumas; žindymas; kartu taikomas gydymas varfarinu arba kitais geriamaisiais antikoaguliantais. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pacientas turi tvirtai laikytis rekomenduotos dietos. Jei orlistatas vartojamas kiekvieno maitinimosi metu arba valgomas riebus maistas, gali dažniau pasireikšti virškinimo trakto simptomų tikimybė. Gydymas orlistatu gali sutrikdyti riebaluose tirpių vitaminų (A, D, E ir K) absorbciją. Todėl reikia gerti polivitaminų papildą. Cukriniu diabetu sergantys asmenys, prieš pradėdami gydymą Orlistat Polpharma turi pasitarti su gydytoju. Pacientai, vartojantys Orlistat Polpharma kartu su vaistinėmis preparatais hipertenzijai arba hipercholesterolemijai gydyti, turi pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Amjodaroną, levotiroksiną vartojantys pacientai, prieš pradėdami gydymą Orlistat Polpharma, turi pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Praešta apie kraujavimo iš tiesiosios žarnos atvejus pacientams, vartojantiems orlistatą. Jeigu taip nutinka, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Jeigu prasideda stiprus viduriavimas, geriamieji kontraceptikai gali nesukelti pageidaujamo poveikio, todėl rekomenduojama naudoti papildomas kontracepcijos priemones. Pacientai, sergantys inkstų ligomis, epilepsija prieš pradėdami gydymą Orlistat Polpharma, turi pasitarti su gydytoju. Teksto paruošimo data: 2018-04. **SUMAŽINK SVORĮ SAUGIAI.**

NUO SKAUSMO

3⁹⁹ €



PERSEN

PERSEN, 40 dengtų tablečių.

PERSEN FORTE, 20 kietųjų kapsulių.

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas. PERSEN tablečių yra 35 mg valerijonų šaknų sausosio alkoholinio ekstrakto, 17,5 mg melisų lapų sausosio ekstrakto, 17,5 mg pipirmėčių lapų sausosio ekstrakto. PERSEN FORTE kapsulėje yra 87,5 mg valerijonų šaknų sausosio alkoholinio ekstrakto, 17,5 mg melisų lapų sausosio ekstrakto, 17,5 mg pipirmėčių lapų sausosio ekstrakto. **Indikacijos.** Vartoti laikinos nedidelės nervinės įtampos mažinimui, pasunkėjusio užmigimo atvejais. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** PERSEN: Nervinės įtampos mažinimui reikia gerti po 3-4 PERSEN tab. 3 kartus per parą. Pasunkėjusio užmigimo atveju reikia gerti 3-4 PERSEN tab. 1 kartą per parą 1 val. prieš miegą. Tabletes reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai nuo valgymo laiko. **PERSEN FORTE:** Nervinės įtampos mažinimui reikia gerti po 2 PERSEN FORTE kaps. 2 kartus per parą. Pasunkėjusio užmigimo atveju reikia gerti 2 PERSEN FORTE kaps. 1 kartą per parą 1 val. prieš miegą. Kapsules reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai nuo valgymo laiko. PERSEN ir PERSEN FORTE pradeda veikti palaipsniui, kad gydymo veiksmingumas būtų optimalus, vaisto rekomenduojama gerti mažiausiai 14 dienų. Gydymo trukmė neribojama. PERSEN ir PERSEN FORTE nėra skirtas jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** PERSEN tablečių sudėtyje yra laktozės ir sacharozės. PERSEN FORTE kapsulių sudėtyje yra laktozės. Reklamos teksto parengimo data: 2022 m. gruodžio mėn. ID000557059 **PERSEN- NURAMINK SAVO RŪPESČIUS!**

4⁹⁹ €



MILGAMMA N, 20 minkštųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 40 mg bentofitamins (riebaluose tirpus vitamino B1 darinio), 90 mg piridoksinio hidrochlorido (vitamino B6) ir 250 mikrogramų cianokobalamino (vitamino B12). **Terapinės indikacijos.** B1, B6, B12 vitaminų trūkumo šalinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems žmonėms: po 1 kapsulę 3-4 kartus per parą. Kai liga lengva ir jei vaistinis preparatas padeda, per parą pakanka 1-2 kapsulių. Vartoti per burną. Kapsulę reikia praryti po valgio nesukramtyta, užsigeriti truputi skysčio. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, žemės riešutams, sojoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas sojos arba sojų pupelių produktams, pvz., lecitinui. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vartojama ilgiau negu 6 mėn. gali sukelti neuropatiją. Sąveika su kitais vaistinėmis preparatais ir kitokia sąveika. Gydymosiomis dozėmis vartojamas vitaminas B6 gali susilpninti levodopos poveikį. Be to, pastebėta sąveika su izoniazidu, D penicilaminu ir cikloserinu. **Nepageidaujamas poveikis.** Imūninės sistemos sutrikimai. Reti: alerginės reakcijos (odos išbėrimas, dilgėlinė). **Pakuotė.** 20 minkštųjų kapsulių. **Registruotojas.** „Worwag Pharma GmbH & Co. KG“, Vokietija. Teksto peržiūros data: 2021-10-18. **Nereceptinis vaistinis preparatas. Reklamos teksto parengimo data.** 2023-01-03. **„MILGAMMA“ – JUDEK LAISVAI!**



ODOS IR LŪPŲ PŪSLELINEI GYDYTI

13⁹⁹ €

ACIC 200 MG, 25 tabletės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje tablete yra 200 mg acikloviro. **Indikacijos:** vaistas skirtas anksčiau gydytojo diagnozuotos pasikartojančios lūpų pūslelinės gydymui suaugusiems žmonėms. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** gerti po vieną tabletę 5 kartus per parą kas 4 val. Gydymo trukmė - 5 paras. **Kontraindikacijos:** „Acic“ naudoti negalima esant padidėjusiam jautrumui acikloviro, valacikloviro arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** po viruso pažeistos vietos palietimo, reikia tuoj pat nusiplauti rankas. Iki tol reikia stengtis neliesiti kitų kūno vietų, ypač akių. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Seimyniškių g. 3A LT-09312 Vilnius, Lietuva. BS221209791. Reklamos teksto patvirtinimo data: 2022.12.09. **UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSLELINEI SU „ACIC“!**

ODOS IR LŪPŲ PŪSLELINEI GYDYTI

4⁹⁹ €

ACIC 5% kremas, 2 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: viename grame „Acic“ 5% kremo yra 50 mg acikloviro. **Indikacijos:** vaistas skirtas odos ir lūpų pūslelinei, kurią sukelia Herpes simplex virusas, gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** pažeista odos vieta tepi plonu sluoksniu 5 kartus per parą kas 4 val. **Kontraindikacijos:** „Acic“ naudoti negalima esant padidėjusiam jautrumui acikloviro, valacikloviro, propilenglikoliui arba bet kurioms pagalbinėms „Acic“ medžiagoms. Kremo negalima tepti ant gleivinės (burnos, akių, makšties). **Specialūs įspėjimai:** vaisto draudžiama nuryti. Specialių atsargumo priemonių reikia susilpnėjus imunitetui. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Seimyniškių g. 3A LT-09312 Vilnius, Lietuva. BS221209791. Reklamos teksto patvirtinimo data: 2022.12.09. **UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSLELINEI SU „ACIC“!**

METANTIESIEMS RŪKYTI

18⁹⁹ €

NIQUITIN


NIQUITIN, 14 mg/24 val., 7 transderminiai pleistrai

NIQUITIN, 21 mg/24 val., 7 transderminiai pleistrai

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 transderminiam pleistre „NiQuitin“, 14 mg/24 val.“ yra 78 mg nikotino (5,1 mg/cm²); 1 transderminiam pleistre „NiQuitin“, 21 mg/24 val.“ yra 114 mg nikotino (5,1 mg/cm²). Terapinės indikacijos: „NiQuitin“ naudojamas nikotino abstinencijos simptomams, įskaitant nenumaldomą norą rūkyti, lengvinti. Jei yra galimybė, metus rūkyti, „NiQuitin“ turėtų būti naudojamas kartu su elgsenos programa. Vartojimo būdas ir dozavimas: 1 pleistras naudojamas 1 kartą per parą, geriausia vos pabudus, ir laikomas ant odos 24 valandas. Gydymo programa sudaryta iš 3 etapų, kurių reikia laikytis nuosekliai. Kiekvieno etapo pleistrai yra skirtingų stiprumų. Naudojamas suaugusiems žmonėms, įskaitant senyvo amžiaus pacientus; jei surūkote daugiau kaip 10 cigarečių per parą, reikia gydytis tokia tvarka: pirmąjį etapą (6 savaites) naudojami pleistrai „NiQuitin“, 21 mg/24 val.; antrąjį etapą (2 savaites) naudojami pleistrai „NiQuitin“, 14 mg/24 val.; trečiąjį etapą (2 savaites) naudojami pleistrai „NiQuitin“, 7 mg/24 val.“. Jei surūkoma 10 ar mažiau cigarečių per parą, gydymą pradeda nuo antrojo etapo: antrąjį etapą (6 savaites) naudojami pleistrai „NiQuitin“, 14 mg/24 val.“; trečiąjį etapą (2 savaites) naudojami pleistrai „NiQuitin“, 7 mg/24 val.“. Specialūs įspėjimai: jeigu jūs esate 12–17 m. amžiaus; jeigu esate nėščia, ketinate pastoti arba žindote kūdikį; sutrikusi jūsų širdies veikla ar kraujotaka, įskaitant širdies nepakankamumą ir stabilią krūtinės angina, arba yra padidėjęs kraujospūdis; sergate ar anksčiau sirgote dermatitu arba kita odos liga; sergate sunkia kepenų arba inkstų liga; sergate skrandžio opalige arba yra sustiprėjusi skydliaukės funkcija; sergate cukriniu diabetu ir vartojate insuliną; jums diagnozuotas antinksčių navikas; jeigu kada nors patyrėte traukulius ar esate nuo jų gydomi; vartojate kofeiną, teofiliną, imipraminą, pentazociną, fenacetiną, fenilbutazoną, takriną, klomipraminą, vaistų nuo bronchinės astmos ar padidėjusio kraujospūdžio; jeigu jums yra skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opalige arba stemplės ar ryklės uždegimas. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija nikotinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu nerūkote arba rūkote rečiau; jaunesniems kaip 12 m. vaikams; jeigu neseniai jūs išliko miokardo infarktas ar insultas; jeigu jums pasireiškia greitas, neritmiškas širdies plakimas, nestabili ar progresuojanti krūtinės angina ar neprognozuojanti krūtinės angina. Reklamos teksto parengimo data 2021-02-03. **MESK RŪKYTI SU „NIQUITIN“!**

NUO GERKLĖS SKAUSMO

6⁹⁹ €

INOVOX MENTHOL 2mg/0,6mg/1,2mg, 24 kietosios pastilės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje pastilėje yra 2 mg lidokaino hidroklorido, 0,6 mg amilmetakrezolio ir 1,2 mg 2,4-dichlorobenzolio alkoholio. **Indikacijos:** gerklės skausmo malšinimas, vietinis antiseptinis gerklės ir burnos ertmės uždegiminių būklių (pvz., paraudimo, patinimo) gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: po 1 kietąją pastilę kas 2-3 val. ir kai reikia, bet ne daugiau kaip 8 kietąsias pastiles per parą (vaikams – ne daugiau kaip 4 pastiles). Vartoti ant burnos gleivinės. Kietąją pastilę reikia lėtai sučiulpti laikant burnoje, bet ne už skruosto. Vaisto nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 5 paras. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti jaunesniams kaip 12 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: jei simptomai neišnyksta ilgiau kaip 2 paras, sunkėja, arba atsiranda nauji simptomai, reikia įvertinti paciento klinikinę būklę. Atsargiai vartoti ūminę ligą sergantiems, nusilpusiems pacientams. Nevartoti esant ūmioms burnos ir gerklės žaizdoms, prieš valgant ar atsigeriant. Astma sergantys pacientai turi būti prižiūrimi gydytoju. Sudėtyje yra levomentolio terpenų, gliukozės, sacharozės, saulėlydžio getonijo ir kosulio raudonojo. Reklamos teksto parengimo data 2022-06-09. **INOVOX. EFEKTAS – JAU PO 1 MINUTĖS!**

INOVOX. EFEKTAS – JAU PO 1 MINUTĖS!

2⁴⁹ €

AMBROLAN, 30 mg, 20 tablečių

Ambroksolio hidrochloridas

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tablete yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido. „Ambrolan“ yra labai veiksmingas vaistas, kurio veiklioji medžiaga ambroksolis yra bromheksino metabolitas. „Ambrolan“ mažina susikaupusių skreplių klampumą, gerina virpamojo epitelio aktyvumą ir taip skatina sekretą pasišalinti iš bronchų, skystina pelynyų klampias gleives ir palengvina jų išskyrimą, vartojamas sergantiesiems ūmine arba lėtine bronchų ir plaučių liga, kurios metu sutrinka sekreto išskyrimas ir šalinimas, kvėpavimo takų sekretui skystinti. **Vartojimas.** Suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams prastinė dozė yra 1 tablete tris kartus per parą. Vartojama po valgio, užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Ambrolan“ vartoti negalima, jeigu yra: alergija ambroksoliui; skrandžio ir (arba) žarnyno opa; pirmuosius 3 nėštumo mėnesius ir maitinant krūtimi; jaunesniems nei 12 metų vaikams. Kiekvienoje tablete yra 100 mg laktozės (pieno cukraus). Įtektos peržiūros data 2016-08-29. Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas: „G.L. Pharma GmbH“, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. **NUGALEKITE KOSULĮ!**



PERŠALIMO IR GRIPO SIMPTOMAMS LENGVINTI

NUO 4⁹⁹ €



GRIPEX
 GRIPEX, 325/30/10 mg, 12 plėvele dengtų tablečių 4⁹⁹ €
 GRIPEX, 325/30/10 mg, 24 plėvele dengtos tabletės 7⁹⁹ €
 GRIPEX, 500/30/15 mg, 10 plėvele dengtų tablečių 5⁹⁹ €
 GRIPEX, 500/30/15 mg, 20 plėvele dengtų tablečių 8⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tableteje „Gripex 500/30/15 mg“ yra 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrohlorido, 15 mg deksmetorfanohidrobromido. 1 tableteje „Gripex 325/30/10 mg“ yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrohlorido, 10 mg deksmetorfanohidrobromido. Terapinės indikacijos: peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Gripex 500/30/15 mg“ suaugusiems po 1–2 tabletes 3–4 kartus per parą. „Gripex 325/30/10 mg“ suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams įprasta dozė yra 2 tabletes 3–4 kartus per parą, kas 4–6 val. tada, kada reikia. Neviršyti vienkartinės 2 tablečių dozės. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. Kontraindikacijos: negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šių vaistų sudedamajai medžiagai; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; smarkiai padidėjęs kraujospūdis; chronišis alkoholizmas. Negalima vartoti kartu su monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI) arba anksčiau negu 2 savaites baigus juos vartoti. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: esant sutrikusiai kepenų funkcijai, sergant alkoholizmu, sutrikus mitybai yra didesnis kepenų toksinio pažeidimo pavojus. Gydanis šiais vaistais, nepatirtina vartoti alkoholio. Jeigu per 3 dienas jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2023-10-10. „GRIPEX“. VEIKIUI!

NUO GERKLĖS SKAUSMO IR UŽDEGIMO

NUO 5⁹⁹ €



DECATYLEN™

DECATYLEN™, 0,25 mg/0,03 mg, 20 kietųjų pastilių 5⁹⁹ €
 DECATYLEN, 0,25 mg/0,03 mg, 40 kietųjų pastilių 9⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje pastilėje yra 0,25 mg dekalvino chlorido, 0,03 mg cínchokaino hidrohlorido. **Indikacijos:** burnos ir ryklės uždegimo (gingivito, opinio ir aftinio stomatito, faringito) vietinis gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams kas 2 val. lėtai sugultui po 1 pastilę, vaikams nuo 4 iki 12 metų kas 3 val. lėtai sugultui po 1 pastilę. Kai uždegimo simptomų sumažėja, vartoti po 1 pastilę kas 4 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai ar ketvirtniamis amonio dariniams (pvz., benzalkonio chloridui). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Decatylen sudėtyje yra sorbitolis. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktūzės netoleravimas. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurius išsilavinį poveikį. **Reklamos teksto parengimo data 2023-02-17. DCLT-11-00102**
KAI REIKIA NE TIK MALŠINTI SIMPTOMUS, BET IR GYDYTI GERKLĖS SKAUSMĄ.

9⁹⁹ €



TONZIRIN 8,75 mg, 24 kietosios pastilės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

TONZIRIN 8,75 mg kietosios pastilės: yra vaistas, kurio veiklioji medžiaga yra flurbiprofenas. Šis vaistas priklauso nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) grupei ir turi skausmą ir karščiavimo mažinanti bei priešūždegiminį poveikį. TONZIRIN pastilės yra skirtos suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams, siekiant palengvinti skaudančios gerklės simptomus, tokius kaip gerklės skausmas, skausmingumas ir patinimas, sunkumas nuryti. Prieš pradėdami vartoti TONZIRIN, turite atidžiai perskaityti informacinį lapelį. Jei per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, turite kreiptis į gydytoją. Be to, TONZIRIN vartoti draudžiama, jei esate alergiškas flurbiprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, taip pat jei turite tam tikrų sveikatos problemų, tokių kaip astma, skrandžio ar žarnų opa, kraujavimas iš virškinimo trakto, sunkūs širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimai, ir kt. Taip pat yra specialių atsargumo priemonių, kurias reikia laikytis vartojant šį vaistą. Jei pasireiškia bet kokios odos simptomai arba kitokios alerginės reakcijos požymiai, turite nedelsiant nutraukti TONZIRIN vartojimą ir kreiptis į gydytoją. Šio vaisto negalima vartoti paskutinius tris nėštumo mėnesius. Prieš vartojant šias kietąsias pastiles pirmuosius šešis nėštumo mėnesius ir žindymo laikotarpiu, būtina pasitarti su gydytoju. Vairavimas ir mechanizmų valdymas. Tyrimų poveikio gebėjimai vairuoti ir valdyti mechanizmus nebuvo atlikti. Tačiau sąvaiguly ir regos sutrikimai yra galimi šalutiniai poveikiai pavartojus nesteroidinių vaistų nuo uždegimo. Jeigu tokių pasireiškė, nevažiuokite ir nevaldykite mechanizmo. **Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams.** Jaunesniems kaip 12 metų vaikams vartoti negalima. **Viena kietąja pastile įdėkite į burną ir lėtai čiulpkite.** Čiulpimo metu nuolat judinkite kietąją pastilę burnos ertmėje. Pastilių gydymas poveikis turėtų pasireikšti po 30 minučių. Jeigu reikia, vartokite po vieną pastilę kas 3–6 valandas. Vartoti daugiau kaip 5 kietąsias pastiles per 24 valandas negalima. **Tekstas paskutinį kartą peržiūrėtas 2024-01-12**

PERŠALIMO IR GRIPO SIMPTOMAMS LENGVINTI

NUO 5⁹⁹ €



GRIPEX THERMAL

GRIPEX THERMAL, 1000/100/12,2 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 8 paketai 7⁹⁹ €
 GRIPEX THERMAL, 1000/100/12,2 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 12 paketai 9⁹⁹ €
 GRIPEX THERMAL, 650/50/10 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 8 paketai 5⁹⁹ €
 GRIPEX THERMAL, 300/20/5 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 12 paketai 7⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: (1 paketai) „Gripex Thermal 300/20/5 mg“: 300 mg paracetamolio, 20 mg askorbo rūgšties, 5 mg fenilefrino hidrohlorido; „Gripex Thermal 650/50/10 mg“: 650 mg paracetamolio, 50 mg askorbo rūgšties, 10 mg fenilefrino hidrohlorido; „Gripex Thermal 1000/100/12,2 mg“: 1000 mg paracetamolio, 100 mg askorbo rūgšties, 12,2 mg fenilefrino hidrohlorido. Terapinės indikacijos: peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. „Gripex Thermal 300/20/5 mg“: 6–12 m. vaikams: 1 paketai kas 4–6 val.; suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams: 1–2 paketai kas 4–6 val. „Gripex Thermal 650/50/10 mg“ arba „Gripex Thermal 1000/100/12,2 mg“: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. vaikai: po 1 paketai kas 4–6 val. Nepaartai su gydytoju, nevertokite ligai nei 7 d. Nevertokite didesnę nei rekomenduojama dozę. Pasakykite gydytojui, jei jūsų inkstų ar kepenų veikla sutrikusi ar nuolat vartojate alkoholi. Kontraindikacijos: alergija veikliosios arba pagalbinės medžiagos, taip pat vaistams, kurių sudėtyje yra simpatomimetinių aminių; širdies ligos, padidėjęs kraujospūdis; gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės arba metemoglobino reduktazės stoka; sunkus kepenų ar inkstų nepakankamumas; tirotozikoze; šlapimo užšalimas arba leotromocitoma; zidovudino, MAO inhibitorių vartojimas; nėtumas ar koldio žindymas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarite su gydytoju, jei sergate kepenų arba inkstų nepakankamumu, bronchine astma, prostatos hiperplazija, Reino sindromu (rankų ar kojų pirštų, ausies kraus ir nosies galiko iššyškimas, dažnai sukeltas šaltio arba emocinio streso), širdies liga, padidėjusiu kraujospūdžiu, cukriniu diabetu. Reklamos teksto parengimo data 2022-11-15. „GRIPEX THERMAL“. VEIKIUI.

SKAUSMUI MALŠINTI

3⁴⁹ €



MIALDEX 25 mg, 10 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Mialdex yra vaistas skausmui malšinti, priklausantis nesteroidinių vaistų nuo uždegimo grupei (NVNU). **Mialdex** veiklioji medžiaga yra deksketoprofenas (deksketoprofeno trometamolio pavidalu). **Mialdex** vartojamas lengvo ir vidutinio stiprumo raumenų skausmui, skausmingų mėnesinių, dantų skausmui malšinti. **Vartojimas:** visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką, kaip vartoti dozę yra pusė tabletės (12,5 mg) kas 4–6 valandas arba 1 tabletė (25 mg) kas 8 valandas, bet ne daugiau kaip 3 tabletes per parą (75 mg). **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) deksketoprofeno trometamoliui arba bet kuriai pagalbinei Mialdex medžiagai. **Įspėjimai:** jeigu sergate arba sirgote inkstų, kepenų ar širdies ligomis, širdies nepakankamumu, jeigu sergate kraujodaros sistemos ligomis; jeigu sergate sisteminė raudonąja vilkligė ar mišriosiomis jungiamąjo audinio ligomis; jeigu sergate arba sirgote virškinimo trakto ligomis pasikonsultuokite su gydytoju. **Galimas šalutinis poveikis:** šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Reklamos teksto parengimo data: 2022.11.17

NUO PLEISKANOJIMO

NUO 7⁹⁹ €



KETOCONAZOL-RATIOPHARM

KETOCONAZOL-RATIOPHARM, 60 ml 7⁹⁹ €
 KETOCONAZOL-RATIOPHARM, 120 ml 12⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Viename mililitre šampūno yra 20 mg ketoconazolo. **Terapinės indikacijos.** Galvos seborėjos ir pleiskanėjimo (pityriasis capitis) gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Ketoconazol-ratiopharm šampūnas vartojamas paaugliams ir suaugusiems pacientams. Plauant galvą plaukai trinami Ketoconazol-ratiopharm šampūnu ir paliekama jo poveikiui 3–5 min. prieš nuplaunant vandeniu. Gydymas. Galvos oda ir plaukai gydoma du kartus per savaitę. Gydymo kurso trukmė – 2–4 savaitės. Profilaktika. Norint išvengti simptomų pasikartojimo, plaukai ir galvos oda šio šampūno turi būti plaujami kartą per savaitę arba kas antrą savaitę. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Reikia saugotis, kad šampūno nepatektų į akis. Patekus į akis, jas reikia gerai praplauti vandeniu. Pleiskanėjimas ir seborėjinis dermatitas dažnai būna susiję su plaukų slinkimu, tai, nors ir retai, tačiau taip pat pasitaiko vartojant Ketoconazol-ratiopharm šampūną. Pacientams, ligai vartojantiems vienoje odos vietose vietiniam gydymui kortikosteroidais, rekomenduojama toki gydymą palengva per 2–3 savaites užbaigti, kad vartojant Ketoconazol-ratiopharm šampūną būtų išvengta ligos pasikartojimo. Šio vaistinio preparato kvapiosios medžiagos sudėtyje yra a-izometiljonono, benzilo alkoholio, benzilbenzoato, benzilcinamato, ctrialio, ctronelolio, kumarino, eugenolio, geraniolio, heksilcinamolio, izoeugenolio, linalolio, kurie gali sukelti alerginių reakcijų. Kiekvienam šio vaistinio preparato mililitre yra 100 mg natrio laurisulfato, kuris gali sukelti vietinių odos reakcijų (gelsiančių ar sukeliančių deginimo pojūtį) arba sustiprinti odos reakcijas, kurias sukėlė ant tos pačios vietos pavartoti kiti preparatai. **Reklaminės medžiagos parengimo data:** 2024 m. kovas. OT-11-00073



NUO 4⁹⁹ €



MAGNE B₆ 470 mg/5 mg, 60 dengtų tablečių 6⁹⁹ €

MAGNE B₆ geriamasis tirpalas, 10 ampulių 4⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 tablete yra 470 mg magno laktato dihidrato bei 5 mg piridoksino hidroklorido (vitamino B₆); Vienoje 10 ml ampulėje yra 186 mg magno laktato dihidrato, 936 mg piridoksino hidroklorido. Terapinės indikacijos: **MAGNE B₆** skirtas magno trūkumo sukeltiems simptomams gydyti. Magno trūkumas gali sukelti tam tikrus simptomus ar jų derinius: nervingumą, irzlumą, nedidelį nerimą, trumpalaikį nuovargį, nedidelius miego sutrikimus; mėšlungį, dilgčiojimo pojūtį. Vartojimo būdas ir dozavimas: tabletes reikia nuryti užgeriant stikline vandens. Suaugusiems paros dozė yra 6–8 tabletės, kurias reikia išgerti per 2–3 kartus vaistą. Geriamojo tirpalo ampulės turinys ištrinamas pusę stiklinės vandens. Suaugusiems paros dozė yra 3–4 ampulės, kurias reikia išgerti per 2–3 kartus tarp valgytų. Vaikams ir kūdikiams, svėriantiems daugiau kaip 10 kg, paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno svorio arba 1–4 ampulės per 2–3 kartus tarp valgytų. Kontraindikacijos: preparato vartoti negalima, jeigu: yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei **MAGNE B₆** medžiagai; sergate tam tikra inkstų liga; vartojama levodopa. Specialūs įspėjimai: nešūti ir žindymo laikotarpiu vaista galima vartoti tik tada, jei nurodo gydytojas. **MAGNE B₆** dengtos tabletės skirtos suaugusiems žmonėms ir vyresniems nei 6 metų vaikams. **MAGNE B₆** geriamojo tirpalo negalima duoti mažiau kaip 10 kg svėriantiems (iki 1 metų) kūdikiams. Jeigu sergate inkstų, širdies ir kraujagyslių liga, prieš pradėdami vartoti **MAGNE B₆** preparatą, reikia pasitarti su gydytoju. Piktinaudžiant vitaminu B₆, pakenkiami jutiminiai periferiniai nervai: atsiranda tirpimas ir padėties jautimo pablogėjimas, drebulys galinėse ir koordinacijos sutrikimai. Nustojus vartoti vaistą, pazeidimai paprastai išnyksta. Reklamos teksto parengimo data 2022-08. Z208_SB_MAGNE_B6_V01_LT

MAGNE B₆ PADEŠ IVEIKTI MAGNIO TRŪKUMĄ!

6⁹⁹ €



NASOMETIN 50 mikrogramų/dozėje nosies purškalo, 60 dozių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje išpurškiamoje dozėje yra 50 mikrogramų mometazono furato. Indikacijos: vaistas skirtas anksčiau gydytojo diagnozuoto sezoninio alerginio rinito simptomams gydyti. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama dozė yra 2 įpurškimai į kiekvieną nosies lauką 1 kartą per parą. Kai ligos simptomai tampa kontroliuojami, poveikiai palaikyti dozė galima sumažinti iki 1 įpurškimo į kiekvieną nosies lauką 1 kartą per parą. Kontraindikacijos: „Nasometin“ negalima vartoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai ar bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, taip pat - jeigu yra neįslydyta vietinė nosies gleivinės infekcija ar neužgyjusi žaizda po nosies operacijos ar traumos. Specialūs įspėjimai: „Nasometin“ reikia vartoti atsargiai pacientams, sergantiems kepvėžio taktu, tuberkulioze arba neįslydyta grybeline, bakterine ar sisteminė virusine infekcija. Jeigu yra praeitęs nosies pertvara, vaisto vartoti nerekomenduojama. „Sandoz Pharmaceuticals d.“ filialas, Seimyniškių g. 3A LT-09312 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El paštas: info.lituanija@sandoz.com. BS221297788. Teksto patvirtinimo data: 2022.12.09.

KANKINA ALERGINĖ SLOGA? METAS TAI PAKEISTI!

INTENSYVAUS POVEIKIO ŠILDOMASIS PLEISTRAS

-20% 1⁵⁹€



PYRALGINA TERMO HOT, 1 vnt.

Medicinos prietaisas. „PYRALGINA TERMO HOT“ yra intensyvaus poveikio šildomasis pleistras, kuris veiksmingai ir natūraliai atpalaiduoja gliuosius raumenis ir dėl to lengvina nugaros, pečių, strėnų, kaklo, sąusyslių bei reumatinių skausmą. „PYRALGINA TERMO HOT“ veikia iki 14 valandų. Ypatinai tinka lėtinį skausmą gydyti. Šiluma suaktyvina kraujotaką, limfos drenažą, atpalaiduoja gliuosius raumenis, susilpnėja skausmas, silpnėja uždegimo požymiai. PAPERASTA IR EFEKTYVU!

NUO 1⁹⁹ €



NUROFEN 200 mg, 12 tablečių 1⁹⁹ €

NUROFEN FORTE 400 mg, 12 tablečių 3⁴⁹ €

NUROFEN FORTE EXPRESS 400 mg, 12 tablečių 3⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

NUROFEN sudėtyje yra 200 mg ibuprofeno. **NUROFEN FORTE** ir **NUROFEN FORTE EXPRESS** sudėtyje yra 400 mg ibuprofeno. Terapinės indikacijos. Trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių, mėnesinių skausmų malšinimas, karščiavimo mažinimas. **NUROFEN dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams padinė dozė yra 2 tabletės, užgeriant vandeniu. Po to, jei reikia, gerti po 1-2 tabletes kas 4 valandas. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 6 tabletes (200 mg). **NUROFEN FORTE** ir **NUROFEN FORTE EXPRESS** dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams padinė dozė yra 1 tabletė, užgeriant vandeniu. Po to, jei reikia, gerti po vieną tabletę kas 8 valandas. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 3 tabletes (200 mg). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai; jei praėityje yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijos (astma, rinitas, angioneurozinis patrinkimas, dilgėlinė); sunkus kepenų, inkstų, širdies nepakankamumas; pasikūris trijų mėnesių mėsulių baltojiap, esama ar buvusi pepsinė opa (da ar daugiau atskirų įdėjų išopėjimo ar kraujavimo epizodai); buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; kraujavimas ir smegenų, virškinimo trakto arba kitoks kraujavimas; jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Specialūs įspėjimai. Reikia atsargiai vartoti pacientams, kuriems yra sisteminė autoimuninė vilkligė; anksčiau buvo padidėjęs kraujospūdis ir (arba) širdies nepakankamumas; jei yra nesunkus inkstų pakenkimas ar inkstų funkcijos pablogėjimas; jei yra nesunkus kepenų funkcijos sutrikimas; pacientams, kurių sergio opinio koltu, Krono liga; pacientams, kurie vartoja kraują skystinančių vaistinių preparatų bei vaistų, galinčių padidinti išopėjimo ar kraujavimo pavojų. Reikia atvejais pasiteba sunkių odos reakcijų (kai kurios iš jų buvo mirtinos), skaitant eksfoliacinį dermatitą, Stivenso-Džonsono (Stevens-Johnson) sindromą bei toksinę epidemio nekrolizę - Lajelo (Lyell) sindromą, susijusiu su NVNU vartojimu. Gauta pranešimų apie ūminis generalizuotas egzantemines pustuliozes (UGEP) atvejus. Pastebėjus susirūkius odos reakcijų požymiams ir simptomams, pvz., odos išbėrimą, gleivinės pazeidimus ar kitels ar kitels padidėjusio jautrumo požymiams, ibuprofeno vartojimą reikia nutraukti. Sie vaista gali būti sudėtyje su nedideliu širdies pzeipulo („mirkardo infarkto“) ir insulto pavojaus padidėjimu. Šie vaistiniai preparatai gali maskuoti infekcijos simptomus, dėl to gali būti vėluojama pradėti tinkamą gydymą, o tai gali pabloginti infekcijos gydymo rezultatus. Šiu vaista negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas - fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Kiekvienoje tableteje yra natrio, būtina atsižvelgti, jei kontroliuojamas natrio kiekis maiste. Reklamos tekostas parengtas 2024-02-08.

4⁹⁹ €



WINTROZEN

600 mg, 10 šnypščiučių tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Kiekvienoje šnypščiučioje tableteje yra 600 mg acetilcisteino.

Terapinės indikacijos. „Wintrogen“ skirtas gleivėms skystinti ir atsisojimo lengvinti sergant peršalimo sukeltu bronchitu, suaugusiems ir vyresniems kaip 14 metų paaugliams. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems ir vyresniems kaip 14 metų paaugliams: rekomenduojama dozė yra 1 tabletė (600 mg) 1 kartą per parą, vakare. Jūsų gydytojas gali pakeisti vartojimo dažnį ir dozę, neviršydamas 600 mg didžiausios paros dozės. „Wintrogen“ negali būti vartojamas ilgiau nei 5 dienas. **Vartojimo metodas.** 1 šnypščiučioje tableteje iširpinti stikline vandens. Paruoštą tirpalą reikia išgerti per kelias minutes. Rekomenduojama nenaistyti „Wintrogen“ su kitais vaistais. **Kontraindikacijos.** „Wintrogen“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija acetilcisteinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Dėl didelio veiklosios medžiagos kiekio „Wintrogen“ negalima vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 14 metų paaugliams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Wintrogen“, jeigu: atsiranda naujų odos ir gleivinės pokyčių. Labai reiai gauti pranešimų apie sunkius odos reakcijas, sergate uždegimine bronchiu liga, netoleruojate histaminą, yra ar anksčiau buvo skrandžio ar žarnyno problema, vadinamą skrandžio ar dvilypkapištes žarnos opomis, ypač kai kartu su „Wintrogen“ vartojami kiti skrandžio gleivinę dirginantys vaistai. Jeigu jaučiate sieros kvapą, nesjaujandite, nes tai yra acetilcisteino savybė ir nereikia, kad vaistas pakiti. **Reklamos teksto parengimo data:** 2022. m. gruodžio mėn. ID 00053527

MENOPAUZĖS SIMPTOMAMS LENGVINTI

11⁹⁹ €



CLIMOFEMIN 6,5 mg, 30 tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Blakėžučių šakniastiebių sausasis ekstraktas

Veiklosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje tableteje yra 6,5 mg Cimicifugos racemosa (L) Nutt., rhizoma (blakėžučių šakniastiebių) sausio ekstrakto (4,5-5,1), atitinkančio 29–55 mg blakėžučių šakniastiebių. Indikacijos: menopauzės simptomų, tokių kaip karščio pylimas, gausus prakaitavimas, miego sutrikimai, nervingumas ir depresinė nuotaika, lengvinimui. Vartojimo būdas ir dozavimas: įprastinė paros dozė yra viena tabletė. Tablete reikia nuryti nekrantant, užsigeriant skysčiu. „Climofemin“ be gydytojo leidimo negalima vartoti ilgiau kaip 6 mėnesius. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Climofemin“ medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pacientės, kurioms yra buvę kepenų sutrikimų, „Climofemin“ turėtų vartoti atsargiai. Jons turi būti atlikti kepenų funkcijos tyrimai. „Climofemin“ vartojimą reikia nedelsiant nutraukti ir kreiptis į gydytoją, jei atsiranda galimų kepenų pazeidimo požymių (pvz., nuovargis, apetito netekimas, odos ir akių pageltimas arba stiprus viršutinės pilvo dalies skausmas, lydimas pykinimo ir vėmimo arba šlapimo patamsėjimo). Jeigu atsiranda kraujavimas iš makšties arba kitokių neakūčių arba naujų simptomų, reikia kreiptis į gydytoją. „Climofemin“ be gydytojo leidimo negalima vartoti su vaistais, kurių sudėtyje yra estrogenų. Pacientėms, kurios buvo arba yra gydomos dėl krūties vėžio arba bet kokio kitokio naviko, „Climofemin“ be gydytojo leidimo vartoti negalima. „Climofemin“ sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Jeigu vartojant vaistą simptomai pasunkėja, reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024-01-21

NERVŲ SISTEMAI

NUO 4⁹⁹ €



NEUROMULTIVIT

20 plėvele dengtų tablečių 4⁹⁹ €
100 plėvele dengtų tablečių 12⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Indikacijos: „Neuromultivit“ yra vitamino B₁, vitamino B₆, ir vitamino B₁₂, kurie yra ypač svarbūs užtikrinant normalias nervų sistemos medžiagų apykaitos funkcijas, derinys. Vartojant nervų sistemos ligų gydymui B grupės vitaminai atstato jų stoką organizme ir skatina nervinio audinio natūralų gijimo procesą. „Neuromultivit“ vartojamas esant B grupės vitaminų stokos sukeltiems negalavimams. Vitaminas B₁₂ pasižymi skausmą malšinančiu poveikiu. **Vartojimas:** rekomenduojama dozė yra viena tabletė kartą per parą. Pavieniais atvejais paros dozė galima padidinti iki 3 tablečių. Tabletes reikia nuryti nesukramtytas po valgymo ir užsigeri truputį skysčio. **Kontraindikacijos:** retai pasitaiko nespecifinių požymių – vėmimas, galvos skausmas ir svaigulys. Mažiau tikėtinos padidėjusio jautrumo reakcijos, kurios vartojant vitaminus B₁ arba B₆ dažniausiai reiškiasi požymiais odoje. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Neuromultivit“ vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas vitaminui B₁₂, vitaminui B₆, vitaminui B₁, arba bet kuriai pagalbinei „Neuromultivit“ medžiagai. Negalima vartoti vaikams ir paaugliams (jaunesniems negu 18 metų) dėl per didelio veikliųjų medžiagų kiekio. Nedešiant pranešti gydytojui, jei yra kontraindikacijų vaisto vartojimui, atsirado šalutinio poveikio požymių ar pastojote. Reikėtų vengti vartoti didelės vaisto dozės ilgiau nei 4 savaites. Vitaminas B₁₂ gali sumažinti kartu vartojamos L-dopos poveikį. **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:** G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. **Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį RTT atstovą:** UAB „GL Pharma Vilnius“, A. Jakšto g. 12, Vilnius, tel. (8 5) 261 0705, el. paštas: office@gl-pharma.lt; www.gl-pharma.lt

NUO RĖMENS IR PADIDĖJUSIO RŪGŠTINGUMO

NUO 2⁹⁹ €



ELFIMEST

ELFIMEST, 20 mg, 7 skrandyje neiros tablečių 2⁹⁹ €
ELFIMEST, 20 mg, 14 skrandyje neirių tablečių 4⁹⁹ €
Ezomeprazolas

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Elfimest 20 mg skrandyje neiros tabletės. Kiekvienoje skrandyje neiroje tablete yra 20 mg ezomeprazolo (atitinkancio 21,75 mg ezomeprazolo magnio druskos dihidrato). **Terapinės indikacijos.** Elfimest skirtas suaugusių žmonių gastroezofaginio refliksio simptomų (pvz., rėmens ir skrandžio rūgšties regurgitacijos) trumpalaikiam gydymui. **Dozavimas.** Rekomenduojama dozė - 20 mg ezomeprazolo (viena tabletė) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, tabletes gali prireikti vartoti 2-3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaites. Simptomams visiškai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Reikia nuryti visą tabletę, užgeriant puše stiklinės vandens. Tablečių negalima nei kramtyti, nei traškyti. Kitoks pasirinkimas - tabletę galima disperguoti pusėje stiklinės negazuoto vandens. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pakeistiems benzimidazolams arba pagalbinei medžiagai. Ezomeprazolo negalima vartoti kartu su neflinaviru. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pacientus reikia informuoti, kad kreiptusi į gydytoją, jeigu jie patiria didelį kūno svorio mažėjimą dėl nežinomų priežasčių, pasikojantį vėmimą, disfagiją, vėmimą krauju ar melėną arba jeigu įtariama ar diagnozuojama skrandžio opa, būtina iširti, ar nėra piktyninės ligos, nes gydymas ezomeprazolu gali palengvinti jos simptomus ir uždelsti diagnozės nustatymą; jeigu anksčiau sirgo skrandžio opa arba patyrė virškinimo trakto operaciją; jiems 4 savaites arba ilgiau buvo taikomas nepertraukiamas simptominis nevirškinimo arba rėmens gydymas; je sėrga gelta arba sunkia kepenų liga; je yra vyresni kaip 55 metų ir turi naują arba senesni pakitusių simptomų. Protonų siurblio inhibitoriai siejami su labai retais PORV atvejais. Dėl padidėjusio chromogranino A (CgA) koncentracijos gali būti sunkiau atlikti neuroendokrininių navikų tyrimus. **Reklamos teksto parengimo data** 2023 balandis. ELF-IT-00007

GREITA IR INOVATYVI PAGALBA NUO RĖMENS!

-20% 15^{99€} ~~19^{99€}~~ NAUJIENA



OILESEN D3 + K2 SU KANAPIŲ ALIEJUMI, 60 kapsulių MAISTO PAPILDAI

Ištin vertinga sudėtis, apjungianti 3 svarbius gerai savijautai komponentus: 75 mcg vitamino K2 sinergiškai veikiančio su 4000 TV vitaminu D3 ir 500 mg kanapių sėklų aliejumi. Tik 1 kapsulė per dieną! Paprasta ir patogus vartoti.

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



AMBIO GERKLEI

Citrinų skonio, 20 tablečių 5⁹⁸ €
Pipirmėčių skonio, 20 tablečių 5⁶⁸ €
MAISTO PAPILDAI

-20% 19^{99€} ~~24^{99€}~~ NAUJIENA



OCUTEIN KRISTAL, 30 kapsulių

Liuteinas 40 mg + Kolagenas + Mėlynės

MAISTO PAPILDAS

Ocutein Kristal savo sudėtyje turi keturis aktyvius kompleksus. Juose esančios medžiagos, tokios kaip mėlynės, vitaminas C, manganas, cinkas, turi daugialypius sveikatinimo teiginius.

*Vitaminas A ir cinkas - padeda išaugoti normalų regėjimą.

**Dviskiautis ginkmedis (Ginkgo biloba) - padeda palaikyti periferinę cirkuliaciją, kuri yra ypatingai naudinga akims ir ausims.

***Selenas, varis, cinkas, vitaminai C ir E - padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

****Manganas ir varis - padeda palaikyti normalų jungiamojo audinio formavimąsi.

KRISTOLO TYRUMO REGĖJIMUI!



IKI -40%

**AMBIO**AMBIO ŠIRDŽIAI PLUS, 30 kapsulių 17⁹⁹ 10⁷⁹ € - 40 %AMBIO GUDOBELĖ SU ALYVMEDŽIU IR ČESNAKU, 30 kapsulių 9⁹⁹ 6⁴⁹ € - 35 %

MAISTO PAPILDAI

IKI -40%

**„MICROLIFE“ KRAUJOSPUDŽIO MATUOKLIAI**BP B2 Basic 73⁹⁹ 44²¹ € - 40 %BP B6 Connect (su adapteriu) 103⁹⁹ 72³⁷ € - 30 %BP B3 Comfort PC (su adapteriu) 98⁹⁹ 59¹⁵ € - 40 %

MEDICINOS PRIEMONĖS

-30%

**AMBIO**AMBIO VITAMINŲ B KOMPLEKSAS FORTE, 90 tablečių 13⁹⁹ 9⁷⁹ €AMBIO VITAMINAS B12 500MG, 60 tablečių 5⁹⁹ 4¹⁹ €

MAISTO PAPILDAI

IKI -30%

**„MICROLIFE“ INHALIATORIAI**NEB Pro 82⁹⁹ 58⁹⁹ € - 30 %NEB 800 (kišeninis, be garso) 98⁹⁹ 69²² € - 30 %NEB 400/Meškiukas 88⁹⁹ 56⁴¹ € - 30 %

MEDICINOS PRIEMONĖS

NUO 5⁹⁹ €**TROXEVASIN**2 %, 40 g gels 5⁹⁹ €2 %, 100 g gels 9⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Troxevasin 300 mg kiekiosios kapsulės. Troxevasin 2 % gels. Kiekvienoje kietosios kapsulėje yra 300 mg troxerutino. Viename gramme gelio yra 20 mg troxerutino. **Indikacijos:** lėtinis venų nepakankamumo simptomų (kojų skausmo, sunkumo, patinimo) lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** Troxevasin kapsulės – rekomenduojama pradine doze suaugusiems 600 mg (2 kapsulės) parai tolygiu intervalu. Gydoma kol išnyksta edema ir kiti simptomai, dažniausiai 2 sav. Palankioji dozė – 1 kapsulė (300 mg) per parą 2-4 sav. Maksimali paros dozė yra 1500 mg. Kapsulės reikėtų vartoti valgio metu, nes jos gali sukelti dispepsijos simptomus. Troxevasin gels – suaugusiems pacientams iš ryto ir vakare ligos pažeistą vietą reikia patepti nedideliu geliu kiekį ir švelniai masažuoti tol, kol vaistinis preparatas visiškai įsijęs į odą. Gydomo geliu veiksmingumas daugiausia priklauso nuo vaistinio preparato dozės, vartojimo reguliarumo ir trukmės (patariama vartoti ilgai). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliąjam arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialios įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Troxevasin kapsulių reikia atsargiai vartoti kepenų nepakankamumu ar tulžies apytakos sutrikimų sergantiems pacientams. Vaistinis preparatas neveiksmingas gydant edemą, atsiradusį dėl kepenų, inkstų ar širdies-kraujagyslių sistemos ligų. Vaikams iki 18 metų troxerutino vartoti nerekomenduojama, kadangi duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra. Kapsulių negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktozės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Esantis sudėtyje saulėlydžio geltonasis FCF (E110) gali sukelti alerginių reakcijų. Troxevasin gelį galima vartoti tik ant nepažeistos odos. Juo negalima tepti atvirų žaizdų bei gleivinės, pvz., akių. Gelio sudėtyje yra benzalkonio chlorido, kuris gali sudirginti odą. Nesitikiama, kad vartojimas neturėtų ir žindymo laikotarpiu gali būti susijęs su žalingu poveikiu motinai, kadangi benzalkonio chlorido absorbcija per odą yra minimali. **Reklamines medžiagas parengimo data:** 2023 m. liepa. TROX-LI-00024

KAD KOJOS BŪTŲ LENGVOS! MĖGAUKITĖS TYRINĖDAMI PASAULĮ BE LĒTINIO VENŲ NEPAKANKAMUMO SUKELTŲ SIMPTOMŲ!

NUO 5⁹⁵ €**LILANDOR 80 MG**, 14 minkštųjų kapsulių 5⁹⁵ €**LILANDOR 80 MG**, 28 minkštiosios kapsulės 9⁹⁵ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Lilandor 80 mg minkštiosios kapsulės. Lavandula angustifolia Miller, eterinis aliejus. Nereceptinis vaistinis preparatas. Lilandor yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliąjam arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Specialios įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jaugi simptomai pablogėja šio vaisto vartojimo metu, pastarą kartą su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, vartoti nerekomenduojama, nes levandų aliejaus sudėties medžiagos daugiausia šalinamos iš organizmo perdirbant jas kepenyse. Kiekvienoje šio vaisto minkštiosios kapsulėje yra apytikriai 12 mg sorbitolio. Dozavimas ir vartojimo metodas. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta pakuoletės lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: viena minkštiosios kapsulė vieną kartą per parą. Minkštąją kapsulę reikia nuryti nesukamtyta užsigeriant pakankamu skysto kiekiu (geriausia stikline vandens). Jeigu simptomai išlieka po vaisto vartojimo dvi savaites, reikia kreiptis į gydytoją arba kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą. Tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. UAB "Berlin Chemie Menarini Baltic" J. Jasinskio g. 16A, Vilnius LT-03163 Paruosta 2023 m. gruodžio mėn. LT_Lil_21_2023_VI_prrnt

ATGAUK RAMYBĖ IR RAMŲ MIEGĄ



LAIMĖS VALANDOS

Darbo dienomis ir šeštadieniais
8-9 val. ir 14-15 val.*

Sekmadieniais
14-15 val.*



-30%

Perkant 3**
ir daugiau
prekių

-25%

Perkant
2* prekes

-20%

Perkant
1 prekę

**nereceptiniams vaistams -25%
receptiniams vaistams -20%

* vaistams -20%

Nuo 2023 m. spalio 23 d. NORFOS vaistinėje akcijos LAIMĖS VALANDOS metu perkant 1 prekę taikoma 20 % nuolaida, perkant 2 prekes – 25 % nuolaida, vaistams – 20 % nuolaida, o įsigyjant 3 ir daugiau prekių – 30 % nuolaida, nereceptiniams vaistams – 25 %, receptiniams – 20 % nuolaida.

Taikomos momentinės 20 % dydžio nuolaidos receptiniams vaistams, 20 ar 25 % nuolaidos nereceptiniams vaistams ir vaistiniams preparatams, o kitoms prekėms – 20, 25 arba 30 % nuolaidos, atsižvelgiant į atitinkamo pirkimo metu įsigyjamų prekių bendrą kiekį. Nuolaida taikoma perkant pilnas prekių pakuotes, kurių kiekvienos vertė arba priemoka ne mažesnė nei 1,50 euro. Prekės, perkamos su kompensuojamuoju receptu, įskaičiuojamos į įsigyjamų (perkamų) prekių krepšelį (kiekį), tačiau joms nuolaida netaikoma.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaidos netaikomos perkant su kompensuojamuoju receptu, mokant už skiepus, taip pat pradinio maitinimo pieno mišiniams, kartiniams (gaminamiems vaistinėje) ir vardiniam vaistams, įsigyjant dovanų kuponus, pakavimo maišelius. Nuolaidos netaikomos perkant www.gintarine.lt, net jei už prekes atsiskaitoma jas atsiimant vaistinėse. Nuolaidos netaikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Visos nuolaidos galioja tik su PC NORFA lojalumo kortele.

Informaciją apie kitu nei nurodyta laiku vykstančias LAIMĖS VALANDAS rasite www.nvaistine.lt. Informacija apie kitas akcijas ir prekes, kurioms netaikomos akcijos LAIMĖS VALANDOS nuolaidos, suteikiama kiekvienoje vaistinėje, el. paštu info@nvaistine.lt arba nemokamu tel. 8 800 10008.

NVAISTINĖ
VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS

IKI **-40%**



AMBIO
KOMPLEKSAS ŽARNYNUI SU GEROSIOMIS BAKTERIJOMIS, 30 kapsulių ~~12⁹⁹ 8¹¹ €~~ **-35%**
LAKTO-BIFIDOBAKTERIJŲ KOMPLEKSAS FORTE (milteliai), 10 pakelių ~~10⁹⁹ 6²⁹ €~~ **-40%**
MAISTO PAPILDAS

NUO **4⁹⁹ €**



SMECTA 3 G, milteliai geriamajai suspensijai, 10 pakelių **4⁹⁹ €**
SMECTA 3 G, milteliai geriamajai suspensijai, 30 pakelių **10⁹⁹ €**

Diosmektitas
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
smecta 3 g milteliai geriamajai suspensijai. Sudėtis. Viena pakelėlyje yra 3 g diosmektito. **Terapinės indikacijos.** Vaikų nuo 2 metų ir suaugusiųjų ūminio viduriavimo kartu su geriamaisiais rehidratuojančiais tirpalais bei suaugusiųjų lėtinio viduriavimo gydymui. **Simptomai** suaugusiųjų skausmo, susijusio su funkciniais žarnyno sutrikimais, gydymui. **Dozavimas.** Ūminio viduriavimo gydymas. Vaikams nuo 2 metų: 6 gramai (2 pakelėlyje) per parą. Ūminio viduriavimo pradžioje (pirmašias 3 dienas) šis dozė gali būti du kartus didesnė. Suaugusiems: 9 gramai (3 pakelėlyje) per parą. Ūminio viduriavimo pradžioje šis dozė gali būti du kartus didesnė. Ūminio viduriavimo epizodas paprastai trunka ne ilgiau kaip 7 dienas. Kiti ligų gydymas. Suaugusiems: vidutiniškai 9 g (3 pakelėlyje) per parą. Vartojimo metodas. Vartoti po turimų. Pakelėlyje turinį reikia išvirti prieš pat vartojimą. Vaikams: pakelėlyje turinį reikia išvirti 50 ml vandens arba sumalti su pusiu šlyčiu milteliu (pvz., daržovių koše, sriuba, kompotu). Suaugusiems: pakelėlyje turinį reikia išvirti pusę-stiklinės vandens. **Specialūs įspėjimai.** Smecta nes skirtas vartoti kūdikiams ir vaikams iki 2 metų amžiaus. Gydančiam ūminio viduriavimo silpnais pacientams ir vaikams nuo 2 metų amžiaus, siekiant išvengti dehidratacijos, kartu būtina skirti geriamąsias rehidratuojančias druskas (GRD). Suaugusiems taip pat turi būti taikoma rehidratacija, jei ji reikalinga. GRD arba intraveninė rehidratacija turi būti skiriama atsivėligiant į viduriavimo intensyvumą, paciento amžių ir klinikinę situaciją. Reikia atsižvelgti dėl tolimosios smecta vartojimo; jei po 3 ūminio viduriavimo dienų sutrinkamas nepaėgria; jei yra skausmas kartu su karščiavimu ir vėmimu. Reikia atsižvelgti skirti diosmektitą pacientams, kuriems praėlyje yra buvę sunkių lėtinio viduriavimo užkietėjimo atvejų. Reikia vengti ilgalaikio Smecta vartojimo. Smecta sudėtyje yra gliukozės ir sacharozės. Būlma atsivėliginti cukriniu diabetu sergantiems pacientams. Jeigu gydytojas žams yra saikes, kad netoleruoja koki nors angliavandenių, krepšities ir ji turi pradedami vartoti šio vaisto. Šio vaisto sudėtyje yra mažas etanolio kiekis (mažiau kaip 100 mg paros dozei). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas (alergija) diosmektitui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Praneškite apie šalinimą poveikį registratūroje vietiniams atstovams Mavoly Baltics UAB, el. paštu: vigilance.BA@mavoly.com. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024 m. kovo mėn. SME-11-2024-0010

4⁴⁹ €



ALMAGEL A GERIAMOJI SUSPENSIJA, 170 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, silpnumas: 5 ml geriamosios suspensijos yra 340 mg aliuminio hidroksido (atitinka 280 mg aliuminio oksido), 109 mg magnio hidroksido (atitinka 75 mg magnio oksido) ir 109 mg benzocaino. **Terapinės indikacijos:** virškinimo trakto sutrikimų, susijusių su skrandžio rūgšties pertekliumi, tokiu kaip rėmuo, rūgšties sukelti skrandžio negalavimai, skrandžio ar dvilykapištės žarnos opa, simptomai gydymas 14 metų arba vyresniems paauaugintiems ir suaugusiems žmonėms. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems, atsivėligiant į ligos sunkumą, 3–4 kartus per dieną (30 min. prieš valgį ir vakare, prieš miegą) gerti po 1–3 pilnus dozavimo šaukštėlius (1 šaukštėlyje yra 5 ml). Jei yra dvilykapištės žarnos opa ir kai kurių formų skrandžio opa (prevencinio opa), „Almagel A“ galima gerti tarp valgyimų. Prieš vaistų, dirginančių virškinimo trakta, vartojimą profilaktikai reikia išgerti 1–2 pilnus dozavimo šaukštėlius „Almagel A“. Vaistinio preparato rekomenduojama vartoti ne ilgiau kaip 12 parų. Jei inkstų funkcija sutrikusi, atsivėligiant į sutrikimo laipsnį, suspensijos reikėtų gerti rečiau arba mažesne doze. Prieš vartojimą būtina tiksliai išplinti pakelėlyje. Preparato skaidri nerekomenduojama. Išgerti suspensijos, 30 min. negalima gerti skysčių. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Fruktozės netoleravimas (nes sudėtyje yra sorbitolio). Hipofosfatemija. Sunkūs inkstų funkcijos nepakankamumas (kreatinino klirensas mažesnis kaip 30 ml/min). Alzheimerio liga. Pacientas jaunesnis nei 14 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Almagel A“ nerekomenduojama vartoti, jei yra nuolatinis vidurių užkietėjimas, ūminio apendicito simptomai, metabolinė alkalozė, kepenų cirozė, sunkus stažinis širdies nepakankamumas, nėštumo toksikozė, opinis kolitas, divertikulozė, kolostomija ar ileostomija, inkstų funkcijos sutrikimas, lėtinis viduriavimas. Vaistas gali sukinti hemoragijos sukeltus negalavimus. Pagyvusiems pacientams gali pasunkėti kaulų ir sąnarių ligos bei Alzheimerio liga. Vaistinio preparato vartoti ilgiau negu 2 savaites galima tik prižiūrint gydytojui. Sudėtyje yra parahidroksibenzoato darinii, kurie gali sukelti alerginių reakcijų, įskaitant uždegimas alergines reakcijas. Sudėtyje yra etanolio, dėl kurio pacientams, sergantiems kepenų, smegenų ligomis, epilepsija ir alkoholizmu, bei neįdomūs moterims ir jautrusiems arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. „Almagel A“ nepatariama vartoti kartu su alkoholiu ir maistinėmis rūgštimis (citrus, acto ir kt.), nes jos neutralizuoja vaistinio preparato vietinį atsivėliginti poveikį. Iar „Almagel A“ ir kitokių vaistų vartojimo reikia daryti ne trumpesne kaip 1–2 val. pertrauka. Dėl sudėtyje esančio benzocaino vartoti ilgiau kaip 10–12 parų nepatariama. Vaikams benzocainas gali sukelti methemoglobinemiją. **Reklamos teksto parengimo data** 2023 m. spalio. OTC-11-00068

-30% **3^{35€}**



AKTYVIORIJI ANGLIS, 20 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis



-30%




LINEX®
LINEX® COMPLEX, 14 kapsulių ~~13⁹⁹ 9⁶³ €~~
LINEX® FORTE, 14 kapsulių ~~9⁹⁹ 6⁶⁴ €~~
LINEX® BABY lašai, 8 ml ~~13⁹⁹ 9⁵¹ €~~
LINEX® KIDS milteliai geriamajai suspensijai, 10 pakelių ~~9⁹⁹ 6⁹⁹ €~~

MAISTO PAPILDAS
Vienoje **LINEX® COMPLEX** kapsulėje yra 10 mlrd. geriausiai iki šiol pasulyje moksliskai išburtu gyvyi *Lactobacillus rhamnosus* GG bakterijų, taip pat - vitaminų B1, B2, B6 ir cinko. Vienoje **LINEX® FORTE** kapsulėje yra 2 mlrd. gerai žinomų ir moksliskai išburtu gyvyi *Lactobacillus acidophilus*, *DSM 13241* ir *Bifidobacterium animalis subsp. lactis*, *DSM 15564* bakterijų. Viena **LINEX® KIDS** pakelėlyje arba 6-uose **LINEX® BABY** lašuose yra 1 mlrd. *Bifidobacterium animalis subsp. lactis*, *DSM 15564* bakterijų. Vartojamas: **LINEX® COMPLEX** suaugusiems ir vyresniems nei 6 metų vaikams gerti po 1–2 kapsules per dieną. **LINEX® FORTE** suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų paauugintiems gerti po 1 kapsulę–3 kartus per dieną; vaikams nuo 3 iki 12 metų - po 1 kapsulę 1–2 kartus per dieną. **LINEX® KIDS** kūdikiams ir vaikams iki 12 metų - po 1 pakelėlyį 1 kartą per dieną. **LINEX® BABY** naujagimiams, kūdikiams ir vaikams iki 2 metų - po 6 lašus vieną kartą per dieną. „Sandoz Pharmaceuticals d. d.“ filialas, Seimyniškų g. 3A, LT-09312 Vilnius, Lietuva. BS2212097787. Teksto patvirtinimo data: 2022.12.09.

KOKYBĖ, KURIA GALIMA PASITIKĖTI!

-40%



HYDROLESS SLIM, 60 kapsulių 12⁹⁹ 7⁷⁹ €

MAISTO PAPILDAS
Padeda palaikyti normalų kūno svorį.
Padeda palaikyti normalų skysčių pasišalinimą per inkstus. Padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų apykaitą.
Juodieji pipirai padeda palaikyti normalią virškinamojo trakto bei kepenų funkciją. Juodieji pipirai ir karčiavėsis citrinmedis padeda palaikyti normalų kūno svorį.
Didžiųjų dilgėlių ekstraktas padeda palaikyti normalų skysčių pasišalinimą per inkstus, padeda palaikyti normalią šlapimo takų funkciją. Cinkas ir chromas padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų apykaitą. Cinkas padeda palaikyti normalią lėbaly rūgščių apykaitą, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo ir padeda palaikyti normalią baltymų sintezę. **Vartojimo būdas:** 2 kapsules per dieną. Rytė ir vakare. Vartoti po valgio, užgerti stikline vandens.

HYDROLESS, 30 kapsulių 12⁹⁹ 7⁷³ €
MAISTO PAPILDAS
Padeda palaikyti normalų skysčių pasišalinimą per inkstus, padeda palaikyti normalią šlapimo takų funkciją.
Medžiagos, turinčios fiziologinį poveikį
Džiovintų stambiauočių spanguolių milteliai, 80 mg
Didžiųjų dilgėlių ekstraktas, 50 mg
Obuolių acto milteliai, 50 mg
Cinkas, 12 mg (120 %)
Vartojimo būdas: po 1 kapsulę per dieną. Vartoti po valgio, užgerti stikline vandens.
HYDROLESS – NUO VANDENS KAUPIMOSI!

ESANT VIDURIAVIMUI

3⁹⁹ €



LOPERAMIDUM WZF POLFA

2 mg, 10 tablečių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veiklioji medžiaga: loperamido hidrochloridas. **Indikacijos:** simptomini suaugusių ir vyresnių negu 12 metų paauugint ūminio viduriavimo gydymas tokiu atveju, jei ne galima pašalinti viduriavimo sukėlusios priežasties. **Dozavimas:** pradžioje geriami 2 tabletės (4 mg), vėliau - po 1 tabletę (2 mg) po kiekvieno išsituštinimo nesufimuotoms išmatoms. Draudžiama per parą gerti daugiau kaip 6 tabletes (12 mg). **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas loperamidui hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jaunesni negu 12 metų pacientai; paralyzinis žarnų nepaėgriaumas; vidurių užkietėjimas; pilvo pūtimas; organizme per mažai skysčių; pseudomembraninis kolitas, kurį dažniausiai sukelia plataus poveikio antibiotikai; ūminė bakterinė dizenterija, bei kitoks bakterinis viduriavimas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** loperamido hidrochloridu gydomas pacientas turi vartoti pakankamai vandens bei mineralinių medžiagų. Šio vaistinio preparato reikia atsargiai vartoti ligoniams, kuriems yra kepenų nepakankamumas. Sergant Krono liga, loperamido hidrochloridu reikia vartoti atsargiai. Jeigu pasireiškia vidurių užkietėjimas, pilvo pūtimas ar atsiranda pirmųjų žarnyno obstrukcijos simptomų, šio vaistinio preparato vartojimą būtina nutraukti. Jeigu ligonis karščiuoja bei jo išmatose yra kraujo, prieš pradėdant vartoti loperamid hidrochloridu, būtina išsiaiškinti tokiu viduriavimo priežastį. Vartojant loperamid hidrochloridu, gali pasunkėti šlapinimasis. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas - Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Reklamos teksto parengimo data** 2017-01.
GREITAI SUSTABDYS VIDURIAVIMĄ.

-20%



SIMETIGAST FORTE
240 mg kapsulės, 10 kapsulių ~~2⁹⁹ 2³⁹ €~~
SIMETIGAST FORTE
240 mg kapsulės, 60 kapsulių ~~9⁹⁹ 7⁵⁹ €~~
SIMETIGAST FORTE BABY
geriamieji lašai, 30 ml ~~5⁹⁹ 4³⁹ €~~

MEDICINOS PRIEMONĖS
„SIMETIGAST FORTE“ 240 mg kapsulės (simetikonas) skirtos vartoti vyresniems nei 12 m. pacientams, esant pilvo pūtimui, pilnumo jausmui pilve, raugėjimui. Taip pat galima naudoti prieš pilvo ertmės diagnostines procedūras, nes tai pagerina vaizdų kokybę. Vartoti: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. amžiaus jaunuoliai - po 1 kapsulę 2–3 kartus per parą. Prieš diagnostines procedūras: 1 kapsulė vakare dieną prieš trynimą ir 1 kapsulė ryte trynimo dieną. „SIMETIGAST FORTE BABY“ geriamieji lašai (simetikonas) skirti kūdikiams nuo 28-os gyvenimo dienos ir vaikams iki 12 metų. Vartoti: kūdikiams (nuo 28-os gyvenimo dienos) ir vaikams iki 2 metų 3 lašai prieš, per ar po kiekvieno valgio. Negalima vartoti daugiau kaip 18 lašų per dieną.
GREITAI PAGALBA IŠPŪSTAM PILVUI.

VITAMINO D3 ŠALTINIS

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



OLIDETRIM®

OLIDETRIM® 2000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių **10³⁵ €**
 OLIDETRIM® 4000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių **14⁹⁹ €**
 OLIDETRIM® 2000 TV, 60 minkštųjų kapsulių **10⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

Imunitetui – vitaminas D 2000 ir 4000 TV.

Sirdžiai, smegenims – DHR+ EPR omega-3 rūgštys.

Kaulams ir raumenims – vitaminai D ir K2.

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Omega-3 riebiųjų rūgščių DHR (dokozahekseno) ir EPR (eikozapenteno) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą. Siekiant maksimaliai padidinti vitamino D papildu naudą, juos naudinga vartoti kartu su vitaminu K2.

GERIAUSIA GYNYBA – STIPRUS IMUNITETAS.

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



VITIRON

VITIRON D3 + OMEGA3 STRONG, 60 kapsulių **12⁹⁹ €**
 VITIRON D3 OLIVE SUN 4000IU, purškalas, 10 ml **15⁸⁵ €**
 VITIRON D3 OLIVE SUN 2000IU, purškalas, 10 ml **13¹⁹ €**
 VITIRON KIDS IMMUNITY, guminukai vaikams, 50 guminukų **17⁴⁹ €**
 VITIRON KIDS GROWUP, kramtomieji guminukai, 50 guminukų **14⁹⁹ €**
 VITIRON KIDS SCHOOL, guminukai vaikams, 50 guminukų **15⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

„Vitiron® D3 + OMEGA3 STRONG“ yra didelė D3 vitamino dozė, paruošta linų sėmenų aliejaus pagrindu, o tai yra natūralios kilmės omega-3. Linų sėmenų aliejaus pagrindas skatina gerą D vitamino absorbciją ir biologinį įsisavinimą. Vitaminas D3 padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų ir dantų būklę bei normalią raumenų funkciją. Linų sėmenų aliejaus yra natūralus omega-3 šaltinis. „Vitiron® D3 Olive SUN“ – vitaminas D, išdirbtas tyrime alyvuogių aliejuje, kuris užtikrina geresnį jo pasisavinimą. Patogus ir greitas vitaminas D kiekvienam! „Vitiron® KIDS“ – tai vaistų ir uogų skonių, įvairių formų kramtomieji guminukai su vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis. „Vitiron® Kids grow UP“ skirti vaikų kaulų augimui ir vystymuisi, „Vitiron® Kids School for BRAIN“ – smegenims, normaliai psichologinei būklei, pažinimo funkcijai, o „Vitiron® KIDS Immunity“ su Seivamedžių uogų sultimis – imunitetui.

-50%



DETRICAL 2000 IU, 60 plėvele dengtų tablečių **7⁴⁹ 3⁷⁵ €**

DETRICAL 4000 IU, 60 plėvele dengtų tablečių **9⁹⁹ 5⁰⁰ €**


MAISTO PAPILDAS

Didelė vitamino D dozė tablečių imunitetui, kaulams ir dantims. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų bei raumenų funkciją ir dantų būklę. 1 tablete per dieną. Užgerti stikline vandens.

KAULAMS IR SĄNARIAMS

-30%

12^{59€}
~~17⁹⁹~~



GLIUKOZAMINAS PLUS KOLAGENAS, CHONDRITINAS, MSM

MAISTO PAPILDAS

daugiau informacijos apie produktus www.vitaminali.lt

-40%



AMBIO

REGĖJIMUI SU GINKMEDŽIO EKSTRAKTU, 30 kapsulių **14⁹⁸ 8⁹⁹ €**

REGĖJIMUI, 30 kapsulių **11⁹⁸ 7¹⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

-40%



LIUBERIN

Liuberin + lutein 35mg, 30 kapsulių **15⁴⁹ 9²⁹ €**


Liuberin superior, 30 kapsulių **17⁹⁹ 10⁷⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

Linija „Liuberin“ skirta padėti išsaugoti normalų regėjimą bei palaikyti akies kraujotaką. „Liuberin superior“ net 18 aktyviųjų medžiagų kompleksas sausoms, pavargusioms, daug į skaitmeninių įrenginių ekranus žiūrinčioms akims. Sudėtas praturtinta ginkmedžiu, kuris padeda palaikyti akies kraujotaką. O „Liuberin + LUTEIN 35 mg“ – naujausia formulė akims! Šio preparato sudėtis praturtinta karotenoidais: net 35 mg luteino ir 3 mg zeaksantino, kurių su anžiūmi koncentracija akyse mažėja. Gausi sudėtis išsiskiria ir mėlynių uogų ekstraktu, kuris padeda palaikyti normalią akių funkciją, vaizdo aiškumą ir kraujotaką. Normali regėjimo padeda išsaugoti vitaminus A ir cinkas. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

RYŠKIOMS GYVENIMO SPALVOMS!

-35%



VISIONACE, 30 tablečių **23⁹⁹ 15⁵⁹ €**

VISIONACE PLUS, 28 tablečių / 28 kapsulės **32⁹⁹ 21⁴⁴ €**

MAISTO PAPILDAI

VISIONACE – subalansuotas luteino, mėlynių ekstrakto, antioksidantų kompleksas. Sudėtyje esančios medžiagos padeda išsaugoti normalų regėjimą (cinkas, vitaminai A, B₂), o antioksidantai – manganas, selenas palaiko ląstelių apsaugą nuo oksidacinių pažeidimų. VISIONACE linka daug laiko praleidžiantiems prie kompiuterių ar TV ekranų dirbantiems akims reikly darba, dažnai jaučiantiems akių nuovargį, vyresnio amžiaus žmonėms, devintiems kontaktinius lęšius. VISIONACE PLUS sudėtis praturtinta omega-3 rūgštimis ir 12 mg luteino.

VISIONACE – REGĖJIMO JĖGA!

11^{99€}
~~15⁹⁷~~



OCHISAN, 15g

MEDICINOS PRIEMONĖ

Akių vokų tepalas be konservantų. Padeda palengvinti tokius simptomus, kaip vokų odos niežulys, jų skausmingumas ir patinimas, susijusius, be kita ko, su išorinio miežio ir chlamidinio atsiradimu. Veiklioji medžiaga sluotinių sėklųjų medus (manuka) MGO 400+. Sluotinių sėklųjų aliejaus (manuka).



1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė NEMOKAMAI!



„MÖLLER'S“ ŽUVŲ TAUKAI IR OMEGA-3 KAPSULĖS

MAISTO PAPILDAI

„Möller's“ – tai šimtmėčišais puoselejami žuvų taukai visai šeimai. „Möller's“ žuvų taukų kapsulės išsiskiria kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyviu medžiagų deriniais. Tyri ir gerai išvalyti „Möller's“ žuvų taukai puikiai tinka vartoti kasdien visa gyvenimą. Įvairaus skonio kramtomosiose žuvelėse

PATIKIMAS PASIRINKIMAS NUO 1854.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis.

IKI -40%



AMBIO

MAGNIS (tirpiosios tabletės), 20 tablečių **4⁹⁸ 2⁹¹ € -35 %**

MAGNIS SU B6 FORTE 375MG, 30 pakelių **9⁹⁸ 5⁹⁹ € -40 %**

KALIS 300MG IR MAGNIS 350MG, 30 pakelių **12⁹⁸ 7⁹⁹ € -40 %**

MAISTO PAPILDAI

-20%



LYSI

MAISTO PAPILDAI

Tai nepakeičiamųjų omega-3 riebalų rūgščių ir vitaminų šaltinis visai šeimai. „Lysi“ žuvų taukai užtikrina Jums vitamino D paros normą ir didelį kiekį svarbiausių omega-3 riebalų rūgščių.

„LYSI“ – ŽUVŲ TAUKŲ EKSPERTAI IŠ ISLANDIJOS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis.

-40%



CORDISOL, 60 kapsulių **11⁹⁹ 7¹⁹ €**

CORDISOL FORTE, 30 kapsulių **12⁹⁸ 7⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

Esant mineralų trūkumui organizme rekomenduojama vartoti „Cordisol“, kurio sudėtyje yra 100 mg kalio ir 137 mg – magnio, bei „Cordisol forte“, kurio sudėtyje – NET 200 mg kalio ir 187,5 mg magnio!

-20%

1 19€



VALIDOL-LUBNYPHARM,

10 poliežuvinį tablečių.

MAISTO PAPILDAS

Grynasis kiekis: 12,23 g. **Sudedamosios dalys:** cukrus, mentolio tirpalas izovalerijonų rūgšties mentolio esteryje, kalcio stearatas. 2-ose tabletėse yra 0,12 g mentolio tirpalo izovalerijonų rūgšties mentolio esteryje ir 4-ose tabletėse yra 0,24 g mentolio tirpalo izovalerijonų rūgšties mentolio esteryje. **Vartojimas:** VALIDOL-Lubnypharm tablete reikia laikyti po liežuviu tol, kol ji visiškai ištirpsta. Vartojama po 1 tabletę 2-4 kartus per dieną. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, gamintojo pakuotėje, kad produktas būtų apsaugotas nuo drėgmės. Tinkamumo laikui pasibaigus vartoti negalima. Geriausias iki (pabaigos): žr. ant pakuotės. **Gamintojas:** AAB „Lubnypharm“, Lubnai 37500, Petrovskogo g.16, Ukraina. Pagaminta pagal specialų UAB „FD group užsakymą“

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



MAGNETRANS DRINK, 400 mg, vandenyje tirpstančios granulės, 20 paketėlių **11²⁵ €**


MAGNETRANS DIRECT, 375 mg, granulės tirpios burnoje, 20 paketėlių **12⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

Magnetrans drink 400 mg. 1 paketėlyje yra 400 mg magnio. Magnis naudingas daugeliui mūsų organizme: padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą, raumenų ir psichologinę funkciją, normalią kaulų ir dantų būklę. Gaivaus apelsinų ir greipfrutų skonio.

Magnetrans direct. Burnoje tirpstančios granulės raumenims ir nervų sistemai. Citrinų ir greipfrutų skonio. Tobula keliaujant. Magnis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą, raumenų ir psichologinę funkciją, normalią kaulų ir dantų būklę. Tinka nuo 12 metų.

2402_SB_Magnetrans_V01_LT



SKENUOKITE QR KODĄ IR
NORFOS VAISTINĖS
LEIDINIUS VARTYKITE
TELFONE.



-40% 4^{55€}



RAMEVAL® 15 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„RAMEVAL“ – ramybės augalų puokštė sukurta iš valerijonų, melisų, pipirinių mėtų, ramunėlių ir apynių, kuri padeda:
 – palaikyti normalią nervų sistemos būklę (vaistiniai valerijonai),
 – atsipalaiduoti (vaistinės melisos, pipirinės mėtos, vaistinės ramunės),
 – palengvinti užmigimą ir palaikyti miego kokybę (vaistinės melisos, paprastieji apyniai)
IEŠKAI RAMYBĖS? ATRASK JĄ SU RAMEVAL.

-40% 11^{99€}



LUNESTIL®, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Lunestil® yra maisto papildas inovatyvioje dviguboje prailginto atpalaidavimo kapsulėje (kapsulė kapsulėje). Lunestil® padeda lengviau užmigti ir palaikyti kokybišką nepertraukiamą miegą. Tikrųjų levandų aliejus padeda palaikyti normalų miegą. Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti. Raudonžiedžių pasiflorų ekstraktas padeda atsipalaiduoti ir palaikyti normalų miegą. Vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vitaminas B6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir psichologinę funkciją. Z301_SB_Lunestil_V01_LT

NERVINIAM NERAMUMUI LENGVINTI

NUO 5^{99€}



SEDATIF PC

SEDATIF PC, 40 tablečių 5^{99€}
 SEDATIF PC, 90 tablečių 9^{99€}

HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: Atrus precatorius 6 CH, 0,5 mg, Aconitum napellus 6 CH, 0,5 mg, Belladonna 6 CH, 0,5 mg, Calendula officinalis 6 CH, 0,5 mg, Chelidonium majus 6 CH, 0,5 mg, Viburnum opulus 6 CH, 0,5 mg. **Indikacijos:** nervinio neramumo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vaikams nuo 6 metų vartoti po 2 tabletes 3 kartus per parą. „Sedatif PC“ veiksmingumas ir saugumas vaikams iki 6 metų netirtas. Duomenų nėra, todėl vartoti nerekomenduojama. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** šio vaistinio preparato vaikams iki 6 metų vartoti nerekomenduojama. Negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharozės ir izomaltozės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2019-08.

ĮVEIK STRESĄ, KOL STRESAS NEĮVEIKĖ TAVĘS. SEDATIF PC

NUO ALERGIJOS

3^{99€}



CETIRIZIN ACTAVIS 10 mg, 10 dengtųjų tablečių

NERCEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Cetirizin Actavis 10 mg pėlevė dengtos tabletės. Kiekvienoje pėlevė dengtoje tablete yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos.** Suaugusiems žmonėms ir 6 metų amžiaus bei vyresniems vaikams cetirizinas vartojamas sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito simptomams (nosies ir akių) palengvinti bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės simptomams palengvinti. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus: 5 mg (pusė tabletės) du kartus per parą. **Suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų paauguliams:** 10 mg (1 tabletė) 1 kartą per parą. Esant inkstų funkcijos sutrikimui, dozė reikia mažinti. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, hidrokortizonui arba bet kuriam pipirazino dariniui. Pacientai, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas mažesnis negu 10 ml/min.). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju ar vaistininku, prieš pradėdami vartoti Cetirizin Actavis; jeigu sergate inkstų nepakankamumu (jei būlina, Jums reikės vartoti mažesnę vaisto dozę. Reikalinga dozė nustatys gydytojas), jei yra rizikos veiksmų, galinčių sukelti šlapimo susilaikymą; jei sergate epilepsija ar Jums gali būti traukulių. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktozės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Reklamos teksto parengimo data:** 2023 gegužė. OTC-LT-00060

4^{99€}



LORATIN EXPRESS 10 mg tabletes, 10 tablečių

NERCEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienioje „Loratin express“ 10 mg tablete yra 10 mg loratadino. **Indikacijos:** simptominiams alerginės slogos ir lėtinės idiopatinės dilgėlinės gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems negu 2 metų vaikams – po 1 tabletę per dieną. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas loratadinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nevartoti jaunesniems nei 2 metų arba svėrantiems mažiau kaip 30 kg vaikams. **Specialūs įspėjimai:** vaistas alergenai reikiai vartoti pacientams, kuriems yra sunkus kepenų veiklos sutrikimas. „Sanofz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Seimyniškių g. 3A LT-09512 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El.paštas: info.lit@sanofz.com. BS2304195476. Teksto patvirtinimo data: 2023 04 19.

4^{99€}



OPEXA 20 MG, 10 tablečių

NERCEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Vienioje tablete yra 20 mg bilastino.
Indikacijos: Opexa vartojamas šienligės (kuriai būdingi simptomai yra čiaudulys, niežulys, sloga, užgulta nosis, paraudusios ir ašarojančios akys) ir kitų alerginio rinito formų simptomų slopinimui. Jis taip pat gali būti vartojamas niežtinčių odos išberimų (pūkslių arba dilgėlinės) gydymui. **Kontraindikacijos:** Opexa vartoti draudžiama jeigu yra alergija bilastinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jei Jums nustatytas vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų veiklos sutrikimas ir vartojate kitus vaistus. Medžiagė šio vaisto jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Neviršykite rekomenduojamos dozės. Gydymo trukmė priklauso nuo jūsų ligos simptomų, trukmės ir eigos. Nevartokite Opexa ligiam nei 10 dienų nepasikonsultavę su gydytoju. Jei po 7 dienų jūsų sąjauja nepagerėja arba net pablogėja, kreipkitės į gydytoją. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Rekomenduojama dozė suaugusiems, įskaitant senesnius žmones ir 12 metų bei vyresnius paauglius yra 1 tabletė (20 mg) per dieną. Tablete reikia nurinti nevalgius, viena valanda prieš valgį arba sulčių gėrima arba praėjus dviems valandoms po valgyimo arba sulčių gėrimo. Reklama paruošta 2023 m. gruodžio mėn. LT_Ope_22_2023_VI_pharma UAB „Berlino Chemijos Menarini Baltis“ J. Jesinčio g. 16A, Vilnius LT-03163

SUSIDRAUGIAUK SU SAVO ALERGIJA!

Pasiūlymai galioja 2024 04 01 – 2024 04 30.

Leidinyje ir „Svytinčioms akimirkom“ priede nurodytos maisto papildų, kosmetikos, medicininės paskirties prekių ir medicinos prietaisų kainos fizinesė vaistinesė galioja su vaistinės lojalumo kortele, o vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujantiems prekėms. Nuolaidos taikomos prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą. Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinesė, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį/informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.


Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkvtk.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkvtk.lt.

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Daugiau informacijos NORFOS vaistinėje, tel. 8 800 10008, www.nvaistine.lt MAŽYLIUI IR MAMAI skirtas prekes ypatingomis kainomis greičiau ir patogiau užsisakykite internetinėje vaistinėje www.nvaistine.lt. Užsisakius prekių (išskyrus vaistinius preparatus) už 28,96 € ir daugiau – pristatymas NEMOKAMAS! Reklaminio teksto parengimo data – 2024 03 18.



**AMBIO
CHOLESTEROL
BALANCE
COMPLEX,**

90 kapsulių



-50%

~~29⁹⁸€~~
14⁹⁹€

MAISTO PAPILDAS

**AMBIO GERKLEI
VAIKAMS**

(sirupas), 150ml



-35%

~~6⁴⁹€~~
4²²€

MAISTO PAPILDAS

**AMBIO
OMEGA-3
FORTE,**

60 kapsulių



-45%

~~12⁹⁸€~~
7¹⁴€

MAISTO PAPILDAS

**AMBIO LAKTO-
BIFIDOBakterijos
su S. BOULARDI,**

20 kapsulių



-40%

~~14⁴⁸€~~
8⁶⁹€

MAISTO PAPILDAS

**AMBIO
VIRŠKINIMO
FERMENTAI,**

12 tablečių



-30%

~~3⁶⁴€~~
2⁵⁵€

MAISTO PAPILDAS

**AMBIO
KOFERMENTAS
Q10 100MG,**


30 kapsulių



-45%

~~18⁷⁸€~~
10³³€

MAISTO PAPILDAS



AMBIO BIOTINAS,
100 kapsulių

~~15⁷⁸€~~
10²⁶€

-35%



MAISTO PAPILDAS

AMBIO GLUCOBALANCE COMPLEX,
30 kapsulių

~~9⁸⁸€~~
5⁹³€

-40%



MAISTO PAPILDAS

AMBIO MUĻTIVITAMINAI NĖŠČIOMS IR MAITINANČIOMS,
30 tablečių

~~11⁹⁸€~~
6⁵⁹€

-45%



MAISTO PAPILDAS

AMBIO ATMINČIAI PLUS,
30 tablečių +
30 kapsulių

~~21⁹⁸€~~
13¹⁹€

-40%



MAISTO PAPILDAS

AMBIO SELENAS,
90 tablečių

~~9⁹⁸€~~
6⁹⁹€

-30%



MAISTO PAPILDAS

AMBIO GELEŽIS SU B12,
30 tablečių

~~13⁹⁸€~~
9⁰⁹€

-35%



MAISTO PAPILDAS



IMUNINEI SISTEMAI

IKI -50%



IMUNITAL

IMUNITAL SHOTS, 20 buteliukų **33⁹⁹ 17⁰⁰ € -50 %**IMUNITAL VITAMIN C 1000 SHOTS, 20 buteliukų **25⁹⁹ 18¹⁹ € -30 %**IMUNITAL HOT DRINK, su islandinėmis kerpenomis, 5 pakeliai **8⁹⁹ 6²² € -30 %**IMUNITAL HOT DRINK, su imbierais ir citrinomis, 5 pakeliai **7⁹⁹ 5⁵² € -30 %**IMUNITAL PLUS, 30 kapsulių **9⁹⁹ 6⁹⁷ € -30 %**

MAISTO PAPILDAI

Imuninė sistema – tai žmogaus organizmo atsakas neįgajamiems aplinkos veiksniams. Tam tikru metu laiku ar pasikeitus įprastoms gyvenimo sąlygoms (pvz., esant peršalimo ligų sezonui), imuninei sistemai gali prireikti stipresnio palaikymo. „Imunital“ – skirtingų vartojimo formų ir sudėčių produktai, skirti imuninei sistemai. Kapsulės, „Imunital Plus“ su kiminiais kordicepsais ir ežiūolėmis, „Imunital Shots“ – itin stipri programa imunitetui su bičių pieneliu, priešgrybelio koncentratu, riešiši ir šitake grybų ekstraktais bei vitaminu B6. Tik 1 buteliukas per dieną! „Imunital Vitamin C 1000 Shots“ – didelė dozė stabilizuoto skysto vitamino C imunitetui. Ir „Imunital Hot Drink“ – karštas gėrimas, kurį rekomenduojama vartoti pajutus pirmuosius peršalimo simptomus. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

„IMUNITAL“ – **MAGIŠKAI TVIRTAS IMUNITETAS!**

GERKLĖS PERŠTĖJIMUI IR UŽKIMIMUI PALENGVINTI

IKI -30%



ISLA

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Isla“ pastilių su islandinėmis kerpenomis sudedamosios dalys padengia gleivines, gerklę ir ryklę kaip balzamas. Tokiu būdu sudirgusi gleivinė apsaugoma nuo tolesnio dirginimo ir greičiau atsigauja dėl malonaus pastilių poveikio, ypač esant užkimimui ir perštinčiai gerklei, pernelyg dideliame balso stygų įtempimui (dainininkai, pranešėjai), sausam orui (šildomose arba vėdinamose patalpose), burnos džiūvimui, apsupinkant kvėpavimui per nosį. Suaugusieji ir vyresni kaip 4 metų vaikai turi lėtai čiulpti 1–2 pastiles keletą kartų per dieną pagal poreikį.

Reklamos teksto parengimo data 2023-08-21 PM-LT-2023-8-3838

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

IKI -45%



AMBIO

VITAMINAS D3 1000, 80 kapsulių **8⁴⁸ 4⁵⁶ € -45 %**VITAMINAS D3 2000, 60 guminukų **14⁹⁸ 9⁷⁴ € -35 %**VITAMINAS D3, 4000 IU, 60 kapsulių **14⁹⁸ 8²⁴ € -45 %**

MAISTO PAPILDAI

IKI -50%



AMBIO

IMUNINEI SISTEMAI SU BETA GLIUKANAIŠ, 30 kapsulių **9⁹⁸ 5⁹⁹ € -40 %**IMUNITETUI SU ŠEIVAMEDŽIU IR EŽIUOLE, 20 tablečių **10⁹⁸ 5²⁴ € -50 %**IMUNITETUI SU KVERCETINU, 30 kapsulių **10⁹⁸ 6⁵⁹ € -40 %**

MAISTO PAPILDAI

-30%

ABC VIT VITAMINAS A, 60 kapsulių **6⁹⁹ 4⁸⁹ €**VITAMINAS D3 50 MG (2000 TV), 60 kapsulių **7⁹⁹ 5⁵⁹ €**VITAMINAS D3 100 MG (4000 TV), 60 kapsulių **7⁹⁹ 5⁵⁹ €**ABC VIT VITAMINAS C, 500 mg, ananasų skonio, 50 tablečių **5⁹⁹ 4¹² €**ABC VIT VITAMINAS C, 500 mg, apelsinų skonio, 50 tablečių **5⁹⁹ 4¹² €**ABC VIT VITAMINAS C, 500 mg, braškių skonio, 50 tablečių **5⁹⁹ 4¹² €**

MAISTO PAPILDAI

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, padeda palaikyti normalią kaulų, dantų būklę, normalią raumenų funkciją, padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės, nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

-30%

COSINUS SINUSES AND NOSE purškalas, 60 ml **6⁹⁹ 4³³ €**COSINUS, 30 tablečių **6⁹⁹ 4⁶¹ €**

MAISTO PAPILDAI

IKI -35%



IMMUNACE

IMMUNACE su ežiūolėmis, 30 tablečių **22⁹⁹ 14⁹⁴ € -35 %**IMMUNACE EXTRA, 30 tablečių **28⁹⁹ 22⁶³ € -20 %**

MAISTO PAPILDAI

„Immunace“ – subalansuotas ežiūolių ir antioksidantų kompleksas. Ežiūolės palaiko natūralią organizmo apsaugą. Antioksidantai – cinkas, selenas, vitaminas C ir kiti – padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. Geležis, folio rūgštis ir kitos medžiagos palaiko normalią imuninės sistemos veiklą. „Immunace Extra“ sudėtis papildyta inovatyviomis medžiagomis – resveratrolu, astaksantinu, alfa-lipo rūgštimi, likopenu. Pakanka 1 tabletės per dieną.

„IMMUNACE“ – **NEMATOMAS IMUNITETO RŪBAS!**

IMUNINEI SISTEMAI

-30% 6^{29€}

GRINOVITA FORTE, 10 pakelių

MAISTO PAPILDAS

Didelės vitamino C kiekis. Į sudėtį įeina taip pat juodųjų serbentų (*Ribes nigrum*) uogų miltelių koncentratas, paprastųjų aviečių (*Rubus idaeus*) uogų miltelių koncentratas, juodųjų šėivamedžių (*Sambucus nigra*) vaisių ekstraktas, jamaikinių kimrožių (*Hibiscus sabdariffa*) žiedų ekstraktas. Vartojimo būdas: pakelio turinį (10 g) supilkite į puodelį ar stiklinę, užpilkite 150 ml šilto vandens. Išmaišykite. Rekomenduojama suvartoti 1 pakelį per dieną. Skirta vartoti vaikams nuo 12 m. ir suaugusiesiems.

-35%



AMBIO

GERKLEI SU ISLANDINE KERPENA IR IMBIERU, 20 tablečių **5⁹⁹ 3⁸⁹€**
 GERKLEI SU ŠALTALANKIŲ IR MEDETKŲ ALIEJAIS, 20ml **6⁴⁹ 4²²€**
 GERKLEI SU ISLANDINE KERPENA IR EUKALIPTU, 20 tablečių **5⁹⁹ 3⁸⁹€**
MAISTO PAPILDAI


-30%



AMBIO

AMBIO BRONCHO COMPLEX (skystasis maisto papildas), 120ml **6⁹⁹ 4⁸⁹€**
 AMBIO BRONCHO COMPLEX, 20 tablečių **5⁹⁹ 4¹⁹€**
MAISTO PAPILDAI

-40% **8⁹⁹€** ~~14⁹⁹€~~



AMBIO HOT HERBAL DRINK (milteliai karštam gėrimui), 20 pakelių
MAISTO PAPILDAS

-40%



AMBIO

VITAMINAS C, 56 kramtomosios tabletės **8⁹⁹ 5³⁹€**
 LIPOSOMINIS VITAMINAS C SU KVERCETINU, 30 kietųjų kapsulių **16⁹⁹ 10¹⁹€**
MAISTO PAPILDAI

-40% **9⁵⁸€** ~~15⁹⁹€~~



GOLAMIR 2ACT

Golamir 2ACT, purškiklis be alkoholio, 30 ml
 Golamir 2Act, 20 tablečių
MEDICINOS PRIEMONĖS
 - Malšina gerklės skausmą, deginimą
 - Palengvina rijimą saugodamas gleivinę nuo dirgiklių
 • 100 % natūralus
 • biologiškai skaidus
 • gaminamas be sintetinių, pusiau sintetinių arba genetiškai modifikuotų medžiagų.

-40%



GRINTUSS

Grintuss Adult sirupas, 180 ml **18⁹⁹ 11³⁸€**
 Grintuss Adult, 20 tablečių **20⁹⁹ 12⁵⁸€**
 Grintuss Pediatric sirupas, 180 g **18⁹⁹ 11³⁸€**

MEDICINOS PRIEMONĖS

- Ramina kosulį
- Skystina ir padeda šalinti gleives
- Saugo gleivinę
- 100 % natūralus
- biologiškai skaidus
- gaminamas be sintetinių, pusiau sintetinių arba genetiškai modifikuotų medžiagų.
- Sudedamosios dalys iš ekologinio ūkio

VAISTINĖ
 VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS

GAMINAME VAISTUS PAGAL INDIVIDUALIUS RECEPTUS

- Atneškite gydytojo receptą iki 13 val. į bet kurią „Gintarinę vaistinę“.
- Atsiimkite pagamintą vaistą kitą darbo dieną.



BURNOS INFEKCIŲ LIGOMS GYDYTI

7.49 €

JOX

85/1 mg/ml burnos gleivinės, gerklų ir ryklės purškalo (tirpalas), 30 ml



NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 85 mg joduoto povidono ir 1 mg alantoino. Terapinės indikacijos: papildomas lokalus lengvų burnos ir ryklės infekcinių ligų faringito, stomatito, gingivito gydymas; papildomas bakterijų sukkelto tonzilito gydymas kartu su antibiotikais; burnos ertmės infekcijos profilaktika ligoniams, kuriems atliekamos burnos ar ryklės operacijos. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniams kaip 8 m. vaikams įprastinė dozė – puršksti 2-4 kartus per parą, bet jeigu būtina, galima vartoti ir dažniau (kas 4 val.), purškšti ne daugiau kaip 3 kartus į dieną ir kairę burnos ertmės pusę, bet ne daugiau kaip 6 kartus per parą. Pertrauka tarp atskirų įpurškimų turi būti ne mažesnis kaip 4 val. Vaistinio preparato negalima įkvėpti ar nurijoti. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; inkstų funkcijos sutrikimas; dekompensuotas širdies nepakankamumas; neštumo ir žindymo laikotarpis; 2 sav. prieš planuojamą tyrimą arba gydymą radioaktyviuoju jodu ir 2 sav. po to; nuolat vartoti ligoniams, kuriems diagnozuotas skydliaukės funkcijos sutrikimas; nuolat vartoti ligoniams, kurie kartu vartoja ličio vaistinių preparatų; jaunesniems kaip 8 m. vaikams (dėl farmacinės formos). Specialūs įspėjimai: Jeigu „Jox“ atsitiktinai patenka į akis, jas reikia gerai nuplauti vandeniu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, „Jox“ purškalo reikia vartoti atsargiai. Siems pacientams preparatas gali sukelti kepenų transaminazių kiekio padidėjimą. Ligoniams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, „Jox“ vartoti draudžiama. Vaistinio preparato vartoti ligiui kaip 7 dienas negalima. Jeigu pasireiškia jautrumas arba nuolatinis lokalus dirginimas, vaistinio preparato vartojimą reikia nutraukti. Sergant laringitu, vaistinio preparato galima vartoti tik būtinu atveju. Reklamos teksto parengimo data 2022-03. OT-LT-00023 „Jox“ – VIENINTELIS TOKS!

NOSIES UŽGULIMUI MAŽINTI IR KASDIENEI PRIEŽIŪRAI

-5%

QUIXX

Quixx Baby nosies lašai, 10ml 6.99 €

Quixx daily nosies purškalas, 100ml 10.99 €

Quixx nasal spray, 30ml 6.99 €



Quixx Soft nasal spray, 30ml 6.99 €

Quixx acute nosies purškalas, 100ml 10.99 €

Quixx Extra nosies purškalas, 30ml 6.99 €

MEDICINOS PRIEMONĖS

Quixx efektyviai mažina peršalimo, gripo ar alergijos sukelta nosies ir sinusų užsikimšimą. Dozavimas. Kūdikams (nuo 6 mėnesių) ir vaikams: 1-2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2-3 kartus per dieną. Suaugusiems: 1-3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2-3 kartus per dieną. **Quixx Soft** su alavijų ekstraktu – tai natūrali, pagalbiniu priemonė, drėkinanti jautrias nosies sienelės ir apsauganti nuo peršalimo sukkeliamų simptomų nosyje. Dozavimas. Kūdikams (nuo 6 mėnesių) ir vaikams iki 5 metų: 1 įpurškimas į kiekvieną šnervę iki 4 kartų per dieną. Vaikams nuo 6 metų ir suaugusiems: esant reikaliui, 1-3 įpurškimai į kiekvieną šnervę kelis kartus per dieną. **Quixx Extra** su eukaliptų aliejumi sumažina nosies ir sinusų užsikimšimą peršalus ir sergant gripu, stimuliuoja nosies ertmės išsivymą, suteikia stiprų galvos pūlimą. Dozavimas. Vaikams nuo 6 metų amžiaus: 1-2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2-3 kartus per dieną, suaugusiems ir paauguliams: 1-3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2-3 kartus per dieną. **Quixx Daily** kruopščiai praskalbia nosį ir sumažina bakterijų, virusų, alergijų bei žiedadulkių, kietųjų dalelių, dulkių kiekį. Priemonė gali vartoti vaikai nuo 2 metų amžiaus ir suaugusieji. **Quixx Acute** - natūrali nosies valymo priemonė ir pagalba pasireiškus slogai. Gali vartoti vaikai nuo 5 metų amžiaus ir suaugusieji. **Quixx baby** - mažiųjų nosies priežiūra ir higienai nuo pirmosios gyvenimo dienos. Dozavimas. 1-3 lašai į kiekvieną nosies šnervę nuo 2 iki 6 kartų per dieną ar dažniau, jei reikia. Naujagimiams ir kūdikiams iki 3 mėnesių rekomenduojama vartoti netiesiogiai, užlašinus ant vatos tamponėlio. Sudėtyje yra tik natūralios medžiagos. Specialūs įspėjimai. Quixx medicinos priemonių negalima vartoti jei yra jautrumas bet kuriai priemonės sudėtyje esančiai medžiagai. UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ Jasinio g. 16a, Vilnius LT-03165, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com LT_01_01_2023. Y Reklama parosta 2023m. sausio mėn.

QUIXX- VANDENYNO GALIA PRIEŠ SLOGĄ!

NOSIES GLEIVINĖS PABURKIMUI MAŽINTI

4.49 €

RHINO-STAS

nosies purškalas, tirpalas, 10 ml



NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 ml nosies purškalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. Indikacijos: „Rhino-stas“ yra simpatikomimetikas. Purškalas siaurina kraujagysles, todėl mažina nosies gleivinės paburkimą. Vartojamas trumpalaikiam nosies gleivinės paburkimui mažinti, sergant sloga arba prienosinių ančių uždegimų (sinusitu). Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 10 m. vaikams bei paauguliams reikia puršksti po 1 įpurškimą tirpalu „Rhino-stas“ į kiekvieną nosies landą 1-3 kartus per parą tada, kada reikia. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jei yra sausasis nosies gleivinės uždegimas (sausasis rinitas); pacientams, kuriems po nosies neseniai buvo atlikta smegenų operacija; jaunesniems kaip 10 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: „Rhino-stas“ galima vartoti tik atidžiai įvertinus jo vartojimo riziką ir galimą naudą šiais atvejais: pacientams, kurie vartoja ar vartoja vaistų nuo depresijos (monoaminooksidazės inhibitorių) arba kitų vaistų, kurie gali labai padidinti kraujospūdį; kai padidėjęs akispūdis, ypač sergant ūdaro kampo glaukoma; sergant sunkia širdies ir kraujagyslių sistemos liga (pvz., vainikinių širdies arterijų liga, hipertenzija); sergant feochromocitoma (antinksčių naviku); sergant porfirija; sergant medžiagų apykaitos ligomis (pvz., hipertireozė, cukrinis diabetas). Pakuotės lapelio peržiūros data 2018-10-23. Reklamos teksto parengimo data 2020-02-03.

PURŠKALAS „RHINO-STAS“ – PIRMOJI PAGALBA SERGANT SLOGA AR SINUSITU!

PERŠALUS


8.99 €

ACTIFED®

ACTIFED® 60 mg/2.5 mg tabletės, 12 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tabletė yra 60 mg pseudoeferidino hidrochlorido ir 2.5 mg triprolidino hidrochlorido. Indikacijos: nosies ir viršutinį kvėpavimo takų gleivinės užburkimo (užgulimo) pašalinti mažinimas. Nosies tekėjimo ir daudulio stiprinimas. Dozavimas ir vartojimo metodas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: po 1 tabletę kas 4-6 val. iki 4 kartų per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Pacientai, kurie vartoja ar per pastarąsias 14 dienų vartojo monoaminooksidazės inhibitorių, širdies ir kraujagyslių ligos, hipertenzija, sunkus inkstų funkcijos sutrikimas, diabetas, feochromocitoma, hipertirozė, ūdaro kampo glaukoma. Draudžiama kartu vartoti kitus simpatikomimetinius dekongestantus ir beta blokuojančius. Vaikai iki 12 metų. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: ACTIFED® gali sukelti mieguistumą. Nevartoti kartu alkoholio. ACTIFED® vartojimą reikia nutraukti, jei pasireiškia šie simptomai: haliuciacijos, neramumas, miego sutrikimai, karščiavimas ir išplitusi raudonė su smulkiais pūlinėliais, staiga netekus regos arba sumažėjęs regos atstumas, staigus pilvo skausmas, kraujavimas iš šlapimo ar kiti šerminio kofolio simptomai. Pacientai, sergantys kepenų liga, vidutiniškai sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu, ACTIFED® turėtų vartoti atsargiai. Vaistas negali būti vartojamas vaikams raminti. ACTIFED® tablečių sudėtyje yra laktozės – jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate sukriū no anglavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Teksto peržiūros data: 2024.01. LT-MU-2100002. GREITAS PALENGVĖJIMAS PERŠALUS.



Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis



1.99 €

PARACETAMOL ZENTIVA 500 MG, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekvienoje tabletyje yra 500 mg paracetamolo. Terapinės indikacijos. Trumpalaikis simptominis lengvo ar vidutini stiprumo skausmo ir (arba) karščiavimo malšinimas. Paracetamol Zentiva 500 mg tabletes skirtas suaugusiems, paauguliams ir 6 metų bei vyresniems vaikams, sveriantiems daugiau kaip 21 kg. Vartojimo būdas ir dozavimas. Reikėtų vartoti mažiausia veiksmingą dozę, kiek galima trumpesni laiką. Didžiausias paros dozės viršyti negalima. Paracetamolis dozuojamas atsūvelgiant į kūno svorį ir amžių, paprastai skiriami vienkartinė 10-15 mg/kg kūno svorio dozė, nevirsiant didžiausios paros dozės – 60 mg/kg kūno svorio. Tabletes reikia nurijuti užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio, vartoti valgio metu arba nevalgius. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbine medžiagai. Sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas. Ūminis hepatitas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Paracetamol Zentiva nevertokite kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolo. Vartojant didesnę nei rekomenduojama vaisto dozę, padidėja sunkaus kepenų pažeidimo pasireiškimo rizika. Vartojami šį vaistą negerkite alkoholinių gėrimų. Reklamos teksto parengimo data: 2022 m. gruodžio mėn. ID00056231



PERŠALIMO LIGŲ SIMPTOMAMS LENGVINTI

NUO 7.99 €

FERVEK

FERVEK vaikams, granulės geriamajam tirpalui paketyje, N8 7.99 €

FERVEK suaugusiems, granulės geriamajam tirpalui paketyje, N8 7.99 €

FERVEK suaugusiems, be cukraus, granulės geriamajam tirpalui paketyje, N8 8.99 €



NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 paketyje „Fervek“ suaugusiems ir suaugusiems be cukraus yra 500 mg paracetamolo, 25 mg feniramino maleato, 200 mg askorbo rūgšties; 1 paketyje „Fervek“ vaikams yra 280 mg paracetamolo, 100 mg askorbo rūgšties. Terapinės indikacijos: trumpalaikis ūminis peršalimo ligų simptomams (karščiavimas, nosies gleivinės paburkimo, skausmo) palengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Fervek“ suaugusiems, granulės geriamajam tirpalui paketyje, be cukraus: suaugusiems ir paauguliams nuo 15 metų (sveriantiems daugiau kaip 50 kg) gerti po 1 pakelį 3-4 kartus per dieną, kartoti mažiausiai po 4 valandų, nevirsiant 3 pakelėmis per parą. „Fervek“ vaikams: 6-10 m. vaikams gerti po 1 pakelį 2 kartus per parą, 10-12 m. vaikams – po 1 pakelį 3 kartus per parą, 12-15 m. paauguliams – po 1 pakelį 4 kartus per parą, bet ne dažniau kaip kas 4 valandas. Mažiausią gydymo trukmę yra 5 dienas vartojant „Fervek“ suaugusiems ir 3 dienas – „Fervek“ vaikams. Jei inkstų ar kepenų funkcija sutrikusi vartoti atsargiai, rekomenduojama sumažinti dozę ir palengvinti minimaliai tarp dozių. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas vaisto sudedamosioms dalelėms, sunkus kepenų nepakankamumas, aktyvus kepenų ligos, ūdaro kampo glaukoma, šlapimo susilaikymas, skrandžio priveržimo stenozė, šlapimo takų akmenys, draudžiama vartoti vaikams ir paauguliams iki 15 m.; „Fervek“ vaikams: draudžiama vartoti vaikams iki 6 metų. Fervek suaugusiems be cukraus – fenileketonurija. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pastaraitė su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergate Žilberto sindromu, sergate kepenų arba inkstų liga, piktnaudžiaujate alkoholiniais gėrimais, yra anoreksija, kacheksija arba ligalaidė bloga mityba (glutamo rūgšties kepenyse trūkumas), yra dehidratacija, hipovolemija, sergate epilepsija, sutrikusi galvos apykaita, yra polinkis susidurti alimerms šlapimo takuose, pacientams, sveriantiems mažiau nei 50 kg, trūksta gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės, yra hemolizė anemija, yra padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, pasireiškiantis bronchu spazmo priepuoliu, jei sergate ar pasireiškė ūminis virusinis hepatitas. Atsargūs odos šerbetumai ar kitoms alergijos požymiams, nutraukite gydymą ir nedelsdami kreipties į gydytoją. Nevartokite kartu jokio kito vaisto, kurio sudėtyje yra paracetamolo, feniramino ar kitų antihistamininių vaistų, vitamino C ir patikrinkite ar neviršijate didžiausias leistinas dozes. Sergantiems cukriniu diabetu atsargiai vartoti „Fervek“ suaugusiems, sergantiems fenileketonurija atsargiai vartoti „Fervek“ suaugusiems be cukraus. Daugiau informacijos ži. vaistinių preparatų charakteristikų santraukoje arba pakuočių lapeliuose. Reklamos teksto parengimo data 2023-06-22. PM-LT-2023-6-3271. JEGA, KOVOJANTI SU PERŠALIMU!

NUO PERŠALIMO

NUO 4.99 €

DALERON COLD3

DALERON COLD3, 12 plėvele dengtų tablečių 4.99 €

DALERON COLD3, 24 plėvele dengtos tabletės 8.49 €



NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Vienoje plėvele dengtoje tabletyje yra 325 mg paracetamolo, 30 mg pseudoeferidino hidrochlorido ir 15 mg deksketometorano hidrochlorido. Terapinės indikacijos. Peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, sąnarių, gerklės skausmas, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Dozavimas ir vartojimo metodas. Įprasta dozė suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vaikams yra 2 tabletės. Tokia dozė galima gerti daugiausia 4 kartus per parą. Tarp dozių vartojimo turi būti praėjusios mažiausiai 4 valandos. Didžiausia paros dozė yra 2 tabletės. Kontraindikacijos, specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Sunki hipertenzija ar išemine širdies liga. Vartojama MAO inhibitorių, guanetidino arba jo darinių, beta blokuojančių ar vartojama kitų vaistinių preparatų, kuriuose yra paracetamolo. Sunkus kepenų arba inkstų funkcijos sutrikimas. Kartu vartojama kitų kraujagysles sutraukiančių vaistinių preparatų nosies gleivinės paburkimui mažinti, įskaitant vazokonstriktorius per burną ar į nosį. Anksčiau sergant miokardo infarktu, buvus insultas arba šiuo metu esantis insulto rizikos faktorai. Sergama lėtiniu alkoholiu, glaukoma, feochromocitoma, persistama raudonoja virkštie, cukriniu diabetu, hipertirozizmu ar badaujama. Esant nosies padidėjimui ar anksčiau buvo traumai. Reklamos teksto parengimo data: 2023 10 17.

PRADEDA VEIKTI JAU PER 20 MINUTIŲ!

SAUSAM KOSULIUI

4.49 €

STOPTUSSIN, 4 mg/100 mg tabletės, 20 tablečių

VAISTINIS PREPARATAS

Stoptussin 4/100 mg tabletes. Vienoje tabletyje yra 4 mg butamirato divandenilio citrato ir 100 mg gvafenezino. Terapinės indikacijos. Sauso, dirginančio kosulio stiprinimas. Dozavimas ir vartojimo būdas. Vyresniems kaip 12 metų paauguliams ir suaugusiems pacientams – nuo 3 tabletes iki 1 ir 3 tabletes 3-4 k/para (dozė priklauso nuo ligonio kūno svorio). Tarp dozių būtina daryti 4-6 valandų pertrauką. Stoptussin vartoti ligiui kaip 3 paras, nepamirštus su gydytoju, draudžiama. Jaunesniems kaip 12 metų vaikams Stoptussin vartoti nerekomenduojama. Vartoti po valgio. Tablečių nurijuti, užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosios arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sunkioji miastenija; pirmasis neštumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pacientai, kuriems yra produktyvus ir (arba) pastovus ar lėtinis kosulys, sukeltas ryškios, astmos, lėtinio bronchito ar emfizėmos, neturėtų būti gydomi butamirato citrato ir gvafenezino deriniu. Jei simptomai šlieka ar būklė blogėja, gydymas turėtų būti peržiūretas. Reklamos medžiagos parengimo data: 2022 09 12 OT-LT-00042

NUTILDYKITE KOSULIŲ!



PAVIRŠINIŲ ODOS ŽAIZDŲ GYJIMO GERINIMUI

NUO 5⁹⁹ €

Bepanthen 50 mg/g kremas, 30 g
Bepanthen 50 mg/g tepalas, 30 g
Bepanthen Plus 50 mg/5 mg/g kremas, 30 g

BEPANTHEN

Bepanthen 50 mg/g kremas, 30 g **5⁹⁹ €**
Bepanthen 50 mg/g tepalas, 30 g **5⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. 1 g preparato yra 50 mg dekspantenolio. **Terapinės indikacijos:** įvairios kilmės paviršinių odos ir gleivinių pažeidimų pagalbiniams gydymams drėkinant odą ir atkuriant epidermio barjerą, palaikant epitelizaciją su atitinkamu priešuždegiminiu ir niežėjimą mažinančiu poveikiu, pavyzdžiui nedidelių pažeidimų (nedidelių nudegimų arba nubrozdinimų), odos sudirginimų, išbrėmimo nuo sauskelnių, skausmingų ir įtrūkusių spenelių gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** pažeista odą tepti plonu sluoksniu preparato vieną ar daugiau kartų per dieną, reikaliu esant. Skausmingus ir įtrūkusių spenelių tepti po kiekvieno maitinimo, prieš žindant rupluotai. Tepti kiekviena kartą keičiant sauskelnes, prieš tai odą reikia kruopščiai nuvalyti. Gydymo trukmė priklauso nuo susirgimo pobūdžio ir eigos. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jei sergate kita liga, esate alergiškas arba vartojate kitus vaistus, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Naudojant tepalą ar kremą reikia vengti kontakto su akimis. Reklamos teksto parengimo data: 2023-01-01 CH-20230127-73

BEPANTHEN PLUS 50 mg/5 mg/g kremas, 30 g 6⁴⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. 1 g kremo yra 50 mg dekspantenolio ir 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** lokalus įvairių paviršinių žaizdų, pvz. nubrozdinimų, įpjovimų, išbrėmimų, odos įtrūkimų, nudegimų gydymas, kai yra infekcijos pavojus. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** kūdikiams nuo 1 mėn., vaikams, paauguliams ir suaugusiems išvalytą žaizdą arba pažeistą odą reikia tepti plonu kremo sluoksniu viena arba kelis kartus per dieną, kol žaizda užgis. Venkite tepti didelius odos plotus. **Kontraindikacijos:** alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; gilios arba stipriai užkrėstos žaizdos; jei trūkės ausies būgnelis, negalima tepti ausies srities. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** saugokitės, kad kremas nepatektų akis, ausis ir ant gleivinių. Negalima tepti ant sudirgintos, bet neišnekuotos odos. Negalima vartoti kartu su kitomis antiseptinėmis medžiagomis, muilu. Jei pasireiškia sunkios alerginės reakcijos simptomai, vartojimą nedelsiant nutraukite ir pasitarkite su gydytoju. Reklamos teksto parengimo data: 2023-01-01 CH-20230127-73

LAIMEI, YRA BEPANTHEN® GYDO IR APSAUGO ODA

-20%



URGO

Urgo pleistrai – inovatyvūs produktai padės prižiūrėti paviršines žaizdas. Tai patogūs, alergiškos nesukeliantys bei orui pralaidūs pleistrai, kurių nelipni pleistrų pagalbė impregnuota antiseptiniu tirpalu, žaizdes sauganti nuo bakterijų.

Urgo Filmogel geliai – naujos kartos technologija pažeistiems nagams, pūslelinei, burnos žaizdoms, gelis odos įtrūkimams ir purškiamas pleistras mažiems odos įtrūkimams.

URGO – PLEISTRŲ EKSPERTAI JAU 60 METŲ. PRIŽIŪRIMOS ŽAIZDOS GYJA GREIČIAU!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-25% 7^{49€}



DERMATONICS DRY SKIN

balzamas, 60 ml
Jo sudėtyje yra 10% karbamido ir kitų palaikomųjų emolientų. Tinka kūno, rankų ir pėdų drėkinimui. Tinka žmonėms sergantiems cukriniu diabetu. **GREITAI IR ITIN EFEKTYVAI DRĖKINA ODA.**

DERMATONICS ULTRA VEEN ITCH RELIEF kremas, 60 ml

Unikali sudėtis - kremo formulėje yra **3% koloidinių avižinių dribsnių ir 5% šlapalo**. Nuramina sudirgintą odą, efektyviai sumažina niežėjimą, todėl gali būti siūlomas kaip alternatyva atopiniam dermatitui sergantiems žmonėms. Pasirūpinti itin geromis apsauginėmis bei drėkinančiomis savybėmis. **PIRMA PAGALBA NIEŽTINČIAI ODAI.**

-10% 5^{40€}



ICHTIOLO BALZAMAS, 30 g

MEDICINOS PRIETAISAS

Pagalbinė odos priežiūros priemonė išoriniam naudojimui. Ingredientai: Petrolatum, Sodium Shale Oil Sulfonate 10% (Icthiolic acid, sodium salt). Naudojimas: tepti balzamu problemiškas odos vietas 2-3 kartus per dieną. Reikaliu esant – uždėti švarų marlinį tvarstį. Nenaudoti esant padidintam jautrumui gamtinio sudėtinės dalies; vaikams iki 12 metų. Laikyti nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje, sausoje, tamsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Gamintojas: „Farmakom“, Ukraina. Igaliojasis gamintojo atstovas Europos ekonomijoje erdvėje ir importuotojas: ES: SIA „VIOLA FARMA“, Ulbrokas Iga, Riga, Latvija. Platintojas Lietuvoje: UAB „VERATRUM PHARMA“, Žarijų g. 2B, Vilnius

6⁹⁹ €



TERBINAFIN-RATIOPHARM 10 mg/g kremas, 15 g.

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Terbinafin-ratiopharm 10 mg/g kremas. 1 g kremo yra 10 mg terbinafino hidroklorido. **Indikacijos:** Odos infekcija, sukelta dermatofitu, tokių kaip Trichophyton, Microsporum canis ir Epidermophyton floccosum; mieliagrybių, daugiausia Candida genties; įvairios spalvės dedervėnų, sukelta Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** Suaugę ir paaugliai (>12 metų amžiaus); pedos grybelis, blauzdos grybelis ir liemens grybelis: 1 k. per parą savaitę laiko; odos kandidozė: 1 k. per parą 1-2 savaites, įvairios spalvės dedervėnė: 1-2 k. per parą 2 savaites. Tepti ant sausos ir švarios odos. Terbinafin-ratiopharm 10 mg/g kremas turi būti tepamas ant pažeistos ir aplinkinės odos plonu sluoksniu ir tada švelniai įtrinamas. Jei infekcija yra raukšlėse (po kūrimu, tarpupirščiuose, sėdimųjų raukšlėse arba kirksnyje), po kremo užtepimo odą galima uždegti steriliu marlės gabaliu, ypatingai naktį. Simptomų palengvėjimas dažniausiai atsiranda per kelias paras. Nereguliarus vaisto vartojimas arba ankstyvas nutraukimas padidina simptomų pasikartojimo riziką. Jei per 2 sav. nespėjimas pagerėjimo, diagnozė turi būti svarstoma iš naujo. Terbinafin-ratiopharm 10 mg/g kremo nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 metų vaikams, nes duomenų apie saugumą nepakanka. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** Terbinafin-ratiopharm 10 mg/g kremas yra skirtas tik išoriniam vartojimui. Sąlyčio su akimis turi būti vengiamas. Gali atsistoti akių dirginimo požymiai. Įvykus atsitiktiniam sąlyčiui su akimis, gerai išplaukite jas tekančiu vandeniu. Terbinafin-ratiopharm 10 mg/g kremą reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Sudėtyje esantis cetosteario alkoholis ir celtio alkoholis gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą). Benzilo alkoholis gali sukelti alerginių reakcijų ir nesunkų vietinį sudirginimą. **Reklamos teksto parengimo data:** 2023 gegužė. OTC-LI-00061

-35% 13^{97€}



OLIPROX nagų lakas grybeliui

(gelis vandens pagrindu), 12 ml

Oliprox™ nagų lakas (gelis vandens pagrindu) – veiksminga priemonė, padedanti užkirsti kelią grybelinei infekcijai bei pagalbiniu priemonė gydant onichomikozę (nagų grybelį).

-50%



NIZORAL®

NIZORAL® CARE kosmetinis galvos tonikas, 100 ml **15⁹⁹ 7⁷⁹ €**

NIZORAL® EXPERT DAILY CARE šampūnas, 200 ml **14⁹⁹ 7²⁴ €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Nizoral® Care“ kosmetinis galvos tonikas. Niežtinčios, sudirgusios galvos odos apsauga ir priežiūra su natūraliais magnolijų ir kaktusų augaliniais ekstraktais.
„Nizoral® Expert Daily Care“ šampūnas. Niežtinčiai ir pleiskanjančiai galvos odai. Poveikis pastebimas po pirmojo plovimo.
Z711_58_Nizoral_Cosmetics_V01_LT

ODOS PRIEŽIŪRA IR APSAUGA

-30%



SUDOCREM® MULTI-EXPERT, 60g 6⁹⁹ 4⁸⁹ €

SUDOCREM® MULTI-EXPERT, 125 g 10⁴⁹ 7⁸⁴ €

MEDICINOS PRIEMONĖ

Sudocrem® Multi-Expert™ skirtas įvairių iššūtiui ir vystyklų bėrimų gydymui ir profilaktikai. Tinka kūdikių ir suaugusiųjų odos priežiūrai. Dėka subalansuotos sudėties, kremas švelniai gydo odos uždegimus, apsaugo odą nuo išorinių dirgiklių suformuodamas apsauginį odos barjerą. Sudėtyje esantis natūralus emolientas lanolinas gerai sugeria drėgmę ir minkština odą. Kremas išsaugo odos drėgmę ir nepalieka riebalų sluoksnio odos paviršiuje kaip kiti kosmetiniai kremai nuo iššūtių. Tepti plonu sluoksniu.
„SUDOCREM“ – TRIGUBAS EFEKTAS: ŠVELNIAI GYDO. RAMINA. APSAUGO

NUO **1⁹⁹** €



IBUMETIN®

200 mg, 10 plevelė dengtų tablečių **1⁹⁹** €
400 mg, 20 plevelė dengtų tablečių **4⁴⁹** €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: 1 tablete yra 200 mg arba 400 mg ibuprofeno. **Indikacijos:** trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip galvos, dantų, raumenų, sąnarių ar sukkelto menstruacinio, malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų, paauklams įprasta vienkartinė doze yra 1-2 tabletes. IBUMETIN 200 mg arba 1 tablete IBUMETIN 400 mg. Didžiausia paros dozė yra 1200 mg. Tabletę reikia užgerti šilku vandeniu. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofeni arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, acetilsalicilo rūgščiai arba kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU). Ligoniams anksčiau sirgusi acetilsalicilo rūgšties arba kitokiu NVNU sukelta astma, angioneurozinė edema, dilgėlinė rinitis ar kitokia padidėjusio jautrumo reakcija. Aktyvi arba buvusi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, opinis kolitas, kraujavimas iš virškinimo trakto ar kitoks kraujavimas, sunkus kepenų, širdies, inkstų funkcijos nepakankamumas, hemoraginė diatezė, psichiniai ir nešūnimo medžiagų ar žuvalų toksinai. Vaikams ir paauguliams iki 12 metų, vartoti negalima. **Specialūs įspėjimai:** specialiai atsaugomoms priemonėms reikia, jei inkstų, kepenų arba širdies funkcija yra sutrikusi; yra buvę virškinimo trakto pažeidimų, sutrikęs kraujo krešėjimas arba vartojami antiagregantai, jei vartojama kitų NVNU ar vaistinių preparatų, galinčių padidinti skrandžio opos susidarymo arba kraujavimo pavojų, diuretikų ar nefrotoksinių poveikį turinčių vaistinių preparatų, sergama cukriniu diabetu, raudonoja virkštie, ar kitomis kolagenozėmis, Krono liga, opiniu kolitu, hipertenzija, periferinių arterijų liga, galvos smegenų kraujagyslių liga, astma, šienligė, yra nosies polipai ar lėtinė infekcinė kvėpavimo takų liga, svėrimus žmonėms. Pradėjus kraujavimui, atsisakyti ar odos reakcijai, vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir kuo skubiau kreiptis į gydytoją. Negalima vartoti, jei nustatytas paveldimas sutrikimas – Lapp laktozės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pirmuosius 6 nėštumo mėnesius vartoti negalima, nebent tai reabsorbcijai būtina ir taip pataria gydytojas. Teksto parengimo data: 2023-03-01

NUO MIGRENIŲ GALVOS SKAUSMO

NUO **4⁴⁹** €



SUMATRIPTAN ACTAVIS, 2 dengtos tabletės

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Vienoje tablete yra 50 mg sumatriptano. **Veiklioji medžiaga:** Neatididolinas migrenos priepuoliui, pasireiškiančio su aura ar be jos, gydymas suaugusiems, kuriems mediciniškai patvirtinta migrenos diagnozė ir turintys triptanų vartojimo patirties. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems rekomenduojama gerti vieną 50 mg sumatriptano dozę, kai kuriems pacientams gali prireikti 100 mg dozės. Jei pacientui nepadaeda pirmoji sumatriptano dozė, antrosios dozės tam pačiam priepuoliui palengvinti vartoti negalima. Tokiu atveju skausmas gali būti malšinamas paracetamoliu, acetilsalicilo rūgštimi ar nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo. Sumatriptano gerti galima, jei prasidėję naujas priepuolis. Paros dozė neturi viršyti 100 mg. Sumatriptan Actavis negalima vartoti dažniau kaip 9 dienas per mėnesį. Pacientams, kuriems migrena malšinti prireikia dažniau, turėtų kreiptis į gydytoją dėl kitokio gydymo (migrenos profilaktikos). Sumatriptano ne Rekomenduojama vartoti vaikams. Tablete reikia nuryti užgertam vandeniu. Ji galima sutraukti ir sumaišyti su skystu. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; buvęs miokardo infarktas, arba diagnozuota išeminė širdies liga, Prinzmetal (Prinzmetal) krūtinės angina (vaikiniui širdies kraujagyslių spazmas), periferinių kraujagyslių liga, išeminė širdies ligos simptomai arba polimija; buvusi smegenų kraujagyslių liga arba praėjusios smegenų išemijos priepuoliai; sunkus kepenų funkcijos sutrikimas; vidutinio sunkumo arba sunki hipertenzija, lengva nekontroliuojama hipertenzija; gydymas ergotaminu ar jo dariniais, įskaitant metilergidolį arba bet kurį triptaną ar 5-hidroksitriptaminą (5-HT) receptorių agonistų vartojimas; gydymas tiek laikino, tiek nepraeinančio poveikio monoaminooksidazės (MAO) inhibitoriais ir 3 savaites po gydymo nepraeinančio poveikio MAO inhibitoriais nutraukimo. **Spec.Įspėjimai:** Sumatriptan galima gydyti tik nustatydami, jog pacientas serga migrena. Jei migrena bazilinė, hemipleginė ar oftalmopleginė, sumatriptanas neleidžiama. Išgėrus sumatriptano, gali būti kitiems simptomai, ypač krūtinės skausmas ir spaudimas, kurie gali būti stiprūs ir įplėsi į gerklę. Itarus, kad šie simptomai rodo išeminę širdies ligą, sumatriptano vartojimą reikia nutraukti ir tinkamu būdu pasiekti širdį. Atsargumo priemonės reikalingos pacientams, kurie serga vidutinio laipsnio kontroliuojama hipertenzija, moterims postmenopauziniu periodu ar vyresniems negu 40 metų vyrams, kuriems šis širdies ligų rizikos veiksnys, pacientams, kuriems anksčiau yra buvę traukulių arba esant kitiems rizikos veiksniams, kurie mažina smegenų kraujavimo riziką, pacientams vartojantiems SSRI. Ilgai nuo galvos skausmo vartojant bet kokį skausmo malšinamąjį preparatą, galvos skausmas gali sustiprėti. Pacientams, kuriems yra lėtas paveldimas sutrikimas, pvz., galaktozės netoleravimas, Lapp laktozės trūkumas ar gliukozės ir galaktozės malabsorbcija, šio medikamento vartoti negalima. Teksto parengimo data: 2022-02-14

GYDO MIGRENIŲ GALVOS SKAUSMĄ

-25%



KAMISTAD®, 20ml **8⁴⁹** € **6³⁷** €

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

KAMISTAD® burnos purškalas su ramunėlių skirtas švelniai burnos gleivinės ir dantenu priežiūrai. Sukuriam purškimo galima tiksliai puršksti į gleivinę ir sunkiai pasiekiamas burnos ertmės vietas.

„Kamistad“ burnos purškalas:

- gali būti naudojamas kaip papildoma priemonė esant burnos opų, pažeidimų ir nedideliame burnos gleivinės uždegimui;
- padeda atkurti nuolatines gleivinės membranas;
- be cukraus;
- be alkoholio.

Naudojimas: nukreipkite purkštuką į norimą burnos ertmės vietą arba skaudamas burnos sritis. Spustelėkite purkštuką ir purškite 1-2 kartus rytą ir vakarais išsivalę dantis arba pagal poreikį.

-30%

4^{54€}



AMEDIPLUS

Šaldantis arklų balzamas, 250 ml
Šaldantis arklų balzamas, 250 ml
KOSMETIKOS PREKĖS

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis



NUO SKAUSMO

NUO **4⁴⁹** €



METAFENEX 200 mg/500 mg, 10 plevelė dengtų tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: 10 plevelė dengtų tablečių yra 200 mg ibuprofeno ir 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos:** „Metafenex“ skirtas trumpalaikiam lengvo ar vidutinio stiprumo skausmui, šalinamam su migrena, galvos skausmu, mėnesiniu skausmu, dantų skausmu, reumatiniu bet raumenų skausmu, nesituriu aritro skausmu, peršalimo ir gripo simptomams, perkš (tykš) skausmu bei karščiavimu, malšinti. Šis vaistinis preparatas ypač tinkamas skausmui, kuriam reikia stipresnės analgezijos nei vartojant vien ibuprofeną ar paracetamolį. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems gerti po 1 tablete ne dažniau kaip 3 kartus per parą valgio metu užgertam vandeniu. Taip dozių išlaikyti ne mažiau kaip 6 valandų tarpai. Jei, vartojant po 1 tablete, simptomai nesnyškia, daugiau galima vartoti po 2 tabletes ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių per bet kurį 24 valandų laikotarpį. „Metafenex“ negalima vartoti ilgiau kaip 3 dienas. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų asmenims. **Kontraindikacijos.** Šio vaistinio preparato vartoti negalima pacientams, kuriems yra padidėjęs jautrumas ibuprofeni, paracetamoliiui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti kartu su kitais vaistinėmis preparatais, kurių sudėtyje yra paracetamolio ar kitų NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius ir didesnę kaip 75 mg acetilsalicilo rūgšties paros dozes; jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumo reakcijai, susijusiai su acetilsalicilo rūgštimi arba kitais nesteroidiniams vaistams preparatais nuo uždegimo; jeigu anksčiau buvo aktyvi arba buvusi psichotrofinė peptinė opa; buvo ar yra virškinimo trakto išopėjimas ir (arba) ar jo pradžiamas ar kraujavimas, susijęs su ankstesniu gydymu NVNU. Pacientams, kuriems yra kraujo krešėjimo sutrikimas, kuriems yra sunkus kepenų, inkstų arba širdies nepakankamumas. Negalima vartoti psichotrofinio nešūnimo medžiagų metu. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Būtinai ypatingas atsargumas: jei pacientas serga infekcine liga, pacienas yra senyvo amžiaus; arba ar anksčiau sirgo astma; yra inkstų, širdies, kepenų arba žarnyno sutrikimas; serga sisteminė raudonoja virkštie; yra virškinimo trakto sutrikimai arba lėtinė uždegiminė žarnyno liga; pacienė nešči pirmuosius 6 nėštumo mėnesius arba žindo. Reikiamos teksto parengimo data: 2022-03.

SKAUSMĄ KEISKI Į METAFENEX!

KARŠČIAVIMO MAŽINIMUI IR SKAUSMO MALŠINIMUI

NUO **4⁴⁹** €



IBUSTAR 20 mg/ml geriamoji suspensija vaikams, 100 ml **4⁴⁹** €
IBUSTAR 40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams, 100 ml **7⁴⁹** €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Ibustar 20 mg/ml geriamoji suspensija vaikams. Ibustar 40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams. Viename geriamosios suspensijos ml yra 20 mg ibuprofeno. Viename geriamosios suspensijos ml yra 40 mg ibuprofeno. **Indikacijos:** Ibustar yra uždegimą slopinantis ir skausmo malšinantis vaistinis preparatas (nesteroidinis vaistas nuo uždegimo, NVNU), pasižymintis karščiavimo mažinamomis savybėmis (antipiretikas). Ibustar vartojamas trumpalaikiam simptominiam gydymui: karščiavimo mažinimui; silpno ar vidutinio stiprumo skausmo malšinimui. Ibustar 20mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams, svėriantiems nuo 5 kg iki 25 kg (kuriai amžiui nuo 6 mėnesių iki 9 metų). Ibustar 40 mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams svėriantiems 10 kg ir daugiau (2 metų ir vyresniems), paauguliams ir suaugusiems. Vartojimo būdas. Tinka vartoti tik per burną ir trumpai. Jeigu šio vaistinio preparato vaikams ir paauguliams reikia vartoti ilgiau kaip 3 dienas, arba jeigu lėtos počiniam biologija, reikia pasitarti su gydytoju. Prieš vartojimą buteliuką reikia stipriai supurtyti. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija ibuprofeni arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu praėlyje buvo alerginių reakcijų vartojant acetilsalicilo rūgšį ar NVNU, pvz., bronchų spazmas, astma, nosies gleivinės paburkimas; jeigu buvo odos reakcijų (pvz., paraudimas, paburkimas, dilgėlinė ar kitai panašūs reiškiniai); jeigu yra neaiškių kraujodaros sutrikimų; jeigu yra ar buvo praėlyje skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa (pepsinė opa) arba kraujavimas (du ar daugiau atskirų įvykių išopėjimo ar kraujavimo epizodų); jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo pradžiamas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; jeigu yra kraujavimas iš smegenis arba kitoks kraujavimas; jeigu yra sunkus inkstų arba kepenų funkcijos nepakankamumas; jeigu nustatytas sunkus širdies nepakankamumas; netekus daug skysčių (dėl vemimo, viduriavimo ar dėl nepakankamo skysčių vartojimo); jeigu yra paskutinis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Ibustar. Šalutinis poveikis gali sumažėti vartojant mažesnius veiksmingus vaisto dozes trumpaaisa laika būtinai simptomų kontrolei. Ibustar reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant COX-2 (ciklooksigenazės-2 selektyvius) inhibitorius, jeigu Jūs jau vartojate ar atsisakite skrandžio kraujavimas ar išopėjimas, nutraukite Ibustar vartojimą. Nedelsiant informuokite gydytoją, jeigu atsiranda bet koks neįprastas simptomas plė. Pastebėjus pirmųjų odos išbėrimo, gleivinės pažeidimo ar kitų padidėjusio jautrumo reakcijos požymių, Ibustar vartojimą reikia nutraukti. Ibustar gali slopinti tokius infekcijos simptomus kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl Ibustar gali vėlinėti lėtiniam infekcijos gydymui, ir dėl to gali padidėti komplikacijų rizika. Jei vartojate šį vaistą sirgami infekcine liga ir simptomai išlieka arba blogėja, nedelsdami pasitarkite su gydytoju. Sergant vėjaraupiais reikia vengti vartoti Ibustar. IT_06_2023_VI_pmlt Reklama parasta 2023 m. gruodžio mėn.

GREIT IR VĖL KARALYŠ!

7⁹⁹ €



KAMISTAD N gelis 10g

Lidokaino hidrochloridas, 20 mg/g, ramunėlių žiedų skystasis ekstraktas, 185 mg/g.

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Indikacijos: gelis vartojamas esant nesunkiam dantenių ir burnos gleivinės uždegimui.

Vartojimas: suaugusiems ir vaikams, vyresniems nei 12 metų, reikia tepi 0,5 cm ilgio gelio juostele 3 kartus per parą. Gelis tepamas ant pažeistų vietai ir švelniai įtrinamas.

Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai: gelio vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Saugoti, kad gelio nepatektų į akis ir ant alvurių žaidų. Panaudojus gelio, kruopščiai nusiplauti rankas. Pakuotės lapelio peržiūros data: 2022 sausio mėn.

Reikiamos teksto parengimo data:

2201_SB_Kamistad_N_V01_LT

„KAMISTAD N“ – PAGALBA ESANT BURNOS GLEIVINĖS UŽDEGIMUI!

-50%

ANTRAI TOKIAI PAČIAI



PIPIRINIS PLEISTRAS 10 x 18 cm 0⁷⁹ €
MEDICINOS PRIEMONĖ

🍁 **Jamieson Lecitinas, 1200 mg,
100 kapsulių**
Maisto papildai




1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

21⁴⁹ €

🍁 **Jamieson Vitamino D lašai 1000IU 11,4ml**
Maisto papildas



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

18⁴⁹ €



Pagaminta Kanadoje

🍁 **Jamieson Multivitamin For Kids, 60 tablečių**
Maisto papildai



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

24⁹⁹ €

🍁 **Jamieson C Mix 500mg 120 tablečių**
Maisto papildas



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

19⁹⁹ €



Pagaminta Kanadoje



MOTERS INTYMAI HIGIENAI IR SVEIKATAI

-25%

PERFECTIL
MAISTO PAPILDAI

„Perfectil“ – grožio priemonių linija odai, plaukams ir nagams. Aktyvieji elementai pamaitina pačius giliausius odos, plaukų, nagų sluoksnius. Kitaip nei kremai ar serumai, „Perfectil“ visą darbą rūpestingai atlieka iš vidaus. Naujiena – kolageno geriniai odai ir plaukams „Perfectil Platinum Collagen“. Sudėtyje yra patentuotas hidrolizuotas jūrinių kolageno peptidų kompleksas „Peptan“ – kuris dėl itin mažo molekulinio svorio išsiskiria aukštu biologiniu prieinamumu ir užtikrina itin gerą pasisavinimą bei efektyvumą.

ISLAISVINK SAVO GROŽĮ SU „PERFECTIL“!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-30%



DINADAX KRAMTOMOSIOS LAZDELĖS

MAISTO PAPILDAI

„DinadaxActive“ – maisto papildas su laktobakterijomis, fruktooligosacharidais, bičių pieneliu, vitaminais B, ir B₆.

„DinadaxEnergy“ – maisto papildas su bičių pieneliu, želatina ir B grupės vitaminais.

„Dinadax Sapiens“ – maisto papildas su cholino bitartratu, omega-3, linolo ir oleino rūgštimis, vitaminais, folio rūgštimi, biotinu ir cinku.

KRIMSK PASIGARDŽIUODAMAS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-30%



BF-ESSE

MAISTO PAPILDAS

Pasimėgauk gyvenimo akimirkomis su BF-ESSE...

JŪSŲ GERAI SAVIJAUTAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-20%

9^{27€}
~~11⁵⁹~~

FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Fitolizyna Nefrocaps PLUS“ yra unikalus 7 koncentruotų augalinių ekstraktų mišinys, kuris:

– padeda palaikyti normalią inkstų ir šlapimo takų veiklą (petražolių šaknis, dirvinių asioklių žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, karpotųjų beržų lapai, vaistinių gėlių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė);

– padeda palaikyti normalų vandens pašalinimą iš organizmo, todėl skatinamas nepageidaujimų metabolizmo produktų šalinimas su šlapimu (dirvinių asioklių žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, vaistinių gėlių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė).

Rekomenduojamas vartojimas: 1 kapsulė 2 kartus per parą prieš valgį, užgeriant dideliu kiekiu vandens (ne mažiau kaip ½ stiklinės).

-40%

2^{99€}
~~4⁹⁹~~

TRAVELOK, 10 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

IMBIERAI PADEDA PALAIKYTI NORMALIĄ SAVIJAUTĄ KELIAUJANT.

-50%

ANTRAI
TOKIAI
PAČIAI

MILLY

Vatos pagalvukai, 200 vnt. 2⁵⁹ €

Vatos diskeliai, 120 vnt. 2⁴⁹ €

HIGIENOS PRIEMONĖS

GREENIFY®

- Gamtos įkvėpta sudėtis
- Efektyvesnis pasisavinimas
- Ypač greitas veikimas
- Be pridėtinio cukraus ir dirbtinių priedų
- Patogus vartojimo būdas

Atrask, išbandyk, patirk gamtastišką efektą!



Maisto papildai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

-35%**LIVOL VITAMINAI****MAISTO PAPILDAS**

Skandinaviški maisto papildai „Livol“ sukurti, remiantis holistiniu požiūriu į Jūsų organizmo sveikatą, todėl labai veiksmingi. Gaminami Danijoje nuo 1959 m. Kurdami „Livol“, Skandinavijos mokslininkai įvertino skirtingus žmonių poreikius ir pasiūlė saugią dozių bei efektyvius pasisavinimo (su EC gamybos technologija) vitaminus.

LIVOL – NR.1 SKANDINAVIŠKI MULTIVITAMINAI LIETUVOJE!*

* Lietuvoje Nr.1 multivitaminų kat., vaistinėse 2023 m. (šaltinis: UAB „SoftDent“ farmacijos rinkos duomenų bazė „PharmaZOOM“, duomenys pagal kiekį ir vertę).

* Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-15%**OILEDIXIN****MAISTO PAPILDAS**

„Oiledixin vitaminas A+E“ vitaminas A padeda palaikyti normalią odos būklę. Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.
 „Oiledixin vitaminas D3“ skirtas papildyti mitybą vitaminu D3 (cholekaliferoliu). Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir normalią kaulų būklę.
 „Oiledixin Niam-Niam“ skirtas papildyti vaikų ir suaugusių mitybą vitaminais ir mineralais. Geležis padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą.
 „Oiledixin Vitaminas C“ pagamintas specialiai vaikams lašų forma, todėl jame esantį vitaminą C patogiu dozuoti mažoms, t.y. vaikams skirtomis dozėmis.
 „Oiledixin B grupės vitaminai“ skirti papildyti kasdieninę mitybą B grupės vitaminais ir GABA. Vitaminai B6, B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.

* Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-20% 5^{03€}**UNDEVIT, 50 dražečių****MAISTO PAPILDAS**

Vitaminų A, C, E, B grupės (B1, B2, B6, B12) ir niacino, rutino, pantoteno rūgšties, folio rūgšties preparatas. Vitaminai C ir A padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo, vitaminas B1 (tiaminas) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, vitaminas B2 (riboflavinas) padeda išsaugoti normalų regėjimą, vitaminas B6 (piridoksinas) padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, vitaminas B12 (cianokobolaminas) padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją, pantoteno rūgštis padeda palaikyti normalią proteininę veiklą.

Vartojimas: gerti po 1 dražetę per dieną po valgio.

Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Gamintojas: „Technology“, Ukraina. Išskirtinis platintojas Lietuvoje: UAB VERATRUM PHARMA, Žarijų g.2B, Vilnius

-20%**„AMEDIPLUS“ VAIKIŠKI IR VANDENIUI ATSPARŪS PLEISTRAI****MEDICINOS PRIEMONĖS**

* Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-20% 4^{39€}**GLICINAS, 50 tablečių****MAISTO PAPILDAS**

Sudedamosios dalys: glicinas (65 % grynojo kiekio), dekstrozės monohidratas, kukurūzų krakmolai, lipnumą reguluojanti medžiaga riebalų rūgščių maiganti druskos. Grynasis kiekis: 7,6 g. Vartojimo būdas: vartoti po 1 tablete 3 kartus per dieną. Tablete laikyti po liežuvio, kol ištirps. Rekomenduojamame suvartoti per parą kiekyje (3 tabletes) yra 300 mg glicino. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Laikymo sąlygos. Laikyti sausoje, tamsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Gamintojas: UAB „Medicata Filia“, Žarijų g. 2B, Vilnius. Išskirtinis platintojas Lietuvoje: UAB VERATRUM PHARMA, Žarijų g.2B, Vilnius

-25% 3^{52€}**AMEDIPLUS RICINOS ALIEJUS, 100 ml****KOSMETIKOS PRIEMONĖ**

Tepti odą ir plaukus. Tik išoriniam naudojimui. Patekus į akis, nedelsiant jas praplauti dideliu vandens kiekiu.

-10% 2^{96€}**GINTARO RŪGŠTIS, 20 tablečių****MAISTO PAPILDAS**

Vartojimas: gerti po 1 tablete 3 kartus per dieną valgiui.

Rekomenduojamame suvartoti per parą kiekyje (3 tabletes) yra 0,3 g gintaro rūgšties.

Gamintojas: UAB „Medicata Filia“, Žarijų g.2B, Vilnius

Išskirtinis platintojas Lietuvoje: UAB „VERATRUM PHARMA“, Žarijų g. 2B, Vilnius

-25% 2^{99€}**AMEDIPLUS AUSŲ KIŠTUKAI, 8 vnt.**



-35%

**AMBIO**

MULTIVITAMINAI SU ŽENŠENIU (tiršiosios tabletės), 20 tablečių **4⁹⁸ 3²⁴ €**
 MULTIVITAMINAI (tiršiosios tabletės), 20 tablečių **4⁴⁸ 2⁹¹ €**

MAISTO PAPILDAI

-35%

**AMBIO**

SPANGUOLIŲ EKSTRAKTAS SU LAKTO-BIFIDOBAKTERIJOMIS, 20 kapsulių **10⁹⁸ 7¹⁴ €**
 CRANBERRY COMPLEX, 30 kapsulių **11⁴⁸ 7⁴⁶ €**

MAISTO PAPILDAI

IKI -45%

**AMBIO**

AMBIO CA+K+MG+ZN+D3, 30 paketėlių **12⁸⁸ 6⁹² € -45 %**
 AMBIO KALCIS CITRINŲ SKONIO, 60 tablečių **10⁴⁸ 6⁸¹ € -35 %**

MAISTO PAPILDAS

-40%

**AMBIO**

AUGALINIAI POLIFENOLIAI, 60 tablečių **30⁴⁸ 18²⁹ €**
 ANTIOKSIDANTŲ KOMPLEKSAS, 30 kapsulių **11⁴⁸ 6⁸⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

IKI -35%

**AMBIO**

KIDS LAKTO-BIFIDOBAKTERIJOS, 10 pakelių **9⁴⁸ 6¹⁶ € -35 %**
 KIDS HOT HERBAL DRINK SU ISLANDINE KERPENE, 10 pakelių **10⁴⁸ 7³⁴ € -30 %**

MAISTO PAPILDAS

IKI -40%

**AMBIO**

GERAI NUOTAIKAI, 30 kapsulių **15⁴⁸ 9²⁹ € -40 %**
 PASIFLORA, 60 tablečių **9⁹⁸ 6⁹⁹ € -30 %**

MAISTO PAPILDAI

-25%

2^{99€}**MEDETKŲ KREMAS 20 g****KOSMETIKOS PRIEMONĖ**

Skirtas sudugusiam, žvairių odų nuolintai odai prižiūreti.
 Kremą naudoti pagal poreikį.

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!16⁴⁹ €**AMEDIPLUS PLEISTRAS NUO LŪPŲ PŪSELINĖS, 15 vnt.****MEDICINOS PRIEMONĖ**

VAISTINĖ



KOSMETIKAI „ŽIEDĖ“

iki **-40%**



-40% 10^{19€}
~~16^{99€}~~



AMBIO MENOPAUSE COMPLEX, 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS

-40%



AMBIO
PROSTATAI, 30 kapsulių **11^{99€} 7^{19€}**
TRIBULUS FORTE, 30 tablečių **14^{99€} 8^{99€}**
MAISTO PAPILDAS

-30% 13^{64€}
~~19^{49€}~~



AMBIO NAKVIŠŲ ALIEJUS, 1000 mg, 100 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

-20%



VAGISAN
KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS. Priemonės „Vagisan“ su natūralia pieno rūgštimi skirtos tinkamai lytinių organų priežiūrai. Rūgštis aplinka – būtina sąlyga, kad laktobacilos galėtų pačios gaminti pieno rūgštį ir daugintis. Taip užtikrinama optimali natūrali apsauga nuo infekcijos. Intymiosios higienos prausiklis „Vagisan“ tinka kasdieniui intymiajai higienai. Drekinamasis makšties kremas „Vagisan“ sumažina tokius simptomus kaip sausumas, niežulys, deginimo pojūtis ir skausmas. Ovuļės su pieno rūgštimi, skirtos natūraliai makšties pH terpei palaikyti ir atkurti.

TAVO INTYMIAM SVIEKATAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

RANKŲ DREBĖJIMĄ MAŽINANTIS PRIETAISAS



Sergantiems
Esencialiniu tremoru
ir Parkinsono liga



VILIM ball

-20%



www.vilimed.com



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



ORALFLUX

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Reguliariai naudojamas „Oralflux“ gaivina burnos kvapą. **Be alkoholio.** Inovatyvius dozatorius užtikrina tikslią skalavimo skysčio dozę ir ekonomišką naudojimą. „Oralflux“ turėtų būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė valant dantis. Naudojimas: noredami gauti 10 ml skysčio, švelniai paspauskite butelį, kol skysis atsiras virš purškimo prietaiso. Skalaukite burną skysčiu apie 1 min., išspjaukite. Kad poveikis būtų geresnis, nevalgykite ir negerkite 2 val. po skalavimo. Buteliukas turi INOVATYVŲ DOZATORIŲ - TIKSLŲ IR EKONOMIŠKŲ!

STIPRESNI DANTYS. GAIVESNIS KVAPAS. PLATESNĖ ŠYPSENA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

IKI -30%



JORDAN

Visi esame skirtingi. Turime unikalius dantis, naudojame unikaliją jų valymo technika, renkames dantų šepetėlius pagal savo individualius poreikius. „Jordan“ burnos higienos priemonės sukurtos siekiant užtikrinti maksimalių dantų priežiūros rezultatus. Platus asortimentas apima dantų šepetėlius, tarpdančių siūlus bei šepetėlius, dantų pasta suaugusiems ir vaikams.

JORDAN RŪPINASI ŠYPSENOMIS NUO 1927-UJŲ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

NUO NAGŲ GRYBELIO

-30%



NAILNER

Išryšytas veiksmingumas:

- gydo nagų grybelį;
- su oru laidžiu nagų laku;

* paslepia negražias dėmes ar pažeidimus, atspariusius nagus pažeidus infekcijai.

Nailner teptukas nagų grybeliui gydyti 2in1 5ml, Nailner pieštukas nagų grybeliui gydyti 2in1 4ml – greitai matomiems rezultatams. Ši priemonė ne tik gydo nagų grybelį, bet ir greitai pašalina infekcijos pažeistą nagą. Papildoma šveicarinio medžiaga leidžia nagui atgauti dailesnę išvaizdą vos per 7 dienas. **Kaip veikia „Nailner“?** Priemonės „Nailner“ efektyviai gydo ir užkerta kelią grybelinei nagų infekcijai. Unikali pernešimo sistema leidžia komponentams visiškai prisotinti nagą ir kovoti su grybeliu iš pagrindų – priemonė pakeičia nagų aplinką, kuri tampa nebepalanki grybeliui. Apsaugo naujai ataugusį nagą nuo infekcijos. Medicinos priemonė „Nailner Treat & Colour“ specialiai sukurta nagų grybelio pažeistiems nagams. **Teptukas „Nailner“, Nailner pieštukas nagų grybeliui gydyti 2in1 4ml** gydo ir užkerta kelią grybelinei nagų infekcijai. Jis trejopai kovoja su grybeline nagų infekcija:

• prassivertbia 1 nagą į ypatingos sudėties dantis įsigėta į nagą ir kovoja su grybeliu;

• salina infekcija. „Nailner“ sumažina nagų pH lygį, pilnas aplink grybelio pažeistą vietą atkuria ir grybelis sunaikinamas;

• užkerta kelią naujoms infekcijoms: profilaktiškai tepamas kasdien „Nailner“ apsaugo naujai išaugusį nagą nuo infekcijos.

Oru laidas nagų lakas „Nailner“ paslepia negražius pažeidimus, nuudažydamas nagą patrauklia natūralia spalva, todėl tai yra idealus sprendimas avint atvirus dantis. Oru laidas nagų lakas gali būti naudojamas ir užkūstiems, ir sveikiems nagams lakuoti.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

IKI -50%



DAILEE

HIGIENOS PRIEMONĖS

DAILEE Lady Premium įklotai- orui laidūs, ploni daug sugeriantys, minkšti ir švelnūs. Paviršius impregnuotas alijošiaus ekstraktu, saugančiu odą nuo sudirginimo. Puikiai prilimpa, įvairių dydžių. **Kvapo kontrolė iki 12 val.**

DAILEE Men Premium Level 1- įklotai vyrams, patiriantiems lengvą šlapimo nelaimą. Anatininės formos, papildomi borteliai saugo nuo pratekėjimo, puikiai prilimpa **Kvapo kontrolė iki 12 val.**

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

TOBULAI BURNOS HIGIENAI

-25%



CURAPROX

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Curaprox“ – tai aukščiausios kokybės šveicariškos burnos higienos priemonės: platus spektras dantų šepetėlių, tarpdančių šepetėlių, dantų pastų. Taip pat kūdikiams ir vaikams skirtos priemonės. „Curaprox“ dantų šepetėlių šereliai gaminami ne iš nailono, o iš patentuotos „Curen“ medžiagos, todėl šie šepetėliai efektyviai pašalina apnašas, netraumuodami dantenu. Tarpdančių šepetėliai gaminami iš labai plonos, tačiau tvirtos „Cural“ patentuotos medicininės vielutės, todėl tarpdančius išvalysite kruopščiai ir be skausmo. Dantų pastų sudėtyje esantys fermentai veiksmingai apsaugo nuo dantų ėduonies, o antibakterinės „Perio Plus“ linijos poveikis paremtas moksliniais tyrimais.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-30%



VELYM

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

VELYM 100 ml balinamasis dantų kremas. Dabar virš 95% ingredientų yra natūralūs kilmes medžiagos. Nauja, tvirti, perdirbto plastiko tubelė.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

DANTŲ PROTEZŲ KLIIJAI

-30%

9.79€
13.99€

BLEND-A-DENT

BLEND-A-DENT REGULAR, 47 g (x2 pakuotės)

BLEND-A-DENT FRESH, 47 g (x2 pakuotės)

Fiksujamasis dantų protezų kremas „Blend-a-dent“ – puikus pasirinkimas, jei nenorite galvoti apie savo protezus. Nesvarbu, ką darote ar valgoite, galite pasitikėti savimi, nes dantų protezai savo vietoje laikosi tvirtai ir patogiai. „Blend-a-dent“ suteikia stiprią fiksaciją visą dieną, užtikrina komfortą, sukurdamas pagalvėlę tarp dantelių bei dantų protezų, ir apsaugo nuo maisto dalelių patekimo po protezais. Galite atspalaiduoti ir mėgautis gyvenimu nesivarždami.

-25%



TEPE

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Produkcija „TePe“ pagaminta bendradarbiaujant su Švedijos ir tarptautiniais odontologijos specialistais. Visi tarpdančių šepetėliai turi unikalius laikiklius, specialiai parinktus šerelius ir plastikų dengtą vielutę, todėl tarpdančių valymas labai veiksmingas. Dantų šepetėliai „TePe“ patikimi ir kokybiški.

„TEPE“ RŪPINASI ŠYPSENA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-40%



AMBIO
MULTIVITAMINAI VAIKAMS, 50 guminukų **13⁴⁸ 8⁰⁹ €**
KIDS VITAMINAS C, 60 guminukų **14²⁰ 8⁵² €**
MAISTO PAPILDAI

-20%



RELIZEMA™ BABY CARE, KREMAS, 100 ml 16⁹⁹ 13⁹⁹ €
RELIZEMA™ SPRAY&GO – ZINC + PANTHENOL, PURŠKALKAS, 100 ml 18⁹⁹ 15¹⁹ €
KOSMETIKOS PRIEMONĖS
„Relizema“ baby care“ ir „Relizema“ spray&go – zinc + panthenol“ yra produktai, skirti jautriai ir švelniai kūdikių sauskelnių srities odai. „Viskas viename“ – cinkas ir panthenolis! Puikiai tinka odai raminti ir apsaugoti nuo paraudimo bei deginimo pojūčio, ant odos sudaro apsauginę plėvelę, sauganti nuo išorinių dirgiklių. Kremą taip pat galima naudoti ir jautriai suaugusiųjų odai. Klimikiniais tyrimais įrodytas veiksmingumas. Patikrinta dermatologų. Rekomenduojama tėvų.
„Relizema“ spray&go – zinc + panthenol“ purškalkas – be dujų, skirtas sunkiau pasiekiamoms odos sritims, galima purkšti tiesiai ant pažeistos vietos, nereikia įtrinti – daugiau higienos ir patogumo.
„Relizema“™ rekomenduojama naudoti kiekvieną kartą keičiant sauskelnes arba tada, kai reikia.
Reklama paruošta 2023 m. rugpjūtį, LT_Riz_10_2023_VI_pharma
VEIKSMINGA, TYRIMAIS PAGRĮSTA KŪDIKIŲ ODO APSAUGA!

-20% 5^{98€}



INFACOL GERIAMOJI SUSPENSIJA, 50 ml
Simetikonas 40 mg/ml
MEDICINOS PREKĖ
Terapinės indikacijos: „Infacol“ geriamoji suspensija skirta sumažinti kūdikių pilvuko diegliams ir vidurių skausmams. Skausmo ir dieglių priežastis – kūdikio žarnyne susikaupę maži dujų burbuliukai. „Infacol“ padeda pasišalinti susikaupusius dujoms. Suspensiją galima skirti naujagimiams ir vyresniems vaikams. Esant pilvuko pūtimui, suspensiją galima vartoti ilgai – tiek, kiek reikia. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** prieš vartojimą gerai suplakite buteliuko turinį. Pilnai pripildykite vieną lašintuvą, paspausdami du kartus guminį balionėlį. Suspensijos perteklių nubraukite atgal į buteliuką. Norėdami sugirdyti suspensiją, paspauskite lašintuvo balionėlį ir sulauškite „Infacol“ suspensiją kūdikiui ant liežuviu. Buteliuke yra iki 100 suspensijos dozių. Vieną pilną lašintuvą (0,5 ml) suspensijos sugirdykite kūdikiui prieš kiekvieną maitinimą. Jei būtina, dozę laikinai galima padidinti iki dviejų pilnų lašintuvų (1 ml). Norint pasiekti geresnių rezultatų, „Infacol“ reikėtų vartoti keletą dienų. **Išspėjimas:** simetikonas yra inertiška medžiaga, kurios kūdikio organizmas neabsorbuoja. Ji išsiskiria iš organizmo nepakitusi. „Infacol“ šalutinio poveikio reiškiniai iki šiol nėra žinomi. Metilo ir propilo hidroksibenzoat'ai gali sukelti alerginę reakciją (galbūt pavėluota). Jei manote, kad Jūsų kūdikis galėtų būti alergiškas kuriai nors iš sudedamųjų dalių, prieš duodami kūdikiui „Infacol“, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.
MAŽŲ PILVELIŲ DRAUGAIS!

NUO KARŠČIAVIMO IR SKAUSMO

7⁹⁹ €



IBUPROM, 40 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams, 100 ml
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 ml „Ibuprom“ 40 mg/ml geriamosios suspensijos yra 40 mg Ibuprofeno. Indikacijos: trumpalaikis silono ir vidutinis skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. „Ibuprom“ skirtas 3 mėn. ir vyresniems kūdikiams ir vaikams. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. 3–6 mėn. kūdikiams (> 5 kg) gerti po 125 ml 3 k. per parą, 6–12 mėn. kūdikiams (8–10 kg) – po 125 ml 3–4 k. per parą, 1–3 m. vaikams (10–15 kg) – po 25 ml 3 k. per parą, 3–6 m. vaikams (15–20 kg) – 3,75 ml 3 k. per parą, 6–9 m. vaikams (20–30 kg) – po 5 ml 3 k. per parą, 9–12 m. vaikams (30–40 kg) – po 7,5 ml 3 k. per parą. Nurodytą vaisto dozę reikia skirti maždaug kas 6–8 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas Ibuprofenui, kitoms nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU) ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitų NVNU vartojimas, kraujo krešėjimo sutrikimai, psichikos nėsimo traukimas, trombotropija, sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas, praėjusie buvusios padidėjusio jautrumo reakcijos (astma, rinitas, angioedemos pobūris), dilgėlinė) vartojant kitą NVNU, įskaitant ir acetilsalicilo rūgšties darinius, esama ar buvusi pepsinė opa / hemoragija, buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu, kraujavimas / smegenis, virškinimo trakto ar kitos kraujavimas, sisteminė raudonoji vilkligė. Specialūs įspėjimai: senyviems pacientams, pacientams, turintiems inkstų, kepenų, žarnyno, virškinimo trakto problemų, pacientams, kuriems anksčiau buvo virškinimo trakto opa ar infarktas, sergantiems diabetu, sisteminė raudonoji vilkligė, širdies nepakankamumu, virškinimo trakto opa, hipertenzija, bronchių astma, rūkantiems pacientams, taip pat pacientams, kuriems padidėjęs cholesterolio kiekis, yra gimtas porfirino apykaitos sutrikimas, dehidratacija, vartojantiems vaistus, galinčius padidinti opų ar kraujavimo pavojų, Ibuprofeną reikia vartoti atsargiai. Reklamos teksto parengimo data 2023-01-19.
YRA „IBUPROM“ NĖRA SKAUSMO.

ŽARNYNO MIKROFLORA

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ! 10¹⁹ €



ACIDOLAC® JUNIOR, 20 meškiuko formos tablečių
ACIDOLAC® JUNIOR braškių skonio, 20 meškiuko formos tablečių
MAISTO PAPILDAI
Acidolac Junior meškiuko formos tablečių sudėtyje yra gerųjų žarnyno bakterijų *Lactobacillus acidophilus* La-14TM ir *Bifidobacterium lactis* BI-04TM, inulinu ir vitaminu B6, kuris padeda palaikyti normalią imuniteto sistemos veiklą. Vartojamas: vyresniems kaip 3 m. vaikams ir suaugusiems vartoti po 1 meščiuko formos tablete 2 kartus per parą. Be sacharozės ir gliutinio.

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ! 3⁷⁹ €



TESTAS OVULIACIJOS AMEDIPLUS, 2 vnt.
MEDICINOS PREKĖ

Skirkite

1,2% GPM



Prisidėk prie sunkiai sergančių ir neigalių vaikučių svajonių išsipildymo.

Daugiau informacijos www.rupestingasirdele.lt



SKIEPAI NUO ERKINIO ENCEFALITO

SKIEPO KAINA

34⁹⁵ €

SU LOJALUMO KORTELE

31⁹⁵ €



Nuolaidos taikomos su PC Norfa kortele.
Akcijos „Laimės valandos“ nuolaidos netaikomos.



Galima išankstinė registracija:

- internetu www.nvaistine.lt/skiepai
- telefonu +370 800 10 008