

# NVAISTINĖ

## TOP GEGUŽĖS PASIŪLYMAI



**-50%**

### AMBIO

CHOLESTEROL BALANCE COMPLEX, 30 kapsulių **14<sup>98</sup> 7<sup>19</sup> €**

GELEŽIS LIPOSOMOSE, 30 kapsulių **17<sup>98</sup> 8<sup>99</sup> €**

MAISTO PAPILDAI



**1+1**

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

### AMBIO

AMBIO VITAMINAS C, 56 kramtomosios tabletės **8<sup>98</sup> €**

AMBIO AUGALINIAI POLIFENOLIAI, 60 tablečių **30<sup>48</sup> €**

MAISTO PAPILDAI



**-50%**

**8<sup>50</sup>€**  
~~16<sup>99</sup>~~



### OCUAL STRONG, 30 minkštųjų kapsulių

MAISTO PAPILDAI

„Ocual Strong“ – stipresnė pagalba regėjimui! Sudėtyje – gerai pasisavinamas luteinas, taip pat gausu aukštos kokybės žuvų taukų\* bei vitaminų A, riboflavino (B2) ir cinko, padedančių išsaugoti normalų regėjimą.

Tai perkamiausias maisto papildas akims Lietuvoje!\*\*\*

**OCUAL – MATYK, KAI LABIAUSIAI REIKIA**

\* Omega-3 sudėtyje gausu dokozahexaeno rūgšties (DHR), kuri padeda palaikyti normalų regėjimą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg DHR.

\*\* Remiantis „SoftDent“ 2018–2023 m. duomenimis.

**IKI -50%**



NAUJIENA

### FJØRD STRONG OMEGA-3

MAISTO PAPILDAI

Išbandykite naują širdžiai – „Fjord Strong Omega-3 Cardio“.

Kuo ypatingas?

Tai biologiška aktyvių polifenolių ir riebalų rūgščių EPR ir DHR kombinacija jūsų širdžiai, kraujagyslėms, kraujotakai.

Ypač didelis kiekis polifenolių kartu su omega-3 turi vienas kitą papildantį veikimo mechanizmą.

Išskirtinai gerai pasisavinama reesterifikuota omega-3 forma, išgaunama iš laukinių niebių žuvų, kurios sugaunamos tvarios žvejybos būdu. Žaliavos gamintojų patvirtintas „Jūros draugo“ statusas.

**„FJØRD STRONG OMEGA-3“ GALI DAUGIAU, NEI TIKIESI.**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

NUO **4<sup>99</sup> €**

### LIVOSIL

140 mg, 30 kapsulių **4<sup>99</sup> €**  
140 mg, 60 kapsulių **8<sup>99</sup> €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI



**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino. **Indikacijos:** papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livosil“ dozė yra 280–420 mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. „Livosil“ rekomenduojama vartoti ilgiau nei 3 mėnesius. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livosil“ medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemija), bei tuos, kurie vartoja preparatus, maisto papildus ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. Teksto peržiūros data 2017-07-12.

**NATŪRALI KEPENŲ APSAUGA IR GYDYMAS!**

**-40%**



### „VIZIK“ AKIŲ LAŠŲ LINIJA

VIZIK ALLERGY, 10 ml **15<sup>99</sup> 9<sup>99</sup> €**

VIZIK Lašai pavargusioms ir sausoms akims, 10 ml **11<sup>99</sup> 7<sup>19</sup> €**

VIZIK Lašai sudirgusioms ir paraudusioms akims, 10 ml **12<sup>99</sup> 7<sup>37</sup> €**

MEDICINOS PRIEMONĖS

Be konservantų  
**ATIDARIUS BUTELIUKUS GALIMA NAUDOTI NET VIENERIUS METUS!**

NUO **2<sup>99</sup> €**



**THROMBO ASS**

THROMBO ASS 50 mg, 100 skrandyje neirių tablečių **2<sup>99</sup> €**  
 THROMBO ASS 75 mg, 100 skrandyje neirių tablečių **3<sup>99</sup> €**  
 THROMBO ASS 100 mg, 100 skrandyje neirių tablečių **4<sup>99</sup> €**

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veiklioji medžiaga:** acetilsalicilo rūgštis. **Terapinės indikacijos:** miokardo infarkto rizikos mažinimas sergantiems krūtinės angina. Antrinė miokardo infarkto profilaktika. Trombozės profilaktika po vaikininkinių arterijų nuostorio operacijos. Antrinė praeanančio smegenų išemijos priepuolio (PSIP) ar insulto profilaktika. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti po 1 tablete 1 kartą per dieną (patarama vakare). Skrandyje neirių tablete reikia nursti nesukramtyti, užsigeriant pakankamu skysčiu kietu vandeniu arba tarp valgių tuo pačiu paros metu. Iprastinė paros dozė ilgalaikiam vartojimui yra 50–150 mg. Dalyti 1 dalis „Thrombo ASS“ skrandyje neirių tabletes negalima, nes bus pažeista skrandyje neiri plevėle. Norint, kad tikti individualiam vartojimui, reikia rinktis atitinkamo stiprumo preparatą (50 mg, 75 mg ir 100 mg). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei salicilatams ir kitoms NVNU; bronchų spazmas; ūminė pepsinė opa; polinkis į kraujavimą, hemofilija; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; sunkus, nepakankamai kontroliuojamas širdies nepakankamumas; nėštumas; vaikai ir paaugaliai iki 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Atsargumo reikia laikytis šlaies abiejais; sergant bronchine astma, šienlige, esant nosies gleivinės paburkimui ir esant kitai pobūdžio alergijai; vartojant kartu su vaistais, mažinančiais kraujo krešumą; sergant hemolinne anemija; esant skrandžio ir žarnų sutrikimams, esant anamnezėje duodenitams apie opalę ar kraujavimą iš virškinimo trakto; esant inkstų ligoms ir (arba) kepenų funkcijos sutrikimui; turintiems polinkį podagrai. Prieš numatytą operaciją 10 dienų acetilsalicilo rūgštis reikia nevartoti. Šio vaisto sudėtyje yra laktozės monohidrato, todėl vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas lopp laktozės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pakuotė. 50 mg, 75 mg arba 100 mg; 100 skrandyje neirių tablečių. Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas. G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. Paskutinė teksto peržiūros data: 2020-05-13. Reklamų teksto parengimo data: 2024 04.

**MODERNI KAPSULĖ NUO RĖMENS**

NUO **2<sup>99</sup> €**



**ESCADRA 20 mg,**

7 skrandyje neiros kietosios kapsulės

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** ezomeprazolas, 20 mg. **Terapinės indikacijos:** vaistas skirtas suaugusiųjų gastroezofaginio refliksio simptomų (pvz., rėmens ir skrandžio rūgšties reguliacijos) trumpalaikiam gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 kapsulė) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, kapsules gali prireikti vartoti 2–3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnis kaip 2 savaitės. Simptomams visiskai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Jeigu per 2 savaites neperturaukama gydymą simptomai neišnyksta, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Nėra linkimų „Escadra“ vartojimo rekomendacijų jaunesniui kaip 18 metų vaikų populiacijai indikacijai „trumpalaikis gastroezofaginio refliksio simptomų (pvz., rėmens ir rūgšties reguliacijos) gydymas“. Kapsuliu negalima kramtyti ar sulaukinti. Kapsules galima atidaryti ir gauti išmašyti pusęje stiklinės negazuoto vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pakeičiems benzimidazolams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Ezomeprazolo negalima vartoti kartu su neflavinu. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pacientus reikia informuoti, kad kreiptis į gydytoją, jeigu jie patiria didelį kūno svorio mažėjimą dėl nebeturimo priežasčių, pasikartojanti vėmimą, disfagija, vėmimą krauju ar melėnu, arba jeigu įtariama ar diagnozuojama skrandžio opa, būtina iširti, ar nėra piktybinės ligos, nes gydymas ezomeprazolu gali palengvinti šio simptomus ir uždelsti diagnozės nustatymą, jeigu jie anksčiau sirgo skrandžio opa arba patyrė virškinimo trakto operaciją, jeigu jiems 4 savaites arba ilgiau buvo taikomas neperturaukiamas simptominis nevirškinimo arba rėmens gydymas; jeigu jie serga gelta arba sunkia kepenų liga; jeigu jie yra vyresni kaip 55 metų ir turi naują arba neseniai pakitusių simptomų. Pacientai, kurių pasikartojantis nevirškinimo ar rėmens simptomai ilgalaikiai, turi reguliariais intervalais lankytis pas savo gydytoją. Kaip ilgalaikio profilaktinio vaistinio preparato „Escadra“ pacientai neturi vartoti. Pacientai, kuriems reikia atlikti endoskopiją ar ureazės kvėpavimo testą, turi pasitarti su savo gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistinį preparatą. Ezomeprazolo skirti kartu su atazanaviru nerekomenduojama. Ezomeprazolo derinimas su llopidogreliu nepatartinas. Kiti PS1 arba H2 receptorių blokatorių kartu su ezomeprazolu pacientams vartoti negalima. „Escadra“ sudėtyje yra sacharozės. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems yra fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamų teksto parengimo data 2024.02.13.

**NUO RAUMENŲ IR ŠANARIŲ SKAUSMO**

NUO **5<sup>99</sup> €**



**VIPROSAL B®**

VIPROSAL B®, tepalas, 50 g **5<sup>99</sup> €**  
 VIPROSAL B®, tepalas, 75 g **8<sup>99</sup> €**

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 g tepalo yra 0,05 V gvačių nuodu, 10 mg salicilo rūgšties, 30 mg racemino kamparo ir 30 mg terpentino eterinio aliejaus. **Indikacijos:** šanarių ir raumenų skausmai malšinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** nedidelis „Viprosal B“ kiekis (5–10 g, t. y. 1 ar 2 arbatiniai šaukšteliai, atsižvelgiant į pažeistos vietos plotą) užtepamas ant skaudamos vietos ir įtrinamas į odą 1 arba 2 kartus per parą, tepai ant odos. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, odos opa ar kitos odos ligos. **Specialūs įspėjimai:** „Viprosal B“ negalima tepėti ant pažeistos odos. Saugotis, kad tepalo nepatektų ant gleivinės ar į akis. Vietinis rinkodaros teisės turėtojas: AB „Grindeks“ filialas, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius. Reklamų teksto parengimo data 2023.01.10. **ISMINTINGAS SPRENDIMAS NUO SKAUSMO!**



NUO **2<sup>99</sup> €**



**IBUPROM EXPRESS**

IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 10 minkštųjų kapsulių **2<sup>99</sup> €**  
 IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 20 minkštųjų kapsulių **5<sup>99</sup> €**

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg. **Indikacijos:** skausmo (galvos, šanarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems pacientams ir vyresniems nei 12 m. vaikams kaip trumpalaikis pagalbinis gydymas kas 4 val. geriama 1 kapsulė (negerti daugiau kaip 3 kapsulės per parą). Kapsuliu negalima kramtyti. Kapsulė reikia užsigerti stikline vandens. **Kontraindikacijos:** alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, praityje buvusios padidėjusio jautrumo reakcijos vartojant kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo, sunkus kepenų, inkstų ar širdies funkcijos nepakankamumas, esama (ar praityje buvus) pepsinė opa, buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo priekurimas, kraujavimas į smegenis, virškinimo trakto arba kitoks kraujavimas, sisteminė raudonoji vilkligė, paskutinis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai:** specialų atsargumo priemonių reikia, jeigu sutrikusi inkstų, kepenų, širdies ir virškinimo trakto veikla, vartojama kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo, sergama bronchine astma, alerginėmis ligomis ar sisteminė raudonąja vilkligė; servyviems žmonėms. Reklamų teksto parengimo data 2023-01-15. **YRA „IBUPROM“. NĖRA SKAUSMO.**

NUO **9<sup>99</sup> €**



**NICORETTE**

Nicorette coolmint 1 mg/išpurškime burnos gleivinės purškalas (tirpalas), 150 išpurškimų **22<sup>99</sup> €**  
 Nicorette invisipatch 10 mg/16 h (15 mg/16 h; 25 mg/16 h) transderminis pleistras, 7 transderminiai pleistrai **22<sup>99</sup> €**  
 Nicorette freshfruit 2 mg (4 mg) vaistinė kramtomoji guma, 30 vienetų **9<sup>99</sup> €**  
 Nicorette freshmint 2 mg (4 mg) vaistinė kramtomoji guma, 30 vienetų **9<sup>99</sup> €**

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** vienetoje gumoje yra 2 mg (4 mg) nikotino (reinato natrio), viename pleistre yra 15,5 mg (23,62 mg, 39,37 mg) nikotino, kiekviename išpurškime (0,07 ml tirpalo) yra 1 mg nikotino. 1 ml tirpalo yra 15,5 mg nikotino. **Indikacijos:** vaistinė kramtomoji guma, transderminis pleistras, nikotino purškimas nuo tabako gydymui, kvėpuojant nutraukimo simptomams, kad būtų lengviau laikinai susilaikyti nuo rūkymo, o apsigėrusius – mesti rūkyti; purškalas: priklausomybės nuo tabako gydymas, sumažinant potraukį nikotinui ir palengvinant nutraukimo simptomus, kurie atsiranda metant rūkyti staiga ar palaipsniui. Tikslas yra visam laikui nutraukti tabako vartojimą, nicorette coolmint geriausia vartoti kartu su elgesio pakeitimo programa. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** paprastai pakanka kramtyti 8–12 tam tikro stiprumo vaistinių kramtomųjų gumų per dieną. Pleistras reikia priklijuoti ant odos ryte, o vakare į nuimti. Purškalo reikia įpurškyti 1–2 vaisto dozes tuo laiku, kai paprastai rūkoma, arba jeigu jaučiamas poreikis rūkyti. Galima vartoti iki 4 purškimų per valandą. Negalima puršksti daugiau kaip 2 išpurškimus 6 karto, per 24 valandas neviršyti 64 purškimų (4 purškimų per valandą, 16 valandų per dieną). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas nikotinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, ūminis negalima kramtyti vaikams iki 12 metų. Purškalo negalima vartoti jaunesniems kaip 18 m. pacientams, neturintiems pacieniams. **Specialūs įspėjimai:** prieš vartojant nicorette, pastarasis su gydytoju, jeigu turite širdies infarktą, insultą, sergate neseniai arba progresuojančia krūtinės angina, sunkiomis širdies aritmijomis, yra nekontroliuojama hipertenzija. Pacientai, sergantys cukriniu diabetu, pradėję naujoti diabeto pakeičiamąją terapiją, turi atidžiai sekti savo cukraus kiekį kraujyje. Galima rizika ir lėkama gydymo nauda turi būti apsvaistytą gydytoju, jeigu pacienta serga inkstų ir kepenų nepakankamumu, feochromocitoma ir nekontroliuojama hipertenzija, virškinimo trakto ligomis. Jeigu sergate žvynine, lėtinu dermatitu ar dilgeline, neįkveikuokite nicorette pleistro ant pažeistos odos. Norint išvengti nudegimų rizikos, pleistras reikia nuimti prieš atliekant magnetinio rezonanso tomografinį tyrimą. Kramtomoji guma gali prilipsti prie dantų protezo ir į sugadinti. Kramtomųjų gumų ir purškalo sudėtyje yra butilhidroksitolueno, kuris gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivinę. Kramtomųjų gumų sudėtyje yra kaliochlorido, kuris gali lasivinti vidurius. Reklamų teksto parengimo data: 2024 02, LT-NL-2000003.

**NAGŲ GRYBELIUI GDYTI**

**-35%**



**EXCILOR® PEN**, pieštukas nagų grybeliui gydyti, 3,3 ml **29<sup>99</sup> 19<sup>96</sup> €**  
**EXCILOR® SOLUTION**, teptukas nagų grybeliui gydyti, 3,3 ml **29<sup>99</sup> 19<sup>96</sup> €**  
**EXCILOR® FORTE**, nagų grybeliui gydyti 30ml **32<sup>99</sup> 21<sup>96</sup> €**

**MEDICINOS PREKĖS**

Nagų grybelinės ligos sudėtinga pasiekti ir gydyti, nes infekcija plinta ir nago viduje, ir paviršiuje. „Excilor“ buvo sukurtas specialiai nagų grybelinėms ligoms gydyti ir yra pagrįstas 3 principais: 1) efektyvus veikimo režimas. „Excilor“ pakeičia pH lygį nago viduje, sukurdamas nepalankią aplinką grybeliams (dermatofitams). Tai stabdo tolesnį grybelio augimą ir nagų pakeičimus; 2) optimalus ir visiškas praskisvėrimas į nagą. „Excilor“ greitai pasiekia grybelius, užtikrina sveiką nago ataugimą; 3) patogumas. „Excilor“ paprasta naudoti, nereikia didelių nago. Tik 1 minutę per dieną – nagams patiepti ir kelios sekundes įvairiu nuodžioti. Naudokite būdami bet kur ir bet kada. **„Trodyta“ klinikiniais tyrimais.**  
**EXCILOR® - NAUJOS KARTOS PRIEMONĖ NAGŲ GRYBELIUI GDYTI!**

VENOMS

NUO 9<sup>99</sup> €



NAUJIENA

TIK VIENA TABLETĖ PER DIENĄ\*

**HESIO**  
 HESIO 500 mg, 30 plėvele dengtų tablečių 9<sup>99</sup> €  
 HESIO 500 mg, 60 plėvele dengtų tablečių 16<sup>99</sup> €  
 HESIO 500 mg, 120 plėvele dengtų tablečių 32<sup>99</sup> €  
 HESIO 1 000 mg, 30 plėvele dengtų tablečių 16<sup>99</sup> €

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Kiekvienoje „Hesio“ 500 mg tablete yra 500 mg mikronizuotų flavonoidų (atitinka 450 mg diosmino ir 50 mg kitų flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną). Kiekvienoje „Hesio“ 1000 mg tablete yra 1000 mg mikronizuotų flavonoidų (atitinka 900 mg diosmino ir 100 mg kitų flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną). **Terapinės indikacijos.** „Hesio“ skirtas suaugusiųjų: lėtinio kojų venų nepakankamumo simptomams (kojų sunkumui, kojų patinimui, skausmui, naktiniam kojų mėšlungiui) lengvinti; paūmėjusio hemorojus simptomams (skausmui, kraujavimui ir patinimui išangės srityje) lengvinti. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** „Hesio“ 500 mg tabletes: lėtinis venų nepakankamumas: rekomenduojama dozė suaugusiems yra 2 tabletes per parą 2 mėnesius: 1 tabletė vidudienį ir 1 tabletė vakare valgio metu. Jei simptomai išlieka, gydymas gali būti tęsiamas dar 2 mėnesius; hemorojus: rekomenduojama dozė suaugusiems yra 3 tabletes 2 kartus per parą (6 tabletes per parą). Kitas 3 dienas – 2 tabletes 2 kartus per parą (4 tabletes). Tabletes vartokite valgio metu. „Hesio“ 1000 mg tabletes: lėtinis venų nepakankamumas: rekomenduojama dozė suaugusiems yra 1 tabletė per parą 2 mėnesius valgio metu. Jei simptomai išlieka, gydymas gali būti tęsiamas dar 2 mėnesius; hemorojus: rekomenduojama dozė suaugusiems yra 1 tabletė per parą 2 mėnesius valgio metu. Jei simptomai išlieka, gydymas gali būti tęsiamas dar 2 mėnesius; hemorojus: rekomenduojama dozė suaugusiems yra 1 tabletė per parą 2 mėnesius valgio metu. Kitas 3 dienas – 1 tabletė 2 kartus per parą (2 tabletes). Tabletes vartokite valgio metu. **Kontraindikacijos.** „Hesio“ vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vaikams ir paaugliams „Hesio“ vartoti nerekomenduojama. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024-02. ID: 00064235

3<sup>99</sup> €



**FREST® 1 MG/G GELIS, 30 g**  
**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI.**

1 g gelio yra 1 mg dimetindeno maleato. **Terapinės indikacijos.** Frest vartojamas niežėjimo, susijusio su dermatozėmis, dilgėline, vabzdžių įkandimais, nudegimais nuo saulės spindulių ir paviršinių odos nudegimais (pirmojo laipsnio) trumpalaikiam malšinimui suaugusiems, paaugliams ir 1 mėnesio bei vyresniams vaikams. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Suaugusiems, paaugliams ir vaikams Frest gelį reikia tepti plonu sluoksniu ant pažeistos ir niežtinčios odos vietos iki 3 kartų per parą. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Frest negalima vartoti jaunesniems nei 1 mėnesio vaikams, ypač nesinėsioms. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu pasireiškė labai sunkus niežėjimas arba oda labai paražėsta, kartu su lokaliai vartojamu dimetindeno maleatu rekomenduojama skirti gydymą sisteminiu poveikiu geriamaisiais vaistais preparatais. **Vietinis rinkodaros teisės turėtojas atstovas.** AB Grindeks filialas, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius. Teksto peržiūros data 2022-05-16. Reklamos teksto parengimo data 2023-02-06.

NUO 5<sup>99</sup> €



**DITEL**  
 DITEL, 23,2 mg/g, gels, 50 ml 5<sup>99</sup> €  
 DITEL, 23,2 mg/g, gels, 100 ml 9<sup>99</sup> €

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veiklioji medžiaga, stiprumas:** diklofenako dietilaminas, 23,2 mg/g. **Terapinės indikacijos:** skirtas suaugusiems ir 14 metų bei vyresniems paaugliams: vietiskai skausmui malšinti esant ūminiams patempimams ar sumušimams po buko traumos. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** reikia vartoti 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Reikia nuo vėšnios iki graikiško riešuto dydžio kiekio, atitinkančio 14 g gelio. Didžiausia paros dozė yra 8 g gelio. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Anksčiau pasireiškusių padidėjusio jautrumo reakcijos, pavartojus acetilsalicilo rūgšties ar nesteroidinių vaistinių preparatų nuo uždegimo (NVPNU). Vartojimas ant atvirų žaizdų, gleivinių, jei yra odos uždegimas arba infekcija bei egzema. Vartojimas paskutiniujo nėštumo trimestru. Vartojimas vaikams ir paaugliams iki 14 metų. **Įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai vartoti pacientams, kurių inkstų, širdies ar kepenų funkcija sutrikusi, taip pat pacientams, kuriems yra aktyvi skrandžio ar dvilypakartės žarnos peptinė opa. Vartoti tik ant nepažeistos ir sveikos odos. Venyti, kad nepatektų į akis ir kontakto su gleivinėmis. Nenaudoti orui nepraaidžių tvarščių. Jei yra tiesioginių saulės spindulių arba dirbtinės saulės poveikis, kyla odos reakcijų pavojus. Gydymo metu ir dvi savaites po gydymo reikia vengti saulės spindulių ar dirbtinės saulės. Reklamos teksto parengimo data: 2024-04-04

5<sup>99</sup> €



**DEEP RELIEF**  
 50 mg/30 mg/g gels, 50g  
**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

1 g gelio yra 50 mg ibuprofeno ir 30 mg levomentolio. **Terapinės indikacijos:** Lokalus sąnarių aplinkos minkštųjų audinių uždegimo ir (ar) traumas (pvz., patempimo, ištrinimo) sukeltą skausmo malšinimas. **Dozavimas:** Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: gelį vartoti iki 3 kartų per parą, bet ne dažniau kaip 4 valandas. Tepti reikia apie 1–4 cm gelio iš 50 g pakuotės. Viename centimetre gėlio iš 50 mg tabletes yra vidutiniškai 50 mg ibuprofeno. 4 cm, iš 50 g tabletes yra vidutiniškai 125 mg ibuprofeno. Neviršyti nurodytų dozių. Jeigu simptomai nepraeina per penkis dienas, kreiptis į gydytoją. Vaikų populiacija: Duomenų apie Deep Relief saugumą ir veiksmingumą jaunesniems kaip 12 metų vaikams nėra. Vartojimo metodas: Plonu gėlio sluoksniu tepti skaudamą vietą, švelniai masažuoti, kol susigęs. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas aspirinui ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, skaitant ir vartojamus per burną. Astma sergantys pacientai, kuriems aspirinas arba kiti nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, gali sukelti astmos priepuolį, niežėjimą, rinitą ar dilgėlinę. Nutrozidina, patėsta infekcijos ar uždegimo oda arba pūtinė be virusinio odos sluoksnio. Kiti toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu lokaliai vartojami vaistiniai preparatai. Vartojimo vietoje esanti infekcija. Paskutinis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Deep Relief gėlio sudėtyje yra propilenglikolio, kuris gali sukelti odos sudirginimą. Gėlio neteigi ant (arba) šalia gleivinės ir akių. Nelinkta tepti po sandarinamųjų tvarščių. Pirmą kartą išbandyti ant mažo odos ploto. Vartoti tik ant odos. Registracijos ir gamintojas: The Menholatum Company (Ireland) Limited, Airija **DEEP RELIEF – VĖSINANTIS IR GREITAI VEIKIANTIS TEPALAS NUO SKAUSMO!**

EFEKTYVUS IR PATOGUS NAŲ GRYBELIO GYDYMAS

22<sup>99</sup> €



**POSAMYK 78,22 MG/ML, vaistinis nagų lakas**

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 ml yra 78,22 mg terbinafino. **Terapinės indikacijos:** suaugusiųjų, sergančių lengva ar vidutinio sunkumo nagų grybeline infekcija, gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** per pirmąsias 4 gydymo savaites „Posamyk“ art pakėnktu vartoti reikia tepti 1 kartą per parą, vėliau – 1 kartą per savaitę. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas terbinafinui arba pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** tik šoriniam vartojimui. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 214, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 265 6071. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS24035897 Teksto patvirtinimo data: 2024 03 13.

NUO ALERGIJOS

6<sup>99</sup> €



**ALLERGODIL**

ALLERGODIL, 0,1 % nosies purškalas (tirpalas), 10 ml  
 ALLERGODIL, 0,05 % akių lašai (tirpalas), 6 ml

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Allergodil 0,1% nosies purškalas (tirpalas).** 1 ml tirpalo yra 1 mg (0,1%) azelastino hidroklorido. **Terapinės indikacijos.** Simptominis nuolatinis alerginės slogos arba sezoninės alerginės slogos (šienligės) gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems ir vyresniems kaip 6 metų vaikams į kiekvieną nosies landą du kartus per dieną reikia įpurkšti po vieną išpurkimą. Jaunesniems kaip 6 metų vaikams vartoti nerekomenduojama. Vartoti į nosį. Pūrkiant vaistinio preparato į nosį, galvą reikia laikyti tiesiai. Vaistas tinka ilgalaikiam gydymui. Nepasitarus su gydytoju nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 4 savaites. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas azelastinui ar pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vaistas neskirtas vartoti į akis. Venyti kontakto su akimis. Vartojant su alkoholiu, gali pasireikšti papildomas budrumo sumažėjimas. **Allergodil 0,05 % akių lašai (tirpalas).** Viename laše yra 0,015 mg azelastino hidroklorido. 1 ml tirpalo yra 0,5 mg azelastino hidroklorido. Sudėtyje yra benzalkonio chlorido. **Terapinės indikacijos.** Simptominis suaugusiųjų ir vyresnių nei 4 metų vaikų sezoninio alerginio konjunktyvito gydymas ir profilaktika. Simptominis suaugusiųjų ir vyresnių nei 12 metų vaikų nuolatinio alerginio konjunktyvito gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Abiems indikacijoms dozė yra vienas lašas į kiekvieną akį du kartus per dieną. Paūmėjimo metu – iki 1 lašo į kiekvieną akį 4 kartus per dieną. Gydymo ciklas neturėtų viršyti 6 savaičių. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas azelastinui ar pagalbinėms medžiagoms, negalima vartoti jaunesniems kaip 4 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Allergodil nėra skirti akių infekcinėms ligoms gydyti. Prieš lašų vartojimą kontaktiniai lęšiai turi būti išimti ir prieš įsidėdant juos atgal reikia palaukti mažiausiai 15 min. Reklamos teksto parengimo data: 2023 04. ALL-2023-0069.



**-30%**



### „SMARTHIT IV“ EFEKTYVAUS PASISAVINIMO MAISTO PAPILDAI

Mūsų technologijos dėka pagaminami produktai, kurie pasisavinami itin gerai. Be to, mikrokapsulės sumažina šalutinių poveikių riziką. Efektyvus pasisavinimo maisto papildų **SMARTHIT IV** liniją sudaro:  
 Naujiene! **SMARTHIT IV Lactoferrin**. Laktoferrinas – tai geležį surišantis baltymas, dalyvaujantis geležies pasisavinimo procese. Galima vartoti kartu su **SMARTHIT IV Ferum** kapsulėmis arba **SMARTHIT IV Ferum Liquid** skysčiu. Geležis padeda palaikyti normalią hemoglobino ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą.  
 Naujiene! **SMARTHIT IV Ferum Gummies** – pirmieji mikrokapsuliuoti geležies guminukai.  
 Naujiene! **SMARTHIT IV Vitamin C+Zn** – mikrokapsuliuotas vitaminas C su cinku kapsulėmis.  
**SMARTHIT IV Vitamin D3** – kaulams, dantims, raumenims;  
**SMARTHIT IV Vitamin D3+K2** – sinerginis, vitaminų D3 ir K2 poveikis kaulams ir kraujotakai;  
**SMARTHIT IV Vitamin B12** – normaliai kraujodarai bei psichologinei funkcijai palaikyti ypač daug dirbančiams ir besimokantiems;  
**SMARTHIT IV Polifen** – polifenolių šaltinis gerai savijautai.  
**SMARTHIT IV – MENAS VEIKTI!**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

**IKI -50%**



Su natokinazės fermentu



**NATASPIN CONTROL PRO**, 30 kapsulių **18<sup>99</sup> 9<sup>50</sup> € -50 %**  
**NATASPIN CONTROL PRO**, 90 kapsulių **35<sup>99</sup> 27<sup>99</sup> € -30 %**

#### MAISTO PAPILDAI

Tai pažangus, kompleksinio pobūdžio maisto papildas cholesterolio kontrolei, kraujotakai ir kraujagyslėms. Sudėtyje yra plataus poveikio augalinės kilmės derinys iš 2000 FV (fibрино vienelių) standartizuotos natokinazės fermento, monokolino K, polikonasolio ir polifenolių (iš bergaminių citrinmedžių bei dažinių ciberžolių). Dažinės ciberžolės padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje, širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą, normalų kepenų lipidų kiekį.

**NATASPIN H**, 30 kapsulių **17<sup>99</sup> 10<sup>79</sup> € -40 %**

#### SPECIALIOS MED. PASKIRTOS MAISTO PRODUKTAS

Tai vienintelis Lietuvos vaistinėse siūlomas standartizuotos natokinazės fermento ir hidroksitirozolio (iš alyvuogių) derinys kraujotakai. Skirtas tik mitybai reguliuoti esant kraujotakos sutrikimams ir padidėjusiai trombozės susidarymo rizikai.

**NATASPIN – PRADEK DABAR.**

**-50%**



**HYPNOZAN EXPRESS**,  
30 tablečių **6<sup>99</sup> 3<sup>25</sup> €**

#### MAISTO PAPILDAS

Čiulpiamos tabletės su melatoninu ir fitoterapinių medžiagų deriniu leidžia greičiau užmigti, o čiulpiama preparato forma užtikrina geresnį veikimą.



**HYPNOZAN**, 20 kapsulių **9<sup>55</sup> 4<sup>78</sup> €**

#### MAISTO PAPILDAS

Maisto papildas su melatoninu ir melisomis padeda greičiau užmigti, palaikyti normalią miegą bei psichinę sveikatą ir padeda atsipalaiduoti.

**5<sup>99</sup> €**



### SEPTABENE

3 mg/1 mg, 16 kietųjų pastilių

#### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Septabene“ dezinfekuoja burną ir ryklę bei lengvina ryklės uždegimo požymius: skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. Kietosios pastilės „Septabene“ vartojamos uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti: jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas; sergant dantenų uždegimu (gingivitu), ryklės uždegimu (faringitu) ir gerklų uždegimu (laringitu); prieš dantų traukimą ir po jo. **Dozavimas:** suaugusiems rekomenduojama paros dozė yra 3–4 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai iširpinti burnoje kas 3–6 valandas. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 m. vaikas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Septabene“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydymo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Saveika su kitais vaistais: preparatas ir kitokia saveika. „Septabene“ negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Kietųjų pastilių negalima vartoti kartu su pienu, nes jis silpnina cetilpiridinio chlorido antimikrobinį poveikį. Reklamos teksto parengimo data 2022 10 12.

**TAVO GERKLĖ – TAVO JĖGA!**

**4<sup>99</sup> €**



**SEPTANAZAL** 1 mg/50 mg/ml  
nosies purškalo (tirpalas), 10 ml

Suaugusiems

Ksilometazolino hidrochloridas / Dekspantenolis

#### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Septanazal nuo 6 metų amžiaus vartojamas:

– nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) bei gleivinės pažeidimo gijimui skatinti;  
 – nealerginiam nosies gleivinės uždegimui (vazomotoriniam rinitui) lengvinti;  
 – kvėpavimo pro nosį pasunkėjimui po nosies operacijos šalinti.

Rekomenduojama dozė 6 metų bei vyresniems vaikams yra po vieną įpurškimą į kiekvieną šnervę iki 3 kartų per parą. Kontraindikacijos. Septanazal suaugusiems vartoti negalima, jeigu yra alergija ksilometazolino hidrochloridui, dekspantenoliui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu Jums arba Jūsų vaikui yra sausasis nosies gleivinės uždegimas ir atsiranda šašų (sausasis rinitas), jeigu Jums arba Jūsų vaikui buvo chirurginiu būdu pašalinta posmegeninė liauka arba buvo atlikta kita operacija, susijusi su smegenų dangalais. Specialūs įspėjimai. Septanazal galima vartoti tik atidžiai įvertinus rizikos ir naudos santykį, jeigu: pacientas yra gydomas monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI) ar kitokiais kraujospūdį didinanti galinčiais vaistais; pacientas, yra padidėjęs akispūdis (ypač jei sergama uždaru kampo glaukoma), pacientas serga sunkia širdies ir kraujagyslių liga, yra feochromocitoma, yra metabolinių sutrikimų, yra porfirija, yra prostatos hiperplazija. Teksto peržiūros data: 2023 11 20.

**ATKĖMSA UŽGULUSIĄ NOSĮ IR ŠVELNIAI GYDO ISSAUSĖJUSIĄ NOSIES GLEIVINĘ.**

**-50%**



**FOMAN® UP SHOTS**  
14 x 25 ml **36<sup>99</sup> 18<sup>50</sup> €**

#### MAISTO PAPILDAS

**Foman UP Shots** – skirtas seksualiai aktyviems vyrams. Viename buteliuke yra koncentruotųjų veikliųjų medžiagų dozė pritaikyta vyrų: **lytiniam potraukiui, erekcijai, pajėgumui ir energijai**. Natūralų seksualinį aktyvumą ir energiją padeda palaikyti **Peruvinė pipirė (maca)**. Lytinį potraukį ir pajėgumą padeda palaikyti **Gulstioji ragutė**. Ženšenis padeda palaikyti normalią erekcijos funkciją. **Pantoteno rūgštis** (vitaminas B<sub>5</sub>) padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei padeda palaikyti normalią proteinų sintezą bei normalią energijos apykaitą. Sudėtyje taurinas (natūrali amino rūgštis).

**VIRŠYK GALIMYBES SU FOMAN UP SHOTS**

**FOMAN®** 30 kapsulių **13<sup>95</sup> 7<sup>00</sup> €**

#### MAISTO PAPILDAS

„Foman“ – maisto papildas, skirtas 3 pagrindiniams vyriškoms funkcijoms: **prostatai, šlapimo sistemos, reprodukcinei**. Išskirtinėje „Foman“ sudėtyje yra 4 kompleksiški veikiantys elementai: gulsčiųjų serenojų vaisių ekstraktas padeda palaikyti šlapimo ir reprodukcinę funkcijas; didžiųjų dilgėlių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią prostatos funkciją; fermentas proteazė padeda palaikyti normalią selekto formą, padeda palaikyti normalią spermatogenezę. Rekomenduojama suaugusiems gerti po 1–2 tabletes per dieną ne valgio metu.

**FOMAN – TECHNIŠKAI TVARKINGAM VYRUI.**

# Dolmen®

deksketoprofeno trometamolis

GREITAI MALŠINA  
SKAUSMĄ,  
KAI TO LABIAUSIAI REIKIA!



Geriamas  
iš paketėlio

**M BERLIN-CHEMIE  
MENARINI**

UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIČ“  
Jasinskio g. 16a, Vilnius LT-03163  
Tel. +370 5 269 19 47  
LT@berlin-chemie.com



## SKAUSMINGŲ MĖNESINIŲ, RAUMENŲ IR KAULŲ, DANTŲ SKAUSMO MALŠINIMAS

Dolmen. **Nereceptinis vaistas. Veiklioji medžiaga.** Deksketoprofeno trometamolis (dexketoprofenum). Vienoje pėvele dengtoje tabletėje / granulių geriamajam tirpalui paketylyje / geriamojo tirpalo paketylyje yra 25 mg deksketoprofeno. **Vaisto forma.** Pėvele dengtos tabletės / granulės geriamajam tirpalui / geriamasis tirpalas paketylyje. **Pakuotė.** Po 10 tablečių / po 10 paketylių granulių / po 10 geriamųjų tirpalų paketylyje. **Indikacijos.** Dolmen vartojamas trumpalaikiam simptominiams lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiams kaip raumenų, sąnarių ir kaulų skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorejos), dantų skausmui malšinti. **Dozavimas.** Atsižvelgiant į skausmo priežastis ir intensyvumą, rekomenduojama gerti: po 1 tabletę / paketylį / geriamąjį tirpalą paketylyje 1-3 kartus per parą kas 8 valandas. Didžiausia paros dozė neturi būti didesnė kaip 3 tabletės / paketyliai / geriamieji tirpalai paketylyje. Jei esate senyvo amžiaus ar sergate inkstų, kepenų ligomis, pradėkite vartoti ne daugiau kaip 2 tabletes / paketylius / geriamuosius tirpalus paketylyje per parą. **Vartojimo būdas.** Jei vartojate granules, visą paketėlio turinį ištirpinkite stiklinėje vandens, suplakite. Išgerkite nedelsiant. Geriamasis tirpalas paketylyje gali būti geriamas tiesiai iš paketėlio. Jeigu jaučiate intensyvų skausmą ir reikia jį greičiau nuslopinti, vaistą vartokite prieš valgymą (ne vėliau kaip prieš 15-30 min.). Poveikis prasideda po 30 min. pavartojus vaisto. Skausmą malšinantis poveikis trunka 4-6 valandas. Šio vaisto neturėtų vartoti vaikai ir paaugliai (jaunesni kaip 18 metų). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas deksketoprofenui, kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aspirinui; vartojant ketoprofeno ar fi bratų buvę fotoalerginės ar fototoksinės reakcijos; pepsinė opa, buvęs kraujavimas iš virškinamojo trakto, lėtiniai virškinimo sutrikimai bei lėtinės virškinamojo trakto ligos; sunkus širdies nepakankamumas, vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų funkcijos, sunkus kepenų veiklos sutrikimas; esant sunkiai dehidratacijai; nėštumas bei žindymo laikotarpis. **Įspėjimai.** Vaistą atsargiai turi vartoti vyresnio amžiaus ligoniai, sergantieji alergija, astma, širdies, inkstų, kepenų ligomis, hipertenzija, sisteminė raudonąja vilklige, cukriniu diabetu, įvairiomis jungiamojo audinio ligomis, sutrikus kraujodarai; vartojant šlapimo išsiskyrimą skatinančius vaistus ar netekus daug skysčių. Pasitarkite su gydytoju jei vartojate kitų vaistų: geriamųjų steroidinių, nuo depresijos, apsaugančių nuo kraujo krešumo. Dolmen geriamojo tirpalo paketylyje ir granulių geriamajam tirpalui paketylyje yra sacharozė, todėl jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti Dolmen granules geriamajam tirpalui ar geriamąjį tirpalą paketylyje. Į tai turėtų atsižvelgti pacientai, sergantys cukriniu diabetu. Deksketoprofenas gali paslėpti tokius infekcijų požymius kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl gali būti, kad vartojant šį vaistą gali būti vėluojama pradėti tinkamą gydymą, o dėl to gali padidėti komplikacijų rizika.

Pašome dėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje [www.vvt.lt](http://www.vvt.lt)

Reklama paruošta: 2021 m. birželio mėn.

LT\_Dol\_10\_2021\_V1\_press

GERESNIAM VIRŠKINIMUI

**6<sup>99</sup>** €



**MEZYM 20000V**, 20 skrandyje neirių tablečių

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Vienoje skrandyje nerioje Mezym 20000V tablete yra 160mg-222,22 mg kasos miltelių (iš kiaušių kasos pagaminto pankreatino), kurių minimalus aktyvumas atitinka 20 000 lipazės vienetų, 12 000 amilazės vienetų, 900 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. MEZYM vartojamas tuomet, kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentų ir tai sukelia virškinimo sutrikimų. Mezym vartoti negalima: jeigu yra alergija kasos milteliams, kiaulės (dailymamams) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; šio vaisto negalima vartoti, jeigu jūs sergate ūminiu kasos uždegimu (pankreatitu) arba jums patologiškas lėtinis kasos uždegimas, kai ligos požymiai yra stipriai išreikšti. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju ir vaistininku, prieš pradėdami vartoti Mezym. Cistinė fibrozė kartais gali komplikuotiis žarnyno nepraeinamumu. Esant simptomams, panašioms į žarnyno nepraeinamumo požymius, reikia apsvaityti žarnyno susiaurėjimo galimybę. Jeigu jums atsirado neįprastas diskomfortas skrandyje ar žarnyne, ar pasikėtė nusiskundimų pobūdis, būtina kreiptis į gydytoją, kuris yra apžiūrės tikslu atimti žarnų pažeidimo galimybę. MEZYM sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas yra sakes, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į j prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Mezym būtina reikia būtina nuryti nekramčius. Dozavimas: MEZYM visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. MEZYM dozės priklauso nuo virškinimo sutrikimų tipais, optimali dozė nustatoma individualiai. Jeigu kitaip nenurodyta, valgant išgeriamas 1-2 pėvele dengtos MEZYM 20000V tabletes. Dienos dozė 15000-20000 lipazės vienetų kilogramui kūno svorio nustatoma individualiai. Reklama paruošta 2023 m. gruodžio mėn. UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ Jasinisko g. 16a, LT-0363 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com LT\_Mez\_03\_2023\_V1-pharma

**MEZYM – PADEDA GERINTI SUTRIKUSĮ VIRŠKINIMĄ!**

\* kai kasa išskiria nepakankamai virškinimo fermentų

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis



MAZGINIAM VENŲ IŠSIPLĖTUMUI

**NUO 7<sup>99</sup>** €



**LIOTON**

LIOTON, 1000 TV/g, gelis, 50 g **7<sup>99</sup>** €  
LIOTON, 1000 TV/g, gelis, 100 g **14<sup>99</sup>** €

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Lioton 1000 TV/g gelis.** Heparino natrio druska. **Nereceptinis vaistinis preparatas.** Terapinės indikacijos. Lioton vartojamas: mazgino venų išsiplėtimui ir jo sukeliamų komplikacijų (kraujavimų, kraujagyslių sutraukimų, kraujagyslių uždegimų, trombozės) gydymui; pažeistų venų sienelių uždegimui, pasireiškusio po chirurginių operacijų gydymui; dėl venų operacijos atsiradusių simptomų šalinimui (pvz., mėlynių, patinimų); dėl sąnarių ir raumenų traumų, sausgyslių patempimo atsiradancio patinimo ir kraujosruvų mažinimui. **Vartojimo būdas:** gelis tepamas ant odos pažeistose vietose ir švelniai įtramas 1-3 kartus per parą. Iš tobėles patarima išspausti 3-10 cm gėlo. Jeigu simptomai pasunkėja arba nepalengvėja, reikia kreiptis į gydytoją. **Kontraindikacijos.** Lioton vartoti draudžiama: jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) heparinui arba bet kuriai pagalbinei Lioton medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu padidėjęs kraujosruvų tikimybė, gydymas Lioton turi būti atidžiai įvertintas gydytojo; jeigu panaudojus Lioton atsiranda alergijos (padidėjęs jautrumas) požymiai ir simptomai, vartojimą reikia nutraukti nedelsiant. Šio vaistinio preparato sudėtyje yra aromatinių medžiagų, šono sudėtyje turiu citralo, chlorofėlio, kumarino, d-limoneno, farnezo, geranolio ir linalolio. Citralas, chlorofėlio, kumarinas, d-limonenas, farnezo, geranolis ir linalolis gali sukelti alerginius reiškius. Jeigu yra atvėri žalčiai, iš odos kraujuoja arba yra odos infekcijos požymiai plote, kuriu reikia gydyti. Lioton vartoti draudžiama; nevartoti srityse, nepadengtose oda (pvz., lyties organų, burnos ertmės gleivinė). Lioton sudėtyje yra etanolio, kuris gali sukelti degimo pojūtį ant pažeistos odos. Arterijos Lietuvoje. UAB „Berlin Chemie Menarini Balti“, J. Jasinskio g. 16A, Vilnius LT-0363. Tel. +370 5 269 19 47, el. paštas LT@berlin-chemie.com Reklama paruošta 2023 m. sausio mėn. LT\_Lio\_01\_2023\_V1\_press

**TAVO KOJŲ SVEIKATAI IR KOMFORTUI**

NUO SLOGOS

**4<sup>99</sup>** €



**IBUPROFEN LANNACHER**

400 mg, plėvele dengtos tabletės, 10 tablečių **2<sup>49</sup>** €  
400 mg, plėvele dengtos tabletės, 20 tablečių **3<sup>99</sup>** €  
Vienoje plėvele dengtoje tablete yra 400 mg ibuprofeno.

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Indikacijos:** „Ibuprofen Lannacher“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos ibuprofeno. Ibuprofenas malšina uždegimo sukelitą skausmą, patinimą ir karščiavimą, vartojamas trumpą laiką silpno ar vidutinio stiprumo skausmui, tokiam kaip mėnesiniai galvos, dantų, raumenų, sąnarių, mašini. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** tabletes reikia nuryti valgant arba pavėlyjus, užsigeriant pakankamiu kiekiu skysčiu. Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: 0,5-1 plėvele dengtą tabletę 3 kartus per parą. Negalima viršyti didžiausios paros dozės 1200 mg ibuprofeno (3 plėvele dengtų tablečių). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofeniui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei yra buvę padidėjęs jautrumo reakciju, vartojant kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo, acetilsalicilo rūgšties dariniams. Sunkus kepenų, inkstų ar širdies funkcijos nepakankamumas. Pasukūlimu trijų nėštumo mėnesių laikotarpis. Pėpsinė opa. Kraujavimas į smegenis, virškinimo trakto ir kt. Sistemine raudonoji vilkligė. Jaunesni nei 12 m. vaikai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai skirti pacientams, sergantiems širdies ir kraujagyslių, smegenų kraujagyslių ligomis, cukriniu diabetu ir jungiamojo audinio ligomis, servyiems pacientams. Pacientams, sergantiems bronchine astma ar alerginomis ligomis, gali išsivystyti bronchių spazmas. Virškinimo trakto sutrikimai ir lėtinis uždegiminis žarnyno ligos gali padmėti. Atsirado virškinimo trakto kraujavimai ar išopėjimai, gydymas turi būti nedelsiant nutrauktas. Vartojimas gali mažinti moters vaisingumą. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbija. **Pakuotė:** 10 ir 20 plėvele dengtų tablečių. **Farmakoterapinė grupė:** nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo. **ATC kodas:** N01AE01. **Rinkodanos teisės turėtojas ir gamintojas:** „G.L. Pharma GmbH“, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. **Paskutinė teksto peržiūros data:** 2023-07-27. Reklamos teksto parengimo data: 2024 04.

**NUSIMESK SKAUSMO KAUKĖ!**

**OLYNTH® HA,**

1 mg/ml, nosies purškukas (tirpalas), 10 ml

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: trumpalaikis simptominis nosies ir prienosinio ančių gleivinės paburkimo mažinimas, kuris atsiranda dėl peršalimo ar alergijos. „Olynth® HA“ 1 mg/ml/1 mg/ml\* skiriamas vartoti suaugusiesiems, 12 m. ir vyresniems vaikams. Vartojimo būdas ir dozavimas: puršksti po 1 įpuskijimą į kiekvieną nosies landą ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; padidėjęs akių spūdis, ypač pacientams, sergantiems odos kampe glaukoma; sausasis arba vazomotorinis nosies gleivinės uždegimas; pacientai, kuriems atlikta transfenoidalinė hipofizektomija; monoaminooksidazės inhibitorių vartojimas šiuo metu arba per pastarąsias 2 savaites; vaistų, galinčių padidinti kraujospūdį, vartojimas; pacientai, sergantys atopine astma ar vazomotoriniu rinitu. Specialūs įspėjimai: jei gydytojo nepaskirta kitaip, negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Atsargiai vartoti pacientams, kurie jautriai reaguoja į simpatomimetikus, serga širdies ir kraujagyslių ligomis, hipertenzija, hiperlirtoze, cukriniu diabetu, esant prostatos hipertrofijai ar sergant feochromocytoma. Reklamos teksto parengimo data 2024-02. LT-01-2000006

**ALERGIJOS ŽALČIAI? OLYNTH HA GREITAI ATKŔMŠA NOSĮ IR SINUSUS.**

**7<sup>99</sup>** €

**NUROFLEX 200 mg vaistinis pleistras,**

2 vaistiniai pleistrai

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Kiekviena vaistinė pleistrė yra 200 mg ibuprofeno. **Farmacinė forma.** Vaistinis pleistras: bespalvis, lipnus vaistinio preparato sluoksnis, paskirstytas ant 10 cm x 14 cm dydžio lankstaus kūno spalvos austos pagrindo, ir padengtas nuimam apsauginiu sluoksniu. **Terapinės indikacijos.** Nuroflex skirtas trumpalaikiam lokaliam skausmo, sukėto ūminio raumenų patempimo arba lengvų viršūnės ar apatinės galūnės sąnario aplinkos audinių traumų, simptominiam gydymui suaugusiesiems ir 16 metų ar vyresniems paaugliams. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiesiems ar 16 metų ir vyresniems paaugliams: viena dozė yra lyvi vienam vaistiniam pleistrui. Didžiausia dozė per vieną 24 valandų laikotarpį yra vienas vaistinis pleistras. Pleistras gali būti vartojamas bet kurioje dienos ar nakties metu, tačiau jį reikia nuimti ir naują pleistrą vė užklijuoti kita dieną tuo pačiu laiku. Vartoti ant odos ir tik trumpą laiką. Vaistinis pleistras turi būti naudojamas visas, jo negalima karpyti. Klijuojama tik ant sveikos odos. Gydymasis pleistras neturi būti vartojamas kartu su okliuziniu tvarščiu. Prieš užklijuojant vaistinį pleistrą rekomenduojama kruopščiai nuplauti ir išdžiovinti gydymąi kūno paviršių. Pirmiausia pašalinkite centre apsauginio sluoksnio dalį, skirtą apsaugoti lipniam pagrindo paviršiui, ir uždėkite pleistrą šia lipnia puse ant skaudančio ploto. Kai pleistras yra reikiamoje vietoje, pašalinkite apsauginį sluoksnio dalį, esančią pleistro kraštuose. Vaistinis pleistras yra lankstus ir paslankus, todėl prireikus gali būti užklijuotas ant arba šalia sąnario, tokiu būdu leisdamas jam normaliai judėti. Venkite vaistinio pleistro drėkinimo. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai vaisto pagalbinei medžiagai. Jeigu praėlyte yra buvę padidėjęs jautrumo reakciju (pvz., astma, bronchių spazmas, rinitas, angioneurozinė edema ar dilgelinė) vartojant ibuprofeno, acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistinių preparatų nuo uždegimo (NVNU). Vartojimas ant įtrūkusios ar pažeistos odos. Trečiasis nėštumo trimestras. Vartojimas ant akių, lūpų ar gleivinių. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei simptomai išlieka ilgiau nei 5 paras arba pablogėja, reikia pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu. Bronchių spazmas gali pasireikšti pacientams, vartojantiems ibuprofeno, kurie serga arba anksčiau sirgo bronchine astma ar alergija. Gydymą reikia nedelsiant nutraukti, jei užklijuojant vaistinį pleistrą atsiranda odos išbėrimas. Pacientai turi būti įspėjami apie gydymo zonos reakciją stropiems natūralaus ir (arba) dirbtinio apšvietimo šaltiniams (pvz., idegio lempos) gydymo metu ir vieną dieną po vaistinio pleistro pašalinimo, siekiant sumžinti jautrumo šviesai riziką. Pacientams, kuriems yra sutrikusi inkstų, širdies ir kepenų funkcija, buvo arba yra peštinė opa, žarnų uždegimas ar hemoraginė diatezė, prieš pradėdami vartoti šį vaistinį preparatą, reikia kreiptis į gydytoją. Senyviems pacientams nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo turėtu būti vartojami atsargiai, nes jiems yra didesnė nepageidaujimų poveikii tikimybė. Reklamos tekostas parengtas 2024-04-15.

NUO SUMSIŠIŲ

**9<sup>99</sup>** €



**DOLOBENE™ gelis, 50 g**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 g gėlo yra 500 TV heparino natrio druskos, 150 mg dimetilsulfoksido, 25 mg diksipantenolio. **Terapinės indikacijos:** patinimo, hematomos ir uždegimo po bukos raumenų, sausgyslių, sausgyslių makščių, reikščių, sąnarių traumų gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tepti geliu pažeistą vietą 1-2 kartus per parą. Nereikia įtrinti, tik švelniai užtepti ir paskleisti. Nenaudoti po oro nepalaidžiančias tvarsčias. „Dolobene“ negalima tepi ant atvros žaizdos, pažeistos odos ir gleivinės. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sergantiesiems raudonąja vilkligė; astma; jaunesniems kaip 5 m. vaikams; esant sunkiems inkstų ir (arba) kepenų pažeidimams, kraujotakos sutrikimams; negalima vartoti kartu su sulindaku. **Specialūs įspėjimai:** nepatariama tepi ant pažeistos odos ir gleivinės. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024 m. balandis. DLBN-LT-00001



2<sup>75</sup> €



**PARACETAMOLIS SANITAS**

500 mg, 20 tablečių

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** Vienoje tablečių yra 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikiam karščiavimo mažinimui, silpno ir vidutinio stiprumo skausmo mažinimui (pvz.: galvos, dantų, gerklės, raumenų, mėnesinių). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** įprastinė rekomenduojama vienkartinė dozė suaugusiems yra 1 tabletė kas 4 valandas, sunkiais atvejais – 2 tabletes kas 6 valandas, ne daugiau kaip 6 tabletes per parą. Vartoti per burną. Vaistą vartojant valgio metu, mažiau dirginamas virškinimo traktas. Tabletę reikia užgerti ne mažiau kaip 250 ml sulčių, pieno ar vandens, jos kramtyti negalima. **Kontraindikacijos:** yra alergija paracetamolii arba pagalbinei šio vaisto medžiagai, pacientas jaunesnis negu 6 metų, yra sunkus kepenų ar inkstų nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu esate alergiškas acetilsalicilo rūgščiai ar kitiems nesteroidiniams vaistiniams preparatams nuo uždegimo, persigrote arba dabar sergate sunkia kepenų liga, sutrikusi inkstų funkcija, turite įgimtą bilirubinemiją, jums yra kai kurių fermentų, skaldančių gliukozę, trūkumas, esate senyvas, sergate sunkia liga arba jeigu širdies ir kraujagyslių sistemos veikia susilpnėjusi, sergate alkoholizmu. **Reklamos teksto parengimo data:** 2023 04 27

**VYRIŠKAS VAISTAS. VYRIŠKAS SPRENDIMAS**

NUO 11<sup>99</sup> €



**PROSTAMOL UNO**, 320 mg, 30 minkštųjų kapsulių 11<sup>99</sup> €  
**PROSTAMOL UNO**, 320 mg, 60 minkštųjų kapsulių 22<sup>99</sup> €  
**PROSTAMOL UNO**, 320 mg, 90 minkštųjų kapsulių 33<sup>99</sup> €

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Sabalpalmių vaisių tirštasis ekstraktas „Prostamol uno“ yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas su gerybine prostatos hipertrofija susijusių apatinių šlapimo takų simptomams lengvinti, gydytojų paneigus sunkias būkles. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas sabalpalmių (*Serenoa repens*) vaisių ekstraktui ar bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Prostamol uno“ tik lengvina simptomus, susijusius su prostatos padidėjimu, bet prostatos padidėjimo neveikia. Del to pacientas turi reguliarius intervalais lankytis pas gydytoją. Jeigu vartojant vaistinį preparatą ligos požymiai pasunkėja arba atsiranda tokių simptomų, kaip karščiavimas, spazmai arba kraujas šlapime, skausmingas šlapinimasis arba šlapimo susilaikymas, būtina pacientą ištirti. Sąveika su kitais vaistinėmis preparatais ir kitokia sąveika: pasiebėta keletas įtariamos sąveikos su varfarinu atveju. Aprašyti TNS padidėjimo atvejai. Dozavimas ir vartojimo metodas: 1 minkštąją kapsulę (320 mg) reikia vartoti 1 kartą per parą, kasdien, tokiu pačiu laiku. Kapsulę reikia nuryti nesukramtyta, užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio. Vartoti po valgio. Galimas ilgalaikis vartojimas. Medžiagos šalutinis poveikis: pykinimas, vėmimas, viduriavimas, pilvo skausmas (ypač pavartojus tuščiu skrandžiu). Registracijos: UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, Lietuva. Teksto peržiūros data: 2021-10-21. Čia pateikta trumpintą informaciją apie vaistą. Reklama paruošta 2022-06-17, LT\_05\_2022\_V1\_press

2<sup>99</sup> €



**LOPERAMIDE-GRINDEKS**

2 mg, 10 kietųjų kapsulių

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veiklioji medžiaga:** vienoje kapsulėje yra 2 mg loperamido hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** viduriavimą slopinantis vaistas. **Dozavimo ir vartojimo būdas:** suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų paaugliams pradinė dozė – 2 kapsulės (4 mg), paskui – po 1 kapsulę (2 mg) po kiekvieno tuštinosi skystomis išmatomis. Didžiausia paros dozė – 6 kapsulės (12 mg). **Kontraindikacijos:** galvos skausmas, svaiugyvis, vidurių užkietėjimas, pykinimas, dujų kaupimasis žarnyne. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** viduriavimo gydymas šiuo vaistu yra tik simptominis ir priežastis nepašalina. Jei viduriavimo priežastis yra žinoma, ją reikia gydyti. **Vietinis rinkodaros teisės turėtojas atstovas:** AB GRINDEKS filialas, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius. **Reklamos teksto parengimo data:** 2023-05-05.

IKI -30%



**RANIGAST S-O-S**, 12 kramtomųjų tablečių 4<sup>99</sup> 3<sup>42</sup> € -30 %

**RANIGAST S-O-S**, 24 kramtomosios tabletės 5<sup>79</sup> 4<sup>63</sup> € -20 %

**MEDICINOS PRIEMONĖ**

„Ranigast S-O-S“ yra skirtas gastroezofaginio refliksu simptomams (rėmeniu, skrandžio skausmui, dispepsijai) malšinti.

- Veikia akimirksniu – nuo to momento, kai tik sučiulpste ar išgersite tabletę.
  - Dėl ypatingos sudėties apsaugo skrandžio gleivinę ir sumažina rėmens epizodų skaičių.
  - Tinka naudoti ir kaip papildoma priemonė sergantiems gastritu, peptine opa.
  - Galima naudoti nėštumo ir žindymo metu, prieš tai pasitarus su gydytoju.
- Suaugusiems ir vaikams nuo 12 metų: rekomenduojama pavalgius vartoti 2 tabletes. Vaikams (6–12 metų): rekomenduojama pavalgius vartoti 1 tablete.

6<sup>99</sup> €



**MAGNEROT 500 MG**, 50 tablečių.

**NERECEPTINIS VAISTAS**

Kiekvienoje tablečių yra 500 mg magno orotato dihidrato (atitinka 32,8 mg magnio). **Terapinės indikacijos:** Magno trūkumo, jeigu jis sukelia raumenų veiklos sutrikimą (pvz., mėšlungį), šalinimas. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems žmonėms: jei nepaskirta kitaip, magno atsargoms papildyti pirmą savaitę reikia gerti po 2 tabletes 3 kartus per parą, po to – po 2-3 tabletes per parą. Vaikų populiacija: magnerot nėra skirtas vaikams iki 18 metų. Vartoti per burną. Tablete reikia vartoti mažiausiai 6 savaites. Galima vartoti ir ilga laiką. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, inkstų funkcijos sutrikimas ir polinkis formuotis kalcio, magnio ir amonio fosfatų akmenims. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktozės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Sąveika su kitais vaistinėmis preparatais ir kitokia sąveika. Jei kartu vartojama geležies vaistinių preparatų, magnis gali sutrikdyti geležies absorbciją. Tokiu atveju geležies vaistinių preparatų reikia gerti ne anksčiau, kaip praėjus 2-3 val. po magno vaistinio preparato pavartojimo (arba atvirkščiai). Taip turi būti vartojami ir tetraclinkiniai bei natro fluoridai. Nepažeidžiamas poveikis. Didelės dozės gali sukelti viduriavimą arba išmatų suminkštėjimą. Sumažinus dozę, toks poveikis išnyksta. Pakuotė, 50 tablečių. Teksto peržiūros data: 2022.08.11. Registracijos: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Vokietija. **ORGANINĖ MAGNIO DRUSKA, LENGVAS PASISAVINIMAS.**

9<sup>99</sup> €



**CANIFUG CREMOLUM** 200 mg, 3 ovulės

Klotrimazolas

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** vienoje ovulėje yra 200 mg klotrimazolo. **Indikacijos:** mieliagrybių (dažniausiai *Candida albicans*) sukeltos makšties uždegimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: 1 „Canifug Cremolum“ ovulė (tai atitinka 200 mg klotrimazolo) įkišti kuo giliau į makštį vieną kartą per parą, vakare. Dažniausiai pakanka 3 dienų gydymo šiuo vaistu kursu. Prieiktus galima paskirti antrą 3 dienų trukmės gydymo kursą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Canifug Cremolum“ medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** specialiu atsargumo priemoniu reikia nėštumo ir žindymo laikotarpiu, jeigu vartojami deodorantai arba intymiosios higienos priemonės; jeigu kartu yra lytinis lupai ir gretimos srities odos infekcinė liga; šiais atvejais reikia papildomai skirti lokalių gydymą tinkamais vaistais; jeigu atsiranda tokių požymių – paraudimas, dilgčiojimas, niežėjimas, makšties išsivyras, makšties uždegimas su skausmu; šie požymiai taip pat gali būti dėl to, kad ligos sukėlėjas neįėjimas „Canifug Cremolum“; jeigu tuo pačiu metu vartojamas „Canifug Cremolum“ su lateksu produktas (pvz., prezervatyvas, diafragmos), dėl vaisto sudėtyje esančių pagalbinės medžiagos (ypač stearato) šių produktų veiksmingumas gali sumažėti ir jie tampa mažiau patikimi. Vaisto sudėtyje yra cetosteario alkoholio. Cetosteario alkoholis gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą). Geriausia gydytis ne mėnesinių metu ir (arba) gydymą baigti prieš mėnesinių pradžią, gydyti mėnesinių metu galima tik esant sunkiems klinikiniams simptomams. Nėštumo metu gydymą gali skirti tik gydytojas. Jeigu kartu yra lytinis lupai ir gretimų srities infekcija ir (arba) partneriu mediciniškai diagnozuojamas varpos grybelis ir apvaisinimo uždegimas, partneriu reikia papildomai vartoti lokalių gydymą tinkamais vaisto formos. Siekiant išvengti galimos pakartotinės infekcijos, tuo pat metu reikia mediciniškai tirti ir partnerį. Ligai pasireiškus pirmą kartą arba jeigu liga pasireiškė dažniau nei 4 kartus per paskutinius 12 mėnesių vaisto galima vartoti tik gydytoju nurodžius ir jį pritrūžinti. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024-01-15

5<sup>99</sup> €

## NEURORUBINE FORTE LACTAB, 20 pėvele dengtų tablečių

### VAISTINIS PREPARATAS

**Neurorubine Forte Lactab pėvele dengtos tabletės.** Kiekvienoje pėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg tiamino nitrato (vitamino B1), 50 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6), 1 mg cianokobalmino (vitamino B12). **Indikacijos.** Dėl B grupės vitaminų stokos atsiradusių nervų sistemos ligų gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Per parą reikia išgerti 1-2 tabletes. Vartoti per laim. Vėliausia po 4 savaitų būtina vėrtingi paciento būklė ir persvarstyti, ar nereikia mažinti dozes. Vartojant vitaminų preparatus rekomenduojami dietinis, vartojimo trukmės nėra nustatyta. Jeigu simptomai nepašalinami, reikia kreiptis gydytoja, kad jis patvirtintų kitą gydymą. Didelės rizikos pacientų grupių neįdoma. **Ypač populiarūs:** Saugumas ir veiksmingumas vaikams dar neišbirtas. Duomenų nėra. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliąjui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei sergant žvyneline. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pindoksinas gali sukelti parastajai akme, į ją panašią egzantemą arba šias ligas sukurti. Gydymo metu, dėl atsiradusio jautrumo vitaminams B1, B6 ir B12, gali pasireikšti odos reakcijos. Retais atvejais, vitamino B6 vartojant ilgai ir didelės dozės (daugiau kaip 200 mg per dieną), gali atsirasti trumpalaikė periferinė jutiminė neuropatija. Vitamino B12 preparatai gali pasilęgti fukimilinės miežios ir piktybinės anemijos simptomus ir jų metu atsiradusių laboratorinių tyrimų duomenis. Psoriaze sergantiems žmonėms vitamino B12 vartoti negalima. **Reklamos teksto parengimo data:** 2023 balandis. NEUR-LT-00006. **PALIKITE SKAUSMĄ UŽ NUGAROS!**

### ŠANARIAMS

9<sup>99</sup> €

## GLUCOSAMIN-RATIOPHARM

1,5 g miltelių geriamajam tirpalui, 20 pakelių

### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Viename pakelyje yra 1,5 g gliukozamino sulfato. Tai atitinka 1,884 g gliukozamino sulfato natrio chlorido arba 1,178 g gliukozamino. **Indikacijos.** Lengvo ar vidutinio sunkumo kelio osteoartrito sukeltų simptomų lengvinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Pakelėlio turinį iširpinti stiklinėje vandens ir gerti vieną kartą per parą. Gliukozaminas netinka vartoti ūminio sunkumo simptominiui. Simptomų palengvėjimas (ypač skausmo) gali pasireikšti tik po kelių savaičių, kartais ir dar ilgesniu, vartojimo. Jei simptomai nepalengvėja po 2-3 mėnesių vartojimo, reikia iš naujo spręsti, ar gydymą gliukozaminu tęsti toliau. Miltelius galima vartoti tiek valgio metu, tiek nevalgant. Gliukozaminą negalima vartoti jaunesniems kaip 16 metų vaikams ir paauguliams. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas gliukozaminui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Gliukosamin-ratiopharm negalima skirti ligoniams, alergiškiems kiauliotiesiems vežagviamis, nes iš jų išgaunama preparato veiklioji medžiaga. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei pacientui yra sutrikusi gliukozės tolerancija, prieš skiriant gydymą ir vėliau periodiškai rekomenduojama stebėti gliukozės kiekį kraujyje ir, jei reikia, insulino poreikį. Jei pacientai turi širdies ir kraujagyslių ligų rizikos faktorių, rekomenduojama stebėti lipidų kiekį kraujyje, nes vartojantiems gliukozaminą ligoniams buvo nustatyti lėti hipercholesterolemijos atvejai. Būvo aprašytas atvejis, kai pradėjus gliukozaminą terapiją, pablogėjo astmos simptomai. Gliukozaminą negalima vartoti jaunesniems kaip 16 metų vaikams ir paauguliams, nes neišbirtas vartojimo saugumas ir veiksmingumas. Atsargumas reikalingas, jei pacientai yra fenilketonurijai. Šio vaistinio preparato pakelyje yra 151 mg natrio, tai atitinka 8 % diidžiausios P50 rekomenduojamos paros normos suaugusiems, kuri yra 2 g natrio. Dėl sudėtyje esančio sorbitolio šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems yra įgimtas fruktozės netoleravimas. Taip pat sorbitolis gali paveikti kitų kartų vartojimų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį prieinamumą. **Reklamos teksto parengimo data:** 2023 02 27. GLR-LT-00003 **JUDEJIMUI BE SKAUSMO!**

### VYRŲ IR MOTERŲ PLAUKŲ SLINKIMO GYDYMU

NUO 22<sup>99</sup> €

## MINOXIDIL INTELI

MINOXIDIL INTELI 2 % odos tirpalas 60 ml 22<sup>99</sup> €

MINOXIDIL INTELI 5 % odos tirpalas 60 ml 26<sup>99</sup> €

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI.** MINOXIDIL INTELI veikioji medžiaga minoksidilis. MINOXIDIL INTELI 5 % odos tirpalas vartojamas gydyti vidutinio stiprumo vyrų nuplikimą, susijusį su hormonais. Gydymas šiuo tirpalu rekomenduojamas pacientams po nesekmingo 4 mėnesių gydymo MINOXIDIL INTELI 2 % odos tirpalu. **KAIP VARTOTI MINOXIDIL INTELI:** MINOXIDIL INTELI 2 % ar MINOXIDIL INTELI 5 % odos tirpalą visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. **Dozavimas:** MINOXIDIL INTELI 2 % odos tirpalas ar MINOXIDIL INTELI 5 % odos tirpalą reikia tepti ant pažeistos galvos odos po 1 ml (10 puorškiolio paspaudimu) kas 12 valandų. Nesvarbu, koks alopecijos plotas, rekomenduojama dienos dozė visada tokia pati. Maksimali dienos dozė yra 2 ml (20 paspaudimų). **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas minoksidiliui arba bet kuriai pagalbinei MINOXIDIL INTELI medžiagai. Dėl galimo kitų kūno vietų plaukautumo padidėjimo, MINOXIDIL INTELI 5 % moterims vartoti negalima. MINOXIDIL INTELI 5 % odos tirpalą draudžiama vartoti jaunesniems kaip 18 ir vyresniems kaip 65 metų asmenims. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Pacientams su galvos odos dermatoze preparatas gali rezerbuotis po oda. Prieš pradėdami vartoti MINOXIDIL INTELI 5 % reikėtų pasitikrinti sveikatą. Dėl preparato esančio propilenglikolio poveikio gali atsirasti sudirginimas ir kontaktinis dermatitas. Pacientams, kurie sergo širdies ir kraujagyslių ligomis, MINOXIDIL INTELI reikia vartoti ypač atsargiai dėl galimo sisteminio preparato poveikio. Vartojant MINOXIDIL INTELI reikia saugotis, kad preparato nepatektų akis. Jei preparato atsitiktinai patenka ant jautrių vietų, reikia kruopščiai nuplauti dideliu vandens kiekiu. **Reklamos teksto parengimo data:** 2021 05 20. **MINOXIDIL INTELI ... IR PLAGUKI SUGRŽITA...**

-30%



## BIODERMA

### KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Prancūzijos dermatologijos laboratorija „Bioderma“ vadovaujasi požiūriu, kad odos priežiūros priemonės turi padėti atkurti natūralius biologinius procesus, šalinamos odos problemų kilmės priežastis bei simptomus. Priežiūros priemonės „Bioderma“ kuriamos tik iš grynų veikliųjų medžiagų, atliekančių svarbų vaidmenį odos veikloje. Dermatologai, pediatrai, vaistininkai – visi šie specialistai rekomenduoja „Bioderma“ net ir jautriausią odą turintiems pacientams.

### BIOLGIJOS MOKSLAS DERMATOLOGIJAI.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtos prekės.

7<sup>97</sup> €

## TONSILGON® N

Tonsilgon® N, 50 dengtų tablečių

Tonsilgon® N geriamieji lašai, tirpalas 50 ml

### NERECEPTINIAI AUGALINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Terapinės indikacijos.** Tradicinis augalinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas dažnai pasikartojantiems viršutinių kvėpavimo takų uždegimams, ypač tonzilių uždegimui gydyti. **Veikliosios medžiagos ir stiprumas.** 1 dengtoje tabletėje yra šių veikliųjų medžiagų miltelių: 8 mg silviraziolių šaknų, 4 mg ažuolių žievės, 6 mg ramunėlių žiedų, 4 mg kiaulpienių žolės, 10 mg asiūklių žolės, 4 mg kraujazolių žolės, 12 mg rėšutmedžių lapų, 1 g tirpalo yra 290 mg skysto ekstrakto, pagaminto iš: 4 mg silviraziolių šaknų, 3 ramunėlių žolės, 5 mg asiūklių žolės, 4 mg rėšutmedžių lapų, 4 mg kraujazolių žolės, 2 mg ažuolių žievės, 4 mg kiaulpienių žolės. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Vartoti per burną. Ūmišs ligos simptomai: suaugusiems ir paauguliams nuo 12 metų – po 25 lašus arba po 2 tabletes 5-6 kartus per dieną. Vaikams 6-11 metų – po 15 lašų arba po 1 tablete 5-6 kartus per dieną, 2-5 metų – po 10 lašų 5-6 kartus per dieną. Ūmišs ligos simptomams sumažėjus: suaugusiems ir paauguliams nuo 12 metų – po 25 lašus arba 2 tabletes 3 kartus per dieną. Vaikams 6-11 metų – po 15 lašų arba 1 tablete 3 kartus per dieną, 2-5 metų – po 10 lašų 3 kartus per dieną. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliąjui arba kitoms preparato sudedamosioms dalims. Jei žinoma, kad alergija gali sukelti graižžiedžių šeimos augalai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei simptomai nepašalinami ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Geriamuosiuose lašuose yra 19 tūrio procentų alkoholio, todėl žalinga alkoholizmu sergantiems žmonėms. Sveikata su kitais vaistais preparatas šio metu nėra žinoma. **Šalutinis poveikis.** Skrandžio ir žarnyno sutrikimai yra nežadži. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024 04 17

### NUO RĖMENS

2<sup>99</sup> €

## OMEPRAZOLE INTELI

20 mg, 14 skrandyje neiurių kietųjų kapsulių

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS.** Omeprazole Inteli sudėtyje yra aktyvios medžiagos omeprazole. Omeprazole Inteli mažina rūgšties kiekį Jūsų skrandyje. Vaistas vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refluksu simptomų (rėmens ir rūgšties atpylimo) gydymui. Omeprazole Inteli vartoti negalima jeigu Jūs esate alergiškas omeprazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (nurodyta informaciniame lapelyje); jeigu Jūs esate alergiškas kitiems vaistams, priklausantiems protonų siurblio inhibitorių grupei (pvz., pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, ezomeprazolui); jeigu Jūs vartojate vaisto, kurio sudėtyje yra neflinaviro (vartojamo nuo ŽIV infekcijos). Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pastariktis su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Omeprazole Inteli. Ypač jei vartojate informaciniame lapelyje išvardytų vaistų. Nėštumas ir žindymo laikotarpis. Prieš vartodama Omeprazole Inteli, pasakykite savo gydytojui, jog esate nėščia ar ketinate pastoti. Tokiu atveju vartojimas nusprendus, ar šiuo laiku Jums galima vartoti Omeprazole Inteli. Kaip vartoti Omeprazole Inteli. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Rekomenduojama dozė yra viena 20 mg kapsulė vieną kartą per parą kol išnyksta simptomai, bet ne ilgiau kaip 14 parų. Kad sumažėtų simptomai, gali tekti kapsulių vartoti 2-3 paros iš eilės. Jei po 14 parų laikotarpio simptomai neišnyksta, kreipkitės į savo gydytoją. Galimas šalutinis poveikis. Šis vaistas, kaip ir kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Nedėsidami nutraukti Omeprazole Inteli vartojimą ir kreipkitės į gydytoją, jeigu pastebite kurį nors iš šio reto, bet sunkaus šalutinio poveikio atveju: staiga prasidėjęs švokštimas, lūpių, liežuvių, gerklų ar kūno tinimas, išbėrimas, alpimas ar sutrikio rijimas (sunki alerginė reakcija); paraudo, tapo pūslėta ir lupasi oda. Taip pat gali atsirasti lūpių, akių, burnos ertmės, nosies, lytinių organų pūslėtumas ar kraujavimas (tai gali būti Stevens-Johnson sindromas arba toksinė epidermolizė); pagelto oda, patamsėjo šlapimas ir atsirado nuovargis (šie simptomai gali rodyti sutrikusią kepenų funkciją). Ši informacija paskutinį kartą peržiūrėta 2023.01.02.



# GAMINAME VAISTUS PAGAL INDIVIDUALIUS RECEPTUS

- Atneškite gydytojo receptą iki 13 val.
- Atsiimkite pagamintą vaistą kitą darbo dieną.



IKI **-45%****AMBIO**GUDOBELĖ SU MAGNIU, 30 kapsulių **8<sup>99</sup> 5<sup>99</sup> € -40 %**ŠIRDŽIAI, 100ml **4<sup>99</sup> 2<sup>81</sup> € -40 %**OMEGA-3 ŠIRDŽIAI, 60 kapsulių **16<sup>28</sup> 8<sup>95</sup> € -45 %**

MAISTO PAPILDAI

IKI **-40%****VITADAY**VITADAY KOMPLEKSAS ŠIRDŽIAI SU GUDOBELE IR KOFERMENTU Q10, 50 tablečių **7<sup>99</sup> 4<sup>79</sup> € -40 %**VITADAY KORVALOLIS SKYSTIS, 25ml **4<sup>99</sup> 3<sup>24</sup> € -35 %**

MAISTO PAPILDAI

**KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIAI, INHALIATORIAI, TERMOMETRAI**IKI **-50%****OMRON KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIAI, INHALIATORIAI, TERMOMETRAI BEI SKAUSMO MALŠINIMO PRIETAISAS**

Japonų prekių ženklui „Omron“ aparatai tiksliai išmatuos jūsų kraujospūdį, kūno temperatūrą, inhaliatoriai palengvins kvėpavimą, o skausmo malšinimo prietaisai sumažins bei palengvins raumenų ir sąnarių skausmą.

**„OMRON“ - PATIKIMAS SVEIKATOS PARTNERIS!**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtais prekėmis.

IKI **-30%****CARDIOACE**Cardioace, 30 tablečių **24<sup>99</sup> 17<sup>49</sup> € -30 %**Cardioace Plus, 60 kapsulių **40<sup>99</sup> 32<sup>39</sup> € -20 %**

MAISTO PAPILDAI

CARDIOACE – sinerginio veikimo kompleksas, kuriame derinamos naudingosios česnakų ekstrakto savybės su vitaminais, mineralais bei antioksidantais. Sudėtyje yra medžiagų normaliai širdies veiklai (vitaminas B1, EPR, DHR), kraujotakai (česnakai), ląstelių apsaugai nuo oksidacinio pažeidimo (varis, selenas, vitaminas C E).

CARDIOACE PLUS – sudėtis papildyta net 1300 mg veiksmingųjų augalinių sterolių normaliai cholesterolio koncentracijai ir patentuotu Cardiol kompleksu.

\*Teigiamas poveikis jaučiamas suvartojant per parą ne mažiau 0,8 g augalinių sterolių

**„CARDIOACE“ – KIEKVIENAM ŠIRDIES DŪŽIUI!****NUO SPAZMINIO SKAUSMO**NUO **4<sup>99</sup> €****NO-SPA 40 MG**, 24 tabletės **4<sup>99</sup> €****NO-SPA 40 MG**, 24 plėvele dengtos tabletės **5<sup>99</sup> €**

(Drotaverino hidrochloridas)

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS****Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 tableteje ir plėvele dengtoje yra 40 mg drotaverino hidrochlorido. **Indikacijos:** lygiųjų raumenų spazmų, susijusių su tulžies latakų ligomis (tulžies pūslės ir (arba) latakų akmenlige, tulžies pūslės ir (arba) šalia jos esančių audinių, tulžies latakų ar didžiojo dvilypkapištes žarnos spenelio uždegimas), šalinimui. Inkstų ir (arba) šlapimtakio akmenligės, inkstų geldelių ar šlapimo pūslės uždegimo sukkelto šlapimo takų lygiųjų raumenų spazmo šalinimui, mėšlungiško noro šlapintis slopinimui. **Kaip pagalbinis gydymas** šalinant skrandžio ir žarnyno lygiųjų raumenų spazmus, jei yra skrandžio ir dvilypkapištes žarnos opa, skrandžio, plonosios ar storosios žarnos uždegimas, įskrandžio ir prievartio spazmas bei esant skausmingoms mėnesinėms. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** reikia vartoti po 1-2 tabletes 1-3 kartus per parą, įprastinė suaugusio žmogaus paros dozė yra 3-6 tabletes.**Kontraindikacijos:** alergija drotaverinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Sunkus kepenų, inkstų ir širdies nepakankamumas. Negalima vartoti jaunesniams kaip 1 m. vaikams. **Specialūs spėjimai:** vaikams ir paaugliams iki 18 metų vartoti NO-SPA nerekomenduojama. Jei kraujospūdis mažas, vaistą reikia vartoti labai atsargiai. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Drotaverino vartojant su levodopa, mažėja pastarojo vaisto poveikis parkinsonizmui, todėl stiprėja drebulys ir raumenų stingsulys. **Teksto parengimo data:** 2022 m. sausio mėn. Z201\_SB\_NO-SPA\_VOZ\_LT**PILVO SKAUSMAS? NUMALŠINK JI GREITAI.**NUO **4<sup>99</sup> €****DICLAC**Diclac 1% gelis, 50 g **4<sup>99</sup> €**Diclac 5% gelis, 50 g **6<sup>99</sup> €**Diclac 5% gelis, 100g **10<sup>99</sup> €**Diclac 5% gelis, 150g **14<sup>99</sup> €****NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI****Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 g „Diclac“ 5% gelio yra 50 mg, 1 g „Diclac“ 1% gelio yra 10 mg diklofenako natrio druskos. **Terapinis indikacijos:** lokaliu skausmui malšinti, uždegimui slopinti ir patinimui mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** ploną „Diclac“ 5% gelio sluoksnį tepti 2 kartus per dieną, „Diclac“ 1% gely tepti 3-4 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** jautrumas diklofenakui ar pagalbinėms medžiagoms, jaunesni kaip 14 m. vaikai, 3 paskutiniai nėštumo mėnesiai. Specialūs spėjimai: negalima tepti burnos, nuryti. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lituanian@sandoz.com. BS2403135891. Teksto patvirtinimo data 2024-03-13.**STIPRUS ATKIRTIS SKAUSMUI!**



# LAIMĖS VALANDOS

Darbo dienomis ir šeštadieniais  
**8-9 val. ir 14-15 val.\***

Sekmadieniais  
**14-15 val.\***



**-30%**

Perkant 3\*\*  
ir daugiau  
prekių

**-25%**

Perkant  
2\* prekes

**-20%**

Perkant  
1 prekę

\*\*nereceptiniams vaistams -25%  
receptiniams vaistams -20%

\* vaistams -20%

Nuo 2023 m. spalio 23 d. NORFOS vaistinėje akcijos LAIMĖS VALANDOS metu perkant 1 prekę taikoma 20 % nuolaida, perkant 2 prekes – 25 % nuolaida, vaistams – 20 % nuolaida, o įsigyjant 3 ir daugiau prekių – 30 % nuolaida, nereceptiniams vaistams – 25 %, receptiniams – 20 % nuolaida.

Taikomos momentinės 20 % dydžio nuolaidos receptiniams vaistams, 20 ar 25 % nuolaidos nereceptiniams vaistams ir vaistiniams preparatams, o kitoms prekėms – 20, 25 arba 30 % nuolaidos, atsižvelgiant į atitinkamo pirkimo metu įsigyjamų prekių bendrą kiekį. Nuolaida taikoma perkant pilnas prekių pakuotes, kurių kiekvienos vertė arba priemoka ne mažesnė nei 1,50 euro. Prekės, perkamos su kompensuojamuoju receptu, įskaičiuojamos į įsigyjamų (perkamų) prekių krepšelį (kiekį), tačiau joms nuolaida netaikoma.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaidos netaikomos perkant su kompensuojamuoju receptu, mokant už skiepus, taip pat pradinio maitinimo pieno mišiniams, kartiniams (gaminamiems vaistinėje) ir vardiniam vaistams, įsigyjant dovanų kuponus, pakavimo maišelius. Nuolaidos netaikomos perkant [www.gintarine.lt](http://www.gintarine.lt), net jei už prekes atsiskaitoma jas atsiimant vaistinėse. Nuolaidos netaikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Visos nuolaidos galioja tik su PC NORFA lojalumo kortele.

Informaciją apie kitu nei nurodyta laiku vykstančias LAIMĖS VALANDAS rasite [www.nvaistine.lt](http://www.nvaistine.lt). Informacija apie kitas akcijas ir prekes, kurioms netaikomos akcijos LAIMĖS VALANDOS nuolaidos, suteikiama kiekvienoje vaistinėje, el. paštu [info@nvaistine.lt](mailto:info@nvaistine.lt) arba nemokamu tel. 8 800 10008.

**NVAISTINĖ**  
VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS



-30%



## GASTROVAL

GASTROVAL, 15 kapsulių 4<sup>85</sup> 3<sup>40</sup> €  
 GASTROVAL FLUXUS rūgštingumui, 15 kapsulių 6<sup>05</sup> 4<sup>24</sup> €  
 GASTROVAL FORTE, 12 kapsulių 5<sup>99</sup> 4<sup>19</sup> €  
 GASTROVAL HEPAR FORMULA, 30 kapsulių 9<sup>88</sup> 6<sup>92</sup> €

## MAISTO PAPILDAS

**GASTROVAL – jau 11 metų populiariausias\* maisto papildas virškinimui Lietuvoje.** Sudėtyje net 7 augalinių fermentų ir ekstraktų derinys, kurio naudą lengva pajusti. **GASTROVAL FORTE** – stipresnis net 7 augalinių kilmės fermentų ir augalinių ekstraktų derinys virškinimui. Sudėtyje padidintas kiekis fermentų – kai reikia stipresnės pagalbos. **GASTROVAL FLUXUS** – inovacija su DGL saldymedžiu. Išmaniakio skrandžio rūgštingumo pusiausvyrą dėka planda sudėties: augalų sėklų ir šaknų ekstraktai, magnis, virškinimo fermentai, bifido bei lakto bakterijos, inulinas. **GASTROVAL HEPAR FORMULA** – tik 1 kapsulė per dieną! Gerensio pasivsinimo augalinė formulė – rimtesnė kepenų apsauga nuo oksidacinės pažaidos, kepenų ląstelių regeneracija, organizmo valymo funkcija, normalaus cholesterolio lygio palaikymas. **GASTROVAL** – suprantu, ko reikia virškinimui skrandžio rūgštingumui, kepenų veiklai.

## GASTROVAL – SUPRANTA, KO REIKIA VIRŠKINIMUI SKRANDŽIO RŪGŠTINGUMUI, KEPENŲ VEIKLAI.

Geltonasis genčionas tradiciškai vartojamas virškinimo palengvinti. Užrašų sėklų ekstraktas padeda palaikyti normalią skrandžio rūgštinę terpę. Dažnės ciberžolės padeda apsaugoti kepenis nuo oksidacinės pažaidos, palaikyti normalų cholesterolio lygį kraujyje.

\* - GASTROVAL yra populiariausias maisto papildas virškinimui Lietuvoje, remiantis SoftDent Pharma200M LT duomenų baze, 2011-2022 m. pardavimai didmeninėmis kainomis ir pakuočėmis.

## - NUO PILVO PŪTIMO

NUO 2<sup>99</sup> €

## ESPUMISAN

ESPUMISAN, 40 mg, 25 minkštosios kapsulės 2<sup>99</sup> €  
 ESPUMISAN, 40 mg, 50 minkštųjų kapsulių 4<sup>99</sup> €

## NERCEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: 1 minkštųjų kapsulėje yra 40 mg simetikonu. Terapinės indikacijos: „Espumisan“ vartojamas ligų, kurių metu virškinimo trakte kaupiasi dujos (meteorizmas), bėna pilvo pūtimas, pilnumo pojūtis, simptomams gydyti, prieš pilvo ertmės organų tyrimus, pvz., rentgenu, ultragarsu. „Espumisan“ skirtas vaikams nuo 6 metų, paauguliams ir suaugusiems. Kontraindikacijos: „Espumisan“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija veikliajai medžiagai, dažniukui saulėlydžio joniui (CFE (E170)), konservantui metililparahidroksibenzoatui (E218) arba bet kuriai pagalbiniui šio vaisto medžiagai. Įspėjimai ir atsargumo priemonės: pastarąsias su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Espumisan“. Jei šie virškinimo veiklos sutrikimai atsiranda ar jie trunka ilgai, reikia pasitarti su gydytoju. Jis nustatys, ar nėra ligų, kurias reikia gydyti kitais būdais. Dozavimas: kai dėl suaugusiųjų dujų sutrikimo virškinimo trakto veikla, paauguliams, suaugusiems ir 6-14 m. amžiaus vaikams rekomenduojama skirti vartoti po dvi „Espumisan“ 40 mg minkštąsias kapsules 3-4 kartus per parą. „Espumisan“ 40 mg minkštąsias kapsules galima gerti valgant arba po valgio, prireikus – ir prieš miegą. Vartojimo trukmė priklauso nuo ligos eigos. Prireikus „Espumisan“ 40 mg minkštąsias kapsules galima vartoti ilgai. Reniganti pacientus tyrimams rekomenduojama skirti po dvi „Espumisan“ 40 mg minkštąsias kapsules 3 kartus per parą 1 dieną prieš tyrimus ir dvi „Espumisan“ 40 mg minkštąsias kapsules tyrimo dienos ryte. UAB „BERLIN CHEMIE NEMARIN BALTIC“ J. Jasinio k. 16A, LT-03635 Vilnius, tel. +370 5 269 1947, LT@berlin-chemie.com  
 Reklamos paruošta 2023-12-11. Esp\_17\_2022\_VI\_17.ppt  
**JEI PILVE URAGANAS – JUMS PADES „ESPUMISANAS“!**

## - NUO RĖMENS

NUO 4<sup>99</sup> €

## ENTEROL®

ENTEROL®, 250 mg kietosios kapsulės, 10 kapsulių 7<sup>47</sup> €  
 ENTEROL®, 250 mg kietosios kapsulės, 20 kapsulių 11<sup>47</sup> €  
 ENTEROL®, 250 mg kietosios kapsulės, 30 kapsulių 14<sup>97</sup> €  
 ENTEROL®, 250 mg milteliai geriamajai suspensijai, 10 paketėlių 8<sup>47</sup> €  
 ENTEROL®, 250 mg milteliai geriamajai suspensijai, 20 paketėlių 11<sup>97</sup> €

Saccharomyces boulardii CNCM I-745.

## NERCEPTINIAI VAISTAI

Enterol vartojamas lėtinio viduriavimo pagalbiniams gydymui kartu su kitais vaistais nuo viduriavimo. Vartojimo būdas. Kapsules nuryti užgeriant gurkšniu vandens arba atidarytos kapsulės turinį supilti į nedidelį kiekį šaldinto gėrimo arba į maistą. Miltelius geriamajai suspensijai pakelkite turinį supilti į nedidelį kiekį vandens ar šaldinto gėrimo, sumaišyti ir gerti. Miltelius taip pat galima maišyti su maistu. Vaisto vartoti dar kelias paras, pasibaigus viduriavimo simptomams. Dozavimas. Suaugusiems ir vyresniems nei 2 metų amžiaus vaikams rekomenduojama dozė yra 1 kapsulė arba pakelėles vartojama viena arba du kartus per parą. **Specialūs įspėjimai.** Pastarąsias su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Enterol. Šis vaistas nepakeičia rehidracijos (normalaus organizmo skysčio tonio ir sudėties palaikymo), jei jos reikia. **Enterol vartoti negalima** jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbiniui šio vaisto medžiagai; jeigu yra alergija miltelių grybeliui, ypač Saccharomyces boulardii; jeigu nusilpusi imuninė sistema ar esate gydymas ligoninėje; jeigu įstaitytas centrinės venos kateteras; jeigu pacientas yra jaunesnis kaip 2 metų amžiaus vaikas. Reklamos parengimo data: 2023/10/15 ID 101956595

IKI -50%



**SALUTIL PREMIUM.**  
 30 tablečių 14<sup>99</sup> 8<sup>04</sup> € -30%

## MAISTO PAPILDAS

Salutil Premium 9 yra unikalus gyvybingųjų bakterijų, fruktoooligosacharidų ir vitamino D kompleksas, kurį sudaro 9 padermių mikroorganizmai. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir normalią kaulų ir dantų būklę. Tinkamas suaugusiems ir vaikams nuo 5 metų amžiaus.  
 Z306\_SB\_Salutil\_Premium\_V01\_LT

**SALUTIL, 10 kapsulių 10<sup>99</sup> 5<sup>20</sup> € -50%**

## MAISTO PAPILDAS

Sudėtyje yra pieno rūgšties ir bifido bakterijų bei Saccharomyces boulardii miltelių. Salutil maisto papildas tinka nešėdoms ir krūtimi maitinantioms moterims. Nereikia laikyti šaldytuve, tinka kelionėms. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. LT.Sal.70821

-30% 4<sup>19€</sup>

**SORBEX® 396 mg, 20 kapsulių**

## MAISTO PAPILDAS

1 kapsulėje – net 300 mg aktyviosios anglies.  
 Padeda sumažinti per didelį dujų kaupimąsi pavalgisus\*\*.  
 Aktyvintoji anglis „Sorbex“ išgaunama iš kokos riešutų kevalų.  
 Rekomenduojama paros norma – 1-3 kapsulės.  
 \*\* Išgamtas poveikis dujų kaupimuisi pasireiškia tada, kai j aktyviosios anglies suvartojama ne mažiau kaip 30 min. prieš valgį ir j aktyviosios anglies – įskaitant po valgio.

-20%



## REFLUXAID®

REFLUXAID® NIPIO, sirupas, 150 ml 10<sup>99</sup> 8<sup>63</sup> €  
 REFLUXAID®, sirupas, 250 ml 10<sup>99</sup> 8<sup>63</sup> €  
 REFLUXAID®, 12 tablečių 6<sup>49</sup> 5<sup>19</sup> €

## MEDICINOS PRIEMONĖS

„Refluxaid“ – inovatyvi medicinos priemonė, skirtas gastrozofaginio refliuks (GERL) bei ezofagito simptomams mažinti. Vartojant šį medicinos prietaisą, susilpnėja tokie simptomai kaip: deginimo pojūtis (rėmuo), atsiroginimas, pasunkėjęs rijimas (disfagija), skausmingas rijimas (odinofagija), kosulys, užkimimas. **Refluxaid Sirupo Vartojimas.** Prieš naudojimą supurtyti. Suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams rekomenduojama vartoti po 10-20 ml sirupo po valgio arba prieš miegą. Jaunesniems nei 12 metų vaikams rekomenduojama vartoti pusę dozės (5 – 10 ml) po valgio arba prieš miegą.

**Refluxaid Nipio Vartojimas.** Suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams rekomenduojama vartoti 1-2 tabletes po valgio ir / arba prieš miegą.

**Refluxaid Sirupo Vartojimas.** Prieš naudojimą supurtyti. Kūdikiams iki 5 kg svorio: rekomenduojama dozė yra 1 ml sirupo, praėjus 5-10 minutėms po maitinimo. Atsiradus vėmimui, rekomenduojama papildomai suvartoti 1 ml sirupo. Iki 3 metų amžiaus vaikams (6 – 15 kg svoris) rekomenduojama dozė yra 4 ml po valgio ir prieš miegą.

-40% 5<sup>09€</sup>

**AMARIN FORTE, 45 tablečių**

## MAISTO PAPILDAS

Rekomenduojamas suaugusiems, kurie linkę patirti nemalonius pykinimo simptomus kelionės metu. Maisto papildas „Amarin Forte“ sudėtyje yra tikrųjų imbiero šakniastiebių sausosio ekstrakto ir vitamino B<sub>6</sub>. Vartojamas: po 1 tablete 30 min. prieš kelionę.

-35%



**AMBIO**  
**VIRŠKINIMUI**, 20 tablečių ~~5<sup>95</sup>~~ 3<sup>43</sup> €  
**KOMPLEKSAS VIRŠKINIMUI SU GEROSIOMIS BAKTERIJOMIS**, 20 kapsulių ~~6<sup>95</sup>~~ 4<sup>54</sup> €  
 MAISTO PAPILDAI

IKI -40%



**AMBIO**  
**LAXATIVE COMPLEX**, 10 kapsulių ~~4<sup>95</sup>~~ 2<sup>72</sup> € -35 %  
**SKAIDULOS SU LACTO-BIFIDOBakterijomis**, 180 kapsulių ~~25<sup>95</sup>~~ 15<sup>59</sup> € -40 %  
 MAISTO PAPILDAI

ŽARNYNO MIKROFLORA!

-40%



**BIFOVAL®**  
 „Bifoval Forte“, 15 kietųjų kapsulių ~~8<sup>95</sup>~~ 5<sup>33</sup> €  
 „Bifoval Babe“, 25 kramtomosios tabletės ~~9<sup>95</sup>~~ 5<sup>54</sup> €  
 MAISTO PAPILDAI

Specialiai parinktos sudėties maisto papildai kiekvieno ryto ritualui 15-30 min prieš kiekvienus pusryčius.  
 „Bifoval Forte“ – 5 milijardai lacto- ir bifidobakterijų. Sudėtyje 3 bakterijų padėmės. Visai šeimai (vaikams nuo 5 metų).  
 „Bifoval Babe“ – braškių skonio kramtomos tabletės, kurių sudėtyje yra 4 rūšių Lacto ir Bifido bakterijų kompleksas (3,15 mlrd. 1 tableteje).  
 Vaikams nuo 3 metų.  
 Vartojant antibiotikus gerti 1 val. prieš arba po antibiotikų vartojimo.

-40% 5<sup>69</sup> €



**AMBIO LAKTO-BIFIDOBACTERIJOS SU INULINU**, 30 kapsulių  
 MAISTO PAPILDAS

-20% 0<sup>39</sup> €



**AKTYVINTA ANGLIS**, 10 tablečių  
 MAISTO PAPILDAS

-40% 3<sup>59</sup> €



**VITADAY KOMPLEKSAS KEPENIMS**, 30 kapsulių  
 MAISTO PAPILDAS

WAYA StopReflux®

STOP RĖMENIUI!

APSAUGO NUO REFLUKSO GREIČIAU NEI PER 3 MINUTES!

**3** minutes

Kovoja su refluksu

Apsaugo gleivinę

Malšina rėmenį



NAUJIENA

WAYA StopReflux®

For gastroesophageal reflux treatment  
 14 STICK PACKS (14 x 2.5g) (14 x 0.09oz)  
 LACTOSE FREE | GLUTEN FREE  
 MEDIS

IKI **-40%****AMBIO**Kalis ir magnis, 60 tablečių **11<sup>99</sup> 8<sup>11</sup> € -30 %**Kalis (milteliai geriamajam tirpalui ruošti), 15 pakelių **6<sup>99</sup> 3<sup>99</sup> € -40 %****MAISTO PILDALAI****PIC MATUOKLIAI / INHALIATORIAI / TERMOMETRAI**IKI **-35%****PIC SOLUTION****MEDICINOS PRIETAISAI**

„PIC Solution“ jau daugiau nei 50 metų yra vienas žinomiausių Italijos medicinos priemonių prekių ženklų.

Kiekvienas PIC sprendimas yra daugiau nei kraujospūžio matuoklis, inhaliatorius ar termometras. Tai paprastas būdas parodyti rūpestį ir paklausti „Kaip jautiesi?“. Savo laboratorijose kuriami pažangūs prietaisai, skirtus inhaliacijai, širdies darbu ir temperatūrai stebėti. Visi prietaisai turi 5 metų garantiją\* ir jų tikslumas patvirtintas klinikiniais tyrimais\*\*.

\* Išskyrus termometrus, matuokli „LiteRapid“, inhaliatorių „AirCube“.

\*\* Taikoma kraujospūžio matuokliams

**KIEKVIENA ŠIRDIS TURI SAVO RITMĄ!**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

**KOJŲ VENOMS**NUO **9<sup>99</sup> €****VENORUTON FORTE** 500 mg, 30 tablečių **9<sup>99</sup> €****VENORUTON** 1000 mg, 15 šnypščiančių tablečių **14<sup>99</sup> €**

O-(β-hidroksietil)-rutozidai

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** kiekvienoje Venoruton forte tablete yra 500 mg O-(β-hidroksietil)-rutozidų; kiekvienoje Venoruton šnypščioje tablete yra 1000 mg O-(β-hidroksietil)-rutozidų (HR). **Indikacijos:** lėtinio venų nepakankamumo simptomams (edemos, kojų nuovargio, sunkumo, skausmo, mėšlungio, parestezijos) lengvinti, hemorojus simptomams mažinti. Papildomai diabetinės retinopatijos (diabeto komplikacijos tinklainės kraujagyslių pažeidimo) ir limfos sąstojimo gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** Venoruton forte – 1 tablete 2 kartus per parą; Venoruton šnypščioje tabletės: 1 tablete – 1 kartą per parą. Venoruton nesikirta vartoti vaikams. Dozavimas, esant visoms indikacijoms, pateikiamas pakotės lapelyje arba www.vvkt.lt. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** negalima vartoti, jeigu yra kojų edema dėl širdies, inkstų arba kepenų ligių. Venoruton 1000 mg šnypščiojų tablečių sudėtyje yra kalio ir natrio. Reklamos teksto parengimo data 2023 balandžio mėn. Z304\_SB\_Venoruton\_V01\_LT

IKI **-35%****AMEDIPLUS**KRAUJOSPŪDŽIO MAT. AUTOM. ŽASTINIS DBP-1358 **64<sup>99</sup> 42<sup>22</sup> € -35 %**MANŽETĖ KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIUI, XL (22-42 cm) **15<sup>99</sup> 13<sup>59</sup> € -15 %**MANŽETĖ KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIUI, XXL (32-48 cm) **15<sup>99</sup> 13<sup>59</sup> € -15 %**KRAUJOSPŪDŽIO MAT. ADAPTERIS **10<sup>99</sup> 9<sup>34</sup> € -15 %****MEDICINOS PRIETAISAI**

-40%

**KALICORD 850 FORTE**, 30 kapsulių **10<sup>99</sup> 6<sup>29</sup> €****KRIOMEGA+**, 30 minkštųjų kapsulių **18<sup>99</sup> 11<sup>33</sup> €****MAISTO PILDALAI**

Norintems papildyti kalio atsargas organizme, rekomenduojama vartoti „Kalicord“, kurio sudėtyje yra net 307 mg kalio. Padeda palaikyti normalų kraujospūdį ir palaiko normalią raumenų veiklą. Žuvų taukai „KriOmega+“ yra iš kriūlių. Kriūliai yra laikomi vienu geriausių, veiksmingiausių ir prieinamiausių omega-3 riebiųjų rūgščių šaltinių. Sudėtyje esantis omega-3 fosfolipidai, gaunami iš vežlagyvių – kriūlių – ekstrakto, greičiau patenka į audinių ląsteles ir tolygiau pasiskirsto nei omega-3 trigliceridai, randami žuvų taukuose.

-20%

**FEROGLOBIN, FEROGLOBIN PLUS****MAISTO PILDALAI**

„Feroglobin“ – geležies, vitaminų ir mineralų kompleksas normaliai kraujodarai (foliatai), raudonųjų kraujo kūnelių gamybai (vitaminai B6, B12, geležis), hemoglobino susidarymui (geležis) palaikyti. „Feroglobin“ puikiai papildoma mitybą nešumo ir laktacijos laikotarpiu, vaikystėje ir paaugulystėje, sveikstant po ligos ar operacijos.

„Feroglobin Plus“ ne tik papildoma geležies atsargas, bet ir padeda mažinti pavargimo jausmą (vitaminai B6 ir B12), palaiko fizinę ir protinę energiją (sibirinis ženšenis).

**GELEŽIS, KURIAI NĖRA LYGIŲ!**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-40% **0 89€****VALIDOL**, 10 čiulpiamųjų tablečių**MAISTO PILDALAI**

Sudėtyje esantis vaistinių valerijonų ekstraktas padeda atsipalaiduoti bei palaikyti gerą psichologinę būseną. Vartojimas: Tablete reikia laikyti po liežuviu tol kol ji visiškai ištirps. Vartojama po 1 tablete 2-4 kartus per dieną.

**VALIDOL ACONITUM – JŪSŲ GERAI SAVIJAUTAI!**-40% **12 17€****CANTALIN® MICRO**, 64 tabletės**MAISTO PILDALAI**„CANTALIN micro“ papildoma kasdienė mitybą mikronizuotais flavonoidais diosminu ir hesperidinu. Kiekvienoje „CANTALIN micro“ tablete yra 500 mg mikronizuotų flavonoidų mišinio, sudedancio iš: 50 mg mikronizuoto hesperidino, 450 mg mikronizuoto diosmino. Diosminas ir hesperidinas – augalinės medžiagos, priklausancios bioflavonoidų grupei ir randamos daugiausia citrusiniuose vaisiuose. „CANTALIN micro“ sudėtyje esanti citrusinių vaisių bioflavonoidų frakcija yra mikronizuota (susmulkinama iki labai mažų dalelių), stiekiam pagerinti ir pagreinti šių medžiagų įsivainavimą žmogaus organizme. **Vartojimas:** suaugusiems geriti po 1-2 tabletes per parą. Tablete užgerti stikline vandens.

SAUSOMS, SUDIRGUSIOMS IR PAVARGUSIOMS AKIMS

NUO **13<sup>47</sup>** €



**BEPANTHEN® EYE**

BEPANTHEN® EYE akių lašai, 10 ml **15<sup>97</sup> 14<sup>97</sup>** €  
 BEPANTHEN® EYE akių lašai, 20 x 0,5 ml vienadozių talpyklių **13<sup>97</sup> 13<sup>47</sup>** €

**MEDICINOS PRIEMONĖS**

Bepanthen® Eye akių lašų sudėtyje yra 0,15 % natrio hialuronato ir 2 % deksantenolio. Bepanthen® Eye saugo ir drėkina akies paviršių ir padaro jį šlidiu. Tokiu būdu ilgam sumažėja diskomfortas, susijęs su mechaniniu stresu, stresu dėl aplinkos poveikio arba intensyvaus žiūrėjimo. Sudėtyje nėra konservantų, todėl šie lašai gerai toleruojami, net jei vartojami ilgą laiką. Jeigu yra alergija bet kuriai sudėtyje esančiam medžiagai arba akių uždegimas ar paraudimas, vartoti negalima. Akių lašų vartojimo metu kontaktinių lęšių išsimiti nereikia. Vienadozės akių lašų talpyklės skirtos tik vienkartiniam vartojimui. Bepanthen® Eye buteliukas yra ekonomiškas sprendimas: ypatinga akių lašų buteliuko technologija leidžia produktą suvartoti net per 12 mėnesių po jo atidarymo. Jei norite sužinoti daugiau, skaitykite pilną Bepanthen® Eye vartojimo instrukcija. Reklamos teksto parengimo data: 2023.12. CH-20231222-37

**PASALINKITE SAUSŲ AKIŲ SIMPTOMUS IŠ KARTO!**

**-25%**



**AKINIAI SKAITYMU!**

Vis daugiau skaitotame ne spausdinta teksta, o iš ekranu. Pristatome naujiene – skaitymo akiniai su Blue Control lęšiais. Ju privalumai:  
 • Apsaugo akis nuo kenksmingų mėlynos šviesos spindulių, kurią skleidžia skaitmeniniai prietaisai (šmaunūs telefonas; kompiuteris; planšetinis kompiuteris; televizorius; LED apšvietimas)  
 • Panaikina atspindžius tiek iš išorės, tiek iš vidinės lęšių pusės.  
 • Mažina akių nuovargį.  
 \*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

**-20%** **11<sup>98€</sup>**  
~~14<sup>7</sup>~~



**CATIONORM®** akių lašai, 10 ml

**MEDICINOS PREKĖ**

„Cationorm“ veikia kaip tikros ašaros. Sukuria unikalų apsauginę drėkinamąją ir gydymą terpe akies paviršių – unikali nanoemulsija. Dėl teigiamo elektrostatinio krūvio ilgai išlaikoma drėgmė akies paviršiuje. Atstato visus 3 ašarų sluoksnius. Ypač efektyviai mažina sausų akių simptomus, kurie pasireiškia tiek ryte, tiek vakare, taip pat kai ašaroja akys.  
 1. Apsaugo – atkuria pažeistą ašarų lipidų sluoksnį, sumažina ašarų išgaravimą, palaiko drėgmę.  
 2. Drėkina – atpratina medžiagomis visus 3 ašarų plevėles sluoksnius iki optimalaus ašarų kiekio ir balanso.  
 3. Ašarina gijimą.  
 Tinka naudoti su visų rūšių kontaktiniais lęšiais, 3 mėnesius nuo atidarymo.  
**BE KONSERVANTŲ!**

ALERGINIAM KONJUNKTYVITUI GYDYTI

**8<sup>99</sup>** €



**LECROLYN SINE, 10 ml**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**ANTIALERGINIS VAISTAS**

**BE KONSERVANTŲ,** todėl tinka naudoti su kontaktiniais lęšiais.  
 • **Skiriamas ir vaikams, ir suaugusiems.**  
 • Įrašyta dozė: po 1-2 lašus į abi akis 3 kartus per parą.  
 „Lecrolyn sine“ kiekviename mililitre yra 40 mg natrio kromoglikato ir pagalbinę medžiagų (glicerolis, dinatrio edetatas, polivinilo alkoholis, injekcinis vanduo). **Terapinės indikacijos:** suaugusiųjų ir vaikų alerginis konjunktyvitas. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** nerūstyta. „Lecrolyn sine“ galima vartoti nėštumo ir žindymo metu, nes sisteminis natrio kromoglikato poveikis vartojant vietiskai, akis yra nereikšmingas. **Specialios laikymo sąlygos:** laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Negalima užšaldyti. Pirmą kartą atidarius buteliuką, tinkamumo laikas – 8 savaites. **Informacinio teksto peržiūros data:** 2016 m. gruodžio 5 d.

**4<sup>49</sup>** €



**ACETERIN EXPRESS, 10 mg tabletės, 10 tablečių**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** vienoje tabletėje yra 10 mg cetrizino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės simptomams palengvinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vyresniems kaip 12 metų – po 1 tabletę per dieną, 6-12 metų vaikams – po pusę tabletės 2 k/d. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pagalbinei medžiagai, hidroksizolinui arba bet kuriam piperazino darinui. Pacientai, kuriems smarkiai sutrikusi inkstų funkcija. **Specialūs įspėjimai:** atsargiai vartoti sergantiems epilepsija ir pacientams, kuriems yra traukulių pavojus. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El.paštas: info.lt@hannia@sandoz.com. BS2403536092. Teksto patvirtinimo data: 2024 03 13.

NIEŽULIUI MALŠINTI

**6<sup>35</sup>** €



**FENISTIL 1 mg/g gelis, 30 g**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Dimetindeno maleatas. **Indikacijos.** Niežulio, susijusio su odos išberimu, dilgeline, vabzdžių įkandimu arba saulės ar kitokių priezastų sukeltu paviršiniu odos nudegimu, trumpalaikis malšinimas. **Vartojimas.** Pažeistą odą plota tepi 2-4 k./dieną. **Kontraindikacijos.** Alergija dimetindeno maleatui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai.** Jei niežulys labai sunkus arba odai labai pažeista, jei simptomai per 7 d. nepalengvėja, būtina kreiptis į gydytoją. Jei gelio tepamas didelis odos plotas, ilgai būti saulėje draudžiama. **Kūdikiams ir vaikams iki 2 m.** didelio odos ploto, ypač apimto uždegimo arba pažeisto, gelio tepi draudžiama. Nevartoti ant gleivinės. Sudėtyje yra propilenglikolio ir benzalkonio chlorido. Teksto parengimo data 2023.04. **NP-LT-FENI-23-0001**

NUO ALERGIJOS

**4<sup>49</sup>** €



**LORATADINE ACTAVIS 10 mg, 10 tablečių**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veiklioji medžiaga, stiprumas.** Kiekvienoje tabletėje yra 10 mg loratadino. **Terapinės indikacijos.** Simptominis alerginio rinito ir lėtinės idiopatinės dilgėlinės gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. vaikai: 10 mg 1 kartą per parą; 2-12 m. vaikai: svertiniais daugiau kaip 30 kg – 10 mg 1 kartą per parą. **Tabletes galima vartoti nepriklausomai nuo valgyimo laiko.** Pacientams, sergantiems sunkiu kepenų funkcijos nepakankamumu, skiriama pradine 10 mg dozė kas antrą dieną. **Kontraindikacijos.** Loratadino tablečių vartoti negalima, jeigu padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Loratadine Actavis“, jeigu yra sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas (tokiems pacientams gydymas gali skirti vartoti šio vaisto kas antrą dieną). Antihistamininiai vaistiniai preparatai gali susilpninti odos hiperergines reakcijas arba neleistų joms pasireikšti, todėl loratadino tablečių vartojimą reikėtų nutraukti mažiausiai įprastą 48 val. iki alerginio odos mėginio. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Reklamos peržiūros data:** 2024 m. balandis. OTC-LT-00036

ANTIALERGINIS VAISTAS

**4<sup>99</sup>** €



**OPEXA 20 MG, 10 tablečių**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Indikacijos:** Opexa vartojamas silpnėjusiems (kuriai būdingi simptomai yra čiaudulys, niežulys, sloga, užgulta nosis, paraudusios ir ašarojančios akys) ir kitų alerginio rinito formų simptomų slopinimui. Jis taip pat gali būti vartojamas nežinčių odos išberimų (odžių) arba dilgėlinės gydymui. **Kontraindikacijos:** Opexa vartoti draudžiama jeigu yra alergija bilastinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Pastarūkie su gydytoju arba vaistininku, jei jums nustatytas vidurinio sunkumo arba sunkus inkstų veiklos sutrikimas ir vartojate kitus vaistus. Neduoškite šio vaisto jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Nevisiškai rekomenduojamas dozės. Gydymo trukmė priklausau nuo jūsų ligos simptomų, trukmės ir eigos. Nevartokite Opexa ilgiau nei 10 dienų nepasikonsultavę su gydytoju. Jei po 3 dienų jūsų sąjauva nepagerėja arba net pablogėja, kreipkitės į gydytoją. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Rekomenduojama dozė suaugusiems, įskaitant senyvus žmones ir 12 metų bei vyresnius paauglius yra 1 tabletė (20 mg) per dieną. **Tabletė reikia nuryti nevalgius, viena valandą prieš valgį arba su kava gerinti** arba praėjus dviems valandoms po valgyimo arba su kava gerimo. Reklama paruošta 2023 m. gruodžio mėn. LT\_Ope\_22\_2023\_VI\_pharma UAB "Berlin Chemie Menarini Baltic". Įrašinio g. 16A, Vilnius LT-01616

**SUTRAMDYK ALERGIJĄ!**



**-35%** 4<sup>73€</sup>  
~~7€~~



**AMBIO VITAMINŲ B KOMPLEKSAS FORTE**, 30 tablečių  
MAISTO PAPILDAS

**NUO 5<sup>95</sup> €**



**LILANDOR 80 MG**, 14 minkštųjų kapsulių **5<sup>95</sup> €**  
**LILANDOR 80 MG**, 28 minkštųjų kapsulės **9<sup>95</sup> €**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Lilander 80 mg minkštiosios kapsulės, Lavandula angustifolia Miller, eterinis aliejus. Nereceptinis vaistinis preparatas. Lilander yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jeigu simptomai pablogėja šio vaisto vartojimo metu, pasitarkite su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, vartoti nerekomenduojama, nes levandulų aliejus sudėties medžiagos daugiausia šalinamos iš organizmo perdirbant jas kepenyse. Kiekvienoje šio vaisto minkštjoje kapsulėje yra apytikriai 12 mg sorbitolio. Dozavimas ir vartojimo metodas. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta pakuotės lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: viena minkštjoji kapsulė vieną kartą per parą. Minkštją kapsulę reikia nuryti nesukramtytą užsigeriant pakankamu skysčiu (geriausia stikline vandens). Jeigu simptomai išlieka po vaisto vartojimo dvi savaites, reikia kreiptis į gydytoją arba kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą. Tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. UAB "Berlin Chemie Menarini Baltic" J. Jasinskio g. 16A, Vilnius LT-03163 Paruošta 2023 m. gruodžio mėn. LT\_L1\_U21\_2023\_V1\_print  
**ATGAUK RAMYBĘ IR RAMŲ MIEGĄ**

**NERVŲ SISTEMAI, ENERGIJOS APYKAITĄ, NUOVARGIUI MAŽINTI, IMUNITETUI**

**1+1** Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



**BIOMAGNESIUM FORTE 500 MG**, 20 pakelių **14<sup>79</sup> €**  
**BIOMAGNESIUM 300 MG**, 30 pakelių **12<sup>39</sup> €**  
**BIOCA+K+MG+ZN SU VITAMINU D3**, 28 pakeliai **14<sup>49</sup> €**

**MAISTO PAPILDAI**

Maisto papildai milteliais geriamajam tirpalui ruošti. Išrinkite reikalingiausias: 300 mg ar net 500 mg gryno magnio. Magnis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą bei nuovargį. „bioCa+K+Mg+Zn su vitaminu D3“ - net 4 mineralų kompleksas: kalcis, kalis, magnis ir cinkas su vitaminu D. Kalcis ir magnis padeda palaikyti normalią kaulių ir dantų būklę. Cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, odos, plaukų ir nagų būklę. Produktų sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, be stabilizatorių. Magnis išgautas iš Nesyvoitos jūros. Pagaminta Izraelyje.  
**NEPRARASK MINERALŲ – NEPRARASK ENERGIJOS!**

**-40%** 7<sup>61€</sup>  
~~12<sup>69</sup>~~



**MEMORIL FORTE**, 30 kapsulių

**MAISTO PAPILDAS**

„Memoril forte“ – subalansuotas, 11 sudedamųjų dalių kompleksas atminčiai bei kraujotakai. Tinka tiems, kuriems sunku susikaupti bei nuolat ką nors pamiršantiems. Vienoje kapsulėje yra 80 mg ginkmedžių ekstrakto, kuris padeda palaikyti normalią atminties funkciją ir kraujotaką. Taip pat sudėtyje yra magnio, vitaminų B, C, E, seleno ir folio rūgšties, kuri padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną.

**-40%**



**B TOTAL + MAGNE** 60 kapsulių **12<sup>89</sup> 7<sup>55</sup> €**  
**B COMPLEX** 40 kapsulių **9<sup>48</sup> 5<sup>67</sup> €**  
**INOLAB ATSPARUMAS STRESUI**, 30 kapsulių **26<sup>09</sup> 15<sup>65</sup> €**

**MAISTO PAPILDAS**

„B total + magne“ sudėtis praturtinta ir magniu, kuris padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją bei normalią raumenų funkciją ir padeda mažinti nuovargį. Pakuotėje yra 2 mėnesių kursas. „B complex“ – tai įvairių, gerai subalansuotų B grupės vitaminų derinys tiems, kurie jaučia nervinę įtampą bei nuovargį. Mažinti nuovargį, palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą padeda vitaminai B2, B6, B12. Normalią odos būklę padeda palaikyti vitaminai B2, biotinas ir niacinas, o normalią plaukų būklę – biotinas. Normalią proteinę veiklą padeda palaikyti pantoteno rūgštis. „Inolab Atsparumas stresui“ – tai 8 veikliųjų medžiagų kompleksas nervų sistemai ir gerai nuotaikai. „Affron“ safrano ekstraktas padeda palaikyti psichinę sveikatą, teigiamą nuotaiką ir atsipalaiduoti. Vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

**NORMALIAI PERIFERINIŲ NERVŲ SISTEMOS VEIKLAI**

**-25%** 11<sup>32€</sup>  
~~15<sup>09</sup>~~ **NAUJIENA**



**PERIFERISAN**, 30 kapsulių

**MAISTO PAPILDAS**

Tiaminas, vitaminai B12, B6 ir magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vitaminai B12, B6 ir magnis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. Niacinas, vitaminai B6, B12 ir magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją. Vartoti po 1 kapsulę per dieną.



-40%



**MAGNIS + B<sub>6</sub> COMPLEX**, 30 kapsulių ~~11<sup>99</sup>~~ 7<sup>19</sup> €  
**MAGNIS + B<sub>6</sub> SUPERIOR**, 30 kapsulių ~~11<sup>99</sup>~~ 7<sup>18</sup> €

**MAISTO PAPILDAS**

**Magnis + B<sub>6</sub> complex** sudėtyje magnis yra magnio oksido pavidalu. O „Magnis + B<sub>6</sub> superior“ naudojama ypatinga magnio forma – divi magnio druskos (magnio oksidas ir magnio citratas), kurios organizme išlieka ilgiau, nes suyra skirtingu metu. Abiejų preparatų sudėtis papildyta ir vitaminu B<sub>6</sub>. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų ir nervų sistemos veiklą. Magnis ir vitaminas B<sub>6</sub> padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją bei mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

-50% 8<sup>49€</sup> ~~16<sup>99€</sup>~~



**AMBIO ATMINČIAI**, 30 tablečių  
**MAISTO PAPILDAS**

-20% 40<sup>39€</sup> ~~50<sup>99€</sup>~~



**NEUROZAN PLUS**, 56 tablečių/kapsulės

**MAISTO PAPILDAS**

**NEUROZAN PLUS** – dviguba pakuotė su omega-3 riebiosiomis rūgštimis.  
**PAMAITINK SAVO PROTĄ!**

-30% 7<sup>34€</sup> ~~10<sup>99€</sup>~~



**AMBIO GINKMEDŽIO EKSTRAKTAS 150MG**, 30 tablečių  
**MAISTO PAPILDAS**

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ! 29<sup>99€</sup>



**NEUROZAN**, 30 tablečių

**MAISTO PAPILDAS**

**NEUROZAN** – platus ir subalansuotas kompleksas normaliai protinei (pantoteno rūgštis) ir nervų sistemos (jodas, magnis, ir kt.) veiklai palaikyti. Vitamini B1, B3 ir kt., palaiko normalią psichologinę būklę, o geležis ir cinkas – pažinimo funkciją. Sudėtis papildyta ginkmedžių ekstraktu ir kofermentu Q10.  
**PAMAITINK SAVO PROTĄ!**

-35%



**AMBIO PATIRIANTIEMS ĮTAMPA**, 15 kramtomųjų tablečių ~~5<sup>99</sup>~~ 3<sup>89</sup> €  
**GERAM POILSIUI**, 30 kapsulių ~~9<sup>99</sup>~~ 5<sup>93</sup> €  
**NERVŲ SISTEMAI** (mikstūra), 100ml ~~7<sup>99</sup>~~ 4<sup>86</sup> €  
**MAISTO PAPILDAS**

-40%



**ACOSEDUM+**, 50 ml ~~7<sup>99</sup>~~ 4<sup>39</sup> €

**MAISTO PAPILDAS**

**„Acosedum“** – skystas maisto papildas vandens pagrindu (be etanolio) jautriai nervų sistemai. Sudėtyje esantis vaistinio valerijono ekstraktas padeda palaikyti normalią psichologinę būseną bei atsparumą stresui. Normalią miego kokybę padeda palaikyti vaistinių ramunėlių ir tikrųjų levandų žiedų ekstraktai, o nervų sistemos veiklą – vitaminas B<sub>6</sub>. Tinka ir vaikams nuo 3 metų. Vartojimas: 3-6 metų vaikams po 5 lašus, 6-12 metų vaikams po 10 lašų, nuo 12 metų ir suaugusiems po 20 lašų 2 kartus per dieną.

**TRIPTAN FORTE**, 30 kapsulių ~~16<sup>99</sup>~~ 10<sup>07</sup> €

**MAISTO PAPILDAS**

**„Triptan forte“** sudėtyje esantis 5-hidroksitriptofanas (5-HTP) yra natūrali medžiaga, gaunama iš Afrikoje augančių augalų – *Griffonia simplicifolia* – sėklų, kuri kartu su vitaminu B<sub>6</sub> reikalinga serotonino – geros nuotaikos hormono – gamybai. Serotonino išsiskyrimas suteikia gerą nuotaiką ir energiją. Tai pat sudėtyje esantys vitaminai B1 ir B6 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą. Vitaminas B<sub>6</sub> padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.  
**TAI, KO REIKIA GYVENIMUI BE STRESO!**

-35% 3<sup>89€</sup> ~~5<sup>99€</sup>~~



**VALERIJONAS PLUS**, 50 tablečių  
**MAISTO PAPILDAS**

IKI **-45%****AMBIO**

KALCIS, MAGNIS, CINKAS, 100 tablečių **15<sup>28</sup> 8<sup>40</sup> € -45 %**  
 OSTEO COMPLEX, 60 tablečių **11<sup>48</sup> 6<sup>89</sup> € -40 %**  
 MAISTO PAPILDAI

**-45%** 9<sup>83€</sup> ~~17<sup>60</sup>~~

**AMBIO SĄNARIAMS SU KOLAGENU**, 60 kapsulių  
 MAISTO PAPILDAS

**-50%****ARTHROSTOP PROENZI****MAISTO PAPILDAI**

Arthrostop proenzi maisto papildai sąnariams su gliukozaminu, chondroitinu, kolagenu, bosvelijos ekstraktu. Judėk laisvai!  
 NAUJIENA! Arthrostop proenzi collagen shots – unikali dviejų tipų kolageno, vitaminų ir mineralų kombinacija sąnariams. Net 11 000mg hidrolizuoto kolageno viename buteliuke!  
 Z305\_SB\_Proenzi\_V01\_LT

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

**-35%****UNIKALK****MAISTO PAPILDAI**

UNIKALK – daniški maisto papildai su kalciumu. Jūsų tvirtam kūnui! UNIKALK produktai gaminami Danijoje jų kokybę prižiūrint ir tikrinant farmacijos specialistams. UNIKALK maisto papildai padės papildyti organizmą kalciumu, magniumi, vitaminais D3 ir K2. Skirtingu sudėčių, formų bei skonių tabletes užtikrina platų kalcio maisto papildų pasirinkimą, pritaikytą individualiems poreikiams.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

**-40%** 7<sup>79€</sup> ~~12<sup>59</sup>~~**VITIRON D3 + OMEGA3 STRONG**, 60 kapsulių**MAISTO PAPILDAI**

„VitirON™ D3 + OMEGA3 STRONG“ yra didelė D3 vitamino dozė, paruošta linų sėmenų aliejaus pagrindu, o tai yra natūralios kilmės omega-3. Linų sėmenų aliejaus pagrindas skatina gerą D vitamino absorbciją ir biologinį įsisavinimą. Vitaminas D3 padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų ir dantų būklę bei normalią raumenų funkciją. Linų sėmenų aliejus yra natūralus omega-3 šaltinis.

**-30%****ARTILANE FORTE** skystis,  
15 vienadozių butelių **16<sup>99</sup> 11<sup>89</sup> €****MAISTO PAPILDAS**

Maisto papildas su saldikiiais  
 Maisto papildas sudėtyje yra fermentais hidrolizuotu ypač gryno kolagenu, gliukozamino ir chondroitino, hialurono rūgšties, magnio, cinko, pluoštinės bosvelijos (*Boswellia serrata*), antioksidantų: kofermento Q10, likopeno, kvercetino, vitamino C.

**ARTILANE CLASSIC** skystis,  
15 vienadozių butelių **11<sup>99</sup> 8<sup>39</sup> €****MAISTO PAPILDAS**

Maisto papildas su saldikiiais  
 Maisto papildas sudėtyje yra fermentais hidrolizuotu ypač gryno kolagenu, hialurono rūgšties, magnio, cinko, antioksidantų: kofermento Q10, likopeno, kvercetino, vitamino C.

Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

**-30%** 0<sup>97€</sup> ~~1<sup>39</sup>~~**KALCIO GLIUKONATAS 500 MG**, 10 tablečių**MAISTO PAPILDAS**

Kalcis padeda palaikyti normalią raumenų veiklą, reikalingas normaliai kaulų bei dantų būklei palaikyti.

**-30%** 8<sup>39€</sup> ~~11<sup>99</sup>~~**DOCTOR FISH OMEGA-3****+ VITAMINS D & E** 30 kapsulių**MAISTO PAPILDAS SU SALDIKIU**

Maisto papildas sudėtyje yra omega-3 riebalų rūgščių (EPR ir DHR) ir vitaminų D ir E.  
 EPR (eikozapentaeno rūgštis) ir DHR (dokozaheksaeno rūgštis) padeda palaikyti normalią širdies veiklą; DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją, išsaugoti normalų regėjimą; vitaminas D padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų, raumenų, dantų būklę; vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.  
 Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.



NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO

NUO **2<sup>49</sup>** €



**APAP**  
APAP, 500 mg, 12 plevėle dengtų tablečių **2<sup>49</sup> €**  
APAP, 500 mg, 24 plevėle dengtos tabletės **3<sup>99</sup> €**  
APAP, 250 mg granulės pakėtyje, vaikams, 10 pakėtylių **5<sup>99</sup> €**

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 pakėtylyje „APAP 250 mg“ yra 250 mg paracetamolio. 1 plevėle dengtoje tabletėje „APAP 500 mg“ yra 500 mg paracetamolio. Indikacijos: silpno ir vidutinio stiprumo skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Apap, 500 mg“ plevėle dengtos tabletės: suaugusiems ir vyresniams kaip 12 metų vaikams gerti po 1-2 tabletes kas 4-6 valandas, ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. „Apap, 250 mg“ granuliu pakėtylyje, skirtu vaikams, vienkartinė dozė yra nuo 10 iki 150 mg/kg kūno svorio vyresniems nei 4 m. vaikams, ją vartoti ne dažniau kaip kas 4 valandas (didžiausia paros dozė - 4 pakėtyliai). Granulės supilti tiesiai į burną ant liežuvio ir praryti neužgerus vandens. Kontraindikacijos: vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, inkštų ar kepenų veiklos nepakankamas. Specialūs įspėjimai: vartoti vartojant būtina pasitarti su gydytoju, jei yra: pažėstos kepenys ar inkstai, astma, gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka, hemolizinė anemija, vartojami kiti vaistai, skysčių netekimas, mitybos nepakankamumas, vartojamas alkoholis bei nūštumo ir žindymo laikotarpiai. Didėnes nei rekomenduojamas dozės sukėlia vidaus organų pažeidimus. Reklamos teksto parengimo data 2023-12-19.  
**„APAP“ - KIEKVIEKIOJE VAISTINĖLĖJE.**

SKAUSMO MALŠINIMUI

**3<sup>99</sup>** €



**NEOASKOFENAS 200 MG/200 MG/40 MG, 20 tablečių**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje tablečių yra 200 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg paracetamolio ir 40 mg kofeino. **Terapinės indikacijos:** Vaistas vartojamas silpno ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių ir menstruacinio skausmo malšinimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** Vartoti per burną, tabletes reikia vartoti nekramtant, užgeriant ne mažesniu kaip 250 ml vandens kiekiu. Priekšlaikmai nuo ligos sunkumo vartoti po 1 tablete 1-4 kartus per dieną. Didžiausia paros dozė - 4 tabletes. Negalima vaisto gerti dažniau kaip kas 6 valandas. Skausmui malšinti vaisto galima vartoti ne ilgiau kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, esanti ar buvusi virškinimo trakto opa ir (arba) kraujavimas iš virškinimo trakto, buvusi bronchų astma, kurią sukėlė salicilatai ar kitokie nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, pacientas jaunesnis negu 12 metų, tų spaskūnė nešūmo mensei, žindymas, ligos kuriu metu yra padidėjęs kraujavimo pavojus, kraujotekos sutrikimas, vartojama 15 mg ar didesni metotreksato savaitės dozė, sunkus širdies, kepenų, inkstų nepakankamumas, labai sunki podagra, padidėjęs nerivngumas, dirglumas, nervingas, baimė, sąjauidimas ar kiti panašūs simptomai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergama podagra, bronchų astma, kolagenozėmis ar kraujodės sistemos ligomis, susijęsuji skydliaukės veikla ar sergama cukriniu diabetu, yra virškinimo trakto, inkstų, kepenų ar širdies funkcijos sutrikimai, yra buvusi alergija kitoms nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, planuojama chirurginė operacija, pacientas jaunesnis kaip 16 metų ir serga virusinėmis ligomis, pacientas yra senyvas, planuojama pastoti, atsiranda šlapimo pakitimus, pasireiška patrinkimų ar skausmas juosmens srityje, pagelsta oda ar akys, pasireiškia bendras silpnumas, yra nerimo sutrikimas, nemiga. Sudėtyje esantis kofeinas gali sukelti drebulį, dažną širdies plakimą, viduriavimą, susjauidinimą, stiprų širdies plakimą, nemiga, galvos skausmą, raumenų trūkčiojimą ir šlapimo išskyrimo padidijimą. **Reklamos teksto parengimo data:** 2023-04-27

NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO

NUO **2<sup>75</sup>** €



**IBUPROM**  
IBUPROM, 200 mg, 10 dengtųjų tablečių **2<sup>75</sup> €**  
IBUPROM, 200 mg, 20 dengtųjų tablečių **4<sup>25</sup> €**  
IBUPROM, 400 mg, 10 plevėle dengtų tablečių **3<sup>25</sup> €**  
IBUPROM, 400 mg, 20 plevėle dengtų tablečių **4<sup>75</sup> €**

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg ir 200 mg. Indikacijos: skausmo (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Ibuproim, 400 mg“ suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 1 tablete 3 kartus per parą. „Ibuproim, 200 mg“: 6-9 m. vaikams (kūno svoris 20-29 kg) gerti po 1 tablete kas 6-8 val. (regeriti daugiau nei 3 tabletes per parą); 10-12 m. vaikams gerti po 1 tablete kas 6 val. (regeriti daugiau nei 4 tabletes per parą); suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams pradine doze yra 2 tabletes, po to galima gerti po 1-2 tabletes kas 4 val. (regeriti daugiau nei 6 tabletes per parą). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, tankinis kraujavimas, ūminis skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaliges stadija, anksčiau buvusi alergija acetilsalicilo rūgščiai ir kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, sergant sunkiu širdies nepakankamumu, esant trečiam nėštumo trimestru. Specialūs įspėjimai: vartoti nepatartina, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu, bronchų astma. Reklamos teksto parengimo data 2023-05-04.  
**YRA „IBUPROM“ - NĖRA SKAUSMO.**

SKAUSMO IR/BEI KARŠČIAVIMO MALŠINIMUI

**6<sup>99</sup>** €



**UPSARIN C 330 mg/200 mg, 20 šnyptčiųjų tablečių**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veikliosios medžiagos stiprumas: 330 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg askorbo rūgšties. Indikacijos: silpno arba vidutinio stiprumo skausmo malšinimas ir (arba) karščiavimo mažinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir 16 m. bei vyresniems paaugijams po 1-2 šnyptčiasias tabletes, ne dažniau kaip kas 4 val., ne daugiau kaip 9 tabletes per parą. Senyviems pacientams po 1-2 šnyptčiasias tabletes, bet ne daugiau kaip 6 tabletes per parą. Vartoti per burną. Prieš vartojimą išdrinti tablete stiklinėje vandens ir nedelsiant išgerkite. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija acetilsalicilo rūgščiai, askorbo rūgščiai, askorbo rūgšties, askorbo rūgšties ir askorbo rūgšties druginių druskų, jeigu gergate ar anksčiau sergote skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opalige, sunkia kepenų, inkstų ar širdies liga, paskūnė 4 nėštumo mėnesius, negalima vartoti daugiau kaip 100 mg per parą, jeigu inkstuose yra akmenų (negalima vartoti > 1 g vit C para). Negalima vartoti kartu su metotreksatu, jeigu metotreksato dozė viršija 20 mg per savaitę, arba jei acetilsalicilo rūgšties dozė yra priešūdegiminė (>1g vienkartinė ir (arba) >3g paros) arba analgetinė / antipiretinė (>500 mg vienkartinė ir <50 paros), kartu su genamaisiais antiokaguliantais, jeigu acetilsalicilo rūgšties dozė yra priešūdegiminė arba analgetinė / antipiretinė, nerekomenduojama vartoti karščiavimui mažinti ir virusinėms infekcijoms gydyti vaikams iki 16 metų. **Specialūs įspėjimai:** vartoti atsargiai jeigu ilgiau ir didesniu doze vartojant analgetikų skauda galva (tuomet galvos skausmas negalima malšinti dr didėnesiu jų dozeimis), anksčiau sergote skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, skrandžio uždegimu arba buvo kraujavimas iš virškinimo trakto, sutrikusi Jūsų inkstų, kepenų arba širdies veikla, mėnesinys yra gausios, kraujuoja iš gimdos ne mėnesiniu metu arba jeigu į gimdą įleista spiralė, esant G6PD trūkumui, sergate podagra arba anksčiau sergote šlapimo takų akmenlige, esate senyvo amžiaus arba Jums yra dehidratacija, jeigu Jūsų kūno svoris yra mažas. Nerekomenduojama vartoti sergant asma ir jei yra bėrimas (dilgėlinis), susijęs su nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo arba acetilsalicilo rūgštimi. Vartojimą reikia nutraukti vos pastebėjus odos išbėrimą, gleivinės žaizdų. Daugiau informacijos apie specialius įspėjimus ir vaistinio preparato charakteristikų santraukoje ar pakuoės lapelyje. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024.02.06. PM-11-2024-2-417

-50% ANTRAI TOČIAI PAČIAI



**AMEDIPLUS SKAUSMĄ MALŠINANTIS PLEISTRAS** 9 x 14 cm N10 **18<sup>99</sup> €**  
**MEDICINOS PRIEMONĖ**

40% **6<sup>29€</sup>** ~~10<sup>99</sup>~~



**AMEDIPLUS ACTIVE GEL ŠALDOMAS-ŠILDOMAS KŪNO GELIS**, 100ml  
**KOSMETIKOS PRIEMONĖ**

Pasiūlymai galioja **2024 05 01 - 2024 05 31**.

Leidinyje ir „Svytinioms akimirkoms“ priede nurodytos maisto papildų, kosmetikos, medicininės paskirties prekių ir medicinos prietaisų kainos fizinesė vaistinesė galioja su vaistinės lojalumo kortele, o vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujantioms prekėms. Nuolaidos taikomos prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą. Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinesė, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuoėes lapelį/informaciją ant išorinės pakuoėes ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsiranda šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškę šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [NepageidaujamaR@vkvtk.lt](mailto:NepageidaujamaR@vkvtk.lt) arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje [www.vkvtk.lt](http://www.vkvtk.lt).

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Daugiau informacijos NORFOS vaistinėje, tel. 8 800 10008, [www.nvaistine.lt](http://www.nvaistine.lt) MAŽYLIUI IR MAMAI skirtas prekes ypatingomis kainomis greičiau ir patogiau užsisakykite internetinėje vaistinėje [www.nvaistine.lt](http://www.nvaistine.lt). Užsisakius prekių (išskyrus vaistinius preparatus) už 28,96 € ir daugiau - pristatymas NEMOKAMSI! Reklaminio teksto parengimo data - 2024 04 18.





-35%

**AMBIO**BRONCHO COMPLEX, 20 tablečių 5<sup>96</sup> 3<sup>89</sup> €GERKLEI SU ISLANDINE KERPENA SIRUPAS, 150ml 8<sup>46</sup> 5<sup>51</sup> €

MAISTO PAPILDAI

NUO 6<sup>99</sup> €**BRONCHIPRET®**BRONCHIPRET®, 20 pūvelės dengtų tablečių 6<sup>99</sup> €BRONCHIPRET® TI, geriamasis tirpalas, 100 ml 7<sup>99</sup> €**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veikliosios medžiagos ir stiprumas:** 1 pūvelės dengtoje tabletėje yra 60 mg raktažolių šaknų sausosio ekstrakto ir 160 mg vaistinių čiobrelių žolės sausosio ekstrakto, 1 g tirpalo yra 150 mg vaistinių čiobrelių žolės skystojo ekstrakto, 15 mg gėbenių lapų skystojo ekstrakto. **Terapinės indikacijos:** augalinis vaistas uminio bronchito sukeltą drėgną kosulio priepuoliams retinti ir atskisėjimui gerinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Bronchipret“ tabletes suaugusiems gerti po 1 tabletę 3 kartus per parą; „Bronchipret“ TI – 1–5 m. amžiaus vaikams gerti po 3,2 ml, 6–11 m. amžiaus vaikams – po 4,3 ml, nuo 12 m. ir suaugusiems – po 5,4 ml 3 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas gėbeniams, raktažolėms, čiobreliams ar kitoms netolimių (lupazėdžių) Lamiaceae (Labiatae) šeimos augalams, beržams, kieciamams, salierams arba kitoms preparato sudedamosios dalims. **Specialūs įspėjimai:** jeigu simptomai išlieka ilgiau nei 1 savaitę arba jeigu prasideda dusulys, karščiavimas, o skrepliai tampa pūlingi arba juose atsiranda kraujo priemaišų, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Teksto parengimo data 2023-12-14.

**KOSULYS? BRONCHITAS? „BRONCHIPRET“!**

IKI -35%

**AMBIO**HOT HERBAL DRINK (milteliai karštam gėrimui), 10 paketėlių 9<sup>26</sup> 6<sup>03</sup> € -35 %

HOT HERBAL DRINK SU ISLANDINE KERPENA (milteliai karštam gėrimui ruošti),

10 paketėlių 8<sup>96</sup> 5<sup>84</sup> € -35 %SINUREN COMPLEX, 60 tablečių 9<sup>76</sup> 6<sup>85</sup> € -30 %

MAISTO PAPILDAI

6<sup>99</sup> €**ILOXEN 200 mg/30 mg** pūvelės dengtos tabletės, 12 tablečių**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veikliosios medžiagos ir stiprumas:** kiekvienoje pūvelės dengtoje tabletėje yra 200 mg ibuprofeno ir 30 mg psudobefedino hidrohlorido. **Terapinės indikacijos:** ILOXEN vartojamas nosies užgulimo, susijusio su ūminiu rinosinustu (šarvama virusinės kilmės), simptominiui gydymui, kai yra galvos skausmas ir (arba) karščiavimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tabletę reikia nuryti nepažeidžiant ir nekarštytą, užgeriant didele stikline vandens, geriausia – valgio metu. Suaugusiems ir 15 metų bei vyresniems pagaugliams po 1 tabletę kas 6 val. pagal poreikį. Jeigu simptomai išlieka ilgiau nei 6 savaites, bet ne daugiau kaip 6 tabletes per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos ar pagalbinių šio vaisto medžiagoms, pacientas yra vaikas iki 15 metų, moterims trečią nėštumo trimestrą, žindymo laikotarpiu, ankstesnė pasireišusi alerginė reakcija arba dusulys, astma, širdies, nosies ir ausies ligos, padidėjęs kraujospūdis, nesėkmingi inkstai ir kepenys, sutrikęs kraujo krešėjimas, sergate infekcine liga, sergate širdies liga, skaitant širdies nepakankamumą ir kritines anginas (kritines skausmas), arba jeigu anksčiau Jus buvo išties širdies priepuolis, atlikta kraujagyslių šuntavimo operacija, sergate periferinių arterijų liga arba Jus buvo išties bet koks insultas, jeigu padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje, rūkote. Jei pasireiškia staigus pilvo skausmas, kraujavimas iš tiesiosios žarnos ar kiti išeminio kolito simptomai, reikia nutraukti vaisto vartojimą ir kreiptis medicininės pagalbos. Jei Jums pasireiškė odos išbėrimas, gleivinių pažeidimas, pūsles ar kitų alergijos požymių, ILOXEN vartojimą nutraukite ir nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Vartojant ILOXEN gali sumažėti Jūsų regos nervo aprūpinimas krauju. Jeigu staiga praradote regėjimą, nutraukite ILOXEN vartojimą ir susisiekiate su gydytoju arba skubiai kreipkitės medicininės pagalbos. **Reikšimos teksto parengimo data:** 2023-04-26

**DVGUBAS SMŪGIS SINUSITUI!**

-45%

**AMBIO GERKLEI**GERKLEI AVIEČIŲ SKONIO, 20 tablečių 5<sup>66</sup> 3<sup>12</sup> €GERKLEI CITRINŲ SKONIO, 20 tablečių 5<sup>88</sup> 3<sup>29</sup> €GERKLEI PIPIRMĖČIŲ SKONIO, 20 tablečių 5<sup>66</sup> 3<sup>12</sup> €

MAISTO PAPILDAI

-40%

**AMBIO VITAMINAS D3 3200**, 30 kramtomųjų kapsulių 10<sup>46</sup> 6<sup>29</sup> €**VITADAY VITAMINAS D3 1600TV**, 40 kramtomųjų tablečių 7<sup>96</sup> 4<sup>79</sup> €

MAISTO PAPILDAI

IKI -45%

**AMBIO**VITAMINAS C SU CITRUSINIŲ VAISIŲ BIOFLAVONOIDAIS, 30 tablečių 7<sup>26</sup> 4<sup>39</sup> € -45 %VITAMINAI C IR D SU CINKU, 30 kapsulių 7<sup>26</sup> 4<sup>37</sup> € -40 %

MAISTO PAPILDAI

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ! 9<sup>78</sup> €**VITADAY ŽUVŲ TAUKAI 1000MG**, 60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

IKI **-40%**



**AMBIO**

GREIPFRUTŲ SĖKLŲ EKSTRATAS, 50 ml **17<sup>99</sup> 11<sup>69</sup> € -35%**  
 OMEGA 3 SU VITAMINAIŠ D3 IR E, 60 kapsulių **13<sup>99</sup> 9<sup>09</sup> € -35%**  
 IMUNITETUI SU EŽIŪOLE, 30 tablečių **9<sup>99</sup> 5<sup>99</sup> € -40%**  
**MAISTO PAPILDAI**

NUO **3<sup>99</sup> €**



**ACC**

ACC 20 mg/ml geriamasis tirpalas, 100 ml **4<sup>99</sup> €**  
 ACC LONG 600 mg, 10 šnypščiosių tablečių **6<sup>99</sup> €**  
 ACC LONG 600 mg, 6 šnypščiosios tabletės **4<sup>99</sup> €**  
 ACC 200 mg, 20 šnypščiosių tablečių **4<sup>99</sup> €**  
 ACC 200 mg, 20 šnypščiosių geriamajam tirpalui, 20 paketėlių **4<sup>99</sup> €**  
 ACC 100 mg, 20 šnypščiosių geriamajam tirpalui, 20 paketėlių **3<sup>99</sup> €**  
**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**  
 Veikliosios medžiagos, stiprumas: ACC 100 mg, 20 šnypščiosių geriamajam tirpalui, ACC 200 mg/ml geriamasis tirpalas, ACC 200 mg šnypščiosios tabletės, ACC 600 mg šnypščiosios tabletės, acetilsisteinas. **Terapinės indikacijos:** gleivčių skystinimas sergant ūminėmis ar lėtinėmis bronchių bei plaučių ligomis, kurių metu būna sutrikusi gleivių gamyba bei šalinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** 2-5 m. vaikams – 100 mg 2 kartus per dieną; 6-14 m. vaikams – 200 mg 2 kartus per dieną; vyresniems kaip 14 metų – 600 mg acetilsisteino. Vartoti per burną. **Kontraindikacijos:** jaunesni nei 2 metų vaikai; ACC LONG 600 mg šnypščiosios tabletės netinka jaunesniems nei 14 metų vaikams; padidėjęs jautrumas acetilsisteinui arba pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** bronchine astma, skrandžio ar žarnų opaligė, padidėjęs jautrumas histaminui. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ Filialas, Uges g. 21-1, LT-08038 Vilnius, Lietuva, tel. +370 7 323 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2403150086. Teksto patvirtinimo data: 2024-03-13.  
**ACC. PASIRŪPINSIME JŪSŲ KOSULIU.**

**-40%**



**VITAMIN C PROLONG**, 40 kapsulių **11<sup>45</sup> 6<sup>87</sup> €**  
**VITAMIN C PRO FORTE**, 30 kramtomųjų tablečių **11<sup>99</sup> 7<sup>19</sup> €**  
**RUTIN FORTE + C**, 30 kapsulių **10<sup>99</sup> 6<sup>29</sup> €**  
**MAISTO PAPILDAI**

**Vitamin C prolong** kapsulės ir **Vitamin C PRO forte** greipfrutų skonio kramtomosios tabletės yra prailginto veikimo patentuotas vitaminas Ester-C®. Moksliniai tyrimai rodo, kad patentuota Ester-C forma organizme išlieka iki 24 valandų, nedirgina skrandžio, nėra toksiška kepenims, lėčiau pasisalina iš organizmo. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, taip pat apsaugoti organizmą nuo oksidacinės pažaidos bei sumažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: „Vitamin C prolong“ gerti po 1 kapsulę per dieną, užgeriant stikline vandens, o „Vitamin C PRO forte“ sukramtyti po 1 tablete per dieną. **Rutin forte+C** sudėtyje yra rutozido, vitamino C, cinko ir seleno. Normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių funkcijai, susidarymą padeda palaikyti vitaminas C. Normalią imuninės sistemos veiklą padeda palaikyti vitaminas C, cinkas ir selenas. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną.

**PALENGVINA ATSIKOSĖJIMĄ**

**6<sup>99</sup> €**



**HADORTA SIRUPAS**, 100 ml

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ACC 100 mg, 20 šnypščiosių geriamajam tirpalui, ACC 200 mg/ml geriamasis tirpalas, ACC 200 mg šnypščiosios tabletės, ACC 600 mg šnypščiosios tabletės, acetilsisteinas. **Terapinės indikacijos:** augalinis vaistinis preparatas, skirtas suaugusiųjų, paauglių ir vyresnių kaip 2 metų vaikų atsikojimui lengvinti esant produktyviam (drėgnam) kosuliui. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** vyresni kaip 12 metų paaugliai, suaugusieji ir senyvi pacientai: 5 ml sirupo 2-3 kartus per parą (atitinka 55,56–83,34 mg greipfrutų lapų sausosio ekstrakto per parą). 6–11 metų vaikai: 2,5 ml sirupo 3 kartus per parą (atitinka 41,67 mg greipfrutų lapų sausosio ekstrakto per parą). 2-5 metų vaikai: 1,6 ml sirupo 3 kartus per parą (atitinka 26,67 mg greipfrutų lapų sausosio ekstrakto per parą). Negalima vartoti jaunesniems kaip 2 metų vaikams. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajam medžiagai, Araliaceae šeimos augalams ir Apiaceae (Umbelliferae) šeimos augalams (pankollai, kmynai, salierai, kalendros ir krapai) ar anetoliui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti prenatūrai vartojimo. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** esant nuolatiniams ar atsinaujinantiems kosuliui 2-4 metų vaikams prieš pradėdant gydymą turi būti nustatyta medicininė diagnozė. Pasireiškus dusuliui, karščiavimui ar atsiradus pūlingų skreplių, reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Atsargiai vartoti rekomenduojama pacientams, sergantiems gastritu ar jei yra skrandžio opa. **Reklamos teksto parengimo data 2023 m. spalio.**

**SKAUDANČIAI GERKLEI**

**-40%**



**RHINOLAYA**

**MEDICINOS PRIEMONĖS**

Himalajų druskos purškalo Jums ir Jūsų kūdikiui  
 Vienintelis **Himalajų druskos** nosies purškalas.  
 • Natūraliai išvalo, drėkina ir padeda atkūrimui užburkusia nosi  
 • Tinka šalčiui, vėjui ir alergijai (namų dulkių, oro taršos, gyvūnų plaukų, žiedadulkių) pažeistai nosies gleivinei  
 • Nedirgina ir nesusaina nosies gleivines  
 • Šykština gleives  
 • Paslėgti greitu veikimui  
**RHINOLAYA – IŠ HIMALAJŲ GELMIŲ PRIEŠ ALERGIJĄ IR SLOGĄ!**

**RHINOLAYA nosies purškalas yra kelių rūšių:**  
 RHINOLAYA PROTECT izotoninis, 50 ml – alergių pažeistai nosies gleivinei.  
 RHINOLAYA izotoninis, 100 ml – kasdienė nosies priežiūra, išsausėjusiai nosies gleivinei.  
 RHINOLAYA FORT hipertoniškas, 50 ml – sloguojant, persalus, sinusito metu.  
 RHINOLAYA KIDS izotoninis, 50 ml – užburkusiai ir išsausėjusiai kodikių nosies gleivinei.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

**NUO SLOGOS**

**5<sup>75</sup> €**



**GALANAS 1 mg/50 mg/ml, nosies purškalas, 10 ml**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidroklorido ir 50 mg dekopantenolio. **Indikacijos:** „Galanas“ skirtas suaugusiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams nosies gleivinės patinimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) ir kaip pagalbinė priemonė odos bei gleivinės pažeidimams gydant, ne alerginės kilmės išskyrus iš nosies (vazomotoriniai rinitai) mažinti ir kvėpavimui per nosį palengvinti esant nosies užgulimui po nosies operacijos; nosies gleivinės patinimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu ir ūminiu prienosiniu ančių uždegimu (sinusitu). Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams 1 purškalo tirpalo dozė į kiekvieną šnervę pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Dozavimas priklauso nuo individualaus paciento jautrumo ir klinikinio atsako. „Galanas“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 paras, nebent gydytojas nurodė kitap. Dėl vaikų gydymo trukmės reikia pasikonsultuoti su gydytoju. **Kontraindikacijos:** šio vaistinio preparato vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliosioms ar pagalbinėms medžiagoms, jeigu yra susaisis nosies gleivinės uždegimas (rinitis sicca); po chirurginio pooperacinės kraujosruvimo pavojus (transkondaliozės hipofizektomijos) arba po kitų chirurginių intervencijų, pažeidžiančių smegenų dangalą; kraujimas ir jaunesniems kaip 6 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** padidinti su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Galanas“, jeigu esate gydomas monoaminooksidazės (MAO) inhibitoriais; jei yra padidėjęs akispūdis; jeigu sergate sunkia širdies ar kraujagyslių sistemos liga; jeigu yra antinksčių navikas; sergate cukriniu diabetu ar yra suaktyvėjusi skydliaujės veikla; jei yra padidėjęs prostata (prostato hiperplazija). **Reklamos teksto parengimo data 2021-08.**  
**ATEKMSA NOSĮ IR ATKURIA PAŽEISTĄ NOSIES GLEIVINĘ.**

**-30%** **1<sup>74€</sup>**



**ASKORBO RŪGŠTIS**, 50 mg, 200 dražečių  
**MAISTO PAPILDAS**

**-30%** **3<sup>63€</sup>**



**RHINOSOL** aliejiniai nosies lašai, 10 ml  
**NOSIES LAŠAI**

🍁 **Jamieson Ciberžolė 550mg**  
**60 kapsulių**

Maisto papildai



**-40%** **13<sup>49</sup>€**  
~~22<sup>49</sup>~~

🍁 **Jamieson Maca ekstraktas 50mg**  
**45 kapsulės**

Maisto papildas




**-40%** **9<sup>59</sup>€**  
~~15<sup>99</sup>~~



Pagaminta Kanadoje

🍁 **Jamieson kalcis su vit.D3**  
**90 tablečių**

Maisto papildai



**-40%** **6<sup>71</sup>€**  
~~11<sup>19</sup>~~

🍁 **Jamieson Lutein 20mg,**  
**45 kapsulės**

Maisto papildas



**-40%** **13<sup>49</sup>€**  
~~22<sup>49</sup>~~



Pagaminta Kanadoje

IKI **-40%****AMBIO**

Kalis ir Magnis (milteliai geriamajam tirpalui ruošti), 30 pakelių **12<sup>48</sup> 8<sup>11</sup> € -35 %**  
 Magnis (milteliai geriamajam tirpalui ruošti), 30 paketėlių **10<sup>68</sup> 6<sup>41</sup> € -40 %**

**MAISTO PAPILDAI****-30%** **16<sup>79</sup>€****IBESAN, 60 kapsulių**

Kapsulės nuo dirgliosios žarnos sindromo yra medicinos priemonė, lengvinanti simptomus, atsiradusius dėl pernelyg didelių dujų kaupimosi pilve, ir su tuo susijusių skausmą pacientams, sergantiems dirgliosios žarnos sindromu (DŽS), kaip antai: pilvo pūtimo, pilnumo jausma, meteorizma, raugėjima ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos. Vaistų nuo DŽS nėra iki šiol, o kapsulės nuo dirgliosios žarnos sindromo palengvina jį lydinčius simptomus. Malšina skausmingus žarnyno spazmus ir pilvo pūtimą, kuri sukelia žarnyne susikaupusios dujos. Malšina pilvo skausmą pacientams, sergantiems dirgliosios žarnos sindromu, esant viduriavimui. Normalizuoja peristaltiką, mažina skausmą, padeda išvengti žarnyno nepažeidimo. Rekomenduojama dozė suaugusiems ir vaikams nuo 12 metų yra 2 kapsulės, geriamos iki 3 kartų per dieną 4 savaites. Kapsulės reikia gerti valgant arba po valgio. Kapsulę nuryti visą, užgeriant didele stikline skysčio (200 ml).

**-40%** **5<sup>99</sup>€****VITADAY CHOLESTEROLIUI MAŽINTI SU ČESNAKU, 30 kapsulių****MAISTO PAPILDAS****-30%** **13<sup>99</sup>€****GLUCOPIL, 60 dengtų tablečių****MAISTO PAPILDAS**

Normaliai gliukozės koncentracijai kraujyje.

„Glucopil“ yra baltųjų šilkmedžių lapų, vaistinių ožragių sėklų ir miškiniių pokštenių lapų ekstraktų derinys, papildytas B grupės vitaminais. Šilkmedžių lapų ekstraktas padeda palaikyti normalią angliavandenių apykaitą organizme. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą ir normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminai B6 ir B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

Vartojimas: 2 tabletes per dieną nuryti užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio.

**-35%** **11<sup>23</sup>€****AMBIO NAKVIŠŲ IR AGURKLIŲ ALIEJUS, 60 kapsulių****MAISTO PAPILDAS****1+1** Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!** **19<sup>98</sup> €****AMBIO AUGALINIS KOMPLEKSAS VYRIŠKUMUI, 60 kapsulių****MAISTO PAPILDAS****-40%****AMBIO**CINKAS 15MG, 45 tablečių **7<sup>26</sup> 4<sup>37</sup> €**SELENAS IR CINKAS SU VITAMINAIŠ, 90 tablečių **13<sup>10</sup> 7<sup>86</sup> €****MAISTO PAPILDAI****-40%** **9<sup>89</sup>€****„AMEDIPLUS“ PLEISTRAS NUO LŪPŲ PŪSELINĖS, 15 vnt.****MEDICINOS PRIEMONĖ**



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

14<sup>98</sup> €

**AMBIO VITAMINAS D3, 4000 IU, 60 kapsulių**  
MAISTO PAPILDAS

-40%



**WALMARK LINIJOS VITAMINAI IR MINERALAI VISAI ŠEIMAI**  
MAISTO PAPILDAI

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

IKI -35%



**VITADAY SPANGUOLIŲ EKSTRAKTAS SU VITAMINU C, 60 tablečių** ~~6<sup>66</sup>~~ 4<sup>68</sup> € -30 %  
**AMBIO CENTAURIUM, 30 tablečių** ~~10<sup>98</sup>~~ 7<sup>14</sup> € -35 %  
MAISTO PAPILDAI

-30%

**URINAL**

MAISTO PAPILDAI

„Urinal“ – šlapimo takų sistemos. Unikalus spanguolių ekstraktas, paprastųjų rykštenių ir vitamino D derinys.  
„Urinal Akut“ – didelės koncentracijos spanguolių ekstrakto „Exocyan“, paprastųjų rykštenių ekstraktas ir vitamino D derinys.  
„Urinal sirupas“ – tinka vaikams nuo 1 metų.  
Urinal Akut D-Mannose - spanguolių ir D - manozės kombinacija, didelis kiekis proantocianidinių (PAC) dienos dozėje.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-40%

6<sup>29€</sup>  
~~10<sup>35</sup>~~

**AMBIO OMEGA-3, 60 kapsulių**  
MAISTO PAPILDAS


-30%

7<sup>20€</sup>  
~~10<sup>35</sup>~~

**OMEGA 3 + VITAMINAI D IR E, 1000 mg, 30 kapsulių**

MAISTO PAPILDAS

EPA (liet. EPR – eikozapentaeno rūgštis) ir DHA (liet. DHR – dokozaheksaeno rūgštis) padeda palaikyti normalią širdies veiklą. DHR (dokozaheksaeno rūgštis) padeda palaikyti normalią smegenų funkciją, išsaugoti normalų regėjimą. Vitaminas D3 padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų, dantų ir raumenų būklę. Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.



◀ SKENUOKITE QR KODĄ IR  
**NORFOS VAISTINĖS**  
**LEIDINIUS VARTYKITE**  
**TELEFONE.**





-50% 7<sup>49€</sup>  
~~14<sup>9€</sup>~~

**AMBIO REGĖJIMUI FORTE**, 30 kapsulių  
MAISTO PAPILDAS

GERAI SAVIJAUTAI

-20%

100 METŲ  
Doppelherz  
ispainėmė Jūsų sveikatą

## DOPPELHERZ

MAISTO PAPILDAS

Maisto papildus „Doppelherz“ gamina viena farmacinių produktų gamintojų lyderių Vokietijoje „Queisser Pharma“, todėl produktai kuriami pasitelkiant naujausias technologijas ir gamybos laimėjimus bei laikantis tarptautinių kokybės standartų. Maisto papildai „Doppelherz“ yra vieni perkamiausių Lietuvoje ir jau daugiau kaip 20 metų garantuoja savo klientams gerą savijautą.

„DOPPELHERZ“ – DVIEJŲ ŠIRDŽIŲ JĖGA!

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-50% 6<sup>74€</sup>  
~~13<sup>4€</sup>~~

**AMBIO MULTIVITAMINAI SU ELEUTEROKOKU**, 30 tablečių  
MAISTO PAPILDAS

-20%



## FLORADIX

MAISTO PAPILDAS

„Floradix“ – svarbiausi mineralai ir vitaminai gerai savijautai. „Floradix“ natūralios sudedamosios dalys užtikrina gerą organizmo svarbiausių vitaminų ir mikroelementų pasisavinimą. Skystos formos medžiagos greitai rezorbuojasi nei sąnariams, nei skrandžiui, o dėl puikaus skonio juos noriai geria maži vaikai ir yra tinkami vertuli nešiojantiems moterims.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-30%



**URAGIN**, 30 tablečių 6<sup>39</sup> 4<sup>47</sup> €  
**FITOLIZIN** valgomoji pasta 100 g 6<sup>99</sup> 4<sup>54</sup> €  
MAISTO PAPILDAS

IKI -20%



## SYMBIOSYS

MAISTO PAPILDAS

Symbiosys produktai sukurti kartu su mokslininkais, kad įvairiose situacijose ir skirtingais mūsų amžiaus tarpsniais padėtų palaikyti gerą savijautą. ID 20230316\_13687702

MIKROORGANIZMAI GERAI SAVIJAUTAI. REIKŠMINGA VISĄ YVENINAMA.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

NUO 3<sup>99</sup> €

**GLICEROL INTELI**, ramunėlių ir dedešvų 9 g  
mikrokulizmos suaugusiems, 6 vnt 9<sup>99</sup> €

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Glicerol Inteli“ yra vienkartinė medicinos priemonė – mikrokulizma, kurios pagrindines sudedamosias medžiagas yra glicerolis, ramunėlės ir dedešvos; ji skirta naudoti į tiesiąją žarną siekiant palengvinti tuštinimąsi esant vidurių užkietėjimui. „Glicerol Inteli“ yra skirtas naudoti trumpą laiką, esant retkarčiais pasireiškiančiam vidurių užkietėjimui. Suaugusiems: 1 mikrokulizma pagal poreikį 1 arba 2 kartus per dieną. Negalima naudoti, jei yra padidėjęs jautrumas arba alergija vienai ar daugiau sudedamųjų medžiagų. Esant nuolatiam vidurių užkietėjimui, svarbu pasikonsultuoti su gydytoju, kad būtų atmetos kitos priežastys. Mikrokulizma skirta naudoti tik viena kartą; todėl, sunaudojus pusę mikrokulizmos, kitos pusės naudoti negalima. Naujausias peržiūros data: 2020-03.

**GLICEROL INTELI**, 1500 mg, 10 žvakučių  
vaikams 3<sup>99</sup> €

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Glicerol Inteli“ yra vienkartinė medicinos priemonė – žvakutė, kurios pagrindinė sudedamoji medžiaga yra glicerolis; ji skirta naudoti siekiant palengvinti tuštinimąsi, esant vidurių užkietėjimui. „Glicerol Inteli“ yra skirtas naudoti trumpą laiką, esant retkarčiais pasireiškiančiam vidurių užkietėjimui. Vaikams: 1 žvakutė pagal poreikį 1 arba 2 kartus per dieną. Vienkartinė priemonė. Negalima naudoti, jei yra padidėjęs jautrumas arba alergija vienai ar daugiau sudedamųjų medžiagų. Esant nuolatiam vidurių užkietėjimui, svarbu pasikonsultuoti su gydytoju, kad būtų atmetos kitos priežastys. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Vidurius laisvinančių priemonių reikia naudoti kuo rečiau ir ne ilgiau kaip 7 dienas. Ilgesnį naudojimą skiria gydytojas, tinkamai įvertinęs konkretų atvejį. Naujausias peržiūros data: 2020-03.

-30%



**OPTIC BIOLUTEINA 25**, 30 tablečių 7<sup>99</sup> 5<sup>59</sup> €

**OPTIC TOTAL**, 30 tablečių 5<sup>99</sup> 3<sup>63</sup> €

**OPTIC SENIOR**, 30 tablečių 6<sup>99</sup> 4<sup>47</sup> €

MAISTO PAPILDAS



## PĖDŲ IR ODOS GRYBELIUI GYDYTI

NUO **7<sup>99</sup>** €



## EXODERIL

Exoderil 10 mg/ml odos tirpalas, 10 ml **7<sup>99</sup>** €  
Exoderil 10 mg/ml odos tirpalas, 20 ml **12<sup>99</sup>** €  
Exoderil 10 mg/g kremas, 15 g **7<sup>99</sup>** €  
Exoderil 10 mg/g kremas, 30 g **12<sup>99</sup>** €

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** 1 g vaisto yra 10 mg natifino. **Terapinės indikacijos:** „Exoderil“ tirpalas naudojamas pėdų grybeliui gydyti. „Exoderil“ kremas naudojamas rankų, pėdų, odos grybeliams, įvairios spalvės dėdėms bei uždegiminiams dermatomikozėms gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** pažeista oda ir aplink ją esanti plotą tepti 1 kartą per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas natifinui arba pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** saugoti, kad vaistas nepatektų į akis ir atvirus žaizdas. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2403156088. Teksto patvirtinimo data: 2024-03-13.

**5<sup>99</sup>** €



## ACICLOVIR ACTAVIS 5% kremas, 5 g

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Aciclovir Actavis 5% kremas.** 1 g kremo yra 50 mg acikloviro. **Terapinės indikacijos.** Lokalus odos ir lūpų pūslėlinės gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems Aciclovir Actavis 5% kremo reikia tepėti 5 kartus per parą, vidutiniškai kas 4 valandas; naktį daroma pertrauka. Gydoma 4 paras. Jei per šį laikotarpį nepasveikstama, gydymą reikia tęsti dar 6 paras. Jei pažeidimas neišnyksta ir po 10 parų, rekomenduojama kreiptis į gydytoją. Aciclovir Actavis 5% kremo nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Vartoti ant odos. **Kontraindikacijos:** Aciclovir Actavis 5% kremo pagalbine medžiaga. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Aciclovir Actavis 5% kremo nerekomenduojama tepėti gleivinės, pvz., burnos, akių ar lyties organų, nes galimas sudirginimas. Būtinai laikytis atsargumo priemonių ir saugoti akis, kad į jas nepatektų kremo. Jeigu Jūsų imunitetas labai susilpnėjęs, (t. y. Jūsų organizmo gebėjimas kovoti su infekcija yra sumažėjęs), tokiu atveju dėl bet kokios infekcijos gydymo reikia kreiptis į gydytoją ir įvertinti gydymo geriausiųjų acikloviro galimybe. Pagalbinės medžiagos cetostearyl alkoholis, natrio laurilsulfatas ir propilenglikolis gali sukelti vietinio odos reakcijų. **Reklamos teksto parengimo data.** 2023 02 15. OTC-LT-00047

## ŽAIZDŲ GIJIMUI SKATINTI

**-25%** **5<sup>24€</sup>**



## HELP4SKIN WOUND HEALING gels, 20 g

## MEDICINOS PRIEMONĖ

„Help4skin Wound Healing“ yra hidrokoloidinis gelis be parabenų, skirtas lokaliai sausų ir slapių žaizdų priežiūrai bei jų gijimui skatinti. Skirtas gydyti ūminėms ar lėtinėms žaizdoms, tokioms kaip: žaizdos (skaiant chirurgines); įjiovimai, įbrėžimai; odos nubrozdinimai ir įtrūkimai; atviroi kojų opos; paviršiniai nudegimai (I ir IIA laipsniai); pragulos. Galima naudoti vyresniems nei 2 m. vaikams.

## PAPRASTA IR EFEKTYVU.

**-25%**



## AMEDIPLUS

Pleistrai pūslėms, 2 x 6 cm, N5 **4<sup>58</sup> 3<sup>44</sup>** €  
Pleistrai pūslėms, 6,9 x 4,4 cm, N5 **4<sup>88</sup> 3<sup>67</sup>** €

## MEDICINOS PREKĖS

## NUO VABZDŽIŲ

**-15%**



## MOUSTICARE

Apyrankė nuo uodų, erkių, mašalų, 1 vnt. **8<sup>98</sup> 7<sup>64</sup>** €  
Purškalkas nuo uodų, erkių, mašalų, 50 ml **12<sup>29</sup> 10<sup>87</sup>** €  
FAMILY purškalkas nuo uodų, erkių, mašalų, 125 ml **14<sup>49</sup> 12<sup>32</sup>** €  
INFESTED purškalkas nuo uodų, erkių, mašalų, 75 ml **15<sup>49</sup> 13<sup>17</sup>** €  
Nugalėkite uodus ir erkes su „MoustiCare“ iš Prancūzijos! Tinka visiems: vaikams, nešėdams moterims, suaugusiems. Efectyvūs prieš įvairių rūšių mašalus: uodus, erkes, blusas, muses, Egipčio, Azijos tigrinius ir paprastuosius uodus. Sudėtyje 100% augalinės veikliosios medžiagos. Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.  
**„MOUSTICARE“ GALI PAKEISTI CHEMINIUS REPELENTUS!**

**-20%**



## AMEDIPLUS

Pleistras aloe 7x2cm, 10 vnt. **1<sup>29</sup> 1<sup>43</sup>** €  
Pleistras velvet juodas 7x2cm, 10 vnt. **1<sup>29</sup> 1<sup>43</sup>** €  
Pleistras tamprus 7x2cm, 10 vnt. **1<sup>65</sup> 1<sup>32</sup>** €  
Pleistras tamprus 7x2cm, 200 vnt. **18<sup>80</sup> 14<sup>40</sup>** €

## MEDICININĖ PREKĖS

**1+1** Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**



## AMEDIPLUS

Pleistras, atsparus vandeniui, 7x2 cm, 200 vnt. **14<sup>00</sup>** €  
Pleistras, atsparus vandeniui, 7x3,8 cm, 200 vnt. **20<sup>00</sup>** €  
Pleistras, tamprus, 7x3,8 cm, 200 vnt. **26<sup>00</sup>** €

## MEDICININĖ PREKĖ

**-30%** **6<sup>71€</sup>**



„AMEDIPLUS“ PANTENOLIO PUTOS, 10%, 150 ml  
KOSMETIKOS PRIEMONĖ

-35%



**AMBIO VITAMINAS E**, 30 kapsulių ~~7<sup>98</sup>~~ **5<sup>19</sup> €**  
**VITADAY VITAMINAI A IR E**, 30 kapsulių ~~4<sup>78</sup>~~ **3<sup>11</sup> €**  
**MAISTO PAPILDAI**

IKI -35%



**AVÈNE**  
**KOSMETIKOS PRIEMONĖS**  
 „Avène“ terminio šaltinio vanduo pasižymi raminamuoju poveikiu. Unikaliomis ir nekinančiomis sudėtimis, pagamintomis sterilioje aplinkoje. Daugybė mokslinių tyrimų patvirtino jo veiksmingumą. Tinka kūdikiams, vaikams, suaugusiems.  
 \*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



**AMBIO HYDRO CONTROL COMPLEX**, 30 kapsulių **9<sup>49</sup> €**  
**MAISTO PAPILDAS**

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



**BEOTEBAL® PLUS** plaukams, odai, nagams, 30 tablečių **29<sup>99</sup> €**  
**MAISTO PAPILDAS**  
 „Beotebal® PLUS“ plaukams, odai, nagams rekomenduojamas kasdieninei plaukų, odos ir nagų būklės bei išvaizdos priežiūrai. Ypač tinkamas laikotarpiu, kai plaukus, odą ir nagus veikia aplinkos veiksniai (saulė, vanduo, vėjas, šaltis, sniegas, lietus), ar po intensyvių kirpiklos procedūrų (pvz., dažymo, tiesinimo, džiovinimo) ir kosmetinių nagų procedūrų. Sudėtyje esantis originalus koncentruotas „NutriAminoBiotinum“ kompleksas, kuriame yra daug aminorūgščių, mineralų ir vitaminų (įskaitant biotiną ir natūralių silių), turi naudingą poveikį plaukams, odai ir nagams. Gaminyje nėra gliitimo ir laktozės. Tinka vegetarams ir veganams.

-30%

3<sup>91€</sup>



**„AMEDIPLUS“ KOSMETINIS ŽIBALAS PLAUKAMS**, 100 ml  
**KOSMETIKOS PREKĖ**

-25%



**ESU LAPÉ**  
 „Esu lapė“ kremų linija – tai taiko patikrintos ir vartojtojų įvertintos kūno priežiūros priemonės už priimtina kainą. Tormentin kremas, 20 g – spuoguotos odos priežiūra. įvairių tipų spuogams. Arnikų tepalas, 20 g – masažinis sumuštos odos tepalas su vitaminu E. Kaulažolių kremas, 30g – puiki pirmoji pagalba po sumušimų bei patempimų. Taip pat pravers masazuojant pavargusius šnarius, nugarą ir raumenis. A+D HERBA kremas, 20 g – suskurdusiai lūpų, veido, kojų bei rankų odai prižiūrėti. Be konservantų, todėl galima naudoti ir kūdikių odos priežiūrai. Ramunėlių kremas, 20 g – ramunėlių ekstraktas raminančiai veikia suskurdusią odą ir apsaugo ją nuo kenksmingo aplinkos poveikio. Kamparo kremas, 20 g – masažinis kremas su pušų aliejumi krūtinės bei šnarių įtrūkimams.  
 \*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

DOVANA

Perkant 2 iš nurodytų produktų, micelinis vanduo - NEMOKAMAI!

ŽIEDĖ

Paakių kremas su hidrolizuotu šilku, 20 ml **22<sup>99</sup> €**  
 Veido kremas jautriai odai su avokadų kauliukų aliejumi, 50 ml **20<sup>99</sup> €**  
 Drėkinamasis veido kremas su agurkų sėklų aliejumi, 50 ml **18<sup>99</sup> €**  
 Veido kremas brandžiai odai su erškėtrožių aliejumi, 50 ml **21<sup>99</sup> €**  
 Veido kremas su hialurono rūgštimi, 50 ml **21<sup>99</sup> €**  
 Paakių serumas su dumbliais, 20 ml **20<sup>99</sup> €**  
 Neurokosmetinis veido kremas su dumbliais, 50 ml **25<sup>99</sup> €**  
 Naktinis veido kremas su ožkų pienu, 50 ml **17<sup>99</sup> €**  
 Veido kremas normaliai odai su abrikosų kauliukų aliejumi, 50 ml **19<sup>99</sup> €**  
 Veido serumas brandžiai odai su šlamučių aliejumi, 30 ml **20<sup>99</sup> €**  
 Skaistinamasis veido kremas su dumblių ekstraktu, 50 ml **23<sup>99</sup> €**  
**KOSMETIKOS PRIEMONĖS**



NAUJIENA!

DOVANA



**ŽIEDĖ** Micelinis vanduo su hialurono rūgštimi, 300 ml **13<sup>99</sup> €**  
**KOSMETIKOS PRIEMONĖ**  
 Gaivus micelinis vanduo su hidrolizuota hialurono rūgštimi nuvalo makiažą ir odos nesvarumus, palikdamas glotnumo pojūtį. Micelinio vandens sudėtyje esantis damaskinių rožių hidrolatas gali padėti palaikyti gerą odos būklę ir apsaugoti odą nuo išorinio poveikio, apsaugodamas veidą vasaros saulės aromatu. Tankių aliejūjų lūpų sučių mišiniai, gali padėti palaikyti gerą odos būklę, prisiliedami prie veido raminančių apakabinimų. Propolisolis ir hialurono rūgštis gali padėti sušalinti ir išaikyti drėgmę. Sudėtyje esanti valomoji medžiaga suformuoja micelas, kurios švelniai valo ir puoselėja odą ir gali padėti suteikti putumo bei glotnumo pojūtį.

# „TENA Discreet“ – apsauga, kokios reikia

Menstruacijų paketai, žinoma, yra reikalinga priemonė – menstruacijoms. Tačiau šlapimui sugerti jie nėra tinkami. Tad kodėl, užuot bandžius gaminius, kurie nežinia kiek padės, nepasirinkus gaminio, kuris tam ir sukurtas? Juk nenaudotumėte plaukų balzamo veido odai drėkinti, tiesa?

Šlapimo nelaikymo paketai specialiai sukurti šlapimui sugerti, o menstruacijų paketai – ne. Be abejo, gali atrodyti, kad menstruacijų paketai tinka ir šlapimui sugerti, tačiau šlapimo pūslės silpnumas ir menstruacijos – du visiškai skirtingi dalykai. Šlapimo ir kraujo sudėtys labai skiriasi: šlapimas yra lengvesnis, stipresnio kvapo ir teka greičiau, o kraujas – daug tirštesnis ir atpalaiduojamas apie 10–20 kartų lėčiau. Pavyzdžiui, per 1 sekundę gali nevaldomai išbėgti iki 50 ml šlapimo, tiek pat kraujo moteris netenka per visą menstruacijų ciklą (4–5 dienas)! Menstruacijų paketai, kai naudojami šlapimui sugerti, greitai sušlampa, praranda formą, todėl mažėja jų veiksmingumas – ne visada apsaugo nuo pratekėjimo ir dėmių ant drabužių. Be to, menstruacijų paketai nepašalina šlapimo kvapo, juos tenka dažniau keisti.

## Specialiai sukurti savo funkcijai

„TENA Discreet“ šlapimo nelaikymo paketai veiksmingi dėl keturių savybių, kurios gerokai palengvina gyvenimą esant silpnai šlapimo pūslei.

**Kvapo neutralizavimo sistema „Fresh Odour Control“** su aktyviomis mikrogranulėmis, saugančiomis nuo amoniako išsiskyrimo, slopina nepageidaujamo šlapimo kvapo atsiradimą. Taigi jūs jaučiatės gaiviai ir užtikrintai.

**Ypatingą sausumą** užtikrina „TENA“ paketuose esantys ypač gerai skysčius sugeriantys polimerai. Jie sugeria ir užblokuoja šlapimą, kad jis neprasiskverbtų iš vidaus į paketo paviršių, taip užtikrindami apsaugą nuo pratekėjimo ir iki 12 valandų išliekanti sausumo jausmą.

„TENA Discreet“ paketai šlapimą **sugeria itin greitai**, todėl jausitės švari ir gaivi. Viršutinis ir sugeriamieji sluoksniai specialiai pritaikyti greitai ištekančiam šlapimui, skirtingai nuo menstruacijų paketų, skirtų tirštesniam kraujui.


**Diskretiški ir nepastebimi.** „TENA Discreet“ plonesni, nei galite tikėtis, žinant, kiek daug skysčio jie sugeria. Ar vis dar manote, kad daug sugeriantys gaminiai turi būti dideli, itin stori ir nepatogūs naudoti? Tai jau ne! „TENA“ paketai sukurti atsižvelgiant į moters kūną, kad saugiai ir patogiai priglustų ir liktų nepastebimi po drabužiais. Išbandykite ir įsitikinkite.

**Pasirūpinkite reikiama apsauga ir išlikite savimi!**

APSAUGA,  
KOKIOS REIKIA  
IR DIENĄ,  
IR NAKTĮ



[www.tena.lt](http://www.tena.lt)



IKI -30%



TENA

SAUSKELNĖS, KLIKLOAI, PAKLOAI IR KOSMETIKA.

Patikimos, odos sveikatai užtikrinančios TENA sauskelnės, klijoklai ir paklojai greitai sugeria šlapimą, apsaugo nuo pratekėjimo ir nemalonaus kvapo. Patalpoms naudojamoms TENA odos priežiūros priemonės padeda pasirūpinti odos švara, higiena ir pragulų profilaktika.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-30%



INTIMOHHELP

MEDICINOS PRIEMONĖS

**Makšties tabletės „Intimohelp“** atkuria ir palaiko fiziologinį makšties pH, slopina bakterijų plitimą. Priemonės sudėtyje esantis inulinas skatina natūralios bakterinės floros augimą, sugeria pagausėjusias išskyras, naikina blogą kvapą. Sudėtyje yra inulino, hialurono rūgšties ir vitamino E. Naudojimo instrukcija: naudokite po 1 makšties tabletę vieną kartą per parą.

**Intymios higienos emulsija „Intimohelp“** su rožių vandeniui ir hialurono rūgštimi padeda atkurti natūralią mikroflorą. Sudėtyje yra pieno rūgšties ir prebiotikų. Rožių vanduo veikia antiseptiškai ir ramina. Nedidelį kiekį emulsijos užtepti ant rankos, nuplauti intymias vietas, paskui nuskalauti šiltu vandeniu.

**Dregnos intymios higienos servetėlės „Intimohelp“** su alavijų lapų ekstraktu ir D-pantenoliu švelniai valo ir nedirgina odos, užtikrina optimalią higieną bet kokiomis aplinkybėmis.

„INTIMOHHELP“ – MOTERS INTYMIOS SVEIKATOS RECEPTAS.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

NUO GRYBELIO

-25%



MYCOSAN

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Mycosan“ skirtas nagų ir pėdų grybelinėms infekcijoms gydyti ir apsaugoti nuo jų. „Mycosan“ serumas gydo ir užkerta kelią rankų ir kojų naujų grybeliui. Serumas prasiskverbia į nagą ir pagerina jo struktūrą, todėl nagas atauga sveikas. Pažeistose vietose „Mycosan“ sukuria apsauginį barjerą ir infekcija nebegali plisti į kitus nagus. Labai svarbu gydymą pradėti vos pastebėjus pirmuosius ligos simptomus. Labai svarbu griežtai laikytis produkto naudojimo instrukcijos. „Mycosan“ pėdų gelis nuo grybelių skirtas „atleto pėdai“ gydyti. „Atleto pėda“ yra grybelių sukelta pėdos odos infekcija, kurią reikia gydyti, kad ji neįspilstų. Galvinamas ir vandeniu nelaidus pėdų purškiklis „Mycosan Protect“ 12 val. apgaubia pėdą apsaugine plėvele, kuri saugo pėdas nuo gresmės susigrąžinti grybeline pėdų odos infekcija.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

MOTERŲ INTYMIAI HIGIENAI

-25%



MULTI-GYN

KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS

Mūsų produktai suteikia tinkamą intymią higieną ir padeda sumažinti nemalonių pojūčių toje srityje: nepageidaujama kvapa, niežulys ar deginimo pojūtis. „Multi-Gyn“ puikiai supranta moterų poreikius, kai atsiranda nepatogumų intymioje zonoje ir kaip tai paveikia jūsų gyvenimą. Todėl mes siūlome produktus, kurie gydo šiuos negalavimus natūraliu būdu, be žinomo šalutinio poveikio („Actigel“, „Liquigel“, „Flora Plus“). Visų produktų sudėtyje esantis unikalus 2OR kompleksas atkuria ir normalizuoja natūralią makšties mikroflorą.

2OR kompleksas – patentuoti biologiški aktyvūs polisacharidai, gaunami iš sudedamųjų alavijų (Barbadensis Miller) medžiagų. [www.2OR.com](http://www.2OR.com)

JEI NORI BŪTI TIKRA DĖL SAVO SVEIKATOS MAKŠTIES!

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

IKI -45%



AMBIO

FOLIO RŪGŠTIES 1000MG, 90 tablečių ~~7<sup>99</sup> 5<sup>19</sup> €~~ -35 %  
MULTIVITAMINAI MOTERIMS PLUS, 60 tablečių ~~17<sup>99</sup> 9<sup>91</sup> €~~ -45 %  
MAISTO PAPILDAI

-40%



PROSTOSAN FORTE,

30 kapsulių ~~15<sup>99</sup> 9<sup>09</sup> €~~

POTENZINE SUPERIOR,

30 tablečių ~~19<sup>99</sup> 11<sup>99</sup> €~~

MAISTO PAPILDAI

„Prostosan forte“ – pagalba vyresnio amžiaus vyrų prostatai. Sudėtyje esantys sabelpalmių ir rugių žiedėdžių ekstraktai padeda palaikyti normalią prostatos funkciją, o afrikinių pigių ekstraktas – normalia šlapimo pūslės funkcija. Kininio ženšenio ekstraktas padeda išlaikyti energingumą. Šio preparato sudėtis taip pat praturtinta vitamina D3 ir cinku. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 2 kartus per dieną, valgio metu.

„Potenzine superior“ – subalansuotas derinys potencialai. Šio maisto papildas sudėtyje esantis ženšenio šaknų ekstraktas padeda palaikyti lytinę funkciją, išvengti ir energingumą. Normalių lytinių potraukių ir seksualinių pajėgumų padeda palaikyti gulsiosios ragulės vaisių ekstraktas, o normaliai vaisingumą ir testosterono koncentraciją kraujyje – cinkas. Sudėtyje taip pat yra L-arginino. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną, valgio metu.

KIEKVIENO VYRO PASIRINKIMAS!

14<sup>99</sup> €



LENOSTELLA 1,5 mg tabletė

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** vienoje tableteje yra 1,5 mg levonorgestrelio. **Terapinės indikacijos:** skubi kontracepcija, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms po nesaugaus lytinio akto. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vieną tabletę reikia išgerti kiek galima greičiau, geriausia per 12 valandų ir ne vėliau kaip per 72 valandas po nesaugių lytinių santykių. **Kontraindikacijos:** jautrumas levonorgestrelio arba pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** nevartoti kol nebuvo pirmųjų mėnesinių. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El.paštas: info.lithuania@sandoz.com. BS2403136093. Teksto patvirtinimo data: 2024 03 13.

SOS TABLETĖ – PAVEDA IŠVENGTI NĖSTUMO PO NESAUGAUS LYTINIO AKTO

-40% 15<sup>59€</sup> ~~25<sup>99</sup>~~



MEFLOVAN FORTE, 60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Meflovan forte“ – trijų augalinių medžiagų derinys, skirtas moterims, siekiančioms maksimalaus komforto ir geros savijautos menopauzės metu. Raudonųjų dobilų ekstraktas padeda palaikyti normalią būseną menopauzės metu. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną.



## JAUTRIŲ DANTŲ PRIEŽIŪRAI

**-30%**



### SENSODYNE

#### BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Dantų pastos Sensodyne yra specialiai sukurtos žmonėms, turintiems jautrius dantis. CHLT/CHMULBRA/0004/78a/JUL

#### EKSPERTO PAGALBA JAUTRIEMS DANTIMS.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

## BURNOS HIGIENAI

**-20%**



### SUNSTAR GUM

Jau daugiau kaip 80 metų „Sunstar“ yra burnos ertmės higienos produktų gamybos lydere. „Sunstar GUM“ misija – užtikrinti savo klientams sveikus dantis bei dantenas, naudojant produktus, sukurtus remiantis naujaisiais išradimais ir klinikinį tyrimų rezultatais. „Sunstar GUM“ burnos higienos produktai sukurti, siekiant užkirsti kelią ne tik ligų simptomams, bet ir jų priežastims!

#### SVEIKOS DANTENOS, SVEIKESNIS GYVENIMAS.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

**1+1** Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

**12<sup>99</sup> €**



### „GUM ORIGINAL WHITE“ DANTŲ PASTA

#### BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖ

Aktoriai ir palaiko natūralių dantų baltumą, nepažeidžia burnos ertmės. Tai pasiekama nenaudojant šiurkščių abrazyvinių medžiagų ar agresyvių balinimo medžiagų.

#### „SUNSTAR GUM“. SVEIKOS DANTENOS, SVEIKESNIS GYVENIMAS.

**-25%**



### „BLEND-A-DENT“ KLIJAI DANTŲ PROTEZAMS

Fiksuojamasis kremas pritvirtina protezus visai dienai, suteikdamas saugumo jausmą. Jis apsaugo gleivinę nuo mechaninių sužeidimų, kuriuos gali sukelti protezai, ir neleidžia maistui patekti po dantų protezais. Kasdien naudodami fiksuojamąjį kremą „Blend-a-dent“, galėsite nevaržomai juoktis, kalbėti ir valgyti.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

**1+1**

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė NEMOKAMA!



### TEPE, dantų šepetėliai

#### BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Dantų šepetėliai yra kasdienės dantų higienos pagrindas. „TePe“ siūlo didelių dantų šepetėlių asortimentą vaikams ir suaugusiems kasdieni dantų priežiūrai, taip pat specialiai norėkui turintiems – nešiojantiems kables ir turintiems implantus.

#### „TEPE“ RŪPINASI SVEIKĄ ŠYSENĄ!

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

**-25%**



### ELMEX

#### BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„ELMEX“ burnos higienos priemonės profesionaliai pritaikytos ne tik skirtingoms amžiaus grupėms, bet ir pačioms įvairiausioms problemoms spręsti. **INDIVIDUALIOS PROBLEMOS. PROFESIONALŪS SPRENDIMAI.**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

**DOVANA** Perkant Fittydent kremą, tabletes - DOVANŲ



### FITTYDENT

#### BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Fittydent“ – stiprus, ilgai laikantis fiksuojamasis kremas, neleidžiantis protezams slysti ir slankioti. Netiprus vandenyje ir asparus rūgščiai, todėl nenuplaukiamas skysčių ar seilių. „Fittydent“ dantų protezų fiksuojamasis kremas garantuoja stiprų dantų protezų ir dantelių sukibimą.

#### NAUJAS PAKUOTĖS DIZAINAS.

**-30%**



**PLIDENTA PRO-BALANCE**, dantų pasta, 75 ml **8<sup>99</sup> 5<sup>97</sup> €**

**BIOMIN F FOR KIDS**, vaikiška dantų pasta-gelis, 37,5 ml **7<sup>99</sup> 5<sup>03</sup> €**

**BIOMIN F, DANTŲ PASTA JAUTRIEMS DANTIMS**, 75 ml **12<sup>99</sup> 8<sup>60</sup> €**

**XYLIMELTS**, 40 pastilių **20<sup>99</sup> 14<sup>20</sup> €**

#### BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Dantų pasta „Plidenta Pro-Balance“ su probiotiku, ksilitoliu ir fluoridais, skirta kasdieni dantų priežiūrai. Saugo dantų emalį ir dantenas, švelniai balina. Skirta suaugusiems. Vaikiška gelinė dantų pasta „Biomin F for Kids“ (37,5 ml (50 g)), braškių skonio, skirta 3–6 metų vaikams. Dantų pasta su bioaktyviu stiklu ir fluoridais saugo vaikių dantis nuo žalingo rūgščių poveikio ir stiprina dantų emalį. Dantų pasta „Biomin F“ su bioaktyviu stiklu jautriems dantims sukurta Didžiosios Britanijos mokslininkų ir ne tik efektyviai mažina dantų jautrumą, bet ir užtikrina aukštą emalio apsaugą nuo žalingo rūgščių poveikio. Išsivalius dantis, perteklių išspauti, išskalauti vandeniu. Galima naudoti vaikams nuo 6 metų ir suaugusiems. Su fluoridais. „Xylimelts“ prilipnamosios pastilės sausai burnai (40 pastilių) skatina seilėtekį, didina natūralią dantų emalio remineralizaciją, neutralizuoja seilių pH. Efektyviai šalina sausos burnos nepatogumus nakties metu. Tinka pacientams su sumažėjusiu seilėtekio, sergantiems cukriniu diabetu, nešiojantiems ortodontines kapas ar turintiems dantų implantus.

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė – NEMOKAMAI!



**AMBIO KIDS VITAMINAS C**, 60 guminukų 14<sup>20</sup> €  
**VITADAY MULTIVITAMINAI VAIKAMS**, 60 tablečių 7<sup>28</sup> €  
 MAISTO PAPILDAI

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė – NEMOKAMAI!



**MARSIEČIAI®**  
**MAISTO PAPILDAI**  
 "Marsiečiai" įvairaus skonio guminukai ir kramtomosios tabletės vaikams.  
 „Marsiečiai“ guminukai su ežiule, vitaminu C ir cinku vaikų imunitetui. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Braškiai ir vyšnių skonio. 2302\_SB\_Marsiečiai\_V01\_LT  
 \*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

TEMPERATŪRAI MAŽINTI IR SKAUSMUI MALŠINTI

NUO 4<sup>49</sup> €



**IBUGARD**  
 100 mg/5 ml geriamoji suspensija, 120 ml 4<sup>49</sup> €  
 200 mg/5 ml geriamoji suspensija, 100 ml 7<sup>49</sup> €

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**  
 Veikliosios medžiagos, stiprumas: 5 ml **IBUGARD 100 mg/5 ml** geriamosios suspensijos yra 100 mg ibuprofeno. 5 ml **IBUGARD 200 mg/5 ml** geriamosios suspensijos yra 200 mg ibuprofeno. Terapinės indikacijos. Įvairios kilmės karščiavimai, įvairios kilmės silpno ir vidutinio stiprumo skausmo, tokio, kaip virusinės ar kitokios infekcijos sukeltos galvos, gerklės ir raumenų skausmai; sąnarių ir kaulų skausmai; pooperacinio skausmo; danties skausmo, galvos skausmo, ausies skausmo, esant vidurinės ausies uždegimui, mažinimui. Vartojimo būdas ir dozavimas: nustatant ibuprofeno dozę, reikia atsižvelgti į paciento kūno svorį ir amžių. Paprastai vienkartinė ibuprofeno dozė yra 7-10 mg/kg kūno svorio, maksimali paros dozė yra 20-30 mg/kg kūno svorio. Dozė galima kartoti kas 6-8 valandas, tarp dozių turi būti ne mažesnis nei 4 valandų intervalas. Tik trumpalaikiam vartojimui. Kontraindikacijos: Padidėjęs jautrumas ibuprofenui, aspirinui ar kitam nesteroidiniam vaistui nuo uždegimo (NVNU), arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei sergate ar sirgote skrandžio ir (arba) dvylikapirštės žarnos opa ar kraujavimu iš virškinamojo trakto; sergate sunkiu kepenų, širdies ar inkstų funkcijos sutrikimu. Yra polinkis į kraujavimą. Specialūs įspėjimai: specialūs atsargumo priemonių reikia, jei inkstų, kepenų ar širdies funkcija yra sutrikusi, sutrikęs kraujo krešėjimas arba vartojami antikoagulantai, sergama cukriniu diabetu, raudonoja vilkige, krono liga, opiniu kolitu, hipertenzija, astma, šienlige, yra nosies polipų ar lėtinį infekcinį kvėpavimo takų ligų. Teksto paruošimo data 2024 01 mėn.

-50% 1<sup>90€</sup>



**„AMEDIPLUS“ OVULIACIJOS TESTAS**, 2 vnt.  
 MEDICINOS PREKĖ

IKI -30%



**PREGNACARE**  
**MAISTO PAPILDAI**  
 „Pregnacare“ – maisto papildų linija, sukurta mitybai papildyti planuojant nėštumą, nėštumo bei žindymo laikotarpiais. „Pregnacare Conception“ sukurta planuojantioms nėštumą. „Pregnacare“ – vitaminų ir mineralų kompleksas, rekomenduojamas nuo pirmo nėštumo mėnesio. „Pregnacare Plus“ papildyta omega-3 riebalų rūgštimis (DHR ir EPR). „Pregnacare Breast Feeding“ pritaikyta žindymo laikotarpiui, sudėtis papildyta kalciumu ir omega-3. „Pregnacare New Mum“ sukurta mamų gyvei ir energijai palaikyti.  
**TVIRTAI KŪDIKIO IR MAMYTĖS DRAUGYSTEI!**  
 \*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-20% 11<sup>98€</sup>



**NURODENT®**, dygstančių dantukų gelis, 15 ml  
**MEDICINOS PRIEMONĖ**  
 Dygstantys dantukai gali sukelti daug diskomforto mūsų mažyliams, nes jie kalasi pro skausmingas, uždegimo apimtas dantenas. Palengvinkite šiuos nemalonius pojūčius su „Nurodent“!  
**NURODENT®** - greito poveikio dygstančių dantukų gelis - padeda numalšinti dygstančių dantukų keliamą skausmą, diskomfortą ir uždegimą. Skirtas kūdikiams nuo 6 mėnesių.  
 • Kliniškai išbandytas.  
 • Sudėtyje yra hialurono rūgšties ir 4 natūralių ekstraktų: tikrųjų alavijų, miškinųjų dedešvų, damaskinių rožių bei vaistinių ramunėlių.  
 • Sudėtyje nėra vietinių anestetikų, cukraus, alkoholio, parabenu, dirbtinių saldiklių ir kvapiųjų medžiagų.  
 • Sudėtyje nėra ibuprofeno.  
**Sudėtis:** ksilitolis, vanduo, glicerolis, damaskinių rožių žiedlapių ekstraktas, ksantano derva, hialurono rūgštis (0,2 %), kalio sorbatas (0,1 %), pektinas, natrio benzoatas (0,1 %), citrinų rūgštis, miškinųjų dedešvų ekstraktas (0,05 %), vaistinių ramunėlių žiedų ekstraktas (0,05 %), tikrųjų alavijų lapų ekstraktas (0,05 %).  
**Naudojimo nurodymai:** Svari mažuju prieteliu užtepkite pakankamą produkto kiekį skaudamoje vietoje ir švelniai pamasauokite dantenas. Kad susidarytų apsauginė plėvelė ir poveikis truktų ilgiau, geriausia naudoti po valgio ir prieš miegą. Naudokite 3 – 5 kartus per dieną, pagal poreikį. Kaskart po naudojimo uždarykite dėbelę. Prieš naudojimą susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir naudojimo instrukcija paleikta priemonės lapelyje ir etiketėje.



-25%

PHILIPS  
**AVENT**

www.philips.lt/avent



# SKIEPAI NUO ERKINIO ENCEFALITO

SKIEPO KAINA

34<sup>95</sup> €

SU LOJALUMO KORTELE

31<sup>95</sup> €



Nuolaidos taikomos su PC Norfa kortele.  
Akcijos „Laimės valandos“ nuolaidos netaikomos.



Galima išankstinė registracija:

- internetu [www.nvaistine.lt/skiepai](http://www.nvaistine.lt/skiepai)
- telefonu +370 800 10 008