VAISTINĖ


TOP SPALIO PASIŪLYMAI

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!** **14,98 €**



AMBIO
VITAMINAS D3 4000, 60 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!** **7,48 €**



AMBIO
PATIRIANTIEMS ĮTAMPĄ, 20 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

IKI **-50%**

NAUJIENA



Su natokinazės fermentu

NATASPIN CONTROL PRO, 30 kapsulių ~~18,99~~ **9,50 € -50 %**
NATASPIN CONTROL PRO, 90 kapsulių ~~39,99~~ **27,99 € -30 %**
MAISTO PAPILDAI
Tai pažangus, kompleksinio pobūdžio maisto papildas cholesterolio kontrolei, kraujotakai ir kraujagyslėms. Sudėtyje yra plataus poveikio augalinės kilmės derinys iš 2000 FV (fibrino vienetų) standartizuotos natokinazės fermento, monakolino K, polikonasolio ir polifenolių (iš bergaminių citrinmedžių bei dažinių ciberžolių). Dažinės ciberžolės padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje, širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą, normalų kepenų lipidų kiekį.

NATASPIN H, 30 kapsulių ~~17,99~~ **9,00 € -50 %**
SPECIALIOS MED. PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAS
Tai vienintelis Lietuvos vaistinėse siūlomas standartizuotos natokinazės fermento ir hidroksitirozolio (iš alyvuogių) derinys kraujotakai. Skirtas tik mitybai reguliuoti esant kraujotakos sutrikimams ir padidėjusiai trombų susidarymo rizikai.
SUTEIKITE GYVYBĖS KRAUJOTAKAI SU „NATASPIN"



1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**

MOLEKIN IMUNO vitaminas C 1000 mg, vitaminas D 2000 IU, cinkas 10 mg, 30 tablečių **11,89 €**

MOLEKIN IMUNO, 20 Šnypščiųjų apelsinų skonio tablečių **10,67 €**
MAISTO PAPILDAI
Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, vitaminas C padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.Tabletė sudaryta iš dviejų dalių, vienoje – vitaminas C, kitoje – vitaminas D ir cinkas,todel vitaminai geriau įsisavinami. „Molekin Imuno" maisto papilde yra didelis vitaminų C ir D kiekis.Tinka vegetarams.Sudėtyje nėra laktozės.Sudėtyje nėra glitimo.Rekomenduojama suvartoti po 1 tabletę per dieną.

NUO **3,99 €**



LIVOSIL
140 mg, 30 kapsulių **3,99 €**
140 mg, 60 kapsulių **7,99 €**
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino. **Indikacijos:** papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas**: suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livosil" dozė yra 280–420 mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. „Livosil" rekomenduojama vartoti ilgiau nei 3 mėnesius. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livosil" medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemija), bei tuos, kurie vartoja preparatų, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. Teksto peržiūros data 2017-07-12.
NATŪRALI KEPENŲ APSAUGA IR GYDYMAS!



NUO **4,99 €**

STREPSILS INTENSIVE
8,75 mg, 16 kietųjų pastilių **4,99 €**
8,75 mg, 24 kietosios pastilės **8,99 €**
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg flurbiprofeno. Terapinės indikacijos: trumpalaikis simptominis gerklės skausmo gydymas suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. amžiaus vaikams. Vartojimo būdas ir dozavimas: *suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams:* kas 3–6 val. (kai reikia) lėtai sučiulpti (leisti ištirpti burnoje, čiulpiant reikia judinti burnoje, kad būtų išvengta lokalaus dirginimo) po 1 kietąją pastilę. Per 24 val. galima suvartoti ne daugiau kaip 5 kietąsias pastiles. Kontraindikacijos: padidėjes jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; anksčiau buvusios acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) sukeltos padidėjusio jautrumo reakcijos (pvz., astma, bronchų spazmas, rinitas, angioneurozinė edema ar dilgėlinė); yra ar anksčiau buvo pepsinė opa ar kraujavimas iš opos (nustatyti du ar daugiau nesusijusių opaligės epizodų) bei žarnyno opos; anksčiau buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo perforacija, sunkus kolitas, kraujavimo ar kraujodaros sutrikimai, susije su anksčesniu NVNU vartojimu; paskutinis nėštumo trimestras; sunkus širdies, inkstų, kepenų nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: reikia atsargiai vartoti pacientams, kurie serga sistemine raudonąja vilklige ir mišria jungiamojo audinio liga, serga tonzilitu (tonzilių uždegimu) ar mano, kad serga bakterinių sukelta gerklės infekcine liga, turi širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų, sirgo virškinimo trakto ligomis (pvz., opiniu kolitu, Krono liga), jei pasireiškia pirmosios odos reakcijos (išbėrimas, lupimasis, pūslių atsiradimas) arba kitokie alerginės reakcijos požymiai; nėščiosiems pirmuosius 6 mėnesius ar žindyvėms bei senyviems pacientams. Tokie vaistai gali būti susije su nedideliu širdies priepuolio (miokardo infarkto) ar insulto rizikos padidėjimu. Vaisto sudėtyje yra gliukozės ir sacharozės (cukraus), į tai turėtų būti atsižvelgta sergant cukriniu diabetu. Jeigu pacientas yra alergiškas (alergiška) kviečiams (ši liga skiriasi nuo celiakijos), šio vaisto vartoti negalima. Sudėtyje esantys citralis, citronelolis, d-limonenas, farnezolis, geraniolis ir linalolis gali sukelti alerginių reakcijų, sieros dioksidas gali sukelti sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų ir bronchų spazmą, butilhidroksianizolas gali sukelti vietiniu odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivinę. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2024-09-04.

SUPERPASIŪLYMAI!

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis



NUO **3**^{99} €



DICLAC

Diclac 1% gelis, 50 g **3**^{99} €
Diclac 5% gelis, 50 g **6**^{99} €
Diclac 5% gelis, 100g **9**^{99} €
Diclac 5% gelis, 150g **12**^{99} €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g „Diclac" 5 % gelio yra 50 mg, 1 g „Diclac" 1 % gelio yra 10 mg diklofenako natrio druskos. **Terapinės indikacijos:** lokaliam skausmui malšinti, uždegimui slopinti ir patinimui mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** ploną „Diclac" 5 % gelio sluoksnį tepti 2 kartus per dieną, „Diclac" 1 % gelį tepti 3–4 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** jautrumas diklofenakui ar pagalbinėms medžiagoms, jaunesni kaip 14 m. vaikai, 3 paskutiniai nėštumo mėnesiai. Specialūs įspėjimai: negalima tepti burnos, nuryti. „Sandoz Pharmaceuticals d.d." filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2403135891. Teksto patvirtinimo data 2024-03-13.
STIPRUS ATKIRTIS SKAUSMUI!

NUO **2**^{99} €



HJERTEMAGNYL

150 mg, 30 plėvele dengtų tablečių **2**^{99} €
150 mg, 90 plėvele dengtų tablečių **6**^{99} €
75 mg, 100 plėvele dengtų tablečių **4**^{99} €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: 1 tabletėje yra 75 mg arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties. **Indikacijos:** trombozės profilaktika, sergant išemine širdies liga, po miokardo infarkto, išeminio smegenų insulto ar praeinančiojo smegenų išemijos (kraujotakos sutrikimo) priepuolio. Vaistas slopina trombocitų (kraujo plokštelių) agregaciją (sukibimą), todėl jo vartojama krešulių, susidariusių iš sukibusių kraujo plokštelių, atsiradimo rizikai mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną, užsigeriant stikline vandens; įprastinė dozė ilgalaikiam vartojimui yra 75 – 150 mg vieną kartą per parą. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, padidėjęs jautrumas kitiems salicilatams; jei neseniai kraujavo į virškinamąjį traktą; yra polinkis į kraujavimą, ūminė pepsinė opa, sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, šlapime padaugėjo oksalatų, jeigu yra trys paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas; vaikams ir paaugliams, jaunesniems kaip 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai vartoti, jei pacientas serga bronchų astma, šienlige, nosies polipais ar kita lėtine kvėpavimo takų liga, gydymui atsparia hipertenzija, podagra, esant gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stokai, sutrikusiai kepenų ir (ar) inkstų arba virškinimo trakto funkcijai, likus 10 parų iki chirurginės operacijos, senyvo amžiaus pacientams nepatartina ilgai vartoti dėl galimos kraujavimo iš virškinamojo trakto rizikos, esant vaikų ir paauglių virusinėms infekcijoms. Teksto parengimo data: 2022-04-07. LT-HJERT-2200001

NUO **1**^{99} €



IBUMETIN®

200 mg, 10 plėvele dengtų tablečių **1**^{99} €
400 mg, 10 plėvele dengtų tablečių **2**^{99} €
400 mg, 20 plėvele dengtų tablečių **3**^{99} €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikioji medžiaga: 1 tabletėje yra 200 mg arba 400 mg ibuprofeno. **Indikacijos:** trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip galvos, dantų, raumenų, sąnarių ar sukelto menstruacijų, malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams įprasta vienkartinė dozė yra 1-2 tabletė(s) IBUMETIN 200 mg arba 1 tabletė IBUMETIN 400 mg. Didžiausia paros dozė yra 1200 mg. Tabletę reikia užsigerti stikline vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjes jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, acetilsalicilo rūgščiai arba kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU). Ligonis anksčiau sirgo acetilsalicilo rūgšties arba kitokių NVNU sukelta astma, angioneurozine edema, dilgėline, rinitu ar kitokia padidėjusio jautrumo reakcija. Aktyvi arba buvusi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, opinis kolitas, kraujavimas iš virškinimo trakto ar kitoks kraujavimas, sunkus kepenų, širdies, inkstų funkcijos nepakankamumas, hemoraginė diatezė, paskutiniu 3 nėštumo mėnesiu ar žindymo laikotarpis. Vaikams ir paaugliams iki 12 m. vartoti negalima. **Specialūs įspėjimai:** specialių atsargumo priemonių reikia, jei inkstų, kepenų arba širdies funkcija yra sutrikusi, yra buvę virškinimo trakto pažeidimų, sutrikęs kraujo krešėjimas arba vartojami antikoaguliantai, jei vartojama kitų NVNU ar vaistinių preparatų, galinčių padidinti skrandžio opos susidarymo arba kraujavimo pavojų, diuretikų ar nefrotoksinį poveikį turinčių vaistinių preparatų, sergama cukriniu diabetu, raudonaja vilklige ar kitomis kolagenozėmis, Krono liga, opiniu kolitu, hipertenzija, periferinių arterijų liga, galvos smegenų kraujagyslių liga, astma, šienlige, yra nosies polipų ar lėtinių infekcinių kvėpavimo takų ligų, senyviems žmonėms. Prasidėjus kraujavimui, atsiradus opų ar odos reakcijų, vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir kuo skubiau kreiptis į gydytoją. Negalima vartoti, jei nustatytas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pirmuosius 6 nėštumo mėnesius vartoti negalima, nebent tai neabejotinai būtina ir taip pataria gydytojas. Teksto parengimo data: 2023-03-01

DRĖKINAMIEJI AKIŲ LAŠAI

-40% **8**^{90}€ ~~14,84~~



STARAZOLIN SAUSOMS IR SUDIRGUSIOMS AKIMS

Natrio hialuronatas / dekspantenolis, 10 ml (be konservantų)

STARAZOLIN HYDROFORTE

Natrio hialuronatas, 10 ml (be konservantų)

MEDICINOS PRIEMONĖS

Drėkinamojo, raminamojo ir apsauginio poveikio lašai, palengvinantys akies paviršiaus regeneraciją.
„Starazolin sausoms ir sudirgusioms akims" akių lašai skirti padėti sumažinti simptomus, esant lengvam ar vidutinio sunkumo sausų akių sindromui ir (arba) sudirgintam akies paviršiui. **Lašai drėkina akį, stabilizuoja ašarų plėvelę ir regeneruoja akies paviršių.**
„Starazolin HydroForte" – intensyviai drėkinantys akių lašai, skirti vartoti esant sunkiam sausų akių sindromui.
Lašai rekomenduojami: esant akių aplinkos dirginiams; sumažėjus mirksėjimo dažniui; kai yra nepakankama ašarų gamyba arba jų sudėties pokyčių. „Starazolin sausoms ir sudirgusioms akims" gali naudoti žmonės, nešiojantys visų tipų kontaktinius lęšius. Prieš vartojant „Starazolin HydroForte" reikia išsiimti kontaktinius lęšius. Įprasta dozė – 1–2 lašai 3 kartus per parą į kiekvienos akies junginės maišelį.

SLENKA PLAUKAI?* PASITIKĖK VAISTO GYDOMĄJA GALIA!

NUO **8**^{99} €



BEOTEBAL

BEOTEBAL 10 mg, 30 tablečių **8**^{99} €
BEOTEBAL 10 mg, 60 tablečių **24**^{99} €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

BEOTEBAL 10 mg tabletės. Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino.
Terapinės indikacijos. „BEOTEBAL" priklauso B vitaminų preparatų grupei ir vartojamas biotino trūkumo gydymui suaugusiesiems. Biotino trūkumas gali sukelti plaukų retėjimą, plaukų slinkimą, nagų ir plaukų augimo sutrikimus bei padidėjusį trapumą, dermatitą (odos uždegimą, kuriam paprastai būdingas niežulys ir paraudimas) aplink akis, nosį, burną, ausis ir kirkšnis, konjunktyvitą (akies junginės uždegimą, dėl kurio akys atrodo paraudusios), nuovargio, parestezijos (nenormalaus odos pojūčio, pasireiškiančio tokiais simptomais kaip dilgčiojimas, perštėjimas, šalimas, deginimas, tirpimas) simptomus. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiesiems, įskaitant senyvus pacientus, vartoti 10 mg biotino, t.y. 1 tabletė „BEOTEBAL" per parą. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jeigu yra numatoma atlikti laboratorinius tyrimus, turite pasakyti savo gydytojui arba laboratorijos darbuotojams, kad vartojate arba neseniai vartojote „BEOTEBAL", nes biotinas gali turėti įtakos tokių tyrimų rezultatams. Atsižvelgiant į tai, koks tyrimas atliekamas, dėl biotino poveikio tyrimų rezultatai gali būti klaidingai didesni arba klaidingi mažesni. Reklamos teksto parengimo data 2022-04.
***Slenkantys, silpni, trapūs plaukai yra viena iš biotino trūkumo išraiškų. „Beotebal" yra nereceptinis vaistas skirtas biotino trūkumo gydymui.**

VIRŠKINIMO SISTEMAI

NUO **4**^{99} €



GUTTALAX

GUTTALAX, 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 15 ml **4**^{99} €
GUTTALAX, 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml **7**^{99} €
(*Natrio pikosulfatas*)

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. Veikioji medžiaga,stiprumas: 1 ml tirpalo (15 lašų) yra 7,5 mg natrio pikosulfato. **Indikacijos:** Trumpalaikis vidurių užkietėjimo mažinimas, tuštinimosi lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Guttalax" geriamas vakare. Suaugusiems ir vyresniems nei 10 metų vaikams: 10 – 20 lašų per parą. 4 – 10 metų vaikams: 5 – 10 lašų per parą. Vartoti per burną. Rekomenduojama gydymą pradėti mažiausia doze. Siekiant, kad tuštinimasis būtų reguliarus, dozę galima koreguoti iki rekomenduojamos didžiausios. Didžiausios rekomenduojamos paros dozės viršyti negalima. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; žarnų nepraeinamumas ar obstrukcija; stiprus pilvo skausmas ir (arba) karščiavimas dėl ūminės pilvo būklės (pvz., apendicito), galimai susijęs su pykinimu, vėmimu; ūminė uždegiminė žarnų liga; sunki dehidratacija; jaunesni kaip 4 metų vaikai; retos paveldimos būklės, kurios gali būti nesuderinamos su preparato pagalbine medžiaga. **Įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Nenustačius vidurių užkietėjimo priežasties, negalima vartoti nepertraukiamai kasdien ar ilgai. „Guttalax" pavartojusiems žmonėms buvo galvos svaigimo ir (arba) sinkopės atvejų. Vaikams be gydytojo nurodymo „Guttalax" vartoti negalima. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas fruktozės netoleravimas. Teksto parengimo data: 2017 m. spalio mėn. Reklamos teksto parengimo data: 2022 gegužės mėn. 2205_SB_"Guttalax"_V01_LT

-50%



ZAN™ – maisto papildų linija atminčiai, protinei veiklai, nervų sistemai, psichinei sveikatai bei miegui.
HYPNOZAN EXPRESS, 30 čiulpiamųjų tablečių ~~6,49~~ **3,25 €**
VALEROZAN DROPS, geriamasis tirpalas, 50 ml ~~3,95~~ **1,99 €**
HYPNOZAN, 20 kapsulių ~~9,99~~ **5,00 €**
VALEROZAN, 60 tablečių ~~7,95~~ **3,98 €**

MAISTO PAPILDAI
„HypnoZAN Express“ čiulpiamosios tabletės su melatonino ir fitoterapinių medžiagų deriniu leidžia greičiau užmigti*, o čiulpiama preparato forma užtikrina geresnį veikimą. **„ValeroZAN Drops“** geriamasis tirpalas, augalinių ekstraktų derinys su valerijonais, tinkamas nervų sistemos veiklai, psichinei sveikatai ir atsipalaidavimui, skysta preparato forma užtikrina greitesnį veikimą. **„HypnoZAN“** su melatoninu ir melisomis padeda greičiau užmigti*, palaikyti normalų miegą bei psichinę sveikatą, padeda atsipalaiduoti. **„ValeroZAN“** tabletės vaistinių valerijonų, vaistinių melisų ir paprastųjų apynių bei sukatžolių derinys padeda: atsipalaiduoti, palaikyti normalią nervų sistemos būklę, palengvinti užmigimą* ir palaikyti miego kokybę.
* Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti.
ZAN™ – ĮKVĖPK... IŠKVĖPK.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

IKI -45%



JORDAN
BURNOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS
Platus dantų priežiūros priemonių asortimentas visai šeimai - nuo pirmo dantuko! Rinkitės dantų šepetėlius, pastas bei tarpdančių valymo priemones pagal savo individualius poreikius.
„JORDAN“ RŪPINASI ŠYPSENOMIS NUO 1927-ŲJŲ!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

DIENAI BE STRESO, GERESNIAM MIEGUI NAKTĮ

6,99 €



NEUREXAN, 50 tablečių
HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: 0,6 mg *Avena sativa* D2, 0,6 mg *Coffea arabica* D12, 0,6 mg *Passiflora incarnata* D2, 0,6 mg *Zincum isovalerianicum* D4.
Indikacijos. Miego sutrikimų ir nerimastingumo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Suaugusiems žmonėms ir paaugliams nuo 12 metų vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Pradžioje, jei simptomai stiprūs, galima vartoti po 1 tabletę kas 0,5–1 val., neviršyti 12 tablečių per dieną. Simptomams palengvėjus, gydymą tęsti įprastine doze. „Neurexan“ saugumas ir veiksmingumas jaunesniems kaip 12 metų vaikams neištirti. Duomenų nėra. Prieš nuryjant tabletę reikia ištirpinti burnoje. Ją vartoti likus ne mažiau kaip 30 min. iki valgio.
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Neurexan“ sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. „Neurexan“ nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Registruotojas.** „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). **Registruotojo atstovas.** UAB „Farmahelis“, www.heel.lt. Teksto parengimo data 2022-10-04.

NUO SLOGOS

NUO 3,99 €



XYMELIN
XYMELIN, 1 mg/ml, nosies lašai (tirpalas), 10 ml **3,99 €**
XYMELIN MENTHOL, 1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml **4,99 €**
XYMELIN, 1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml **4,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Sudėtis: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. **Indikacijos:** susirgus peršalimo ligomis, paburkus nosies gleivinei arba pasireiškus nosies ančių uždegimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 10 metų paaugliams (XYMELIN MENTHOL atveju – vyresniems kaip 12 metų paaugliams) 1 ipurškimas arba 1–2 lašai į kiekvieną nosies landą 2–3 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, uždaro kampo glaukoma, sausasis nosies gleivinės uždegimas, atrofinis rinitas (XYMELIN MENTHOL atveju), jei hipofizės ar smegenų operacija atlikta pro nosį arba burną; XYMELIN MENTHOL: jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai:** Vartoti atsargiai, jei yra antinkščių navikas (feochromocitoma), sustiprėjusi skydliaukės veikla, sergate cukriniu diabetu ar sutrikęs šlapinimasis dėl padidėjusios prostatos. Sergant sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis ar ligomis, kurių metu susiaurėja kraujagyslės, vartoti tik su gydytojo leidimu. Ilgiau kaip 7 paras šio vaisto vartoti draudžiama. Dažnai ir ilgai vartojant vaisto gali atsinaujinti nosies gleivinės paburkimas, susilpnėti jo slopinimas ir atsirasti nosies užgulimas. Gali sukelti miego sutrikimų, galvos svaigimą, tremorą, širdies ritmo sutrikimą, aukštą kraujospūdį. XYMELIN nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 10 metų vaikams. XYMELIN MENTHOL: Pasitarti su gydytoju arba vaistininku, jei vartojate arba per paskutines dvi savaites vartojote vaistų nuo depresijos, vadinamų monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI). Reklamos teksto parengimo data: 28.03.2024 LT-XYME-2200004

NUO RAUMENŲ IR SĄNARIŲ SKAUSMO

NUO 5,99 €



VIPROSAL B®
VIPROSAL B®, tepalas, 50 g **5,99 €**
VIPROSAL B®, tepalas, 75 g **7,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo yra 0,05 V gyvačių nuodų, 10 mg salicilo rūgšties, 30 mg raceminio kamparo ir 30 mg terpentino eterinio aliejaus. **Indikacijos:** sąnarių ir raumenų skausmui malšinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** nedidelis „Viprosal B®“ kiekis (5–10 g, t. y. 1 ar 2 arbatiniai šaukšteliai, atsižvelgiant į pažeistos vietos plotą) užtepamas ant skaudamos vietos ir įtrinamas į odą 1 arba 2 kartus per parą. Tepti ant odos. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, odos opa ar kitos odos ligos. **Specialūs įspėjimai:** „Viprosal B®“ negalima tepti ant pažeistos odos. Saugotis, kad tepalo nepatektų ant gleivinės ar akių. Vietinis rinkodaros teisės turėtojo atstovas: UAB Grindeks Kalceks Lietuva, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2024-08-09
IŠMINTINGAS SPRENDIMAS NUO SKAUSMO!

NUO 9,99 €



NIZORAL
NIZORAL 20 mg/g šampūnas, 60 ml **9,99 €**
NIZORAL 20 mg/g šampūnas, 100 ml **14,99 €**
Ketokonazolas

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliojі medžiaga,stiprumas: ketokonazolas, 20 mg/g. **Indikacijos:** vartojamas infekcinėms odos ligoms, kurias sukėlė grybeliai, gydyti: séleniniam galvos odos pleiskanojimui (Pityriasis capitis); seboréjiniam dermatitui (rausvai rudos dėmės, padengtos gelsvomis arba baltomis pleiskanomis); jvairiospalvei dedervinei (Pityriasis versicolor) (ant liemens esančios mažos rudos ar baltos spalvos, nelygiais kraštais dėmės); tinka Pityriasis capitis ir seboréjinio dermatito profilaktikai. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** skirtas vartoti paaugliams ir suaugusiesiems. Pažeistą odą reikia sudrėkinti „Nizoral“ šampūnu ir palaikyti 3-5 min., kad įsigertų. Po to odą ir plaukus reikia gerai nuplauti vandeniu. Odos drėkinimo šampūnu dažnis priklauso nuo grybelių rūšies ir nuo to, ar vaistas vartojamas ligai gydyti, ar jos profilaktikai. **Kontraindikacijos:** šampūno vartoti negalima: jeigu yra alergija ketokonazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Nizoral“. Reikia saugotis, kad „Nizoral“, kaip ir kitokio šampūno, nepatektų į akis. Jeigu taip atsitinka, jas reikia praplauti vandeniu. Reklamos teksto parengimo data: 2022 balandžio mėn. 2204_SB_“Nizoral“_VOI_LT

SUPERPASIŪLYMAI!

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis



PERŠALIMO IR GRIPO SIMPTOMAMS LENGVINTI

NUO **4,99 €**



GRIPEX THERMAL

GRIPEX THERMAL, 1000/100/12,2 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 8 paketėliai **7,99 €**
GRIPEX THERMAL, 1000/100/12,2 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 12 paketėlių **9,99 €**
GRIPEX THERMAL, 650/50/10 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 8 paketėliai **4,99 €**
GRIPEX THERMAL, 300/20/5 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 12 paketėlių **7,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: (1 paketėlyje): „Gripex Thermal 300/20/5 mg“: 300 mg paracetamolio, 20 mg askorbo rūgšties, 5 mg fenilefrino hidrochlorido; „Gripex Thermal 650/50/10 mg“: 650 mg paracetamolio, 50 mg askorbo rūgšties, 10 mg fenilefrino hidrochlorido; „Gripex Thermal 1000/100/12,2 mg“: 1000 mg paracetamolio, 100 mg askorbo rūgšties, 12,2 mg fenilefrino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. „Gripex Thermal 300/20/5 mg“: 6–12 m. vaikams: 1 paketėlis kas 4–6 val.; suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams: 1–2 paketėliai kas 4–6 val. „Gripex Thermal 650/50/10 mg“ arba „Gripex Thermal 1000/100/12,2 mg“: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. vaikai: po 1 paketėlį kas 4–6 val. Nepasitare su gydytoju, nevartokite ilgiau nei 7 d. Nevartokite didesnės nei rekomenduojama dozės. Pasakykite gydytojui, jei jūsų inkstų ar kepenų veikla sutrikusi ar nuolat vartojate alkoholį. Kontraindikacijos: alergija veikliosioms arba pagalbinėms medžiagoms, taip pat vaistams, kurių sudėtyje yra simpatomimetinių aminų; širdies ligos, padidėjęs kraujospūdis; gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės arba methemoglobino reduktazės stoka; sunkus kepenų ar inkstų nepakankamumas; tirotoksikozė; šlapimo užsilaikymas arba feochromocitoma; zidovudino, MAO inhibitorių vartojimas; nėštumas ar kūdikio žindymas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju, jei sergate kepenų arba inkstų nepakankamumu, bronchine astma, prostatos hiperplazija, Reino sindromu (rankų ar kojų pirštų, ausies kraštų ir nosies galiuko išblyškimas, dažnai sukeltas šalčio arba emocinio streso), širdies liga, padidėjusiu kraujospūdžiu, cukriniu diabetu. Reklamos teksto parengimo data 2024-07-03.

„GRIPEX THERMAL“. VEIKIU.

NUO GERKLĖS SKAUSMO IR UŽDEGIMO

NUO **6,99 €**



DECATYLEN™

DECATYLEN™, 0,25 mg/0,03 mg, 20 kietųjų pastilių **6,99 €**
DECATYLEN, 0,25 mg/0,03 mg, 40 kietųjų pastilių **9,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje pastilėje yra 0,25 mg dekvalinio chlorido, 0,03 mg cinchokaino hidrochlorido. **Indikacijos:** burnos ir ryklės uždegimo (gingivito, opinio ir aftinio stomatito, faringito) vietinis gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams kas 2 val. lėtai sučulpti po 1 pastilę, vaikams nuo 4 iki 12 metų kas 3 val. lėtai sučulpti po 1 pastilę. Kai uždegimo simptomų sumažėja, vartoti po 1 pastilę kas 4 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai ar ketvirtiniams amonio dariniams (pvz., benzalkonio chloridui). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Decatylen“ sudėtyje yra sorbitolio. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą viduriu laisvinantį poveikį. **Reklamos teksto parengimo data** 2023 02.17. DCTL-LT-00012

KAI REIKIA NE TIK MALŠINTI SIMPTOMUS, BET IR GYDYTI GERKLĖS SKAUSMĄ.

PERŠALIMO IR GRIPO SIMPTOMAMS LENGVINTI

NUO **4,99 €**



GRIPEX

GRIPEX, 325/30/10 mg, 12 plėvele dengtų tablečių **4,99 €**
GRIPEX, 325/30/10 mg, 24 plėvele dengtos tabletės **8,49 €**
GRIPEX, 500/30/15 mg, 10 plėvele dengtų tablečių **5,99 €**
GRIPEX, 500/30/15 mg, 20 plėvele dengtų tablečių **9,49 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje „Gripex 500/30/15 mg“ yra 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido, 15 mg dekstrometorfano hidrobromido. 1 tabletėje „Gripex 325/30/10 mg“ yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido, 10 mg dekstrometorfano hidrobromido. Terapinės indikacijos: peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas. „Gripex 500/30/15 mg“ suaugusiesiems po 1–2 tabletes 3–4 kartus per parą. „Gripex 325/30/10 mg“ suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams įprasta dozė yra 2 tabletės 3–4 kartus per parą, kas 4–6 val. tada, kada reikia. Neviršyti vienkartinės 2 tablečių dozės. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. Kontraindikacijos: negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šių vaistų sudedamajai medžiagai; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; smarkiai padidėjęs kraujospūdis; chroniniu alkoholizmas. Negalima vartoti kartu su monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI) arba anksčiau negu 2 savaites baigus juos vartoti. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: esant sutrikusiai kepenų funkcijai, sergant alkoholizmu, sutrikus mitybai yra didesnis kepenų toksinio pažeidimo pavojus. Gydantis šiais vaistais, nepatartina vartoti alkoholio. Jeigu per 3 dienas jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2024-04-02.

„GRIPEX“. VEIKIU!

-40% 5,94 € 9,90



DECATYLEN™ NATURAL SPRAY, burnos ir gerklės purškalas, 20 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Decatylen™ Natural Spray“ vartojamas vietiškai, gleivinei apsaugoti ir kaip pagalbinė priemonė, padedanti sumažinti burnos ir gerklės uždegimo simptomus. Augalinių aliejų mišinys padengia burnos bei gerklės gleivinę apsauginiu sluoksniu, mažina dirginimą, palaiko drėgmę ir padeda atkurti natūralią burnos gleivinės funkciją. Vartojamas esant stomatitui (burnos gleivinės uždegimui), skausmingoms burnos ertmės žaizdelėms, gingivitui (dantenų uždegimui), faringitui (ryklės uždegimui). **BE CUKRAUS. TINKA VARTOTI VAIKAMS NUO 2 METŲ**

RAMINANTIS POVEIKIS IŠ GAMTOS!

4,99 €



WINTROZEN

600 mg, 10 šnypščiųjų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekvienoje šnypščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino.

Terapinės indikacijos. „Wintrozen“ skirtas gleivėms skystinti ir atsikosėjimo lengvinti sergant peršalimo sukeltu bronchitu, suaugusiesiems ir vyresniems kaip 14 metų paaugliams. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 14 metų paaugliams: rekomenduojama dozė yra 1 tabletė (600 mg) 1 kartą per parą, vakare. Jūsų gydytojas gali pakeisti vartojimo dažnį ir dozę, neviršydamas 600 mg didžiausios paros dozės. „Wintrozen“ negali būti vartojamas ilgiau nei 5 dienas. **Vartojimo metodas.** 1 šnypščiąją tabletę ištirpinti stiklinėje vandens. Paruoštą tirpalą reikia išgerti per kelias minutes. Rekomenduojama nemaišyti „Wintrozen“ su kitais vaistais. **Kontraindikacijos.** „Wintrozen“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija acetilcisteinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Dėl didelio veikliosios medžiagos kiekio „Wintrozen“ negalima vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 14 metų paaugliams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Wintrozen“, jeigu: atsiranda naujų odos ir gleivinės pokyčių. Labai retai gauta pranešimų apie sunkių odos reakcijų, sergate uždegimine bronchų liga, netoleruojate histamino, yra ar anksčiau buvo skrandžio ar žarnyno problemų, vadinamų skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opomis, ypač kai kartu su „Wintrozen“ vartojami kiti skrandžio gleivinę dirginantys vaistai. Jeigu jaučiate sieros kvapą, nesijaudinkite, nes tai yra acetilcisteino savybė ir nereiškia, kad vaistas pakito.

Reklamos teksto parengimo data: 2022 m. gruodžio mėn. ID 000551327

NUO RĖMENS

2,99 €



PANZILAN® 20 mg, 14 skrandyje neirių tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Pantoprazolas. Vienoje tabletėje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidrato pavidalu). **Indikacijos.** „Panzilan“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos pantoprazolo, kuri blokuoja skrandžio rūgštį gaminantį „siurblį“, todėl skrandyje sumažėja rūgšties kiekis. „Panzilan“ vartojamas trumpalaikiam gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens, rūgščių atpylimo) suaugusiems pacientams gydymui. Refliuksas yra rūgščių iš skrandžio atgalinis patekimas į stemplę, kurioje gali prasidėti uždegimas ir sukelti skausmą. Dėl to gali atsirasti tokių simptomų, kaip skausmingas deginimo pojūtis krūtinėje kylantis iki ryklės (rėmuo) ir rūgštus skonis burnoje (rūgšties atpylimas). **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Gerti po 1 tabletę per parą prieš valgį tuo pačiu paros laiku 2-3 dienas iš eilės, užsigeriant vandeniu. Tabletes reikia nuryti, negalima kramtyti ar laužyti. Neviršykite rekomenduojamos 20 mg pantoprazolo dozės per parą. Nutraukite „Panzilan“ vartojimą, kai visai pranyks ligos simptomai. Nepasitarus su gydytoju vartoti „Panzilan“ ilgiau kaip 4 savaites negalima. **Kontraindikacijos.** Jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) pantoprazolui, soju lecitinui arba bet kuriai pagalbinei „Panzilan“ medžiagai; kartu vartojami vaistai, kurių sudėtyje yra atazanaviro; amžius iki 18 metų; nėštumas arba kūdikio žindymas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu dėl rėmens arba virškinimo sutrikimo gydotės ilgiau kaip 4 savaites; esate vyresnis kaip 55 metai ir kasdien vartojate nereceptinius vaistus dėl sutrikusio virškinimo; atsirado naujų simptomų arba simptomai neseniai pasikeitė; anksčiau sirgote skrandžio opalige arba buvo atlikta skrandžio operacija; sutrikusi kepenų veikla arba atsirado gelta; numatoma atlikti endoskopiją arba C-šlapalo mėginį. Jeigu numatyta atlikti kraujo mėginį, pasakykite gydytojui, kad vartojate šį vaistą. Atsirūgimo ir rėmens simptomai gali palengvėti pavartojus „Panzilan“ vos vieną dieną, tačiau šis vaistas neturi sukelti pagerėjimo nedelsiant. Jo negalima vartoti profilaktikai. Jei Jums gydytojas sakė, kad netoleruojate kai kurių angliavandenių, prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su gydytoju. „Panzilan“ sudėtyje yra sojų lecitino. Jei esate alergiškas žemės riešutams ar sojai, vaisto vartoti negalima.

UŽGESINK GAISRĄ SKRANDYJE!

7,99 €



VOLTAREN EMULGEL 23,2 MG/G gelis, 50g

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Diklofenako dietilaminas. **Indikacijos.** Suaugusiesiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: skausmo ir uždegimo mažinimas, kai yra minkštųjų audinių sužalojimas (sausgyslių, raiščių, raumenų ir sąnarių trauma, pavyzdžiui, patempimas, sumušimas); vietinis minkštųjų audinių uždegimas (nugaros skausmas, tendinitas, bursitas). Tik suaugusiesiems (18 m. ir vyresniems): sąnarių (pvz., kelių) degeneracinės ligos sukeltam skausmui malšinti. **Vartojimas.** Vartoti ant odos. Tepti 2 k. per parą (geriausia ryte ir vakare). Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje. **Kontraindikacijos.** Alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitiems vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo; paskutinis nėštumo trimestras; jaunesniems kaip 14 m. paaugliams. **Specialūs įspėjimai.** Netepti ant pažeistos odos, atviros žaizdos, odos išbėrimo ar egzemos vietos, didelių odos plotų, saugoti, kad nepatektų į akis ir ant gleivinės, pvz., burnos, nenuryti. Jeigu pasireiškia bėrimas, gydymą nutraukti; nenaudoti su oro nepraleidžiančiais tvarsčiais. Sudėtyje yra propilenglikolio ir butilhidroksitolueno. Teksto parengimo data 02/2023. Prekių ženklai priklauso GSK arba GSK turi jiems licenciją. ©2023 GSK arba licencijos turėtojas. NP-LT-VOLT-23-00001

EFEKTYVI PAGALBA ESANT SUMUŠIMUI, PATEMPIMUI, PANIRIMUI

8,99 €



TRAUMEEL S tepalas, 50,0 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS

100 g tepalo yra veikliųjų medžiagų: *Arnica montana* D3 1,5 g, *Calendula officinalis* Ø 0,45 g, *Hamamelis virginiana* Ø 0,45 g, *Echinacea angustifolia* Ø 0,15 g, *Echinacea purpurea* Ø 0,15 g, *Chamomilla recutita* Ø 0,15 g, *Symphytum officinale* D4 0,1 g, *Bellis perennis* Ø 0,1 g, *Hypericum perforatum* D6 0,09 g, *Achillea millefolium* Ø 0,09 g, *Aconitum napellus* D1 0,05 g, *Atropa belladonna* D1 0,05 g, *Mercurius solubilis Hahnemanni* D6 0,04 g, *Hepar sulfuris* D6 0,025 g. **Terapinės indikacijos.** Bukų traumų (pvz., raiščių patempimo, sumušimo, panirimo, mėlynių), kaulų ir sąnarių degeneracijos simptominis gydymas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 m. vaikams, 0–2 m. vaikams, 2–6 m. vaikams, 6–12 m. vaikams: vartoti 2 kartus per dieną arba, jei reikia, dažniau. Vartoti ant odos. Patepti plonu sluoksniu pažeistą vietą. Ant gydomos vietos galima uždėti tvarstį. „Traumeel S" tepalu negalima tepti didelio ploto, vartoti ilgai arba tepti tiesiai ant atvirų žaizdų. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms, pvz., kalninei arnikai (*Arnica montana*), vaistinei ramunei (*Chamomilla recutita*), paprastajai kraujažolei (*Achillea millefolium*), kitiems astrinių (graižažiedžių) šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Tepalo sudėtyje yra cetostearilo alkoholio. Cetostearilo alkoholis gali sukelti lokalią (vietinę) odos reakciją (pvz., kontaktinį dermatitą). Sudėtyje yra 13,8 % (V/V) etanolio. Kiekvienam šio vaistinio preparato grame yra 111 mg alkoholio (etanolio), tai atitinka 11,1% m/m. Ant pažeistos odos etanolis gali sukelti deginimo pojūtį. Reikia saugotis, kad tepalo nepatektų į akis, ant gleivinės, atvirų žaizdų ar pažeistos odos. Netepti tepalu didelio ploto. **Registruotojas.** „Biologische Heilmittel Heel GmbH" (Vokietija). **Registruotojo atstovas.** UAB „Farmahelis". Reklamos teksto parengimo data 2024-09-02.

AKIŲ DIRGINIMO, AŠAROJIMO, PERVARGIMO, VOKŲ KRAŠTŲ UŽDEGIMO LENGVINIMAS

8,99 €



OCULOHEEL, 3 paketėliai, kurių kiekviename yra 5 vienadozės talpyklės.

AKIŲ LAŠAI (TIRPALAS)

HOMEOPATINIS NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 talpyklėje (0,45 ml tirpalo) yra veikliųjų medžiagų: *Euphrasia* D5 110,7 mg, *Cochlearia officinalis* D5 110,7 mg, *Pilocarpus* D5 110,7 mg, *Echinacea* D5 110,7 mg.

Terapinės indikacijos. Akių dirginimo, ašarojimo, smėlio akyse pojūčio, pervargimo, jautrumo šviesai ir vokų kraštų uždegimo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas. Vaikams nuo 6 m. ir suaugusiems žmonėms paprastai reikia lašinti į pažeistą akį po 1 lašą 3 kartus per dieną. Jei vartojama ir kitokių akių lašų, tarp jų ir **„Oculoheel"** akių lašų vartojimo rekomenduojama daryti 15 minučių pertrauką. Kadangi šio vaistinio preparato sudėtyje yra ežiuolės (*Echinacea*), prieš skiriant jo ilgesniam kaip 8 savaičių laikotarpiui, rekomenduojamas individualus įvertinimas. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, arba astrinių (graižažiedžių) šeimos augalams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** *Pagalbinės medžiagos.* Fosfatiniai buferiai. Kiekvienoje šio vaistinio preparato vienadozėje talpyklėje yra 2,81 mg fosfatų, tai atitinka 6,25 mg/g. Kadangi šio vaistinio preparato sudėtyje yra ežiuolės (*Echinacea*), prieš skiriant jo pacientams, turintiems imuninės sistemos funkcijos sutrikimų (pvz., progresuojančių sisteminių sutrikimų, autoimuninių ligų, imunodeficito, imunosupresijos ir baltųjų kraujo ląstelių sistemos ligų atvejais), rekomenduojamas individualus įvertinimas. Talpyklės turinį galima vartoti tik 1 kartą, t. y. kartą lašinti į kairiąją ir (arba) dešiniąją akį tiek, kiek reikia. Talpyklę reikia atidaryti tik prieš pat vaisto vartojimą. Naudotą talpyklę reikia išmesti, net jeigu joje yra vaistinio preparato likučių. **Registruotojas.** „Biologische Heilmittel Heel GmbH" (Vokietija). **Registruotojo atstovas.** UAB „Farmahelis". Reklamos teksto parengimo data 2024-09-03.

6,99 €



STREPSILS

STREPSILS HONEY & LEMON, 1,2 mg/0,6 mg, 24 kietosios pastilės

STREPSILS MENTHOL & EUCALYPTUS, 1,2 mg/0,6 mg/8 mg, 24 kietosios pastilės

STREPSILS VITAMIN C, 1,2 mg/0,6 mg/100 mg, 24 kietosios pastilės

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 1,2 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio, 0,6 mg amilmetakrezolio, 100 mg askorbo rūgšties („Strepsils Vitamin C") ir 8 mg levomentolio („Strepsils Menthol & Eucalyptus"). Terapinės indikacijos: lokalus simptominis ryklės uždegimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Strepsils Honey & Lemon" ir „Strepsils Vitamin C": *suaugusiesiems ir vyresniems nei 6 m. amžiaus vaikams bei paaugliams:* 1 kietoji pastilė kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 8 kietosios pastilės per 24 val. „Strepsils Menthol & Eucalyptus": *suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. amžiaus vaikams bei paaugliams:* 1 kietoji pastilė kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 8 kietosios pastilės per 24 val. Vartoti į burną ir ryklę. Kietąjai pastilei leisti lėtai ištirpti burnoje. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šių vaistų medžiagai; jaunesniems nei 12 m. vaikams („Strepsils Menthol & Eucalyptus"); jaunesniems nei 6 m. vaikams („Strepsils Honey & Lemon" ir „Strepsils Vitamin C"). Specialūs įspėjimai: dėl užspringimo pavojaus nerekomenduojama vartoti mažiems vaikams. Šių vaistų negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. „Strepsils Vitamin C" sudėtyje yra azodažiklių – Ponso 4R (E124) ir saulėlydžio geltonojo (E110), kurie gali sukelti alerginių reakcijų. Jeigu pacientas yra alergiškas kviečiams (ši liga skiriasi nuo celiakijos), tuomet šių vaistų vartoti negalima. „Strepsils Honey & Lemon" ir „Strepsils Vitamin C" kvapiosios medžiagos sudėtyje yra citralio, citronelolio („Strepsils Vitamin C" sudėtyje), d-limoneno, geraniolio ir linalolio. Citralis, d-limonenas, geraniolis ir linalolis gali sukelti alerginių reakcijų. „Strepsils Menthol & Eucalyptus" kvapiosios medžiagos sudėtyje yra d-limoneno. D-limonenas gali sukelti alerginių reakcijų. Šių vaistų sudėtyje yra sieros dioksido (E220). Retais atvejais gali sukelti sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų ir bronchų spazmą. Reklamos teksto parengimo data 2024-09-04.

NORMALIZUOJA ŽARNYNO VEIKLĄ

6,99 €



LINEX® 16 kietųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje yra ne mažiau kaip 1,2 x 107 KSV liofilizuotų gyvybingų bakterijų (*Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium infantis*, *Enterococcus faecium*). **Terapinės indikacijos:** viduriavimui, pilvo pūtimui ar kitokiam virškinimo sutrikimui gydyti kaip pagalbinė priemonė. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** mažesniems kaip 2 metų vaikams gerti po 1 kapsulę 3 kartus per dieną, 2–12 metų vaikams – po 1–2 kapsules 3 kartus per dieną, o vyresniems nei 12 metų – po 2 kapsules 3 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** padidėjes jautrumas veikliajai medžiagai, pieno baltymams ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** specialių atsargumo priemonių reikia, jei išmatose yra kraujo ar gleivių. „Sandoz Pharmaceuticals d.d." filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2403136080. Teksto patvirtinimo data: 2024-03-13.

SKAUSMUI MALŠINTI

3,49 €



MIALDEX 25 mg, 10 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. „mialdex" yra vaistas skausmui malšinti, priklausantis nesteroidinių vaistų nuo uždegimo grupei (NVNU). **„mialdex"** veikliojoje medžiaga yra deksketoprofenas (deksketoprofeno trometamolio pavidalu). **„mialdex"** vartojamas lengvo ir vidutinio stiprumo raumenų skausmui, skausminių mėnesinių, dantų skausmui malšinti. **Vartojimas:** visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkė. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Įprastinė vaisto dozė yra pusė tabletės (12,5 mg) kas 4–6 valandas arba 1 tabletė (25 mg) kas 8 valandos, bet ne daugiau kaip 3 tabletes per parą (75 mg). **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija (padidėjes jautrumas) deksketoprofeno trometamoliui arba bet kuriai pagalbinei **„mialdex"** medžiagai. **Įspėjimai:** jeigu sergate arba sirgote inkstų, kepenų ar širdies ligomis, širdies nepakankamumu, jeigu sergate kraujodaros sistemos ligomis; jeigu sergate sistemine raudonąja vilklige ar mišriomis jungiamojo audinio ligomis; jeigu sergate arba sirgote virškinimo trakto ligomis pasikonsultuokite su gydytoju. **Galimas šalutinis poveikis:** šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Reklamos teksto parengimo data: 2022.11.17

SUPERPASIŪLYMAI!

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis



2,99 €



NEOCITRAMONAS, 240 mg/200 mg/30 mg tabletės, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje tabletėje yra 240 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg paracetamolio ir 30 mg kofeino. **Terapinės indikacijos:** vaistas vartojamas trumpalaikio lengvo ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių ir menstruacinio skausmo malšinimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tabletes reikia vartoti nekramtant, užgeriant ne mažesniu kaip 250 ml vandens kiekiu. Priklausomai nuo ligos sunkumo vartoti po 1 tabletę 1–4 kartus per dieną. Didžiausia paros dozė - 4 tabletės. Negalima vaisto vartoti dažniau kaip kas 6 valandas ir ilgiau kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, esanti ar buvusi virškinamojo trakto opa ir (arba) kraujavimas iš virškinimo trakto, buvusi bronchų astma, kurią sukėlė salicilatai ar kitokie nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, pacientas jaunesnis negu 12 metų, trys paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas, ligos, kurių metu yra padidėjes kraujavimo pavojus, kraujo krešėjimo sutrikimas, vartojama 15 mg ar didesnė metotreksato savaitės dozė, sunkus širdies, kepenų, inkstų nepakankamumas, labai sunki aukšto kraujo spaudimo liga, kamuoja nemiga, padidėjes nervingumas, dirglumas, nerimas, baimė, sujaudinimas ar panašūs simptomai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergama podagra, bronchų astma, kolagenozėmis ar kraujodaros sistemos ligomis, yra sustiprėjusi skydliaukės veikla ar sergama cukriniu diabetu, yra virškinimo trakto, inkstų, kepenų ar širdies funkcijos sutrikimų, yra buvusi alergija kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, planuojama chirurginė operacija, pacientas yra jaunesnis kaip 16 metų ir serga virusinėmis ligomis, pacientas yra senyvas, planuojama pastoti, pakinta šlapimo kiekis, pasireiškia pabrinkimų ar skausmas juosmens srityje, pagelsta oda ar akys, patamsėja šlapimas, atsiranda bendras silpnumas, yra nerimo sutrikimas, panikos sutrikimas ar nemiga. Sudėtyje esantis kofeinas gali sukelti dirglumą, dažną širdies plakimą, viduriavimą, susijaudinimą, stiprų širdies plakimą, nemigą, galvos skausmą, raumenų trūkčiojimą ir šlapimo išsiskyrimo padidėjimą. **Reklamos teksto parengimo data:** 2023 04 27

KOJŲ VENOMS

15,99 €



VELIOS 1000 mg plėvele dengtos tabletės, 30 tablečių

PATOGI DOZĖ. TIK VIENA TABLETĖ PER PARĄ

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikloji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra **1000 mg** mikronizuoto diosmino. **Terapinės indikacijos:** suaugusiųjų lėtinio veninės kraujotakos nepakankamumo simptomų gydymui, esant: apatinių galūnių venų varikozei, venų opoms, telangiektazijoms ir retikulinėms varikozėms ar venoms, sunkumui, nuovargiui, diskomfortui ar neramių kojų pojūčiui, kojų skausmui ar deginimo pojūčiui, šaltų kojų pojūčiui, naktiniam kojų mėšlungiui, apatinių galūnių patinimui, niežuliui, parestezijai (odos dilgčiojimui, badymui ar niežėjimui), odos eritemai ar cianozei. Suaugusiųjų paūmėjusio hemorojaus simptomų gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** lėtinio veninės kraujotakos nepakankamumo simptominiam gydymui **1 tabletė per parą** valgio metu, vartoti bent 4-5 savaites. Paūmėjusio hemorojaus simptominiam gydymui, pirmąsias 4 dienas gerti 3 tabletes per parą, 3 vėlesnes dienas – po 2 tabletes per parą, gydymas turi būti trumpalaikis. Vartoti per burną. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija diosminui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** paūmėjus hemorojaus simptomams, reikia prisiminti, kad „VELIOS" veikia tik simptomus ir turi būti vartojamas trumpai. Jei simptomai nepraeina, reikia atlikti tiesiosios žarnos tyrimą ir parinkti tinkamą gydymą. VELIOS nėra veiksmingas gydant su staziniu širdies nepakankamumu susijusią edemą. VELIOS plėvele dengtų tablečių turi nevartoti pacientai, kuriems yra širdies nepakankamumas. Kai sutrikusi kojų veninė kraujotaka, „VELIOS" gydomąjį poveikį gali sustiprinti saulės bei ilgalaikio stovėjimo vengimas, tinkamo kūno svorio palaikymas, specialių kojinių nešiojimas. Kai apatinės kojų dalys patinusios dėl širdies, inkstų arba kepenų ligos, šis vaistas nepadeda. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. „VELIOS" sudėtyje yra saulėlydžio geltonojo dažalo (E110), kuris gali sukelti alerginių reakcijų. Reklamos teksto parengimo data: 2023 04 23.

PAJUSK KOJŲ LENGVUMĄ.

KOSULIUI LENGVINTI

6,99 €



STODAL Sirupas, 200 ml

HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: *Antimonium tartaricum* 6CH, 59,375 mg, *Bryonia* 3CH, 59,375 mg, *Coccuc cacti* 3CH, 59,375 mg, *Drosera* TM, 59,375 mg, *Ipeca* 3CH, 59,375 mg, *Myocarde* 6CH, 59,375 mg, *Pulsatilla* 6CH, 59,375 mg, *Rumex crispus* 6CH, 59,375 mg, *Spongia tosta* 3CH, 59,375 mg, *Sticta pulmonaria* 3CH, 59,375 mg. **Indikacijos:** kosulio lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms ir paaugliams po 15 ml matavimo taurelę 3–5 kartus per parą; vaikams (2–12 m.) po 5 ml matavimo taurelę 3–5 kartus per parą. Vaistinio preparato sudėtyje yra etanolio, todėl vaikams iki 2 m. vartoti negalima. **Kontraindikacijos:** padidėjes jautrumas veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** Šio vaistinio preparato sudėtyje yra 1,74 tūrio % etanolio (alkoholio). Vienoje 5 ml dozėje yra 0,069 g etanolio ir vienoje 15 ml dozėje yra 0,206 g etanolio. Kenksminga sergantiesiems alkoholizmu. Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir didelės rizikos grupės (pvz., sergantiesiems kepenų ligomis ar epilepsija) pacientams. Negalima ilgiau kaip savaitę vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams, nes sudėtyje yra etanolio. Vienoje 5 ml dozėje yra 3,75 g sacharozės ir vienoje 15 ml dozėje yra 11,25 g sacharozės. Į tai reikia atsižvelgti gydant sergančiuosius cukriniu diabetu. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Teksto parengimo data 2018-11.

PRASIDEDA KOSULYS? VARTOK „STODAL" IR JIS IŠNYKS!

NAGŲ GRYBELIUI GYDYTI

24,99 €



ONYTEC®, 80 mg/g, vaistinis nagų lakas, 3,3 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliojі medžiaga: 1 g vaistinio nagų lako yra 80 mg ciklopirokso. Terapinės indikacijos: „Onytec®" gydomos lengvos ar vidutinio sunkumo grybelių sukeltos suaugusiųjų nagų ligos, neapimančios nago matricos, t. y. ménuliuko (balto nago pusmėnulio). Vartojimo būdas ir dozavimas: naudoti ant odos, tepti tik nagus ir odą aplink juos. Rekomenduojama 1 kartą per parą patepti pažeistą nagą (nagus), aplink esančią odą bei panagę. Nenuplauti mažiausiai 6 valandas. **Nagų lako „Onytec®" nereikia pašalinti tirpikliais ar šlifuojančiomis priemonėmis.** Gydymą tęsti, kol problema išnyksta ir atauga sveikas nagas. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija ciklopiroksui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Ne jaunesniems nei 18 metų pacientams. Specialūs įspėjimai: vengti preparato patekimo į akis ar ant gleivinių. „Onytec®" naudojamas tik išoriškai. Gydymą nagu nepoliruokite ir nenaudokite kitų nagų kosmetikos priemonių. Šis preparatas yra degus, saugokite nuo karščio ir atviros liepsnos. Reklamos teksto parengimo data 2024-02-20.

NEGAIŠK LAIKO NEEFEKTYVIAM GYDYMUI. RINKIS VAISTĄ „ONYTEC®"!

NUO MIGRENINIO GALVOS SKAUSMO

3,99 €



SUMATRIPTAN ACTAVIS,

50mg, 2 dengtos tabletės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tabletėje yra 50 mg sumatriptano (sumatriptano sukcinato pavidalu). **Terapinės indikacijos:** neatidėliotinas migrenos priepuolio, pasireiškiančio su aura ar be jos, gydymas suaugusiesiems, kuriems medicininiai patvirtinta migrenos diagnozė ir turintiems triptanų vartojimo patirties. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** prasidėjus migrenos priepuoliui, rekomenduojama sumatriptano dozė suaugusiam žmogui yra 50 mg. Kai kuriems pacientams gali reikėti 100 mg. Nevartokite daugiau kaip 100 mg sumatriptano (2 tabletės po 50 mg) per parą (24 val.). „Sumatriptan Actavis" negalima vartoti dažniau kaip 9 dienas per mėnesį. Pacientai, kuriems migreną malšinti prireikia dažniau, turėtų kreiptis į gydytoją dėl kitokio gydymo (migrenos profilaktikos). Jeigu pirma dozė migrenos simptomus palengvino, tačiau vėliau jie atsinaujino, 24 val. laikotarpiu tokią pačią dozę galima gerti antrą kartą, bet tarp dozių turi būti ne mažesnis nei 2 val. laiko tarpas. **Kontraindikacijos:** „Sumatriptan Actavis" vartoti negalima, jeigu yra alergija sumatriptanui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu buvo miokardo infarktas; jeigu sergate bet kokia širdies liga; jeigu yra simptomų, galinčių rodyti, kad yra širdies liga, pvz., laikinas krūtinės skausmas ar spaudimas; jeigu buvo smegenų insultas ar praeinančių smegenų išemijos priepuolių (PSI, maži insultai, trunkantys trumpiau negu 24 val.); jeigu yra kojų kraujotakos sutrikimas, sukeliantis į mėšlungį panašų skausmą vaikštant (periferinių kraujagyslių liga); jeigu reikšmingai didelis kraujospūdis arba kraujospūdis yra didelis, nepaisant vaistų vartojimo; jeigu labai susilpnėjusi kepenų veikla; jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų nuo migrenos, kuriuose yra ergotamino ar į jį panašių vaistų, tokių kaip metizergido maleatas, arba bet kurių triptano ar 5-hidroksitriptaminol (5-HT1) receptorių agonistų (tokių kaip almotriptanas, eletriptanas, frovatriptanas, naratriptanas, rizatriptanas ar zolmitriptanas); jeigu vartojate arba neseniai vartojote monoaminooksidazės (MAO) inhibitorių, pvz., moklobemido (vaisto nuo depresijos) ar selegilino (preparato nuo Parkinsono ligos); jeigu esate vyresnis negu 65 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Sumatriptan Actavis" galima vartoti tik tuo atveju, jeigu nustatyta, kad galvos skausmas tikrai yra migreninis. Pavartojus „Sumatriptan Actavis", gali pasireikšti laikinas krūtinės skausmas ir spaudimas, kurie gali būti gana stiprūs ir plintantys į gerklę. Labai retais atvejais šių simptomų priežastis gali būti vaisto poveikis širdžiai. Jeigu jie neišnyksta, reikia kreiptis į gydytoją. Atsargumo priemonės reikalingos pacientams, kurie serga vidutinio laipsnio kontroliuojama hipertenzija, moterims postmenopauzės periodu ar vyresniems negu 40 m. vyrams, kuriems yra širdies ligų rizikos veiksnių, pacientams, kuriems anksčiau yra buvę traukulių, arba esant kitiems rizikos veiksniams, kurie mažina smegenų traukulinio aktyvumo slenkstį, pacientams, vartojantiems SSRI. Ilgai nuo galvos skausmo vartojant bet kokių skausmą malšinančių preparatų, galvos skausmas gali sustiprėti. Pacientams, kuriems yra retas paveldimas sutrikimas, pvz., galaktozės netoleravimas, Lapp laktazės trūkumas ar gliukozės ir galaktozės malabsorbcija, šio medikamento vartoti negalima. **Reklamos teksto parengimo data** 2024-08. OTC-LT-00082

GYDO MIGRENINĮ GALVOS SKAUSMĄ

NUO 3,99 €



ALIFLUSIN

ALIFLUSIN 500 mg/200 mg/4 mg šnypščiosios tabletės, 10 tablečių **3,99 €**
ALIFLUSIN 500 mg/200 mg/4 mg šnypščiosios tabletės, 20 tablečių **5,99 €**
ALIFLUSIN 500 mg/200 mg/4 mg šnypščiosios granulės, 10 paketėlių **4,99 €**
ALIFLUSIN 500 mg/200 mg/4 mg šnypščiosios granulės, 20 paketėlių **6,99 €**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

paracetamolis / askorbo rūgštis / chlorfenamino maleatas

„Aliflusin" sudėtyje yra 3 veikliosios medžiagos: paracetamolis, turintis skausmą malšinantį ir karščiavimą mažinantį poveikį, chlorfenamino maleatas, mažinantis išskyrų iš nosies, slopinantis čiaudėjimo refleksą ir akių ašarojimą, bei askorbo rūgštis, papildanti vitamino C trūkumą organizme.

Vaistas skirtas trumpalaikiam gripo, peršalimo ir į gripą panašios būklės simptomų, tokių kaip galvos skausmas, karščiavimas, ryklės (gerklės) skausmas, ypač lydimas slogos gydymui. Negalima vartoti kartu su kitais vaistais peršalimui ir gripui gydyti. Vartojimas suaugusiesiems ir vyresniems kaip 15 metų paaugliams: rekomenduojama vienkartinė dozė yra 1 šnypščiojі tabletė arba 1 paketėlis šnypščiųjų granulių (500 mg paracetamolio, 200 mg askorbo rūgšties ir 4 mg chlorofenamino maleato) iki 3 kartų per parą pagal poreikį, tarp dozių išlaikant bent 4 valandų tarpą. Negalima viršyti didžiausios paros dozės 3 šnypščiųjų tablečių arba 3 paketėlių šnypščiųjų granulių (1 500 mg paracetamolio, 600 mg askorbo rūgšties ir 12 mg chlorofenamino maleato) per 24 valandas. Vartoti per burną. Nepasitarus su gydytoju šio vaisto negalima vartoti ilgiau kaip 3 dienas mažinant karščiavimą ir 5 dienas malšinant skausmą (vyresniems kaip 15 metų paaugliams – 3 dienas). Šį vaistą reikia vartoti, kai atsiranda skausmas ir karščiavimas. Jei jie pranyksta, vaisto vartojimą reikia nutraukti. Šnypščiąją tabletę arba paketėlį šnypščiųjų granulių reikia ištirpinti stiklinėje šilto vandens. Išgerti iškart po paruošimo. Gamintojo atstovas UAB „Natur Produkt Vilnius", Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius.

NUO **1**[99] €



NUROFEN 200 mg, 12 tablečių **1[99] €**
NUROFEN FORTE 400 mg, 12 tablečių **2[79] €**
NUROFEN FORTE EXPRESS 400 mg, 12 tablečių **2[99] €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

NUROFEN sudėtyje yra 200 mg ibuprofeno. **NUROFEN FORTE ir NUROFEN FORTE EXPRESS** sudėtyje yra 400 mg ibuprofeno. **Terapinės indikacijos.** Trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių, menesinių sukelto skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. **NUROFEN dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams pradinė dozė yra 2 tabletės, užgeriant vandeniu. Po to, jei reikia, gerti po 1-2 tabletes kas 4 valandas. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 6 tabletes (1200 mg). **NUROFEN FORTE ir NUROFEN FORTE EXPRESS dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams pradinė dozė yra 1 tabletė, užgeriant vandeniu. Po to, jei reikia, gerti po vieną tabletę kas 8 valandas. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 3 tabletes (1200 mg). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai; jei praeityje yra buvę padidėjusio jautrumo reakciju (astma, rinitas, angioneurozinis patrinkimas, dilgėlinė); sunkus kepenų, inkstų, širdies nepakankamumas; paskutinis trijų nėštumo mėnesių laikotarpis; esama ar buvusi pepsinė opa (du ar daugiau atskirų įrodytų išopėjimo ar kraujavimo epizodų); buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; kraujavimas į smegenis, virškinimo traktą arba kitoks kraujavimas; jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai.** Reikia atsargiai vartoti pacientams, kuriems yra sisteminė raudonoji vilkligė; anksčiau buvo padidėjęs kraujospūdis ir (arba) širdies nepakankamumas; jei yra nesunkus inkstų pakenkimas ar inkstų funkcijos pablogėjimas; jei yra nesunkūs kepenų funkcijos sutrikimai; pacientams, kurie sirgo opiniu kolitu, Krono liga; pacientams, kurie vartoja kraują skystinančių vaistinių preparatų bei vaistų, galinčių padidinti išopėjimo ar kraujavimo pavojų. Retais atvejais pastebėta sunkių odos reakcijų (kai kurios iš jų buvo mirtinos), įskaitant eksfoliacinį dermatitą, Stivenso-Džonsono (Stevens-Johnson) sindromą bei toksinę epidermio nekrolizę - Lajelio (Lyell) sindromą, susijusių su NVNU vartojimu. Gauta pranešimų apie ūminės generalizuotos egzanteminės pustuliozės (ŪGEP) atvejus. Pasireiškus pirmiesiems sunkių odos reakcijų požymiams ir simptomams, pvz., odos išberimui, gleivinės pažeidimams ar kitiems padidėjusio jautrumo požymiams, ibuprofeno vartojimą reikia nutraukti. Šie vaistai gali būti susijes su nedideliu širdies priepuolio ("miokardo infarkto") ar insulto pavojaus padidėjimu. Šie vaistiniai preparatai gali maskuoti infekcijos simptomus, dėl to gali būti vėluojama pradėti tinkamą gydymą, o tai gali pablogínti infekcijos gydymo rezultatus. Šių vaistų negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Kiekvienoje tabletėje yra natrio, būtina atsižvelgti, jei kontroliuojamas natrio kiekis maiste. Reklamos tekstas parengtas 2024-02-08.

NERVŲ SISTEMAI

NUO **3**[99] €



NEUROMULTIVIT
20 plėvele dengtų tablečių **3[99] €**
100 plėvele dengtų tablečių **12[99] €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Indikacijos: „Neuromultivit" yra vitamino B_1, vitamino B_6 ir vitamino B_{12}, kurie yra ypač svarbūs užtikrinant normalias nervų sistemos medžiagų apykaitos funkcijas, derinys. Vartojant nervų sistemos ligų gydymui B grupės vitaminai atstato jų stoką organizme ir skatina nervinio audinio natūralų gijimo procesą. **„Neuromultivit"** vartojamas esant B grupės vitaminų stokos sukeltiems negalavimams. Vitaminas B_1 pasižymi skausmą malšinančiu poveikiu. **Vartojimas:** rekomenduojama dozė yra viena tabletė kartą per parą. Pavieniais atvejais paros dozę galima padidinti iki 3 tablečių. Tabletes reikia nuryti nesukramtytas po valgymo ir užsigerti trupučiu skysčio. **Kontraindikacijos:** retai pasitaiko nespecifiniu požymiu – vėmimas, galvos skausmas ir svaigulys. Mažiau tikėtinos padidėjusio jautrumo reakcijos, kurios vartojant vitaminus B_1 arba B_{12} dažniausiai reiškiasi požymiais odoje. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: „Neuromultivit"** vartoti negalima, jeigu yra padidėjes jautrumas vitaminui B_1, vitaminui B_6, vitaminui B_{12} arba bet kuriai pagalbinei **„Neuromultivit"** medžiagai. Negalima vartoti vaikams ir paaugliams (jaunesniems negu 18 metų) dėl per didelio veikliųjų medžiagų kiekio. Nedelsiant pranešti gydytojui, jei yra kontraindikacijų vaisto vartojimui, atsirado šalutinio poveikio požymių ar pastojote. Reikėtų vengti vartoti dideles vaisto dozes ilgiau nei 4 savaites. Vitaminas B_6 gali sumažinti kartu vartojamos *L-dopos* poveikį. **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:** G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. **Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį RTT atstovą:** UAB „GL Pharma Vilnius", A. Jakšto g. 12, Vilnius, tel. (8 5) 261 0705, el. paštas: office@gl-pharma.lt; www.gl-pharma.lt

7[99] €



NUROFLEX 200 mg vaistinis pleistras, 2 vaistiniai pleistrai

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekviename vaistiniame pleistre yra 200 mg ibuprofeno.

Farmacinė forma. Vaistinis pleistras: bespalvis, lipnus vaistinio preparato sluoksnis, paskirstytas ant 10 cm x 14 cm dydžio lankstaus kūno spalvos austo pagrindo, ir padengtas nuimamu apsauginiu sluoksniu. **Terapinės indikacijos.** „Nuroflex" skirtas tumpalaikiam lokalaus skausmo, sukelto ūminio raumenų patempimo arba lengvų viršutinės ar apatinės galūnės sąnario aplinkos audinių traumų, simptominiam gydymui suaugusiesiems ir 16 metų ar vyresniems paaugliams. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiesiems ar 16 metų ir vyresniems paaugliams: viena dozė yra lygi vienam vaistiniam pleistrui. Didžiausia dozė per vieną 24 valandų laikotarpį yra vienas vaistinis pleistras. Pleistras gali būti vartojamas bet kuriuo dienos ar nakties metu, tačiau jį reikia nuimti ir naują pleistrą vėl užklijuoti kitą dieną tuo pačiu laiku. Vartoti ant odos ir tik trumpą laiką. Vaistinis pleistras turi būti naudojamas visas, jo negalima karpyti. Klijuojama tik ant sveikos odos. Gydomasis pleistras neturi būti vartojamas kartu su okliuziniu tvarsčiu. Prieš užklijuojant vaistinį pleistrą rekomenduojama kruopščiai nuplauti ir išdžiovinti gydomąjį kūno paviršių. Pirmiausia pašalinkite centrinę apsauginio sluoksnio dalį, skirtą apsaugoti lipniam pagrindo paviršiui, ir uždėkite pleistrą šia lipnia puse ant skaudančio ploto. Kai pleistras yra reikiamoje vietoje, pašalinkite apsauginio sluoksnio dalis, esančias pleistro kraštuose. Vaistinis pleistras yra lankstus ir paslankus, todėl prireikus gali būti užklijuotas ant arba šalia sąnario, tokiu būdu leisdamas jam normaliai judėti. Venkite vaistinio pleistro drėkinimo. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai vaisto pagalbinei medžiagai. Jeigu praeityje yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijų (pvz., astma, bronchų spazmas, rinitas, angioneurozinė edema ar dilgėlinė) vartojant ibuprofeno, acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistinių preparatų nuo uždegimo (NVNU). Vartojimas ant įtrūkusios ar pažeistos odos. Trečiasis nėštumo trimestras. Vartojimas ant akių, lūpų ar gleivinių. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei simptomai išlieka ilgiau nei 5 paras arba pablogėja, reikia pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu. Bronchų spazmas gali pasireikšti pacientams, vartojantiems ibuprofeno, kurie serga arba anksčiau sirgo bronchine astma ar alergija. Gydymą reikia nedelsiant nutraukti, jei užklijavus vaistinį pleistrą atsiranda odos išbėrimas. Pacientai turi būti įspėjami apie gydomos zonos reakciją stipriems natūraliaus ir (arba) dirbtinio apšvietimo šaltiniams (pvz., įdegio lempos) gydymo metu ir vieną dieną po vaistinio pleistro pašalinimo, siekiant sumažinti jautrumo šviesai riziką. Pacientams, kuriems yra sutrikusi inkstų, širdies ir kepenų funkcija, buvo arba yra peptinė opa, žarnų uždegimas ar hemoraginė diatezė, prieš pradedant vartoti šį vaistinį preparatą, reikia kreiptis į gydytoją. Senyviems pacientams nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo turėtų būti vartojami atsargiai, nes jiems yra didesnė nepageidaujamų poveikių tikimybė. Reklamos tekstas parengtas 2024-04-15.

BURNOS INFEKCINĖMS LIGOMS GYDYTI

6[99] €



JOX 85/1 mg/ml burnos gleivinės, gerklų ir ryklės purškalas (tirpalas), 30 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 ml tirpalo yra 85 mg joduoto povidono ir 1 mg alantoino. **Terapinės indikacijos:** papildomas lokalus lengvų burnos ir ryklės infekcinių ligų faringito, stomatito, gingivito gydymas; papildomas bakterijų sukelto tonzilito gydymas kartu su antibiotikais; burnos ertmės infekcijos profilaktika ligoniams, kuriems atliekamos burnos ar ryklės operacijos. „Jox" purškalo gali vartoti suaugusieji ir vyresni kaip 8 m. vaikai. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 8 m. vaikams įprastinė dozė – purkšti 2–4 kartus per parą, bet jeigu būtina, galima vartoti ir dažniau (kas 4 val.), purkšti ne daugiau kaip 3 kartus į dešinę ir kairę burnos ertmės puses, bet ne daugiau kaip 6 kartus per parą. Pertrauka tarp atskirų įpurškimų turi būti ne mažesnė kaip 4 valandos. Vaistinio preparato negalima įkvėpti ar nuryti. **Kontraindikacijos:** padidėjes jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; inkstų funkcijos sutrikimas; dekompensuotas širdies nepakankamumas; nėštumo ir žindymo laikotarpis; 2 sav. prieš planuojamą tyrimą arba gydymą radioaktyviuoju jodu ir 2 sav. po to; nuolat vartoti ligoniams, kuriems diagnozuotas skydliaukės funkcijos sutrikimas; nuolat vartoti ligoniams, kurie kartu vartoja ličio vaistinių preparatų; jaunesniems kaip 8 m. vaikams (dėl farmacinės formos). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jeigu „Jox" atsitiktinai patenka į akis, jas reikia gerai nuplauti vandeniu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, „Jox" purškalą reikia vartoti atsargiai. Šiems pacientams preparatas gali sukelti kepenų transaminazių kiekio padidėjimą. Ligoniams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, „Jox" vartoti draudžiama. Vaistinio preparato vartoti ilgiau kaip 7 dienas negalima. Jeigu pasireiškia jautrumas arba nuolatinis lokalus dirginimas, vaistinio preparato vartojimą reikia nutraukti. Sergant laringitu, vaistinio preparato galima vartoti tik būtinu atveju. **Reklaminio teksto parengimo data** 2024-07. 0TC-LT-00080
„JOX" – VIENINTELIS TOKS!

VIRUSINIŲ PERŠALIMO LIGŲ SIMPTOMAMS LENGVINTI

NUO **6**[99] €



OSCILLOCOCCINUM
OSCILLOCOCCINUM, vienadozės talpyklės, 6 piliulės **6[99] €**
OSCILLOCOCCINUM, vienadozės talpyklės, 30 piliulių **24[99] €**

HOMEOPATINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 dozėje (1 g) yra 0,01 ml laukinių ančių (*Anas Barbariae*) kepenų ir širdies ekstrakto 200K potencijos. **Indikacijos:** virusinių peršalimo ligų simptomų lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Jei ligos eiga sunkesnė, jai gydyti reikia naudoti klinikiniais tyrimais patikrintas priemones. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** dozė priklauso nuo ligos stadijos. Inkubacijos laikotarpiu ir kai tik atsiranda simptomų – 1 dozė. Kartoti 2 ar 3 kartus kas 6 valandas. Sergant – 1 dozė 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare) 1–3 paras. 1 dozės turinį suberti po liežuviu ir leisti ištirpti. Vartojimas vaikams: prieš vartojimą piliules ištirpinti vandenyje. **Kontraindikacijos:** padidėjes jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Taip pat tiems, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Teksto parengimo data 2018-11.
NELEISK PERŠALIMUI TAVĘS ĮVEIKTI! „OSCILLOCOCCINUM"!

SKAUSMUI MALŠINTI

3[99] €



DICUNO 25 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 25 mg diklofenako kalio druskos. **Indikacijos:** „Dicuno" vartojamas ūminio lengvo ir vidutinio stiprumo skausmo, įskaitant ūminius migreninius galvos skausmus, simptomams gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 18 metų asmenims reikia gerti po 1–2 tabletes kas 4–6 valandas. Vartoti ne daugiau kaip 6 tabletes (150 mg) per parą. Tabletę reikia nuryti užgeriant stikline vandens. **Kontraindikacijos:** „Dicuno, 25 mg" nevartoti, jeigu yra alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu jums kada nors buvo ar yra skrandžio arba žarnyno opa; jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto arba jo prakiurimas dėl skausmą mažinančių vaistų vartojimo (NVNU); jeigu yra labai sutrikusi kepenų funkcija; jeigu sergate porfirija (medžiagų apykaitos liga); jeigu sergate sunkia inkstų liga; jeigu Jums nustatyta širdies liga ir (arba) galvos smegenų kraujagyslių liga, pavyzdžiui, jeigu Jūs patyrėte širdies smūgį, insultą, „mikroinsultą" (praeinantį smegenų išemijos priepuolį) arba Jums buvo užsikimšusios širdies ar galvos smegenų kraujagyslės, arba Jums buvo atlikta operacija siekiant išvalyti arba šuntuoti užsikimšusias kraujagysles; jeigu Jums yra arba anksčiau buvo sutrikusi kraujotaka (periferinių arterijų liga); jei pacientas yra jaunesnis kaip 18 metų vaikas ar paauglys; per paskutinius tris nėštumo mėnesius; jeigu vaistai nuo skausmo, kurių sudėtyje yra acetilsalicilo rūgšties, arba kiti NVNU grupės (nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo) vaistai nuo skausmo / uždegimo anksčiau buvo sukėlę alerginę reakciją, tokią kaip astmos priepuolis, čiaudulys ar bėrimas. Nėščiosioms draudžiama vartoti „Dicuno" per paskutinius tris nėštumo mėnesius. Kitu nėštumo laikotarpiu „Dicuno" galima vartoti tik tuo atveju, jei paskyrė gydytojas. **Įspėjimai ir atsargumo priemonės:** prieš pradėdami gydymą pasitarkite su gydytoju, jei sergate ar sirgote bet kuria iš toliau išvardintų ligų: uždeginė žarnų liga (opinis kolitas, Krono (Crohn) liga); astma, širdies liga, kepenų ar inkstų liga; lėtinė obstrukcinė plaučių liga arba lėtinis kvėpavimo takų uždegimas; nosies gleivinės uždegimas; sisteminė raudonoji vilkligė; dilgėlinė arba angioneurozinė edema; ligos, sukeliačios padidėjusį polinkį kraujuoti; kepenų porfirija. Teksto parengimo data: 2023-05-11. Atidžiai perskaitykite informacinį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama jums svarbi informacija.

SUPERPASIŪLYMAI!

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis



NERVINĖS ĮTAMPOS MAŽINIMAS IR UŽMIGIMO LENGVINIMAS

4 99 €



PERSEN

PERSEN, 40 dengtų tablečių.

PERSEN FORTE, 20 kietųjų kapsulių.

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas. PERSEN tabletėje yra 35 mg valerijonų šaknų sausojo alkoholinio ekstrakto, 17,5 mg melisų lapų sausojo ekstrakto, 17,5 mg pipirmėčių lapų sausojo ekstrakto. **PERSEN FORTE** kapsulėje yra 87,5 mg valerijonų šaknų sausojo alkoholinio ekstrakto, 17,5 mg melisų lapų sausojo ekstrakto,17,5 mg pipirmėčių lapų sausojo ekstrakto. **Indikacijos.** Vartoti laikinos nedidelės nervinės įtampos mažinimui, pasunkėjusio užmigimo lengvinimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas. PERSEN:** Nervinės įtampos atveju reikia gerti po 3-4 PERSEN tab. 3 kartus per parą. Pasunkėjusio užmigimo atveju reikia gerti 3-4 PERSEN tab. 1 kartą per parą 1 val. prieš miegą. Tabletes reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai nuo valgymo laiko. **PERSEN FORTE:** Nervinės įtampos mažinimui reikia gerti po 2 PERSEN FORTE kaps. 2 kartus per parą. Pasunkėjusio užmigimo atveju reikia gerti 2 PERSEN FORTE kaps. 1 kartą per parą 1 val. prieš miegą. Kapsules reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai nuo valgymo laiko. PERSEN ir PERSEN FORTE pradeda veikti palaipsniui, kad gydymo veiksmingumas būtų optimalus, vaisto rekomenduojama gerti mažiausiai 14 dienų. Gydymo trukmė neribojama. PERSEN ir PERSEN FORTE nėra skirtas jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** PERSEN tabletėje sudėtyje yra laktozės ir sacharozės. PERSEN FORTE kapsulių sudėtyje yra laktozės. Reklamos teksto parengimo data: 2022 m. gruodžio mėn. ID000557059

„PERSEN“ - NURAMINK SAVO RŪPESČIUS!

3 99 €



OMEPRAZOLE NORD 20 MG,

14 skrandyje neirių kietųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
Kas yra „Omeprazole Nord“ ir kam jis vartojamas. „Omeprazole Nord“ kapsulių sudėtyje yra veikliosios medžiagos omeprazolo, kuri priklauso vaistų, vadinamų protonų siurblio inhibitoriais, grupei. Šie vaistai mažina rūgšties gamybą skrandyje. „Omeprazole Nord“ vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refliukso simptomų (rėmens ir rūgšties atpylimo) gydymui. Kas žinotina prieš vartojant „Omeprazole Nord“. „Omeprazole Nord“ vartoti negalima: jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) omeprazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje). Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Omeprazole Nord“. „Omeprazole Nord“ gali maskuoti kitų ligų simptomus, todėl tuojau pat pasikonsultuokite su gydytoju, jeigu prieš pradėdant vartoti „Omeprazole Nord“. Vaikams ir paaugliams. Šis vaistas jaunesniems kaip 18 metų pacientams netinka. Kiti vaistai ir „Omeprazole Nord“. Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Tai svarbu dėl to, kad „Omeprazole Nord“ gali keisti kai kurių kitų vaistų veikimą, o kai kurie kiti vaistai gali keisti „Omeprazole Nord“ veikimą. Galimas šalutinis poveikis. Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Tekstas paskutinį kartą peržiūrėtas 2021-03-12

NUO 5 99 €



BRONCHIPRET®

BRONCHIPRET®, 20 tablečių **5 99 €**

BRONCHIPRET® TP, 100 ml tirpalas **6 99 €**

NERECEPTINIAI AUGALINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Terapinės indikacijos: „Bronchipret® TP“ yra augalinis vaistas, skirtas ūminio bronchito sukelto drėgno kosulio priepuoliams retinti ir atsikosėjimui gerinti; **„Bronchipret®“ tabletės** yra augalinis vaistas, skirtas vartoti esant drėgnam kosuliui, siekiant palengvinti atkosėjimą klampiomis gleivėmis. **Veikliosios medžiagos ir stiprumas:** 1 plėvele dengtoje tabletėje yra 60 mg raktažolių šaknų sausojo ekstrakto ir 160 mg vaistinių čiobrelių žolės sausojo ekstrakto; 1 g tirpalo yra 150 mg vaistinių čiobrelių žolės skystojo ekstrakto, 15 mg gebenių lapų skystojo ekstrakto. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Bronchipret®“ tabletes suaugusiesiems gerti po 1 tabletę 3 kartus per parą; „Bronchipret® TP“ 1–5 m. amžiaus vaikams gerti po 3,2 ml, 6–11 m. amžiaus vaikams – po 4,3 ml, nuo 12 m. ir suaugusiesiems – po 5,4 ml 3 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas gebenėms, raktažolėms, čiobreliams ar kitiems notrelinių (lūpažiedžių) *Lamiaceae (Labiatae)* šeimos augalams, beržams, kiečiams, salierams arba kitoms preparato sudedamosioms dalims. **Specialūs įspėjimai:** jeigu simptomai išlieka ilgiau nei 1 savaitę arba jeigu prasideda dusulys, karščiavimas, o skrepliai tampa pūlingi arba juose atsiranda kraujo priemaišų, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Teksto parengimo data 2024-09-03.

KOSULYS? BRONCHITAS? „BRONCHIPRET®“!

NUO 4 99 €



SMECTA 3 G,

milteliai geriamajai suspensijai, 10 paketėlių **4 99 €**

SMECTA 3 G,

milteliai geriamajai suspensijai, 30 paketėlių **11 99 €**

Diosmektitas.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

„smecta“ 3 g milteliai geriamajai suspensijai. Sudėtis. Viename paketėlyje yra 3 g diosmektito. **Terapinės indikacijos.** Vaikų nuo 2 metų ir suaugusiųjų ūminio viduriavimo kartu su geriamaisiais rehidratuojančiais tirpalais bei suaugusiųjų lėtinio viduriavimo gydymui. Simptominiam suaugusiųjų skausmo, susijusio su funkciniais žarnyno sutrikimais, gydymui. **Dozavimas.** Ūminio viduriavimo gydymas. Vaikams nuo 2 metų: 6 gramai (2 paketėliai) per parą. Ūminio viduriavimo pradžioje (pirmąsias 3 dienas) ši dozė gali būti du kartus didesnė. Suaugusiesiems: 9 gramai (3 paketėliai) per parą. Ūminio viduriavimo pradžioje ši dozė gali būti du kartus didesnė. Ūminio viduriavimo epizodas paprastai trunka ne ilgiau kaip 7 dienas. Kitų ligų gydymas. Suaugusiesiems: vidutiniškai 9 g (3 paketėliai) per parą. Vartojimo metodas. Vartoti per burną. Paketėlio turinį reikia ištirpinti prieš pat vartojimą. Vaikams: paketėlio turinį reikia ištirpinti 50 ml vandens arba sumaišyti su pusiau skystu maistu (pvz., daržovių koše, sriuba, kompotu). Suaugusiesiems: paketėlio turinį reikia ištirpinti puodelyje stiklinės vandens. **Specialūs įspėjimai.** „smecta“ neskirtas vartoti kūdikiams ir vaikams iki 2 metų amžiaus. Gydant ūminį viduriavimą silpniems pacientams ir vaikams nuo 2 metų amžiaus, siekiant išvengti dehidratacijos, kartu būtina skirti geriamąsias rehidratuojančias druskas (GRD). Suaugusiesiems taip pat turi būti taikoma rehidratacija, jei ji reikalinga. GRD arba intraveninė rehidratacija turi būti skiriama atsižvelgiant į viduriavimo intensyvumą, paciento amžių ir klinikinę situaciją. Reikia apsvarstyti dėl tolimesnio „smecta“ vartojimo: jei po 3 ūminio viduriavimo dienų sutrikimas nepraeina; jei yra skausmas kartu su karščiavimu ir vėmimu. Reikia atsargiai skirti diosmektitą pacientams, kuriems praeityje yra buvę sunkių lėtinių vidurių užkietėjimo atvejų. Reikia vengti ilgalaikio „smecta“ vartojimo. „smecta“ sudėtyje yra gliukozės ir sacharozės. Būtina atsižvelgti cukriniu diabetu sergantiems pacientams. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Šio vaisto sudėtyje yra mažas etanolio kiekis (mažiau kaip 100 mg paros dozėje). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas (alergija) diosmektitui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Praneškite apie šalutinį poveikį registruotojo vietiniam atstovui Mayoly Baltics UAB, el. paštu: vigilance.BAL@mayoly.com. **Teksto peržiūros data:** 2024-01-01. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024 m. kovo mėn. SME-LT-2024-0010

NUO 4 99 €



TROXEVASIN

2 %, 40 g gelis **4 99 €**

2 %, 100 g gelis **9 99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Troxevasin“ 300 mg kietosios kapsulės. „Troxevasin“ 2 % gelis. Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 300 mg trokserutino. Viename grame gelio yra 20 mg trokserutino. **Indikacijos:** lėtinio venų nepakankamumo simptomų (kojų skausmo, sunkumo, patinimo) lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Troxevasin“ kapsulės –rekomenduojama pradinė dozė suaugusiems 600 mg (2 kapsulės) parai tolygiais intervalais. Gydoma kol išnyksta edema ir kiti simptomai, dažniausiai 2 sav. Palaikomoji dozė – 1 kapsulė (300 mg) per parą 2-4 sav. Maksimali paros dozė yra 1500 mg. Kapsules reiktų vartoti valgio metu, nes jos gali sukelti dispepsijos simptomus. „Troxevasin“ gelis – suaugusiems pacientams iš ryto ir vakare ligos pažeistą vietą reikia patepti nedideliu gelio kiekiu ir švelniai masažuoti tol, kol vaistinis preparatas visiškai įsigers į odą. Gydymo geliu veiksmingumas daugiausia priklauso nuo vaistinio preparato dozės, vartojimo reguliarumo ir trukmės (patariama vartoti ilgai). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Troxevasin“ kapsulių reikia atsargiai vartoti kepenų nepakankamumu ar tužies apytakos sutrikimu sergantiems pacientams. Vaistinis preparatas neveiksmingas gydant edemas, atsiradusias dėl kepenų, inkstų ar širdies-kraujagyslių sistemos ligų. Vaikams iki 18 metų troksertino vartoti nerekomenduojama, kadangi duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra. Kapsulių negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Esantis sudėtyje saulėlydžio geltonasis FCF (E110) gali sukelti alerginių reakcijų. „Troxevasin“ gelį galima vartoti tik ant nepažeistos odos. Juo negalima tepti atvirų žaizdų bei gleivinės, pvz., akių. Gelio sudėtyje yra benzalkonio chlorido, kuris gali sudirginti odą. Nesitikima, kad vartojimas nėštumo ir žindymo laikotarpiu gali būti susijęs su žalingu poveikiu motinai, kadangi benzalkonio chlorido absorbcija per odą yra minimali. **Reklaminės medžiagos parengimo data:** 2023 m. liepa. TROX-LT-00024

KAD KOJOS BŪTŲ LENGVOS! MĖGAUKITĖS TYRINĖDAMI PASAULĮ BE LĖTINIO VENŲ NEPAKANKAMUMO SUKELTŲ SIMPTOMŲ!

MAGNIO ŠALTINIS

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!** **10 99 €**



SUPMAGNIT,

30 pailginto atpalaidavimo trijų sluoksnių tablečių

MAISTO PAPILDAS

„Supmagnit“ – tai inovatyvios technologijos TRIJŲ SLUOKSNIŲ MAGNIO TABLETĖ, nulemianti geresnį magnio pasisavinimą. Trifazis magnio atsipalaidavimas: skirtingu laiku, skirtingose viršikinio trakto vietose. 1 tabletėje yra 364 mg elementinio magnio. Patogu vartoti – tik 1 tabletė per parą. Magnis yra gyvybiškai svarbus žmogaus organizmui. Jis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir normalią raumenų funkciją bei energijos apykaitą.



VAISTINĖ

NORFOS VAISTINĖJE GALITE PASISKIEPYTI NUO GRIPO

SKIEPO KAINA

18,99 €

SU **LOJALUMO KORTELE**

15,99 €

Nuolaidos taikomos su PC Norfa kortele.
Akcijos „Laimės valandos“ nuolaidos netaikomos.



Galima išankstinė registracija:
• internetu **www.nvaistine.lt/skiepai**
• telefonu **+370 800 10 008**

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**



VITADAY
VITAMINAS C 200 MG, 50 tablečių **4**^{49} **€**
GINTARO RŪGŠTIS, 10 tablečių **1**^{55} **€**
RIBOKSINAS, 50 tablečių **7**^{98} **€**
MAISTO PAPILDAI

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**



AMBIO
ŠIRDŽIAI, 100 ml **4**^{68} **€**
ŠIRDŽIAI, 30 kramtomųjų tablečių **7**^{28} **€**
OMEGA-3 ŠIRDŽIAI, 60 kapsulių **16**^{28} **€**
MAISTO PAPILDAI

-40% **4**^{55} **€** ~~7,43~~



RAMEVAL® 15 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
„Rameval®" – ramybės augalų puokštė lengvai nervinei įtampai, sukurta iš valerijonų, melisų, pipirinių mėtų, ramunių ir apynių.
„Rameval®" padeda:
- palaikyti normalią nervų sistemos būklę (vaistiniai valerijonai),
- atsipalaiduoti (vaistinės melisos, pipirinės mėtos, vaistinės ramunės),
- palengvinti užmigimą ir palaikyti miego kokybę (vaistinės melisos, paprastieji apyniai),
IEŠKAI RAMYBĖS? ATRASK JĄ SU RAMEVAL.

ATMINČIAI IR DĖMESIO KONCENTRACIJAI PAGERINTI

NUO **9**^{99} **€**



GINGIUM 120 MG, 30 plėvele dengtų tablečių **9**^{99} **€**
GINGIUM 120 MG, 60 plėvele dengtų tablečių **18**^{99} **€**
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 120 mg dviskiaučių ginkmedžių lapų ekstrakto. **Terapinės indikacijos:** vyresnio amžiaus žmonių lengvo ir vidutinio sunkumo smegenų kraujotakos nepakankamumo, protarpinio šlubavimo, galvos svaigimo simptomams mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** 1 tabletė 1– 2 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai ar pagalbinėms medžiagoms, nėštumas. **Specialūs įspėjimai:** neskirtas vartoti jaunesniems nei 18 metų žmonėms. „Sandoz Pharmaceuticals d.d." filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2403136089. Teksto patvirtinimo data: 2024-03-13.

IKI **-45%**

microlife
3 MAM IHB AFIB seris Insulto prevencija



MICROLIFE
MICROLIFE BPA7 TOUCH, automatinis kraujospūdžio matuoklis ~~99,99~~ **59**^{99} **€ -40 %**
MICROLIFE BP B6 CONNECT, automatinis kraujospūdžio matuoklis ~~94,99~~ **52**^{24} **€ -45 %**
MICROLIFE BP B3 COMFORT PC, automatinis kraujospūdžio matuoklis ~~84,99~~ **52**^{24} **€ -35 %**
MICROLIFE NEB400, inhaliatorius, meškiukas ~~78,99~~ **47**^{39} **€ -40 %**
MICROLIFE NEB 200, inhaliatorius ~~69,99~~ **48**^{99} **€ -30 %**
MICROLIFE NC 200, skaitmeninis bekontaktis termometras ~~45,95~~ **27**^{59} **€ -40 %**
MICROLIFE OXY 300, pulsoksimetras ~~47,99~~ **31**^{19} **€ -35 %**
„MICROLIFE" INOVATYVIOS TECHNOLOGIJOS

LAIMĖS VALANDOS

Darbo dienomis ir šeštadieniais
8-9 val. ir **14-15 val.***

Sekmadieniais
14-15 val.*



-30%
Perkant 3** ir daugiau prekių

-25%
Perkant 2* prekes

-20%
Perkant 1 prekę

**nereceptiniams vaistams -25%
receptiniams vaistams -20%

* vaistams -20%

Nuo 2023 m. spalio 23 d. NORFOS vaistinėje akcijos LAIMĖS VALANDOS metu perkant 1 prekę taikoma 20 % nuolaida, perkant 2 prekes – 25 % nuolaida, vaistams – 20 % nuolaida, o įsigyjant 3 ir daugiau prekių – 30 % nuolaida, nereceptiniams vaistams – 25 %, receptiniams – 20 % nuolaida.

Taikomos momentinės 20 % dydžio nuolaidos receptiniams vaistams, 20 ar 25 % nuolaidos nereceptiniams vaistams ir vaistiniams preparatams, o kitoms prekėms – 20, 25 arba 30 % nuolaidos, atsižvelgiant į atitinkamo pirkimo metu įsigyjamų prekių bendrą kiekį. Nuolaida taikoma perkant pilnas prekių pakuotes, kurių kiekvienos vertė arba priemoka ne mažesnė nei 1,50 euro. Prekės, perkamos su kompensuojamuoju receptu, įskaičiuojamos į įsigyjamų (perkamų) prekių krepšelį (kiekį), tačiau joms nuolaida netaikoma.

VAISTINĖ
VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaidos netaikomos perkant su kompensuojamuoju receptu, mokant už skiepus, taip pat pradinio maitinimo pieno mišiniams, kartiniams (gaminamiems vaistinėje) ir vardiniams vaistams, įsigyjant dovanų kuponus, pakavimo maišelius. Nuolaidos netaikomos perkant www.gintarine.lt, net jei už prekes atsiskaitoma jas atsiimant vaistinėse. Nuolaidos netaikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Visos nuolaidos galioja tik su PC NORFA lojalumo kortele.

Informaciją apie kitu nei nurodyta laiku vykstančias LAIMĖS VALANDAS rasite www.nvaistine.lt. Informacija apie kitas akcijas ir prekes, kurioms netaikomos akcijos LAIMĖS VALANDOS nuolaidos, suteikiama kiekvienoje vaistinėje, el. paštu info@nvaistine.lt arba nemokamu tel. 8 800 10008.

PERŠALIMUI IR IMUNITETUI

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis



7,35 €

THERAFLU

THERAFLU ND 1000 mg/60 mg/30 mg milteliai geriamajam tirpalui, 6 pakeliai

THERAFLU NT milteliai geriamajam tirpalui, 6 pakeliai



NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Indikacijos. „Theraflu ND“: peršalimo sukeltų simptomų (skausmo, nosies gleivinės uždurkimo, erzinančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. **„Theraflu NT“:** peršalimo sukeltų simptomų (skausmo, nosies gleivinės uždurkimo ir sekrecijos, čiaudulio, erzinančio kosulio, akių ašarojimo ir niežėjimo bei karščiavimo) lengvinimas. **Vartojimas.** Suaugusiems žmonėms bei 16 m. ir vyresniems paaugliams: gerti po 1 pak. kas 6 val. pagal poreikį. Negalima vartoti daugiau kaip 4 pak. per 24 val. Gydymo trukmė neturi viršyti 3 parų. 1 pak. turinį ištirpinti stiklinėje karšto, tačiau ne verdančio vandens (maždaug 250 ml). Vartoti per burną. **Kontraindikacijos.** Alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, jei vartojate ar per paskutines 2 sav. vartojote vaistų nuo depresijos arba Parkinsono ligos, vadinamų MAOI, vartojate kitų simpatomimetikų, yra užd aro kampo glaukoma (padidėjęs spaudimas akyje), nėštumo laikotarpis. **„Theraflu ND“:** labai aukštas kraujospūdis, širdies kraujagyslių liga, sunkus inkstų veiklos sutrikimas, yra kvėpavimo nepakankamumas, plaučių liga ar astmos priepuolis, jei vartojate oksazolidinono klasės antibiotikų, žindymo laikotarpis. **„Theraflu NT“:** sunki širdies liga, kepenų ar inkstų veiklos sutrikimas. **Specialūs įspėjimai.** Nevartoti kitų vaistų, kuriuose yra paracetamolio. Nevartoti alkoholio. Pasitarti su gydytoju, jei yra inkstų ar kepenų liga, lėtinis alkoholizmas, gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės nepakankamumas, padažnėjęs širdies ritmas, aukštas kraujospūdis, padidėjęs skydliaukės aktyvumas, cukrinis diabetas, padidėjusi prostata, psichikos liga, kosulys su dideliu skrepliu kiekiu, lėtinis kosulys, aukšta temperatūra, išberimas, pastovus galvos skausmas, jei vartojate vaistų nuo depresijos ar psichozių, netekus skysčių ar badaujant. Pasireiškus karščiavimui ir išplitusiai raudonei su smulkiais pūliniėliais, stebėti, ar nepasireiškia ūminė uždegiminė egzantemos pustulinė liga. Nevartoti kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio. Vartojant vaistus

-40%





VITAMIN C PROLONG, 40 kapsulių ~~11,25~~ **6,77 €**
VITAMIN C PRO FORTE, 30 kramtomųjų tablečių ~~11,95~~ **7,19 €**

MAISTO PAPILDAI
„Vitamin C prolong" kapsulės ir **„Vitamin C PRO forte"** greipfrutų skonio kramtomosios tabletės yra prailginto veikimo patentuotas vitaminas *Ester-C*®. Moksliniai tyrimai rodo, kad patentuota *Ester-C* forma organizme išlieka iki 24 valandų, nedirgina skrandžio, nėra toksiška kepenims, lėčiau pasišalina iš organizmo. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, taip pat apsaugoti organizmą nuo oksidacinės pažaidos bei sumažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: „Vitamin C prolong" gerti po 1 kapsulę per dieną, užgeriant stikline vandens, o „Vitamin C PRO forte" sukramtyti po 1 tabletę per dieną.

-30% **3,63 €** ~~5,19~~



RHINOSOL aliejiniai nosies lašai, 10 ml
NOSIES LAŠAI

-20% **6,31 €** ~~7,89~~



MEDISTUS® ANTIVIRUS, 10 tablečių
MEDICINOS PRIETAISAI
Reguliarus „Medistus"" Antivirus pastilių vartojimas, esant padidėjusiai oru plintančių infekcijų rizikai, palaiko apsaugą nuo virusinės ir bakterinės kilmės kvėpavimo takų infekcijų, sukuria fizinį apsauginį barjerą burnos ir ryklės gleivinėje. Veikliosios medžiagos esančios Kistosyn® 200 ekstrakte padengia burnos ir gerklės gleivinės membranų paviršių ir yra tarsi fizinis apsauginis barjeras. Tai padeda atsikratyti virusų ir bakterijų prieš jiems patenkant į organizmą. Kistosyn® 200 veikliųjų medžiagų komplekso sudėtyje yra tik natūralios, augalinės kilmės medžiagos. **Vartojimas.** Rekomenduojama vartoti po 1 pastilę kas 2 valandas, 3-6 pastilės per dieną. Jei vartojate per burną vartojamų vaistų, tarp vartojimų darykite 2 valandų pertrauką. **Grynasis kiekis:** 20 g (10 pastilių po 2 g). **Gamintojas.** Nutrin GmbH, Schnaid 36b, 91352 Hallerndorf, Vokietija. **Platintojas Lietuvoje.** UAB „Litfas", Vytauto g.6, LT-55175 Jonava, Lietuva, tel. (8 37) 330664, www.vaistas.lt, www.medistusantivirus.com Medicinos prietaisas CE 0481

GERKLEI

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**



HERBITASSIN®
HERBITASSIN® ICELAND MOSS HYDRO, 12 pastilių **5,29 €**
MEDICINOS PRIEMONĖ
Drėkina gerklės gleivinę, ramina sausumo, perštėjimo ir gerklės skausmo jausmą, mažina sauso kosulio ir užkimimo simptomus. Hialurono rūgštis intensyviai drėkina gleivinę.
HERBITASSIN® ledinukai su šalavijais ir svilarožėmis, aviečių ir obuolių skonio, 4 vnt. **4,99 €**
HERBITASSIN® ledinukai HERBAL EXTRACTS + VIT C, braškių ir miško uogų skonio, 4 vnt. **4,99 €**
MAISTO PRODUKTAI
Įvairių skonių ledinukai vaikams nuo 3 metų su vaistažolių ekstraktais ir vitaminu C.
HERBITASSIN® SALVIA + VIT C, 12 pastilių **4,19 €**
HERBITASSIN® ICELAND MOSS + HONEY, 12 pastilių **4,59 €**
HERBITASSIN® ICELAND MOSS + BLACKCURRANT, 12 pastilių **4,59 €**
MAISTO PAPILDAI
Šveicarijoje pagamintos pastilės gerklei ir imunitetui. Sudėtyje esančios islandinės kerpenos, vaistinių šalavijų lapų ekstraktas padeda palaikyti gerklės ir balso stygų funkcijas, o vitaminas C – normalią imuninės sistemos veiklą.

IMUNITETUI

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**



ISKIAL
ISKIAL MAX, 120 kapsulių **24,99 €**
ISKIAL JUNIOR, 30 kramtomųjų kapsulių **22,99 €**
MAISTO PAPILDAI
„Iskial" – ryklių kepenų aliejus iš Islandijos, papildytas didele doze vitamino D3, kuris yra svarbus normaliai imuninės sistemos veiklai. Ryklių kepenų aliejus – tai vienas gausiausių natūralių, vertingų, biologiškai aktyvių medžiagų – alkilglicerolio ir skvaleno – šaltinių. „Iskial Junior" sudėtyje kartu yra ir žuvų taukų, kuriuose gausu DHR rūgščių, svarbių normaliai smegenų funkcijai ir padedančių išsaugoti normalų regėjimą. Tiks vaikams nuo 3 metų. „Iskial Max" tiks suaugusiesiems ir vaikams nuo 6 metų.
„ISKIAL" – RŪPINASI VISOS ŠEIMOS IMUNITETU!

-30%



VITAMINAS D3, 50 µg (2000 TV), 60 kapsulių ~~7,99~~ **5,59 €**
VITAMINAS D3, 100 µg (4000 TV), 60 kapsulių ~~7,99~~ **5,59 €**
ABC VIT VITAMINAS C, 500 mg, ananasų skonio, 50 tablečių ~~5,89~~ **4,12 €**
ABC VIT VITAMINAS C, 500 mg, apelsinų skonio, 50 tablečių ~~5,89~~ **4,12 €**
ABC VIT VITAMINAS C, 500 mg, braškių skonio, 50 tablečių ~~5,89~~ **4,12 €**
MAISTO PAPILDAI
Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, padeda palaikyti normalią kaulų, dantų būklę, normalią raumenų funkciją, padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės, nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

-40%

IMMUNOHOT, 6 pakeliai ~~7,19~~ **4,31 €**
IMUNOX POWER 300, 14 pakelių ~~9,49~~ **5,69 €**
BIOVITAMINAS D3, 20 pakelių ~~7,29~~ **4,37 €**
BACK TO LIFE, 14 pakelių ~~19,99~~ **11,99 €**
BIOVITAMIN C + ZN, 14 pakelių ~~5,79~~ **3,47 €**
POWER C 1000 MG, 10 pakelių ~~4,49~~ **2,69 €**



MAISTO PAPILDAI
Maisto papildai miltelėiais geriamajam tirpalui ruošti. Išsirink reikalingiausią: „ImmunoHOT" – karštas imbierinis gėrimas su 7 aktyviosiomis medžiagomis imunitetui ir kvėpavimo takams! Miltelių sudėtyje – imbierų šaknų, vaistinių čiobrelių, ežiuolių, liepų žiedų, aviečių uogų ekstraktai, taip pat džiovintų plikųjų malpigijų (acerola) ekstraktas (iš jų – natūralus vitaminas C), grynas cinko citratas. „ImunoX POWER 300" – vitaminas C, D ir cinkas. Net 300 % dienos normos imunitetui naudingų medžiagų 1 pakelyje. „bioVitaminas D3" – vitaminas D miltelių pavidalu! 1 pakelyje – net 3000 TV Vitamino D3! „Back to Life" – 4 mineralų, 5 vitaminų, 6 žolelių ekstraktų bei ispaninių šalavijų sėklų miltelių (iš kurių pašalinta dalis riebalų) kompleksas. „bioVitamin C + Zn" – vitaminas C su cinku. Vitaminas D svarbus kalciui ir fosforui įsisavinti, normaliai imuninės sistemos veiklai, kaulų ir dantų būklei. „bioVitamin C + Zn" – vitaminas C su cinku. „Power C 1000 mg" – net 1000 mg vitamino C 1 pakelyje. Sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, be stabilizatorių ir dažiklių.
GALINGAM IMUNITETUI!

PERŠALIMUI IR IMUNITETUI

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis



NUO **2,99 €**



BRONTEX

BRONTEX, 15 mg/5 ml, sirupas, 100 ml **4,49 €**
BRONTEX, 30 mg, 20 tablečių **2,99 €**
BRONTEX, 7,5 mg/ml, geriamieji lašai, tirpalas, 100 ml **5,49 €**
BRONTEX, 60 mg šnypščiosios tabletės, 10 tablečių **5,49 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 5 ml sirupo yra 15 mg, 1 tabletėje yra 30 mg, 1 ml tirpalo (14 lašų) yra 7,5 mg, 1 šnypščiojoje tabletėje yra 60 mg ambroksolio hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** kvėpavimo takų sekreto skystinimas pacientams, sergantiems ūmine arba lėtine bronchų ar plaučių liga, kurios metu sutrinka sekreto išskyrimas ir šalinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** 2–5 m. vaikams 3 kartus per parą po 7,5 mg ambroksolio (1 ml lašų arba 2,5 ml sirupo); 6–12 m. vaikams – 2–3 kartus per parą po 15 mg (2 ml lašų arba 5 ml sirupo, arba po ½ tabletės); suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams – 2–3 kartus per parą po 30 mg (4 ml lašų arba 10 ml sirupo, 1 tabletė arba 1/2 šnypščiosios tabletės) arba inhaliuoti lašus 1–2 kartus per parą po 15–22,5 mg (po 2–3 ml lašų). Sergantiesiems sunkiu inkstų veiklos nepakankamumu dozę mažinti ir (arba) vartoti rečiau. Ambroksolio nepatariama vartoti ilgiau negu 4–5 paras. Jei simptomai negerėja arba po 5 parų pablogėja, reikalinga gydytojo konsultacija. Šnypščiąsias tabletes reikia ištirpinti stiklinėje vandens. **Kontraindikacijos:** „Brontex“ (visų formų) negalima vartoti jaunesniems kaip 2 m. vaikams, tablečių – jaunesniems kaip 6 m. vaikams, šnypščiųjų tablečių – jaunesniems kaip 12 m. vaikams. „Brontex“ negalima vartoti, jei padidėjęs jautrumas ambroksoliui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** reikalingi, jei sutrikusi bronchų motorika ir padidėjusi gleivių sekrecija, sutrikusi inkstų veikla, sergant sunkia kepenų liga, buvus pepsinei opai, nustačius fruktozės netoleravimą, sergantiesiems cukriniu diabetu (vartojant sirupą). Pasireiškus odos išbėrimui (įskaitant gleivinės, pvz., burnos, gerklės, nosies, akių, lyties organų, pažeidimus), „Brontex“ vartojimą reikia nutraukti ir kreiptis į gydytoją. „Brontex“ 60 mg šnypščiųjų tablečių sudėtyje esantis benzilo alkoholis gali sukelti alerginių reakcijų. Vartoti atsargiai nėščioms moterims ir žindyvėms. Dėl sudėtyje esančio sorbitolio šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas įgimtas fruktozės netoleravimas. „Brontex“ tabletėju (dėl sudėtyje esančios laktozės) ir šnypščiųjų tablečių (dėl sudėtyje esančių laktozės ir maltodekstrino) negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.
Reklamos tekste parengimo data: 2023 m. rugsėjis. BRO-LT-00026
GREITOJI PAGALBA NUO KOSULIO VISAI ŠEIMAI!

NUO PERŠALIMO

NUO **5,75 €**



DALERON COLD3

DALERON COLD3, 12 plėvele dengtų tablečių **5,75 €**
DALERON COLD3, 24 plėvele dengtos tabletės **8,75 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido ir 15 mg dekstrometorfano hidrobromido. **Terapinės indikacijos.** Peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, sąnarių, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Įprasta dozė suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vaikams yra 2 tabletės. Tokią dozę galima gerti daugiausia 4 kartus per parą. Tarp dozių vartojimo turi būti praėjusios mažiausiai 4 valandos. Didžiausia paros dozė yra 8 tabletės. **Kontraindikacijos, specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Sunki hipertenzija ar išeminė širdies liga. Vartojama MAO inhibitorių, guanetidino arba jo darinių, beta blokatorių arba vartojama kitų vaistinių preparatų, kuriuose yra paracetamolio. Sunkus kepenų arba inkstų funkcijos sutrikimas. Kartu vartojama kitų kraujagyslės sutraukiančių vaistinių preparatų nosies gleivinės paburkimui mažinti, įskaitant vartojamus per burną ar į nosį. Anksčiau persirgtas miokardo infarktas, buvęs insultas arba šiuo metu esantys insulto rizikos faktoriai. Sergama lėtiniu alkoholizmu, glaukoma, feochromocitoma, sistemine raudonąja vilklige, cukriniu diabetu, hipertiroidizmu ar badaujama. Esant prostatos padidėjimui ar anksčiau buvę traukuliai. Reklamos teksto parengimo data: 2023 10 17.
PRADEDA VEIKTI JAU PER 20 MINUČIŲ!

NUO SLOGOS

NUO **3,99 €**



OTRIVIN

OTRIVIN 0,5 mg/ml nosies lašai (tirpalas), 10 ml **3,99 €**
OTRIVIN 1 mg/ml nosies lašai (tirpalas), 10 ml **3,99 €**
OTRIVIN 1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml **5,49 €**
OTRIVIN MENTHOL, 1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml **5,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Ksilometazolino hidrochloridas. **Indikacijos.** Nosies gleivinės paburkimo mažinimas peršalus, sergant sinusitu, šienlige ar kitokia alergine sloga. Nosiaryklės gleivinės paburkimo mažinimas, gydant vidurinės ausies uždegimą. Nosies ertmės apžiūros atlikimo lengvinimas. **Vartojimas.** „Otrivin“ 0,5 mg/ml nosies lašai. 2–5 m. vaikai: po 1–2 lašus į kiekvieną nosies landą 1–2 k./parą (kas 8–10 val.). 6–11 m. vaikai: po 2–3 lašus į kiekvieną nosies landą 2–3 k./parą, kai reikia. „Otrivin“ 1 mg/ml nosies lašai. Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: po 2–3 lašus į kiekvieną nosies landą, kai reikia. „Otrivin“ Menthol 1 mg/ml nosies purškalas ir „Otrivin“ 1 mg/ml nosies purškalas: Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: po 1 ipurškimą į kiekvieną nosies landą, kai reikia. Negalima lašinti/purkšti daugiau kaip 3 dozių per parą į kiekvieną nosies landą. **Kontraindikacijos.** Alergija ksilometazolinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, pacientams, kuriems neseniai buvo atlikta operacija per nosį, sergantiems užd aro kampo glaukoma (padidėjęs spaudimas akyje), lėtiniu nosies uždegimu (sausuoju arba atrofiniu rinitu). **Specialūs įspėjimai.** Negalima vartoti ilgiau kaip 7 d. iš eilės. Negalima viršyti rekomenduojamos dozės, ypač vaikams ir pagyvenusiems žmonėms. Atsargiai vartoti, jeigu yra padidėjęs kraujospūdis, širdies liga (pvz., pailgėjusio QT intervalo sindromas), cukrinis diabetas, padidėjęs skydliaukės aktyvumas, padidėjusi prostata, gerybinis antinkščių augl ys, jeigu vartojate arba per paskutines 2 sav. vartojote vaistų nuo depresijos ar Parkinsono ligos, vadinamų MAOI. Teksto parengimo data 12.2022. **NP-LT-OTRI-22-00001**

SKAUDANČIAI GERKLEI

10,99 €



POLOVOX

8,75 mg/dozėje burnos gleivinės purškalas (tirpalas), 15 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: Vienoje dozėje (3 išpurškimuose) yra 8,75 mg flurbiprofeno. **Indikacijos:** skaudančios gerklės simptomų, tokių kaip gerklės skausmas, skausmingumas, sunkumas nuryti ir patinimas, trumpalaikiam malšinimui 18 metų ir vyresniems suaugusiesiems. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusieji nuo 18 metų ir vyresni: viena dozė (3 išpurškimai) į gerklę kas 3-6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 dozių per 24 valandas. Per ipurškimą neįkvėpti. „PoloVox“ skirtas vartoti tik trumpą laiką. **Kontraindikacijos.** „PoloVox“ vartoti negalima pacientams, kuriems: yra alergija (padidėjęs jautrumas) flurbiprofenui, ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aspirinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; anksčiau buvo pasireiškę alerginės reakcijos, pavartojus nesteroidinių vaistų nuo uždegimo ar aspirino; yra arba buvo du ar daugiau skrandžio opos arba kraujavimo arba žarnų opos atvejų; anksčiau po nesteroidinių vaistų nuo uždegimo vartojimo pasireiškė kraujo krešėjimo arba kraujavimo sutrikimų; jeigu yra sunkių širdies, inkstų ar kepenų sutrikimų; paskutiniai 3 nėštumo mėnesiai. Šio vaisto negalima vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vartojant mažiausią veiksmingą vaistinio preparato dozę trumpiausią simptomų kontrolei būtiną laiką, galima sumažinti nepageidaujamus poveikius. Pasitarti su gydytoju arba vaistininku, prieš pradedant vartoti „PoloVox“: jeigu jau yra vartojamas bet kuris kitas nesteroidinis vaistas nuo uždegimo ar aspirinas; jei yra bakterinis tonzilitu uždegimas; jeigu pacientas senyvo amžiaus; jeigu pacientas serga arba sirgo astma; sistemine raudonąja vilklige ar miršia jungiamojo audinio liga; hipertenzija; žarnyno ligomis (opinis kolitas, Krono liga); jeigu yra širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų; pacientė nėščia pirmuosius 6 mėnesius arba maitina krūtimi. Reklamos teksto parengimo data- 2020 m. 07 mėn.

7,97 €



ILOXEN 200 mg/30 mg plėvele dengtos tabletės, 12 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos ir stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg ibuprofeno ir 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** ILOXEN vartojamas nosies uždulimo, susijusio su ūminiu rinosinusitu (įtariama virusinės kilmės), simptominiam gydymui, kai yra galvos skausmas ir (arba) karščiavimas*. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tabletę reikia nuryti nepažeistą ir nekramtytą, užgeriant didele stikline vandens, geriausia – valgio metu. Suaugusiesiems ir 15 metų bei vyresniems paaugliams po 1 tabletę kas 6 val. pagal poreikį. Jeigu simptomai išreikšti stipriau: po 2 tabletes kas 6 val. pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 6 tabletes per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms ar pagalbinėms šio vaisto medžiagoms, pacientas yra vaikas iki 15 metų, moterims trečią nėštumo trimestrą, žindymo laikotarpiu, ankstesnė pasireiškusi alerginė reakcija arba dusulys, astma, išbėrimas, nosies niežulys ir varvėjimas arba veido patinimas, sukelti acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU), virškinimo trakto kraujavimas arba perforacija, anksčiau pasireiškę vartojant NVNU, esama aktyvi peptinė opa ar kraujavimas arba anksčiau buvę 2 arba daugiau atskiri patvirtintos opos ar kraujavimo epizodai, dėl neaiškios priežasties sutrikusi kraujo gamyba, kraujavimas iš smegenų arba kitų kraujagyslių, sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas, sunkūs širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai (širdies liga, aukštas kraujospūdis, krūtinės angina, padažnėję širdies susitraukimai), padidėjęs skydliaukės aktyvumas, diabetas, antinkščių navikas, jeigu padidėjęs jūsų akispūdis, yra šlapimo susilaikymo dėl šlaplės ar prostatos sutrikimų rizika, miokardo infarktas, anksčiau patirtas insultas arba padidėjusi insulto rizika, yra buvę traukulių, sisteminė raudonoji vilklige. Negalima vartoti kartu su kitais vaistais nuo nosies uždulimo, metilfenidatu, kai kuriais vaistais nuo depresijos. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** ILOXEN reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jei sergate bronchų astma, cukriniu diabetu, psichoze, yra padidėjęs skydliaukės aktyvumas, yra buvęs koks nors virškinamojo trakto sutrikimas ar sergate arba sirgote virškinamojo trakto liga, padidėjęs kraujospūdis, nesveiki inkstai ar kepenys, sutrikęs kraujo krešėjimas, sergate infekcine liga, sergate širdies liga, įskaitant širdies nepakankamumą ir krūtinės anginą (krūtinės skausmą), arba jeigu anksčiau Jus buvo ištikęs širdies priepuolis, atlikta kraujagyslių šuntavimo operacija, sergate periferinių arterijų liga arba Jus buvo ištikęs bet koks insultas, jeigu padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje, rūkote. Jei pasireiškia staigus pilvo skausmas, kraujavimas iš tiesiosios žarnos ar kiti išeminio kolito simptomai, reikia nutraukti vaisto vartojimą ir kreiptis medicininės pagalbos. Jei Jums pasireiškia odos išbėrimas, gleivinių pažeidimas, pūslės ar kitų alergijos požymių, ILOXEN vartojimą nutraukite ir nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Vartojant ILOXEN gali sumažėti Jūsų regos nervo aprūpinimas krauju. Jeigu staiga praradote regėjimą, nutraukite ILOXEN vartojimą ir susisiekite su gydytoju arba skubiai kreipkitės medicinos pagalbos. **Reklamos teksto parengimo data:** 2023-04-26
DVIGUBAS SMŪGIS SINUSITUI!*

8,99 €



ACTIFED®

ACTIFED® 60 mg/2,5 mg tablet ės, 12 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tabletėje yra 60 mg pseudoefedrino hidrochlorido ir 2,5 mg triprolidino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** nosies ir viršutinių kvėpavimo takų gleivinės užburkimo mažinimas; nosies tekėjimo ir čiaudulio slopinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: po 1 tabletę kas 4–6 val., iki 4 kartų per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjes jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; pacientai, kurie per pastarąsias 14 dienų vartojo monoaminooksidazės inhibitorių; širdies ir kraujagyslių ligos; sunki hipertenzija arba jeigu hipertenzija nesureguliuota skiriant vaistų; sunki ūminė ar lėtinė inkstų liga arba inkstų nepakankamumas; cukrinis diabetas; feochromocitoma; hipertirozė; uždaro kampo glaukoma; kitų simpatomimetinių gleivinės paburkimą mažinančių vaistų ir beta blokatorių vartojimas; vaikai iki 12 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Actifed“ gali sukelti mieguistumą. Nevartoti kartu alkoholio. „Actifed“ vartojimą reikia nutraukti, jei pasireiškia šie sutrikimai: haliucinacijos, neramumas, miego sutrikimai, karščiavimas ir išplitusi raudonė su smulkiais pūlinėliais, staigus regos netekimas arba regos ašturmo sumažėjimas, staigus pilvo skausmas, kraujavimas iš išangės ar kiti išeminio kolito simptomai. Nedelsdami nutraukite „Actifed“ vartojimą ir kreipkitės skubios medicinos pagalbos, jeigu pasireikštų stiprus staiga prasidėjęs galvos skausmas, pykinimas, vėmimas, sumišimas, traukuliai, pakitusi rega. Ligoniai, sergantys kepenų liga, vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimu, „Actifed“ turėtų vartoti atsargiai. Vaistas negali būti vartojamas vaikams raminti. „Actifed“ tablečių sudėtyje yra laktozės. Reklamos teksto parengimo data 2024-09-18.
ATKEMŠA NOSĮ IR SINUSUS. STABDO NOSIES VARVĖJIMĄ. SLOPINA ČIAUDULĮ.

NUO **8,99 €**



SINUPRET

SINUPRET, geriamieji lašai (tirpalas), 100 ml **9,99 €**
SINUPRET INTENS, 160 mg, 20 dengtųjų tablečių **11,99 €**
SINUPRET FORTE, 20 dengtųjų tablečių **8,99 €**

NERECEPTINIAI AUGALINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Terapinės indikacijos. Geriamieji lašai **„Sinupret“** yra augalinis vaistas, vartojamas tirštam sekretui skystinti, sergant ūminiu prienosinių ančių uždegimu (sinusitu) arba jam paūmėjus sergant lėtine ligos forma. **„Sinupret Intens“** yra augalinis vaistas, skirtas suaugusiųjų ūminiam nekomplikuotam prienosinių ančių uždegimui gydyti, jei pasireiškia tokių simptomų, kaip nosies sekreto tekėjimas, nosies užgulimas, galvos skausmas, veido skausmas arba spaudimas. **„Sinupret Forte“** yra augalinis vaistas, vartojamas tirštam nosiaryklės sekretui skystinti, sergant ūminiu arba paūmėjusiu lėtiniu prienosinių ančių uždegimu (sinusitu). **Veikliosios medžiagos ir stiprumas.** 1 g **„Sinupret“ geriamųjų lašų** yra 290 mg skystojo ekstrakto (1:11), pagaminto iš gencijonų šaknų, raktažolių žiedų, rūgštynių žolės, juoduogių šeivamedžių žiedų, verbenų žolės (1:3:3:3:3). **„Sinupret Intens“** veikliųjų medžiaga yra gamtinis sausasis ekstraktas (3–6:1) iš gencijonų šaknų, raktažolių žiedų, rūgštynių žolės, juoduogių šeivamedžių žiedų, verbenų žolės (1:3:3:3:3). Kiekvienoje dengtojoje tabletėje yra 160 mg gamtinio sausojo ekstrakto. **„Sinupret Forte“** 1 dengtojoje tabletėje yra 36 mg verbenų žolės miltelių, 12 mg gencijonų šaknų miltelių, 36 mg rūgštynių žolės miltelių, 36 mg juoduogių šeivamedžių žiedų miltelių, 36 mg raktažolių žiedų miltelių. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** 2–5 m. vaikams gerti 15 geriamųjų lašų 3 kartus per dieną, 6–11 m. vaikams – 25 geriamuosius lašus 3 kartus per dieną. Suaugusiesiems ir paaugliams nuo 12 m. – po 50 geriamųjų lašų 3 kartus per dieną. Suaugusiesiems ir paaugliams vartoti po 1 dengtąją tabletę „**Sinupret Intens**“ 3 kartus per dieną (daugiausia 3 dengtąsias tabletes per parą). „Sinupret Forte“ suaugusieji ir paaugliai nuo 12 m. turėtų vartoti po 1 tabletę 3 kartus per parą. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai.** Jei simptomai išlieka ilgiau nei 7–14 dienų ar periodiškai kartojasi arba pasireiškia dusulys, karščiavimas ir atsiranda pūlingų skreplių, reikia kreiptis į gydytoją. Geriamuosius lašus „**Sinupret**“ vartoti jauniesiems nei 2 m. vaikams nerekomenduojama. Šio vaisto sudėtyje yra 18 tūrio % etanolio (alkoholio). Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu. Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir didelės rizikos grupės pacientams (pvz., sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija). Jeigu nustatytas gastritas ir jeigu pacientė skrandis jautrus, „**Sinupret Intens**“ geriamuosius vartoti po valgio, užgeriant stikline vandens. Vartoti vaikams ir jaunesniems nei 18 m. amžiaus paaugliams nerekomenduojama. „**Sinupret Forte**“ nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams dėl pakankamų duomenų trūkumo. Teksto parengimo data 2024-09-03.
KANKINA SINUSITAS? „SINUPRET“ – IR SINUSITAS NEBEKANKINA!

6,99 €



HEXORALETTEN N, 5 mg/1,5 mg, kietosios pastilės, 16 vnt.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje pastilėje yra 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido ir 1,5 mg benzokaino. Terapinės indikacijos: lokalus burnos ir ryklės infekcinių ligų: faringito, stomatito, gingivito, simptomų slopinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: jei nepaskirta kitaip, sučiulpti po 1 kietąją pastilę keletą kartų per parą. Jei reikia, galima čiulpti po 1 kietąją pastilę kas 1–2 val., daugiausia 8 kietąsias pastiles per parą. 6–12 m. vaikams: jei nepaskirta kitaip, sučiulpti po 1 kietąją pastilę keletą kartų per parą. Jei reikia, galima čiulpti po 1 kietąją pastilę kas 1–2 val., daugiausia 4 kietąsias pastiles per parą. Kontraindikacijos: padidėjes jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; sumažėjes plazmos cholinesterazės kiekis; burnoje ar gerklėje yra žaizdų ar opų; jaunesni kaip 6 m. vaikai. Specialūs įspėjimai: jeigu sergate sunkia infekcine liga, pasireiškiančia aukšta temperatūra, galvos skausmu, vėmimu, būtina gydytojo konsultacija, ypač jei savijauta nepagerėja per 3 dienas. Jei yra burnos gleivinės epitelio defektų ar gleivinė lupasi, šio vaisto vartoti nereikėtų. Benzokainas gali sukelti methemoglobinemiją (pasireiškia odos, lūpų ir nagų guolių blyškumu, pilkumu ar melsvumu, galvos skausmu, svaiguliu, dusuliu, nuovargiu ir dažnu širdies plakimu). Kietosios pastilės gali sukelti užspringimo riziką. Šio vaisto reikia vartoti atsargiai, jeigu turite aspiracijos ir rijimo problemų. Vengti valgyti ar gerti iškart po pastilės vartojimo. „Hexoraletten N“ sudėtyje yra aspartamo ir izomalto. Reklamos teksto parengimo data 2024-06. LT-HXR-2400001.

Jamieson™

NATURAL SOURCES | SINCE 1922

JAMIESON turi ilgametę patirtį - savo produkciją eksportuoja po visą pasaulį jau nuo 1922 metų. JAMIESON naudoja išskirtinę „360 Pure“ technologiją, kuri apima net 360 gamybos proceso kontrolės etapų.

-40%

„JAMIESON“ MAISTO PAPILDAMS



Pagaminta Kanadoje

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis



NERVINIAM NERAMUMUI LENGVINTI

NUO **5**^{99} **€**



SEDATIF PC

SEDATIF PC, 40 tablečių **5**^{99} **€**
SEDATIF PC, 90 tablečių **9**^{99} **€**

HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: Abrus precatorius 6 CH, 0,5 mg, Aconitum napellus 6 CH, 0,5 mg, Belladonna 6 CH, 0,5 mg, Calendula officinalis 6 CH, 0,5 mg, Chelidonium majus 6 CH, 0,5 mg, Viburnum opulus 6 CH, 0,5 mg. **Indikacijos:** nervinio neramumo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiesiems ir vaikams nuo 6 metų vartoti po 2 tabletes 3 kartus per parą. „Sedatif PC" veiksmingumas ir saugumas vaikams iki 6 metų netirtas. Duomenų nėra, todėl vartoti nerekomenduojama. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** Šio vaistinio preparato vaikams iki 6 metų vartoti nerekomenduojama. Negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharozės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2019-08.
ĮVEIK STRESĄ, KOL STRESAS NEĮVEIKĖ TAVĘS. SEDATIF PC

NORMALIAI RAUMENŲ FUNKCIJAI, NERVŲ SISTEMOS VEIKLAI, ENERGIJAI

IKI **-50**%




MAGVIT

MAISTO PAPILDAI
„Magvit Platinum" – greitas ir ilgalaikis poveikis. Tabletė magnį į organizmą išskiria trimis skirtingomis fazėmis ir leidžia magniui greitai ir ilgai veikti. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Tik 1 tabletė per parą. „Magvit Plus" skirtas raumenims, nervų sistemai ir širdžiai. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, vitaminai B2, B6 ir B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vitaminas B1 padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Dėl specialios ilgalaikio veikimo Depo formulės vitaminai ir magnis išskiriami daugelį valandų. Tik 1 tabletė per parą. „Magvit B Complex" sudėtyje yra 400 mg magnio ir 8 B grupės vitaminai. Tinka vartoti fizinio krūvio metu. Magnis, vitaminai B2, B6, B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją. Suaugusiesiems ir vaikams nuo 12 m. – gerti po 1 paketėlį per dieną. „Magvit GO" – raumenims, nervų sistemai, energijai. „Magvit GO" buteliukuose esantis magnis gaunamas iš organinės formos ir jau ištirpęs, todėl organizmas lengviau jį pasisavina, palyginti su įprastomis tabletėmis. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. Magnis taip pat padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir normalią raumenų funkciją. Naudojimas: suaugusiesiems ir paaugliams nuo 14 m. gerti 1 buteliuką per dieną.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms


1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!** **29**^{99} **€**



NEUROZAN, 30 tablečių

MAISTO PAPILDAI
NEUROZAN – platus ir subalansuotas kompleksas normaliai protinei (pantoteno rūgščiai) ir nervų sistemos (jodas, magnis, ir kt.) veiklai palaikyti. Vitaminai B1, B3 ir kt. palaiko normalią psichologinę būklę, o geležis ir cinkas - pažinimo funkciją. Sudėtis papildyta ginkmedžių ekstraktu ir kofermentu Q10.
PAMAITINK SAVO PROTĄ!

-50% ANTRAI TOKIAI PAČIAI



NEUROZAN PLUS, 56 tabletės/kapsulės **50**^{49} **€**

MAISTO PAPILDAI
NEUROZAN PLUS – dviguba pakuotė su omega-3 riebiosiomis rūgštimis.
PAMAITINK SAVO PROTĄ!

-40% **7**^{61}**€** ~~12^{69}~~



MEMORIL FORTE, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS
„Memoril forte" – subalansuotas, 11 sudedamųjų dalių kompleksas atminčiai bei kraujotakai. Tinka tiems, kuriems sunku susikaupti bei nuolat ką nors pamiršti. Vienoje kapsulėje yra 80 mg ginkmedžių ekstrakto, kuris padeda palaikyti normalią atminties funkciją ir kraujotaką. Taip pat sudėtyje yra magnio, vitaminų B, C, E, seleno ir folio rūgšties, kuri padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną.

-40%



MAGNIS + B_6 COMPLEX, 30 kapsulių ~~11^{95}~~ **7**^{19} **€**
MAGNIS + B_6 SUPERIOR, 30 kapsulių ~~11^{96}~~ **7**^{18} **€**

MAISTO PAPILDAI
„Magnis + B6 complex" sudėtyje magnis yra magnio oksido pavidalu. O **„Magnis + B6 superior"** naudojama ypatinga magnio forma – dvi magnio druskos (magnio oksidas ir magnio citratas), kurios organizme išlieka ilgiau, nes suyra skirtingu metu. Abiejų preparatų sudėtis papildyta ir vitaminu B6. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų ir nervų sistemos veiklą. Magnis ir vitaminas B6 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją bei mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

5^{99} **€**



MILGAMMA N, 20 minkštųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 40 mg benfotiamino (riebaluose tirpaus vitamino B1 darinio), 90 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6) ir 250 µg cianokobalamino (vitamino B12). **Terapinės indikacijos:** B1, B6, B12 vitaminų trūkumo šalinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiesiems: po 1 kapsulę 3–4 kartus per parą. Kai liga lengva ir jei vaistinis preparatas padeda, per parą užtenka 1–2 kapsulių. Vartoti per burną. Kapsulę reikia praryti po valgio nesukramtytą, užsigerti trupučiu skysčio. **Kontraindikacijos:** padidėjes jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai vaistinio preparato pagalbinei medžiagai. Padidėjes jautrumas sojoms arba sojų pupelių produktams, pvz., lecitinui. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** vartojama ilgiau negu 6 mėn. „Milgamma N" gali sukelti neuropatiją. Reikia atsižvelgti į adityvų kartu vartojamų vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra sorbitolio (ar fruktozės), ir su maistu vartojamo sorbitolio (ar fruktozės) poveikį. Geriamojo vaistinio preparato sudėtyje esantis sorbitolis gali paveikti kitų kartu vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį prieinamumą. Vaistinio preparato sudėtyje yra lecitino (išgauto iš sojų aliejaus). Jeigu yra alergija žemės riešutams arba sojoms, šio vaistinio preparato vartoti negalima. Reklamos tekstas parengtas 2024-09-11.
„MILGAMMA" – JUDĖK LAISVAI!

-30% **9**^{79}**€** ~~13^{99}~~



HERBASTRESS®, 30 tablečių

Dienai
MAISTO PAPILDAS
Standartizuotų augalų ekstraktų ir B grupės vitaminų derinys nervų sistemai.
Vartojimas: 1 tabletė per dieną.

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**



AMBIO

OSTEO COMPLEX, 60 tablečių **11⁴⁸ €**
KALCIS SU VITAMINAIS K2 IR D3, 60 tablečių **12⁹⁸ €**
KALCIS, MAGNIS, CINKAS, 100 tablečių **15²⁸ €**

MAISTO PAPILDAI

-30% **1** 11 € ~~15⁹⁹~~



KALCIO GLIUKONATAS, 500 mg, 10 tablečių

MAISTO PAPILDAS
Kalcis padeda palaikyti normalią raumenų veiklą, reikalingas normaliai kaulų bei dantų būklei palaikyti.

VITAMINO D3 ŠALTINIS

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**



OLIDETRIM®

OLIDETRIM® 2000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių **10³⁵ €**
OLIDETRIM® 4000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių **14⁹⁹ €**
OLIDETRIM® 2000 TV, 60 minkštųjų kapsulių **10⁰⁹ €**

MAISTO PAPILDAI
Imunitetui – vitaminas D 2000 ir 4000 TV.
Širdžiai, smegenims – DHR+ EPR omega-3 rūgštys.
Kaulams ir raumenims- vitaminai D ir K2.
Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Omega-3 riebalų rūgštys DHR (dokozaheksaeno) ir EPR (eikozapentaeno) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą. Siekiant maksimaliai padidinti vitamino D papildo naudą, juos naudinga vartoti kartu su vitaminu K2.
GERIAUSIA GYNYBA – STIPRUS IMUNITETAS.

-40%



ARTHROSTOP PROENZI

MAISTO PAPILDAI
„Arthrostop proenzi" maisto papildai sąnariams su gliukozaminu, chondroitinu, kolagenu, bosvelijos ekstraktu. Judėk laisvai!
NAUJIENA! „Arthrostop proenzi" collagen shots – unikali dviejų tipų kolageno, vitaminų ir mineralų kombinacija sąnariams. Net 11 000mg hidrolizuoto kolageno viename buteliuke!
2305_SB_Proenzi_V01_LT


*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-30%



BIOCALCIUM FORTE 600 MG, 30 pakelių ~~11⁴⁹~~ **8⁰⁴ €**
BIOKALCIS 1200 MG, 15 pakelių ~~8⁴⁹~~ **5⁹⁴ €**
BIOCA+K+MG+ZN SU VITAMINU D3, 28 pakeliai ~~14⁴⁹~~ **10¹⁴ €**
BIOGLUCOSAMINE MARINE 1500 MG, 20 pakelių ~~11⁴⁹~~ **8⁰⁴ €**
BIOGLUCOSAMINE MARINE 1500 MG, 60 pakelių ~~28²⁹~~ **19⁸⁰ €**

MAISTO PAPILDAI
Maisto papildai milteliais geriamajam tirpalui ruošti. „bioCALCIUM FORTE 600 mg" ir „bioKALCIS 1200 mg" sudėtyje – grynas kalcio citratas! Išsirinkite reikalingiausią: 600 mg kalcio su vitaminu D3 bei 1200 mg kalcio su fosforu, vitaminu K ir D3. Kalcis reikalingas kaulų ir dantų būklei palaikyti, padeda palaikyti normalią raumenų veiklą, nervų impulso perdavimą, virškinimo fermentų veikimą bei energijos apykaitą. Vitaminas D padeda palaikyti normalų kalcio ir fosforo įsisavinimą. Fosforas ir vitaminai D, K padeda palaikyti normalią kaulų būklę. „bioCa+K+Mg+Zn su vitaminu D3" – net 4 mineralų kompleksas: kalcis, kalis, magnis ir cinkas su vitaminu D. Magnis mažina pavargimo jausmą, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, raumenų funkciją. Cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, odos, plaukų ir nagų būklę. „bioGlucosamine Marine 1500 mg" – net 1500 mg gliukozamino, kalcio, vitaminų C ir D kompleksas. Natūralus angliavandenių ir baltymų junginys, įeinantis į įvairių žmogaus audinių sudėtį, daugiausia jo aptinkama kremzlėse. Produktų sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be dažiklių, konservantų ir stabilizatorių. Pagaminta Izraelyje.
STIPRIEMS SĄNARIAMS, KAULAMS IR DANTIMS!



NORFA nuolaidų kortelė Jūsų telefone

Paprasta. Naudinga. Praktiška



Atsisiųskite: GET IT ON Google Play | Available on the App Store

VIRŠKINIMO SISTEMAI

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis



4,49 €




OMEP UNO 20 mg, 14 skrandyje neirių kietųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje yra 20 mg omeprazolo. **Terapinės indikacijos:** vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refliukso simptomų gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti po 1 kapsulę per parą, ryte. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas omeprazolui (taip pat pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, ezomeprazolui) ar pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** sudėtyje yra sacharozės. „Sandoz Pharmaceuticals d.d." filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2403136087. Teksto patvirtinimo data 2024-03-13.

-40% 2,01 € ~~3,35~~



DIGESTRONG+ 6 kramtomosios tabletės

MAISTO PAPILDAS

„Digestrong+" – ananasų skonio kramtomosios tabletės virškinimui, kurio sudėtyje yra patentuotas fermentų kompleksas – Digezyme (5 rūšių virškinimo fermentai). Virškinimo fermentai padeda suskaidyti maistą. Sudėtyje taip pat yra mėlynžiedės liucernos žolės ekstraktas, ananasų vaisių milteliai ir papajinių melionmedžių vaisių ekstraktas. Vartojimas: sukramtyti po 1 tabletę po valgio. Rekomenduojama vartoti ne daugiau nei 2 tabletes per parą.

JŪSŲ GERAI SAVIJAUTAI!

-50% ANTRAI TOKIAI PAČIAI



LACTO SEVEN

MAISTO PAPILDAI

„Lacto Seven" sudėtyje yra net 7 rūšių gerųjų lakto-bifido bakterijų, vitamino D ir inulino. Vartojimas: suaugusiems 1-2 tabletes, vaikams nuo 3m. – 1 tabletė per parą, nebent gydytojas nurodys vartoti kitaip. Pagaminta Suomijoje.

*Akcija taikoma kainų skirtuku pažymėtoms prekėms

MODERNI KAPSULĖ NUO RĖMENS

3,99 €



ESCADRA 20 mg, 7 skrandyje neirios kietosios kapsulės

NERECEPTINIAI VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ezomeprazolas, 20 mg. **Terapinės indikacijos:** vaistas skirtas suaugusiųjų gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens ir skrandžio rūgšties regurgitacijos) trumpalaikiam gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 kapsulė) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, kapsules gali prireikti vartoti 2–3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Simptomams visiškai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Jeigu per 2 savaičių nepertraukiamą gydymą simptomai neišnyksta, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Nėra tinkamų „Escadra" vartojimo rekomendacijų jaunesnių kaip 18 metų vaikų populiacijoje indikacijai „trumpalaikis gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens ir rūgšties regurgitacijos) gydymas". Kapsulių negalima kramtyti ar smulkinti. Kapsules galima atidaryti ir granules išmaišyti pusėje stiklinės negazuoto vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pakeistiems benzimidazolams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Ezomeprazolo negalima vartoti kartu su nelfinaviru. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pacientus reikia informuoti, kad kreiptųsi į gydytoją, jeigu jie patiria dideį kiino svorio matėjimą dėl nežinomų priežasčių, pasikartojantį vėmimą, difagiją, vėmimą kraujiu ar melena, arba jeigu įtariama ar diagnozuojama skrandžio opa, būtina ištirti, ar nėra piktybinės ligos, nes gydymas ezomeprazolu gali palengvinti jos simptomus ir uždelsti diagnozės nustatymą; jeigu jie anksčiau sirgo skrandžio opa arba patyrė virškinimo trakto operaciją; jeigu jiems 4 savaites arba ilgiau buvo taikomas nepertraukiamas simptominis nevirškinimo arba rėmens gydymas; jeigu jie serga gelta arba sunkia kepenų liga; jeigu jie yra vyresni kaip 55 metų ir turi naujų arba neseniai pakitusių simptomų. Pacientai, kuriu pasikartojantys nevirškinimo ar rėmens simptomai ilgalaikiai, turi reguliariais intervalais lankytis pas savo gydytoją. Kaip ilgalaikio profilaktinio vaistinio preparato „Escadra" pacientai neturi vartoti. Pacientai, kuriems reikia atlikti endoskopiją ar ureazės kvėpavimo testą, turi pasitarti su savo gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistinį preparatą. Ezomeprazolo skirti kartu su atazanaviru nerekomenduojama. Ezomeprazolo derinimas su klopidogreliu nepatartinas. Kitų PSI arba H2 receptorių blokatorių kartu su ezomeprazolu pacientams vartoti negalima. „Escadra" sudėtyje yra sacharozės. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems yra fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2024 07 12.

-20%



LEPICOL

MAISTO PAPILDAI

LEPICOL - unikalus, natūralios kilmės medžiagų derinys žarnynui ir virškinimui. Balkšvųjų gysločių luobelės, inulinas ir pieno rūgščies bakterijos – natūraliai žarnyne gyvenančios laktobacilos ir bifidobakterijos. LEPICOL PLUS papildytas augalinės kilmės fermentais iš imbierų šaknų, pipirmėčių lapų ir pankolio sėklų normaliai virškinimo funkcijai palaikyti.

„LEPICOL" – GERA JAUSTIS LENGVAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-20%



GLICEROL INTELI, ramunėlių ir dedešvų 9 g mikroklizmos suaugusiesiems, 6 vnt. ~~11,97~~ 9,58 €

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Glicerol Inteli" yra vienkartinė medicinos priemonė – mikroklizma, kurios pagrindinės sudedamosios medžiagos yra glicerolis, ramunėlės ir dedešvos; ji skirta naudoti į tiesiąją žarną siekiant palengvinti tuštinimąsi esant vidurių užkietėjimui. „Glicerol Inteli" yra skirtas naudoti trumpą laiką, esant retkarčiais pasireiškiančiam viduriu užkietėjimui. Suaugusiesiems: 1 mikroklizma pagal poreikį 1 arba 2 kartus per dieną. Negalima naudoti, jei yra padidėjęs jautrumas arba alergija vienai ar daugiau sudedamųjų medžiagų. Esant nuolatiniam viduriu užkietėjimui, svarbu pasikonsultuoti su gydytoju, kad būtų atmestos kitos priežastys. Mikroklizma skirta naudoti tik vieną kartą, todėl, sunaudojus pusę mikroklizmos, kitos pusės naudoti negalima. Naujausios peržiūros data: 2020-03.



GLICEROL INTELI, 1500 mg, 10 žvakučių vaikams ~~4,47~~ 3,58 €

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Glicerol Inteli" yra vienkartinė medicinos priemonė – žvakutė, kurios pagrindinė sudedamoji medžiaga yra glicerolis; ji skirta naudoti siekiant palengvinti tuštinimąsi, esant viduriu užkietėjimui. „Glicerol Inteli" yra skirtas naudoti trumpą laiką, esant retkarčiais pasireiškiančiam viduriu užkietėjimui. Vaikams: 1 žvakutė pagal poreikį 1 arba 2 kartus per dieną. Vienkartinė priemonė. Negalima naudoti, jei yra padidėjęs jautrumas arba alergija vienai ar daugiau sudedamųjų medžiagų. Esant nuolatiniam viduriu užkietėjimui, svarbu pasikonsultuoti su gydytoju, kad būtų atmestos kitos priežastys. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Vidurius laisvinančių priemonių reikia naudoti kuo rečiau ir ne ilgiau kaip 7 dienas. Ilgesnį naudojimą skiria gydytojas, tinkamai įvertinęs konkretų atvejį. Naujausios peržiūros data: 2020-03.

-20% 0,47 € ~~0,59~~



AKTYVINTA ANGLIS KARBOAKTIV, 10 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Sudedamosios dalys: aktyvinta anglis (83 % grynojo kiekio), bulvių krakmolas.
Grynasis kiekis pakuotėje: 2,5 g
Vartojimo būdas: gerti po 1–3 tabletes 3 kartus per dieną 1 val. prieš arba po valgymo.
Rekomenduojamame suvartoti per parą kiekyje (3–9 tab.) yra 0,622 g–1,867 g aktyvintos anglies.
Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.
Nevartoti esant opaligei ar kraujavimui virškinamajame trakte.
Gamintojas: FARMAKOM, Ukraina
Platintojas Lietuvoje: UAB „VERATRUM PHARMA", Žarijų g. 2B, Vilnius.

4,49 €



ALMAGEL A GERIAMOJI SUSPENSIJA, 170 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 5 ml geriamosios suspensijos yra 340 mg aliuminio hidroksido (atitinka 218 mg aliuminio oksido), 109 mg magnio hidroksido (atitinka 75 mg magnio oksido) ir 109 mg benzokaino. **Terapinės indikacijos:** virškinimo trakto sutrikimų, susijusių su skrandžio rūgšties pertekliumi, tokių kaip rėmuo, rūgšties sukelti skrandžio negalavimai, skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, simptominis gydymas 14 metų arba vyresniems paaugliams ir suaugusiems žmonėms. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiesiems, atsižvelgiant į ligos sunkumą, 3–4 kartus per dieną (30 min. prieš valgį ir vakare, prieš miegą) gerti po 1–3 pilnus dozavimo šaukštelius (1 šaukštelyje yra 5 ml). Jei yra dvylikapirštės žarnos opa ir kai kuriu formų skrandžio opa (prievarčio opa), „Almagel A" galima gerti tarp valgymų. Prieš vaistų, dirginančių virškinimo traktą, vartojimą profilaktikai reikia išgerti 1–2 pilnus dozavimo šaukštelius „Almagel A". Vaistinio preparato rekomenduojama vartoti ne ilgiau kaip 12 parų. Jei inkstų funkcija sutrikusi, atsižvelgiant į sutrikimo laipsnį, suspensijos reikėtų gerti rečiau arba mažesnę dozę. Prieš vartojimą buteliuką reikia stipriai pakratyti. Preparato skiesti nerekomenduojama. Išgėrus suspensijos, 30 min. negalima gerti skysčių. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Fruktozės netoleravimas (nes sudėtyje yra sorbitolio). Hipofosfatemija. Sunkus inkstų funkcijos nepakankamumas (kreatinino klirensas mažesnis kaip 30 ml/min). Alzheimerio liga. Pacientas jaunesnis nei 14 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Almagel A" nerekomenduojama vartoti, jei yra nuolatinis viduriu užkietėjimas, ūminio apendicito simptomų, metabolinė alkalozė, kepenų cirozė, sunkus stazinis širdies nepakankamumas, nėštumo toksikozė, opinis kolitas, divertikulioze, kolostomija ar ileostomija, inkstų funkcijos sutrikimas, lėtinis viduriavimas. Vaistas gali sunkinti hemorojaus sukeltus negalavimus. Pagyvenusiems pacientams gali pasunkėti kaulų ir sąnariu ligos bei Alzheimerio liga. Vaistinio preparato vartoti ilgiau negu 2 savaites galima tik prižiūrint gydytojui. Sudėtyje yra parahidroksibenzoato darinių, kurie gali sukelti alerginių reakcijų, įskaitant uždelstas alergines reakcijas. Sudėtyje yra etanolio, dėl kurio pacientams, sergantiems kepenų, smegenų ligomis, epilepsija ir alkoholizmu, bei nėščioms moterims ir jaunesniems nei 14 metų vaikams gali atsirasti pažeidimų. „Almagel A" nepatariama vartoti kartu su alkoholiu ir maistinėmis rūgštimis (citrinų, acto ir kt.), nes jos neutralizuoja vaistinio preparato vietinį anesteznį poveikį. Tarp „Almagel A" ir kitokių vaistų vartojimo reikia daryti ne trumpesnę kaip 1–2 val. pertrauką. Dėl sudėtyje esančio benzokaino vartoti ilgiau kaip 10–12 parų nepatariama. Vaikams benzokainas gali sukelti methemoglobinemiją. **Reklamos teksto parengimo data** 2023 m. spalis. OTC-LT-00068

4,29 €



RENNIE, 680 mg/80mg, 24 kramtomosios tabletės
RENNIE ORANGE, 680 mg/80 mg, 24 kramtomosios tabletės
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kramtomojoje tabletėje yra 680 mg kalcio karbonato ir 80 mg sunkiojo magnio subkarbonato. **Terapinės indikacijos:** „Rennie" veikliosios medžiagos – kalcio karbonatas ir sunkusis magnio subkarbonatas – neutralizuoja skrandžio rūgštį ir sumažina rūgštinės dispepsijos sukeliamus negalavimus – rėmenį, skrandžio pilnumo arba sunkumo jausmą, virškinimo sutrikimą, rūgštaus skysčio atplyšimą į burnos ertmę, pilvo pūtimą, skrandžio skausmą. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: sučiulpti arba sukramtyti 1–2 kramtomąsias tabletes, praėjus 1 val. po kiekvieno valgio, prieš miegą ir kai pasireiškia rėmuo ar skausmas. Negalima vartoti daugiau kaip 11 kramtomųjų tablečių per 24 valandas. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 2 savaites. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** vaistinį preparatą reikia vengti vartoti ilgai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. „Rennie" nėštumo ir žindymo laikotarpiu vartoti laikantis rekomendacijų galimą, bet reikia vengti ilgalaikio vartojimo. Vaistas neturi būti vartojamas su dideliu kiekiu pieno ar jo produktais. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jeigu yra sunkus inkstų nepakankamumas arba inkstų akmenligė; jeigu yra padidėjęs kalcio kiekis kraujyje arba sumažėjęs fosfatų kiekis kraujyje. Reklamos teksto parengimo data: 2023-02. CH-20230221-72.
NUO RĖMENS IR PADIDĖJUSIO RŪGŠTINGUMO

3,99 €



LOPERAMIDE-GRINDEKS,
2 mg, 10 kietųjų kapsulių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veiklioji medžiaga: vienoje kapsulėje yra 2 mg loperamido hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** viduriavimą slopinantis vaistas. **Dozavimo ir vartojimo būdas:** suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 metų paaugliams pradinė dozė – 2 kapsulės (4 mg), paskui – po 1 kapsulę (2 mg) po kiekvieno tuštinimosi skystomis išmatomis. Didžiausia paros dozė – 6 kapsulės (12 mg). **Kontraindikacijos:** galvos skausmas, svaigulys, vidurių užkietėjimas, pykinimas, dujų kaupimasis žarnyne. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** viduriavimo gydymas šiuo vaistu yra tik simptominis ir priežasties nepašalina. Jei viduriavimo priežastis yra žinoma, ją reikia gydyti. **Vietinis rinkodaros teisės turėtojo atstovas:** UAB Grindeks Kalceks Lietuva, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius. **Reklamos teksto parengimo data** 2024-08-09.

-20%



SIMETIGAST FORTE
240 mg kapsulės, 10 kapsulių ~~2,96~~ **2,37 €**
SIMETIGAST FORTE
240 mg kapsulės, 60 kapsulių ~~9,40~~ **7,52 €**
SIMETIGAST FORTE BABY
geriamieji lašai, 30 ml ~~5,44~~ **4,35 €**
MEDICINOS PRIEMONĖS
„SIMETIGAST FORTE" 240 mg kapsulės (simetikonas) skirtos vartoti vyresniems nei 12 m. pacientams, esant pilvo pūtimui, pilnumo jausmui pilve, raugėjimui. Taip pat galima naudoti prieš pilvo ertmės diagnostines procedūras, nes tai pagerina vaizdų kokybę. Vartoti: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. amžiaus jaunuoliai – po 1 kapsulę 2–3 kartus per parą. Prieš diagnostines procedūras: 1 kapsulė vakare dieną prieš tyrimą ir 1 kapsulė ryte tyrimo dieną.
„SIMETIGAST FORTE BABY" geriamieji lašai (simetikonas) skirti kūdikiams nuo 28-os gyvenimo dienos ir vaikams iki 12 metų. Vartoti: kūdikiams (nuo 28-os gyvenimo dienos) ir vaikams iki 2 metų 3 lašai prieš, per ar po kiekvieno valgio. Negalima vartoti daugiau kaip 18 lašų per dieną.
GREITOJI PAGALBA IŠPŪSTAM PILVUI.

-20% 11,99€ ~~14,99~~



BIO-KULT, 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
BIO-KULT - unikalus pieno rūgšties bakterijų kompleksas, vienoje kapsulėje net 14 skirtingų rūšių bakterijų!
„BIO-KULT" – MOKSLINIAIS TYRIMAIS PAREMTŲ GYVŲJŲ BAKTERIJŲ KOMPLEKSAI!

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**



AMBIO
KALIS 320 mg IR MAGNIS 375 mg, 30 paketėlių **12,48 €**
KALIS IR MAGNIS, 60 tablečių **11,58 €**
MAGNIS, 375mg, 30 paketėlių **10,68 €**
MAISTO PAPILDAI

IKI -50%



AMBIO
CHOLESTEROL BALANCE COMPLEX, 90 kapsulių ~~29,98~~ **14,99 € -50 %**
GUDOBELĖ SU MAGNIU, 30 kapsulių ~~8,48~~ **4,66 € -45 %**
OMEGA-3 FORTE, 60 kapsulių ~~12,98~~ **7,14 € -45 %**
MAISTO PAPILDAI

-30%



MOCARD ATERO
MOCARD ATERO, 60 tablečių ~~22,95~~ **16,09 €**
MOCARD ATERO, 120 tablečių ~~41,99~~ **29,39 €**
MAISTO PAPILDAI
Cholesteroliui, kraujagyslėms ir širdžiai*
Maisto papildas su monakolinu K, natokinaze, vitaminu B1, ciberžole ir augaliniais polifenoliais. Sudėtyje yra Omeolipid® – patentuotas artišokų, ciklanterų arba perujinių agurkų ir ožragės ekstraktų mišinys.
*Ciberžolė padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje ir širdies ir kraujagyslių veiklą. Ciberžolė ir artišokas padeda palaikyti normalią lipidų koncentraciją kraujyje.
*Tiaminas padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Artišokas padeda palaikyti normalią kepenų veiklą.

-40% 0,89€ ~~1,49~~



VALIDOL, 10 čiulpiamųjų tablečių
MAISTO PAPILDAS
Sudėtyje esantis vaistinių valerijonų ekstraktas padeda atsipalaiduoti bei palaikyti gerą psichologinę būseną.
Vartojimas: Tabletę reikia laikyti po liežuviu tol kol ji visiškai ištirpsta. Vartojama po 1 tabletę 2-4 kartus per dieną.
VALIDOL ACONITUM – JŪSŲ GERAI SAVIJAUTAI!

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis

NUO **4,49 €**



NALGESIN S

Natrio naproksenas, 10 dengtųjų tablečių **4,49 €**
Natrio naproksenas, 20 dengtųjų tablečių **6,49 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: natrio naproksenas – 275 mg. Indikacijos: galvos, dantų, mėnesinių, sąnarių, raumenų, potrauminiams, pooperaciniams skausmams malšinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 18 metų vaikams įprastinė paros dozė skausmui malšinti – 550–1 100 mg. Iš pradžių vartojama 550 mg, vėliau – po 275 mg kas 6–8 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bet kuriai sudedamajai preparato medžiagai, buvusi alerginė reakcija, kurią sukėlė nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, aktyvi ar atsinaujinanti skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, kraujavimas iš virškinamojo trakto, sunkus širdies nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: naproksenu gydomą pacientą, sergantį epilepsija ar porfirija, kuriam buvo ar yra virškinamojo trakto sutrikimų, ypač opinis kolitas ar Krono liga, privalo stebėti gydytojas. Naprokseno draudžiama vartoti, jei yra sunki nesena žaizda arba iki didelės operacijos liko mažiau kaip 48 valandos. Reklamos teksto parengimo data: 2024 07 12.
MALŠINA SKAUSMĄ IR UŽDEGIMĄ.

TEMPERATŪRAI MAŽINTI IR SKAUSMUI MALŠINTI

NUO **4,49 €**



IBUGARD

100 mg/5 ml geriamoji suspensija, 120 ml **4,49 €**
200 mg/5 ml geriamoji suspensija, 100 ml **8,49 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: **5 ml IBUGARD 100 mg/5 ml** geriamosios suspensijos yra 100 mg ibuprofeno. 5 ml **IBUGARD 200 mg/5 ml** geriamosios suspensijos yra 200 mg ibuprofeno. Terapinės indikacijos. Įvairios kilmės karščiavimo, įvairios kilmės silpno ir vidutinio stiprumo skausmo, tokio, kaip virusinės ar kitokios infekcijos sukelto galvos, gerklės ir raumenų skausmo; sąnarių ir kaulų skausmo; pooperacinio skausmo; danties skausmo, galvos skausmo; ausies skausmo, esant vidurinės ausies uždegimui, mažinimui. Vartojimo būdas ir dozavimas: nustatant ibuprofeno dozę, reikia atsižvelgti į paciento kūno svorį ir amžių. Paprastai vienkartinė ibuprofeno dozė yra 7–10 mg/kg kūno svorio, maksimali paros dozė yra 20–30 mg/kg kūno svorio. Dozę galima kartoti kas 6–8 valandas, tarp dozių turi būti ne mažesnis nei 4 valandų intervalas. Tik trumpalaikiam vartojimui. Kontraindikacijos: Padidėjęs jautrumas ibuprofenui, aspirinui ar kitam nesteroidiniam vaistui nuo uždegimo (NVNU), arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei sergate ar sirgote skrandžio ir (arba) dvylikapirštės žarnos opa ar kraujavimu iš virškinamojo trakto; sergate sunkiu kepenų, širdies ar inkstų funkcijos sutrikimu. Yra polinkis į kraujavimą. Specialūs įspėjimai: specialių atsargumo priemonių reikia, jei inkstų, kepenų ar širdies funkcija yra sutrikusi, sutrikęs kraujo krešėjimas arba vartojami antikoaguliantai, sergama cukriniu diabetu, raudonaja vilklige, krono liga, opiniu kolitu, hipertenzija, astma, šienlige, yra nosies polipų ar lėtinių infekcinių kvėpavimo takų ligų. Teksto paruošimo data 2024 01 mėn.

RAUMENIMS IR SĄNARIAMS

-30%



PERSKINDOL

MEDICINOS PRIEMONĖS, KOSMETIKA

„Perskindol Active“ – šaldomojo ir šildomojo poveikio sąnarių ir raumenų gelis. Sudėtyje esantis mentolis, gaunamas iš pipirmėčių, atvėsina skaudamą vietą, ramina raumenų, sąnarių, nugaros, meškiungio sukeltą skausmą. Eterinių aliejų kompleksas aktyvina kraujotaką, sušildo, atpalaiduoja raumenį, mažina sustingimą, gerina raumenų veiklą. Purškiklis „Perskindol Active Spray“ rekomenduojamas naudoti prieš treniruotę, kitokį fizinį krūvį arba po jo, siekiant sumažinti raumenų nuovargį. Patogus didesniam ar sunkiai pasiekiamam odos plotui dengti. „Perskindol Cool Spray“ – greito šaldomojo poveikio purškiklis, kuris greitai bei intensyviai vėsina. Rekomenduojamas fizinio krūvio ir treniruočių metu, kai gali prireikti greito ir stipraus šaldomojo poveikio. „Perskindol Thermo Hot“ - kaitinamojo poveikio gelis su eteriniais aliejais skirtas skausmui mažinti bei įtampai lengvinti nugaros, juosmens, kaklo ir pečių srityje. Rekomenduojamas kaip pagalbinė priemonė pasireiškus ūminei kreivakaklystei (kaklo stinguliui), su sėdmens nervu susijusiam ar strėnų skausmui malšinti. „Verfora SA“, Šveicarija.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

NUO SKAUSMO

4,49 €



METAFENEX 200 mg/500 mg, 10 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg ibuprofeno ir 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos.** „Metafenex“ skirtas trumpalaikiam lengvo ar vidutinio stiprumo skausmui, siejamam su migrena, galvos skausmu, nugaros skausmu, mėnesinių skausmu, dantų skausmu, reumatiniu bei raumenų skausmu, nestiprinu artrito skausmu, peršalimo ir gripo simptomais, gerklės (ryklės) skausmu bei karščiavimu, malšinti. Šis vaistinis preparatas ypač tinka skausmui, kuriam reikia stipresnės analgezijos nei vartojant vien ibuprofeną ar paracetamolį. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiesiems gerti po 1 tabletę ne dažniau kaip 3 kartus per parą valgio metu užgeriant vandeniu. Tarp dozių išlaikyti ne mažiau kaip 6 valandų tarpą. Jei, vartojant po 1 tabletę, simptomai neišnyksta, daugiausia galima vartoti po 2 tabletes ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių per bet kurį 24 valandų laikotarpį. „Metafenex“ negalima vartoti ilgiau kaip 3 dienas. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų asmenims. **Kontraindikacijos.** Šio vaistinio preparato vartoti negalima pacientams, kuriems yra padidėjęs jautrumas ibuprofenui, paracetamoliui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti kartu su kitais vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra paracetamolio ar kitų NVNU, įskaitant CŌX-2 inhibitorius ir didesnes kaip 75 mg acetilsalicilo rūgšties paros dozes; jei anksčiau buvo padidėjusio jautrumo reakcijų, susijusių su acetilsalicilo rūgštimi arba kitais nesteroidiniais vaistiniais preparatais nuo uždegimo; jeigu anksčiau buvo aktyvi arba buvusi pasikartojanti peptinė opa; buvo ar yra virškinimo trakto išopėjimas ir (arba) ar jo prakiurimas ar kraujavimas, susijęs su ankstesniu gydymu NVNU. Pacientams, kuriems yra kraujo krešėjimo sutrikimų; kuriems yra sunkus kepenų, inkstų arba širdies nepakankamumas. Negalima vartoti paskutinio nėštumo trimestro metu. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Būtinas ypatingas atsargumas: jei pacientas serga infekcine liga, pacientas yra senyvo amžiaus; serga ar anksčiau sirgo astma; yra inkstų, širdies, kepenų arba žarnyno sutrikimas; serga sistemine raudonaja vilklige; yra virškinimo trakto sutrikimų arba lėtinė uždegiminė žarnyno liga; pacientė nėščia pirmuosius 6 nėštumo mėnesius arba žindo. Reklamos teksto parengimo data 2022-03.
SKAUSMĄ KEISK Į „METAFENEX“!

-25% ~~4,87 €~~ **4,49 €**



AMEDIPLUS

Šildantis arklių balzamas, 250 ml
Šaldantis arklių balzamas, 250 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!** **10,49 €**



AMEDIPLUS ACTIVE GEL

šaldomasis-šildomasis kūno gelis, 100 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ





EFEKTYVIAI MALŠINA HEMOROJAUS SUKELTUS SIMPTOMUS:
- SKAUSMĄ, NIEŽULĮ, DEGINIMO JAUSMĄ
- GERINA KRAUJAGYSLIŲ TONUSĄ

PROCTO-GLYVENOL žvakutės, N10
PROCTO-GLYVENOL tiesiosios žarnos kremas, 30 g

PROCTO-GLYVENOL skirtas lokaliam simptominiam vidinio ir išorinio hemorojaus gydymui. Vartoti į tiesiąją žarną, po 1 žvakutę du kartus per parą arba kremu galima tepti išangės sritį du kartus per parą, ryte ir vakare tol, kol ūminiai ligos požymiai išnyks, paprastai 7-10 dienų. Po to dozę galima sumažinti ir vartoti vieną kartą per parą ne ilgiau kaip 3 savaites, jei reikia. Vartoti draudžiama jei yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei PROCTO-GLYVENOL medžiagai. Atsargiai vartoti pacientams, sergantiems sunkia kepenų liga. Saugotis, kad nepatektų į akis, negalima nuryti. Nerekomenduojama vartoti vaikams. Reklamos teksto parengimo data – 2024/09.

RECORDATI

RE_LT_PG_2024_324

-45%



AMBIO

REGĖJIMUI, 30 kapsulių ~~11,95~~ 6,59 €
REGĖJIMUI SU GINKMEDŽIO EKSTRAKTU, 30 kapsulių ~~14,95~~ 8,24 €
MAISTO PAPILDAI

AKIMS

IKI -50%

NAUJIENA

Geriamos kapsulės **akių drėgmei**



OCUVAL

MAISTO PAPILDAI.
Išbandykite naujienų akių drėgmei – "Ocuval Hydro Max"! Pažangi formulė, sukurta aprūpinti akis drėgme iš vidaus – geriant kapsules. Ypač naudingas akių drėgmei, nuovargiui mažinti, regėjimui išsaugoti. Tiks ir patiks pavargusioms, jautriems, daug dirbančioms ir drėgmės ištroškusioms akims.
Išsaugokite normalų regėjimą su – „Ocuval" tabletėmis! Tai akims naudingų medžiagų kompleksas, kurio sudėtyje – net 25 mg liuteino ir beta karoteno, kuris reikalingas tinkamam regėjimui palaikyti.
RŪPINKITĖS SAVO AKIMIS - JOS NUSIPELNO GERIAUSIO!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

IKI -50%



LIUBERIN

LIUBERIN + LUTEIN 35mg, 30 kapsulių ~~16,59~~ 8,30 € -50 %
LIUBERIN SUPERIOR, 30 kapsulių ~~18,49~~ 11,09 € -40 %
MAISTO PAPILDAI.
Linija **„Liuberin"** skirta padėti išsaugoti normalų regėjimą bei palaikyti akies kraujotaką. **"Liuberin superior"** net 18 aktyviųjų medžiagų kompleksas sausoms, pavargusioms, daug į skaitmeninių įrenginių ekranus žiūrinčioms akims. Sudėtis praturtinta ginkmedžiu, kuris padeda palaikyti akies kraujotaką. O **"Liuberin +LUTEIN 35 mg"** – naujausia formulė akims! Šio preparato sudėtis praturtinta karotenoidais: net 35 mg liuteino ir 3 mg zeaksantino, kurių su amžiumi koncentracija akyse mažėja. Gausi sudėtis išsiskiria ir mėlynių uogų ekstraktu, kuris padeda palaikyti normalią akių funkciją, vaizdo aiškumą ir kraujotaką. Normalų regėjimą padeda išsaugoti vitaminas A ir cinkas. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.
RYŠKIOMS GYVENIMO SPALVOMS!

-20% 12,66€ ~~15,83~~



OCHISAN, 15g

MEDICINOS PRIEMONĖ
Akių vokų tepalas be konservantų. Padeda palengvinti tokius simptomus, kaip vokų odos niežulys, jų skausmingumas ir patinimas, susijusius, be kita ko, su išorinio miežio ir chalaziono atsiradimu. Veiklioji medžiaga šluotinių sėklučių medus (manuka) MGO 400+, šluotinių sėklučių aliejus (manuka).

NUO 9,99 €



NICORETTE

NICORETTE COOLMINT 1 mg/išpurškime burnos gleivinės purškalas (tirpalas), 150 išpurškimų **22,99 €**
NICORETTE INVISIPATCH 10 mg/16 h (15 mg/16 h; 25 mg/16 h) transderminis pleistras, 7 transderminiai pleistrai **22,99 €**
NICORETTE FRESHFRUIT 2 mg (4 mg) vaistinė kramtomoji guma, 30 vienetų **9,99 €**
NICORETTE FRESHMINT 2 mg (4 mg) vaistinė kramtomoji guma, 30 vienetų **9,99 €**
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI.
Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje gumoje yra 2 mg (4 mg) nikotino (rezinato pavidalu); viename pleistre yra 15,75 mg (23,62 mg; 39,37 mg) nikotino; kiekviename išpurškime (0,07 ml tirpalo) yra 1 mg nikotino. 1 ml tirpalo yra 13,6 mg nikotino. **Indikacijos:** vaistinė kramtomoji guma, transderminiai pleistrai; priklausomybei nuo tabako gydyti, lengviau nutraukimo simptomus, kad būtų lengviau laikinai susilaikyti nuo rūkymo, o apsigynus - mesti rūkyti; purškalas: priklausomybės nuo tabako gydymas, sumažinant potraukį nikotinui ir palengvinant nutraukimo simptomus, kurie atsiranda metant rūkyti staiga ar palaipsniui. Tikslas yra visam laikui nutraukti tabako vartojimą. „nicorette coolmint" geriausia vartoti kartu su elgesio palaikymo programa. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** paprastai pakanka kramtyti 8–12 tam tikro stiprumo vaistinių kramtomųjų gumų per dieną. Pleistrą reikia priklijuoti ant odos ryte, o vakare jį nuimti. Purškalo reikia įsipurkšti 1–2 vaisto dozes tuo laiku, kai paprastai rūkoma, arba jeigu jaučiamas poreikis rūkyti. Galima vartoti iki 4 ipurškimų per valandą. Negalima purkšti daugiau kaip 2 išpurškimus iš karto, per 24 valandas neviršyti 64 ipurškimų (4 purškimai per valandą, 16 valandų periode). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas nikotinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Gumos negalima kramtyti vaikams iki 12 metų. Purškalo negalima vartoti jaunesniems kaip 18 m. pacientams, nerūkantiems pacientams. **Specialūs įspėjimai:** prieš vartodami „nicorette", pasitarkite su gydytoju, jeigu turėjote širdies infarktą, insultą, sergate nestabilia arba progresuojančia krūtinės angina, sunkiomis širdies aritmijomis, yra nekontroliuojama hipertenzija. Pacientai, sergantys cukriniu diabetu, pradėję naudoti nikotino pakeičiamąją terapiją, turi atidžiau sekti savo cukraus kiekį kraujyje. Galima rizika ir laukiama gydymo nauda turi būti apsvarstyta gydytojo, jeigu pacientai serga inkstų ir kepenų nepakankamumu, feochromocitoma ir nekontroliuojama hipertenze, viršikinimo trakto ligomis. Jeigu sergate žvyneline, lėtiniu dermatitu ar dilgėline, nekljuokite „nicorette" pleistro ant pažeistos odos. Norint išvengti nudegimų rizikos, pleistrą reikia nuimti prieš atliekant magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą. Kramtomoji guma gali prilipti prie dantų protezo ir jį sugadinti. Kramtomųjų gumų ir purškalo sudėtyje yra butilhidroksitolueno, kuris gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivinę. Kramtomųjų gumų sudėtyje yra ksilitolio, kuris gali laisvinti vidurius. Reklamos teksto parengimo data: 2024 02. LT-NI-2000003.

IKI -40%



VITIRON™

MAISTO PAPILDAI
„VitirON™ D3+OMEGA3 STRONG" yra didelė vitamino D3 dozė, paruošta linų sėmenų aliejaus pagrindu, o tai yra natūralios kilmės omega-3. Linų sėmenų aliejaus pagrindas skatina gerą D vitamino absorbciją ir biologinį įsisavinimą. **„VitirON™ D3 Olive SUN"** – vitaminas D, ištirpintas tyrame alyvuogių aliejuje, kuris užtikrina geresnį jo pasisavinimą. Patogus ir greitas vitaminas D kiekvienam! **„VitirON™ KIDS"** – tai vaisių ir uogų skonių, įvairių formų kramtomieji guminukai su vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis. **„VitirON™ Kids grow UP"** skirti vaikų kaulų augimui ir vystymuisi, **„VitirON™ Kids School for BRAIN"** – smegenims, normaliai psichologinei būklei, pažinimo funkcijai, **„VitirON™ Kids Sports"** – normaliai energijos apykaitai, o „VitirON™ KIDS Immunity" su šeivamedžių sultimis – imunitetui. **„VitirON™ Mind & Body FORTE"** – vitaminai ir mineralinės medžiagos ilgalaikei **PROTINEI** bei **FIZINEI** ištvermei. Aprūpina medžiagomis, kurios yra būtinos psichinei bei fizinei ištvermei palaikyti, esant padidėjusiam stresui. **„VitirON™ Immunity STRONG"** – tai vitaminai ir vaistažolių ekstraktai, skirti organizmo imuninės sistemos apsaugai.
VITAMINŲ GALIA VISAI ŠEIMAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

4,99 €



LORATIN EXPRESS 10 mg tabletės, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 10 mg loratadino. **Terapinės indikacijos:** simptominis alerginės slogos ir lėtinės idiopatinės dilgėlinės gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiesiems ir vyresniems negu 2 metų vaikams – po 1 tabletę per dieną. **Kontraindikacijos:** padidėjes jautrumas loratadinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nevartoti jaunesniems nei 2 metų arba sveriantiems mažiau kaip 30 kg vaikams. **Specialūs įspėjimai:** vaistą atsargiai reikia vartoti pacientams, kuriems yra sunkus kepenų veiklos sutrikimas. „Sandoz Pharmaceuticals d.d." filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2403136091. Teksto patvirtinimo data: 2024-03-13.

NUO ODOS SUDIRGINIMO

6,99 €



HYDROCORTISON TAKEDA 10 mg/g, gelis, 10 g.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Sudėtis. 1 g gelio yra 10 mg hidrokortizono. **Indikacijos.** Trumpalaikis lengvo odos niežulio ir sudirginimo malšinimas, esant nedideliems odos pažeidimams (pvz., po vabzdžių įgėlimo ar įkandimo). **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Suaugusiesiems 1–3 kartus per parą, vyresniems kaip 2 m. vaikams 1–2 kartus per parą ant odos tepti ploną sluoksnį gelio. Vartoti ne ilgiau kaip 7 paras. **Kontraindikacijos.** Padidėjes jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, rožinė, perioralinis dermatitas, paprastieji spuogai, bakterinė, grybelinė arba parazitinė odos infekcija, kai netaikomas reikiamas gydymas, įtariamas ausies būgnelio prakiurimas, vartojimas ant veido, išangės ar lytinių organų srities arba atvirų žaizdų, jaunesniems nei 2 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai.** Vartoti tik išoriškai, saugotis, kad nepatektų į akis. Gali atsirasti odos atrofija, paūmėti virusinė, bakterinė ar grybelinė infekcija, sulėtėti žaizdų gijimas, pasireikšti regėjimo sutrikimai, ilgalaikis vartojimas ant veido gali sukelti kataraktą ar glaukomą. Jei atsiranda padidėjusio jautrumo simptomų, gydymą reikia nutraukti. Vengti vartojimo po užtarais drabužiais (įskaitant užtarais sauskelnes) ar vietose, kur oda liečiasi su oda. Teksto parengimo data: 2022-04-14 LT-HYCO-2200001
NUMALŠINK IR ODOS SUDIRGINIMĄ, IR NIEŽĖJIMĄ!

GERAI SAVIJAUTAI

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis



IMUNITETUI IR GERAI SAVIJAUTAI

-25%



NEW NORDIC MULTIVITAMINAI

MAISTO PAPILDAI

Skandinavų bendrovės „New Nordic" multivitaminai – tai puikiai suderinti vitaminų, mineralų, mikroelementų ir augalinių ekstraktų kompleksai imunitetui ir gerai savijautai. **„Multivitamin active woman"** – moterims, besirūpinančioms gera savijauta ir grožiu. **„Multivitamin active woman 55+"** – vyresnių moterų organizmo poreikiams. **„Multivitamin pregnant and breastfeeding woman"** – besilaukiančioms moterims ir žindyvėms. **„Multivitamin active man"** ir **„Multivitamin active man energy boost"** – vyrams. Nepamirškome ir mažųjų – „Mineralai kaulams", apelsinų arba miško uogų skonio kramtomosios tabletės – kalcio, magnio ir vitamino D šaltinis augančiam organizmui. **„Multi vegan GUMMIES"** – gaivaus vaisių ir uogų skonio multivitaminai guminukai imunitetui. Tinka visai šeimai, taip pat vegetarams ir veganams. Sudėtyje esantys vitaminai A, C, D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

JAUSKITĖS PUIKIAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

IKI -50%



SPORT & JOINTS BIOMAGNIS + BIOKALIS, 14 pakelių ~~15,69~~ 10,91 € -30 %
SPORT & BASIC BIOMAGNIS + BIOKALIS, 14 pakelių ~~12,59~~ 8,81 € -30 %
BIOMAGNESIUM FORTE, 20 pakelių ~~14,79~~ 10,35 € -30 %
BIOMAGNIS 300 MG + BIOKALIS 300 MG, 30 pakelių ~~14,49~~ 7,25 € -50 %

MAISTO PAPILDAI

Maisto papildai milteliais geriamajam tirpalui ruošti. „Sport & Joints" – elektrolitai su kalciu ir gliukozaminu. Gliukozaminas yra sąnario kremzlės struktūrinė dalis. Kalcis reikalingas normaliai kaulų ir dantų būklei palaikyti. „Sport & Basic" – šarminiai elektrolitai su vitaminu C! Elektrolitų tirpalai naudingi ne tik sportuojant ar fizinio krūvio metu, bet ir kasdien intensyviai dirbant, mokantis ar poilsiaujant. „bioMAGNESIUM forte" – net 500 mg gryno magnio 1 pakelyje. „bioMAGNIS 300 mg + bioKALIS 300 mg" – 300 mg magnio ir 300 mg kalio 1 pakelyje. Magnis ir kalis reikalingi normaliai nervų sistemos veiklai ir raumenų funkcijai palaikyti. Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą, palaikyti normalią energijos apykaitą. Produktų sudėtyje nėra konservantų, stabilizatorių ar dažiklių. Magnis išgaunamas iš Negyvosios jūros. Pagaminta Izraelyje!

NEPRARASK MINERALŲ – NEPRARASK ENERGIJOS!

-40%



WALMARK BIORYTHM

MAISTO PAPILDAI

Naujiena – inovatyvios formos maisto papildų linija „Walmark Biorythm", kurią sudaro 6 produktai: cinkas, selenas, geležis, vitaminas B12, magnis, ašvaganda (migdomosios vitanijos).

Lėto atpalaidavimo mikrogranulės, esančios „Walmark Biorythm" linijos produktuose, išskiria medžiagas iki 8 valandų per dieną, todėl organizmas pasiima jas tada, kai jam reikia.

„WALMARK BIORYTHM" VEIKIA TAVO KŪNO RITMU!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

NUO ALERGIJOS

3,99 €



CETIRIZIN ACTAVIS 10 mg, 10 dengtųjų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

„Cetirizin Actavis" 10 mg plėvele dengtos tabletės. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos.** Suaugusiems žmonėms ir 6 metų amžiaus bei vyresniems vaikams cetirizinas vartojamas sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito simptomams (nosies ir akių) palengvinti bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės simptomams palengvinti. **Dozavimas ir vartojimo metodas**. *Vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus*: 5 mg (pusė tabletės) du kartus per parą. *Suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams*: 10 mg (1 tabletė) 1 kartą per parą. Esant inkstų funkcijos sutrikimui, dozę reikia mažinti. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, hidroksizinui arba bet kuriam piperazino dariniui. Pacientai, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas mažesnis negu 10 ml/min.). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju ar vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Cetirizin Actavis": jeigu sergate inkstų nepakankamumu (jei būtina, Jums reikės vartoti mažesnę vaisto dozę. Reikalinga dozę nustatys gydytojas); jei yra rizikos veiksnių, galinčių sukelti šlapimo susilaikymą; jei sergate epilepsija ar Jums gali būti traukulių. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Reklamos teksto parengimo data:** 2023 gegužė. OTC-LT-00060

-30% **1,04 €** ~~1,49~~



VALIDOL-LUBNYPHARM,

10 poliežuvinių tablečių.

MAISTO PAPILDAS

Grynasis kiekis: 12,23 g. **Sudedamosios dalys:** cukrus, mentolio tirpalas izovalerijonų rūgšties mentilo esteryje, kalcio stearatas. 2-ose tabletėse yra 0,12 g mentolio tirpalo izovalerijonų rūgšties mentilo esteryje ir 4-ose tabletėse yra 0,24 g mentolio tirpalo izovalerijonų rūgšties mentilo esteryje. **Vartojimas: VALIDOL–Lubnypharm** tabletę reikia laikyti po liežuviu tol, kol ji visiškai ištirpsta. Vartojama po 1 tabletę 2–4 kartus per dieną. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, gamintojo pakuotėje, kad produktas būtų apsaugotas nuo drėgmės. Tinkamumo laikui pasibaigus vartoti negalima. Geriausias iki (pabaigos): žr. ant pakuotės. **Gamintojas:** AAB „Lubnypharm", Lubnai 37500, Petrovskogo g.16, Ukraina. Išskirtinis atstovas Lietuvoje UAB „FD group"

-20%



FLORADIX

MAISTO PAPILDAI

„Floradix" – svarbiausi mineralai ir vitaminai gerai savijautai. „Floradix" natūralios sudedamosios dalys užtikrina gerą organizmo svarbiausių vitaminų ir mikroelementų pasisavinimą. Skystos formos medžiagos greičiau rezorbuojasi nei esančios tabletėse, o dėl puikaus skonio juos noriai geria maži vaikai ir yra tinkami vartoti nėščioms moterims.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-10% **2,96€** ~~3,29~~



GINTARO RŪGŠTIS, 20 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Vartojimas: gerti po 1 tabletę 3 kartus per dieną valgant.
Rekomenduojamame suvartoti per parą kiekyje (3 tabletėse) yra 0,3 g gintaro rūgšties.
Gamintojas: UAB „Medicata Filia", Žarijų g.2B, Vilnius
Išskirtinis platintojas Lietuvoje: UAB „VERATRUM PHARMA", Žarijų g. 2B, Vilnius

-30%



„SMARTHIT IV“ EFEKTYVAUS PASISAVINIMO MAISTO PAPILDAI

MAISTO PAPILDAI

Miosol technologijos dėka pagaminami produktai, kurie pasisavinami itin gerai. Be to, mikrokapsulės sumažina šalutinių poveikių riziką. Efektyvaus pasisavinimo maisto papildų **SMARTHIT IV®** linija sudaro:

SMARTHIT IV® Lactoferrin. Laktoferinas – tai geležį surišantis baltymas, dalyvaujantis geležies pasisavinimo procese. Galima vartoti kartu su **SMARTHIT IV® Ferrum** kapsulėmis arba **SMARTHIT IV Ferrum Liquid** skysta geležies forma, tinkančia suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų. Geležis padeda palaikyti normalų hemoglobino ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą.

SMARTHIT IV® Ferrum Gummies – pirmieji mikrokapsuliuotis geležies guminukai.

SMARTHIT IV® Vitamin C+Zn – mikrokapsuliuotas vitaminas C su cinku kapsulėmis.

SMARTHIT IV® Vitamin D3 – kaulams, dantims, raumenims;

SMARTHIT IV® Vitamins D3+K2 – sinerginis, vitaminų D3 ir K2 poveikis kaulams ir kraujotakai;

SMARTHIT IV® Vitamin B12 – normaliai kraujodarai bei psichologinei funkcijai palaikyti ypač daug dirbantiems ir besimokantiems;

SMARTHIT IV® Polifen – polifenolių šaltinis gerai savijautai.

„SMARTHIT IV®“ – MENAS VEIKTI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-30%



SVEIKAŽOLIŲ ARBATOS

ČIOBRELIS, 1,5 g x 20 vnt. ~~2,19~~ 1,53 €
LIEPŲ ŽIEDAI, 1,5 g x 20 vnt. ~~4,99~~ 3,49 €
RAMUNĖLĖS 1 g x 24 vnt. ~~1,89~~ 1,32 €
SENOS LAPAI, 1,5 g x 20 vnt. ~~2,49~~ 1,74 €

ARBATOS

Vaistinių čiobrelių žolė gali padėti palaikyti viršutinių kvėpavimo takų ir virškinimo sistemos funkcijas.
Mažalapių liepų žiedai gali padėti palaikyti imuninės sistemos bei kvėpavimo takų funkcijas.
Vaistinių ramunių žiedai gali padėti palaikyti virškinamojo trakto, viršutinių kvėpavimo takų funkciją, gerinti miego kokybę.
Senų (siauralapių velniapupių) lapai gali padėti palaikyti normalią žarnyno funkciją.

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



DINADAX

kramtomosios lazdelės

MAISTO PAPILDAI

„DinadaxActive“ – maisto papildas su laktobakterijomis, fruktooligosacharidais, bičių pieneliu, vitaminais B1 ir B6.
„Dinadax Energy“ – maisto papildas su bičių pieneliu, žolatina ir B grupės vitaminais.
„Dinadax Sapiens“ – maisto papildas su cholino bitartratu, omega-3, linolo ir oleino rūgštimis, vitaminais, folio rūgštimi, biotinu ir cinku.
KRIMSK PASIGARDŽIUODAMAS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-40%



VIRONOX

MAISTO PAPILDAI

„Vironox“ epigenetinė linija, sukurta Šveicarijos ir Lietuvos mokslininkų. **„Stiprus imunitetas+“** – greitas 7 dienų kursas organizmo apsaugai bei imunitetui. Vitaminas C, cinkas bei dygliuotųjų šaltalankių vaisių ekstraktas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Natūralus energijos šaltinis – **„Jėgoms atstatyti+“**. Kininių žeńsenių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalų organizmo gyvybingumą, vitaminas B6, – normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą bei mažinti nuovargį. Naujiena protinei veiklai – **„Smegenų rūkas“**. Rausvųjų rodiolių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją. Niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją bei nervų sistemos veiklą. Vartojimas: 1 paketėlis per dieną. Balzamas **„Veiksminga apsauga“** su interferonu padeda suformuoti apsauginį barjerą.
„VIRONOX“ – NELEISK TAVĘS SUSTABDYTI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-30%



BERES DROPS PLUS

BERES DROPS PLUS, geriamieji lašai, 30 ml ~~13,69~~ 9,58 €
BERES DROPS PLUS, geriamieji lašai, 100 ml ~~27,99~~ 19,59 €

MAISTO PAPILDAI

„Beres Drops Plus“ sudėties pagrindas – kruopščiai atrinktų ir subalansuotų mineralų ir mikroelementų sinergija, užtikrinanti jų pasisavinimą! Sudėtyje esantys mineralai palaiko imuninę sistemą (varis), kraujodarą (geležis) ir apsaugą nuo oksidacinės pažaidos (selenas), taip pat padeda mažinti nuovargį (geležis). „Beres Drops Plus“ yra pagamintas vandens pagrindu, be jokių kvapiųjų ar skonio medžiagų. Puikiai tinka tiek vaikams, tiek suaugusiesiems.
„BERES“ – GEROS SAVIJAUTOS ELIKSYRAS KIEKVIENAM!

-30% 5,94 € ~~8,49~~



AMARIN FORTE, 45 tabletės

MAISTO PAPILDAS

Rekomenduojamas suaugusiesiems, kurie linkę patirti nemalonius pykinimo simptomus kelionės metu. Maisto papildo „Amarin Forte“ sudėtyje yra **tikrųjų imbierų šakniastiebių sausojo ekstrakto ir vitamino B_6.**
Vartojimas: po 1 tabletę 30 min. prieš kelionę.

-30%



REXSAVIT

MAISTO PAPILDAI LIPOSOMOSE

Liposominė technologija užtikrina, kad vitaminai ir mineralai išlaikys savo vientisumą, kol bus pristatyti į žarnyną organizmo pasisavinimui. Tai puikus pasirinkimas geresniam efektui pasiekti, norint palaikyti ar sugrąžinti organizmo gyvybines jėgas.
„Rexsavit Lipo Mg+B6+Melatoninas“, 30 kietųjų kapsulių. Padeda greičiau atsipalaiduoti ir užmigti. Sudėtyje yra melatonino, kuris padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti trukmę, bei subjektyvų laiko juostų skirtumo pajautimą.
„Rexsavit Lipo D3 4000IU“, 30 kietųjų kapsulių. Vitaminas D3 liposomose imunitetui, kaulams.
„Rexsavit Lipo Mg+B6“, 30 kietųjų kapsulių. Mg liposomose ir vitaminas B6 nervų sistemai, raumenims, energijai.
„Rexsavit Lipo C 500 mg“, 30 kietųjų kapsulių. Vitaminas C 500 liposomose imunitetui.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis

IKI -50%



„MÖLLER'S" ŽUVŲ TAUKAI

MAISTO PAPILDAI

„Möller's" – jau 170 metų puoselėjami žuvų taukai visai šeimai. „Möller's" žuvų taukų kapsulės išsiskiria kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyviu medžiagų deriniais. Tyri ir gerai išvalyti „Möller's" žuvų taukai puikiai tinka vartoti kasdien visą gyvenimą. Įvairaus skonio kramtomosiose žuvelėse „Möller's Junior" yra omega-3 ir vitamino D – augančiam vaikų organizmui naudingų medžiagų.

„MÖLLER'S" – OMEGA-3 EKSPERTAI JAU 170 METŲ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

IKI -20%



SYMBIOSYS

MAISTO PAPILDAI

„Symbiosys" produktai sukurti kartu su mokslininkais, kad įvairiose situacijose ir skirtingais mūsų amžiaus tarpsniais padėtų palaikyti gerą savijautą. ID 20230316_13687702

MIKROORGANIZMAI GERAI SAVIJAUTAI. REIKŠMINGA VISĄ GYVENIMĄ.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-20% 4,39€ ~~5,49~~



GLICINAS, 50 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Sudedamosios dalys: glicinas (65 % grynojo kiekio), dekstrozės monohidratas, kukurūzų krakmolas, lipnumą reguliuojanti medžiaga riebalų rūgščių magnio druskos. Grynasis kiekis: 7,6 g. Vartojimo būdas: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Tabletę laikyti po liežuviu, kol ištirps. Rekomenduojamame suvartoti per parą kiekyje (3 tabletėse) yra 300 mg glicino. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Laikymo sąlygos. Laikyti sausoje, tamsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Gamintojas: UAB „Medicata Filia", Žarijų g. 2B, Vilnius. Išskirtinis platintojas Lietuvoje: UAB VERATRUM PHARMA, Žarijų g.2B, Vilnius

IKI -40%



„LIVOL MULTI" VITAMINAI

MAISTO PAPILDAI

Skandinaviški maisto papildai „Livol" sukurti, remiantis holistiniu požiūriu į Jūsų organizmo sveikatą, todėl labai veiksmingi. Gaminami Danijoje nuo 1959 m. Kurdami „Livol", Skandinavijos mokslininkai įvertino skirtingus žmonių poreikius ir pasiūlė saugių dozių bei efektyvaus pasisavinimo (su EC gamybos technologija) vitaminus.

„LIVOL" – NR.1 SKANDINAVIŠKI MULTIVITAMINAI LIETUVOJE!*

* Lietuvoje Nr.1 multivitaminų kat., vaistinėse 2023 m. (šaltinis: UAB „SoftDent" farmacijos rinkos duomenų bazė „PharmaZOOM", duomenys pagal kiekį ir vertę).

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

ŠLAPIMO TAKŲ SISTEMAI

-30%



URINAL

MAISTO PAPILDAI

„Urinal" – šlapimo takų sistemai. Unikalus spanguolių ekstrakto, paprastųjų rykštenių ir vitamino D derinys.
„Urinal Akut" – didelės koncentracijos spanguolių ekstrakto „ExoCyan™", paprastųjų rykštenių ekstrakto ir vitamino D derinys.
„Urinal sirupas" – tinka vaikams nuo 1 metų.
Urinal Akut D-Mannose - spanguolių ir D - manozės kombinacija, didelis kiekis proantocianidinų (PAC) dienos dozėje.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-40%



GAMTOS NAMAI

Vitaminas D3 40µg, 80 kapsulių ~~10,04~~ 6,02 €
Gliukozaminas Plus Kolagenas, Chondroitinas, MSM, 60 tablečių ~~17,99~~ 10,79 €
Vitaminas C Prolong 500mg, 30 tablečių ~~8,19~~ 4,91 €
Top 4 Herbs, 30 tablečių ~~16,69~~ 10,01 €

MAISTO PAPILDAI

GAMTOS NAMŲ maisto papildai – tai naujos kartos maisto papildai Jūsų gerai fizinei būklei, grožiui ir puikiai savijautai! Sukurta ir pagaminta Lietuvoje. Be GMO.

-40% 7,55€ ~~12,59~~



ŠALTALANKIŲ ALIEJUS, 100 ml

MAISTO PAPILDAI

Šaltalankių aliejus padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir širdies veiklą, normalų virškinimą, normalią odos būklę. Vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą.

VITAMINAI IMUNITETUI

-40%



„LIVOL EXTRA" VITAMINAI

MAISTO PAPILDAI

„Livol" – galingos imuniteto stiprinimo priemonės iš Danijos. Aukštos skandinaviškos kokybės produktai imunitetui su vitaminais D ir C.
„LIVOL EXTRA Vitaminas D 4000 TV", 120 tablečių – stiprios sudėties (4000 TV) vitamino D tabletės: 4 kartus daugiau vitamino D. Užtenka net 4 mėn.
„LIVOL EXTRA Vitaminas C 400 mg", 50 tablečių – kramtomosios vitamino C tabletės, 400 mg, juodųjų serbentų skonio.
„LIVOL EXTRA Vitaminas D+C", 60 tablečių – dvi galingos imuniteto stiprinimo priemonės vienoje tabletėje, kurioje telpa didelė dozė vitamino D (2000 TV) ir C (500 mg). Skandinaviškas patogumas – nereikia dviejų atskirų tablečių, viską rasite vienoje.
„LIVOL" – STIPRI IMUNITETO GALIA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

ODOS IR LŪPŲ PŪSLELINEI GYDYTI

14,99 €



ACIC, 200 mg, 25 tabletės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 200 mg acikloviro **Terapinės indikacijos:** anksčiau gydytojo diagnozuotos pasikartojančios lūpų pūslelinės gydymas suaugusiems žmonėms. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** gerti po 1 tabletę 5 kartus per parą kas 4 val. Gydymo trukmė – 5 paros. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas aciklovirui, valaciklovirui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** palietus viruso pažeistą vietą, reikia tuoj pat nusiplauti rankas. „Sandoz Pharmaceuticals d.d." filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037, el. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2403136084. Teksto patvirtinimo data 2024-03-13.

UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSLELINĘ IŠ VIDAUS!

ODOS IR LŪPŲ PŪSLELINEI GYDYTI

5,99 €



ACIC 5 % kremas, 2 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g kremo yra 50 mg acikloviro. **Terapinės indikacijos:** odos ir lūpų pūslelinei, kurią sukelia Herpes simplex virusas, gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** pažeistą odos vietą tepti plonu sluoksniu 5 kartus per parą kas 4 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas aciklovirui, valaciklovirui, propilenglikoliui arba bet kuriems pagalbiniams medžiagoms. Netepti ant gleivinės (burnos, akių, makšties). **Specialūs įspėjimai:** vaisto draudžiama nuryti. „Sandoz Pharmaceuticals d.d." filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2403136084. Teksto patvirtinimo data: 2024-03-13.

UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSLELINĘ SU „ACIC"!

NIEŽULIUI MALŠINTI

5,99 €



GRIVIX 1 mg/g gelis, 30 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: kiekviename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato. **Pagalbinės medžiagos:** benzalkonio chloridas ir propilenglikolis. **Terapinės indikacijos:** dermatozės, dilgėlinės, vabzdžių įkandimo, nudegimo saulėje arba paviršutinio odos nudegimo (pirmojo laipsnio) sukelto niežėjimo trumpalaikis malšinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** vaikams, suaugusiesiems ir senyviems pacientams: ant pažeistos ir niežtinčios odos GRIVIX reikia tepti plonu sluoksniu 2–4 kartus per parą. Kūdikiams ir mažiems vaikams (jaunesniems nei 2 metų amžiaus) reikia vengti vartoti ant didelių odos plotų. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Antrojo ir trečiojo laipsnio nudegimai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jei GRIVIX gydomas didelis odos plotas, reikia vengti ilgalaikio šių paviršių saulės apšvietimo. Kūdikiams ir mažiems vaikams (jaunesniems nei 2 metų amžiaus) didelio odos ploto, ypač pažeisto ar apimto uždegimo, geliu tepti reikia vengti. Vaistinio preparato sudėtyje yra benzalkonio chlorido, kuris dirgina, gali sukelti odos reakcijų, ir propilenglikolio, kuris gali sudirginti odą. **Reklamos teksto parengimo data:** 2018-04.

NURAMINK SUDIRGINTĄ IR NIEŽTINČIĄ ODĄ!

-25% 1,34€ ~~1,79~~



AMEDIPLUS

Pleistrai su alavijų ekstraktu, 10 vnt.

Juodi aksominiai pleistrai, 10 vnt.

MEDICININĖ PREKĖS

PAVIRŠINIŲ ODOS ŽAIZDŲ GIJIMO GERINIMUI

NUO 5,99 €



BEPANTHEN

Bepanthen 50 mg/g kremas, 30 g **5,99 €**

Bepanthen 50 mg/g tepalas, 30 g **5,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. 1 g preparato yra 50 mg dekspantenolio. **Terapinės indikacijos:** įvairios kilmės paviršinių odos ir gleivinių pažeidimų pagalbinis gydymas dirginant odą ir atkuriant epidermio barjerą, palaikant epitelizaciją su atitinkamu prieuždegiminiu ir niežėjimą mažinančiu poveikiu, pavyzdžiui nedidelių pažeidimų (nedidelių nudegimų arba nubrozdinimų), odos sudirginimų, išberimo nuo sauskelnių, skausmingų ir įtrūkusių spenelių gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** pažeistą odą tepti plonu sluoksniu preparato vieną ar daugiau kartų per dieną, reikalui esant. Skausmingus ir įtrūkusius spenelius tepti po kiekvieno maitinimo, prieš žindant nuplauti. Tepti kiekvieną kartą keičiant sauskelnes, prieš tai odą reikia kuo kruopščiau nuvalyti. Gydymo trukmė priklauso nuo susirgimo pobūdžio ir eigos. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jei sergate kita liga, esate alergiškas arba vartojate kitus vaistus, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Naudojant tepalą ar kremą reikia vengti kontakto su akimis. Reklamos teksto parengimo data: 2023-01 CH-20230127-73

BEPANTHEN PLUS 50 mg/5 mg/g kremas, 30 g **6,49 €**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. 1 g kremo yra 50 mg dekspantenolio ir 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** lokalus įvairių paviršinių žaizdų, pvz. nubrozdinimų, įpjovimų, įbrėžimų, odos įtrūkių, nudegimų gydymas, kai yra infekcijos pavojus. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** kūdikiams nuo 1 mėn., vaikams, paaugliams ir suaugusiesiems išvalytą žaizdą arba pažeistą odos vietą reikia tepti plonu kremo sluoksniu vieną arba kelis kartus per dieną, kol žaizda užgis. Venkite tepti didelius odos plotus. **Kontraindikacijos:** alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; gilios arba stipriai užkrėstos žaizdos; jei trūkęs ausies būgnelis, negalima tepti ausies srityje. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** saugokitės, kad kremo nepatektų į akis, ausis ir ant gleivinių. Negalima tepti ant sudirgintos, bet neinfekuotos odos. Negalima vartoti kartu su kitomis antiseptinėmis medžiagomis, muilu. Jei pasireiškia sunkios alerginės reakcijos simptomai, vartojimą nedelsiant nutraukite ir pasitarkite su gydytoju. Reklamos teksto parengimo data: 2023-01 CH-20230127-73

LAIMEI, YRA „BEPANTHEN"® GYDO IR APSAUGO ODĄ

7,99 €



TERBINAFIN-RATIOPHARM 10 mg/g kremas, 15 g.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

„Terbinafin-ratiopharm" 10 mg/g kremas. 1 g kremo yra 10 mg terbinafino hidrochlorido. **Indikacijos:** Odos infekcija, sukelta dermatofitų, tokių kaip Trichophyton, Microsporum canis ir Epidermophyton floccosum; mieliagrybių, daugiausia Candida genties; įvairiaspalvė dederinė, sukelta Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** Suaugę ir paaugliai (>12 metų amžiaus): pėdos grybelis, blauzdos grybelis ir liemens grybelis: 1 k. per parą savaitę laiko; odos kandidozė: 1 k. per parą 1-2 savaites; įvairiaspalvė dederinė: 1-2 k. per parą 2 savaites. Tepti ant sausos ir švarios odos. „Terbinafin-ratiopharm" 10 mg/g kremas turi būti tepamas ant pažeistos ir aplinkinės odos plonu sluoksniu ir tada švelniai įtrinamas. Jei infekcija yra raukšlėse (po krūtimi, tarpupirščiuose, sėdmenų raukšlėje arba kirkšnyje), po kremo užtepimo odą galima uždengti sterilių marlės gabalėliu, ypatingai naktį. Simptomų palengvėjimas dažniausiai atsiranda per kelias paras. Nereguliarus vaisto vartojimas arba ankstyvas nutraukimas padidina simptomų pasikartojimo riziką. Jei per 2 sav. nestebima pagerėjimo, diagnozė turi būti svarstoma iš naujo. „Terbinafin-ratiopharm" 10 mg/g kremo nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 metų vaikams, nes duomenų apie saugumą nepakanka. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** „Terbinafin-ratiopharm" 10mg/g kremas yra skirtas tik išoriniam vartojimui. Sąlyčio su akimis turi būti vengiama. Gali atsirasti akių dirginimo požymių. Įvykus atsitiktiniam sąlyčiui su akimis, gerai išplaukite jas tekančiu vandeniu. „Terbinafin-ratiopharm" 10 mg/g kremą reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Sudėtyje esantys cetostearilo alkoholis ir cetilo alkoholis gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą). Benzilo alkoholis gali sukelti alerginių reakcijų ir nesunkų vietinį sudirginimą. **Reklamos teksto parengimo data:** 2023 gegužė. OTC-LT-00061

-40% 9,89€ ~~16,49~~



AMEDIPLUS pleistras nuo lūpų pūslelinės, 15 vnt.

MEDICINOS PRIEMONĖ

-25% 2,02€ ~~2,69~~



AMEDIPLUS

Vazelino kremas, 50 g

Vazelino kremas su vitaminais A ir E, 50 g

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

VAISTINĖ

KOSMETIKAI „ŽIEDĖ“

IKI -40%



-30%



BIODERMA

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Prancūzijos dermatologijos laboratorija „Bioderma“ vadovaujasi ekobiologiniu požiūriu, kad odos priežiūros priemonės turi padėti atkurti natūralius biologinius procesus, šalindamos odos problemų kilmės priežastis ir simptomus. Priežiūros priemonės „Bioderma“ kuriamos tik iš grynų veikliųjų medžiagų, atliekančių svarbų vaidmenį odos veikloje, ir tinka net labai jautrią odą turintiems asmenims.

EKOBIOLOGIJOS MOKSLAS DERMATOLOGIJAI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-35% 32,49 € ~~49,98~~



NET 12200 MG JŪRINIO KOLAGENO VIENOJE DOZĖJE

EPITOME CARE BEAUTY MARINE COLLAGEN, 30 pakelių

MAISTO PAPILDAS

Braškių ir rabarbarų skonio tirpūs milteliai geriamajam tirpalui ruošti.

Vitaminas C padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos bei palaikyti normalų kolageno susidarymą, kuris reikalingas normaliai odos, kremzlių ir kraujagyslių funkcijai palaikyti.

Biotinas padeda palaikyti normalią plaukų ir odos būklę.

-30%



BIODERMA NODE

DERMATOLOGINĖS PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

Plaukų ir galvos odos problemos, tokios kaip jautri, riebi ar sausa galvos oda, pleiskanos, žvynelinė, niežėjimas ir seborėjinis dermatitas, visa tai gali paveikti jūsų kasdienį gyvenimą.

BIODERMA sprendimas: „Nodé“ – ekspertinė sveikų plaukų ir galvos odos priemonių linija. „Nodé“ turi daug priežiūros priemonių, kurias ypač rekomenduoja dermatologai: šampūnai nuo pleiskanų, jautriai galvos odai skirti šampūnai, galvos odos priežiūra seborėjinio dermatito ir psoriazės atvejais ir kt.

EKOBIOLOGIJOS MOKSLAS DERMATOLOGIJAI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

IKI -40%



EUCERIN®

DERMATOLOGINĖ KOSMETIKA

Individualiems odos poreikiams pritaikyta dermatologinė kosmetika „Eucerin®“, kurios efektyvumas yra patvirtintas klinikiniais tyrimais. Odos priežiūra apima kur kas daugiau nei poveikį odai. Išsprendus odos problemas, tavo oda jaučiasi geriau, tu jautiesi geriau.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

PLAUKAMS

-40%



HAIR VOLUME™

Hair Volume, 30 tablečių ~~28,49~~ 17,09 €

Hair Volume, 90 tablečių ~~73,99~~ 44,39 €

MAISTO PAPILDAI

Netenkina plaukų būklė? Jie atrodo ploni ir nušiurę? Maisto papildas plaukams „Hair Volume“ yra būtent tai, ko reikia, norint turėti veršlius, žvilgančius ir sveikai atrodančius plaukus! „Hair Volume“ suteikia mitybinių medžiagų galvos odai ir plaukų folikulams, kur ir formuojasi plaukai. Sudėtyje yra biotino, cinko, taip pat „Annurca“ veislės obuolių ekstrakto, kuriame randama biologiškai aktyvios medžiagos procianidino B-2, o cinkas ir biotinas padeda palaikyti normalią plaukų būklę. Tik 1 tabletė per dieną.

VEŠLŪS, ŽVILGANTYS IR SVEIKAI ATRODANTYS PLAUKAI!

-30% 47,60 € ~~68,00~~



EUCERIN® HYALURON-FILLER EPIGENETIC serumas, 30 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Eucerin® Hyaluron-Filler Epigenetic“ serumas padeda pastebimai mažinti odos senėjimo požymius: oda atrodo jaunesnė nei tikrasis žmogaus amžius. Odos senėjimą pagreitina gyvenimo būdas ir aplinkos veiksniai, keičiantys odos epigenetinius modelius. Tai reiškia, kad jaunystės genai nustoja funkcionuoti. Todėl atsiranda matomų senėjimo požymių. Po 15 metų epigenetinių tyrimų „Eucerin“ atrado, kaip vėl suaktyvinti šiuos odos mechanizmus, remiantis inovatyvia technologija „Age Clock“. „Epicelline®“ aktyvina odos jaunystės genus iš pačių pagrindų ir priverčia odos ląsteles veikti taip, kaip jaunos odos.

MATOMI REZULTATAI PER 4 SAVAITES*

*Produkto naudojimo bandymas atliktas su 160 moterų per 4 savaites.

-30%



PURING®

PURING

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Sausiems ar nualintiems plaukams, natūraliems ar chemiškai apdorotiems bei pažeistiems – PURING HYDRARGAN. Sudėtyje esantys aktyvieji ingredientai, argano ir linų sėmenų aliejai, drėkina ir maitina plaukus, todėl jie tampa pastebimai lankstesni, minkštesni ir labiau spindintys.

PLAUKŲ PUOSELĖJIMUI BEI GROŽIUI KASDIEN

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis



IKI -25%



COREGA

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Naudokite COREGA dantų protezų priežiūros priemonės kasdien, kad drąsiai galėtumėt valgyt, juoktis ir kalbėt. COREGA pilnų/dalinių dantų protezų fiksuojamieji kremai suteikia trigubą naudą: ypač stipri fiksacija visą dieną, apsauga nuo maisto dalelių bei komfortas. Be cinko, todėl tinka kasdieniam naudojimui. Visapusiškai kasdienei dantų protezų higienai užtikrinti, naudokite COREGA valomąsias tabletes. Jos sunaikina 10 kartų daugiau kenksmingų bakterijų nei dantų pasta*.

*laboratoriniuose tyrimuose, tik mirkant.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

IKI -45%



DAILEE

HIGIENOS PRIEMONĖS

DAILEE LADY PREMIUM įklotai- orui laidūs, ploni,daug sugeriantys, minkšti ir švelnūs. Paviršius impregnuotas alijošiaus ekstraktu, saugančiu odą nuo sudirginimo. Puikiai prilimpa, įvairių dydžių. **Kvapo kontrolė iki 12 val.**

DAILEE MEN PREMIUM Level 1- įklotai vyrams, patiriantiems lengvą šlapimo nelaikymą. Anatominės formos, papildomi borteliai saugo nuo pratekėjimo, puikiai prilimpa **Kvapo kontrolė iki 12 val.**

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

BURNOS HIGIENAI

-20%



SUNSTAR GUM

Jau daugiau kaip 80 metų **„Sunstar“** yra burnos ertmės higienos produktų gamybos lyderė. **„Sunstar GUM“** misija – užtikrinti savo klientams sveikus dantis bei dantenas, naudojant produktus, sukurtus remiantis naujausiais išradimais ir klinikinių tyrimų rezultatais. **„Sunstar GUM“** burnos higienos produktai sukurti, siekiant užkirsti kelią ne tik ligų simptomams, bet ir jų priežastims!

SVEIKOS DANTENOS, SVEIKESNIS GYVENIMAS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-40%



ROYAL DENTA dantų pastos

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Royal Denta“ burnos priežiūros priemonės sukurtos remiantis mokslu ir odontologijos srities atradimais. Auksu ir sidabru praturtintų dantų pastų savybės ir jų poveikis patvirtintas nepriklausomoje sertifikuotoje laboratorijoje. Kartą išbandę, klientai ir vėl pasirenka „Royal Denta“. Rekomenduoja odontologai.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-25%



ELMEX

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„ELMEX“ burnos higienos priemonės profesionaliai pritaikytos ne tik skirtingoms amžiaus grupėms, bet ir pačioms įvairiausioms problemoms spręsti.

INDIVIDUALIOS PROBLEMOS. PROFESIONALŪS SPRENDIMAI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-25%



MILLY

HIGIENOS PREKĖS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

INTYMIAI HIGIENAI

-20%



VAGISAN

KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS. Priemonės „Vagisan“ su natūralia pieno rūgštimi skirtos tinkamai lytinių organų priežiūrai. Rūgšti aplinka – būtina sąlyga, kad laktobacilos galėtų pačios gaminti pieno rūgštį ir daugintis. Taip užtikrinama optimali natūrali apsauga nuo infekcijos. Intymiosios higienos prausiklis „Vagisan“ tinka kasdienei intymiajai higienai. Drėkinamasis makšties kremas „Vagisan“ sumažina tokius simptomus kaip sausumas, niežulys, deginimo pojūtis ir skausmas. Ovulės su pieno rūgštimi, skirtos natūraliai makšties pH terpei palaikyti ir atkurti.

TAVO INTYMIAI SVEIKATAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-10%



FEMINELLA, makšties ovulės, 10 vnt. 14,95 13,46 €

MEDICINOS PRIEMONĖ

Makšties drėgmei atkurti.

Sudėtis: kiekvienoje makšties ovulėje yra 5 mg natrio hialuronato, 10 mg vitamino E, 60 mg azijinių raistenių, 60 mg dedešvų ir 60 mg ramunėlių ekstraktų, 2 mg arbatmedžių aliejaus. **Indikacijos:** ovulės vartojamos makšties gleivinei drėkinti, esant makšties sausumui dėl hormonų kiekio pokyčių bet kuriuo gyvenimo laikotarpiu, ypač menopauzės periodu, po gimdymo ir žindymo laikotarpiu, arba dėl chemoterapijos ar spindulinio gydymo. Dėl drėkinamojo poveikio ovulės lengvina makšties atrofijos simptomus (pvz., niežulį, deginimą, tempimą bei nemalonius pojūčius lytinių santykių metu). **Dozavimas:** vartoti po 1 makšties ovulę 10 parų iš eilės arba pagal gydytojo nurodymus. Menopauzės laikotarpiu pirmas 10–20 parų vartoti po 1 ovulę per parą; palaikomasis gydymas – po 1 ovulę 2 kartus per savaitę.

BIOHYL LACTO, makšties ovulės, 7 vnt. 14,95 13,46 €

MEDICINOS PRIEMONĖ

Makšties mikrofloral atkurti.

Sudėtis: kiekvienoje makšties ovulėje yra 70 mg laktobakterijų lizatų, 20 mg lizocimo hidrochlorido, 50 mg alavijų ekstrakto, 10 mg morkų ekstrakto, 10 mg šaltalankių ekstrakto. **Indikacijos:** ovulės vartojamos siekiant atkurti normalią makšties mikrofloros; slopinti uždegiminius procesus makštyje; apsaugoti makšties gleivinę ir skatinti jos regeneraciją. **Dozavimas:** suaugusioms moterims vartoti į makštį prieš naktį po 1 ovulę 5–7 dienas.

JAUTRIŲ DANTŲ PRIEŽIŪRAI

-30%



SENSODYNE

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Dantų pastos „Sensodyne“ yra specialiai sukurtos žmonėms, turintiems jautrius dantis.
CHLT/CHMULBRA/0004/18a/JUL
EKSPERTO PAGALBA JAUTRIEMS DANTIMS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

SUAUGUSIŲJŲ IR VAIKŲ DANTŲ PRIEŽIŪRAI

-35%



ELGYDIUM DANTŲ PASTOS

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Dantų pastos „Elgydium“ siūlo specializuotus sprendimus dantų priežiūrai suaugusiesiems ir vaikams: dantenų problemoms spręsti, dantims balinti, jautriems dantims, dantų apnašų kontrolei bei ėduonies prevencijai.
„ELGYDIUM“ - TOBULAI JŪSŲ ŠYPSENAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-50% ANTRAI TOKIAI PAČIAI ARBA PIGESNEI



TEPE

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Produkcija „TePe“ pagaminta bendradarbiaujant su Švedijos ir tarptautiniais odontologijos specialistais. Visi tarpdančių šepetėliai turi unikalius laikiklius, specialiai parinktus šerelius ir plastiku padengtą vielutę, todėl tarpdančių valymas labai veiksmingas. Dantų šepetėliai „TePe“ patikimi ir kokybiški.
„TEPE“ RŪPINASI SVEIKA ŠYPSENA!

*Akcija taikoma kainų skirtuku pažymėtoms prekėms

DANTŲ PROTEZŲ KLIJAI

-30% 9,79 € ~~13,99~~



BLEND-A-DENT

BLEND-A-DENT REGULAR, 47 g (x2 pakuotės)
BLEND-A-DENT FRESH, 47 g (x2 pakuotės)

Fiksuojamasis dantų protezų kremas „Blend-a-dent“ – puikus pasirinkimas, jei nenorite galvoti apie savo protezus. Nesvarbu, ką darote ar valgote, galite pasitikėti savimi, nes dantų protezai savo vietoje laikosi tvirtai ir patogiai. „Blend-a-dent“ suteikia stiprią fiksaciją visą dieną, užtikrina komfortą, sukurdamas pagalvėlę tarp dantenų bei dantų protezų, ir apsaugo nuo maisto dalelių patekimo po protezais. Galite atsipalaiduoti ir mėgautis gyvenimu nesivaržydami.

-40% 4,79 € ~~7,99~~



ODÒNTE

balinamoji dantų pasta jautriems dantims, 75 ml
balinamoji ir dantenas sauganti dantų pasta, 75 ml
balinamoji ir gaivų burnos kvapą suteikianti dantų pasta, 75 ml

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Dantų pasta specialiai sukurta taip, kad jūsų dantys būtų idealiai švarūs ir atrodytų pastebimai baltesni. Pasta stiprina dantų emalį, saugo nuo apnašų susidarymo ir ėduonies, suteikia gaivų burnos kvapą. Dantų pasta mažai abrazyvi – RDA 43. Tinka dantų valymui ir su elektriniu, ir su įprastu šepetėliu.

-30%



VELYM

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

VELYM 100 ml balinamasis dantų kremas. Dabar virš 95% ingredientų yra natūralios kilmės medžiagos. Nauja, tvari, perdirbto plastiko tūbelė.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-20%



FITTYDENT

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Fittydent“ – stiprus, ilgai laikantis fiksuojamasis kremas, neleidžiantis protezams slysti ir slankioti. Netirpus vandenyje ir atsparus rūgščiai, todėl nenuplaunamas skysčiu ar seilių. „Fittydent“ dantų protezų fiksuojamasis kremas garantuoja stiprų dantų protezų ir dantenų sukibimą.
NAUJAS PAKUOTĖS DIZAINAS.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-30%



ORALMEDA

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Dantų pasta **„Plidenta Pro-Balance“** su probiotiku, ksilitoliu ir fluoridais, skirta kasdienei dantų priežiūrai. Saugo dantų emalį ir dantenas, švelniai balina. Skirta suaugusiesiems. Vaikiška gelinė dantų pasta **„Biomin F for Kids“** (37,5 ml (50 g)), braškių skonio, skirta 3–6 metų vaikams. Dantų pasta su bioaktyviu stiklu ir fluoridais saugo vaikų dantis nuo žalingo rūgščių poveikio ir stiprina dantų emalį. Dantų pasta **„BioMin F“** su bioaktyviu stiklu jautriems dantims sukurta Didžiosios Britanijos mokslininkų ir ne tik efektyviai mažina dantų jautrumą, bet ir užtikrina aukštą emalio apsaugą nuo žalingo rūgščių poveikio. Išsivalius dantis, perteklių išspjauti, išskalauti vandeniu. Galima naudoti vaikams nuo 6 metų ir suaugusiesiems. Su fluoridais. **„Xylimelts“** prilimpančios pastilės sausai burnai (40 pastilių) skatina seilėtekį, didina natūralią dantų emalio remineralizaciją, neutralizuoja seilių pH. Efektyviai šalina sausos burnos nepatogumus nakties metu. Tinka pacientams su sumažėjusiu seilėtekiu, sergantiems cukriniu diabetu, nešiojantiems ortodontines kapas ar turintiems dantų implantų.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis



-40%



PROSTOSAN FORTE, 30 kapsulių ~~15,15~~ **9,09 €**
POTENZINE SUPERIOR, 30 tabletių ~~19,99~~ **11,99 €**

MAISTO PAPILDAI
„Prostosan forte“ – pagalba vyresnio amžiaus vyrų prostatai. Sudėtyje esantys sabalpalmių ir rugių žiedadulkių ekstraktai padeda palaikyti normalią prostatos funkciją, o afrikinių pigių ekstraktas – normalią šlapimo pūslės funkciją. Kininio žeńšenio ekstraktas padeda išlaikyti energingumą. Šio preparato sudėtis taip pat praturtinta vitaminu D3 ir cinku. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 2 kartus per dieną, valgio metu.
„Potenzine superior“ – subalansuotas derinys potencijai. Šio maisto papildo sudėtyje esantis žeńšenio šaknų ekstraktas padeda palaikyti lytinę funkciją, ištvermę ir energingumą. Normalų lytinį potraukį ir seksualinį pajėgumą padeda palaikyti gulsčiosios ragūžės vaisių ekstraktas, o normalų vaisingumą ir testosterono koncentraciją kraujyje – cinkas. Sudėtyje taip pat yra L-arginino. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną, valgio metu.
KIEKVIENO VYRO PASIRINKIMAS!

MAKŠTIES MIKROFLOROS ATSTATYMUI

-40% **15,59 €** ~~25,99~~



MEFLOVAN FORTE, 60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS
„Meflovan forte“ – trijų augalinių medžiagų derinys, skirtas moterims, siekiančioms maksimalaus komforto ir geros savijautos menopauzės metu. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną.

9,99 €



CAGYNOL, 300 mg, ovulė, 1 vnt.

NERECEPTINIS VAISTAS
Kiekvienoje ovulėje yra 300 mg sertakonazolo nitrato.
Terapinės indikacijos. Vietiniam makšties grybelinės Candida infekcijos gydymui. „Cagynol“ skirtas suaugusiesiems. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Dozavimas. Viena ovulė vakare prieš miegą, vienkartiniam vartojimui, įterpiama giliai į makštį, geriausia gulint. Gydymo trukmė - vienkartinė dozė. Didžiausia vienkartinė dozė yra viena ovulė (300 mg sertakonazolo). Jei klinikiniai požymiai išlieka, antroji ovulė vartojama 7 dienų intervalu. Vartojimo metodas. Vartoti į makštį. Vartojant šį vaistinį preparatą negalima naudoti tamponų ir intravaginalinių dušų. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas priešgrybeliniams imidazolo klasės vaistiniams preparatams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Latekso prezervatyvų arba diafragmų naudojimas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei kandidozė patvirtinta, reikia atidžiai ieškoti ekologinių veiksnių, kurie sudaro sąlygas ir skatina grybelinės infekcijos vystymąsi. Norint išvengti atkryčių, labai svarbu nustatyti ir eradikuoti infekciją bei atsižvelgti į ją skatinančius veiksnius. Patartina vienu metu gydyti visą grybelinės infekcijos židinį, pripažintą sukėlėją, partnerį. **Nėštumas.** Tyrimais su gyvūnais teratogeninis poveikis nenustatytas. Sertakonazolo vartojimas nėštumo metu turėtų būti svarstomas tik esant būtinybei. Teksto peržiūros data: 2022 m. gegužės 30 d. Reklamos parengimo data: 2023.12.15.
CAGYN/2023/12/03
OVULĖ VIETINIAM MAKŠTIES KANDIDOZĖS GYDYMUI
VIENOS OVULĖS SĖKMĖS ISTORIJA

-30% **11,19 €** ~~15,99~~



ISEREN, 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS
Maisto papildas su gauruotosios sojos ekstraktu, kuriame gausu natūralių izoflavonų.
Vartojimas: po vieną tabletę per dieną.

NUO **4,99 €**






CANESTEN®, 10 mg/g kremas, 20 g **4,99 €**
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Sudėtis: 1 g kremo yra 10 mg klotrimazolo. **Terapinės indikacijos:** odos ir išorinių gleivinių infekcijų, sukeltų klotrimazolui jautrių mikroorganizmų gydymas, Candida sukelto vulvito gydymas kartu gydant vulvovaginalinę mikozinę infekciją, Candida sukelto balanito gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartojamas 2–3 kartus per parą. Užtepti plonu sluoksniu ir švelniai įtrinti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas klotrimazolui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** gali sumažinti latekso gaminių veiksmingumą ir saugumą, jeigu tepama lytinių organų srityje. Poveikis pasireiškia tik gydymo metu, todėl jo metu naudokite alternatyvias apsaugos priemones. Venkite sąlyčio su akimis. Nedėkite kremo į burną ir nenurykite. Pacientai, gydomi imunosupresantais, chemoterapija, sergantys diabetu, infekuoti ŽIV, jaunesnės kaip 16 metų paaugliės, nėščiosios per pirmuosius tris nėštumo mėnesius, prieš vartodami turi pasitarti su gydytoju. Vaikams (jaunesniems negu 12 metų) ir senyviems pacientams vartoti tik prižiūrint gydytojui. Vengti ilgalaikio gydymo dideliuose odos plotuose. Galima vartoti žindymo metu. Jeigu vartojamas spenelių srityje, prieš maitinant reikia nusiplauti krūtis. Sudėtyje yra cetostearilo alkoholio ir benzilo alkoholio, kurie gali sukelti vietinių odos bei alerginių reakcijų. **Reklamos teksto parengimo data:** 2023-10. CH-20231030-59.
„CANESTEN“ KREMAS - GRYBELINĖS INFEKCIJOS GYDYMUI!

CANESTEN® 500 mg makšties minkštoji kapsulė **11,49 €**
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Kapsulėje yra 500 mg klotrimazolo. **Terapinės indikacijos.** Makšties ir moters išorinių lyties organų infekcijų, sukeltų klotrimazolui jautrių mikroorganizmų, tokių kaip grybeliai gydymas. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Suaugusios moterys ir paauglės nuo 16 metų: viena kapsulė įdedama kiek įmanoma giliau į makštį, naudojant pakuotėje esantį aplikatorių, geriausia gulint, vakare prieš miegą. Nėštumo metu kapsulė turi būti įdedama pirštu, be aplikatoriaus. Reikalinga gydytojo konsultacija, jei simptomai nepalengvėja per 7 dienas. Jaunesnėms kaip 16 metų paauglėms galima vartoti tik po gydytojo konsultacijos. Saugumas ir veiksmingumas jaunesniems kaip 12 metų mergaitėms nežinoti. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas klotrimazolui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Reikia kreiptis į gydytoją, jeigu: makšties infekcija pasireiškia pirmą kartą; pirmojo nėštumo trimestro metu; per pastaruosius šešis mėnesius infekcija pasikartojo daugiau nei du kartus; yra karščiavimas (≥ 38 °C); skauda apatinę pilvo dalį, nugarą; atsiranda nemalonaus kvapo išskyrų iš makšties; pykina; kraujuoja iš makšties ir (ar) tuo pat metu yra pečių skausmas. Nerekomenduojama gydyti menstruacijų metu. Vartojant vaistą negalima naudoti tamponų, makšties ploviklių, spermicidinių ar kitokių į makštį vartojamų preparatų, rekomenduojama vengti lytinių santykių. Latekso kontraceptinių priemonių veiksmingumas ir patikimumas gali sumažėti. **Reklamos teksto parengimo data:** 2023-10. CH-20231030-59.
„CANESTEN“ MAKŠTIES MINKŠTOJI KAPSULĖ - 1-OS DIENOS MAKŠTIES GRYBELINĖS INFEKCIJOS GYDYMAS!

PROSTATAI IR POTENCIJAI

-30%



PROSTENAL® CONTROL, 30 tablečių ~~11,49~~ **8,04 €**
PROSTENAL® CONTROL, 60 tablečių ~~19,99~~ **13,99 €**

MAISTO PAPILDAI
1 tabletė per dieną. **Gulsčiųjų serenojų** (Serenoa repens) vaisių ekstraktas padeda palaikyti normalią prostatos funkciją bei normalų šlapimo nutekėjimą. **Didžiųjų dilgėlių** (Urtica Dioica) šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią šlapimo takų ir inkstų funkciją. **Gulsčiųjų ragužių** (Tribulus terrestris) vaisių ekstraktas skatina lytinį potraukį ir pajėgumą. Cinkas padeda palaikyti normalią testosterono koncentraciją kraujyje, vaisingumą ir reprodukciją.
2303_ SB_Prostenal_V01_LT

ŠIRDŽIAI IR KRAUJAGYSLĖMS, MOTERIMS MENOPAUZĖS METU

-15%



EVELOR® 50 mg, 90 kapsulių ~~30,45~~ **25,92 €**
EVELOR® H 200 mg, 30 tablečių ~~21,99~~ **18,69 €**

MAISTO PAPILDAI
Augaliniai antioksidantai, kurie priklauso polifenolių grupei. „Evelor™ ir „Evelor® H“ sudėtyje esantis trans resveratrolis yra mikronizuotas ir išgautas iš didžiausią šios medžiagos kiekį kaupiančių augalų – plačialapių rūgščių (lot. *Polygonum cuspidatum*) – šaknų.
Mikronizacijos procesas (medžiagos susmulkinimas iki labai mažų dalelių) padidina resveratrolio biologinį prieinamumą ir veiksmingumą. Resveratrolis padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą. Dėl panašios cheminės struktūros į hormoną estradiolį jis taip pat padeda palaikyti normalią moters savijautą menopauzės metu.
Vartojimas. Gerti po 1 kapsulę arba tabletę rytinio valgio metu, užgeriant vandeniu.

SKUBIOS PAGALBOS KONTRACEPTIKAS

12,99 €



AVODELE 1,5 mg, 1 tabletė

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
„Avodele“ yra skubios pagalbos kontraceptikas, kurį galima pavartoti per 72 valandas (t. y. per tris paras) po lytinio akto, kurio metu kontraceptinės priemonės nebuvo naudotos arba naudota kontraceptinė priemonė nebuvo veiksminga. „Avodele“ sudėtyje yra sintetinio hormono, veikliosios medžiagos, vadinamos levonorgestreliu. Suvartotas per 72 valandas po nesaugaus lytinio akto, jis 79 % atvejų apsaugo nuo nėštumo. Vartotinas šiais atvejais:
– Lytinio akto metu nebuvo naudota kontraceptinė priemonė.
– Jei kontraceptinė priemonė naudota netinkamai.
Kaip vartoti „Avodele“.Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Po nesaugaus lytinio akto išgerkite vieną tabletę kuo greičiau, bet ne vėliau kaip po 72 valandų (3 parų). Tablečių geriausia išgerti per 12 valandų. Antrą tabletę išgerkite praėjus 12 val. (bet ne daugiau kaip 16 val.) po pirmosios tabletės išgėrimo. Jei žinote arba manote, jog nesate nėščia, „Avodele“ galite vartoti bet kurią ciklo dieną. Tabletę nurykite nekramtydami, užsigerkite vandeniu. Ji bus tuo veiksmingesnė, kuo greičiau ją išgersite. „Avodele“ vartoti negalima: Jeigu yra alergija levonorgestreliui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos informacinio lapelio 6 skyriuje). Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Prieš vartodama, pasitarkite su gydytoju, nes „Avodele“, kaip skubios kontracepcijos priemonė, Jums gali netikti. Gydytojas gali Jums skirti kitokią skubios kontracepcijos priemonę. Kaip dažnai galima vartoti „Avodele“. „Avodele“ vartotina tik neatidėliotinu atveju ir nėra reguliarios kontracepcijos metodas. Galimas šalutinis poveikis. Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Labai dažnas. Šleikštulys (pykinimas); Gali būti neregularus pakraujavimas iki prasidedant mėnesinėms; Gali skaudėti pilvo apačią; Nuovargis; Galvos skausmas. Dažni Vėmimas; Gali pakisti mėnesinių ciklas; Išgėrus šio vaisto, gali atsirasti krūtų jautrumas, viduriavimas, svaiguliо pojūtis. Labai retas Bėrimas, dilgėlinė, niežulys, veido patinimas, dubens srities skausmas, skausmingos mėnesinės. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant informaciniame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Ši informacija paskutinį kartą peržiūrėta 2021-09-01.

IKI **-45%**



AMBIO

KIDS MULTIVITAMINAI VAIKAMS, 50 guminukų ~~13,48~~ **7,41 € -45 %**
KIDS VITAMINAS C, geriamieji lašai, 30 ml ~~3,28~~ **1,97 € -40 %**
KIDS VITAMINAS D 400 TV, 30 kramtomųjų tablečių ~~7,98~~ **4,79 € -40 %**

MAISTO PAPILDAI

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**



AMBIO

KIDS GERKLEI SU ISLANDINE KERPENA, 6 braškių skonio ledinukai ant pagaliuko **5,98 €**
KIDS GERKLEI SU ČIOBRELIU, 6 aviečių skonio ledinukai ant pagaliuko **5,98 €**
KIDS BRONCHO COMPLEX, 150 ml **7,18 €**

MAISTO PAPILDAI

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!** **11,99 €**



DOCTOR FISH OMEGA-3 + VITAMINS D & E 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIU

Maisto papildo sudėtyje yra omega-3 riebalų rūgščių (EPR ir DHR) ir vitaminų D ir E:
EPR (eikozapentaeno rūgštis) ir DHR (dokozaheksaeno rūgštis) padeda palaikyti normalią širdies veiklą;
DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją, išsaugoti normalų regėjimą;
vitaminas D padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų, raumenų, dantų būklę;
vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.

-40%



AMBIO

KIDS LAKTO-BIFIDOBAKTERIJOS, geriamieji lašai, 10 ml ~~12,98~~ **7,79 €**
KIDS LAKTO-BIFIDOBAKTERIJOS, 10 paketėlių ~~9,48~~ **5,69 €**

MAISTO PAPILDAI

-30% **5,18€** ~~7,40~~



INFACOL, geriamoji suspensija, 50 ml
Simetikonas 40 mg/ml

MEDICINOS PREKĖ

Terapinės indikacijos: „Infacol" geriamoji suspensija skirta sumažinti kūdikių pilvuko diegliams ir vidurių skausmams. Skausmo ir dieglių priežastis – kūdikio žarnyne susikaupę maži dujų burbuliukai. „Infacol" padeda pasišalinti susikaupusioms dujoms. Suspensiją galima skirti naujagimiams ir vyresniems vaikams. Esant pilvuko pūtimui, suspensiją galima vartoti ilgai – tiek, kiek reikia. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** prieš vartojimą gerai suplakite buteliuko turinį. Pilnai pripildykite vieną lašintuvą, paspausdami du kartus guminį balionėlį. Suspensijos perteklių nubraukite atgal į buteliuką. Norėdami sugirdyti suspensiją, paspauskite lašintuvo balionėlį ir sulašinkite „Infacol" suspensiją kūdikiui ant liežuvio. Buteliuke yra iki 100 suspensijos dozių. Vieną pilną lašintuvą (0,5 ml) suspensijos sugirdykite kūdikiui prieš kiekvieną maitinimą. Jei būtina, dozę laikinai galima padidinti iki dviejų pilnų lašintuvų (1 ml). Norint pasiekti geresnių rezultatų, „Infacol" reiktų vartoti keletą dienų. **Įspėjimas:** simetikonas yra inertiška medžiaga, kurios kūdikio organizmas neabsorbuoja. Ji išsiskiria iš organizmo nepakitusi. „Infacol" šalutinio poveikio reiškinių iki šiol nėra žinoma. Metilo ir propilo hidroksibenzoatai gali sukelti alerginę reakciją (galbūt pavėluotą). Jei manote, kad Jūsų kūdikis galėtų būti alergiškas kuriai nors iš sudedamųjų dalių, prieš duodami kūdikiui „Infacol", pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.

MAŽŲ PILVELIŲ DRAUGAS!

ŽARNYNO MIKROFLORAI

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!** **10,19 €**



ACIDOLAC® JUNIOR, 20 meškiuko formos tablečių
ACIDOLAC® JUNIOR braškių skonio, 20 meškiuko formos tablečių

MAISTO PAPILDAI

ACIDOLAC® JUNIOR meškiuko formos tablečių sudėtyje yra gerųjų žarnyno bakterijų **Lactobacillus acidophilus La-14TM ir Bifidobacterium lactis BI-04TM,** inulino ir vitamino B6, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vartojimas: vyresniems kaip 3 m. vaikams ir suaugusiesiems vartoti po 1 meškučio formos tabletę 2 kartus per parą. Be sacharozės ir glitimo.

Pasiūlymai galioja **2024 10 01 – 2024 10 31.**

Leidinyje nurodytos maisto papildų, kosmetikos, medicininės paskirties prekių ir medicinos prietaisų kainos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortele, o vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Nuolaidos taikomos prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė" administracijos patvirtintą prekių sąrašą. Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį/informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvktu.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.



Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Daugiau informacijos NORFOS vaistinėje, tel. 8 800 10008, www.nvaistine.lt MAŽYLIUI IR MAMAI skirtas prekes ypatingomis kainomis greičiau ir patogiau užsisakykite internetinėje vaistinėje www.nvaistine.lt. Užsisakius prekių (išskyrus vaistinius preparatus) už 29 € ir daugiau – pristatymas NEMOKAMAS! Reklaminio teksto parengimo data – 2024 09 19.

VAISTINĖ

AMBIO
MAISTO PAPILDAMS

IKI **-45%**



Pasiūlymai galioja **2024 10 01 - 2024 10 31.** Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą. Prekių kiekis ribotas. UAB „Norfos vaistinė“ pasilieka teisę bet kada keisti akcijos sąlygas. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.