

VAISTINĖ

TOP KOVO PASIŪLYMAI



-50%



AMBIO
VITAMINAI D₃ + K₂, 60 KAPSULIŲ **14⁹⁹ 7⁴⁹ €**
VITAMINAS D₃ 4000 IU, 60 KAPSULIŲ **14⁹⁹ 7⁴⁹ €**
MAISTO PAPILDAS

IKI **-70%**



VITADAY
ŽUVŲ TAUKAI, 60 kapsulių **9⁹⁹ 4⁴⁰ € -55 %**
VITAMINŲ B KOMPLEKSAS, 60 tablečių **6⁴⁸ 1⁹⁴ € -70 %**
KOMPLEKSAS AKIMS, 30 kapsulių **6⁷⁸ 3⁰⁵ € -55 %**
MAISTO PAPILDAS

-50%

Akims



OCUVAL, 30 tablečių **14⁴⁹ 7²⁵ €**
MAISTO PAPILDAS
Vis dažniau jaučiate, kad trūksta ryškumo? Po dienos darbų akys jautrios ir pavargusios? Išbandykite „Ocual“ tabletes - akims naudingų medžiagų kompleksą, kuris padės palaikyti normalią akių sveikatą, vaizdo aiškumą. „OCUVAL“ - MATYK, KAI LABIAUSIAI REIKIA!

-50%



VERSAN SHOTS
20 geriamųjų dozių po 10 ml **29⁹⁹ 14⁹⁵ €**
MAISTO PAPILDAS
„Versan Shots“ - geriamos skystos dienos dozės sąnariams, sklandžiam jų darbui. Vienas buteliukas per dieną aprūpina sąnarius reikalingomis medžiagomis: kolageną, hialurono rūgštimi, gliukozaminu, chondroitinu, vitaminais C ir D3.
„VERSAN“ - PROFESIONALI PAGALBA JŪSŲ SĄNARIAMS!

NUO **8⁹⁹ €**

ESSENTIALE FORTE N
Essentiale forte N, 300 mg, 100 kietųjų kapsulių **12⁹⁹ €**
Essentiale forte N, 600 mg, 30 kietųjų kapsulių **8⁹⁹ €**
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI



Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje yra 300 mg arba 600 mg sojų fosfolipidų. **Indikacijos:** simptomų, tokių kaip apetito stoka, spaudimo pojūtis dešinėje pusrankaulinėje srityje, atsiradusių dėl toksinio ir mitybos kepenų pažeidimo ar hepatito, malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams vienkartinė dozė - dvi 300 mg kietosios kapsulės arba viena 600 mg kietoji kapsulė. Paros dozė - po dvi 300 mg kietasias kapsules arba po vieną 600 mg kietąją kapsulę 3 kartus per parą (1800 mg sojų fosfolipidų). „Essentiale forte N“ saugumas ir veiksmingumas vaikams ir paaugliams iki 12 metų neįvertinti. Dėl šios priežasties „Essentiale forte N“ neturėtų būti vartojamas vaikams ir paaugliams iki 12 metų. Kapsulės geriamos valgio metu, nekramytos, užgeriant dideliu skysčio kiekiu (pvz., stikline vandens). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Padidėjęs jautrumas žemės riešutams arba sojoms arba sojų pupelių produktams, pvz., fosfatidilcholinui. **Specialūs įspėjimai:** „Essentiale forte N“ neapsaugo nuo toksinių medžiagų (pvz., alkoholio) sukeltą kepenų pažeidimo. Jei yra kepenų pažeidimas, negalima vartoti alkoholio. „Essentiale forte N“ gali silpninti kraują skystinančių vaistų poveikį, todėl gali prireikti koreguoti pasitarusių vaistų dozę. „Essentiale forte N“ sudėtyje yra rafinuoto sojų aliejaus, hidrinto ricinos aliejaus ir etanolio. Ricinos aliejaus gali sukelti skrandžio sutrikimų ir viduriavimą. Šio vaisto sudėtyje yra mažas etanolio kiekis. Teksto parengimo data: 2018 m. kovo mėn. Reklamos teksto parengimo data - 2022 m. sausio mėn. 2201 SB. Essentiale. V01 LI **MAKSIMALI PAGALBA KEPENIMS!**

NUO **1⁹⁹ €**

IBUPROFEN LANNACHER
IBUPROFEN LANNACHER 400 mg, plėvelė dengtos tabletės, 10 tablečių **1⁹⁹ €**
IBUPROFEN LANNACHER 400 mg, plėvelė dengtos tabletės, 20 tablečių **3⁴⁹ €**



NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Vienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 400 mg ibuprofeno. **Indikacijos:** „Ibuprofen Lannacher“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos ibuprofeno. Ibuprofenas mažina uždegimo sukeltą skausmą, palimą ir karščiavimą, vartojamas trumpą laiką silpno ar vidutinio stiprumo skausmui, tokiems kaip mėnesiniai, galvos, dantų, raumėnų, malšinti. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** tabletes reikia nurijoti valgio metu arba pavakariu, užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: 0,5-1 plėvelė dengta tabletė 3 kartus per parą. Negalima viršyti didžiausios paros dozės 1200 mg ibuprofeno (3 plėvelė dengtų tablečių). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofeni arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijų, vartojanti kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo, acetilsalicilo rūgšties darinius. Sunkus kepenų, inkstų ar širdies funkcijos nepakankamumas. Paskutinių trijų neštumo mėnesių laikotarpis. Pepsinė opa. Kraujavimas iš smegenis, virškinimo trakto arba kt. Sisteminė audonijų virkijė. Jaunesni nei 12 m. vaikai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai skirti pacientams, sergantiems širdies ir kraujagyslių, smegenų kraujagyslių ligomis, cukriniu diabetu ir jungiamųjų audinių ligomis, servimis pacientams. Pacientams, sergantiems bronchine astma ar alerginėmis ligomis, gali išsivystyti bronchų spazmas. Virškinimo trakto sutrikimai ir letinės uždegiminės žarnos ligos gali padidėti. Atsargus virškinimo trakto kraujavimų ar išopėjimų, gydvams turi būti nedelsiant nutauktas. Vartojimas gali mažinti moters vaisingumą. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas - Lopo laktozės skygus arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Pakuotė:** 10 ir 20 plėvelė dengtų tablečių. **Farmakoterapinė grupė:** nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo. **ATC kodas:** M01AE01. **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:** „G.L. Pharma GmbH“, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. **Paskutinė teksto peržiūros data:** 2024-10-18. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-02. **NUSIMESK SKAUSMO KAUKĘ!**



-50% PIGIAU



-50%

GASTROVAL

GASTROVAL FLUXUS rūgštingumui, 15 kapsulių **6⁹⁹ 3⁰³ €**

GASTROVAL FORTE, 12 kapsulių **5⁹⁹ 3⁰⁰ €**

MAISTO PAPILDAI

„Gastroval Forte“ – stipresnis augalinių fermentų ir įvairesnis augalinių ekstraktų mišinys lengvam virškinimui.

„Gastroval Fluxus“ – skrandžio rūgštingumo pusiausvyrai. Virškinimui lengvinti.

Geltonoji gencionai tradiciškai vartojama virškinimo palengyinti. Dažnės ciberžolės padeda apsaugoti kepenis nuo oksidacines pažeidimų, palaikyti normalų cholesterolio lygį kraujyje. Tinkraj gamgarniai padeda palaikyti normalią laštelių regeneraciją. Otžargų sėklų ekstraktas padeda palaikyti normalią skrandžio rūgštingumą.

„GASTROVAL“ SUPRANTA, KO REIKIA VIRŠKINIMUI, SKRANDŽIO RŪGŠTINGUMUI, KEPENŲ VEIKLAI.



-50%

MARSIEČIAI®

MAISTO PAPILDAI

„Marsiečiai“ įvairaus skonio guminukai ir kramtomosios tabletės vaikams.

„Marsiečiai“ guminukai su ežiule, vitaminu C ir cinku vaikų imunitetui. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Braškių ir vyšnių skonio. 2302_SB_Marsiečiai_V01 IT

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms



-50%

SPORT

MAISTO PAPILDAI

„Biofarmacijos“ linija „Sport“ skirta tiems, kuriems rūpi atstatyti prarastus mineralus, druskas. Išsirinkite sau tinkamą: „Sport & Cardio“ – elektrolitai su gudobelėmis ir L-glucinu; „Sport & Joints“ – elektrolitai su kalciumu ir gliukozaminu; „Sport & Basic“ – šarminiai elektrolitai su vitaminu C! Elektrolitų tirpalai padeda papildyti organizmą reikalingomis medžiagomis (magniu, kalciumu, natriu, cinku ir kt.). „Sport & Creatine“ – kreatino, gudobelės ekstrakto ir vitamino B1 kompleksas, sukurtas fiziniams pajėgumui didinti ir širdžiai saugoti. „Sport & Protein“ – kolageno, pieno baltymų, magnio ir vitamino C kompleksas raumenų masei auginti ir išlaikyti, kremzlės ir odai. „Sport & Amino W.H.O.“ – bėne vienintelis net 8 aminorūgščių kompleksas su folio rūgštimi. „Sport & Isonic“ – bėne vienintelis izotoninis produktas su augalų ekstraktais, padedantis atkurti prarastus elektrolitus, mikroelementus, vitaminus ir energiją, padeda saugoti svarbiausią organą – širdį. „Sport & Hydro“ – svarbių elektrolitų kompleksas su hialurono rūgštimi energijos balansui palaikyti. Sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, be stabilizatorių, be dirbtinių saldiklių. Pagaminta Izraelyje.

NEPRARASK MINERALŲ – NEPRARASK ENERGIJOS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.



-50%

SALUTIL®

MAISTO PAPILDAI

„Saluti“ – produktų linija su gyvybingomis bakterijomis ir elektrolitais.

„Saluti“ Hydra“ – elektrolitų ir gliukozės mišinys, papildytas vitaminais, mineralinėmis medžiagomis ir cholinu. Idealu vartoti po įtemptos veiklos ar jauciant nuovargį.

„Saluti“ Shots“ – gyvybingosios bakterijos, prebiotikai ir vitaminai viename flakonėlyje. Vaikams nuo 3 metų.

„Saluti“ Premium 9“ – sudėtyje yra 9 mikroorganizmų padermės ir vitaminas D.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

Imunitetui,
kaulams,
raumenims,
sveikoms ląstelėms

-50%



OILESEN VITAMINAS D₃, 60 minkštųjų kapsulių **17⁹⁹ 8⁹⁰ €**

MAISTO PAPILDAS

„Oilesen D3 Forte“ – 1 kapsuleje yra net 4000 TV vitamino D₃, išdirpinto kanapių aliejuje. Tinka vartoti žmonėms, turintiems padidintą vitamino D poreikį, pavyzdžiui, vyresniems. **DAUGIAU SAULĖS SU „OILESEN D3“!**

-50%



ZAN™ – maisto papildų linija atminčiai, protinei veiklai, nervų sistemai, psichinei sveikatai bei miegui.

HYPNOZAN EXPRESS, 30 čiulpiamųjų tablečių **6⁴⁹ 3²⁵ €**

VALEROZAN DROPS, geriamasis tirpalas, 50 ml **3⁹⁹ 1⁹⁹ €**

HYPNOZAN, 20 kapsulių **9⁹⁹ 5⁰⁰ €**

VALEROZAN, 60 tablečių **7⁹⁹ 3⁹⁸ €**

MAISTO PAPILDAI

„HypnoZAN Express“ čiulpiamosios tabletės su melatonino ir fitoterapijų medžiagų deriniu leidžia greičiau užmigti, o čiulpiama preparato forma užtikrina geresnę veikimą. „ValeroZAN Drops“ geriamasis tirpalas, augalinių ekstraktų derinys su valerijonais, tinkamas nervų sistemos veiklai, psichinei sveikatai ir atsipalaidavimui, skysta preparato forma užtikrina greitesnę veikimą. „HypnoZAN“ su melatoninu ir melisomis padeda greičiau užmigti, palaikyti normalią miegą bei psichinę sveikatą, padeda atsipalaiduoti. „ValeroZAN“ tabletes vaistinių valerijonų, vaistinių melisų ir paprastųjų apynių bei suktažolių derinys padeda atsipalaiduoti, palaikyti normalią nervų sistemos būklę, palengvinti užmigimą ir palaikyti miego kokybę.

* Teigiama poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti.

„ZAN™“ – **IKVĖPK... IŠKVĖPK.**

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.



Nuo skausmo ir karščiavimo NUO **2,75 €**

IBUPROM
IBUPROM, 200 mg, 10 dengtųjų tablečių **2,75 €**
IBUPROM, 200 mg, 20 dengtųjų tablečių **4,25 €**
IBUPROM, 400 mg, 10 dengtųjų tablečių **3,25 €**
IBUPROM, 400 mg, 20 dengtųjų tablečių **4,75 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: Ibuprofenas, 400 mg ir 200 mg. Terapinės indikacijos: skausmo (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Ibuprom, 400 mg“: suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 1 tabletę 3 kartus per parą. „Ibuprom, 200 mg“: 6–9 m. vaikams (kūno svoris 20–29 kg) gerti po 1 tabletę kas 6–8 val. (negeriti daugiau nei 3 tablečių per parą); 10–12 m. vaikams gerti po 1 tabletę kas 6 val. (negeriti daugiau nei 4 tablečių per parą); suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams pradine doze yra 2 tabletės, po to galima gerti po 1–2 tabletes kas 4 val. (negeriti daugiau nei 6 tablečių per parą). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, tachinis kraujavimas, ūminis skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligės stadija; ankščiau buvusi alergija acetilsalicilo rūgščiai ir kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; sergant sunkiu širdies nepakankamumu; esant trečiam nėštumo trimestriui. Specialūs įspėjimai: vartoti nepatartina, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu, bronchų astma. Reklamos teksto parengimo data 2024.11.29.

YRA „IBUPROM“. NĖRA SKAUSMO.

Moderni kapsulė nuo rėmens NUO **3,99 €**

ESCADRA 20 mg, 7 skrandyje neiros kietosios kapsulės
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: ezomeprazolas, 20 mg. Terapinės indikacijos: vaistas skirtas suaugusiųjų gastroezofaginio refluksos simptomų (pvz., rėmens ir skrandžio rūgšties regurgitacijos) trumpalaikiam gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 kapsulė) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, kapsules gali prireikti vartoti 2–5 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaites. Simptomams visiškai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Jeigu per 2 savaites nepašalinama gydymą simptomi neišnyksta, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Nėra tinkamų „Escadra“ vartojimo rekomendacijų jaunesniui kaip 18 metų vaikų populiacijai indikacijai „trumpaalaikis gastroezofaginio refluksos simptomų (pvz., rėmens ir rūgšties regurgitacijos) gydymas“. Kapsulių negalima kramtyti ar smulkinti. Kapsules galima atidaryti ir granules išmaityti pusę stiklinės nekarbonatų vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pakeistiems benzimidazolams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Ezomeprazolo negalima vartoti kartu su nelfinaviru. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pacientas reikia informuoti, kad kreiptis į gydytoją, jeigu jie patiria didelį kūno svorio mažėjimą dėl nežinomo priežasties, pasikartojanti vėmima, disfgalija, vėmima krauju ar mėlena, arba jeigu (tariama ar diagnozuojama skrandžio opa, būtina iširti, ar nėra piktvybės ligos, nes gydymas ezomeprazolu gali palengvinti jos simptomus ir uždelsti diagnozės nustatymą; jeigu jie anksčiau sirgo skrandžio opa arba patyrė virškinimo trakto operaciją; jeigu jiems 4 savaites arba ilgiau buvo taikomas nepašalinamas virškinimo ar žarnų rėmens gydymas; jeigu jie serga gelta arba sunkia kepenų liga; jeigu jie yra vyresni kaip 55 metų ir turi naują arba neseniai buvusį simptomų. Pacientai, kurių pasikartojantys virškinimo ar rėmens simptomai ilgalinkiai, turi reguliarius intervalus tarp savų gydymo. Kaip ilgalaikio profilaktinio vaisto preparato „Escadra“ pacientai neturi vartoti. Pacientai, kuriems reikia atlikti endoskopiją ar ureazės kvėpavimo testą, turi pasitarti su savo gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Ezomeprazolo skirti kartus su atazanaviru nerekomenduojama. Ezomeprazolo derinimas su klopidogreliu nepatartinas. Kitų PSl arba H2 receptorių blokatorių kartu su ezomeprazolu pacientams vartoti negalima. „Escadra“ sudėtyje yra sacharozės. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems yra fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharozės ir izomaltozės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2024.07.12.

Pilvo skausmui, pūtimui, dujų kaupimuisi žarnyne palengvinti NUO **4,99 €**

METEOSPASMYL®
60 mg/300 mg, 20 minkštųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIAI PREPARATAI
Terapinės indikacijos. Žarnyno funkcijos sutrikimų, lydymų meteorizmo ir dujų kaupimosi žarnyne (esant ilgaijoles žarnos sindromui) simptominiams gydymas. Dozavimas. *Suaugusiems nuo 18 metų amžiaus:* paprastai vartojama po 1 kapsulę 2–3 kartus per dieną pradėdant valgyti. Vaistinis preparatas vartojamas 3–4 savaites. „Meteospasmyl“ nėra skirtas vaikams ir paaugliams iki 18 metų. Vartojimo metodas. Vartoti per burną. Kapsulės geriamos prieš pradėdant valgyti, jos yra nurijamos nekrantytos užsigeriant pakankamu skysčio kiekiu. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas alverino citratui, simetikonui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; žarnų nepaieinamumas; vartojimas vaikams ir paaugliams iki 18 metų. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Atsargiai vaistą reikia vartoti tais atvejais, kai yra galimo žarnyno nepaieinamumo simptomai (pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas, dujų ir (arba) išmatų susilaikymas). Kepenų funkcija. Pacientams, gydomiems alverinu/simetikonu, pastebėta padidėjusi, daugiau nei 2 kartus viršutinė normos riba (VNR) viršijanti alano aminoransferazės (ALT) ir aspartato aminoransferazės (AST) koncentracija. Šis padidėjimas gali būti lydymas ir padidėjusio bendro bilirubino kiekio serumo. Jei kepenų aminoransferazių kiekis padidėja tiek, kad VNR viršijama daugiau nei 3 kartus, o ypač pasireiškusių gelta, patartina nutraukti alverino ir simetikono vartojimą. Teksto parengimo data 2024 m. vasario 13 d.

Nuo pilvo pūtimo NUO **2,99 €**

ESPUMISAN
ESPUMISAN, 40 mg, 25 minkštosios kapsulės **2,99 €**
ESPUMISAN, 40 mg, 50 minkštųjų kapsulių **4,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veiklioji medžiaga: 1 minkštojoje kapsulėje yra 40 mg simetikono. Terapinės indikacijos. „Espumisan“ vartojamas ligų, kurių metu virškinimo trakte kaupiasi dujos (meteorizmas), būna pilvo pūtimas, pilnumo pojūtis, simptomams gydyti, prieš pilvo ertmės organų tyrimus, pvz.: rentgeno, ultragarsu. „Espumisan“ skirtas vaikams nuo 6 metų, paaugliams ir suaugusiems. Kontraindikacijos. „Espumisan“ vartoti draudžiama; jeigu yra alergija veikliajai medžiagai, dažikliui saulėlydžio geltonajam FCf (E110), konservantui metilo parahidroksibenzoatui (E218) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Espumisan“. Jei šie virškinimo veiklos sutrikimai atsiranda ar jie trunka ilgiau, reikia pasitarti su gydytoju. Jis nustatys, ar nėra ligų, kurias reikia gydyti kitais būdais. Dozavimas: kai dėl susilaikiusių dujų sutrinka virškinimo trakto veikla; paaugliams, suaugusiems ir 6–14 m. amžiaus vaikams rekomenduojama skirti vartoti po dvi „Espumisan“ 40 mg minkštąsias kapsules 3–4 kartus per parą. „Espumisan“ 40 mg minkštąsias kapsules galima gerti valgant arba po valgio, prireikus – ir prieš miegą. Vartojimo trukmė priklauso nuo ligos eigos. Prireikus „Espumisan“ 40 mg minkštąsias kapsules galima vartoti ilgiau. Renjant pacientus tyrimams rekomenduojama skirti po dvi „Espumisan“ 40 mg minkštąsias kapsules 3–4 kartus per parą 1 dieną prieš tyrimus ir dvi „Espumisan“ 40 mg minkštąsias kapsules tyrimo dienos rytą. UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIČI“ J. Jaskinio g. 16A, LT-03663 Vilnius, tel. +370 5 269 1947, LT@berlin-chemie.com Reklama paruošta 2023-12-11. Esp_17_2023_VI_pharma

JEI PILVE URAGANAS – JUMS PADĖS „ESPUMISANAS“!

4,99 €

ACETERIN EXPRESS 10 mg tabletės, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje tabletėje yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. Terapinės indikacijos: sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito bei lėtinės idiopatines dilgėlinės simptomams palengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: vyresniems kaip 12 metų – po 1 tabletę per dieną, 6–12 metų vaikams – po pusę tabletės 2 x/d. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pagalbinei medžiagai, hidroksiziniui arba bet kuriam piperazino dariniui. Pacientai, kuriems smarkiai sutrikusi inkstų funkcija. Specialūs įspėjimai: atsargiai vartoti sergantiems epilepsija ir pacientams, kuriems yra traukulinių pavojūs. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El. paštas: info.lithuania@sandoz.com. BS240336092. Teksto patvirtinimo data: 2024.03.15.

Pagalba nuo viduriavimo **4,49 €**

LOPEDIUM EXPRESS 2 mg, kietosios kapsulės, 10 kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje yra 2 mg loperamido hidrochlorido. Terapinės indikacijos: simptomini suaugusiųjų ir vyresnių kaip 12 m. paauglių ūminio viduriavimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: šį pradžią reikia gerti 2 kapsules, vėliau (po kiekvieno išsūstūtinimo beformės išmatomis) – po 1 kapsulę. Kontraindikacijos: nevartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliajai ar pagalbinei medžiagai, jei yra gerti burtųjū sukeltas žarnyno uždegimas. Specialūs įspėjimai: jei per 48 val. po vaisto šėgėrimo viduriavimas nesusilpnėja, jo vartojimą reikia nutraukti ir kreiptis į gydytoją. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS240336090. Teksto patvirtinimo data 2024-03-13.

1+1

Perkant vieną pakuotę, antrą tokia pati arba pigesnę NEMOKAMAI!



ACONITUM

MAISTO PAPILDAI

ACONITUM – viena iš maisto papildų lyderių Lietuvoje, kuriančių ir gaminančių augalinius vaistus, biomedicininis preparatus ir maisto papildus nuo 1999 m. Vartotojų įvertinimą ir pasitikėjimą pelnė, išlaikydamas atsakingą požiūrį į gaminius produktus: nuolat tobulina preparatų sudėtis ir diegia naujausias technologijas gamyboje. Aukščiausia preparatų kokybę užtikrina Geros gamybos praktikos (GMP) nuostatų laikymasis bei nuolatinė tik gamybos proceso, bei ir žaliavų kokybės kontrolė.

AUKŠTOS KOKYBĖS LIETUVIŠKI PREPARATAI, KURIUOS SUKURĖME JUMS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

NUO 2⁹⁹ €

THROMBO ASS

THROMBO ASS 50 mg, 100 skrandyje neirių tablečių 2⁹⁹ €THROMBO ASS 75 mg, 100 skrandyje neirių tablečių 3⁹⁹ €THROMBO ASS 100 mg, 100 skrandyje neirių tablečių 4⁹⁹ €

NERCEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: acetylsalicilo rūgštis. **Terapinis indikacijos:** miokardo infarkto rizikos mažinimas sergantiems krūtinės angina. Antrinė miokardo infarkto profilaktika. Trombozės profilaktika po vainikinių arterijų nuosėdų operacijos. Antrinė praeinančio smegenų išemijos priepuolio (PSP) ar insulto profilaktika. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti po 1 tablete 1 kartą per dieną (patariama vakare). Skrandyje neirią tablete reikia nuryti nesukramtyta, užsigeriant pakankamu skysčiu kiekiu valgio metu arba tarp valgių tuo pačiu paros metu. Įprastinė paros dozė ilgalaikiam vartojimui yra 50–150 mg. Dalyti į dalis. „Thrombo ASS“ skrandyje neirių tabletes negalima, nes bus pažeista skrandyje neiri plevelė. Norint, kad tikėtų individualiam vartojimui, reikia rinktis atitinkamo stiprumo preparatą (50 mg, 75 mg ir 100 mg). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei salicilatams ir kitiems NVNU; bronchų spazmas; ūminė pepsinė opa; polinkis į kraujavimą, hemofiliją; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; sunkus, nepakankamai kontroliuojamas širdies nepakankamumas; nėštumas; vaikai ir paaugliai iki 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Atsargumo reikia laikytis šiais atvejais: sergant bronchine astma, šienlige, esant nosies gleivinės paburkimui ir esant kito pobūdžio alergijai; vartojant kartu su vaistais, mažinančiais kraujo krešumą; sergant hemolizine anemija; esant skrandžio ir žarnų sutrikimams, esant anamnezėje duomenims apie opaligę ar kraujavimą iš virškinimo trakto; esant inkstų ligoms ir (arba) kepenų funkcijos sutrikimui; turintiems polinkį podagrai. Prieš numatytą operaciją 10 dienų acetilsalicilo rūgštis reikia nevartoti. Šio vaisto sudėtyje yra laktozės monohidrato, todėl vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas lėpų laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pakuotė: 50 mg, 75 mg arba 100 mg; 100 skrandyje neirių tablečių. Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas: G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. Reklamos teksto parengimo data: 2024.10.

NUO GERKLĖS SKAUSMO

6⁹⁹ €

INOVOX

INOVOX HONEY LEMON 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, 24 kietosios pastilės

INOVOX MENTHOL 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, 24 kietosios pastilės

INOVOX ORANGE 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, 24 kietosios pastilės

NERCEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietoje pastilėje yra 2 mg lidokaino hidroklorido, 0,6 mg amilmetakrezolio ir 1,2 mg 2,4-dichlorobenzolio alkoholio. **Indikacijos:** gerklės skausmo mažinimas, vietinis antiseptinis gerklės ir burnos ertmės uždegiminiu būkliu (pvz., paraudimo, patinimo) gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** po 1 kietąją pastilę kas 2–3 val. ir kai reikia, bet ne daugiau kaip 8 kietąsias pastiles per parą (vaikams – ne daugiau kaip 4 pastiles). Vartoti ant burnos gleivinės. Kietąją pastilę reikia lėtai sučiulpti laikant burnoje, bet ne už skruosčio. Vaisto nerekomenduojama vartoti liguotai kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** jei simptomai neišnyksta ilgiau kaip 2 paras, sunkėja, arba atsiranda naujų simptomų, reikia įvertinti paciento klinikinę būklę. Atsargiai vartoti ūmine liga sergantiems, nusilpusiems pacientams. Nevartoti esant ūmios burnos ir gerklės žaizdoms, prieš valgant ar atsigeriant. Astma sergantys pacientai turi būti prižiūrimi gydytojo. Sudėtyje yra levomentolio terpenų, gliukozės, sacharozės, saulėlydio getonito ir košenilio rūdono. **Reklamos teksto parengimo data 2022-06-09.**
„INOVOX“. EFEKTAS – JAU PO 1 MINUTĖS!

4⁹⁹ €

SEPTANAZAL

SEPTANAZAL VAIKAMS 0,5 mg/50 mg/ml

nosies purškalas (tirpalas), 10 ml

SEPTANAZAL SUAUGUSIESIEMS 1 mg/50 mg/ml

nosies purškalas (tirpalas), 10 ml

Ksilometazolino hidrokloridas / Dekspantenolis

NERCEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

„Septanazal“ nuo 6 metų amžiaus vartojamas:

- nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) bei gleivinės pažeidimo gijimui skatininti;
- nealerginiam nosies gleivinės uždegimui (vazomotoriniam rinitui) lengvinti;
- kvėpavimo pro nosį pasunkėjimui po nosies operacijos šalinti.

Rekomenduojama dozė 6 metų bei vyresniems vaikams yra po vieną įpurškimą į kiekvieną šnervę iki 3 kartų per parą.

Kontraindikacijos. „Septanazal“ suaugusiems vartoti negalima, jeigu yra alergija ksilometazolino hidrokloridui, dekspantenoliui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu Jums arba Jūsų vaikui yra sausasis nosies gleivinės uždegimas ir atsiranda šašų (sausasis rinitas), jeigu Jums arba Jūsų vaikui buvo chirurginiu būdu pašalinta posmegeninė liauka arba buvo atlikta kita operacija, susijusi su smegenų dangalais. **Specialūs įspėjimai.** „Septanazal“ galima vartoti tik atidžiai įvertinus rizikos ir naudos santykį, jeigu: pacientas yra gydomas monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI) ar kitokiais kraujospūdį didinančiais vaistais; yra padidėjęs akispūdis (ypač jei sergama uždaru kampo glaukoma), pacientas serga sunkia širdies ir kraujagyslių liga, yra feochromocitoma, yra metabolinis sutrikimas, yra porfirija, yra prostatos hiperplazija. **Teksto peržiūros data: 2023.11.20.**

ATKĖMSĄ UŽGLUSIJĄ NOSĮ IR ŠVELNIAI GYDO IŠSAUSĘJUSIA NOSIES GLEIVINĖ.

IKI -50%

NAUJIENA



FJORD STRONG OMEGA-3

MAISTO PAPILDAI

Išbandykite naują širdžiai – „Fjord Strong Omega-3 Cardio“.

- Išskirtinai stiprios koncentracijos omega-3, su dideliu kiekiu bioaktyviųjų EPR ir DHR.
- Sertifikuota aukščiausios kokybės žaliava – atitinka 5* tarptautinio žuvų taukų standarto įvertinimo kriterijus.
- Ypač gerai pasisavinami, nes yra natūraliai gamtoje esančios trigliceridų formos.
- Iš tyro laukinių, mažų, riebių žuvų šaltinio. Žuvys sugaunamos tvarkingai žvejojant (žaliava patvirtinta „Jūros draugo“ statusas).
- Be žuvies skonio, todėl vartoti kasdien tampa tikru malonumu.

„FJORD STRONG OMEGA-3“ – ŽUVŲ TAUKAI, KURIE GALI DAUGIAU, NEI TIKIESI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

JŪSŲ GROŽIUI

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

BEOTEBAL® PLUS PLAUKAMS, ODAI, NAGAMS, 30 +10 tablečių 32⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAS

„Beotebal“ PLUS plaukams, odai, nagams* rekomenduojamas kasdienei plaukų, odos ir nagų būklės bei išvaizdos priežiūrai. Ypač tinkamas laikotarpiu, kai plaukus, odą ir nagus veikia aplinkos veiksniai (saulė, vanduo, vėjas, šaltis, sniegas, lietus) ar po intensyvių kirpyklos procedūrų (pvz.: dažymo, tiesinimo, džiovinimo) ir kosmetinių nagų procedūrų. Sudėtyje yra originalus koncentruotas „NutriAminoBiotinum“ kompleksas, kuriame yra daug aminorūgščių, mineralų ir vitaminų – įskaitant biotiną ir natūralių silicij, turintį naudingą poveikį plaukams, odai ir nagams. Gaminyje nėra gliitimo ir laktozės. Tinka vegetarams ir veganams.

GROŽIO FORMULĖ TAVO PLAUKAMS, ODAI IR NAGAMS!

6⁹⁹ €



MAGNE B₆ geriamasis tirpalas, 10 ampulių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: Vienoje 10 ml ampulėje yra 186 mg magnio laktato dihidrato, 936 mg magnio pidolato, 10 mg piridoksino hidroklorido.

KAI VARGINA HEMOROJAUS SIMPTOMAI

-30% 7⁴⁸ €



HEMAGEL® PROCTO

5 rektalinės žvakutės
MEDICININIS PASKIRTIES PREKĖ
PASKIRTIS: skalinta ūmių ir lėtiniių tiesiosios žarnos gleivinės žaizdų gijimą pacientams, kenčiantiems nuo įtrūkimų ir hemorojaus, taip pat pacientams po Barono operacijos.

2⁹⁹ €



AMBROLAN

30 mg, 20 tablečių
Ambroksolio hidrokloridas
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
1 tablete yra 30 mg ambroksolio hidroklorido. „Ambrolan“ yra labai veiksmingas vaistas, kurio veiklioji medžiaga ambroksolis yra bromheksino metabolitas.

5⁴⁹ €



NO-SPA
NO-SPA 40 mg, 24 tabletės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tablete yra 40 mg droteraveno hidroklorido. Indikacijos: lygiųjų raumenų spazmų, susijusių su tulžies latakų li-gomis (tulžies pūslės ir (arba) latakų akmenlige, tulžies pūslės ir (arba) šalia jos esančių audinių, tulžies latakų ar didžiojo dvilypkapištes žarnos spenelio uždegimas).

6⁹⁹ €



MAGNEROT

500 mg, 50 tablečių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Kiekvienoje tablete yra 500 mg magnio orotato dihidrato (atitinka 32,8 mg magnio). Terapinės indikacijos. Magnio trūkumo, jeigu jis sukelia raumenų veiklos sutrikimą (pvz., mėšlungį), šalinimas. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems žmonėms: jei nepaskirta kitaip, magnio atsargoms papildyti pirmą savaitę reikėtų gerti po 2 tabletes 3 kartus per parą, po to – po 2-3 tabletes per parą.

5⁹⁹ €



NUROFEN

NUROFEN FORTE ORANGE, 40 mg/ml, geriamoji suspensija, 100 ml 7⁹⁹ €
NUROFEN FORTE STRAWBERRY, 40 mg/ml, geriamoji suspensija, 100 ml 8⁹⁹ €
NUROFEN ORANGE, 100 mg, 12 kramtomųjų minkštųjų kapsulių 5⁹⁹ €
NERECEPTINIS VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml „Nurofen Forte Orange“, 40 mg/ml ir „Nurofen Forte Strawberry“, 40 mg/ml geriamosios suspensijos yra 40 mg ibuprofeno. Kiekvienoje „Nurofen Orange“, 100 mg, kramtomosios minkštųjų kapsulėje yra 100 mg ibuprofeno.

SVORIO MAŽINIMUI

22⁹⁹ €



ORLISTAT POLPHARMA

60 mg, 42 kietosios kapsulės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Vienoje kietojoje kapsulėje yra 60 mg orlistato. **Indikacijos:** „Orlistat Polpharma“ yra skirtas antsvorio turintiems (kūno masės indeksas KMI ≥ 28 kg/m²) suaugusiems žmonėms svorį mažinti. Vartojant šį vaistinį preparatą reikia laikytis šiek tiek sumažinto kalorijų ir sumažintos riebalų kiekio dietos. **Dozavimas:** rekomenduojama „Orlistat Polpharma“ dozė yra viena 60 mg kapsulė tris kartus per parą. Per 24 valandas galima išgerti ne daugiau kaip tris 60 mg kapsules. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; kartu taikomas gydymas ciklosporinu; lėtinės malabsorbcijos sindromas; cholestazė; nėštumas; žindymas; kartu taikomas gydymas varfarinu arba kitais geriamaisiais antikoaguliantais. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pacientas turi tvirtai laikytis rekomenduotos dietos. Jei orlistatas vartojamas kiekvieno maitynimosi metu arba valgomos riebus maistas, gali dažniau pasireikšti virškinimo trakto simptomų tikimybė. Gydymas orlistatu gali sutrikdyti riebaluose tirpių vitaminų (A, D, E ir K) absorbciją. Todėl reikia gerti polivitaminų papildą. Cukriniu diabetu sergantis asmuo, prieš pradėdami gydymą „Orlistat Polpharma“ turi pasitarti su gydytoju. Pacientai, vartojantys „Orlistat Polpharma“ kartu su vaistiniais preparatais hipertenzijai arba hipercholesterolemijai gydyti, turi pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Pranešta apie kraujavimo iš tiesiosios žarnos atvejus pacientams, vartojantiems orlistatą. Jeigu taip nutinka, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Jeigu prasideda stiprus viduriavimas, geriamieji kontraceptikai gali nesukelti pagedaujamo poveikio, todėl rekomenduojama naudoti papildomas kontracepcijos priemones. Pacientai, sergantys inkstų ligomis, epilepsija prieš pradėdami gydymą „Orlistat Polpharma“, turi pasitarti su gydytoju. Teksto paruošimo data: 2018-04.

SUMAŽINK SVORĮ SAUGIAI.

4⁹⁹ €



ACEMIS 600 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

„Acemis“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos acetilsalicino. „Acemis“ vartojamas gleivėms skystinti sergant lėtinėmis bronchu bei plaučių ligomis, kurių metu būna sutrikusi gleivių gamyba bei šalinimas suaugusiems. Jeigu per 4-5 dienas Jūsų sąveiką nepagerėja arba net pablogėja, kreipkitės į gydytoją. **Atnaujinti perskaitykite visą pakuoletės lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.** Visada vartokite šį vaistą tiksliai, kaip aprašyta lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. „Acemis“ vartoti draudžiama: * Jeigu yra alergija acetilsalicinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos informacijoje lapelio 6 skyryje); * Jeigu pacientas yra jaunesnis negu 18 metų amžiaus. **Nėštumas ir žindymo laikotarpis.** Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. **Kaip vartoti „Acemis“.** Jeigu gydytojo neparšyta kitaip, rekomenduojamas toliau nurodytas dozavimas. Suaugusiems žmonėms reikia išgerti 1 disperguojamąją tabletę (600 mg) kartą per dieną. Neviršyti 600 mg dozės per parą. **Vartojimo metodas.** Vaistas vartojamas po valgio. Disperguojamąją tabletę reikia ištrinti stiklinėje šilto vandens ir gerai išmaišyti, kad būtų gautas bespalvis, drumstas geriamasis tirpalas, kurį rekomenduojama išgerti šilta. Gausus skysčių vartojimas stiprina „Acemis“ gleivių skystinamąjį poveikį. **Vartojimo trukmė.** Jeigu Jūsų simptomai sunkėja arba po 4-5 parų gydymo būklė nepagerėja, kreipkitės į gydytoją. **Teksto pasitaraj kartą peržiūrėkite 2023-12-14.** Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Vaistyninės vaisti kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro biuro tinklalapyje <http://www.vvkt.lt/>.

NOSES GLEIVINĖS PABURKIMUI MAŽINTI

3⁹⁹ €



RHINO-STAS

nosies purškalas, tirpalas, 10 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 ml nosies purškalo yra 1 mg xylometazolino hidrochlorido. **Indikacijos:** „Rhino-stas“ yra simpatikomimetikas. Purškalas siaurina kraujagysles, todėl mažina nosies gleivinės paburkimą. Vartojamas trumpalaikiam nosies gleivinės paburkimui mažinti, sergant sloga arba prienosinių ančių uždegimu (sinusitu). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 10 m. vaikams bei paaugliams reikia purkšti po 1 įpūsimą tirpalo „Rhino-stas“ į kiekvieną nosies landą 1-3 kartus per parą tada, kada reikia. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jei yra sausasis nosies gleivinės uždegimas (sausasis rinitas); pacientams, kuriems pro nosį neseniai buvo atlikta smegenų operacija; jaunesniems kaip 10 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** „Rhino-stas“ galima vartoti tik atidžiai įvertinus jo vartojimo riziką ir galimą naudą šiais atvejais: pacientams, kurie vartoja ar vartojo vaistų nuo depresijos (monoaminooksidazės inhibitorių) arba kitų vaistų, kurie gali labai padidinti kraujospūdį; kai padidėjęs akispūdis, ypač sergant uždaro kampo glaukoma; sergant sunkia širdies ir kraujagyslių sistemos liga (pvz., vainikinių širdies arterijų liga, hipertenzija); sergant feochromocitoma (antinksčių naviku); sergant porfirija; sergant medžiagų apykaitos ligomis (pvz., hipertireozė, cukrinis diabetas). **Pakuotės lapelio peržiūros data 2018-10-23. Reklamos teksto parengimo data 2020-02-03.**

PURŠKALAS „RHINO-STAS“ – PIRMOJI PAGALBA SERGANT SLOGA AR SINUSITU!

NUO SKAUSMO IR PERŠALIMO

5⁹⁹ €



SOLPADEINE

12 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje tabletėje yra 500 mg paracetamolio, 8 mg kodeino fosfato hemihidrato ir 30 mg kofeino. Terapinės indikacijos: silpno ir vidutinio stiprumo skausmas (šnarių, nugaros, galvos ir migreninio, menstruacinio, neuralginio bei dantų) malšinimas. Peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems: po 2 tabletes, jei reikia, nuo 3 iki 4 kartų per parą. Negalima dozės gerti dažniau nei kas 4 val. ir ne daugiau kaip 8 tablečių per bet kurias 24 val. 12-15 m. paaugliams: po 1 tabletę kas 6 val. Neviršyti maksimalios paros dozės – 4 tablečių per parą. 16-17 m. paaugliams: po 1-2 tabletes kas 6 val. Neviršyti maksimalios paros dozės – 8 tablečių per parą. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliosios medžiagos (paracetamolio, kodeino fosfato hemihidrato, kofeino), skausmą malšinančioms opioidams) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio; jeigu Jums yra lėtinis vidurių užkietėjimas; jeigu Jums yra kvėpavimo funkcijos nepakankamumas; jeigu Jums buvo galvos trauma; jeigu Jums yra padidėjęs intrakranijinis spaudimas; jeigu Jums buvo atlikta tulžies lataų operacija; vaikams, jaunesniems kaip 12 m.; malšinti skausmo vaikams ir paaugliams (0-18 m.), po gerklės ir ryklės migdolų pašalinimo dėl obstrukcinės miego apnėjos sindromo operacijos; jeigu yra žinoma, kad Jūsų organizme kodinas labai greitai metabolizuojamas į morfiną; jeigu esate nėščia arba žindote kūdikį. **Specialūs įspėjimai:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Jeigu: Jūs sergate sunkia inkstų ar kepenų liga; sutrikusi žarnyno veikla, įskaitant žarnyno veiklos sustojimą; Jums operacijos metu buvo greitai metabolizuojamas 1 morfinas; jeigu esate nėščia arba priklausomas (-a) nuo opioidų, alkoholio, receptinių vaistų arba neteisėtų cheminės medžiagų. Reguliariai ir ilgiau laiką vartojant kodeiną (šio vaisto veikliąją medžiagą), gali išsivystyti priklausomybė nuo šio vaisto ir Jūs galite pradėti netinkamai jį vartoti. Nevartokite šio vaisto ilgiau nei reikia. Neduokite šio vaisto niekam kitam. Nivartokite per daug produktų, kuriuose yra kofeino. Kartu su šiuo vaistu nevartokite kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio ar kodeino. Reklamos teksto parengimo data 2024-11-08.

5⁹⁹ €



TAVEGYL 1 mg, 20 tablečių.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: Viena tabletė yra 1,34 mg klemastino fumarato, kuris atitinka 1 mg klemastino. **Indikacijos:** tinka šieno slogos ar kitokios alerginės rinopijos, įvairių priežasčių sukeltos dilgėlinės, įskaitant dermatografinę dilgėlinę, niežėjimą sukeliančios dermatozės, vabzdžių įgėlimo ir įkandimo gydymui. **Vartojimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams du kartus per parą iš ryto ir vakare geriant po 1 tabletę (1 mg), 6-12 metų vaikams reikia gerti prieš pusryčius ir vakare, prieš miegą, po pusę (0,5 mg) „Tavegyl“ tabletę. 3-6 metų vaikams reikia gerti prieš pusryčius ir vakare, prieš miegą, po pusę (0,5 mg) „Tavegyl“ tabletes. Tabletes reikėtų gerti prieš valgį užsigeriant vandeniu. Vartoti tik per burną. **Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai:** padidėjęs jautrumas klemastinui, kitokiems antihistamininiams vaistiniams preparatams ar bet kuriai kitai pagalbinei medžiagai, porfirija, pacientas jaunesnis negu 3 metų vaikas, atsargiai vartoti turi pacientai, sergantys: uždaro kampo glaukoma; stenozė sukėlanti peptinė opa; dvylikapirštės žarnos obstrukcija; prostatos hipertrofija, dėl kurios susiaukio šlapimas, bei šlapimo pūslės kaklelio obstrukcija. „Tavegyl“ sudėtyje yra laktozės. „Tavegyl“ negalima vartoti pacientams, kuriems nustatyta – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Vaistinių preparatų reikia atsargiai skirti epilepsija sergantiems arba praėjusiu traukulius patyrusiems pacientams. Pakuoletės lapelio peržiūros data 2021-01-29. Reklamos teksto parengimo data 2021-03-18. 2203_SB_Tavegyl_V01_LT

VYRŲ IR MOTERŲ PLAUKŲ SLINKIMO GYDYMUI

NUO 19⁹⁹ €



MINOXIDIL INTELI

MINOXIDIL INTELI 2 % odo tirpalas 60 ml 19⁹⁹ €

MINOXIDIL INTELI 5 % odo tirpalas 60 ml 26⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. MINOXIDIL INTELI veiklioji medžiaga minoksidilis. MINOXIDIL INTELI 5 % odo tirpalas vartojamas gydyti vidutinio stiprumo vyrų nuplikimą, susijusį su hormonais. Gydymas šiuo tirpalu rekomenduojamas pacientams po nesėkmingo 4 mėnesių gydymo MINOXIDIL INTELI 2 % odo tirpalu. **KAIP VARTOTI MINOXIDIL INTELI:** MINOXIDIL INTELI 2 % ar MINOXIDIL INTELI 5 % odo tirpalą visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. **Dozavimas:** MINOXIDIL INTELI 2 % odo tirpalą ar MINOXIDIL INTELI 5 % odo tirpalą reikia tepti ant pažeistos galvos odos po 1 ml (10 purškiklio paspaudimų) kas 12 valandų. Nesvarbu, koks alopecijos plotas, rekomenduojama dienos dozė visada tokia pati. Maksimali dienos dozė yra 2 ml (20 paspaudimų). **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas minoksidiliui arba bet kuriai pagalbinei MINOXIDIL INTELI medžiagai. Dėl galimo kitų kūno vietų plaukuotumo padidėjimo, MINOXIDIL INTELI 5 % moterims vartoti negalima. MINOXIDIL INTELI 5 % odo tirpalą draudžiama vartoti jaunesniems kaip 18 ir vyresniems kaip 65 metų asmenims. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Pacientams su galvos odos dermatozė preparatą gali rezerbuolis po oda. Prieš pradėdami vartoti MINOXIDIL INTELI 5 % reikėtų pasitikrinti sveikatą. Dėl preparate esančio propilenglikolio poveikio gali atsirasti sudirginimas ir kontaktinis dermatitas. Pacientams, kurie sirgo širdies ir kraujagyslių ligomis, MINOXIDIL INTELI reikia vartoti ypaci atsargiai dėl alinatrio sistemos poveikio. Vartojant MINOXIDIL INTELI reikia saugotis, kad preparato nepatektų į akis. Jei preparato atsitiktinai patenka ant jaučių, reikia kruopščiai nuplauti dideliu vandens kiekiu. Teksto peržiūros data: 2021-05-20. „MINOXIDIL INTELI“ ... IR PLAUKAI SUGRĮŽTA...

NUO RĖMENS

2⁹⁹ €



PANZILAN® 20 mg, 14 skrandyje neiuri tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Pantoprazolas. Vienoje tabletėje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidrato pavidalu). **Indikacijos.** „Panzilan“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos pantoprazolo, kuri blokuoja skrandžio rūgšties gaminimą „siurbiant“, todėl skrandyje sumažėja rūgšties kiekis, „Panzilan“ vartojimas trumpalaikiam gastroezofaginio refliuksinio simptomo (pvz., rėmens, rūgščių atpylimo) suaugusiems pacientams gydymui. Refliuksas yra rūgščių iš skrandžio atgalinis patekimas į stemplę, kurioje gali prisidėti uždegimas ir sukelti skausmą. Dėl to gali atsirasti tokių simptomų, kaip skausmingas deginimo pojūtis krūtinėje kylantis į ryklės (rėmus) ir rūgštus skonis burnoje (rūgšties atpylimas). **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Gerti po 1 tabletę per parą prieš valgį tuo pačiu paros laiku 2-3 dienas iš eilės, užsigeriai vandeniui. Tabletes reikia nuryti, negalima kramtyti ar laužyti. Neviršykite rekomenduojamos 20 mg pantoprazolo dozės per parą. Nutraukite „Panzilan“ vartojimą, kai visi pranykęs ligos simptomai. Neparisiturkite su gydytoju vartoti „Panzilan“ ligiam kaip 4 savaites negalima. **Kontraindikacijos.** Jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) pantoprazolui, sojų lecitinui arba bet kuriai pagalbinei „Panzilan“ medžiagai; kartu vartojami vaistai, kurių sudėtyje yra atazanavirio, amikacino ir/kiti 18 metų; nėštumas arba kūdikio žindymas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu dėl rėmens arba virškinimo sutrikimo gydomės ilgiau kaip 4 savaites; esate vyresnis kaip 55 metai ir kasdien vartojate nереceptinius vaistus dėl sutrikusio virškinimo; atsiranda naujų simptomų arba simptomai neseniai pasikėlė; anksčiau sirgote skrandžio opa arba buvo atlikta skrandžio operacija; sutrikusi kepenų veikla arba atsirado gelta; numatomas atlikti endoskopija arba C-šlapalo mėginiai. Jeigu numatyta atlikti kraujo mėginius, pasakykite gydytojui, kad vartojate šį vaistą. Atsirginimo ir rėmens simptomai gali palengvėti pavartojus „Panzilan“ vos vieną dieną, tačiau šis vaistas neturi sukelti pagerejimo nedecliant. Jo negalima vartoti profilaktikai. Jei jums gydytojais sakė, kad netoleruojate kai kurių angliavandenių, prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su gydytoju. „Panzilan“ sudėtyje yra sojų lecitino. Jei esate alergiškas žemės riešutams ar sojai, vaisto vartoti negalima. **UŽGESINK GAISRA SKRANDYJE!**

SKAUSMUI MALŠINTI

2⁹⁹ €



NEOASKOFENAS, 200 mg/200 mg/40 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 200 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg paracetamolio ir 40 mg kofeino. **Terapinės indikacijos:** vaistas vartojamas silpno ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių ir menstruaciniam skausmui malšinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Tabletes reikia vartoti nekrumtant, užgeriant ne mažiau kaip 250 ml vandens. Atsivėliginti 1 ligos sunkuma, vartoti po 1 tabletę 1-4 kartus per dieną. Didžiausia paros dozė – 4 tabletės. Negalima vaisto gerti dažniau kaip kas 6 valandas. Skausmui malšinti vaisto galima vartoti ne ilgiau kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai ar buvusi virškinimo trakto opa ir (arba) kraujavimas iš virškinimo trakto, buvusi bronchų astma, kurią sukėlė salicilatai ar kitokie nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, pacientas jaunesnis negu 12 metų, trys paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas, ligos, kurių metu yra padidėjęs kraujavimo pavojus, kraujo krešėjimo sutrikimas, vartojama 15 mg ar didesnę metotreksato savaitės dozė, sunkūs širdies, kepenų, inkstų nepakankamumas, labai sunki padidėjusio kraujo spaudimo liga, kamuoja nemiga, padidėjęs nervingumas, dirglumas, nerimas, baimė, sąsūdumimas ar kiti panašūs simptomai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergama podagra, bronchų astma, kolagenozės ar kraujodaros sistemos ligomis, sustiprėjus sklydiškaiems veikliams arba vartojimo traktu, inkstų, kepenų ar širdies funkcijos sutrikimui, yra buvusi alergija kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, planuojama chirurginė operacija, pacientas jaunesnis kaip 16 metų ir serga virusinėmis ligomis, pacientas yra sėmvas, plauaujama pastoti, atsiranda šlapimo piktinimų, pasireiškia pabrinkimų ar skausmas sausness srityje, pagęsta oda ar akys, pasireiškia bendras silpnumas, yra nerimo simptomai, nemiga. Sudėtyje esantys kofeinai gali sukelti dirglumą, dažnų širdies plakimą, viduriavimą, susijaudinimą, stiprų širdies plakimą, nemigą, galvos skausmą, raumenų trūkčiojimą ir šlapimo išskyrimų padidėjimą. **Reklamos teksto parengimo data** 2024-11-12.

PAVIRŠINĖMS ŽAIZDOMS IR ODOS DEZINFEKCIJAI PRIEŠ NECHIRURGINES PROCEDŪRAS

6⁹⁹ €



DUOSEPTIC, 1 mg/20 mg/ml odos purškalas (tirpalas), 50 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml „Duoseptic“ odos purškalo (tirpalo) yra 1 mg oktenidino dihidrochlorido, 20 mg fenoksietanolio. **Terapinės indikacijos:** mažų paviršinių žaizdų antiseptinis gydymas ir odos dezinfekcija prieš nechirurgines procedūras, kartotinis trumpalaikis gleivinių ir gretimų audinių antiseptinis gydymas prieš diagnostines procedūras išangės ir lyties organų srityje, šikant makščiui, moters išoriniams lyties organams ir vyropas galvute, taip pat prieš šlapimo pūslės kateterizaciją; laikinas ribotas pagalbinis antiseptinis tarpurūšinis mikroze (grybelines infekcijas tarp rankų ar kojų pirštų) gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti ant odos. Ant gydomo srities užpurškite 1 kartą per dieną taip, kad jūs visiškai sudreškite. Kitu atveju galite užpurškinti ant tampono ir gydomą vietą palatinti (ne mažiau nei dviem „Duoseptic“ suapunkštais tamponais), kad visiškai sudreškite, tinkamausias būdas – naudojant tamponus. Palaikite, kol „Duoseptic“ visiškai išdžiūvis, prieš atpaudami ar užkiudami žaizdą. Naudojant grybelinę infekciją gydyti – purškite ryte ir vakare. **Kontraindikacijos:** nenaudokite, jei padidėjęs jautrumas oktenidino dihidrochloridui, fenoksietanolio arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. „Duoseptic“ neturėtų būti naudojamas pilvo ertmėi (pvz., atliekant operaciją), šlapimo pūslėi ar ausies membranoi skalauti. **Specialūs įspėjimai:** nenurykite, ypač didelio kiekio, ir nelieskite patekti į kraujotakos sistemą, pvz., dėl atsitiktinio įšvilimo. Naujagimiams, ypač nelieskite, vartoti atsargiai, nes „Duoseptic“ gali sukelti sunkių odos padidėjimą. Pašalinkite vaistinio preparato perteklių iš užtikrinkite, kad įspranktumo ant odos ilgiau nei reikia. Venkite patekimo į akis; patekus – nedelsdami gerai praskalaukite vandeniu. Nelieskite viršūnei į giliausias raumenes. Naudokite tik išorinai. Po gliu žaizdų apdorojimo viršūnei buvo pranešama apie nuolatinę edemą (patinimą), eritemą (paraudimą), audinių nekrozę; kai kuriais atvejais prireikė chirurginės intervencijos. **Reklamos teksto parengimo data** 2024-11-11.

NUO 5⁹⁹ €



DITEL, 23,2 mg/g, gellis, 50 ml 5⁹⁹ €
DITEL, 23,2 mg/g, gellis, 100 ml 8⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veiklijoji medžiaga, stiprumas: diklofenako dietilamino, 23,2 mg/g. **Terapinės indikacijos:** skirtas suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: vietinis skausmo malšinimas, esant ūminiams patempimams ar sumušimams po bukos traumas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** reikia vartoti 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Reikia nuo vnyšnos iki graikiško riešuto dydžio kiekio, atitinkand 1-4 g gelio. Didžiausia paros dozė – 8 g gelio. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Anksčiau pasireiškusi padidėjusio jautrumo reakcijos, pavartojus acetilsalicilo rūgšties ar nesteroidinių vaistinių preparatų nuo uždegimo (NVPNU). Vartojimas ant atvirų žaizdų, gleivinių, jei yra odo uždegimas arba infekcija bei egzema. Vartojimas paskutini 3 mėnesių trimestru. Vartojimas vaikams ir paaugliams iki 14 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai vartoti pacientams, kurių inkstų, širdies ar kepenų funkcija sutrikusi, taip pat pacientams, kuriems yra aktyvi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos peptinė opa. Vartoti tik ant nepažeistos ir sveikos odos. Vengti, kad nepatektų į akis, ir kontakto su gleivinėmis. Nenaudoti ūry nepralaidžiu tvarsiu. Jei yra tiesioginių saulės spindulių arba dirbtinės saulės poveikis, įkyla odo reakcijų pavojus. Gydymo metu ir dvi savaites po gydymo reikia vengti saulės spindulių ar dirbtinės saulės. **Reklamos teksto parengimo data** 2024-04.

5⁹⁹ €



TONZIRIN, 8,75 mg, 24 kietosios pastilės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
TONZIRIN 8,75 mg kietosios pastilės yra flurbiprofeno. Flurbiprofenas priklauso vaistui, kurie vadiniams nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NNU), grupei. Šie vaistai pasizymi skausmą ir karščiaujimą mažinančiu bei priešūdegiminiu poveikiu. TONZIRIN kietosios pastilės yra skausmą palengvinanti, tokiems kaip gerklės skausmas, skausmingumas ir patinimas, sunkumas nuryti, suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams. Jei po 3 dienų ligos požymiai išlieka ar pasunkėja, kreipkitės į gydytoją. Prieš pradėdami vartoti TONZIRIN, turite atlikti perskaityti informaciją lapelį. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti TONZIRIN. TONZIRIN vartoti draudžiama: jeigu yra alergija jeigu kada nors buvo pasireiškusi astma, netekėte švokštimas ar dusulys, sloga, veido patinimas ar neįtinintis bėrimas (dilgeline) pavartojus aspiriną ar kitą NNU; - paskutiniuosius 3 nėštumo mėnesius; - jeigu jums yra ar kada nors buvo pasireiškę sunkių širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų. Vairavimas ir mechanizmo valdymas Tyrimų poveikio gebėjimai vairuoti ir valdyti mechanizmus nebuvo atlikti. Tačiau svairgylis ir regos sutrikimai yra galimi šalutiniai poveikiai pavartojus nesteroidinių vaistų nuo uždegimo. Jeigu tokių pasireiškė, nevaurokite ir nevaldykite mechanizmų. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: - Viena kietąja pastilė įdėkite į burną ir leiki atlypti. - Čuolimo metu nuolat judinkite kietąją pastilę burnos ertmėje. - Pastilių gydymas poveikis turėtų pasireikšti po 30 minučių. - Jeigu reikia, vartokite po vieną pastilę kas 3-6 valandas. - Vartoti daugiau kaip 5 kietąsias pastiles per 24 valandas negalima. Jaunesniems kaip 12 metų vaikams vartoti negalima. **Nutraukite šio vaisto vartojimą ir nedelsiant susisiekite su gydytoju, jeigu jums pasireiškia:** alerginės reakcijos, vėdo, liežuvis ar gerklės patinimas, širdies ritmo padidėjimas ir kraujospūdis sumažėjimas, sunkios odo reakcijos. **Teakas paskutinį kartą peržiūrėtas** 2024-01-12.

SKAUSMUI MALŠINTI

3⁹⁹ €



DICUNO, 25 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 25 mg diklofenako kalio druskos. **Indikacijos:** „Dicuno“ vartojamas ūminio lengvo ir vidutinio stiprumo skausmo, įskaitant ūminius migreninius galvos skausmus, simptomams gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 18 metų asmenims reikia gerti po 1-2 tabletes kas 4-6 valandas. Vartoti ne daugiau kaip 6 tabletes (50 mg) per parą. Tabletę reikia nuryti užgeriant stikline vandens. **Kontraindikacijos:** „Dicuno, 25 mg“ nevartoti, jeigu yra alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu jums kada nors buvo ar yra skrandžio arba žarnyno opa; jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto arba jo prakiurimas dėl skausmą mažinančių vaistų vartojimo (NNU); jeigu yra labai sunkių kepenų funkcija, jeigu sergate portalinė (medžiagų apykaitos liga); jeigu sergate sunkia inkstų liga; jeigu jums nustatyta širdies liga ir (arba) galvos smegenų kraujagyslių liga, pavyzdžiui, jeigu Jūs patyrėte širdies smūgį, insultą, „mikroinsultus“ (gnoeciniai smegenų priepuoliai) arba jums buvo užsikimšęs širdies ar galvos smegenų kraujagyslis; arba jums buvo atlikta operacija siekiant išvairyti arba šuntuoti užsikimšusias kraujagysles; jeigu jums yra arba anksčiau buvo sutrikusi kraujotaka (periferinių arterijų liga); jei pacientas yra jaunesnis kaip 18 metų vaikas ar paauglys; per paskutinius 3 nėštumo mėnesius; jeigu vaistai nuo skausmo, kurių sudėtyje yra acetilsalicilo rūgšties, arba kiti NNU grupės (nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo) vaistai nuo skausmo / uždegimo anksčiau buvo sukėlę alerginę reakciją, tokią kaip astmos priepuolis, čiaudulys ar bėrimas. Nešiosius draudžiama vartoti „Dicuno“ per paskutinius tris nėštumo mėnesius. Kitu nėštumo laikotarpiu „Dicuno“ galima vartoti tik tuo atveju, jei pasikyrę gydytojas. **Įspėjimai ir atsargumo priemonės:** prieš pradėdami gydymą pasitarkite su gydytoju, jei sergate ar sirgote bet kuria iš toliau išvardintų ligų: uždegiminė žarnų liga (opinis kolitas, Krono (Crohn) liga); astma; širdies liga; kepenų ar inkstų; lėtinė obstrukcinė plaučių liga arba lėtinis kvėpavimo takų uždegimas; nosies gleivinės uždegimas; sisteminė raudoingy; dilgeline arba angioneurozinė edema; ligos, sukeliančios padidėjusį polinių kraujotakų; kepenų portalinė. Teksto parengimo data: 2023-05-11. Atidžiai perskaitykite informaciją lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama jums svarbi informacija.

-40 % PREKIŲ ŽENKLAMS



-40%



VITABIOTICS WELL linija

MAISTO PAPILDAI

WELLWOMAN – mąruvų, agurkių, vitaminių ir mineralų kompleksas moterims. WELLMAN – stibirinių žensnių, amino rūgščių, vitaminių ir mineralų kompleksas vyrams. WELLTEEN – subalansuota paaugiams, o WELLKID – patieams mažiausiems.

GERA SAVIJAUTA VISAI ŠEIMAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

Plaukams

-40%



HAIR VOLUME

MAISTO PAPILDAI

Nelenkina plaukų būklę? Je atrodai ploni ir nušūre? Maisto papildas plaukams „Hair Volume“ gali būti tai, ko reikia, norint turėti storus, žvilgančius ir puikiai atrodančius plaukus! „Hair Volume“ tabletės suteikia mitybinių medžiagų galvos odai ir plaukų folikulams, kur ir formuojasi plaukai. Sudėtyje yra biotino, cinko, taip pat „Annurca“ obuolių ekstrakto, kuriame randama biologiskai aktyvios medžiagos prociandino B-2. Cinkas ir biotinas padeda palaikyti normalią plaukų būklę. Tik 1 tabletė per dieną padės puoselėti jūsų plaukus.

PUIKIAI ATRODANTYS, STORI IR ŽVILGANTYS PLOUKAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-40%



PREGNCARE

MAISTO PAPILDAI

„Pregncare“ – maisto papildų linija, sukurta mitybai papildyti planuojant nėštumą, nėštumo bei žindymo laikotarpiams. „Pregncare Conception“ sukurta planuojančioms nėštumą, „Pregncare“ – vitaminių ir mineralų kompleksas, rekomenduojamas nuo pirmojo nėštumo mėnesio. „Pregncare Plus“ papildyta omega-3 riebiųjų rūgštimis (DHR ir EPR), „Pregncare Breast Feeding“ pritaikyta žindymo laikotarpiui, sudėtis papildyta kalciumu ir omega-3. „Pregncare New Mum“ sukurta mamų rūgštims ir energijai palaikyti.

TVIRTAI KŪDIIKI IR MAMYTĖS DRAUGYSTĖ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-40%



RETINA, 28 pakeliai 29⁹⁹ 17⁹⁹ €

REBRAIN, 60 kapsulių 59⁹⁹ 35⁹⁹ €

AQUAMAG+B6 FORTE, 28 pakeliai 11⁹⁹ 6⁹⁹ €

AQUAMAG+B6 LIQUID, 10 pakelių 8⁹⁹ 4⁹¹ €

BOOBOO GUMMIES, 90 guminių 3⁹⁹ 2⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAI

Maisto papildai, skirti tiems, kuriems svarbu, ką jie vartoja. Išsirninkite sau tinkamą: „Retina“ – luteino, cinko, vitaminių A, B2 ir „Pycnogenol“ kompleksas, padedantis išsaugoti regėjimą. 1 pakelyje – net 50 mg luteino. Vitaminai A ir B2 padeda išsaugoti normalią regėjimą. Cinkas padeda palaikyti normalią vitamino A apykaitą. „REBRAIN“ – maisto papildas, kurio sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų poveikis smegenų veiklai, atmintiai ir gerai nuotaikai patvirtintas klinikiniais tyrimais. Fosfolipidai padeda išlaikyti kognityvinę funkciją ir ryškia atmintį. Vidutines grandines trigliceridai (MCT aliejaus) turi sąsają su žmogaus bendra psichologine funkcija, atmintimi, sprendimų priėmimu, mintimi dėstyimu. „AquaMag+B6 Forte“ ir „AquaMag+B6 liquid“ – natūralios kilmės magnis, išgautas iš jūros vandens. Magnis ir vitaminas B6 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. „BooBoo gummies“ – skanus ir veiksmingas būdas papildyti mūsų organizmą svarbiais mineralais ir vitaminais, tinka vaikams nuo 3 metų. Guminukai su natūralių vaisių sultimis!

Raumenims ir sąnariams

-40%



AXANOVA

Priemonių „Axanova“ pagrindas – eteriniai aliejai, kurie veikia raminau, gali padėti malšinti maudimą ar skausmą. Atsivėlgiant į priemonės sudėtį, turi šildomąjį arba šaldomąjį poveikį, gali būti naudojami esant sumušimams, patempimams, maudžiant sąnarus ar raumenis. Priemonių „Axanova“ veiksmingumas įrodytas moksliniais tyrimais. Pagaminta Šveicarijoje.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-40%



HAPPY drėgnos servetėlės vaikams

HIGIENOS PRIEMONĖS

„HAPPY Aqua Care“ drėgnos servetėlės vaikams, kurių 99% sudėtis sudaro vanduo. „Happy Silik & Cotton“ papildytos šilko ir medvilnės ekstraktais. „HAPPY Sensitive“ – su alajų ekstraktais. Išsirninkite labiausiai tinkančias!

„HAPPY“ – SU MEILE JŪSŲ MAŽYLIUI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-40%**AMBIO**GUDOBELĖ SU MAGNIU, 30 kapsulių **8⁹⁸ 5⁰⁹ €**OMEGA-3 ŠIRDŽIAI, 60 kapsulių **16²⁸ 9⁷⁷ €**ŠIRDŽIAI, 30 tablečių **10⁹⁸ 6⁵⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

-35%**VITADAY**RIBOKSINAS, 50 tablečių **7⁹⁸ 5¹⁹ €**VITAMINAI A IR E, 30 kapsulių **4⁷⁸ 3¹¹ €**

MAISTO PAPILDAI

-30%**OMRON****MEDICINOS PRIETAISAI**

Japonų prekių ženklui „Omron“ medicinos prietaisai tiksliai išmatuos kraujospūdį, kūno temperatūrą, inhalatoriai palengvins kvėpavimą, „OMRON“ – PATIKIMAS SVEIKATOS PARTNERIS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-25%**BLEND-A-DENT** klijai dantų protezams

Fiksujamasis kremas pritvirtina protezus visai dienai, suteikdamas saugumo jausmą. Jis apsaugo gleivinę nuo mechaninių sužalojimų, kuriuos gali sukelti protežai, ir neleidžia maistui patekti po dantų protezais. Kasdien naudodami fiksuojamąjį kremą „Blend-a-dent“, galėsite nevaržomai juoktis, kalbėti ir valgyti.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

ŠANARIAMS**9⁹⁹ €****GLUCOSAMIN-RATIOPHARM**

1,5 g milteliai geriamajam tirpalui, 20 paketėlių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 paketėlyje yra 1,5 g gliukozamino sulfato, tai atitinka 1,884 g gliukozamino sulfato natrio chlorido arba 1,178 g gliukozamino. **Terapinės indikacijos:** lengvo ar vidutinio sunkumo kelio osteoartrito sukeltų simptomų lengvinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** paketėlio turinį ištrinti stiklinėje vandens ir gerti 1 kartą per parą. Gliukozaminas netinka vartoti ūminio skausmo simptomams slopinti. Simptomų palengvėjimas (ypač skausmo) gali pasireikšti vartojant kelias savaites, kartais ir dar ilgiau. Jei simptomai nepalengvėja po 2–3 mėnesių vartojimo, reikia iš naujo spręsti, ar gydymą gliukozaminu tęsti toliau. Miltelius galima vartoti tiek valgio metu, tiek nevalgant. Gliukozaminą negalima vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas gliukozaminui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. „Glucosamin-ratiopharm“ negalima skirti ligoniams, alergiškiems kiaušintuosiesiems vėžiagyviams, nes iš jų išgaunama preparato veiklioji medžiaga. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jei pacientui yra sutrikęs gliukozės toleravimas, prieš skiriant gydymą ir vėliau periodiškai rekomenduojama stebėti gliukozės kiekį kraujyje ir, jei reikia, insulino poreikį. Jei pacientai turi širdies ir kraujagyslių ligų rizikos faktorių, rekomenduojama stebėti lipidų kiekį kraujyje, nes vartojantiems gliukozaminą ligoniams buvo nustatyti keli hipercholesterolemijos atvejai. Buvo aprašytas atvejis, kai, pradėjus gliukozamino terapiją, pablogėjo astmos simptomai. Gliukozaminą negalima vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams, nes neiširtas vartojimo saugumas ir veiksmingumas. Atsargumas reikalingas, jei pacientui yra fenilketonurija. Šio vaistinio preparato paketėlyje yra 151 mg natrio, tai atitinka 8 % didžiausios PSO rekomenduojamos paros normos suaugusiems, kuri yra 2 g natrio. Dėl sudėtyje esančio sorbitolio šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems yra gimtas fruktozės netoleravimas. Taip pat sorbitolis gali paveikti kitų kartu vartojamųjų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį prieinamumą. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-01-22. GLR-1T-00006

JUDEJIMUI BE SKAUSMO!**RYŠKESNIAM MATYMOI****-25%** **14^{98€}****CALIMEL® CLEAR,**

akų lašai be konservantų, 10 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Calimel“ lašų sudėtyje yra natrio hialuronato ir kalio jodido. Lokaliai naudojamas kalio jodidas veikia kaip stiprus antioksidantas, sulaukantis laisvuosius radikalus akies paviršiuje. Jis mažina oksidacinę pažeidimą ir slopina akies lęšuko bei stiklakūnio drumstumą. „Calimel“ lašai naudojami akies paviršiu sudekinti ir užkirsti kelią akies lęšuko bei stiklakūnio drumstumui. Produkto tinkamumo naudoti laikas yra 3 mėnesiai nuo pirmo pakutes atidarymo dienos. Produkto negalima naudoti ilgiau kaip 1 mėnesį neperturkiamai ir ne ilgiau kaip 3 mėnesius, lašinant kartkartėmis (su kelių dienų pertraukomis).



LAIMĖS VALANDOS

Darbo dienomis ir šeštadieniais
8-9 val. ir 14-15 val.*

Sekmadieniais
14-15 val.*



-30%

Perkant 3**
ir daugiau
prekių

-25%

Perkant
2* prekes

-20%

Perkant
1 prekę

**nereceptiniams vaistams -25%
receptiniams vaistams -20%

* vaistams -20%

Nuo 2023 m. spalio 23 d. NORFOS vaistinėje akcijos LAIMĖS VALANDOS metu perkant 1 prekę taikoma 20 % nuolaida, perkant 2 prekes – 25 % nuolaida, vaistams – 20 % nuolaida, o įsigyjant 3 ir daugiau prekių – 30 % nuolaida, nereceptiniams vaistams – 25 %, receptiniams – 20 % nuolaida.

Taikomos momentinės 20 % dydžio nuolaidos receptiniams vaistams, 20 ar 25 % nuolaidos nereceptiniams vaistams ir vaistiniams preparatams, o kitoms prekėms – 20, 25 arba 30 % nuolaidos, atsižvelgiant į atitinkamo pirkimo metu įsigyjamų prekių bendrą kiekį. Nuolaida taikoma perkant pilnas prekių pakuotes, kurių kiekvienos vertė arba priemoka ne mažesnė nei 1,50 euro. Prekės, perkamos su kompensuojamuoju receptu, įskaičiuojamos į įsigyjamų (perkamų) prekių krepšelį (kiekį), tačiau joms nuolaida netaikoma.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaidos netaikomos perkant su kompensuojamuoju receptu, mokant už skiepus, taip pat pradinio maitinimo pieno mišiniams, kartiniams (gaminamiems vaistinėje) ir vardiniams vaistams, įsigyjant dovanų kuponus, pakavimo maišelius. Nuolaidos netaikomos perkant www.gintarine.lt, net jei už prekes atsiskaitoma jais atsiimant vaistinėse. Nuolaidos netaikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Visos nuolaidos galioja tik su PC NORFA lojalumo kortele.

Informaciją apie kitu nei nurodyta laiku vykstančias LAIMĖS VALANDAS rasite www.nvaistine.lt. Informacija apie kitas akcijas ir prekes, kurioms netaikomos akcijos LAIMĖS VALANDOS nuolaidos, suteikiama kiekvienoje vaistinėje, el. paštu info@nvaistine.lt arba nemokamu tel. 8 800 10008.

NVAISTINĖ
VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS

2 UŽ 1 KAINĄ



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

VISIONACE, 30 tablečių **23⁹⁹ €**

VISIONACE PLUS, 28 tabletės / 28 kapsulės **32⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

VISIONACE – subalansuotas luteino, mėlynių ekstrakto, antioksidantų kompleksas. Sudėtyje esančios medžiagos padeda išsaugoti normalią regėjimą (cinkas, vitaminai A, B), o antioksidantai – manganas, selenas palaiko ląstelių apsaugą nuo oksidacinių pažeidimų. **VISIONACE** tinka daug laiko praleidžiantiems prie kompiuterių ar TV ekranų dirbantiems akims reikiu darbu, dažnai jaučiantiems akių nuovargį, vyresnio amžiaus žmonėms, devintiems kontaktinių lęšių. **VISIONACE PLUS** sudėtis praturtinta omega-3 rūgštimis ir 12 mg luteino.

VISIONACE – REGĖJIMO JĖGA!



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

FERGLOBIN, FERGLOBIN PLUS

MAISTO PAPILDAI

„Ferglobin“ – geležies, vitaminų ir mineralų kompleksas normaliai kraujodarai (foliatai), raudonųjų kraujo kūnelių gamybai (vitaminai B6, B12, geležis), hemoglobino susidarymui (geležis) palaikyti. **„Ferglobin“** puikiai padidina mitybą nėštumo ir laktacijos laikotarpiu, vaikystėje ir paaugulytėje, sveikstant po ligos ar operacijos. **„Ferglobin Plus“** ne tik padidina geležies atsargas, bet ir padeda mažinti pavargimo jausmą (vitaminai B6 ir B12), palaiko fizinę ir protinę energiją (sibirinis ženšenis).

GELEŽIS, KURIAI NĖRA LYGIŲ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

CARDIOACE

Cardioace, 30 tablečių **23⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

CARDIOACE – sinerginio veikimo kompleksas, kuriame derinamos naudingosios (cesnakų ekstrakto) savybės su vitaminais, mineralais bei antioksidantais. Sudėtyje yra medžiagų normaliai širdies veiklai (vitaminai B1, EPR, DHR), kraujotakai (cesnakai), ląstelių apsaugai nuo oksidacinio pažeidimo (varis, selenas, vitaminai C, E).

„CARDIOACE“ – KIEKVIENAM ŠIRDIES DŪŽIUI!



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

URIAGE

URIAGE, lūpų pieštukas, 4 g **11⁹⁹ €**

URIAGE XEMOSE, lūpų pieštukas, 4 g **10⁹⁹ €**

URIAGE BARIEDERM CICA, lūpų balzamas, 15 ml **12⁹⁸ €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Uriage“ lūpų pieštukai skirti sausai, pažeistai, suskilinėjusiai lūpų odai prižiūreti. Drėkina, maitina, minkština, padeda gaivinti pažeistą lūpų odą ir palaikyti normalią lūpų odos būklę.



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

SENI CARE

SENI CARE drėgnos servetėlės, 80 vnt. **9⁹⁹ €**

HIGIENOS PRIEMONĖ



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

ELLAMÉ

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Veido kaukių lakštas su šilkmedžių šilku, prisiliesdamas glosto ir intensyviai drėkina. Puikiai tinka odai atgaivinti po saulės vonių ar vejo keliamų iššūkių, taip pat odos skaištumui ir jaunatviškumui palaikyti po ilgo buvimo šildomose ar kondicionuojamose patalpose.

„ELLAMÉ“ – NUO GRAŽI IKI SVYTINTI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

MENOPACE

MENOPACE, 30 tablečių **19⁴⁹ €**

MENOPACE PLUS, 56 tabletės **36⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAI MOTERIMS MENOPAUZĖS PERIODU

„Menopace“ – biologiškai aktyvių medžiagų kompleksas su sojų izoflavonais, kurie pagal savo struktūrą ir poveikį panašūs į moters lytinį hormoną estrogeną. Menopauzės laikotarpiu subalansuotas derinys pasižymi kompleksiniu poveikiu: hormonų balansui (vitaminas B1), psichologinei būsenai (foliatai, biotinas, magnis), kaulų funkcijai (cinkas, magnis), nuovargio mažinimui (geležis, pantoteno rūgštis).

„Menopace Plus“ – dviguba jėga, vitaminų ir mineralų kompleksas, papildytas veiksmingais augaliniais ekstraktais – šalavijais, linų lignanais, žaliąja arbata ir dar didesniu sojų izoflavonų kiekiu.

„MENOPACE“ – NĖLEISK MENOPAUZEI TAVĘS SUSTABDYTI!



1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė – NEMOKAMA!

TEPE dantų pastos ir dantų šepetėliai

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„TePe“ siūlo didelį dantų šepetėlių asortimentą vaikams ir suaugusiems kasdienei dantų priežiūrai, taip pat specialių poreikių turintiems – nešiojantiems kabes, turintiems implantus.

„TePe“ dantų pastos yra švelnios, su fluoru, neputojančios arba mažai putojančios, skirtos kūdikiams nuo pirmo dantuko, vaikų pieniiniams dantims, suaugusiems kasdienai ar turintiems sausą burnos gleivinę.

*Akcija taikoma kainų skirtuku pažymėtoms prekėms

2 UŽ 1 KAINĄ



Magnio šaltinis



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

SUPMAGNIT, 30 pailginto atpalaidavimo trijų sluoksnių tablečių **10⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

„Supmagnit“ – tai inovatyvios technologijos TRIJŲ SLUOKSNIŲ MAGNIO TABLETĖ, nuleimanti geresnį magnio pasisavinimą. Trifazis magnio atpalaidavimas: skirtingu laiku, skirtingose virškinimo trakto vietose. 1 tablete yra 364 mg elementinio magnio. Patogu vartoti – tik 1 tablete per parą. Magnis yra gyvybiškai svarbus žmogaus organizmui. Jis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir normalią raumenų funkciją bei energijos apykaitą.



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

AMBIO OMEGA 3-6-9, 60 kapsulių **15⁹⁸ €**

MAISTO PAPILDAS

- Žuvų taukai, juodųjų serbentų ir moliūgų sėklų aliejai.
- Omega-3 – iš žuvų taukų.
- Omega-6 – iš juodųjų serbentų aliejaus.
- Omega-9 – iš moliūgų sėklų aliejaus.

Vitaminai akims



1+1


Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

SUPEROPTIC 60 minkštųjų kapsulių **23⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

Sudėtyje gausu omega-3 riebalų rūgščių, taip pat vitaminų (A, B grupės, C, E) ir mikroelementų (cinko, mangano, vario, seleno). Maisto papildas turi luteino ir zeaksantino, kurių natūraliai yra akių geltononoje dėmėje. Dėl sudedamųjų dalių „Superoptic“ padeda išsaugoti normalią regėjimą ir apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. 1 kapsulė per parą nurijti užsigeriant nedideliu kiekiu skysčio. Rekomenduojama produktą vartoti valgio metu.

VISAPUSĖ APSAUGA TAVO AKIMS.



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

AMBIO VITAMINAS D3 3200IU, 30 kramtomųjų kapsulių **10⁴⁸ €**

MAISTO PAPILDAS



1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė – NEMOKAMAI!

VELYM

BURINOS HIGIENOS PRIEMONĖS

VELYM 100 ml balinamasis dantų kremas. Dabar virš 95% ingredientų yra natūralios kilmės medžiagos. Nauja, tvirti, perdirbto plastiko dėmelė.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

VITADAY MULTIVITAMINŲ KOMPLEKSAS, 60 tablečių **12⁹⁸ €**

MAISTO PAPILDAS

Energijai, protinei veiklai



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

VIGOR UP!, 30 tablečių **14⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

„Vigor Up!“ – vitaminų bomba energijai su gvaraninėmis pailinjomis (gvarana), paragvajiniais bugieniais (yerba mate) ir kakava. Paragvajiniai bugieniai ir vitaminai B1, B2, B6 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. Magnis ir vitaminai B3, B5, B12 padeda mažinti pavargimo jausmą bei nuovargį. Gvaraninės pailinjos ir vitaminas B5 padeda palaikyti normalią protinę veiklą. Vartojamas: suaugusiems – 1 tablete per dieną, užsigeriant vandeniu.

„VIGOR UP!“ – ENERGIJA JAU PO 1 TABLETĖS.



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

AMBIO GROŽIUI, 30 tablečių **15⁹⁸ €**

MAISTO PAPILDAS

1+1

2 UŽ 1 KAINĄ

1+1

GROŽIUI

BIOCELL BEAUTY SHOTS – geriamas hidrolizuotas kolagenas su hialurono rūgštimi, itin stipriais antioksidantais, net 11 vitaminų ir mineralų.



BIOCELL HAIR SHOTS – geriamas hidrolizuotas keratinas, biotinas, antioksidantai, vitaminai, mineralai ypatingos priežiūros reikalaujantiems plaukams [1].

BIOCELL HAIR – kompleksas nepakeičiamų aminorūgščių, vitaminų ir mikroelementų plaukams [1].

BIOCELL PLATINUM – mažos molekulinės masės hialurono rūgšties, ceramidų ir biotino kompleksas odai [1].

KASDIENAI. KIEKVIENAM

OILESEN D₃ – perkamiausias vitaminas D Lietuvoje!*



OILESEN D₃ su juodųjų ikry aliejumi – itin vertingo vitamino D ir prabangaus juodųjų ikry aliejaus derinys Jūsų imunitetui.

OILESEN D₃ 1000 – vitaminas D, ištirpintas ypač tyrame alyvuogių aliejuje geresniam vitamino D pasisavinimui. Tinka vartoti nuo 3 metų.

OILESEN D₃+K₂ su kanapių aliejumi – formulė, apjungianti tris veiksmingus komponentus svarbius ne tik imunitetui.

OILESEN D₃ – tai, ko reikia gerai savijautai.

*Remiantis SoftDent 2024 metų duomenimis.

ŠIRDŽIAI

CARDOVAL Ritmo – pasirūpinkite savo ir artimųjų širdimis! Trejopo poveikio maisto papildas skirtas ritmingam širdies darbui, kraujagyslėms [3], nervų sistemai [4].

Tai viskas, ko reikia jūsų širdžiai – gudobelė, česnakas, magnis, vitaminai B₁ ir B₆.



KRAUJOTAKAI IR CHOLESTEROLIO KONTROLEI

NATASPIN Control Pro – tai pažangi kompleksinė formulė cholesterolio kontrolei, kraujotakai ir kraujagyslėms su natokinazės fermentu, monakolinu K, polifenoliais ir polikosanoliu [2].

NATASPIN H – vieno stipriausių pasaulyje antioksidantų -hidroksitirozolio iš alyvuogių ir natokinazės fermento iš tradicinio japonų pusryčių patiekalo natto derinys, skirtas mitybai reguliuoti esant kraujotakos sutrikimams ir trombozės susidarymo rizikai.



90 DIENŲ KURSAS

VYRŲ SVEIKATAI

FOMAN® UP SHOTS – Natūralų seksualinį aktyvumą ir energiją padeda palaikyti Peruvinė pipirinė (maca). Lytinį potraukį ir pajėgumą padeda palaikyti Gulsčioji ragužė.

FOMAN UP – neribotoms galimybėms!

FOMAN (30 kaps.) - vyrų prostatai. Gulsčiųjų serenojų vaisių ekstraktas padeda palaikyti šlapimo ir reprodukcinę funkcijas; didžiųjų dilgėlių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią prostatos funkciją.

FOMAN – techniškai tvarkingam vyrui.



REGĖJIMUI



NAUJIENA

Išbandykite naujieną akių drėgmei – **OCUVAL HYDRO MAX!** Šis pažangus papildas sukurtas taip, kad pridėkintų akis iš vidaus [5], mažintų nuovargio ir jautrumo pojūtį [6], bei suteiktų jūsų akims ilgalaikį komfortą.

Rinkitės **OCUVAL STRONG** jei norite palaikyti normalų regėjimą [7], apsaugoti akis nuo aplinkos veiksnių ar sušvelninti senėjimo poveikį akims.

OCUVAL – matyk, kai labiausiai reikia!

MAISTO PAPILDAI. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Biocell [1] Biotinas padeda palaikyti normalią odos ir plaukų būklę. Nataspin [2] Dažinės ciberžolės padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje, širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą, normalų kepenų lipidų kiekį. Cardoval [3] Gudobelė ir česnakas padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių funkciją. [4] Vitaminai B₁ ir B₆ padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą bei energijos apykaitą. Ocual [5] Vitaminas A, riboflavinas (vitaminas B₂) padeda palaikyti normalią gleivinių būklę. [6] Riboflavinas (vitaminas B₂), vitaminas C padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. [7] Vitaminas A, riboflavinas (vitaminas B₂) padeda išsaugoti normalų regėjimą.

1+1

2 UŽ 1 KAINĄ

1+1

SKLANDŽIAM JUDĖJIMUI

KALCIKINON – tai, ko reikia kaulams ir dantims:

- Optimalus kalcio kiekis;
- Didelis vitamino D₃ kiekis;
- Ypač svarbus kaulams vitaminas K₂.



CIGNON kaps. - vienintelis maisto papildas Lietuvoje specialiai sukurtas raiščiams, sausgyslėms, fascijoms.

CIGNON SHOTS – geriamos dienos dozės papildo mitybą raiščiams, sausgyslėms, fascijoms reikiamomis medžiagomis, siekiant užtikrinti harmoningą judėjimą, puikią raiščių, sausgyslių, fascijų sveikatą bei sklandų jų darbą.

Cinkas padeda palaikyti normalią baltymų sintezę, rūgštinę-bazinę bei angliavandenių, maistinių makromedžiagų apykaitas, atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese. Varis padeda palaikyti normalią jungiamojo audinio būklę, energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą. Ciberžolė, varis ir cinkas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

Kalcis reikalingas normaliai kaulų ir dantų būklei palaikyti. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę. Vitaminas D padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą.

NERVŲ SISTEMAI IR MIEGUI

RAMEVAL® – ramybės augalų puokštė jaučiantiems lengvą nervinę įtampą. Padeda atsipalaiduoti ir palaikyti normalią nervų sistemos būklę [8], miego kokybę [9].

Tinka vaikams nuo 5 metų!



BrainoZAN™ SHOTS tonikas atminčiai ir protinei veiklai. Rausvosios rodiolės padeda palaikyti normalią protinę veiklą. Mėlynžiedės taškuonės padeda palaikyti normalią atmintį ir yra tonikas smegenims. Augalinės medžiagos padeda palaikyti aukštesias smegenų funkcijas.

HarmoniZAN™ SHOTS psichinės sveikatos balansui. Mėlynžiedės taškuonės padeda palaikyti normalią psichinę sveikatą, pažinimo funkciją, nervų sistemos veiklą.

IMUNITETUI IR GERKLEI



Imunital SHOTS – itin stipri biologiška aktyvių ingredientų programa Jūsų neprikaištingai veikiančiam imunitetui [10].

Imunital Plus – padės palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą [11].

Gana vaikiškų žaidimų! Nevaikiškas palaikymas jūsų imuninei sistemai.



Miramile 3 in 1 gerklei, kvėpavimo takams ir imunitetui. Sudėtyje – augaliniai ekstraktai, eteriniai aliejai, vitaminas C. Rekomenduojama suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų.

Imbierai, šėivamedžio uogų ekstraktas, vitaminas C padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų ir imuniteto veiklą.



PROPODEZAS – tai propolis (bičių pikis) su vitaminu C ir augaliniais ekstraktais – ne tik naudingas gerklei ir imunitetui [12], bet ir gaiviai skanus. Pasirinkite savo skonį – su avietėmis, imbieru, erškėtuogėmis, vaistažolėmis arba stipresnę versiją – **PROPODEZAS FORTE** su šėivamedžiu ir bičių pieneliu.

MAISTO PAPILDAI. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Rameval [8] Vaistiniai valetinonai padeda palaikyti normalią nervų sistemos būklę; [9] Vaistinės melisos, paprastieji apyniai padeda palengvinti užmigimą ir palaikyti miego kokybę. Imunital shots [10] Tikrinis blizgutis (reishi grybas) padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Imunital Plus [11] Vitaminas C padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų ir imuniteto veiklą; Propodezas [12] Imbierai, šėivamedžio uogų ekstraktas, vitaminas C padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų ir imuniteto veiklą.

Pasiūlymai galioja 2025 03 01 – 2025 03 31. Perkant vieną pakutę, antra tokia pati – nemokamai. Nuolaidos taikomos prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą, vaistinėse pažymėtoms geltona kainų etikete.

NUO 4⁹⁹ €



COLDREX HOTREM LEMON, 750 mg/10 mg/60 mg milteliai geriamajam tirpalui, 5 vnt. **4⁹⁹ €**
COLDREX HOTREM LEMON, 750 mg/10 mg/60 mg milteliai geriamajam tirpalui, 10 vnt. **7⁹⁹ €**
COLDREX HOTREM HONEY & LEMON, 750 mg/10 mg/60 mg milteliai geriamajam tirpalui, 10 vnt. **7⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Terapinės indikacijos: trumpalaikis peršalimo ir gripo simptomi (karščiavimas, slogos ir skausmo) lengvinimas. **Vartojimo būdas:** sūberti 1 paketėlio turinį į stiklinę, pripilti karšto vandens (maždaug 125 ml), gerai išmaišyti, kol milteliai ištirps. Pagal poreikį pripilti šalto vandens. **Dozavimas:** suaugusiems (įskaitant senjoro amžiaus) ir 16 m. bei vyresniems paauglius, kurių svoris didesnis nei 54 kg, po 1 paketėlį kas 4-6 val., jei reikia. Didžiausia paros dozė: 5 paketėlių per 24 val. **Specialūs įspėjimai:** nevartokite kartu jokių kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio, ar vaistų nuo kosulio ir peršalimo, gripo ir nosies gleivinės paburkimo ar užgulimo nosies. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėjami vartoti, jei padidėjusi prostata arba jums sunku šlapintis; sergate kraujagyslių liga, vadinama Reino (Raynaud) fenomenu; sergate inkstų liga; yra lėtinis mišrios kilmės nepakankamas, reguliariai vartojate alkoholi; sergate Žilberto (Gilbert) sindromu; vartojate kitų vaistų, kurie veikia kepenų funkciją; Jums trūksta fermento gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės; sergate hemolizine anemija; yra dehidratacija; esate senjoro amžiaus, suaugęs ar paauglys, kurio kūno svoris mažesnis nei 54 kg; yra šlapimo susilaikymas ar šlapimo takų akmenų; sergate astma arba jums yra padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, pasireiškiantis bronchų spazmu; sergate sunkia infekcine liga, nes gali padidėti metabolinės acidozės rizika. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliosios arba bei kurtai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu padidėjęs skydliaukės aktyvumas; jeigu sergate cukriniu diabetu; jeigu sergate širdies liga; jeigu sergate uždarą kampo glaukoma; jeigu sergate feochromocitoma; jeigu sergate kepenų ar sunkia inkstų liga; jeigu esate nėščia ar žindote kūdikį; jeigu vartojate vaistų, mažinančių nosies paburkimo ir užgulimo vaistus; jeigu vartojate vaistus depresijai gydyti, pvz.: tricyklus antidepressantus, beta blokuojančius arba monoaminooksidazės inhibitorius (MAOI) bei dvi savaites po MAOI vartojimo; jaunesniems kaip 16 m. vaikams ir paaugliams. **Reklamos teksto parengimo data** 2024-11-11.

NUOSIES, AUSŲ, GERKLĖS PRIEŽIŪRAI

-20%



OTOSAN MEDICINOS PRIEMONĖS
 Josų nosies, gerklės ir ausų saviužata leiskite pasirinkti medicinos priemonėms „Otosan“, sukurtoms augalinį medžiagų pagrindu. „OTOSAN“ – PATIKIMAS PASIRINKIMAS!

*Akcija taikoma geltona etikele pažymėtomis prekėms

6⁹⁹ €



HERBION 16 kietųjų pastilių 6⁹⁹ €
HERBION 7 mg/ml sirupas, 150 ml 7⁴⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Kiekvienoje kietjoje pastilėje yra 35 mg Hederae helix L., folium (gebeučių lapų) sausjo ekstrakto (5–7.5:1). Augalinis vaistas, kurio vartojama atsikosėjimui lengvinti pasireiškus drėgnam kosuliui suaugusiems, paaugliams ir 6 metų bei vyresniems vaikams. Įprasta dozė 6-11 metų vaikams yra 1 kietoji pastilė du kartus per parą. Suaugusiems, senyviems žmonėms, 12 metų bei vyresniems paaugliams yra 1 kietoji pastilė tris kartus per parą. Jei yra kvėpavimo pasunkėjimas, karščiavimas ar atkosma pilnųjų skreplių, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku, jei simptomai po 7 vaisto vartojimo dienų nepalengvėja, būtina kreiptis į gydytoją. Gydymo šio vaistu metu be gydytojo leidimo vartoti kosulį slopinančių vaistų (vaistų nuo kosulio, tokių kaip kodeinas ar dekstrometorfanas) nerekomenduojama. Jeigu yra skrandžio sutrikimų (gastritas ar skrandžio opaligė), vaisto reikia vartoti atsargiai. **Reklamos teksto parengimo data** 2022-09-07.
„Herbion“ 7 mg/ml sirupas. 1 ml sirupo yra 7 mg Hederae helix L., folii (gebeučių lapų) sausjo ekstrakto (5–7.5:1). „Herbion“ yra augalinis vaistinis preparatas, kurio vartojama atsikosėjimui lengvinti pasireiškus drėgnam kosuliui. **Suaugę žmonės, senyi, 12 metų paaugliai ir vyresni.** Du kartus per parą gerti 5.75 ml sirupo (atitinka 70 105 mg gebeučių lapų sausjo ekstrakto paros doze). **6–12 metų vaikai.** Du kartus per parą gerti 5 ml sirupo (atitinka 70 mg gebeučių lapų sausjo ekstrakto paros doze). **2–5 metų vaikai.** Du kartus per parą gerti 2.5 ml sirupo (atitinka 35 mg gebeučių lapų sausjo ekstrakto paros doze). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, kitoms Araliaceae (gebeučių) šeimos augalams arba bei kurtai pagalbinei medžiagai. Pacientas yra jaunesnis kaip 2 metų vaikas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** 2–4 metų vaikų nuolatini ar pasikartojanti kosulį galima pradėti gydyti tik nustadus medicininę diagnozę. Jei pasireiškia disonėja, karščiavimas arba atkosma pilnųjų skreplių, pacientas privalo pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Gydymo „Herbion“ metu be gydytojo leidimo vartoti kosulį slopinančių preparatų, tokių kaip kodeinas ar dekstrometorfanas, nerekomenduojama. **Reklamos teksto parengimo data** 2022-03-21.

-20%

MOSS linija
Maisto papildai, medicinos priemonės
 „ColdMoss“ augalinį ekstraktų mišinys, praturtintas vitaminu C, padeda palaikyti imunitinės sistemos veiklą. Sirupas „BronchoMoss“ skirta drėgnam ir sausam, dirginančiam kosuliui palengvinti bei susidurioms trūkstoms gleivėms skystinti. Biologiskai aktyvių veikliųjų medžiagų kompleksas skuluria apsauginį gleivėms sluoksnį, sumažina dirginimą, stabdo infekcijos plitimą, mažina kosulio priežiuolis ir lengvina atsikosėjimą. Sirupas „BronchoMoss Baby“ skirtas vaikų nuo 1 m. apatinį kvėpavimo takų funkcijai pagerinti. „BronchoMoss“ tabletėse esantys islandinės kepenos gniuotulai ir baltųjų pušų žievės padeda palaikyti kvėpavimo takų funkciją, vitaminas C - imunitinės sistemos funkciją. „SinuMoss“ minkštosios kapsulės ir „SinuMoss Baby“ geriamieji lašai pagaminti iš natūralių biologiskai aktyvių eterinių aliejų ir augalų ekstraktų, kurie padeda palaikyti viršutinių kvėpavimo takų funkciją. Kapsulės skirtos suaugusiems ir vaikams nuo 6 m., o geriamieji lašai - vaikams nuo 1 m. Minkštosios „ImunoMoss“ daugiakomponentė suvėdinti pasizymi kompleksiniai poveikio - stiprina ne vien tik imunitetą, kartu palaiko kvėpavimo takų ir virškinamojo trakto funkciją. Tinka vaikams nuo 3 m.

*Akcija taikoma geltona etikele pažymėtomis prekėms

NUO SLOGOS

NUO 3⁵⁰ €



OLYNTH®
OLYNTH® HA, 0,5 mg/ml, nosies purškias (tirpalas), 10 ml **6²⁵ €**
OLYNTH® HA, 1 mg/ml, nosies purškias (tirpalas), 10 ml **6²⁵ €**
OLYNTH®, 1 mg/ml, nosies purškias (tirpalas), 10 ml **5⁷⁵ €**
OLYNTH®, 1 mg/ml, nosies lašai (tirpalas), 10 ml **3⁵⁰ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 0,5 mg arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikis simptominis nosies gleivinės paburkimo lengvinimas, sergant rinitu ar sinusitu. „Olynth“ HA, 0,5 mg/ml“ ir „Olynth“, 1 mg/ml“ skiriamas vartoti suaugusiems, 12 m. ir vyresniems vaikams. „Olynth“ HA, 0,5 mg/ml“ skiriamas vartoti 2–12 m. vaikams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** purkšti po 1 įpuskiamą arba lašinti po 1 lašą į kiekvieną nosies landą ne daugiau kaip 3 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bei kurtai pagalbinei medžiagai; padidėjęs akispūdis, ypaz pacientams, sergantiems uždarą kampo glaukoma; sausasis arba vazomotorinis nosies gleivinės uždegimas; pacientai, kuriems atlika transfenoidalinė hipofizektomija; mononamino oksidazės inhibitorių vartojimas šiuo metu arba per pastarąsias 2 savaites, vaisto, galinčio padidinti kraujospūdį, vartojimas; pacientai, sergantys atrofiniu arba vazomotoriniu rinitu. **Specialūs įspėjimai:** jei gydytojo neparakūta kilaip, negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Atsargiai vartoti pacientams, kurie jautriai reaguoja į simpatomimetikus, serga širdies ir kraujagyslių ligomis, hipertenzija, hiperetroze, cukriniu diabetu, esant protėstams hiperterofūrijai ar sergant feochromocitoma. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-02. LI-OLY-2025-106030

PERŠALIMO LIGŲ SIMPTOMAMS LENGVINTI

NUO 7⁹⁹ €



FERVEK
FERVEK vaikams, granulės geriamajam tirpalui paketėlyje, 8 pak. **7⁹⁹ €**
FERVEK suaugusiems, granulės geriamajam tirpalui paketėlyje, 8 pak. **7⁹⁹ €**
FERVEK suaugusiems, be cukraus, granulės geriamajam tirpalui paketėlyje, 8 pak. **8⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 paketėlyje „Fervek“ suaugusiems ir suaugusiems be cukraus yra 500 mg paracetamolio, 25 mg feniraminio maleato, 200 mg askorbo rūgščies. 1 paketėlyje „Fervek“ vaikams yra 280 mg paracetamolio, 10 mg feniraminio maleato, 100 mg askorbo rūgščies. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikį ūminį peršalimo ligų simptomams (karščiavimas, nosies gleivinės paburkimo, skausmo) palengvinti. „Fervek“ vaikams ir paaugliams nuo 6 iki 15 metų; trumpalaikį ūminį peršalimo ligų simptomams (karščiavimas, nosies gleivinės paburkimo, skausmo) palengvinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Fervek“ suaugusiems, granulės geriamajam tirpalui paketėlyje, be cukraus: suaugusiems ir paaugliams nuo 15 metų (svertantiesiems daugiau kaip 50 kg) gerti po 1 paketėlį jei reikia, kartoti maždaug po 4 valandų, neviršijant 3 paketėlių per parą. „Fervek“ vaikams: 6–10 m. vaikams gerti po 1 paketėlį 2 kartus per parą; 10–12 m. vaikams – po 1 paketėlį 3 kartus per parą; 12–15 m. paauglius – po 1 paketėlį 4 kartus per parą, bet ne daugiau kaip kas 4 valandas. Maksimali gydymo trukmė yra 5 dienas vartojant Fervek suaugusiems ir 3 dienas – Fervek vaikams. Jei inkstų ar kepenų funkcija sutrikusi vartoti atsargiai, rekomenduojama sumažinti doze ir paliginti minimalu intervalu tarp dozių. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas vaisto sudedamosioms dalims, sunkus kepenų nepakankamumas, aktyvios kepenų ligos, uždarą kampo glaukoma, šlapimo susilaikymas, skrandžio priedavimo stenozė, šlapimo takų akmenų, draudžiama vartoti vaikams ir paaugliams iki 15 m., „Fervek“ vaikams; draudžiama vartoti vaikams iki 6 metų, Fervek suaugusiems be cukraus – fenileketonurija. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergate Žilberto sindromu, sergate kepenų arba inkstų liga, piktnaudžiaujate alkoholiniais gėrimais, yra anoreksija, kacheksija arba ilgalaikė bloga mityba (glukotiono atsargas kepenyse būna mažos), yra dehidratacija, hipovolemija, sergate epilepsija, sutrikusi gebėjimas apkalba, yra polinkis susidurti akmenis šlapimo takuose, pacientams, svertantiesiems mažiau nei 50 kg, trūksta gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės, yra hemolizine anemija, yra padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, pasireiškiantis bronchų spazmu priepuoliu, jei sergate ar pasireiškia ūminis virusinis hepatitas. Atsiradus odos išbėrimui ar kitoms alergijos požymiams, nutraukite gydymą ir nedelsdami kreiptis į gydytoją. Nevartokite kartu kito vaisto, kurio sudėtyje yra paracetamolio, feniraminio ar kitų antihistamininių vaistų, vitamino C ir patikrinkite ar neviršiate didžiausios leistinos dozės. Sergantiems cukriniu diabetu atsargiai vartoti „Fervek“ suaugusiems, sergantiems fenileketonurija atsargiai vartoti „Fervek“ suaugusiems be cukraus. Gaušiau informacijos žr. vaistinių preparatų charakteristikų santraukose arba pakuotės lapuose. **Reklamos teksto parengimo data** 2023-06-22. PM-LI-2023-6-3271.

IKI -30%



HUMER MEDICINOS PRIEMONĖS
„HUMER“ nosies higienos ekspertas jau daugiau nei 20 metų. „HUMER“ nosies purškialai nosies higienai ir užgulusiai nosiai, tai 100% neskiestas jūros vanduo, skirtas kasdieninei nosies higienai, drėkina išdusėjusią gleivinę, suskystina sekretą, palengvina jo tekėjimą bei nosies išpūtimą. Natūraliai atkams užgulusia nosi esant peršalimui, alerginiam rinitu ar sinusitu. **„HUMER“ labai užsikimšusiai nosiai** – natūralus, iš augalinių ekstraktų, trepojo poveikio nosies purškias labai užsikimšusiai nosiai, sergant sinusitu ar peršalus. **„HUMER STOP VIRUS“ nosies purškias** – prevencinė antivirusinė priemonė, kuri yra veiksminga net ir atsiradus pirmiems peršalimo simptomams. **„HUMER“ monodozės** skirtos kasdienio kūdikio nosies gleivinės priežiūrai bei kompleksiniam slogos gydimui, esant peršalimui ar alerginiam rinitui. **„HUMER“ – POVEIKIS TIESIAI ĮSAMGAMOS. TINKA VISAI SEIMAI.**
 *Akcija taikoma geltona etikele pažymėtomis prekėms.

GERKLĒS UŽDEGIMUI GYDYTI

6⁹⁹ €



FURASOL

100/900 mg, 5 paketėliai

NERECEPTIVIS VAISTINIS PREPARATAS

Vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma: „Furasol 100/900 mg“ gargalas (milteliai tirpalui). Kolybinė ir kiekybinė sudėtis: 1 mililitrų pakelėlyje yra 100 mg furazino kalio druskos ir 900 mg natrio chlorido. Terapinės indikacijos: vietinis infekcijos sukeltos burnos ertmės ir ryklės uždegimo gydymas. Dozavimas ir vartojimo metodas: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 4 m. vaikams. Tirpalą reikia ruošti prieš pat vartojimą. Pakelėlyje esančius miltelius reikia išsipurinti stiklinėje karšto virinto vandens ir šilto tirpalu 2-3 kartus per dieną skalauti juo burną arba gargaluoti. Tirpalą reikia suvartoti iš karto. Jo laikyti negalima. Sergant burnos ertmės ligomis skalauti, o sergant ryklės ligomis – gargaluoti apie 20-30 sekundžių, po to tirpalą išspjauti. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas furazinui, nitrofurano grupės junginiams. Pacientams yra jaunesnis negu 4 m. vaikas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: tirpalą burnai ir ryklės skalauti reikia ruošti prieš pat vartojimą. Nesuvargotus vaisto likučius reikia išplinti. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika: jokios kliniškai reikšmingos sąveikos nepastebėta. Nešvarotus vaisto likučius reikia išplinti. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir žindymo laikotarpiu, nes tokių tyrimų neatlika. Todėl žindymams ar žindymams jo vartoti nerekomenduojama. Nepageidaujamas poveikis: kiekvienoje organų sistemoje pasireiškiantis nepageidaujamas poveikis apibūdinamas taip: labai dažnas: $\geq 1/10$, dažnis: nuo $\geq 1/100$ iki $< 1/10$, nežažnas: nuo $\geq 1/1000$ iki $< 1/100$, retas: nuo $\geq 1/10000$ iki $< 1/1000$, labai retas: $< 1/10000$, dažnis nežinomas: (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis). Odos ir podinio audinio sutrikimai: labai reti. Alerginė reakcija. Registravimo liudijimo turėtojas ir gamintojas: JSC „Olainfarm“, Rupnicu 5, LV-2114 Oļaine, Latvija. Teksto peržiūros data 2013-09-30. Informacija apie vaistą „Furasol“ gali skirtis nuo registracijos dokumentuose pateiktos informacijos dėl pereinamojo laikotarpio, kai „Olainfarm“ keičia pavadinimą į „Olpha“.

-40% 3^{59€}



AMBIO

GERKLEI SU ISLANDINE KERPENA IR IMBIERU, 20 čiulpiamųjų tablečių
GERKLEI SU ISLANDINE KERPENA IR EUKALIPTU, 20 čiulpiamųjų tablečių

MAISTO PAPILDAI

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



ASKORBO RŪGŠTIS, 50 mg, 200 dražečių 2⁸⁵ €
VITAMINAS D3, 100 µg (4000 TV), 60 kapsulių 7⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAI

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, padeda palaikyti normalią kaulų, dantų būklę, normalią raumenų funkciją, padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsiviskinimą. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės, nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

-40%



AMBIO

HOT HERBAL DRINK, milteliai karštam gėrimui ruošti, 10 paketėlių 9⁹⁹ 5⁵⁷ €
HOT HERBAL DRINK SU ISLANDINE KERPENA, milteliai karštam gėrimui ruošti, 10 paketėlių 8⁹⁹ 5³⁹ €

MAISTO PAPILDAI

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



ŠALTALANKIŲ ALIEJUS, 50 ml 9⁸⁹ €
ŠALTALANKIŲ ALIEJUS, 100 ml 12⁵⁹ €

MAISTO PAPILDAI

Šaltalankių aliejus padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir širdies veiklą, normalų virškinimą, normalią odos būklę. Vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą.

-35%



AMBIO

BRONCHO COMPLEX, 20 tablečių 5⁹⁹ 3⁸⁹ €
SINUREN, 30 tablečių 7⁹⁹ 5¹⁹ €

MAISTO PAPILDAI

AŠ – NE % AŠ – GYVENIMAS

Skirk 1,2% GPM ir suteik galimybę gyvenimui tęstis



POLA Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija



-40%

AMBIO
LAKTO-BIFIDOBAKTERIJŲ KOMPLEKSAS FORTE, milteliai, 10 paketėlių **10^{4€} 6²⁹ €**
LAKTO-BIFIDOBAKTERIJOS SU INULINU, 30 kapsulių **9^{4€} 5⁶⁹ €**
MAISTO PAPILDAI

IKI -40%

AMBIO
KOMPLEKSAS VIRŠKINIMUI SU GEROSIOMIS BAKTERIJOS, 20 kapsulių **6^{9€} 4¹⁹ € -40 %**
KEPENIMS, 50 tablečių **9^{9€} 5⁹⁹ € -40 %**
VIRŠKINIMUI, 20 tablečių **5^{2€} 3⁴³ € -35 %**
MAISTO PAPILDAI

ŽARNYNO MIKROFLORA!**-30%**

BIFOVAL®
BIFOVAL FORTE, 15 kietųjų kapsulių **9⁸⁹ 6²² €**
BIFOVAL BABE, 25 kramtomosios tabletės **9^{2€} 6⁴⁷ €**

MAISTO PAPILDAI
Specialiai parinktos sudėties maisto papildai kiekvieno ryto ritualui 15-30 min prieš kiekvienus pusryčius.
„Bifoval Forte“ – 5 milijardai lacto- ir bifidobakterijų. Sudėtyje 3 bakterijų padėrmės. Visai šeimai (vaikams nuo 5 metų).
„Bifoval Babe“ – braškių skonio kramtomos tabletės, kurių sudėtyje yra 4 rūšių Lacto ir Bifido bakterijų kompleksas (3,15 mlrd. l tablete). Vaikams nuo 3 metų.
Vartojant antibiotikus gerti 1 val. prieš arba po antibiotikų vartojimo.

NUO 6⁴⁹ €

SMECTA 3 G, milteliai geriamajai suspensijai, 10 paketėlių **6⁴⁹ €**
SMECTA 3 G, milteliai geriamajai suspensijai, 30 paketėlių **11⁹⁹ €**

Diosmektinai.
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
„smecta“ 3 g milteliai geriamajai suspensijai. Sudėtis. Viename pakelėlyje yra 3 g diosmektinai. Terapinės indikacijos. Vaiku nuo 2 metų ir suaugusiųjų ūminio viduriavimo kartu su geriamaisiais rehidratuojančiais tirpalais bei suaugusiųjų lėtinio viduriavimo gydymui. Simptominiams suaugusiųjų skausmo, susijusio su funkciniais žarnyno sutrikimais, gydymui. Dozavimas. Ūminio viduriavimo gydymas. Vaikams nuo 2 metų: 6 gramai (2 pakelėliai) per parą. Ūminio viduriavimo pražūčio (pirmąsias 3 dienas) ši dozė gali būti du kartus didesnė. Suaugusiems: 9 gramai (3 pakelėliai) per parą. Ūminio viduriavimo pražūčio ši dozė gali būti du kartus didesnė. Ūminio viduriavimo epizodus paprastai trunka ne ilgiau kaip 7 dienas. Kitų ligų gydymas. Suaugusiems: vidutinai 9 g (3 pakelėliai) per parą. Vartojimo metodas. Vartoti per burną. Paketėlio turinį reikia išgerti prieš pat vartojimą. Vaikams: paketėlio turinį reikia išgerti 50 ml vandens arba sumaišyti su pusiau skystu maistu (pvz., daržovių koše, sruba, kompotu). Suaugusiems: paketėlio turinį reikia išgerti pusėje stiklinės vandens. Specialūs įspėjimai. „smecta“ nes skirtas vartoti kūdikiams ir vaikams iki 2 metų amžiaus. Gydant ūminio viduriavimo išpuolius pacientams ir vaikams nuo 2 metų amžiaus, siekiant išvengti dehidratacijos, kartu būtina skirti geriamąsias rehidratuojančias druskas (GRD). Suaugusiems taip pat turi būti taikoma rehidracija, jei ji reikalinga. GRD arba intraveninė rehidracija turi būti skiriama atsivėlavę į viduriavimo intensyvumą, paciento amžių ir klinikinę situaciją. Reikia apsaugyti dėl tolimosios „smecta“ vartojimo: jei po 3 ūminio viduriavimo dienų sutrikimas nepaėnia; jei yra skausmas kartu su karščiavimu ir vėmimu. Reikia atsargiai skirti diosmektinai pacientams, kuriems praėtyje yra buvęs sunkių lėtinų vidurių užkietėjimo atvejai. Reikia vengti ilgalaikio „smecta“ vartojimo. „smecta“ sudėtyje yra gliukozės ir sacharozės. Būna atžvegti cukriniiu diabetu sergantiesiems pacientams. Jeigu gydytojas žymis yra sakes, kad netoleruoja koki nors angliavandenių, kreipitės į jį prieš pradėjami vartoti šį vaistą. Šio vaisto sudėtyje yra mažas etanolio kiekis (mažiau kaip 100 mg paros dozėje). Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas (alergija) diosmektinai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Praneškite apie šaltinį poveiki registracijos vietiniam atstovui Mayoly Bates UAB, el. paštu: vigilance.BAL@mayoly.com. Teksto peržiuros data: 2024-01-01. Reklamios teksto parengimo data: 2024 m. kovo mėn. SME-L1-2024-000

-40%

AMBIO
NERVŲ SISTEMAI, mikstūra, 100 ml **7^{4€} 4⁴⁹ €**
GERAM POILSIUI, 30 kapsulių **9^{2€} 5⁴⁷ €**
VITAMINŲ B KOMPLEKSAS FORTE, 30 tablečių **7^{2€} 4³⁷ €**
GINKMEDŽIO EKSTRAKTAS 150 mg, 30 tablečių **10^{4€} 6²⁹ €**
MAISTO PAPILDAI

6⁹⁹ €**NEURORUBINE FORTE LACTAB**

20 plevėle dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**„Neurorubine Forte Lactab“ plevėle dengtos tabletės.**

Kiekvienoje plevėle dengtoje tabletėje yra 200 mg timiano nitrato (vitamino B1), 50 mg piridoksinio hidrochlorido (vitamino B6), 1 mg cianokobalamino (vitamino B12). Indikacijos. Del B grupės vitaminų stokos atsiradusių nervų sistemos ligų gydymas. Dozavimas ir vartojimo metodas. Per parą reikia išgerti 1-2 tabletes. Vartoti per burną. Vėliausiai po 4 savaitių būtina įvertinti paciento būklę ir persvarstyti, ar nereikia mažinti dozės. Vartojant vitaminų preparatus rekomenduojamos dozėmis, vartojimo trukmės nėra nustatytos. Jeigu simptomai nepaėnia, reikia kreiptis į gydytoją, kad jis parrinktų kitą gydymą. Didelės rizikos pacientų grupių neėmoma. Vaiku populiacija. Saugumas ir veiksmingumas vaikams dar neišstirtas. Duomenų nėra. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei sergant žvyneline. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Piridoksinas gali sukelti paprastą aknė, į ją panašią egzantemą arba šias ligas sunkinti. Gydymo metu, dėl atsiradusio jautrumo vitaminams B1, B6 ir B12, gali pasireikšti odos reakcijos. Retais atvejais, vitamino B6 vartojant ilgai ir didelės dozės (daugiau kaip 200 mg per dieną), gali atsirasti trumpalaikė periferinė jutiminė neuropatija. Vitaminas B12 preparatą gali paslepti funkulinės mielozės ir piktlybės anemijos simptomus ir ju metu atsirandančius laboratorinių tyrimų duomenis. Psoriaze sergantiems žmonėms vitamino B12 vartoti negalima. Reklamios teksto parengimo data: 2023 balandis. NEUR-L1-00006.

PALIKITE SKAUSMĄ UŽ NUGAROS!**-30%**

VALERIJONŲ EKSTRAKTAS 20 mg, 50 tablečių 2⁴⁹ 1⁷⁴ €
VALERIJONAS FORTE 50 tablečių 6^{9€} 4⁸⁹ €

MAISTO PAPILDAI

Vaistinis valerijonas padeda atsipalaiduoti, palaiko normalią miego funkciją.

NERVAMS, RAUMENIMS, ENERGIJAI**-25%****MAGIC MAGNESIUM™****MAISTO PAPILDAI**

Jaučiatės pavargę, trūksta energijos dienos iššūkiams, norite palaikyti nervų sistemos veiklą ar papildyti organizmą magnii? „Magic Magnesium™“ gali būti tai, ko ieškote, nes tabletėse yra gerai pasisavinamo magnio, kuris reikalingas daugybei organizmo funkcijų.

- „Magic Magnesium Glycinat“ – nervų sistemos veiklai palaikyti.
- „Magic Magnesium Malat“ – raumenims ir kaulams.
- „Magic Magnesium Citrat“ – nuovargiui mažinti ir energijai palaikyti.

Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, išlaikyti elektrolitų pusiausyrą, palaikyti normalią raumenų funkciją, nervų sistemos veiklą ir energijos apykaitą.

„MAGIC MAGNESIUM™“ – LABAI GERAI ĮSISAVINAMO MAGNIO ŠALTINIS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

PIC MATUOKLIAI / INHALIATORIAI / TERMOMETRAI

IKI **-35%**



PIC SOLUTION

MEDICINOS PRIETAISAI

„PIC Solution“ jau daugiau nei 50 metų yra vienas žinomiausių Italijos medicinos priemonių prekių ženklų. Kiekvienas PIC sprendimas yra daugiau nei kraujospūdžio matuoklis, inhaliatorius ar termometras. Tai paprastas būdas parodyti rūpestį ir paklausti „Kaip jautiesi?“. Savo laboratorijose kuriamo pažangius prietaisus, skirtus inhaliacijai, širdies darbui ar temperatūrai stebėti. Visi prietaisai turi 5 metų garantiją* ir jų tikslumas patvirtintas klinikiniais tyrimais**.

** Išskyrus termometrus, matuoklį „LiteRapid“, inhaliatorių „AirCube“.

KIEKVIENA ŠIRDIS TURI SAVO RITMĄ!

* Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-40%



AMBIO

ŠIRDŽIAI, skystas maisto papildas, 100 ml ~~4⁹⁹~~ **2⁸¹ €**

MAGNIS SU B6 FORTE, 375 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 30 paketėlių ~~9⁹⁹~~ **5⁹⁹ €**

KALIS, milteliai geriamajam tirpalui, 15 paketėlių ~~6⁹⁹~~ **3⁸⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

ŠIRDŽIAI

-30% **11^{19€}**
~~15⁹⁹~~




GEROVITAL, 500 ml

MAISTO PAPILDAS SU SALKIKLIAIS

Sudėtyje yra gudobelų ir ženšenų ekstraktų. Gudobelų ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą. Vitaminas C, biotinas, niacinas padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. Biotinas, vitaminai C, B2, B6, B12 ir niacinas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Pantoteno rūgštis, geležis, vitaminai C, B2, B6, B12 ir niacinas padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Pantoteno rūgštis padeda palaikyti normalią protinę veiklą, normalią energijos apykaitą. Vitaminas C padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo ir gerina geležies absorbciją. Geležis padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą ir deguonies pernešimą organizme. Vartojimas: po 1 valgomąjį šaukštą 2 kartus per parą prieš valgią arba valgant. Tik suaugusiems.

-30%



CARDIOACE PLUS, 60 kapsulių 40⁹⁹ 28³⁴ €

MAISTO PAPILDAS

CARDIOACE PLUS – sudėtis papildyta net 1300 mg veiksmingųjų augalinių sterolių normaliai cholesterolio koncentracijai* ir patentuotu Cardiol kompleksu. *Teigiamas poveikis jaučiamas suvartojant per parą ne mažiau 0,8 g augalinių sterolių

„CARDIOACE“ – KIEKVIENAM ŠIRDIES DŪŽIUI!

-35% **14^{29€}**
~~21⁹⁹~~



CARDIOM MONAKOLIN K FORTE, 60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Su omega-3. Raudonosiomis mielėmis fermentuoti ryžiai, EPR ir DHR padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Vartojimo instrukcija: gerti po 2 kapsules per dieną, užgeriant stikline vandens. Teigiamas riebalų rūgščių poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg eikozapentaeno rūgšties (EPR) ir dokozaheksaeno rūgšties (DHR).

IKI **-40%**



AMEDIPLUS

Automatinis žastinis kraujospūdžio matuoklis DBP-1358 ~~64⁹⁹~~ **42²² € -35 %**

Automatinis žastinis kraujospūdžio matuoklis DBP-6192 ~~85⁹⁹~~ **51⁵⁹ € -40 %**

Manžetė kraujospūdžio matuokliui, XL (22–42 cm) ~~15⁹⁹~~ **13⁵⁹ € -15 %**

Manžetė kraujospūdžio matuokliui, XXL (32–48 cm) ~~15⁹⁹~~ **9⁹⁹ € -40 %**

Kraujospūdžio matuoklio adapteris ~~10⁹⁹~~ **9³⁴ € -15 %**

Kompresorinis inhaliatorius VP-D1 ~~65⁹⁹~~ **42⁸⁹ € -35 %**

Tinklinis inhaliatorius VP-M1 ~~79⁹⁹~~ **51⁹⁹ € -35 %**

Termometras skaitmeninis bekontaktis ~~39⁹⁹~~ **27⁹⁹ € -30 %**

Termometras skaitmeninis lanksčiu galiuku ~~7⁹⁹~~ **5⁹⁹ € -30 %**

MEDICINOS PRIETAISAI



PIRKDAMI GINTARINĖJE VAISTINĖJE JŪS GAUSITE ČEKĮ, KURIUO GALĖSITĖ ĮSIGYTI DU TOKIUS PAČIUS PRODUKTUS UŽ VIENO KAINĄ:

1+1



MÖLLER'S OMEGA-3 MAGNE ACTIVE, 90 kapsulių 25⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAS

„Möller's Magne Active“ – aukštos kokybės koncentruoti žuvis taukai su magniu, vitaminais D ir C. Magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją, mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Omega-3 riebalų rūgštys EPR ir DHR padeda palaikyti normalią širdies veiklą per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.

„MÖLLER'S“ – OMEGA-3 EKSPERTAI JAU 170 METŲ!

-45% **6^{59€}** ~~11^{90€}~~



AMBIO REGĖJIMUI, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

- Kompleksinis maisto papildas akims, kurio sudėtyje yra: mėlynių uogų miltelių, luteino, zeaksantino, vitaminų bei mineralų.
- Cinkas padeda išsaugoti normalią regėjimą ir palaikyti normalią vitamino A apykaitą.
- Cinkas, varis, selenas, vitaminai C ir E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinių pažeidimų.
- Selenas, varis ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
- Varis ir vitaminas C padeda palaikyti normalią energijos apykaitą bei normalią nervų sistemos veiklą.

-25%



VIZIK

VIZIK ALLERGY, 10 ml **16^{99€} 12^{37€}**

VIZIK lašai pavargusioms ir sausoms akims, 10 ml **12^{48€} 9^{37€}**

VIZIK lašai sudirgusioms ir paraudusioms akims, 10 ml **12^{79€} 9^{59€}**

MEDICINOS PRIEMONĖS

Be konservantų

ATIDARIUS BUTELIUKUS GALIMA NAUDOTI NET VIENERIUS METUS!

SAUSOMS, SUDIRGUSIOMS IR PAVARGUSIOMS AKIMS

NUO 13^{47€}



BEPANTHEN® EYE

BEPANTHEN® EYE akių lašai, 10 ml **14^{97€}**

BEPANTHEN® EYE akių lašai, 20 x 0,5 ml vienadozių talpyklių **13^{47€}**

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Bepanthen“ Eye“ akių lašų sudėtyje yra 0,15 % natrio hialuronato ir 2 % deksantenolio. „Bepanthen“ Eye“ saugo ir drėkina akies paviršių ir padaro jį slidžiu. Tokiu būdu ilgam sumažėja diskomfortas, susijęs su mechaniniu stresu, stresu dėl aplinkos poveikio arba intensyvaus žiūrėjimo. Sudėtyje nėra konservantų, todėl šie lašai gerai toleruojami, net jei vartojami ilgą laiką. Lašinti po 1 lašą į akies junginės maišelį 3–5 kartus per parą. Jeigu yra alergija bet kuriai sudėtyje esančiai medžiagai arba akių uždegimas ar pažeidimas, vartoti negalima. Akių lašų vartojimo metu kontaktinių lęšių išimti nereikia. Vienadozės akių lašų talpyklės skirtos tik vienkartiniam vartojimui. „Bepanthen“ Eye“ buteliukas yra ekonomiškas sprendimas: ypatinga akių lašų buteliuko technologija leidžia produktą suvartoti net per 12 mėnesių po jo atidarymo. Jei norite sužinoti daugiau, skaitkite pilną „Bepanthen“ Eye“ vartojimo instrukciją. Reklamos teksto parengimo data: 2023.12. CH-20231222-37

PAŠALINKITE SAUSŲ AKIŲ SIMPTOMUS IŠ KARTO!

IKI -40%



ABC VIT VITAMINAS A, 60 kapsulių **6^{99€} 4^{89€}** - **30%**

OPTIC BIOLUTEINA 25, 30 tablečių **7^{99€} 4^{79€}** - **40%**

MAISTO PAPILDAS

NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO

NUO 2^{49€}



APAP

APAP, 500 mg, 12 pėvelė dengtų tablečių **2^{49€}**

APAP, 500 mg, 24 pėvelė dengtos tabletės **3^{99€}**

APAP, 250 mg granulių pakelyje, vaikams, 10 pakelių **5^{99€}**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: APAP, 250 mg“ yra 250 mg paracetamolio; 1 pėvelė dengtoje tabletėje „APAP 500 mg“ yra 500 mg paracetamolio. **Indikacijos:** silpno ir vidutinio stiprumo skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Apap, 500 mg“ pėvelė dengtos tabletės: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1–2 tabletes kas 4–6 valandas, ne daugiau kaip 6 tabletes per parą. „Apap, 250 mg“ granulių pakelyje suvartoti su vandeniu, vienkartinė dozė yra nuo 10 iki 15 mg/kg kūno svorio vidurinės nei 4 m. vaikams, ja vartoti ne dažniau kaip kas 4 valandas (didžiausia paros dozė – 4 pakelėliai). Granulių supilti tiesiai į burną ant liežuvio ir praryti neįkvepus vandens. **Kontraindikacijos:** vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai:** prieš vartojimą būtina pasitarti su gydytoju, jei yra: pažėstos kepenys ar inkstai, astma, gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka, hemolizė anemija, vartojami kai kurie lėiti vaistai, skysčių netekimas, mitybos nepakankamumas, vartojamas alkoholis bei nėštumo ir žindymo laikotarpiai. Didelės nei rekomenduojamos dozės sukelia vidaus organų pažeidimus. **Reklamos teksto parengimo data 2023-12-19.**

„APAP“. KIEKVIEŅUJE VAISTINELEJE.

4^{99€}



NUROFLEX 200 mg vaistinis pleistras, 2 vaistiniai pleistrai

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kėlivienė vaistinė pleistrai su 200 mg ibuprofenu.

Farmacinė forma. Vaistinis pleistras: bespalvis, lopus vaistinio preparato sluoksnis, paskirstytas ant 10 cm x 14 cm dydžio lankstaus kūno spalvos austo pagrindo, ir padengtas nuimamu apsauginiu sluoksniu. **Terapinės indikacijos.** „Nuroflex“ skirtas tumpalakių lokalus skausmo, sukkelto iminio raumenų patėpimo arba lengvų viršutines ar apatinės galūnes sąnario aplinkos audinių traumų, simptominiams gydymui suaugusiems ir 16 metų ar vyresniems paaugliams. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems ar 16 metų ir vyresniems paugliams: viena dozė yra lygi vienam vaistiniams pleistru. Didžiausia dozė per vieną 24 valandų laikotarpį yra vienas vaistinis pleistras. Pleistras gali būti vartojamas bet kurio dienos ar nakties metu, tačiau ir reikia numti ir naują pleistrą vėl užklijuoti kita diena tuo patiu laiku. Vartoti ant odos ir tik trumpą laiką. Vaistinis pleistras turi būti naudojamas visose, jo negalima karyti. Klijuojama tik ant sveikos odos. Gydymasis pleistras neturi būti vartojamas kartu su okliuziniais vaistais. Prieš užklijuojant vaistinį pleistrą rekomenduojama kruopščiai nuaplinti ir išdžiovinti gydymo vietą kėnų paviršiu. Pirmaisia palankiė centre apsauginio sluoksnio dalis, skirta apsaugoti lėtinį pagrindo paviršių, ir užklijukite pleistrą šia lėnia nuse ant skaudando ploto. Kai pleistras yra reikiamoje vietoje, pašalinkite apsauginio sluoksnio dalis, esančias pleistro kraštuose. Vaistinis pleistras yra lankstus, todėl prireikus gali būti užklijuojamas ant arba šalia sąnario, tokiu būdu leidžiamas jam normaliai judėti. Venkite vaistinio pleistro drėkinimo. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai vaisto pagalbine medžiagai. Jeigu praeityje yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijų (pvz., astma, bronchų spazmas, rinitas, angioinozėinė edema ar dilgėlė) vartojant ibuprofeną, acetilsalicilic rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistinių preparatų nuo uždegimo (NNUV). Vartojimas ant irukosios ar pažėstos odos. Trečiasis nėštumo trimestras. Vartojimas ant akių, lūpų ar gleivinių. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei simptomai išlieka ilgiau nei 5 paras arba pakloja, reikia pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu. Bronchų spazmas gali pasireikšti pacientams, vartojantiems buprofeną, kurie serga arba anksčiau sirgę bronchine astma ar alergija. Gydymą reikia nedelsiant nutraukti, jei užklijuojamas vaistinis pleistras atsiranda odos šėberimas. Pacientai turi būti įspėjami apie gydymo zonas reikšiją stipriems natūralaus ir (arba) dirbtinio apšvietimo šaltiniams (pvz., dėgio lempos) gydymo metu ir viena dieną po vaistinio pleistro pašalinimo, siekiant sumažinti jautrumo šėviesai riziką. Pacientams, kuriems yra sutrukusi inkstų, širdies ir kepenų funkcija, buvo arba yra peptinė opa, žarnų uždegimas ar hemoraginė diatezė, prieš pradėdami vartoti šį vaistinį preparatą, reikia kreiptis į gydytoją. Senyviems pacientams nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo turėti būti vartojami atsargiai, nei jėms yra didesnė nepageidaujimų poveikų tikimybė. Reklamos tekstas parengtas 2025-02-18.

SKAUSMO IR/BEI KARŠČIAVIMO MALŠINIMUI

6^{99€}



UPSARIN C 330 mg/200 mg, 20 šnypščiuų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos stiprumas: 330 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg askorbo rūgšties. **Indikacijos:** silpo arba vidutinio stiprumo skausmo malšinimas ir (arba) karščiavimo mažinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir 16 m. bei vyresniems paugliams po 1–2 šnypščias tabletes, ne dažniau kaip kas 4 val., ne daugiau kaip 9 tabletes per parą. Senyviems pacientams po 1–2 šnypščias tabletes, bet ne daugiau kaip 6 tabletes per parą. Vartoti per burną. Prieš vartojimą ištrinti tablete stiklinėje vandens ir nedelsiant išgerti. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija acetilsalicilo rūgščiai, askorbo rūgščiai, kitiems salicilatams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, jeigu acetilsalicilo rūgštis, kiti salicilatai arba nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo anksčiau buvo sukėlę astmos (dūsliai) priepuoli, jeigu sergate ar anksčiau sirgote skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa, sunkia kepenų, inkstų ar širdies liga, padėtinis 4 mėnėto mėnesis, negalima vartoti daugiau kaip 100 mg per parą, jeigu inkstuose yra akmenų (negalima vartoti > 1 g/kg C / parą). Negalima vartoti kartu su metotreksatu, jeigu metotreksato dozė viršija 20 mg per savaitę, arba jei acetilsalicilo rūgšties dozė yra priešdeginė (2–3g vienkartinė ir (arba) ≥3g paros) arba analgetinė / antipiretinė (≥500 mg vienkartinė ir <3g paros), kartu su geriamaisiais antikoaguliantais, jeigu acetilsalicilo rūgšties dozė yra priešdeginė arba analgetinė / antipiretinė, nerekomenduojama vartoti karščiavimo mažinti ir virusinems infekcijoms gydyti vaikams iki 16 metų. **Specialūs įspėjimai:** vartoti atsargiai jeigu ligai ir dideliems dozėms vartojant analgetikų skauda galvą (tuomet galvos skausmo negalima malšinti dar didesnėm ju dozėms), anksčiau sirgote skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, skrandžio uždegimu arba buvo kraujavimas iš virškinimo trakto, sutrukusi širdies inkstų, kepenų arba širdies veikla, mėnesiės yra gaubios, kraujuoja iš gimdos nė mėnesinių metu arba jeigu į gimdos ideo spirale, esant 6000 trūkumui, sergate podagra arba anksčiau sirgote slėgimo lėkuma, esate senyvo amžiaus arba jums yra didėlėdažiųjų, jeigu žiu kūno svoris yra mažas. Nerekomenduojama vartoti sergant astma ar jei yra berimas (diligėlėms), susijęs su nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo arba acetilsalicilo rūgštimi. Vartojimą reikia nutraukti vos pastebėjus odos šėberimą, dūvelines žaizdas. Daugiau informacijos apie specialius įspėjimus žr. vaistinio preparato charakteristikų santraukoje ar pakuoės lapelyje. **Reklamos teksto parengimo data 2024.02.06. PM-LT-2024-2-417**

-20% **15^{19€}** ~~18^{99€}~~



AMEDIPPLUS skausmą malšinantis pleistras, 9 x 14 cm, 10 vnt.

MEDICINOS PRIEMONĖ

-40% 14^{99€}
~~24^{99€}~~

EPITOME VITAL OMEGA-3, 90 minkštųjų kapsulių MAISTO PAPILDAS

-25%



AKINIAI SKAITYMUJ

Vis daugiau skaitotome ne spausdintą tekstą, o iš ekranų. Pristatome naujieną – skaitymo akiniai su Blue Control lęšiais. Jų privalumai:

- Apsaugo akis nuo kenksmingų mėlynos šviesos spindulių, kurią skleidžia skaitmeniniai prietaisai (išmanūs telefonas; kompiuteris; planšetinis kompiuteris; televizorius; LED apšvietimas)
- Panaikina atspindžius tiek iš išorės, tiek iš vidinės lęšio pusės.
- Mažina akių nuovargį.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

NUO ALERGIJOS

4^{99€}

LORATADINE ACTAVIS 10 mg, 10 tablečių

NERECEPTIVIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas. Kiekvienoje tableteje yra 10 mg loratadino. **Terapinės indikacijos.** Simptominis alerginio rinito ir lėtinės idiopatinės dilgėlinės gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. vaikai: 10 mg 1 kartą per parą; 2-12 m. vaikai: sveriantiems daugiau kaip 30 kg – 10 mg 1 kartą per parą. Tabletes galima vartoti nepriklausomai nuo valgyimo laiko. Pacientams, sergantiems sunkiu kepenų funkcijos nepakankamumu, skiriama pradinė 10 mg dozė kas antrą dieną. **Kontraindikacijos.** Loratadino tablečių vartoti negalima, jeigu padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs spėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Loratadine Actavis“, jeigu yra sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas (tokiems pacientams gydymas gali skirti vartoti šio vaisto kas antrą dieną). Antihistamininiai vaistiniai preparatai gali susilpninti odos hiperergines reakcijas arba neleisti joms pasireikšti, todėl loratadino tablečių vartojimą reikėtų nutraukti mažiausiai prieš 48 val. iki alerginių odos mėginių. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Reklamos peržiūros data:** 2024 m. balandis, OTC-LI-00036

IKI -25%



TESTERA

GREITIEJI TESTAI

„Testera FOB“ (slaptas kraujavimas) greitis testas, skirtas storosios žarnos vėžio diagnostikai, slaptam kraujavimui išmatose aptikti. FOB (angl. Fecal Occult Blood) – tai mažas, paslėptas kraujo kiekis išmatose, kuris gali būti kraujavimo iš virškinimo trakto ar kitų sveikatos problemų rodiklis.

„Testera Helicobacter Pylori“ testas skirtas aptikti Helicobacter Pylori bakterijos antigeną išmatose.

„Testera“ greitis testas skirtas nustatyti geležies atsargų (feritino) būklę žmogaus organizme. Feritinas kaupia geležį ir, esant poreikiui, ją išskiria į organizmą.

„Testera“ vitamino D greitis testas, skirtas vitamino D koncentracijos būklei žmogaus organizme nustatyti: trūkumui, nepakankamumui, pakankamumui ir pertekliui.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-20%



SVEIKAZOLIŲ ARBATOS

„Sveikazolių arbatos“ asortimente garuoja kruopščiai atrinkti vaistažolių mišiniai bei pavienių žolelių arbatos, svaiginančios gardžiu skoniu ir šildančios iš vidaus.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-20% 2^{04€}
~~2^{54€}~~

AMEDIPLUS NOSIES PLEISTRAS NUO KNARKIMO, 10 vnt. MEDICINOS PRIEMONĖ

-30% 4^{54€}
~~6^{54€}~~

FITOLIZIN valgomoji pasta, 100 g MAISTO PAPILDAS

-30%



ELMEX

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„ELMEX“ burnos higienos priemonės profesionaliai pritaikytos ne tik skirtingoms amžiaus grupėms, bet ir pačioms įvairiausioms problemoms spręsti. **INDIVIDUALIOS PROBLEMOS. PROFESIONALŪS SPRENDIMAI.**

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

 **JAMIESON COLLAGEN, 60 tablečių**

Maisto papildas



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

21⁹⁹ €

 **JAMIESON SELENAS, 100 tablečių**

Maisto papildas



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

12⁹⁹ €



Pagaminta Kanadoje

 **JAMIESON HAIR SKIN NAILS, 60 kramtomųjų tablečių**

Maisto papildas



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

17⁹⁹ €

 **JAMIESON MELATONIN, purškalas, 58 ml**

Maisto papildas



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

19⁹⁹ €



Pagaminta Kanadoje

IMUNITETUI IR GERAI SAVIJAUTAI

-25%



NEW NORDIC MULTIVITAMINAI

MAISTO PAPILDAS

Skandinavų bendrovės „New Nordic“ multivitaminai – tai puikiai suderinti vitaminų, mineralų, mikroelementų ir augalinių ekstraktų kompleksai imunitetui ir gerai savijautai. „Multivitamin active woman“ – moterims, besirūpinančioms gera savijauta ir grožiu. „Multivitamin active woman 55+“ – vyresniųjų moterų organizmo poreikiams. „Multivitamin pregnant and breastfeeding woman“ – besilaukiančioms moterims ir žindymėms. „Multivitamin active man“ ir „Multivitamin active man energy boost“ – vyrams. Nepamiršome ir mažųjų – „Mineralai kaulams“, apelsinų arba miško uogų skonio krantomosios tabletės – kalcio, magnio ir vitamino D šaltinis augančiam organizmui. „Multi vegan GUMMIES“ – gaivaus vaisių ir uogų skonio multivitaminai guminukai imunitetui. Tinka visai šeimai, taip pat vegetarams ir veganams. Sudėtyje esantys vitaminai A, C, D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

JAUSKITĖS PUIKIAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

INKSTAMS IR ŠLĀPIMO TAKAMS

-20% 9^{11€}



FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Fitolizyna Nefrocaps PLUS“ yra unikalus 7 koncentruotų augalinių ekstraktų mišinys, kuris: – padeda palaikyti normalią inkstų ir šlapimo takų veiklą (petražolių šaknis, dirvinii asiūklių žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, karpotųjų beržų lapai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė); – padeda palaikyti normalų vandens pašalinimą iš organizmo, todėl skatinamas nepageidaujimų metabolizmo produktų šalinimas su šlapimu (dirvinii asiūklių žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė).
Rekomenduojamas vartojimas: 1 kapsulė 2 kartus per parą prieš valgį, užgeriant dideliu kiekiu vandens (ne mažiau kaip ½ stiklinės).

-30%



ARTILANE FORTE skystis, 15 vienodozių buteliukų 20⁹⁹ 14⁶⁹ €

MAISTO PAPILDAS SU SALKIKLIAIS

Maisto papildas yra fermentais hidrolizuoto ypač gryno kolageno, gliukozamino ir chondroitino, hialurono rūgšties, magnio, cinko, pluoštinės bosveljės (Boswellia serrata), antioksidantų: kofermento Q10, likopeno, kvercetino, vitamino C.

ARTILANE CLASSIC skystis, 15 vienodozių buteliukų 16⁹⁹ 11⁷⁵ €

MAISTO PAPILDAS SU SALKIKLIU

Maisto papildas sudėtyje yra fermentais hidrolizuoto ypač gryno kolageno, hialurono rūgšties, magnio, cinko, antioksidantų: kofermento Q10, likopeno, kvercetino, vitamino C.
 Nevisiškite nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

-30%



EMILI žolelių arbatos

Darbingai dienai ir jaukiam vakarui.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-30%



BF-ESSE

MAISTO PAPILDAS
 Pasimegausk gyvenimo akimirkomis su BF-ESSE...
JUSŲ GERAI SAVIJAUTAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

9⁹⁹ €



CAGYNOL, 300 mg, ovulė, 1 vnt.

NERECEPTINIS VAISTAS

Kiekvienoje ovulėje yra 300 mg sertakonazolo nitrato.
Terapinės indikacijos. Vietiniam makšties grybelinės Candida infekcijos gydymui. „Cagynol“ skirtas suaugusiems. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Dozavimas. Viena ovulė vakare prieš miegą, vienkartiniam vartojimui, įterpiama giliai į makštį, geriausia gulint. Gydymo trukmė - vienkartinė dozė. Didžiausia vienkartinė dozė yra viena ovulė (300 mg sertakonazolo). Jei klinikiniai požymiai išlieka, antroji ovulė vartojama 7 dienų intervalu. Vartojimo metodas. Vartoti į makštį. Vartojant šį vaistinį preparatą negalima naudoti tamponų ir intravaginaliųjų dušų. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas priešgrybeliniams imidazolo klases vaistiniams preparatams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Latekso prezeratyvų arba diafragmų naudojimas. **Specialios išėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei kandidozė patvirtinta, reikia atidžiai ieškoti ekologinių veiksnių, kurie sudaro sąlygas ir skatina grybelinės infekcijos vystymąsi. Norint išvengti atkryčių, labai svarbu nustatyti ir eradiuoti infekciją bet atsivėlgti į ją skatinančius veiksnius. Partarina vienu metu gydyti visą grybelinės infekcijos židinį, pripažintą sukeleja, partnerį. **Nėštumas.** Tyrimais su gyvūnais teratogeninis poveikis nerastas. Sertakonazolo vartojimas nėštumo metu turėtų būti svarstomas tik esant būtinybei. Teksto peržiūros data: 2022 m. gegužės 30 d. Reklamos parengimo data: 2023.12.15. CAGYN/2023/12/03

OVULĖ VIETINIAM MAKŠTIES KANDIDOZĖS GYDYMUI
 VIENOS OVULĖS SĖKMĖS ISTORIJA

-20% 5⁰³ €



UNDEVIT 50 dražečių

MAISTO PAPILDAS

Vitaminų A, C, E, B grupės (B1, B2, B6, B12) ir niacino, rutino, pantoteno rūgšties, folio rūgšties preparatas. Vitaminai C ir A padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo, vitaminas B1 (tiaminas) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, vitaminas B2 (riboflavinas) padeda palaikyti normalų regėjimą, vitaminas B6 (piridoksinas) padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, vitaminas B12 (cianokobalaminas) padeda palaikyti normalią raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją, pantoteno rūgštis padeda palaikyti normalią protinę veiklą. **Vartojimas:** gerti po 1 dražetę per dieną po valgio. **Gaminotas:** „Technology“, Ukraina. **Išskirtinis platin-tojas Lietuvoje:** UAB VERATRUM PHARMA, Zarjū g.2B, Vilnius

ODOS IR LŪPŲ PŪSELINEI GYDYTI

14⁹⁹ €

ACIC, 200 mg, 25 tabletės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 200 mg acikloviro. **Terapinės indikacijos:** anksčiau gydytojo diagnozuotos pasikartojančios lūpų pūselinės gydymas suaugusiems žmonėms. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** gerti po 1 tabletę 5 kartus per parą kas 4 val. Gydymo trukmė – 5 paras. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas acikloviro, valacikloviro arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** pailietus viruso pažeistą vietą, reikia tuoj pat nusiplauti rankas. „Sandoz Pharmaceuticals d. l.“ filialas, Ulpės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037, el. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2403136004. Teksto patvirtinimo data 2024-03-15.

UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSELINEIŠ IŠ VIDAUS!

5⁹⁹ €

ACICLOVIR ACTAVIS 5 % kremas, 5 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

„Aciclovir Actavis“ 5 % kremas. 1 g kremo yra 50 mg acikloviro. **Terapinės indikacijos.** Lokalūs odos ir lūpų pūselinės gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems „Aciclovir Actavis“ 5% kremo reikia tepti 5 kartus per parą, vidutiniškai kas 4 valandas; naktį daroma pertrauka. Gydoma 4 paras. Jei per šį laikotarpį nepasveikstama, gydymą reikia tęsti dar 6 paras. Jei pažeidimas neišnyksta ir po 10 parų, rekomenduojama kreiptis į gydytoją. „Aciclovir Actavis“ 5 % kremo nerekomenduojama vartoti jaunesiems kaip 12 metų vaikams. Vartoti ant odos. **Kontraindikacijos.** „Aciclovir Actavis“ 5 % kremo negalima skirti pacientams, kurie yra jautrūs aciklovirovi, valaciklovirovi, propilenglikoliui ar bet kuriai „Aciclovir Actavis“ 5 % kremo pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Aciclovir Actavis“ 5 % kremo nerekomenduojama tepti gleivinės, pvz., burnos, akių ar lyties organų, nes galimas sudirginimas. Būtina laikytis atsargumo priemonių ir saugoti akis, kad į jas nepatektų kremo. Jeigu Jūsų imunitetas labai susilpnėjęs, (t. y. Jūsų organizmo gebėjimas kovoti su infekcija yra sumažėjęs), tokiu atveju dėl bet kokios infekcijos gydymo reikia kreiptis į gydytoją ir įvertinti gydymo geriausiųjų aciklovirovų galimybę. Pagalbinės medžiagos celostearilo alkoholis, natro laurilsulfatas ir propilenglikolis gali sukelti vietinių odos reakcijų. **Reklamams teksto parengimo data.** 2023 02 15. OTC-LT-00047

-40% 11^{99€} ~~19^{99€}~~AMBIO GROŽIUI SU KOLAGENU, 60 kapsulių
MAISTO PAPILDAS-40% 9^{47€} ~~15^{78€}~~

AMBIO BIOTINAS, 100 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

• Biotinas padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją, odos ir plaukų būklę, maistingųjų makromedžiagų apykaitą.

• Tik 1 kapsulė per dieną.

-20%



DERMA FORTE

DERMA FORTE kremas, 50 ml 12⁵⁵ 10⁰⁷ €DERMA FORTE KARPOMS NE priemonė karpių gydymui, 2 ml 16²⁵ 13⁰⁸ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

Medicinos priemonė „Derma Forte“ kremas 50 ml skirtas itin sausai, sudirgusiai ir niežtinčiai odai. Sudėtyje esantys komponentai atkuria pažeistų vietų apsauginį odos barjerą, pritraukia ir sulaukia vandenį odoje bei neleidžia drėgmei išgaruoti. Tinka kūdikiams, vaikams, suaugusiems. Be kortizono ir kitų hormonų. Pagaminta Šveicarijoje.

Priemonė „Derma Forte Karpoms Ne“ skirta gydyti paprastosios rankų ir kojų karpoms. Pakanka naudoti tik 1 kartą per savaitę. Užtepimas neskausmingas, todėl priemonę galima naudoti vaikams nuo 4 metų. Efektyvi priemonė gliuoms delnų karpoms bei įsisenėjusioms karpoms gydyti. Tepkite priemonę itin atsargiai. Skystis yra šėdinamasis. Ypač lengvas būdas pamiršti karpas su „Derma Forte Karpoms Ne“!

-20%



AMEDIPLUS

PLEISTRAI SU ALAVIŲ EKSTRAKTU, 7 x 2 cm, 10 vnt. 1⁷⁵ 1⁴³ €JUODI AKSMINIAI PLEISTRAI, 7 x 2 cm, 10 vnt. 1⁷⁵ 1⁴³ €ULTRA SENSITIVE PLEISTRAI, 7 x 2 cm, 10 vnt. 3⁹⁵ 2⁷⁹ €PLEISTRAI RINKINYS ŠEIMAI, 20 vnt. 4⁴⁵ 3⁵⁶ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

NUO GRYBELIO

IKI -35%



MYCOSAN

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Mycosan“ skirtas nagų ir pėdų grybelinėms infekcijoms gydyti ir apsaugoti nuo jų. „Mycosan“ serumas gydo ir užkerta kelią rankų ir kojų nagų grybeliui. Serumas prasiskverbia į nagą ir pagerina jo struktūrą, todėl nagas atauga sveikas. Pažeistoje vietoje „Mycosan“ sukuria apsauginį barjerą ir infekcija negali plisti į kitus nagus. Labai svarbu gydymą pradėti vos pastebėjus pirmuosius ligos simptomus. Labai svarbu griežtai laikytis produkto naudojimo instrukcijos. „Mycosan“ pėdų gelis nuo grybelių skirtas „atleto pėdai“ gydyti. „Atleto pėda“ yra grybelių sukelta pėdos odos infekcija, kuri reikalauja gydyti, kad ji neišplistų. Galvinamasis ir vandeniui nelaidus pėdų pūskiklis „Mycosan Protect“ 12 val. apgaubia pėdą apsaugine plovele, kuri saugo pėdas nuo grysmės susigrįti grybeline pėdų odos infekcija.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-30% 6^{99€} ~~9^{99€}~~

DERMATONICS

DRY SKIN balzamas, 60 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

Jo sudėtyje yra 10 % karbamido ir kitų palaikomųjų emolientų. Tinka kūno, rankų ir pėdų drėkinimui. Tinka žmonėms sergantiems cukriniu diabetu.

GREITAI IR ITIN EFEKTYVIAI DRĖKINA ODA.



DERMATONICS

ULTRAVERN ITCH RELIEF kremas, 60 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

Unikali sudėtis – kremo formulėje yra 3% koloidinių alyvuogių drėkšnių ir 5% Stipalo. Nuramina sudirgintą odą, efektyviai sumažina niežėjimą, todėl gali būti siūlomas kaip alternatyva atopiniui dermatitui sergantiems žmonėms. Pasųžymi itin geromis apsauginėmis bei drėkinančiomis savybėmis.

PIRMA PAGALBA NIEŽTINČIAI ODAI.

GAMINAME VAISTUS PAGAL INDIVIDUALIUS RECEPTUS

- Atneškite gydytojo receptą iki 13 val.
- Atsiimkite pagamintą vaistą kitą darbo dieną.



VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS

JAUTRIŲ DANTŲ PRIEŽIŪRAI

-30%



SENSODYNE

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Dantų pastos „Sensodyne“ yra specialiai sukurtos žmonėms, turintiems jautrius dantis.

CHLT/CHMULBRA/0004/18a/JUL

EKSPERTO PAGALBA JAUTRIEMS DANTIMS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

IKI -30%



PARODONTAX

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

TARKITE SUDIE KRAUJUOJANČIOMS DANTENOMS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

BURNOS HIGIENAI

-20%



SUNSTAR GUM

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Jau daugiau kaip 80 metų „Sunstar“ yra viena burnos eilės higienos priemonių gamybos lyderių. GUM® sukūrė produktų liniją vaikams su saugiu fluorido kiekiu. Fluoridas padeda dantims greičiau įsisavinti mineralus ir saugo emalį nuo rūgščių poveikio. O sudėtyje esantis izomaltas padeda efektyviau įsisavinti fluoridą.

SVEIKOS DANTENOS, SVEIKESNIS GYVENIMAS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

UŽ 1 CT

Perkant burnos skalavimo skystį, PERIOPUS+ dantų pasta - TIK UŽ 1 CT!



CURAPROX

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Sveicaiski „Curaprox Perio Plus“ produktai turi antibakterinį poveikį. Juose yra uždegiminiu procesus slopinančių veikliųjų medžiagų - chlorheksidino ir „Citrox“™ - natūralių antioksidantų, turinčių antimikrobinį ir priešuždegiminį savybių. „Perio Plus Regenerate“ skalikas ir dantų pasta su hialuronu rūgštimi drėkina ir regeneruoja burnos gleivinę.

PRIEMONĖS SLAUGAI

IKI -20%



SENI

SENI sauskelnės ir sauskelnės kelnaitės - orui laidžios, su kvapo kontrolės sistema.

SENI apsauginiai pavidalai - tai papildoma apsauga, kuri išsaugo švairią patalynę.

SENI kosmetika odos priežiūrai - nuvalo, naikina kvapus, maitina ir apsaugo odą nuo dirglių.

SENI urologiniai iklotai ypač greitai sugeria, komfortiški ir diskretiški.

*Sauskelinėms negalima nuolaida su kompozicijomis vaistų paku.

PROFESIONALŲS UROLOGINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-35%



ROYAL DENTA dantų šepetėliai

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Royal Denta“ dantų šepetėliai valo geriau! Įsigykite dabar ir įsitikinkite!

Atraškite „Royal Denta“ dantų šepetėlių valymo galią ir mėgauties spindinčia šypseną ir gaiviu burnos kvapu.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-25%



CURASEPT ADS

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Curasept ADS priemonių išskirtinumas - vienintelė pasauliye patentuota ADS sistema - formulė, kuri patikrins, kad Jūsų natūralių dantų spalva ir burnos receptorių veikla chlorheksidino preparato naudojimo metu nepakistų.

Curasept ADS chlorheksidinas pasižymi itin stipriomis antibakterinėmis savybėmis, efektyviai naikina pavojingas bakterijas, taip užkirsdamas kelią ir apnašų dėjimuisi. Curasept ADS produkcijos sudėtyje nėra alkoholio, SLS, tad išvengsite burnos eilės sausėjimo, skilinėjimo bei dirglumo pojūčių.

Curasept ADS sukurta ir subalansuota gingivitui, periodontitui mažinti, kraujuojančioms dantenoms gydyti. Taip pat skatina burnos audinių gijimą prieš ir po intensyvių burnos higienos ar kitų sudėtingų stomatologinių intervencijų. Tikime, kad sveikas kūnas bei turingas gyvenimas, pirmiausia prasideda nuo sveikos burnos bei spindinčios šypsenos. Mes ne tik kalbame apie unikalumą, mes jį jau sukūrėme. Tu to dar nežinai, bet tai geriausia, kas galėjo nutikti tavo dantims...

PIRMI, NES MUMS RŪPI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

IKI -30%



ABENA

HIGIENOS PRIEMONĖS

Danijos gamintojo ABENA produktai, skirti šlapimo nelaikymui, yra aukščiausios kokybės, atitinkantys skandinaviskus standartus. Produktai itin gerai sugeria ir sugauna skysčius bei „užrakina“ nemalonius kvapus su „Odour system“ sistema.

Diskretiški, švelnūs ir orui pralaidūs, todėl tinka net ir jautriausiai odai bei užtikrina komfortą. Pagaminti nenaudojant jokio balinimo ir latekso, pažymėti NORDIC LABEL ženklu, garantuojančiu tvarumą ir ekologiją.

AKTYVIOMS DIENOMS IR PATOGIOMS NAKTIMS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms



-40%



URIAGE AGE ABSOLU

URIAGE AGE ABSOLU ROSE, atkuriamasis kremas, 50 ml **46⁹⁹ 28¹⁹ €**

URIAGE AGE ABSOLU, atkuriamoji naktinė kaukė, 50 ml **43⁹⁹ 26⁹⁹ €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Odai senstant, daugėja smulkių raukšlelių, gali atsirasti tamsių dėmių, oda nebera tokia stangri kaip ankščiau. „Uriage Age Absolu“ veido kremas ir naktinė kaukė skirti brandžios odos priežiūrai.

Švelnios, akmosinės tekstūros priemonės, papildytos prokolageno peptidais, retinoliu, vitaminais C ir E, hialuronu rūgštimi, puikiai maitina veido odą, padeda stangrinti, suteikti apimties ir spindesio.

IKI -30%



BIODERMA DERMATOLOGINĖS KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Prancūzijos dermatologijos laboratorija „Bioderma“ vadovaujasi požiūriu, kad odos priežiūros priemonės turi padėti atkurti natūralius biologinius procesus, šalindamos odos problemų kilmės priežastis bei simptomus. Priežiūros priemonės „Bioderma“ kuriamos tik iš grynuočių veikliųjų medžiagų, atliekančių svarbų vaidmenį odos veikloje.

EKOLOGIŠKOS MOKSLAS DERMATOLOGIJAI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

IKI -40%



URIAGE veido priežiūros priemonės

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Mūsų odą dažnai veikia nepalankūs aplinkos veiksniai: atmosferos tarša, saulė, žvurbas vėjas, šaltis ar oro kondicionieriai... Todėl labai svarbu tinkamai ir nuolat rūpintis veido oda. „Uriage“ siūlo didžiulį asortimentą priemonių, skirtų veido priežiūrai – kasdienai ar esant odos problemai.

KIEKVIENO POREIKIAMS, VISAI ŠEIMAI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

Natūralus bakterinės vaginozės simptomų gydymas



13⁹⁷ €

CANESBALANCE makšties ovulės, 7 vnt.

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Canesbalance“ veiksmingai mažina dėl bakterinės vaginozės atsiradusį nemalonių kvapą, neįprastas išskyras ir nemalonių pojūčius intymioje zonoje. Natūralios gydymosi medžiagos (pieno rūgštis ir gliukogenas) atkuria normalią Sarmų ir rūgščių pusiausvyrą (pH), makšties mikroflorą. „Canesbalance“ tinka ir neščiostoms. Be konservantų. Be hormonų. Be kvapiųjų medžiagų. Reklamos teksto parengimo data 2025-12. CH-20231222-38

IKI -40%



DR. KONOPKA'S plaukų, kūno ir veido priežiūros priemonės

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Dr. Konopka's“ – tai sertifikuota natūrali kosmetika, pagaminta gydytojo Konopkos receptų pagrindu. Šiuose produktuose tarpusavyje dera įvairūs augaliniai ingredientai, žolelės, aliejai ir kitos aktyviosios sudedamosios dalys, kurios padeda puoselėti Jūsų odą ir plaukus.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

Intymiai higienai



IKI -50%

LACTACYD KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Lactacyd“ intymios higienos prausikliai, skirti kasdienai intymių zonų priežiūrai. Paprasta naudoti vonioje ar duše. Nuo pirmųjų mėnesinių iki menopauzės. „Lactacyd“ siūlo visą asortimentą intymios higienos prausiklių, kad kiekviena moteris žvali ir jaustumėtės patogiai. „Lactacyd“ gaminiai turi tinkamą pH ir palaiko natūralų makšties rūgštumą. Jie yra švelnios, be muilo ir tinkami naudoti kasdien. Produktai yra su natūralia pieno rūgštimi. Natūrali pieno rūgštis skatina gerųjų bakterijų dauginimąsi jūsų intymiose vietose ir padeda išsaugoti natūralų makšties floros rūgštumą.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

14⁹⁹ €



LENOSTELLA 1,5 mg tabletė

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje tablete yra 1,5 mg levonorgestrelio. **Terapinės indikacijos:** skubioji kontracepcija, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms po nesaugaus lytinio akto. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vieną tablete reikia kiek galima greičiau, geriausia per 12 valandų ir ne vėliau kaip per 72 valandas po nesaugių lytinių santykių. **Kontraindikacijos:** jautrumas levonorgestrelui arba pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** nevartoti kol nebuvo pirmųjų mėnesinių. „Sandoz Pharmaceuticals“ filialas, Upės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2656057. **El.pastas:** info.lituania@sandoz.com. B52403536093. **Teksto pavirtinimo data:** 2024 03 15. **SOS TABLETĖ – PAVEDA IŠVENGTI NĖSTUMO PO NESAUGAUS LYTINIO AKTO**

Makšties NIEŽĖJIMAS? DEGINIMO JAUSMAS makštyje? BALTOS BEKVPĖS makšties IŠSKYROS?

Tai – makšties kandidozės (pienligės) simptomai

TINKAMAS VAISTAS MAKŠTIES KANDIDOZEI GYDYTI LOMEXIN®

Fentikonazolo nitratas

LOMEXIN 200 mg makšties minkštosios kapsulės **N3**

LOMEXIN 600 mg makšties minkštosios kapsulės **N1**

TRJU DIENU GYDYMO KURSUI

VIENOS DIENOS GYDYMO KURSUI

Nereceptiniai vaistai

RECORDATI

LOMEXIN kapsulėse yra **200 mg** arba **600 mg** fentikonazolo nitrato. Skirtas išorinių lyties organų ir makšties kandidozės lokaliai gydymui. LOMEXIN vartoti 1 makštyje, tris paras iš eilės po vieno 200 mg makšties kapsulės arba vieną kartą vartojama viena 600 mg makšties kapsulė (prieš miegą). LOMEXIN nevertojamas vaikams ir paaugimams iki 16 metų gydyti. Vartoti draudžiama jei yra padidėjęs jautrumas veikliajai, pagalbinei medžiagai arba alergija žemės riešutams ar sojai. Kreipkitės į gydytoją ar vaistininką, jeigu esate nėščia ar maitinate krūtimi, simptomai nepagerėja per vieną savaitę ar pasikartoja daugiau nei du kartus per pastaruosius 6 mėnesius. Jūs ar Jūsų partneris kada nors sirgote lytiniu plintančiu ligoniu. Jums daugiau nei 60 metų, yra nustatytas jautrumas imidazolams ar kitiems priešgrybeliniams vaistams, pasireiškia nemotormas ar nereguliarius kraujavimas iš makšties, kraujingos makšties išskyros, vulvos ar makšties žaizdos, opos arba pūslelės, apatinės pilvo dalies skausmas arba sutrikęs šlapinimasis, nepageidaujamas poveikis, toks kaip paraudimas, niežėjimas ar išbėrimas, susijęs su gydymu. Vartoti nerekomenduojama, jeigu naudojate „barjerinį“ kontracepcijos metodą, pagamintą iš latekso, spermicidus, makšties ploviklius ar kitus makšties produktus. **Reklamos teksto parengimo data – 2025/02**



TYLUS RŪPESTIS

Pastebėkite tuos, kurie rūpinasi
ir slaugo savo artimuosius.
Padėkite jiems kasdienybėje,
kad jie nesijaustų vieni.



Skenuokite QR kodą
ir sužinokite daugiau
apie iniciatyvą.

www.gintarine.lt/tylus-rupestis



Gintarinė
vaistinė

rūpinkimės tais, kurie rūpinasi kitais



-30%

PHILIPS
AVENT

www.philips.lt/avent



-40%

AMBIO
KIDS VITAMINAS C, 60 guminukų **14^{20€} 8^{52€}**
KIDS IMMUNITY COMPLEX, 100 ml **12^{98€} 7^{79€}**
MAISTO PAPILDAI



-40%

AMBIO KIDS ŽUVŲ TAUKAI VAIKAMS, 60 kramtomųjų kapsulių **17^{98€} 10^{79€}**
MAISTO PAPILDAS



-35%

AMBIO KIDS BIFIDOBAKTERIJOS VAIKAMS, 16 kramtomųjų tablečių **7^{28€} 4^{73€}**
MAISTO PAPILDAS

Temperatūrai mažinti ir skausmui malšinti



NUO **4^{49€}**

IBUGARD
100 mg/5 ml geriamoji suspensija, 120 ml **4^{49€}**
200 mg/5 ml geriamoji suspensija, 100 ml **8^{49€}**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: **5 ml IBUGARD 100 mg/5 ml** geriamosios suspensijos yra 100 mg ibuprofeno, **5 ml IBUGARD 200 mg/5 ml** geriamosios suspensijos yra 200 mg ibuprofeno. Terapinės indikacijos. Įvairios kilmės karščiavimo, įvairios kilmės silpno ir vidutinio stiprumo skausmo, tokio, kaip virusinės ar kitokios infekcijos sukkelto galvos, gerklės ir raumenų skausmo; sąnarių ir kaulų skausmo; pooperacinio skausmo; danties skausmo, galvos skausmo; ausies skausmo, esant vidurinės ausies uždegimui, mažinimui. Vartojimo būdas ir dozavimas: nustatant ibuprofeno dozę, reikia atsižvelgti į paciento kūno svorį ir amžių. Paprastai vienkartinė ibuprofeno dozė yra 7-10 mg/kg kūno svorio, maksimali paros dozė yra 20-30 mg/kg kūno svorio. Dozė galima kartoti kas 6-8 valandas, tarp dozių turi būti ne mažesnis nei 4 valandų intervalas. Tik trumpalaikiam vartojimui. Kontraindikacijos: Padidėjęs jautrumas ibuprofenui, aspirinui ar kitam nesteroidiniam vaistui nuo uždegimo (NVNU), arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei sergate ar sirgote skrandžio ir (arba) dvylikapirštės žarnos opa ar kraujavimu iš virškinamojo trakto; sergate sunkiu kepenų, širdies ar inkstų funkcijos sutrikimu. Yra polinkis ir kraujavimą. Specialūs įspėjimai: specialų atsargumo priemonių reikia, jei inkstų, kepenų ar širdies funkcija yra sutrikusi, sutrikęs kraujo krešėjimas arba vartojami antikoaguliantai, sergama cukriniu diabetu, raudonąja vilkige, krono liga, opiniu kolitu, hipertenzija, astma, šienlige, yra nosies poliopų ar lėtinų infekcinių kvėpavimo takų ligų. Teksto paruošimo data 2024 01 mėn.

Pasiūlymai galioja **2025 03 01 – 2025 03 31**.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujantioms prekėms. Nuolaidos taikomos prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą. Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį/informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkvktu.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvktu.lt.

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Daugiau informacijos NORFOS vaistinėje, tel. +370 800 10008, www.nvaistine.lt MAŽYLIUI IR MAMAI skirtas prekes ypatingomis kainomis greičiau ir patogiau užsisakykite internetinėje vaistinėje www.nvaistine.lt. Užsisakius prekių (išskyrus vaistinius preparatus) už 29 € ir daugiau – pristatymas NEMOKAMAI! Reklaminiu teksto parengimo data – 2025 02 17.





SKIEPAI NUO ERKINIO ENCEFALITO

SU
LOJALUMO
KORTELE

31⁹⁵ €

SKIEPO KAINA
BE KORTELĖS

34⁹⁵ €

Galima išankstinė registracija:

- internetu www.nvaistine.lt/skiepai
- telefonu +370 800 10 008



Nuolaidos taikomos
su PC Norfa kortele.
Akcijos „Laimės valandos“
nuolaidos netaikomos.