

## TOP GEGUŽĖS PASIŪLYMAI



-50%



### AMBIO

CA+MG+K+ZN+D3, milteliai geriamajam tirpalui, 30 paketėlių **13<sup>99</sup> 6<sup>99</sup> €**

ŠIRDŽIAI, 30 tablečių **10<sup>99</sup> 5<sup>49</sup> €**

MAISTO PAPILDAI

-60%



### VITADAY

KOMPLEKSAS SĄNARIAMS SU GLIUKOZAMINU, 60 tablečių **9<sup>99</sup> 3<sup>99</sup> €**

MAISTO PAPILDAI

IKI -50%



### FJØRD STRONG OMEGA-3

MAISTO PAPILDAI

Kuo ypatingi?

- **Stiprumas.** Išskirtinai didelis kiekis omega-3, ypač jų aktyvia forma EPA ir DHA.
- **Matoma kokybė.** Žaliava atitinka 5\* tarptautinio žuvų taukų standarto įvertinimo kriterijus.
- **Geru pasisavinimu.** nes yra natūraliai gamtoje esančios trigliceridų formos.
- **Saltinių - laukinės, mažos, riebios žuvys** natūraliai kaupia milžinišką kiekį omega-3.
- **Skoniui** - skysti žuvų taukai be žuvies skonio, su vos juntama natūralios citrinos nata.

Paragaukite!  
„FJØRD STRONG OMEGA-3“ – ŽUVŲ TAUKAI, KURIE GALI DAUGIAU, NEI TIKIESI.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-50%



### OCUVAL STRONG, 30 minkštųjų kapsulių **17<sup>99</sup> 8<sup>99</sup> €**

MAISTO PAPILDAI

Rūpinkitės savo akimis kasdien su „Ocuval Strong“!

Sudėtyje – net 30 mg liuteino, taip pat vitaminas A, riboflavinas (vitaminas B2) ir cinkas, kurie padeda išsaugoti normalų regėjimą ir palaikyti akių funkciją.

„OCUVAL“ – MATYK, KAI LABIAUSIAI REIKIA

NUO 2<sup>99</sup> €



### IBUPROM EXPRESS

IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 10 minkštųjų kapsulių

IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 20 minkštųjų kapsulių

2<sup>99</sup> €

5<sup>99</sup> €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** ibuprofenas, 400 mg. **Indikacijos:** skausmo (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimo mažinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems pacientams ir vyresniems nei 12 m. vaikams kaip trumpalaikis pagalbinis gydymas kas 4 val. geriama 1 kapsulė (negerti daugiau kaip 3 kapsulių per parą). Kapsulių negalima kramtyti. Kapsulę reikia užgerti stikline vandens. **Kontraindikacijos:** alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, praėjusie buvusios padidėjusio jautrumo reakcijos vartojant kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo, sunkus kepenų, inkstų ar širdies funkcijos nepakankamumas, esama (ar praėjusie buvusio) pepsinės opa, buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, kraujavimas į smegenis, virškinimo trakto arba kitoks kraujavimas, sisteminė raudonoji vilkligė, paskutinis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai:** specialų atsargumo priemonių reikia, jeigu sutrikusi inkstų, kepenų, širdies ir virškinimo trakto veikla, vartojama kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo, sergama bronchine astma, alerginėmis ligomis ar sisteminė raudonoja vilkligė; senyviems žmonėms. **Reklamos teksto parengimo data** 2024.11.29.

RENKUOSI „IBUPROM“. RENKUOSI LAISVĖ.

### OLFEN



OLFEN, 1 % gelis, 50 g **3<sup>99</sup> €**

OLFEN. 23,2 mg/g gelis, 50 g **4<sup>99</sup> €**

OLFEN, 1 % gelis, 100 g **6<sup>99</sup> €**

OLFEN. 23,2 mg/g gelis, 100 g **7<sup>99</sup> €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veiklioji medžiaga, stiprumas.** 1 g gelio yra 10 mg diklofenako natrio druskos arba 23,2 mg diklofenako dietilamino, atitinkančio 20 mg diklofenako natrio druskos. **Terapinės indikacijos.** Suaugusiems ir 14 metų bei vyresniems paaugliams skirtas lokalaus skausmo simptomams malšinti, esant ūminiams šlepiams, patempimams ar sumušimams po bukus traumas; minkštųjų audinių uždegimui slopinti (esant tendinitui, bursitui). 14 metų ir vyresniems paaugliams vaistinis preparatas skirtas trumpalaikiam gydymui. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Atsižvelgiant į gydymo kuro dalies dydį, 2-4 g (mažiausiai 1-2 pilnus arbatinius šaukštelius). „Olfen 1%“ gelio tepama 3-4 kartus per parą ir tolygiai paskirstoma (dirinti nereikia). Neviršyti 16 g gelio paros dozės. Gydymo trukmė priklauso nuo terapinių indikacijų bei vaistinio preparato poveikio. Nepasitarus su gydytoju, suaugusiems „Olfen 1%“ gelio negalima tepti ilgiau kaip 14 parų, o paaugliams – ilgiau kaip 7 paras. Jeigu per 7 dienas simptomai išlieka arba būklė pasunkėja, reikia kreiptis į gydytoją. „Olfen 23,2 mg/g“ reikia vartoti ant odos 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Atsižvelgiant į gydymo pažaisios vietos dydį, reikia nuo vyšnios iki graikiško riešuto dydžio gelio kiekio, atitinkančio 1-4 g gelio, kuris atitinka 20-80 mg diklofenako natrio druskos. Didžiausia paros dozė yra 8 g gelio, kuris atitinka 185,6 mg diklofenako dietilamino (atitinkančio 160 mg diklofenako natrio druskos). Vartojimo trukmė priklauso nuo simptomų bei pagrindinės ligos. Be gydytojo patarimo „Olfen“ negalima vartoti ilgiau kaip 1 savaitę. Jeigu per 3-5 dienas simptomai nepagerėja arba net pablogėja, būtina gydytojo konsultacija. **Kontraindikacijos.** „Olfen“ vartoti negalima, jeigu yra alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu Jums kada nors anksčiau pavartojus acetalisalicilo rūgšties arba kitų NVNU (pvz., ibuprofeno) buvo sutrikęs kvėpavimas (astma, bronchių spazmas), aligėlinė sloga, vėdo arba liežuvinio patinimas; esant odos arba gleivinių atbrosms žaizdoms, uždegimui arba infekcijai, taip pat sergant egzema; paskutiniuoju nėštumo trimestru; jaunesniems kaip 14 metų vaikams ir paaugliams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės** reikalingi, jei sergate astma, šienlige, nosies gleivinės patinimu ar lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis, lėtinėmis kvėpavimo takų infekcijomis arba yra padidėjęs jautrumas kitoms skausmą malšintiems vaistams ir bet kuriems vaistams nuo reumatų; taip pat pacientams, kurie yra alergiški kitoms medžiagoms ir kuriems būna odos reakcijų, niežulys arba aligėlinė sloga. „Olfen“ vartojamas dideliam odos plotui ir ilgai gydyti, negalima panęgti galimo sisteminio šalutinio poveikio. „Olfen“ galima vartoti tik ant nepažeistos ir sveikos odos. Venkite patekimo į akis bei kontakto su gleivinėmis. Nesinaudokite nei nepraideidaisiis tvarščias, „Olfen“ vartojama reikia nutraukti, jei atsiranda odos bėrimas. Vartodami šį vaistą venkite saulės spindulių, taip pat nesinaudokite soliariumu. Saugokite, kad vaikai nepaętytų paliesti šio vaisto gydymo odos vietų. „Olfen 1%“ vartoti atšargai, jeigu inkstų, širdies ar kepenų funkcija sutrinkusi, arba turite ar buvo anksčiau skrandžio opa, žarnyno uždegimas ar esate linkęs į kraujavimą. **Teksto peržiūros data.** „Olfen 1%“ 2022-06-28; „Olfen 23,2 mg/g“ 2023-01-19. OUF-11-00035. **Reklaminės medžiagos parengimo data** 2023 m. liepa.



# -50 % PIGIAU

## -50%

**ZAN™** – maisto papildų linija atminčiai, protinei veiklai, nervų sistemai, psichinei sveikatai bei miegui.

HYPNOZAN EXPRESS, 30 čiulpiamųjų tablečių **6<sup>99</sup> 3<sup>25</sup> €**

VALEROZAN DROPS, geriamasis tirpalas, 50 ml **3<sup>99</sup> 1<sup>99</sup> €**

HYPNOZAN, 20 kapsulių **9<sup>99</sup> 4<sup>90</sup> €**

VALEROZAN, 60 tablečių **7<sup>99</sup> 4<sup>00</sup> €**

#### MAISTO PAPILDAI

„HypnoZAN Express“ čiulpiamosios tabletės su melatonino ir fitoterapinių medžiagų deriniu leidžia greičiau užmigti\*, o čiulpiama preparato forma užtikrina geresnį veikimą. „ValeroZAN Drops“ geriamasis tirpalas, augalinių ekstraktų derinys su valerijonais, tinkamas nervų sistemos veiklai, psichinei sveikatai ir atsipalaidavimui, skysta preparato forma užtikrina greitesnį veikimą. „HypnoZAN“ su melatoninu ir melisomis padeda greičiau užmigti\*, palaikyti normalų miegą bei psichinę sveikatą, padeda atsipalaiduoti. „ValeroZAN“ tabletės vaistinių valerijonų, vaistinių melisų ir paprastųjų apynių bei sukatžolių derinys padeda: atsipalaiduoti, palaikyti normalią nervų sistemos būklę, palengvinti užmigimą\* ir palaikyti miego kokybę.

\* Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti.

„ZAN™“ – JKVEPK... ISKVEPK.



## -50%

#### NIZORAL

##### KOSMETIKOS PRIEMONĖS

**NIZORAL™ DRY & SENSITIVE SCALP** šampūnas. Palengvina pleiskanotą, niežtinčią ir į egzema linkusios galvos odos būklę. Nuramina ir suteikia galvos odai palengvėjimą, išlaiko plaukus švelnius iki 24 valandų. Sukurta iš natūralios kilmės ingredientų.

**NIZORAL™ CARE** kondicionierius – intensyviai drėkinantis kondicionierius galvos odai ir plaukams.

**NIZORAL™ CARE DAILY** šampūnas. Niežtinčiai ir pleiskanojančiai galvos odai. Poveikis pastebimas po pirmo plovimo.

**NIZORAL™ CARE** kosmetinis galvos tonikas – niežtinčios, sudirgusios galvos odos apsaugai ir priežiūrai su natūraliais magnolijų ir kaktusų augalinių ekstraktais.

„NIZORAL™“ KOSMETIKOS PRIEMONĖS NUO PLEISKANŲ KASDIENEI JŲSŲ GALVOS ODO PRIEŽIŪRAI.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.



## -50%

#### FOMAN® UP SHOTS

14 x 25 ml **36<sup>99</sup> 18<sup>50</sup> €**

##### MAISTO PAPILDAS

**Foman UP Shots** – skirtas seksualiai aktyviems VYRAMS. Viename buteliuke yra koncentruotų veikliųjų medžiagų dozė pritaikyta vyrų: **lytiniam potraukiui, erekcijai, pajėgumui ir energijai.**

Natūralų seksualinį aktyvumą ir energiją padeda palaikyti **Peruvinė pipirinė (maca)**. Lytinį potraukį ir pajėgumą padeda palaikyti **Gulščioji ragužė**. **Ženšenis** padeda palaikyti normalią erekcijos funkciją. **Pantoteno rūgštis** (vitaminas B<sub>5</sub>) padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei padeda palaikyti normalią protinę veiklą bei normalią energijos apykaitą. Sudėtyje taurinas (natūrali amino rūgštis).

**VIRŠYK GALIMYBES SU FOMAN UP SHOTS**

**FOMAN®** 30 kapsulių **13<sup>99</sup> 7<sup>00</sup> €**

##### MAISTO PAPILDAS

„Foman“ – maisto papildas, skirtas 3 pagrindinėms vyriškosios funkcijos: **prostato, šlapimo sistemos, reprodukcinės.**

Išskirtinėje „Foman“ sudėtyje yra 4 kompleksškai veikiantys elementai: gulščioji serenojų vaisių ekstraktas padeda palaikyti šlapimo ir reprodukcinę funkcijas; didžiųjų dilgėlių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią prostatos funkciją; fermentas proteazė padidina vyro mitumą; organinė seleno forma, padeda palaikyti normalią spermatogenezę.

Rekomenduojama suaugusiems gerti po 1–2 tabletes per dieną ne valgio metu.

**FOMAN – TECHNIŠKAI TVARKINGAM VYRUI.**





# IKI 5 EURŲ

5€

4<sup>99</sup> €



## ACETERIN EXPRESS 10 mg tabletės, 10 tablečių

### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** vienoje tabletėje yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės simptomams palengvinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vyresniems kaip 12 metų – po 1 tabletę per dieną, 6-12 metų vaikams – po pusę tabletės 2 k/d. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pagalbinei medžiagai, hidroksiziniui arba bet kuriam pirazino dariniiui. Pacientai, kuriems smarkiai sutrikusi inkstų funkcija. **Specialūs įspėjimai:** atsargiai vartoti sergantiems epilepsija ir pacientams, kuriems yra traukulių pavojus. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2656037. El.pastas: info.lithuania@sandoz.com. BS240316092. Teksto patvirtinimo data: 2024 03 15.



NUO 2<sup>99</sup> €

## NOLPAZA

20 mg, 7 skrandyje neiros tabletės 2<sup>99</sup> €  
20 mg, 14 skrandyje neirus tablečių 4<sup>99</sup> €

### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veiklioji medžiaga, stiprumas.** Kiekvienoje skrandyje neירוje tabletėje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidrato pavidalu). **Terapinės indikacijos.** Trumpalaikis suaugusių žmonių gastroezofaginio refliksų simptomų (pvz., rėmens, rūgšties regurgitacijos) gydymas. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Rekomenduojama pantoprazolo paros dozė yra 20 mg (viena tabletė). Šio simptomai palengvėtų, tablečių gali reikėti gerti 2-3 dienas iš eilės. Kai simptomai visiškai išnyksta, gydymas turi būti nutrauktas. Nepasitarus su gydytoju, gydymas negali trukti ilgiau kaip 4 savaites. „Nolpaza“ nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nepakanka. „Nolpaza“ 20 mg skrandyje neirus tablečių negalima kramtyti arba smulkinti, jas reikia nuryti nesmulkintas užgeriant skystiu prieš valgį. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nerekomenduojama pantoprazolui vartoti kartu su ŽIV proteazės inhibitoriais, pvz., atazanaviru, nelinaviru, nes reikšmingai sumažėja tų pat vaistinių preparatų biologinis prieinamumas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pacientai turi būti perspinti, kad tolau išvardytas atvejais jis privalo kreiptis į gydytoją: nelikėliai mažėja kūno svoris, yra anemija, kraujavimas iš virškinimo trakto, dispepsija, nuolatinis vėmimas ar vėmimas krauju. Tokie simptomai gali palengvėti, todėl sunki liga gali būti diagnozuojama vėliau. Tokiu atveju būtina pakeičti vėžinio susirgimo diagnozę; yra buvusi skrandžio opa arba operuotas virškinimo traktas; 4 savaites ar ilgiau nuolat vartojama nevirškinimo ar rėmens simptomus lengvinančių vaistinių preparatų; yra gelta, kepenų funkcijos sutrikimas arba kepenų liga; yra bet kokia kita sunki liga, bloginanti bendrąją savijautą; pacientas vyresnis kaip 55 metų ir anksčiau simptomai nebuvo arba buvę simptomai pasikėlė. Simptomai gali pradėti lengvėti po maždaug vienos gydymo pantoprazolui dienos, tačiau kad rėmus išnyktų visiškai, vaistinio preparato gali tekti vartoti 7 dienas. Pantoprazolui pacientai negali vartoti profilaktikai. Jei padidėjusios chromogranino A (CgA) koncentracijos gali būti sunkiai atlikti neuroendokrininių navikų tyrimas. „Nolpaza“ tabletės yra sorbitolio ir natrio. Geriamojo vaistinio preparato sudėtyje esantis sorbitolis gali paveikti kitų kartų vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį prieinamumą. Šio vaistinio preparato tabletėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės. **Reklamos teksto parengimo data.** 2025.04.07.

„NOLPAZA“ UŽGESINA RĖMENĮ ILGAM!

Pagalba nuo viduriavimo

4<sup>49</sup> €



## LOPEDIDIUM EXPRESS 2 mg, kietosios kapsulės, 10 kapsulių

### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** 1 kapsulėje yra 2 mg loperamido hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** simptomatinis suaugusiųjų ir vyresnių kaip 12 metų paauglių ūminio viduriavimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** iš pradžių reikia gerti 2 kapsules, vėliau (po kiekvieno išstūtinimo beformėmis išmatomis) – po 1 kapsulę. **Kontraindikacijos:** nevartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliajai ar pagalbinėms medžiagoms, jei yra bakterijų sukeltas žarnyno uždegimas. **Specialūs įspėjimai:** jei per 48 val. po vaisto išgerimo viduriavimas nesusilpnėja, jo vartojimą reikia nutraukti ir kreiptis į gydytoją. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 265 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS240316090. Teksto patvirtinimo data 2024-03-13.

Moderni kapsulė nuo rėmens

3<sup>99</sup> €



## ESCADRA 20 mg,

7 skrandyje neiros kietosios kapsulės

### NERECEPTINIAI VAISTINIS PREPARATAS

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** ezomeprazolas, 20 mg. **Terapinės indikacijos:** vaistas skirtas suaugusiųjų gastroezofaginio refliksų simptomų (pvz., rėmens ir skrandžio rūgšties regurgitacijos) trumpalaikiam gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 kapsulė) karta per parą. Kad simptomai palengvėtų, kapsules gali prireikti vartoti 2-3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaites. Simptomams visiškai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Jeigu per 2 savaites nepateikiama gydymą simptomai nesilpnėja, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Nėra tinkamų „Escadra“ vartojimo rekomendacijų jaunesniui kaip 18 metų vaikų populiacijai indikacijai „Trumpalaikis gastroezofaginio refliksų simptomų (pvz., rėmens ir rūgšties regurgitacijos) gydymas“. Kapsulių likučius kramtyti ar smulkinti. Kapsules galima atidaryti ir granules išmalti pusėje stiklinės negazuoto vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pakeistiems benzimidazolams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Ezomeprazolo negalima vartoti kartu su neflinaviru. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pacientus reikia informuoti, kad kreipus į gydytoją, jeigu jie patiria didelį kūno svorio mažėjimą dėl nežinomo priežasties, pasikartojanti vėmima, dispepsija, vėmimų krauju ar mėlena, arba jeigu įtariama ar diagnozuojama skrandžio opa, būtina iširti, ar nėra piktybinės ligos, nes gydymas ezomeprazolu gali palengvinti jos simptomus ir uždelsti diagnozės nustatymą; jeigu jie anksčiau sirgo skrandžio opa arba patyrė virškinimo trakto operaciją, jeigu jiems 4 savaites arba ilgiau buvo taikomas nepateikiama gydymą simptomai nesilpnėja arba rėmens gydymas; jeigu jie serga gelta arba sunkia kepenų liga; jeigu jie yra vyresni kaip 55 metų ir turi naują arba neseniai pakitusių simptomų. Pacientai, kurių pasikartojantis nevirškinimo ar rėmens simptomai ilgalaikiai, turi reguliarius intervalus lankytis pas savo gydytoją. Kaip ilgalaikio profilaktinio vaistinio preparato „Escadra“ pacientai neturi vartoti. Pacientai, kuriems reikia atlikti endoskopiją ar ureazės kvėpavimo testą, turi pasitarti su savo gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistinį preparatą. Ezomeprazolui skirti kartu su atazanaviru nerekomenduojami. Ezomeprazolui derinimas su klopidogreliu nepatartinas. Kitų PGI arba H2 receptorių blokatorių kartu su ezomeprazolu pacientams vartoti negalima. „Escadra“ sudėtyje yra sacharozės. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems yra fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2025.04.07.

Nuo skausmo ir karščiavimo

NUO 2<sup>75</sup> €



## IBUPROM

IBUPROM, 200 mg, 10 dengtųjų tablečių 2<sup>75</sup> €  
IBUPROM, 200 mg, 20 dengtųjų tablečių 4<sup>25</sup> €  
IBUPROM, 400 mg, 10 dengtųjų tablečių 3<sup>25</sup> €  
IBUPROM, 400 mg, 20 dengtųjų tablečių 4<sup>75</sup> €

### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** ibuprofenas, 400 mg ir 200 mg. **Terapinės indikacijos:** skausmo (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimo mažinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Ibuprom, 400 mg“: suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 1 tabletę 3 kartus per parą. „Ibuprom, 200 mg“: 6-9 m. vaikams (kūno svoris 20-25 kg) gerti po 1 tabletę kas 6-8 val. (negerti daugiau nei 3 tablečių per parą); 10-12 m. vaikams gerti po 1 tabletę kas 6 val. (negerti daugiau nei 4 tablečių per parą); suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams pradine doze yra 2 tabletės, po to galima gerti po 1-2 tabletes kas 4 val. (negerti daugiau nei 6 tablečių per parą). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, taškinis kraujavimas, ūminis skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligės stadija; anksčiau buvusi alergija acetylsalicilo rūgščiai ir kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; serganti sunkios širdies nepakankamumu, esant trečiam nėštumo trimestru. Specialūs įspėjimai: vartoti nepatartina, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu, bronchų astma. Reklamos teksto parengimo data 2024.11.29.

RENKUOTI „IBUPROM“. RENKUOTI LAISVĖ.

Nuo alergijos

4<sup>99</sup> €



## LORATADINE ACTAVIS 10 mg, 10 tablečių

### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veiklioji medžiaga, stiprumas:** 1 kapsulėje yra 10 mg loratadino. **Terapinės indikacijos:** Simptomatinis alerginio rinito ir lėtinės idiopatinės dilgėlinės gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. vaikai: 10 mg 1 kartą per parą; 2-12 m. vaikai: sergantiems daugiau kaip 30 kg – 10 mg 1 kartą per parą. Tabletes galima vartoti neįprastai mažu nuo valgyimo laiko. Pacientams, sergantiems sunkiu kepenų funkcijos nepakankamumu, skiriama pradine 10 mg doze kas antrą dieną. **Kontraindikacijos:** Loratadino tablečių vartoti negalima, jeigu padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Loratadine Actavis“; jeigu yra sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas (tokiems pacientams gydymojo gali skirti vartoti šio vaisto kas antrą dieną). Antihistamininiai vaistiniai preparatai gali susilpninti odos hipergigros reakcijas arba neleistų joms pasireikšti, todėl loratadino tablečių vartojimą reikėtų nutraukti mažiausiai prieš 48 val. iki alerginių odos mėginių. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Reklamos peržiūros data:** 2024 m. balandis. OTC-LT-00036

IKI **-50%****NATASPIN®****SPEC. MED. PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAS, MAISTO PAPILAI**

„NatAspin“ – tai inovatyvus, daugiavertis sprendimas kraujotakai, įkvėptas japonų ilgaamžiškumo filosofijos. Sudėtyje naudojami išskirtiniai aukštos kokybės standartizuoti augaliniai ekstraktai, bioktyvūs fermentai, vitaminai ir mineralai. Kiekviena formulė sukurta taip, kad organizmas gautų naują jau nuo pirmos kapsulės:

- kraujotakai ir kraujagyslėms,
- cholesterolio kontrolei,
- gliukozės kontrolei ir angliavandenių apykaitai,
- ląstelių apsaugai nuo oksidacinės pažeidimo.

**„NATASPIN“ – SUTEIKITE GYVYBĖS KRAUJOTAKAI.**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

**VENOMS**NUO **9<sup>99</sup>** €**HESIO**

HESIO 500 mg, 30 pėvelė dengtų tablečių **9<sup>99</sup> €**  
 HESIO 500 mg, 60 pėvelė dengtų tablečių **18<sup>99</sup> €**  
 HESIO 500 mg, 120 pėvelė dengtų tablečių **35<sup>99</sup> €**  
 HESIO 1000 mg, 30 pėvelė dengtų tablečių **18<sup>99</sup> €**

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Kiekvienoje „Hesio“ 500 mg tablete yra 500 mg mikronizuotų flavonoidų (atitinka 450 mg diosmino ir 50 mg kitų flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną). Kiekvienoje „Hesio“ 1000 mg tablete yra 1000 mg mikronizuotų flavonoidų (atitinka 900 mg diosmino ir 100 mg kitų flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną). **Terapinės indikacijos.** „Hesio“ skirtas suaugusiųjų lėtinio kojų venų nepakankamumo simptomams (kojų sunkumai, kojų patinimai, skausmai, naktiniam kojų mėšlungiui) lengvinti; paūmėjusio hemorojaus simptomams (skausmai, kraujavimai ir patinimai išangės srityje) lengvinti. **Dovavimas ir vartojimo metodas.** „Hesio“ 500 mg tabletes: lėtinis venų nepakankamumas: rekomenduojama dozė suaugusiems yra 2 tabletės per parą 2 mėnesius: 1 tabletė vidurdienį ir 1 tabletė vakare valgio metu. Jei simptomai išlieka, gydymas gali būti tęsiamas dar 2 mėnesius; hemorojaus paūmėjimas: pirmas 4 gydymo dienas rekomenduojama dozė suaugusiems yra 3 tabletės 2 kartus per parą (6 tabletės per parą). Kitas 3 dienas – 2 tabletės 2 kartus per parą (4 tabletės). Tabletės vartokite valgio metu. „Hesio“ 1000 mg tabletes: lėtinis venų nepakankamumas: rekomenduojama dozė suaugusiems yra 1 tabletė per parą 2 mėnesius valgio metu. Jei simptomai išlieka, gydymas gali būti tęsiamas dar 2 mėnesius; hemorojaus paūmėjimas: pirmas 4 gydymo dienas rekomenduojama dozė suaugusiems yra 3 tabletės per parą (1 tabletė 3 kartus per parą arba 1 tabletė pirmą kartą ir 2 tabletės antrą kartą per parą). Kitas 3 dienas – 1 tabletė 2 kartus per parą (2 tabletės). Tabletės vartokite valgio metu. **Kontraindikacijos.** „Hesio“ vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vaikams ir paaugliams „Hesio“ vartoti nerekomenduojama. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025 m. gegužės mėn. ID:00746631

5<sup>99</sup> €**DEEP RELIEF**50 mg/30 mg/g gelis, 50g  
**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

1 g gelio yra 50 mg ibuprofeno ir 30 mg levomentolio. Terapinės indikacijos: Lokalus sąnario aplinkos minkštųjų audinių uždegimo ir (ar) traumos (pvz., patempimo, išnirimo) sukeltos skausmo malšinimas. **Dovavimas:** Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: gėlį vartoti iki 3 kartų per parą, bet ne dažniau kas 4 valandas. Tepėti reikia apie 1–4 cm gelio iš 50 g pakuotės. Vienam centimetrui gelio iš 50 g tubelės yra vidutiniškai 50 mg ibuprofeno. 4 cm, iš 50 g tubelės yra vidutiniškai 125 mg ibuprofeno. Neviršyti nurodytų dozių. Jeigu simptomai nepraeina per penkis dienas, kreiptis gydytoja. Vaikų populiacija: Duomenų apie „Deep Relief“ saugumą ir veiksmingumą jaunesniems kaip 12 metų vaikams nėra. Vartojimo metodas: Plonu gelio sluoksniu tepi skaudamą vietą, švelniai masažuoti, kol susigers. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas aspirinui ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, įskaitant ir vartojamus per burną. Astma sergantys pacientai, kuriems aspirinas arba kiti nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, gali sukelti astmos priepuolį, niežėjimą, rinیتą ar dilgėlinę. Nubrodzinta, pažeista infekcijos ar uždegimo oda arba plotai be viršutinios odos sluoksnio. Kiti toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu lokaliai vartojami vaistiniai preparatai. Vartojimo vietoje esanti infekcija. Paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: „Deep Relief“ gelio sudėtyje yra propilenglikolio, kuris gali sukelti odos sudirginimą. Gelio netepti ant (arba) šalia gleivinės ir akių. Netinka tepi po sandarinamųjų tvarsių. Pirmą kartą išbandyti ant mažo odos ploto. Vartoti tik ant odos. Registratojas ir gamintojas: The Menthoholam Company (Ireland) Limited, Airija. **„DEEP RELIEF“ – VĖSINANTIS IR GREITAI VEIKIANTIS TEPALAS NUO SKAUSMO!**

IKI **-45%****OMRON MEDICINOS PRIETAISAI**

Japonų prekių ženklas „Omron“ medicinos prietaisais tiksliai išmatuos kraujospūdį, kūno temperatūrą, inhaliatorių palengvins kvėpavimą. **„OMRON“ – PATIKIMAS SVEIKATOS PARTNERIS!**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

**EFEKTYVUS IR PATOGUS NAGŲ GRYBELIO GYDYMAS**NUO **19<sup>99</sup>** €

**POSAMYK, 78,22 mg/ml, vaistinis nagų lakas, 3,3 ml 19<sup>99</sup> €**  
**POSAMYK, 78,22 mg/ml, vaistinis nagų lakas, 6,6 ml 29<sup>99</sup> €**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** 1 ml yra 78,22 mg terbinafina. **Terapinės indikacijos:** suaugusiųjų, sergančių lengva ar vidutinio sunkumo nagų grybeline infekcija, gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** per pirmąsias 4 gydymo savaites „Posamyk“ ant pakenktų nagų reikia tepi 1 kartą per parą, vėliau – 1 kartą per savaitę. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas terbinafinui arba pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** vartoti tik išorškai. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS240315897. Teksto patvirtinimo data 2024-03-13.

**-40%****SYSTANE HYDRATION MDPF**10 ml **16<sup>99</sup> 10<sup>18</sup> €**

Ilgalaikis palengvėjimas sausoms akims. Sudėtyje yra hialurono rūgšties, skirtos pažangiam drėkinimui.

SYSTANE HYDRATION MDPF drėkinamieji akių lašai yra skirti akių sausumo sukeliantiems deginimui ir dirginimui laikinai palengvinti. Drėkinamieji akių lašai SYSTANE HYDRATION MDPF yra sterilūs tirpalas be konservantų, kurio sudėtyje yra natrio hialuronato, polietileno glikolio 400, propileno glikolio, hidroksipropilo guaro, sorbitolio, ammonio metilpropanolio, boro rūgšties, natrio borato, kalio chlorido ir išgryninto vandens. Sudėtyje gali būti vandenilio chlorido rūgšties ir (arba) natrio hidroksido (ph korektoriai).

**SYSTANE ULTRA MDPF,**10 ml **14<sup>99</sup> 8<sup>98</sup> €**

BE KONSERVANTŲ

Drėkinamieji akių lašai, skirti akių sausumo sukeliamam deginimui ir dirginimui laikinai palengvinti. Taip pat drėkina kontaktinius lęšius, mažina kontaktinių lęšių neįėjimo sukeliamą diskomfortą ir padeda palaikyti smulkių dalelių, galinčių sukelti dirginimą ir (arba) diskomfortą. Galiojimo laikas: 3 mėnesiai nuo atidarymo dienos.

**SYSTANE GEL DROPS**10 ml **17<sup>99</sup> 10<sup>78</sup> €**

Papildoma sausoms akims raktinės medžiagos. Didžiausiu hidroksipropilo guaro kiekiu pasidėtyje drėkinamieji akių lašai SYSTANE produktų linijos, ant akies paviršiaus suformuoja gelinį sluoksnį ir sušvelnina akių sausumą, skausmą, deginimo jausmą bei sudirginimą. Galiojimo laikas: 3 mėnesiai nuo atidarymo dienos.

**SYSTANE BALANCE**10 ml **17<sup>99</sup> 10<sup>69</sup> €**

Papildoma sausoms akims raktinės medžiagos. Drėkinamieji akių lašai pacientams, kurių akių sausumas yra susijęs su Meibomio liaukų disfunkcija. Lašai skirti sausoms, patinusioms, sudirgusioms bei sąsajoms akims. Galiojimo laikas: 3 mėnesiai nuo atidarymo dienos.

**MEDICINOS PRIEMONĖS**



NUO RĖMENS

2<sup>99</sup> €



OMEPRAZOLE INTELI

20 mg, 14 skrandyje neiurių kietųjų kapsulių

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS.** „Omeprazole Inteli“ sudėtyje yra aktyvios medžiagos omeprazolo. „Omeprazole Inteli“ mažina rūgšties kiekį Jūsų skrandyje. Vaistas vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refluksio simptomų (rėmens ir rūgšties atpylimo) gydymui. „Omeprazole Inteli“ vartoti negalima jeigu Jūs esate alergiškas omeprazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (nurodyta informaciniame lapelyje); jeigu Jūs esate alergiškas kitiems vaistams, priklausantiems protonų siurblio inhibitorių grupei (pvz., pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, ezomeprazolui); jeigu Jūs vartojate vaisto, kurio sudėtyje yra neflinavio (vartojamo nuo ŽIV infekcijos). Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Omeprazole Inteli“. Ypač jei vartojate informaciniame lapelyje išvardytų vaistų. Neštumas ir žindymo laikotarpis. Prieš vartodama „Omeprazole Inteli“, pasakykite savo gydytojui, jog esate nėščia ar ketinate pastoti. Tokiu atveju gydytojas nuspręs, ar šiuo laiku Jums galima vartoti „Omeprazole Inteli“. Kaip vartoti „Omeprazole Inteli“. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Rekomenduojama dozė yra viena 20 mg kapsulė vieną kartą per parą kol išnyksta simptomai, bet ne ilgiau kaip 14 parų. Kad sumažėtų simptomai, gali tekti kapsulių vartoti 2–3 paras iš eilės. Jei po 14 parų laikotarpio simptomai neišnyksta, kreipkitės į savo gydytoją. Galimas šalutinis poveikis. Šis vaistas, kaip ir kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Nedelsdami nutraukite „Omeprazole Inteli“ vartojimą ir kreipkitės į gydytoją, jeigu pastebite kurį nors iš šio reišio, bet sunkaus šalutinio poveikio atveju: staiga prasidėjo švokštimas, lūpų, liežuvio, gerklų ar kūno tinimas, išbėrimas, alpimas ar sutrūkijimas (sunki alerginė reakcija); paraudo, tapo pūslėta ir lupasi oda. Taip pat gali atsirasti lūpų, akių, burnos ertmės, nosies, lytinių organų pūslėtimas ar kraujavimas (tai gali būti Stevens-Johnson sindromas arba toksiinė epidermolizė); pagelto oda, patamsėjo šlapimas ir atsirado nuovargis (šie simptomai gali rodyti sutrikusią kepenų funkciją). Ši informacija paskutinį kartą peržiūrėta 2023.01.02.

4<sup>99</sup> €



SEPTANAZAL

SEPTANAZAL VAIKAMS 0,5 mg/50 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml  
SEPTANAZAL SUAUGUSIESIEMS 1 mg/50 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml  
Ksilometazolino hidrochloridas / Dekspantenolis

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

„Septanazal“ nuo 6 metų amžiaus vartojamas:  
- nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) bei gleivinės pažeidimo gijimui skatinti;  
- nealerginiam nosies gleivinės uždegimui (vazomotoriniam rinitui) lengvinti;  
- kvėpavimo pro nosį pasunkėjimui po nosies operacijos šalinii.

Rekomenduojama dozė 6 metų bei vyresniems vaikams yra po vieną įpurškimą į kiekvieną šnervę iki 3 kartų per parą.

**Kontraindikacijos.** „Septanazal“ suaugusiems vartoti negalima, jeigu yra alergija ksilometazolino hidrochloridui, dekspantenoliui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu Jums arba Jūsų vaikui yra sausasis nosies gleivinės uždegimas ir atsiranda šauš (sausasis rinitas), jeigu Jums arba Jūsų vaikui buvo chirurginiu būdu pašalinta posmegeninė liauka arba buvo atlikta kita operacija, susijusi su smegenų dangalais. **Specialūs įspėjimai.** „Septanazal“ galima vartoti tik atidžiai vertinus riziką ir naudos santykį, jeigu: pacientas yra gydomas monoaminoksidazės inhibitoriais (MAOI) ar kitokiais kraujospūdį didinančiais vaistiniais preparatais, yra padidėjęs akispūdis (ypač jei sergama uždarą kampos glaukoma), pacientas serga sunkia širdies ir kraujagyslių liga, yra leichorachizma, yra metabolinių sutrikimų, yra porfirija, yra prostatos hiperplazija. **Teksto peržiūra data:** 2023.11.20.

**ATKĖMSA UŽGULUSIĄ NOSĮ IR ŠVELNIAI GYDO IŠSAUSEJUSIĄ NOSIES GLEIVINĘ.**

3<sup>99</sup> €



ZYRTEC

ZYRTEC, 1 mg/ml, geriamasis tirpalas, 75 ml  
ZYRTEC, 10 mg, 10 pėlele dengtų tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veiklijoji medžiaga ir stiprumas:** cetirizino dihidrochloridas, 10 ml (atitinka 2 matavimo šaukštus) yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido; 1 pėlele dengtoje tableteje yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** „Zyrtec“ 1 mg/ml geriamasis tirpalas skirtas suaugusiems ir 2 m. bei vyresniems vaikams, „Zyrtec“ 10 mg pėlele dengtos tabletės skirtos suaugusiems ir 6 m. bei vyresniems vaikams: sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito simptomams (nosies ir akių) palengvinti; dilgėlinei palengvinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** geriamasis tirpalas turi būti nuryjamas. Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: rekomenduojama dozė yra 10 mg 1 kartą per parą, t. y. 10 ml geriamojo tirpalo (2 pilni matavimo šaukštai). Vartojimas vaikams nuo 6 iki 12 m. amžiaus: rekomenduojama dozė yra 5 mg 2 kartus per parą, t. y. 1 pilnas matavimo šaukštus 2 kartus per parą. Vartojimas vaikams nuo 2 iki 6 m. amžiaus: rekomenduojama dozė yra 2,5 mg 2 kartus per parą, t. y. 2,5 ml geriamojo tirpalo (pusė matavimo šaukšto) 2 kartus per parą. Tabletės reikia nuryti, užsigeriant stikline skysčiu. Šią tablete galima padalyti į 2 lygias dalis. Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: rekomenduojama dozė yra 10 mg 1 kartą per parą. Pacientai, kurių inkstų funkcija sutrikusi: pacientams, kurių inkstų funkcija vidutiniškai sutrikusi, rekomenduojama vartoti 5 mg 1 kartą per parą. Jeigu sergate ar Jūsų vaikas serga inkstų liga, kreipkitės į gydytoją, kuris gali dozė atitinkamai pakoreguoti. **Kontraindikacijos:** „Zyrtec“ vartoti draudžiama: jeigu sergate sunkia inkstų liga, kai reikalingos dializės; jeigu yra alergija cetirizino dihidrochloridui, bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, hidroksiziniui arba bet kuriam piperazino dariniui (glauzdži susijusiai kiti vaistų veikliajai medžiagai). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Zyrtec“. **Detali informacija** – preparato charakteristikų santraukoje, kurią rasite VVKT prie LR SAM tinklalapyje <http://www.vvkt.lt>. Reklamos teksto parengimo data 2025-02. 2502\_PC\_Zyrtec\_A101\_LT

NUO RAUMENŲ IR SĄNARIŲ SKAUSMO

5<sup>99</sup> €



VIPROSAL B®

VIPROSAL B®, tepalas, 50 g 5<sup>99</sup> €  
VIPROSAL B®, tepalas, 75 g 7<sup>99</sup> €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** 1 g tepalo yra 0,05 V gvačių nuodų, 10 mg salicilo rūgšties, 30 mg raceminio kamparo ir 30 mg terpentino eterinio aliejaus. **Indikacijos:** sąnarių ir raumenų skausmų malšinii. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** nedidelis „Viprosal B“ kiekis (5–10 g, t. y. 1 ar 2 arbatiniai šaukštėliai, atsižvelgiant į pažeistos vietos plotą) užtepamas ant skaudamos vietos ir įtrinamas į odą 1 arba 2 kartus per parą. Tepti ant odos. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veiklosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, odos opa ar kitos odos ligos. **Specialūs įspėjimai:** „Viprosal B“ negalima tepti ant pažeistos odos. Saugotis, kad tepalo nepatektų ant gleivinės ar į akis. Vietinis rinkodaros teisės turėtojas atstovs: UAB Grindex Kalceks Lietuva, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2025-03-20.

**ISMINTINGAS SPRENDIMAS NUO SKAUSMO!**

NERVŲ SISTEMAI

3<sup>99</sup> €



NEUROMULTIVIT

20 pėlele dengtų tablečių 3<sup>99</sup> €  
100 pėlele dengtų tablečių 15<sup>99</sup> €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Indikacijos:** „Neuromultivit“ yra vitamino B<sub>1</sub> ir vitamino B<sub>6</sub>, kurie yra ypač svarbūs užtikrinant normalias nervų sistemos medžiagų apykaitos funkcijas, derinys. Vartojant nervų sistemos ligų gydymui B grupės vitaminai atstato jų stoką organizme ir skatina nervinio audinio natūralų gijimo procesą. **„Neuromultivit“** vartojamas esant B grupės vitaminų stokos sukeltiems negalavimams. Vitaminas B<sub>1</sub> pasižymi skausmą malšinančiu poveikiu. **Vartojimas:** rekomenduojama dozė yra viena tabletė kartą per parą. Pavienias atvejais paros dozė galima padidinti iki 3 tablečių. Tabletės reikia nuryti nesukramtytas po valgyimo ir užsigeriti truputį skysčio. **Kontraindikacijos:** retai pasitaiko nespecifinių požymių – vėmimas, galvos skausmas ir svagiumas. Mažiau tikėtinos padidėjusio jautrumo reakcijos, kurios vartojant vitaminus B<sub>1</sub> arba B<sub>6</sub> dažniausiai reikšiasi požymiais odoje. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Neuromultivit“ vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas vitaminui B<sub>1</sub>, vitaminui B<sub>6</sub>, vitaminui B<sub>12</sub> arba bet kuriai pagalbinei „Neuromultivit“ medžiagai. Negalima vartoti vaikams ir paaugliams (jaunesniems negu 18 metų) dėl per didelio veikliųjų medžiagų kiekio. Nedelsiant pranešti gydytojui, jei yra kontraindikacijų vaisto vartojimui, atsirado šalutinio poveikio požymių ar pastojote. Reikėtų vengti vartoti didesnę vaisto dozę ilgiau nei 4 savaites. Vitaminas B<sub>6</sub> gali sumažinti kartu vartojamos L-dopos poveikį. **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:** G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lammach, Austrija. **Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį RTT atstovą:** UAB „GL Pharma Vilnius“, A. Jakšto g. 12, Vilnius, tel. (8 5) 261 0705, el. paštas: [office@gl-pharma.lt](mailto:office@gl-pharma.lt); [www.gl-pharma.lt](http://www.gl-pharma.lt). Reklamos teksto parengimo data: 2025 04 07.

ALERGIJOS SIMPTOMAMS LENGVINTI

3<sup>99</sup> €



BILASTINE STADA, 20 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** kiekvienoje tableteje yra 20 mg bilastino. **Terapinės indikacijos:** vartojamas šienligės (kuriai būdingi simptomai yra čiaudulys, niežulys, sloga, užgulta nosis, paraudusios ir ašarojančios akys) ir kitų alerginės slogos formų simptomams lengvinti. Taip pat gali būti vartojamas nežiintiems odos berimams (pūkslės, dilgėlinė) gydyti. Skirtas suaugusiems ir 12 m. bei vyresniems paaugliams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** rekomenduojama dozė yra 1 tabletė per parą. Tablete reikia nuryti nevalgius, 1 val. prieš valgi arba sulčių gėrimą, arba praėjus 2 val. po valgyimo arba sulčių gėrimo. Nuryti tablete užsigeriant stikline vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** esant vidutinio sunkumo arba sunkiam inkstų funkcijos sutrikimui, jei vartojami kiti vaistai (pvz., ketokonazolas, eritromicinas, diltiazemas, ciklosporinas, ritonaviras, rifampicinas), reikia vengti vartoti kartu su bilastinu. Reklamos teksto parengimo data 2024-12.



2<sup>99</sup> €

## PARACETAMOLIS SANITAS

500 mg, 20 tablečių

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 tablete yra 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikis karščiavimo mažinimas, silpno ir vidutinio stiprumo skausmo malšinimas (pvz.: galvos, dantų, gerklės, raumenų, mėnesinių). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** įprastinė rekomenduojama vienkartinė dozė suaugusiems yra 1 tabletė kas 4 val., sunkiais atvejais – 2 tabletės kas 6 val., bet ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. Vartoti per burną. Vaistą vartojant valgio metu, mažiau dirginamas virškinimo traktas. Tablete reikia užgerti ne mažiau kaip 250 ml sulčių, pieno ar vandens, jos kramtyti negalima. **Kontraindikacijos:** alergija paracetamolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, pacientas jaunesnis negu 6 m., sunkus kepenų ar inkstų nepakankamumas; sunkus, nepakankamai kontroliuojamas širdies nepakankamumas; nėštumas; vaikai ir paauguliai iki 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu esate alergiškas acetilsalicilo rūgščiai, persigrote arba dabar sergate sunkia kepenų liga ar viruso sukeltu ūminiu kepenų uždegimu, sutrikusi inkstų funkcija, turite gimtą bilirubinemiją, jums yra kai kurių fermentų, skaldančių gliukozę, trūkumas, esate senyvas, sergate sunkia liga arba jeigu širdies ir kraujagyslių sistemos veikia susilpnėjusi, sergate alkoholiizmu. **Reklamos teksto parengimo data** 2024-11-14.

## PĖDŲ IR ODOS GRYBELIUI GYDYTI

NUO 7<sup>99</sup> €

## EXODERIL

Exoderil 10 mg/ml odos tirpalas, 10 ml 7<sup>99</sup> €  
Exoderil 10 mg/ml odos tirpalas, 20 ml 12<sup>99</sup> €  
Exoderil 10 mg/g kremas, 15 g 7<sup>99</sup> €  
Exoderil 10 mg/g kremas, 30 g 12<sup>99</sup> €

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 grame vaisto yra 10 mg naftifino. **Terapinės indikacijos:** „Exoderil“ tirpalas naudojamas pėdų grybeliui gydyti. „Exoderil“ kremas naudojamas rankų, pėdų, odos grybeliams, įvairiaspalvių dėdėlių bei uždegiminių dermatozėms gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** pažeistą odą ir aplink ją esantį plotą tepti 1 kartą per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas naftifinui arba pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** saugoti, kad vaistas nepatektų į akis ir atviras žaizdas. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Ulpės g. 214, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS240336088. Teksto patvirtinimo data 2024-03-13.

## TEMPERATŪRAI MAŽINTI IR SKAUSMUI MALŠINTI

NUO 3<sup>99</sup> €

## IBUGARD

100 mg/5 ml geriamoji suspensija, 120 ml 3<sup>99</sup> €  
200 mg/5 ml geriamoji suspensija, 100 ml 7<sup>99</sup> €

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 5 ml IBUGARD 100 mg/5 ml geriamosios suspensijos yra 100 mg ibuprofeno, 5 ml IBUGARD 200 mg/5 ml geriamosios suspensijos yra 200 mg ibuprofeno. **Terapinės indikacijos:** Ivarios kilmės karščiavimo, ivarios kilmės silpno ir vidutinio stiprumo skausmo, tokio, kaip virusinės ar kitokios infekcijos sukeltos galvos, gerklės ir raumenų skausmai; sąnarių ir kaulų skausmai; pooperacinio skausmo; danties skausmo, galvos skausmo; ausies skausmo, esant vidurinės ausies uždegimui, mažinimai. Vartojimo būdas ir dozavimas: nustatant ibuprofeno dozę, reikia atsižvelgti į paciento kūno svorį ir amžių. Paprastai vienkartinė ibuprofeno dozė yra 7–10 mg/kg kūno svorio, maksimali paros dozė yra 20–30 mg/kg kūno svorio. Dozė galima kartoti kas 6–8 valandas, tarp dozių turi būti ne mažesnis nei 4 valandų intervalas. Tik trumpalaikiam vartojimui. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas ibuprofenui, aspirinui ar kitam nesteroidiniam vaistui nuo uždegimo (NVNU), arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei sergate ar sirgote skrandžio ir (arba) dvilypkapištes žarnos opa ar kraujavimu iš virškinamojo trakto; sergate sunkiu kepenų, širdies ar inkstų funkcijos sutrikimu. Yra polinkis į kraujavimą. **Specialūs įspėjimai:** specialų atsargumo priemonių reikia, jei inkstų, kepenų ar širdies funkcija yra sutrikusi, sutrikęs kraujo krešėjimas arba vartojami antikoagulantai, sergama cukriniu diabetu, raudonąja vilkine, krono liga, opiniu kolitu, hipertenzija, astma, šienlige, yra nosies polipų ar lėtinų infekcinių kvėpavimo takų ligų. Teksto paruošimo data 2024 01 mėn.

NUO 2<sup>99</sup> €

## THROMBO ASS

THROMBO ASS 50 mg, 100 skrandyje neirių tablečių 2<sup>99</sup> €  
THROMBO ASS 75 mg, 100 skrandyje neirių tablečių 3<sup>99</sup> €  
THROMBO ASS 100 mg, 100 skrandyje neirių tablečių 5<sup>99</sup> €

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veiklioji medžiaga:** acetilsalicilo rūgštis. **Terapinės indikacijos:** miokardo infarkto rizikos mažinimas sergantiems krūtinės angina. Antrinė miokardo infarkto profilaktika. Trombozės profilaktika po vainikinių arterijų nuosėdų operacijos. Antrinė praeinančio smegenų išemijos priepuolio (PSP) ar insulto profilaktika. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti po 1 tabletę 1 kartą per dieną (patariama vakare). Skrandyje neirią tabletę reikia nuryti nesukramtytą, užsigeriant pakankamu skysčiu kiekį valgio metu arba tarp valgių tuo pačiu paros metu. Įprastinė paros dozė ilgalaikiam vartojimui yra 50–150 mg. Dalyti į dalis „Thrombo ASS“ skrandyje neiros tabletes negalima, nes bus pažeista skrandyje neiri plėvelė. Norint, kad tikty individualiam vartojimui, reikia rinktis atitinkamo stiprumo preparatą (50 mg, 75 mg ir 100 mg). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei salicilatams ir kitiems NVNU; bronchų spazmas; ūminė pepsinė opa; polinkis į kraujavimą, hemofiliją; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; sunkus, nepakankamai kontroliuojamas širdies nepakankamumas; nėštumas; vaikai ir paauguliai iki 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Atsargumo reikia laikytis šiais atvejais: sergant bronchine astma, šienlige, esant nosies gleivinės paburkimui ir esant kito pobūdžio alergijai; vartojant kartu su vaistais, mažinančiais kraujo krešumą; sergant hemolizine anemija; esant skrandžio ir žarnų sutrikimams, esant anamnezėje duomenims apie opalę ar kraujavimą iš virškinimo trakto; esant inkstų ligoms ir (arba) kepenų funkcijos sutrikimui; turintiems polinkį podagrai. Prieš numatytą operaciją 10 dienų acetilsalicilo rūgštis reikia nevartoti. Šio vaisto sudėtyje yra laktozės monohidrata, todėl vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas lėp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pakuotė: 50 mg, 75 mg arba 100 mg; 100 skrandyje neirių tablečių. Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas: G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. Reklamos teksto parengimo data: 2025 04 07.

## NERVINIS ĮTAMPOS MAŽINIMAS IR UŽMIGIMO LENGVINIMAS

3<sup>99</sup> €

## PERSEN

PERSEN, 40 dengtų tablečių.  
PERSEN FORTE, 20 kietųjų kapsulių.

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** PERSEN tablete yra 35 mg valerijonų šaknų sausosio alkoholinio ekstrakto, 175 mg melisų lapų sausosio ekstrakto, 175 mg pipirmėčių lapų sausosio ekstrakto. **PERSEN FORTE** kapsulėje yra 87,5 mg valerijonų šaknų sausosio alkoholinio ekstrakto, 175 mg melisų lapų sausosio ekstrakto, 175 mg pipirmėčių lapų sausosio ekstrakto. **Indikacijos:** Vartoti laikinos nedidelės nervinės įtampos mažinimui, pasunkėjusio užmigimo lengvinimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** **PERSEN:** Nervinės įtampos atveju reikia gerti po 3-4 PERSEN tab. 3 kartus per parą. Pasunkėjusio užmigimo atveju reikia gerti 3-4 PERSEN tab. 1 kartą per parą 1 val. prieš miegą. Tabletes reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai nuo valgyimo laiko. **PERSEN FORTE:** Nervinės įtampos mažinimui reikia gerti po 2 PERSEN FORTE kaps. 2 kartus per parą. Pasunkėjusio užmigimo atveju reikia gerti 2 PERSEN FORTE kaps. 1 kartą per parą 1 val. prieš miegą. Kapsules reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai nuo valgyimo laiko. **PERSEN ir PERSEN FORTE** pradeda veikti palaipsniui, kad gydymo veiksmingumas būtų optimalus, vaisto rekomenduojama gerti mažiausiai 14 dienų. Gydymo trukmė neribojama. **PERSEN ir PERSEN FORTE** nėra skirtas jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** PERSEN tablečių sudėtyje yra laktozės ir sacharozės. **PERSEN FORTE** kapsulių sudėtyje yra laktozės. Reklamos teksto parengimo data: 2025 m. gegužės mėn. ID:000746625 „PERSEN“ – NURAMINK SAVO RŪPESČIUS!

## VYRŲ IR MOTERŲ PLAUKŲ SLINKIMO GYDYMUI

NUO 19<sup>99</sup> €

## MINOXIDIL INTELI

MINOXIDIL INTELI 2 % odos tirpalas 60 ml 19<sup>99</sup> €  
MINOXIDIL INTELI 5 % odos tirpalas 60 ml 24<sup>99</sup> €

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veiklioji medžiaga:** minoksidilis. **MINOXIDIL INTELI 5 %** odos tirpalas vartojamas gydyti vidutinio stiprumo vyrų nuplikimą, susijusį su hormonais. Gydymas šiuo tirpalu rekomenduojamas pacientams po nesėkmingo 4 mėnesių gydymo MINOXIDIL INTELI 2 % odos tirpalu. **Kaip vartoti MINOXIDIL INTELI:** MINOXIDIL INTELI 2 % ar MINOXIDIL INTELI 5 % odos tirpalą visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. **Dozavimas:** MINOXIDIL INTELI 2 % odos tirpalą reikia tepti ant pažeistos galvos odos po 1 ml (10 pušukilio paspaudimų) kas 12 valandų. Nesvarbu, koks alopecijos plotas, rekomenduojama dienos dozė visada tokia pati. Maksimali dienos dozė yra 2 ml (20 paspaudimų). **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas minoksidiliui arba bet kuriai pagalbinei MINOXIDIL INTELI medžiagai. Dėl galimo kitų kūno vietų plaukuotumo padidėjimo, MINOXIDIL INTELI 5 % moterims vartoti negalima. MINOXIDIL INTELI 5 % odos tirpalą draudžiama vartoti jaunesniems kaip 18 ir vyresniems kaip 65 metų asmenims. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Pacientams su galvos odos dermatologine ligimi ar rezorbuoliu po oda. Prieš pradėdant vartoti MINOXIDIL INTELI 5 % reikėtų pasitikrinti sveikatą. Dėl preparato esančio propilenglikolio poveikio gali atsirasti sudirginimas ir kontaktinis dermatitas. Pacientams, kurie sirgo širdies ir kraujagyslių ligomis, MINOXIDIL INTELI reikia vartoti ypąc atsargiai dėl galimo sisteminio preparato poveikio. Vartojant MINOXIDIL INTELI reikia saugotis, kad preparato nepatektų į akis. Jei preparato atsitiktinai patenka ant jautrių vietų, reikia kruopščiai nuplauti dideliu vandens kiekiu. Teksto peržiūros data: 2021 05 20. „MINOXIDIL INTELI“ ... IR PLAUKAI SUGRĮŽTA...

## NUO RĖMENS

NUO 2<sup>99</sup> €

## RANIGAST S-O-S

RANIGAST S-O-S 12 kramtomųjų tablečių 2<sup>99</sup> €RANIGAST S-O-S 24 kramtomosios tabletės 4<sup>99</sup> €

## MEDICINOS PRIEMONĖ

„Ranigast S-O-S“ yra skirtas gastroezofaginio refliksio simptomams (rėmeniui, skrandžio skausmui, dispepsijai) malšinti.

- Veikia akimirksniu – nuo to momento, kai tik sučiulpste ar išgersite tabletę.
- Dėl ypatingos sudėties apsaugo skrandžio gleivinę ir sumažina rėmens epizodų skaičių.
- Tinka naudoti ir kaip papildoma priemonė sergantiesiems gastritu, peptine opa.
- Galima naudoti nėštumo ir žindymo metu, prieš tai pasitarus su gydytoju.

Suaugusiems ir vaikams nuo 12 metų: rekomenduojama pavalius vartoti 2 tabletes.  
Vaikams (6–12 metų): rekomenduojama pavalius vartoti 1 tabletę.

4<sup>99</sup> €

## ACEMIS 600 mg, 10 tablečių

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

„Acemis“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos aceticisteino. „Acemis“ vartojamas gleivėms skystinti sergant lėtinėmis bronchų bei plaučių ligomis, kurių metu būna sutrikusi gleivių gamyba bei šalinimas suaugusiems. Jeigu per 4–5 dienas Jūsų saviarūšis nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. **Atidžiai perskaitykite visą pakuotės lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.** Visada vartokite šį vaistą tiksliai, kaip aprašyta lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas.

## „Acemis“ vartoti draudžiama:

• Jeigu yra alergija aceticisteinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos informacinio lapelio 6 skyriaus);

• Jeigu pasireiškia jaunesniems negu 18 metų asmenims.

**Nėštumas ir žindymo laikotarpis.** Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. **Kaip vartoti „Acemis“.** Jeigu gydytojo neskirta kitaip, rekomenduojamas toliau nurodytas dozavimas. Suaugusiems žmonėms reikia išgerti 1 dispersuojamąją tabletę (600 mg) kartą per dieną. Neviršyti 600 mg dozės per parą. **Vartojimo metodas.** Vaistas vartojamas po valgio. Dispersuojamąją tabletę reikia ištirpinti stiklinėje šilto vandens ir gerai išmaišyti, kad būtų gautas bespalvis, drumstas geriamasis tirpalas, kurį rekomenduojama išgerti šilta. Gausus skysčių vartojimas stiprina „Acemis“ gleivių skystinamąjį poveikį. **Vartojimo trukmė.** Jeigu Jūsų simptomai sunkėja arba po 4–5 parų gydymo būklė nepagerėja, kreipkitės į gydytoją. **Tekstas pastarajį kartą peržiūrėtas 2025-12-14.** Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje <http://www.vvkt.lt/>.

5<sup>99</sup> €

## TONZIRIN 8,75 mg, 24 kietosios pastilės

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

TONZIRIN 8,75 mg kietosios pastilės yra flurbiprofeno. Flurbiprofenas priklauso vaistų, kurie vadinami nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU), grupei. Šie vaistai pasižymi skausmą ir karščiavimą mažinančiu bei priešuždegiminiu poveikiu. TONZIRIN kietosios pastilės yra vartojamas skaudančios gerklės simptomams palengvinti, tokiems kaip gerklės skausmas, skausmingumas ir patinimas, sunkumas nuryti, suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams. Jei po 3 dienų ligos požymiai išlieka ar pasunkėja, kreipkitės į gydytoją. Prieš pradėdami vartoti TONZIRIN, turite atidžiai perskaityti informacinį lapelį. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti TONZIRIN. TONZIRIN vartoti draudžiama: • jeigu yra alergija; jeigu kada nors buvo pasireikusi astma, netikėtas švokštimas ar dusulys, sloga, veido patinimas ar nežinintis bėrimas (dilgėlinė) pavartojus aspirino ar kitų NVNU; • paskutiniuosius 3 mėnesius; • jeigu Jums yra ar kada nors buvo pasireikę sunkių širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų.

Varavimasis ir mechanizmo valdymas

Tyrinimų poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus nebuvo atlikti.

Tačiau vaistų ir regos sutrikimai yra galimi šaltiniai pavartojus nesteroidinių vaistų nuo uždegimo. Jeigu tokių pasireikimų, nenaurokite ir nevaldykite mechanizmų.

Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams:

• Vieną kietąją pastilę įdėkite į burną ir lėtai čiulpkite. • Čiulpimo metu nuolat judinkite kietąją pastilę burnos ertmėje. • Pastilių gydymas poveikis turėtų pasireikšti po 30 minučių. • Jeigu reikia, vartokite po vieną pastilę kas 3–6 valandas. • Vartoti daugiau kaip 5 kietąsias pastiles per 24 valandas negalima.

Jaunesniems kaip 12 metų vaikams vartoti negalima.

**Nutarkite šio vaisto vartojimą ir nedelsiant susisiekiite su gydytoju, jeigu Jums pasireikia:**

alerginės reakcijos, veido, lietojimo ar gerklės patinimas, širdies ritmo padidėjimas ir kraujospūdžio sumažėjimas, sunkios odos reakcijos.

**Tekstas paskutinį kartą peržiūrėtas 2024-01-12**

## NUO SUMUŠIMŲ

9<sup>99</sup> €

## DOLOBENE™ gelis, 50 g

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 g gėlio yra 500 TV heparino natrio druskos, 150 mg dimetilsulfoksido, 25 mg deksantenolio.

**Terapinės indikacijos:** patinimo, hematomos ir uždegimo po bukus raumenų, sausgyslių, sausgyslių mąščių, raščių, sąnarių traumas gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tepėti geliu pažeistą vietą 1–2 kartus per parą. Nereikia įtrinti, tik švelniai užtepti ir paskleisti. Nenaudoti po oro nepraleidžiančiais tvarštais. „Dolobene“ negalima tepėti ant atviro žaizdos, pažeistos odos ir gleivinės.

**Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sergantiesiems raudonąja vilkige; astma; jaunesniems kaip 5 m. vaikams; esant sunkiems inkstų ir (arba) kepenų pažeidimams, kraujotakos sutrikimams; negalima vartoti kartu su sulindaku. **Specialūs įspėjimai:** nepatariama tepėti ant pažeistos odos ir gleivinės. **Reklamos tekto parengimo data:** 2024 m. balandis. DLBN-LT-00001

## NOSIES GLEIVINĖS PABURKIMUI MAŽINTI

4<sup>99</sup> €

## RHINO-STAS

nosies purškalo, tirpalas, 10 ml

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 ml nosies purškalo yra 10 mg xylometazolino hidrochlorido. **Indikacijos:** „Rhino-stas“ yra simpatikomimetikas. Purškalo siurina kraujagysles, todėl mažina nosies gleivinės paburkimą. Vartojamas trumpalaikiam nosies gleivinės paburkimui mažinti, sergant sloga arba prienosinių ančių uždegimu (sinusitu). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 10 m. vaikams bei paaugliams reikia puršksti po 1 purškimo tirpalo „Rhino-stas“ į kiekvieną nosies landą 1–3 kartus per parą tada, kada reikia. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jei yra sausasis nosies gleivinės uždegimas (sausasis rinitas), pacientams, kuriems pro nosį neseniai buvo atlikta smegenų operacija; jaunesniems kaip 10 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** „Rhino-stas“ galima vartoti tik atidžiai įvertinus jo vartojimo riziką ir galimą naudą šiais atvejais: pacientams, kurie vartojo ar vartoja vaistų nuo depresijos (monoaminooksidazės inhibitorių) arba kitų vaistų, kurie gali labai padidinti kraujospūdį; kai padidėjęs akispūdis, ypač sergant uždarą kampo glaukoma; sergant sunkia širdies ir kraujagyslių sistemos liga (pvz., vainikinė širdies arterijų liga, hipertenzija); sergant feochromocitoma (antinksčių naviku); sergant porfirija; sergant medžiagų apykaitos ligomis (pvz., hipertiroze, cukriniu diabetu). **Pakuotės lapelio peržiūros data** 2018-10-23. **Reklamos teksto parengimo data** 2020-02-03.

**PURŠKALAS „RHINO-STAS“ – PIRMOJI PAGALBA SERGANT SLOGA AR SINUSITU!**

6<sup>99</sup> €

## MAGNEROT

500 mg, 50 tablečių

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekvienoje tabletėje yra 500 mg magnio orotato dihidrato (atitinka 32,8 mg magnio). **Terapinės indikacijos.** Magnio trūkumo, jeigu jis sukelia raumenų veiklos sutrikimą (pvz., mėšlungį), šalinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems žmonėms: jei neskirta kitaip, magnio atsargoms papildyti pirmą savaitę reikia gerti po 2 tabletes 3 kartus per parą, po to – po 2–3 tabletes per parą. **Vaikų populiacija:** „magnerot“ nėra skirtas vaikams iki 18 metų. Vartoti per burną. Tabletę reikia nuryti visą arba sukratyti prieš valgį ar valgant, užgeriant nedideliu kiekiu skysčio. Tabletę reikia vartoti mažiausiai 6 savaites. Galima vartoti ir ilga laiką. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Inkstų funkcijos sutrikimas ir polinkis formuotis kalcio, magnio ir amonio fosfatų akmenims. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Sudėtyje yra laktazės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktazės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktazės malabsorbcija. Sąveika su kitais vaistais: preparatais ir kitokia sąveika. Jei kartu vartojama geležies vaistinių preparatų, magnis gali sutrikdyti geležies absorbciją. Tokie atveju geležies vaistinių preparatų reikia gerti ne anksčiau, kaip praėjus 2–3 val. po magnio vaistinio preparato pavartojimo (arba atvirkščiai). Taip turi būti vartojami ir tetraciklinai bei natrio fluoridas. Nepageidaujamas poveikis. Didelės dozės gali sukelti viduriavimą arba išmatų suminkštėjimą. Sumažinus dozę, toks poveikis išnyksta. **Pakuotė.** 50 tablečių. **Teksto peržiūros data.** 2024.09.26. **Registruotojas.** Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Vokietija.

**ORGANINĖ MAGNIO DRUSKA, LENGVAS PASISAVINIMAS.**



## PERŠALIMO IR GRIPO SIMPTOMAMS LENGVINTI

6<sup>99</sup> €

## GRINITE THERMAL,

milteliai geriamajam tirpalui, 8 paketėliai

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 paketėlyje yra 650 mg paracetamolio, 60 mg pseudoefedrinio hidroklorido, 20 mg dekstrometorfano hidrobromido ir 4 mg chlorfenamino maleato. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikis peršalimo ar gripo simptomų (karščiavimo, nosies užgulimo ir gleivių išsiskyrimo, sauso, erzinančio kosulio, galvos, ryklės ir kaulų bei sąnarių skausmo) lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir paaugliams, vyresniems nei 12 m., – 1 paketėlis kas 4–6 val.; ne daugiau kaip 4 paketėliai per dieną. Paketėlio turinį išpilstyti stiklinėje karšto vandens ir išgerti. **Kontraindikacijos:** alergija bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai; anemija; labai sutrikusi inkstų ar kepenų veikla; vaikas yra jaunesnis nei 12 m.; kosulys, lydimas didelio atkosisų skreplių kiekio; bronchų astma ir kosulys, susijęs su astma; labai padidėjęs kraujospūdis; diabetas; uždarų kampo glaukoma; hipertirozizmas; antinksnių navikas (feochromocitoma); įgimtas gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės trūkumas; ilgalaikis piktnaudžiavimas alkoholiu; šlapimo susilaikymas; sunki širdies ir kraujagyslių liga; cistinė fibrozė; nešumo ar žindymo laikotarpis; mitybos nepakankamumas; vartojama kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio, pseudoefedrinio, dekstrometorfano, chlorfenamino, vaistų, vadinamų simpatomimetikais; antihistamininių vaistų; vartojama ar per pastarąsias 2 savaites vartota monoamino oksidazės inhibitorių. **Specialūs įspėjimai:** pasitarti su gydytoju arba vaistininku, nesiriusiems ir ilgalaikiams nejudrumui; jeigu kepenų ir (ar) inkstų veikla sutrikusi; pasunkėjęs kvėpavimas; emfizema; astma; lėtinis bronchitas; padidėjusi prostata; pernelyg aktyvi skydliaukė; širdies ar arterijų liga; buvęs piktnaudžiavimas vaistais ar psichotropinėmis medžiagomis; paaugliams, jaunesni suaugusiems, senyviams žmonėms; vartojama vaistų nuo nemigos, raminamųjų vaistų, CYP2D6 fermento aktyvumą slopinančių vaistų; vaistų nuo depresijos ar psichozų. Gali sukelti priklausomybę. Gali būti teigiamas dopingo testo rezultatas. Sudėtyje yra sacharozės. Jeigu per 3 dienas savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreiptis į gydytoją. Teksto parengimo data 2024-05-10.

5<sup>99</sup> €

## NUROFLEX 200 mg vaistinis pleistras,

2 vaistiniai pleistrai

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekviename vaistiniame pleistre yra 200 mg ibuprofeno.

**Farmacinė forma.** Vaistinis pleistras: bespalvis, lopus vaistinio preparato sluoksnis, paskirstytas ant 10 cm x 14 cm dydžio lankstaus kieno spalvos austro pagrindo, ir padengtas nuimamu apsauginiu sluoksniu. **Terapinės indikacijos.** „Nuroflex“ skirtas trumpalaikiam lokalaus skausmo, sukeltų ūminio raumėnų patempimo arba lengvų viršutinių ar apatinių galūnių sąnario aplinkos audinių traumų, simptominių gydymui suaugusiems ir 16 metų ar vyresniems paaugliams. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems ar 16 metų ir vyresniems paaugliams: viena dozė yra lygi vienam vaistiniam pleistrai. Didžiausia dozė per vieną 24 valandų laikotarpį yra vienas vaistinis pleistras. Pleistras gali būti vartojamas bet kurio dienos ar nakties metu, tačiau jį reikia nuimti ir naują pleistrą vėl užklijuoti tik tada, kai reikia. Vartoti ant odos ir tik trumpą laiką. Vaistinis pleistras turi būti naudojamas vienas, jo negalima karpyti. Klijuojama tik ant sveikos odos. Gydymasis pleistru neturi būti vartojamas kartu su kitais vaistais. Prieš užklijuojant vaistinį pleistrą rekomenduojama kruopščiai nuplauti ir išdžiovinti gydymą kieno paviršių. Pirmiausia pašalinti centrinę apsauginio sluoksnio dalį, skirtą apsaugoti lūpančio pagrindo paviršių, ir užklijuoti pleistrą šia lūpana apie skaudančio ploto. Kai pleistras yra reikiamoje vietoje, pašalinti apsauginio sluoksnio dalis, esančias pleistro kraštuose. Vaistinis pleistras yra lankstus ir paslankus, todėl prieitus gali būti užklijuotas ant arba šalia sąnario, tokiu būdu leisdamas jam normaliai judėti. Venkite vaistinio pleistro drekinimo. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai vaisto pagalbinei medžiagai. Jeigu praėjus 14 dienų po vaisto pleistro naudojimo (pvz., astma, bronchų spazmas, rinitas, angioneurozinė edema ar dilgėlinė) vartojant ibuprofeno, acetoilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistinių preparatų nuo uždegimo (NNUV). Vartojimas ant įtrinkusios ar pažeistos odos. Tiesiasis nešumo trimestras. Vartojimas ant akių, lūpų ar gleivinių. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei simptomai išlieka ilgiau nei 5 paras arba pablogėja, reikia pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu. Bronchų spazmas gali pasireikšti pacientams, vartojantiems ibuprofeno, kurie serga arba anksčiau sirgo bronchine astma ar alergija. Gydymą reikia nedešiant nutraukti, jei užklijuojamas vaistinis pleistras atsiranda odos išbėrimas. Pacientai turi būti įspėjami apie gydymo zonos reakciją stipriems natūralaus ir (arba) dirbtinio apšvietimo šaltiniams (pvz., įdegio lempos) gydymo metu ir viena diena po vaistinio pleistro pašalinimo, siekiant sumažinti jauno žmogaus riziką. Pacientams, kuriems yra sutrikusi inkstų, širdies ir kepenų funkcija, buvo arba yra peptinė opa, vėra uždegimas ar hemoraginė diatezė, prieš pradėdami vartoti šio vaistinio preparato, reikia kreiptis į gydytoją. Senyviems pacientams nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo turėtų būti vartojami atsargiai, nes jiems yra didesnė nepageidaujimų poveikio tikimybė. Reklamos tekstas parengtas 2025-02-18.

## DIENAI BE STRESO, GERESNIAM MIEGUI NAKTĮ

6<sup>99</sup> €

## NEUREXAN, 50 tablečių

## HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tabletė yra veikliųjų medžiagų: 0,6 mg *Avena sativa* D2, 0,6 mg *Coffea arabica* D12, 0,6 mg *Passiflora incarnata* D2, 0,6 mg *Zincum isovalerianicum* D4. **Indikacijos. Miego sutrikimų ir nerastingumo lengvinimas.** Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Suaugusiems žmonėms ir paaugliams nuo 12 metų vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Pradžioje, jei simptomai stiprūs, galima vartoti po 1 tabletę kas 0,5–1 val., neviršyti 12 tablečių per dieną. Simptomams palengvėjus, gydymą tęsti įprastine doze. „Neurexan“ saugumas ir veiksmingumas jaunesniems kaip 12 metų vaikams neištyti. Duomenų nėra. Prieš nuryjant tabletę reikia ištrinti burnoje. Ją vartoti likus ne mažiau kaip 30 min. iki valgio. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Neurexan“ sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktozės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. „Neurexan“ nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Registruotojas.** „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). **Registruotojo atstovas.** UAB „Farmahelis“, www.heel.lt. Teksto parengimo data 2022-10-04.

## SĄNARIAMS

9<sup>99</sup> €

## GLUCOSAMIN-RATIOPHARM

1,5 g milteliai geriamajam tirpalui, 20 paketėliai

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 paketėlyje yra 1,5 g gliukozamino sulfato, tai atitinka 1,884 g gliukozamino sulfato natrio chlorido arba 1,778 g gliukozamino. **Terapinės indikacijos:** lengvo ar vidutinio sunkumo kelio osteoartrito sukeltų simptomų lengvinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** paketėlio turinį išpilstyti stiklinėje vandens ir gerti 1 kartą per parą. Gliukozaminas netinka vartoti ūminio skausmo simptomams slopinti. Simptomų palengvėjimas (ypač skausmo) gali pasireikšti vartojant kelias savaites, kartais ir dar ilgiau. Jei simptomai nepalengvėja po 2–3 mėnesių vartojimo, reikia iš naujo spręsti, ar gydymą gliukozaminu tęsti toliau. Miltelius galima vartoti tiek valgio metu, tiek bevalgiu. Gliukozaminą negalima vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas gliukozaminui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. „Glucosamin-ratiopharm“ negalima skirti ligoniams, alergiškiems kiaušiniams, žuvių produktams, nes iš jų išgaunama preparato veiklioji medžiaga. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jei pacientui yra sutrikęs gliukozės toleravimas, prieš skiriant gydymą ir vėliau periodiškai rekomenduojama stebėti gliukozės kiekį kraujyje ir, jei reikia, insulino poreikį. Jei pacientai turi širdies ir kraujagyslių ligų rizikos faktorių, rekomenduojama stebėti lipidų kiekį kraujyje, nes vartojantiems gliukozaminą ligoniams buvo nustatyti keli hipercholesterolemijos atvejai. Buvo aprašytas atvejis, kai, pradėjus gliukozamino terapiją, pablogėjo astmos simptomai. Gliukozaminą negalima vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams, nes neištyrtas vartojimo saugumas ir veiksmingumas. Atsargumas reikalingas, jei pacientui yra fenilketonurija. Šio vaistinio preparato paketėlyje yra 151 mg natrio, tai atitinka 8 % didžiausios P50 rekomenduojamos paros normos suaugusiems, kuri yra 2 g natrio. Dėl sudėtyje esančio sorbitolio šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems yra įgimtas fruktozės netoleravimas. Taip pat sorbitolis gali paveikti kitų kartu vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį prieinamumą. **Reklamos teksto parengimo data 2025-01-22.** GLR-LT-00006

JUDĖJIMUI BE SKAUSMO!

## AKIŲ DIRGINIMO, AŠAROJIMO, PERVERGIMO, VOKŲ KRAŠTŲ UŽDEGIMO LENGVINIMAS

8<sup>99</sup> €

## OCULOHEEL, 3 paketėliai, kurių kiekviename yra 5 vienadozės talpyklės.

## AKIŲ LASAI (TIRPALAS)

## HOMEOPATINIS NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 talpyklė (0,45 ml tirpalo) yra veikliųjų medžiagų: *Euphrasia* D5 10,7 mg, *Cochlearia officinalis* D5 10,7 mg, *Pilocarpus* D5 10,7 mg, *Echinacea* D5 10,7 mg. **Terapinės indikacijos.** Akių dirginimo, ašarojimo, smėlio akys pojūtis, pervingumo, įdėjimo į akis ir voku kraštų uždegimo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Vaikams nuo 6 m. ir suaugusiems žmonėms paprasta reikia lašinti į pačią akį po 1 lašą 3 kartus per dieną. Jei vartojama ir kitokių akių lašų, tarp jų ir „Oculoheel“ akių lašų vartojimo rekomenduojama daryti 15 minučių pertrauką. Kadangi šio vaistinio preparato sudėtyje yra etilinės (*Echinacea*), prieš skiriant jo lėgimams kaip 8 savaitų laikotarpį, rekomenduojamas individualus įvertinimas. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, arba astriinių (gražiažiedžių) šeimos augalams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pagalbinės medžiagos: fosforiniai baltymai. Kiekvienoje šio vaistinio preparato vienadozės talpyklėje yra 2,81 mg fosfatų, tai atitinka 6,25 mg/kg. Kadangi šio vaistinio preparato sudėtyje yra etilinės (*Echinacea*), prieš skiriant jį pacientams, turintiems imuniteto sistemos funkcijos sutrikimų (pvz., progresuojančių sisteminį sutrikimų, autoimuninių ligų, imunodeficitų, imunosupresijos ir baigčių kraujo lėtelių sistemos ligų), rekomenduojamas individualus įvertinimas. Talpyklės turinį galima vartoti tik 1 kartą, t. y. kartą lašinti į kairiąją ir (arba) dešiniąją akį tiek, kiek reikia. Talpyklė reikia atidaryti tik prieš pat vaisto vartojimą. Naudojant talpyklę reikia išvengti, net jeigu joje yra vaistinio preparato likutis. **Registruotojas.** „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). **Registruotojo atstovas.** UAB „Farmahelis“. Reklamos teksto parengimo data 2024-09-05.

NUO 9<sup>99</sup> €

## NICORETTE

NICORETTE COOLMINT 1 mg/išpurškime burnos gleivinės purškalas (tirpalas),

150 išpurškimų 2299 €

NICORETTE INVISPATCH 10 mg/16 h (15 mg/16 h; 25 mg/16 h) transderminis pleistras,

7 transderminiai pleistrai 2299 €

NICORETTE FRESHFRUIT 2 mg (4 mg) vaistinė kramtomoji guma, 30 vienetų 999 €

NICORETTE FRESHMINT 2 mg (4 mg) vaistinė kramtomoji guma, 30 vienetų 999 €

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** vienos gumos yra 2 mg (4 mg) nikotino (režinato pavidalu), viename pleistre yra 15,75 mg (25,62 mg; 39,37 mg) nikotino; kiekviename išpurškime (0,07 ml tirpalo) yra 1 mg nikotino. 1 ml tirpalo yra 13,6 mg nikotino. **Indikacijos:** vaistinė kramtomoji guma, transderminiai pleistrai: priklausomybė nuo tabako gydymui, lengvinant nutraukimo simptomus, kad būtų lengviau laikinai susilaikyti nuo rūkymo, o aspirendus – mesti rūkyti; purškalas: priklausomybė nuo tabako gydymas, sumažinant potraukį nikotinui ir palengvinant nutraukimo simptomus, kurie atsiranda metant rūkyti staiga ar palaipsniui. Tikslas yra visam laikui nutraukti tabako vartojimą. „Nicorette coolmint“ geriausia vartoti kartu su elgesio psichologine programa. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** paprasta pakanka kramtyti 12–12 mm ilgio stiprumo vaistinių kramtomųjų gumų per dieną. Pleistrą reikia priklijuoti ant odos ir vienerių į naktį. Purškalo reikia įkvėpti 1–2 vado duzes tuo laiku, kai paprasta rūkoma, arba jeigu jaučiamas poreikis rūkyti. Galima vartoti iki 4 purškimų per valandą. Negalima pūkti daugiau kaip 2 žvilgsnius 6 kartą, per 24 valandas neviršyti 64 purškimų (4 purškimai per valandą, 16 valandų periode). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas nikotinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Gumos negalima kramtyti vaikams iki 12 metų. Purškalo negalima vartoti jaunesniems kaip 18 m. pacientams, nerūkantiesiems pacientams. **Specialūs įspėjimai:** prieš vartojant „nicorette“, pasitarkite su gydytoju, jeigu turėjote širdies infarktą, insultą, sergate nestabilia arba progresuojančia krūtinės angina, sunkiomis širdies aritmijomis, yra nekontroliuojama hipertenzija. Pacientai, sergantys cukriniu diabetu, pradžiai naudoti nikotino pakaitaliamą terapiją, turi atidžiau sekti savo cukraus kiekį kraujyje. Galima rūkoma ir laukiamas gydymo nauda turi būti apsvaistoma gydymo, jeigu pacientas serga inkstų ir kepenų nepakankamumu, feochromocitoma ir nekontroliuojama hipertenzija, virškinimo trakto ligomis. Jeigu sergate žvynine, lėtiniu dermatitu ar dilgėline, neklaukšle, „nicorette“ pleistro ant pažeistos odos. Neviršyti šviesios rūgšties, pleistrą reikia nuimti prieš eidami magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą. Kramtomoji guma gali prilipti prie dantų protezo ir į supadint. Kramtomųjų gumų ir purškalo sudėtyje yra bulviųhidrolizato, kuris gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivinę. Kramtomųjų gumų sudėtyje yra ksilitolio, kuris gali laisvinti vidurius. Reklamos teksto parengimo data 2025-01-22. LT-NIC-2025-15329



NUO 4<sup>99</sup> €



### COLDREX HOTREM

COLDREX HOTREM LEMON, 750 mg/10 mg/60 mg milteliai geriamajam tirpalui, 5 vnt. 4<sup>99</sup> €  
COLDREX HOTREM LEMON, 750 mg/10 mg/60 mg milteliai geriamajam tirpalui, 10 vnt. 8<sup>99</sup> €  
COLDREX HOTREM HONEY & LEMON, 750 mg/10 mg/60 mg milteliai geriamajam tirpalui, 10 vnt. 8<sup>99</sup> €

#### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Terapinės indikacijos:** trumpalaikis peršalimo ir gripo simptomų (karščiavimo, slogos ir skausmo) lengvinimas. **Vartojimo būdas:** suberti 1 paketėlio turinį į stiklinę, pripilti karšto vandens (maždaug 125 ml), gerai išmaišyti, kol milteliai ištirps. **Dozavimas:** suaugusiems (įskaitant senyvo amžiaus) ir 16 m. bei vyresniems paauglius, kurių svoris didesnis nei 54 kg, po 1 paketėlį kas 4–6 val., jei reikia. Didžiausia paros dozė: 5 paketėliai per 24 val. **Specialūs įspėjimai:** nevartokite kartu jokių kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio, ar vaistų nuo kosulio ir peršalimo, gripo ir nosies gleivinės paburkimo ar užguliosios nosies. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti, jei padidėjusi prostata arba Jums sunku šlapintis; sergate kraujagyslių liga, vadinama Reino (Raynaud) fenomenu; sergate inkstų liga; yra lėtinis miyobos nepakankamumas; reguliariai vartojate alkoholi; sergate Žilberto (Gilbert) sindromu; vartojate kitų vaistų, kurie veikia kepenų funkciją; Jums trūksta fermento gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės; sergate hemolizine anemija; yra dehidratacija; esate senyvo amžiaus, suaugęs ar paauglys, kurio kūno svoris mažesnis nei 54 kg, yra šlapimo susilaikymas ar šlapimo takų skausmas; sergate astma arba Jums yra padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgšties, pasireiškiantis bronchų spazmu; sergate sunkia infekcine liga, nes gali padidėti metabolinės acidozės rizika. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliosios arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu padidėjęs kraujų spaudimas; jeigu padidėjęs skydlaukės aktyvumas; jeigu sergate cukriniu diabetu; jeigu sergate širdies liga; jeigu sergate uždarą kampo glaukoma; jeigu sergate kepenų ar sunkia inkstų liga; jeigu esate nėščia ar žindote kūdikį; jeigu vartojate vaistų, mažinančių nosies paburkimą, slopančių apetitą, vaistų nuo peršalimo ar apetitą didinančių vaistų; jeigu vartojate vaistus depresijai gydyti, pvz.: trichiklius antidepressantus, beta blokatorius arba monomaminoksidazės inhibitorius (MAOI) bei dvi savaites po MAOI vartojimo; jaunesniems kaip 16 m. vaikams ir paaugliams. **Reklamos teksto parengimo data 2024-11-11.**

2<sup>99</sup> €



### NEOCITRAMONAS, 240 mg/200 mg/30 mg, 20 tablečių

#### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 tablete yra 240 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg paracetamolio ir 30 mg kofeino. **Terapinės indikacijos:** vaistas vartojamas trumpalaikiam lengvo ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių ir menstruaciniam skausmui malšinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tabletes reikia vartoti nekremitant, užgeriant ne mažiau kaip 250 ml vandens. Atsivėlgiant į ligos sunkumą, vartoti po 1 tablete 1–4 kartus per dieną. Didžiausia paros dozė – 4 tabletės. Negalima vaisto vartoti dažniau kaip kas 6 val. ir ilgiau kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, esanti ar buvusi virškinimo trakto opa ir (arba) kraujavimas iš virškinimo trakto, buvusi bronchų astma, kurią sukelia salicilatai ar kitokie nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, pacientas jaunesnis negu 12 m, trys pastūbiniai nėštumo mėnesiai, žindymas, ligos, kurių metu yra padidėjęs kraujavimo pavojus, kraujo krešėjimo sutrikimas, vartojama 15 mg ar didesni metotreksato savaitės dozė, sunkus širdies, kepenų, inkstų nepakankamumas, labai sunki aukšto kraujospaudžio liga, kamuoja nemiga, padidėjęs nerivngumas, dirglumas, nerimas, baimė, sąjūdindimas ar panėdros simptomai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergate podagra, bronchų astma, kolagenozėmis ar kraujodaros sistėmos ligomis, yra susiję su skydlaukės veikla ar sergate cukriniu diabetu, yra virškinimo trakto, inkstų, kepenų ar širdies funkcijos sutrikimų, yra buvusi alergija kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, planuojama chirurginė operacija, pacientas yra jaunesnis kaip 16 m. ir serga virusinėmis ligomis, pacientas yra senyvas, planuojama padotti, pakinta šlapimo kiekis, pasireiškia kraujavimui ar skausmas juosmens srityje, pagesta oda ar akys, patamsėja šlapimas, atsiranda bendras silpnumas, yra nemigos sutrikimas, panikos sutrikimas ar nemiga. Sudėtyje esantis kofeinas gali sukelti drebulį, dažnų širdies plakimą, viduriavimą, susijaudinimą, stiprų širdies plakimą, nemigą, galvos skausmą, raumenų trūkčiojimą ir šlapimo išsiskyrimo padidėjimą. **Reklamos teksto parengimo data 2024-11-14.**

-30% 11<sup>08€</sup> 15<sup>99</sup>



### OCHISAN, 15g

#### MEDICINOS PRIEMONĖ

Akių vokų tepalas be konservantų. Padeda palengvinti tokius simptomus kaip vokų odos niežėjimas, jų skausmingumas ir patinimas, susijusius, be kita ko, su išorinio miežio bei chalaziono atsiradimu. Veikioji medžiaga šluotinių seklųjų medus (manuka) MGO 400+, šluotinių seklųjų aliejus (manuka).

#### NUO BURNOS IR GERKLĖS SKAUSMO

6<sup>99</sup> €



### FARINGODOL, 150 mg, 16 kietųjų pastilių

#### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 150 mg cholinio salicilato. **Terapinės indikacijos:** lokalis simptominis stomatitas, faringito, gingivito ar periodontito gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams lėtai sučiulpti po 1 pastilę 4–6 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, salicilatams, kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo. Pacientams, kurių stemplėje yra veninių mazgų, Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Faringodol“. Panašiai kaip ir gydantis kitais salicilatais, jei sergate virškinimo trakto uždegimais, pepsine opa ir bronchine astma, prieš pradėdami vartoti „Faringodol“, pasitarkite su gydytoju. „Faringodol“ sudėtyje yra medžiagos, iš kurios susidaro fenilalaninas. Gali būti kenksmingas sergantiems fenilketonurijai. **Reklamos teksto parengimo data 2022-01-19.**

#### SVORIO MAŽINIMUI

27<sup>97</sup> €



### ORLISTAT POLPHARMA

60 mg, 42 kietosios kapsulės

#### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Vienoje kietojoje kapsulėje yra 60 mg orlistato. **Indikacijos:** „Orlistat Polpharma“ yra skirtas atsivori turintiems (kūno masės indeksas KMI ≥28 kg/m<sup>2</sup>) suaugusiems žmonėms svorį mažinti. Vartojant šį vaistinį preparatą reikia laikytis šiek tiek sumažinto kalorijumo ir sumažinto riebalų kiekio dietos. **Dozavimas:** rekomenduojama „Orlistat Polpharma“ dozė yra viena 60 mg kapsulė tris kartus per parą. Per 24 valandas galima išgerti ne daugiau kaip tris 60 mg kapsules. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; kartu taikomas gydymas varfarinu arba kitais geriamaisiais antikoaguliantais. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pacientas turi tvirtai laikytis rekomenduotos dietos. Jei orlistatas vartojamas kiekvieno antitūmavimo metu arba valgomas riebus maistas, gali dažniau pasireikšti virškinimo trakto simptomų tikimybė. Gydymas orlistatu gali sutrikdyti riebaluose tirpių vitaminų (A, D, E ir K) absorbciją. Todėl reikia gerti polivitaminų papildą, cukrinii diabetu sergantys asmenys, prieš pradėdami gydymą „Orlistat Polpharma“ turi pasitarti su gydytoju. Pacientai, vartojantys „Orlistat Polpharma“ kartu su vaistinėmis preparatais hipertenzijai arba hipercholesterolemijai gydyti, turi pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Amiodaroną, levotiroksiną vartojantys pacientai, prieš pradėdami gydymą „Orlistat Polpharma“, turi pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Pranešta apie kraujavimo iš tiesiosios žarnos atvejus pacientams, vartojantiems orlistatą. Jeigu taip nutinka, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Jeigu prasideda stiprus viduriavimas, geriamieji kontraceptikai gali nesukelti pageidaujamo poveikio, todėl rekomenduojama naudoti papildomas kontracepcijos priemones. Pacientai, sergantys inkstų ligomis, epilepsija prieš pradėdami gydymą „Orlistat Polpharma“, turi pasitarti su gydytoju. Teksto paruošimo data: 2018-04.

SUMAŽINK SVORĮ SAUGIAI.

#### RYŠKESNIAI MATYMAI

-30% 13<sup>98€</sup> 19<sup>97</sup>



### CALIMEL® CLEAR,

akių lašai be konservantų, 10 ml

#### MEDICINOS PRIEMONĖ

„Calimel“ lašų sudėtyje yra natrio hialuronato ir kalio jodido. Lokaliai naudojamas kalio jodidas veikia kaip stiprus antioksidantas, sulaukantis laisvuosius radikalus akies paviršiuje. Ji mažina oksidacinę pažeidimą ir slopina akies lęšiuo bei stiklakūnio drumstumą. „Calimel“ lašai naudojami akies paviršiu sudekinti ir užkirsti kelią akies lęšiuko bei stiklakūnio drumstumui. Produkto tinkamumo naudoti laikas yra 3 mėnesiai nuo pirmo pakuotės atidarymo dienos. Produkto negalima naudoti ilgiau kaip 1 mėnesį nepertraukiamai ir ne ilgiau kaip 3 mėnesius, lašinant kartkartėmis (su kelių dienų pertraukomis).



-40 % PREKIŲ ŽENKLAMS

-40%



## „WALMARK“ LINIJOS VITAMINAI IR MINERALAI VISAI ŠEIMAI

MAISTO PAPILDAI

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-40%



## SALUTIL®

MAISTO PAPILDAI

„Salutil“ – produktų linija su gyvybingosiomis bakterijomis ir elektrolitais. „Salutil“ Hydra – elektrolitų ir gliukozės mišinys, papildytas vitaminais, mineraliniais medžiagomis ir cholinu. Idealu vartoti po įtemptos veiklos ar jaudinant nuovargį. „Salutil“ Shots – gyvybingosios bakterijos, prebiotikai ir vitaminai viename flakonelyje. Vaikams nuo 3 metų.

„Salutil“ – kiekvienoje kapsulėje yra 5 milijardai gyvybingųjų bakterijų. „Salutil“ Premium 9 – sudėtyje yra 9 mikroorganizmų padėmės ir vitaminas D.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

## Moterims

-40%

## DIFOLIN

DIFOLIN+, 30 kapsulių 18<sup>99</sup> 11<sup>39</sup> €

DIFOLIN, 60 tablečių 9<sup>58</sup> 5<sup>75</sup> €

MAISTO PAPILDAI

„Difolin“ – moters gerai savijautai: hemoglobiniui, energijai, nervams, imunitetui. Mikrokapsuluota liposomose geležis + folio rūgštis + vitaminai B12, D3, C + varis. „Difolin“ sudėtyje naudojama mikrokapsuluota liposomose geležis yra efektyviai pasisavinama organizmo, neturi geležies poskonio, nedirgina virškinimo trakto, neturi sąveikos su maistu. Geležis, folio rūgštis, vitaminas B12 – vieni būtiniausių kraujo gamybai elementų. Vitaminas B12 padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, geležis – hemoglobino susidarymą, foliatas – kraujodarą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, varis – nervų sistemos veiklą, geležis, varis, vitaminai C, B12 – energijos apykaitą.

„Difolin“ – planuojančioms pastoti, nėščiosioms, žindančioms moterims: folio rūgštis + vitaminas D3. Folio rūgštis padeda palaikyti normalią kraujodarą, mažinti nuovargį. Mažas foliatų kiekis nėščiosios kraujo eritrocituose yra besivystančio vaisiaus nervinio vamzdelio defektų rizikos veiksnys. Teigiama poveikis atsiranda per parą papildomai suvartojant 400 µg folio rūgšties ne trumpiau kaip vieną mėnesį iki pastojimo ir iki trijų mėnesių po jo. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, dalyvauja ląstelių dalijimosi procese.

„DIFOLIN“ – MAISTO PAPILDAI MOTERIMS.



PROSTOSAN FORTE, 30 kapsulių 15<sup>15</sup> 9<sup>09</sup> €

POTENZINE SUPERIOR, 30 tablečių 20<sup>99</sup> 12<sup>99</sup> €

TOTALPOWER MAN, 30 tablečių 18<sup>25</sup> 10<sup>97</sup> €

MAISTO PAPILDAI

„Prostosan forte“ – pagalba vyresnio amžiaus vyrų prostatai. Sudėtyje esantis sabalpalmių ir rūgų žiedadulkių ekstraktai padeda palaikyti normalią prostatos funkciją, o afrikinių pigių ekstraktas – normalią šlapimo pūsles funkciją. Kininio Ženšenio ekstraktas padeda išlaikyti energingumą. Šio preparato sudėtis taip pat praturtinta vitaminu D3 ir cinku. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 2 kartus per dieną, valgio metu.

„Potenzine superior“ – subalansuotas derinys potencijai. Šio maisto papildas sudėtyje esantis žemės šaknų ekstraktas padeda palaikyti lytinę funkciją, išvengti erektilios disfunkcijos ir energingumą. Normalų lytinį potraukį ir seksualinį pajėgumą padeda palaikyti gulsčiosios ragūžės vaisių ekstraktas, o normalų vaisingumą ir testosterono koncentraciją kraujyje – cinkas. Sudėtyje taip pat yra L-arginino. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną, valgio metu.

„TotalPOWER man“ – galingi multivitaminai aktyviam vyrui su 23 aktyviais medžiagomis. Šis maisto papildas puikiai tinka intensyviai gyvenantiems vyrams. Jo sudėtyje esantis juodasis eleuterokokas padeda palaikyti normalią protinę veiklą ir energiją; magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, o vitaminai B6 ir B12 – palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną.

KIEKVIENO VYRO PASIRINKIMAS!



-40%





# SKIEPAI NUO ERKINIO ENCEFALITO

SU  
LOJALUMO  
KORTELE

31<sup>95</sup> €

SKIEPO KAINA  
BE KORTELĖS

34<sup>95</sup> €

Galima išankstinė registracija:

- internetu [www.nvaistine.lt/skiepai](http://www.nvaistine.lt/skiepai)
- telefonu **+370 800 10 008**



Nuolaidos taikomos  
su PC Norfa kortele.  
Akcijos „Laimės valandos“  
nuolaidos netaikomos.

-40%

**AMBIO**OMEGA-3 ŠIRDŽIAI, 60 kapsulių **16<sup>99</sup> 977 €**ŠIRDŽIAI, mikstūra, 100 ml **4<sup>99</sup> 2<sup>91</sup> €**

MAISTO PAPILDAS

IKI -30%

**VITADAY**VALERIJONŲ EKSTRAKTAS, 50 plėvele dengtų tablečių **2<sup>99</sup> 174 € -30 %**VALERIJONŲ TINKTŪRA, geriamieji lašai, 25 ml **1<sup>98</sup> 149 € -25 %**

MAISTO PAPILDAS

IKI -40%

**AMEDIPLUS**Automatinis žastinis kraujospūdžio matuoklis DBP-1358 **64<sup>99</sup> 387 € -40 %**Automatinis žastinis kraujospūdžio matuoklis DBP-6192 **85<sup>99</sup> 51<sup>99</sup> € -40 %**Manžetė kraujospūdžio matuokliui, XL (22–42 cm) **15<sup>99</sup> 127<sup>9</sup> € -20 %**Manžetė kraujospūdžio matuokliui, XXL (32–48 cm) **15<sup>99</sup> 95<sup>9</sup> € -40 %**Kraujospūdžio matuoklio adapteris **10<sup>99</sup> 87<sup>9</sup> € -20 %**Kompresorinis inhaliatorius VP-D1 **65<sup>99</sup> 46<sup>19</sup> € -30 %**Tinklinis inhaliatorius VP-M1 **79<sup>99</sup> 55<sup>99</sup> € -30 %**Termometras skaitmeninis bekontaktis **39<sup>99</sup> 31<sup>99</sup> € -20 %**Termometras skaitmeninis lanksčių galiuku **7<sup>99</sup> 6<sup>39</sup> € -20 %**

MEDICINOS PRIETAISAI

-30%

**ARTILANE FORTE** skystis,  
15 vienadozių buteliukų **20<sup>99</sup> 14<sup>99</sup> €**

MAISTO PAPILDAS SU SALKIKLIAIS

Maisto papildas sudėtyje yra fermentais hidrolizuoto ypač gryno kolageno, gliukozamino ir chondroitino, hialurono rūgšties, magnio, cinko, plauštinės bosvelijos (Boswellia serrata), antioksidantų: kofermento Q10, likopeno, kvercetino, vitamino C.

**ARTILANE CLASSIC** skystis,  
15 vienadozių buteliukų **16<sup>99</sup> 117<sup>5</sup> €**

MAISTO PAPILDAS SU SALKIKLIAIS

Maisto papildas sudėtyje yra fermentais hidrolizuoto ypač gryno kolageno, hialurono rūgšties, magnio, cinko, antioksidantų: kofermento Q10, likopeno, kvercetino, vitamino C.

Nevisiškai nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveiką gyvenimo būdą.

NUO 5<sup>99</sup> €**DITEL**DITEL, 23,2 mg/g, gelis, 50 ml **5<sup>99</sup> €**DITEL, 23,2 mg/g, gelis, 100 ml **8<sup>99</sup> €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veiklioji medžiaga, stiprumas:** diklofenako dietilaminas, 23,2 mg/g. **Terapinės indikacijos:** skirtas suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: vietinis skausmo malšinimas, esant ūminiams patempimams ar sumušimams po bukus traumas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** reikia vartoti 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Reikia nuo vėsnos iki graikiško riešuto dydžio kiekio, atitinkančio 1–4 g gėlio. Didžiausia paros dozė – 8 g gėlio. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Anksčiau pasireiškusių padidėjusio jautrumo reakcijos, pavartojus acetylsalicilo rūgšties ar nesteroidinių vaistinių preparatų nuo uždegimo (NVPNU). Vartojimas ant atvirų žaizdų, gleivinių, jei yra odos uždegimas arba infekcija bei egzema. Vartojimas paskutinįjį nėštumo trimestrą. Vartojimas vaikams ir paaugliams iki 14 metų. **Specialūs spėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai vartoti pacientams, kurių inkstų, širdies ar kepenų funkcija sutrikusi, taip pat pacientams, kuriems yra aktyvi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos peptinė opa. Vartoti tik ant nepažeistos ir sveikos odos. Vengti, kad nepatektų į akis, ir kontakto su gleivinėmis. Nenaudoti orui nepralaidžių tvarstų. Jei yra tiesioginių saulės spindulių arba dirbtinės saulės poveikis, kyla odos reakcijos pavojus. Gydyimo metu ir dvi savaites po gydymo reikia vengti saulės spindulių ar dirbtinės saulės. **Reklamos teksto parengimo data** 2024-04.

-25%

**BLEND-A-DENT** klijai dantų protezams

Fiksuojamasis kremas privertina protezus visai dienai, suteikdamas saugumo jausmą. Jis apsaugo gleivinę nuo mechaninių sužalojimų, kuriuos gali sukelti protezai, ir neleidžia maistui patekti po dantų protezais. Kasdien naudodami fiksuojamąjį kremą „Blend-a-dent“, galėsite nevaržomai juoktis, kalbėti ir valgyti.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms





# TYLUS RŪPESTIS

Pastebėkite tuos, kurie rūpinasi  
ir slaugo savo artimuosius.  
Padėkite jiems kasdienybėje,  
kad jie nesijaustų vieni.



**Skenuokite QR kodą  
ir sužinokite daugiau  
apie iniciatyvą.**

[www.gintarine.lt/tylus-rupestis](http://www.gintarine.lt/tylus-rupestis)



**Gintarinė  
vaistinė**

rūpinkimės tais, kurie rūpinasi kitais



# 2 UŽ 1 KAINĄ



## 1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė – NEMOKAMAI!

### „LIVOL MULTI“ VITAMINAI

#### MAISTO PAPILDAS

Skandinaviski maisto papildai „Livol“ sukurti, remiantis holistiniu požiūriu į Jūsų organizmo sveikatą, todėl labai veiksmingi. Gaminami Danijoje nuo 1959 m. Kurdami „Livol“, Skandinavijos mokslininkai įvertino skirtingus žmonių poreikius ir pasiūlė saugią dozę bei efektyvų pasisavinimą (su EC gamybos technologija) vitaminus.

#### „LIVOL“ – NR.1 DANIŠKŲ MULTIVITAMINAI LIETUVOJE!

\* Lietuvoje Nr.1 multivitaminų kat., vaistinėse 2023 m. (Šaltinis: UAB „SoftDent“ farmacijos rinkos duomenų bazė „Pharma200M“, duomenys pagal kiekį ir vertę).

\* Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



## 1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

### BEOTEBAL® PLUS PLAUKAMS, ODAI, NAGAMS, 30 +10 tablečių 33<sup>95</sup> €

#### MAISTO PAPILDAS

„BeotEBal“ PLUS plaukams, odai, nagams\* rekomenduojamas kasdieniai plaukų, odos ir nagų būklės bei išvaizdos priežiūrai. Ypač tinkamas laikotarpiui, kai plaukus, odą ir nagus veikia aplinkos veiksniai (saulė, vanduo, vėjas, šaltis, sniegas, lietus) ar po intensyvių kirpyklos procedūrų (pvz.: dažymo, tiesinimo, džiovimo) ir kosmetinių nagų procedūrų. Sudėtyje yra originalus koncentruotas „NutriAminoBiotinum“ kompleksas, kuriame yra daug aminorūgščių, mineralų ir vitaminų – įskaitant biotiną ir natūralų silicį, turintį naudingą poveikį plaukams, odai ir nagams. Gaminys nėra glitimo ir laktozės. Tinka vegetarams ir veganams.

**GRĮŽIO FORMULĖ TAVO PLAUKAMS, ODAI IR NAGAMS!**



## 1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė – NEMOKAMAI!

### COREGA

MAX FIXATION + CONTROL fiksuojamasis dantų protezų kremas, 40 g 8<sup>99</sup> €

MAX FIXATION + COMFORT fiksuojamasis dantų protezų kremas, 40 g 8<sup>99</sup> €

#### BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Naudokite COREGA dantų priežiūros priemones kasdien, kad drašiai galėtumėte valgyti, juoktis ir kalbėti. Corega pilnų/dalinių dantų protezų fiksuojamieji kremo suteikia trigitą naudą: ypač stiprią fiksaciją visą dieną, apsaugo nuo maisto dalelių patekimo bei komfortą. Be cinko, todėl tinka kasdieniam naudojimui.



## 1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

### GLIUKOZAMINAS PLUS KOLAGENAS, CHONDROITINAS, MSM, 60 tablečių 17<sup>99</sup> €

#### MAISTO PAPILDAS

daugiau informacijos apie produktus [www.vitaminai.lt](http://www.vitaminai.lt)

### Gerklei



## 1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė – NEMOKAMAI!

### FARINGO

FARINGOSPRAY purškalkas, 20 ml 8<sup>59</sup> €

LARINGOSPRAY purškalkas, 20 ml 8<sup>79</sup> €

#### MEDICINOS PRIEMONĖS

Visos preparato „Faringospray“ sudėtyje esančios medžiagos yra natūralios aliejai, kurie padengia gerklės gleivinę, sumažina gerklės peršėjimo pojūtį, lengvina rijimą, mažina skausmą ir skatina pažeistos gleivinės gijimą. Veiklosios medžiagos – šaltalankių aliejus, medetkų žiedų aliejaus ekstraktas ir bergamočių aliejus. Tinka vaikams nuo 2 metų. „Laringospray“ naudojamas burnos ertmės ir ryklės gleivinės sudirginimui palengvinti uždegimo atveju ar po atitiktų procedūrų. Priemonė padengia gleivinės paviršių ir taip neleidžia mikroorganizmams patekti bei augti, padeda palaikyti palankią mikroterpę, apsaugo nuo sudirginimo ir sukuria reikalingas sąlygas gleivinei atsinaujinti, kad ji galėtų atlikti savo funkcijas. Veiklosios medžiagos: propolio tirpalas etilo alkoholyje, medetkų žiedų tinktūra.

FARINGOSPRAY APELSIN purškalkas, 20 ml 8<sup>99</sup> €

#### MAISTO PAPILDAS

Purškalkas gerklės su šaltalankiais ir medetkomis. Medetkos padeda palaikyti normalią gerklės, ryklės ir burnos ertmės būklę, bei normalią kvėpavimo takų veiklą. Šaltalankiai padeda palaikyti normalią gleivinių būklę.



## 1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

### AMEDIPLUS

ULTRA SENSITIVE pleistrai, 10 vnt 3<sup>49</sup> €

#### MEDICINOS PRIEMONĖ



## 1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

### TEPE SUPREME dantų šepetėliai

#### BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Supreme“ dantų šepetėliai turi dviejų dydžių šerelius, švelniai valo dantis bei danteną. Ilgesni šereliai geriau pasiekia tarp dantų esančius nesvarumus, trumpesnieji efektyviai nuvalo likusį danties plotą. „Supreme Compact“ galvutė yra mažesnė, todėl puikiai tinka vyresnio amžiaus vaikams bei paaugliams. Tinka nešiojantiems kables.

**TVARUS PASIRINKIMAS JUMS IR MŪSŲ PLANETAI.**



# 2 UŽ 1 KAINĄ



## 1+1

Dvi tokios pačios  
pakuotės už  
VIENOS KAINĄ!

**AMBIO**

VITAMINAS D3 4000 IU, 60 kapsulių **14<sup>99</sup> €**

CHOLESTEROL BALANCE COMPLEX, 90 kapsulių **29<sup>99</sup> €**

MAISTO PAPILDAS



## 1+1

Dvi tokios pačios  
pakuotės už  
VIENOS KAINĄ!

**AMBIO**

KALIS IR MAGNIS, miltelių geriamajam tirpalui, 30 paketėlių **12<sup>48</sup> €**

MAISTO PAPILDAS

- Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį.
- Kalis padeda palaikyti normalią raumenų veiklą, o magnis – normalią raumenų funkciją.
- Kalis ir magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.



## 1+1

Dvi tokios pačios  
pakuotės už  
VIENOS KAINĄ!

**VITADAY**

VITAMINŲ B KOMPLEKSAS, 60 tablečių **6<sup>48</sup> €**

MAISTO PAPILDAS



## 1+1

Dvi tokios pačios  
pakuotės už  
VIENOS KAINĄ!

**AMBIO**

VITAMINAI A IR E FORTE, 30 kapsulių **6<sup>48</sup> €**

OMEGA 3-6-9, 60 kapsulių **15<sup>98</sup> €**

MAISTO PAPILDAS

 **JAMIESON KOLAGENAS SU CIBERŽOLE,**  
**60 tablečių 19<sup>99</sup> €**

Maisto papildas

## 1+1

Dvi tokios pačios  
pakuotės už  
VIENOS KAINĄ!



 **JAMIESON LUTEIN, 40 mg,**  
**60 kapsulių 29<sup>99</sup> €**

Maisto papildas

## 1+1

Dvi tokios pačios  
pakuotės už  
VIENOS KAINĄ!



 **JAMIESON MULTI FOR KIDS,**  
**60 kramtomųjų tablečių 16<sup>99</sup> €**

Maisto papildas

## 1+1

Dvi tokios pačios  
pakuotės už  
VIENOS KAINĄ!



 **JAMIESON BABY-D3, 400 IU, lašai**  
**kūdikiams, 11,4 ml 16<sup>49</sup> €**

Maisto papildas

## 1+1

Dvi tokios pačios  
pakuotės už  
VIENOS KAINĄ!



Pagaminta Kanadoje

-40%



## AMBIO

VIRŠKINIMUI, 20 tablečių **5<sup>28</sup> 3<sup>17</sup> €**KOMPLEKSAS VIRŠKINIMUI SU GEROSIOMIS BAKTERIJOS, 20 kapsulių **6<sup>98</sup> 4<sup>19</sup> €**

MAISTO PAPILDAI

## NUO RĖMENS

NUO **5<sup>49</sup> €**

## MAALOX

MAALOX 400 mg/400 mg kramtomosios tabletės (be cukraus), 40 tablečių **5<sup>49</sup> €**MAALOX 40 mg/35 mg/ml geriamoji suspensija, 250 ml **6<sup>99</sup> €**

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** viename vienadozėje 4,3 ml geriamosios suspensijos paketelyje yra 460 mg aliuminio hidroksido ir 400 mg magnio hidroksido; vienoje kramtomosios tabletėje yra 400 mg magnio hidroksido ir 400 mg aliuminio hidroksido; viename ml geriamosios suspensijos yra 40 mg magnio hidroksido ir 35 mg aliuminio hidroksido. **Indikacijos:** rėmens ir skrandžio turinio kilimo į stemplę simptomams mažinti suaugusiems ir paaugliams nuo 15 metų. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** **Suspensija:** geriama po 1 arba 2 vienadozių paketelių turinį, pasireiškus rėmeniui arba refliksui; negalima gerti daugiau kaip 8 paketelių per parą; prieš atplešiant paketelį, jį reikėtų švelniai paspaudyti; suspensiją reikėtų gerti neskubiai, buteliuko suspensija geriama po vieną valgomąjį šaukštą (15 ml) pasireiškus rėmeniui arba skrandžio turinio refliksui į stemplę; negalima gerti daugiau kaip 6 valgomųjų šaukštų (90 ml) per parą; šio vaisto negalima vartoti ilgiau kaip 10 dienų. **Tabletės:** sučiulpti arba sukramtyti 1-2 tabletes, pajutus rėmenį arba atsiradus refliksui; negalima vartoti daugiau kaip 6 kartus per parą ir daugiau kaip 8 tablečių per parą. **Kontraindikacijos:** alergija (padidėjęs jautrumas) magnio hidroksidui ar aliuminio hidroksidui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sunki inkstų liga; stiprus pilvo skausmas arba įtariamas žarnų nepraeinamumas. **Specialūs įspėjimai:** vaistą galima vartoti tik pastarusis su gydytoju, jeigu mažėja kimo svoris, kraujuoja arba ankščiau yra kraujavę iš virškinimo trakto, sutrikęs rijimas arba nuolat jaučiate nemalonų pojūtį pilve, virškinimo sutrikimų atsirado pirmą kartą arba jie neseniai pakito, sergate inkstų liga. Pacientams, kuriems nustatytas inkstų funkcijos sutrikimas, jaunesniems kaip 2 metų vaikams, senyviems pacientams bei kitiems pacientams, kuriems yra fosforo trūkumo pavojus, prieš pradėdami vartoti „Maalox“ reikia kreiptis į gydytoją. Norint išvengti perdozavimo, negalima kartu vartoti vaistinių preparatų, savo sudėtyje turinčių aliuminio hidroksido ir magnio hidroksido. Atsargumo dėlei tarp bet kokių per burną vartojamo vaisto ir antacidinio vaisto vartojimo turi būti bent 2 valandų (vartojant fluorochinolonų ~ 4 valandų) intervalus. Jeigu gydytojas jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „Maalox“ (be cukraus) tabletės tinka cukriniu diabetu sergantiems pacientams. Teksto parengimo data: 2021 m. kovo mėn. Reikiamas teksto parengimo data: 04/2021. MAF-UF-200180 V.1.0

GREITA PAGALBA NUO RĖMENS!

-30%



## GASTROVAL

GASTROVAL, 15 kapsulių **4<sup>85</sup> 3<sup>40</sup> €**GASTROVAL FLUXUS rūgštingumui, 15 kapsulių **5<sup>99</sup> 4<sup>19</sup> €**GASTROVAL FORTE, 12 kapsulių **5<sup>99</sup> 4<sup>19</sup> €**GASTROVAL HEPAR FORMULA, 30 kapsulių **5<sup>98</sup> 6<sup>92</sup> €**

## MAISTO PAPILDAI

„Gastroval“ – net 7 augalinių fermentų ir ekstraktų derinys sklandžiam virškinimui. „Gastroval Forte“ – stipresnis augalinių fermentų ir įvairių augalinių ekstraktų mišinys lengvam virškinimui. „Gastroval Hepar Formula“ – sklandžiai kepenų veikiai. Kepenų apsaugai nuo oksidacinės pažeidimo. Kepenų ląstelių regeneracijai. „Gastroval Fluxus“ – skrandžio rūgštingumo pusiausvyrai. Virškinimui lengvinti. Geltonoji geltonai tradiciškai vartojami virškinimo pagerinti. Dažinės ciberžolės padeda apsaugoti kepenis nuo oksidacinės pažeidimo, palaikyti normalų cholesterolio lygį kraujyje. Tikriji margarinai padeda palaikyti normalią ląstelių regeneraciją. Ūtraujų sėklų ekstraktas padeda palaikyti normalią skrandžio rūgštinę terpę. „GASTROVAL“ SUPRANTA, KO REIKIA VIRŠKINIMUI, SKRANDŽIO RŪGŠTINGUMUI, KEPENŲ VEIKLAI.

-20%




## REFLUXAID®

REFLUXAID® NIPPIO, sirupas, 150 ml **10<sup>99</sup> 8<sup>79</sup> €**REFLUXAID®, sirupas, 250 ml **10<sup>99</sup> 8<sup>79</sup> €**REFLUXAID®, 12 tablečių **6<sup>99</sup> 5<sup>11</sup> €**

## MEDICINOS PRIEMONĖS

„Refluxaid“ – inovatyvus medicinos prietaisas, skirtas gastroezofaginio refliksui (GERL) bei ezofaginio simptomams mažinti. Vartojant šį medicinos prietaisą, susilpnėja tokie simptomai kaip: deginimo pojūtis (rėmus), atsirogiimas, pasunkėjęs rijimas (disfagija), skausmingas rijimas (odinofagija), kosulys, užkimimas. **Refluxaid Sirupo Vartojimas.** Prieš naudojimą supurtyti. Suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams rekomenduojama vartoti po 10-20 ml sirupo po valgio arba prieš miegą. Jaunesniems nei 12 metų vaikams rekomenduojama vartoti pusę dozės (5 – 10 ml) po valgio arba prieš miegą. **Refluxaid Tabletės Vartojimas.** Suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams rekomenduojama vartoti 1-2 tabletes po valgio ir / arba prieš miegą. **Refluxaid Nipio Vartojimas.** Prieš naudojimą supurtyti. Kūdikiams iki 5 kg svorio: rekomenduojama dozė yra 1 ml sirupo, praėjus 5-10 minutėms po maitinimo. Atsiradus vėmimui, rekomenduojama papildomai suvartoti 1 ml sirupo. Iki 3 metų amžiaus vaikams (6 – 15 kg svoris) rekomenduojama dozė yra 4 ml po valgio ir prieš miegą.

-35%



## EPITOME

VITAL OMEGA-3, 90 minkštųjų kapsulių **24<sup>98</sup> 16<sup>24</sup> €**VITAL MAGNESIUM BISGLYCINATE, 90 kapsulių **24<sup>98</sup> 16<sup>24</sup> €**

MAISTO PAPILDAI

-40%

6<sup>29</sup> €

## KALICORD 850 FORTE, 30 kapsulių

## MAISTO PAPILDAI

Norintems papildyti kalio atsargas organizme, rekomenduojama vartoti „Kalicord“, kurio sudėtyje yra net 307 mg kalio. Padeda palaikyti normalų kraujospūdį ir palaiko normalią raumenų veiklą.

## PIC MATUOKLIAI / INHALIATORIAI / TERMOMETRAI

IKI -40%



## PIC SOLUTION

## MEDICINOS PRIETAISAI

„PIC Solution“ jau daugiau nei 50 metų yra vienas žinomiausių Italijos medicinos priemonių prekių ženklų. Kiekvienas PIC sprendimas yra daugiau nei kraujospūdžio matuoklis, inhalatorius ar termometras. Tai paprastas būdas parodyti rūpestį ir paklausti „Kaip jautiesi?“ Savo laboratorijose kuriame pažangius prietaisus, skirtus inhaliacijai, širdies darbui ar temperatūrai stebėti. Visi prietaisai turi 5 metų garantiją ir jų tikslumas patvirtintas klinikiniais tyrimais\*\*.


\* Išskyrus termometrus, matuoklį „LiteRapid“, inhalatorių „AirCube“.

\*\* Taikoma kraujospūdžio matuokliams

## KIEKVIENA ŠIRDIS TURI SAVO RITMĄ!

\* Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis.

-30%

7<sup>20</sup> €

## OMEGA 3 + VITAMINAI D IR E 1000 mg, 30 kapsulių

## MAISTO PAPILDAS

EPA (tiet. EPA – eikozapentaeno rūgštis) ir DHA (tiet. DHR – dokozahekseno rūgštis) padeda palaikyti normalią širdies veiklą. DHR (dokozahekseno rūgštis) padeda palaikyti normalią smegenų funkciją, išsaugoti normalų regėjimą. Vitaminas D3 padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų, dantų ir raumenų būklę. Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.



-35% 11<sup>43€</sup> 17<sup>50</sup>

## EPITOME Melatonin Spray, 385 papurškimai, 50ml

### MAISTO PAPILDAS

- Purskiama maisto papildą patogiai vartoti.
- 1 papurškime yra 1 mg melatonino.
- Sudėtyje esantis melatoninas padeda mažinti subjektyvų laiko juostų skirtumų pajautimą ir mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę.
- Su natūraliais eteriniais aliejais.
- Vietoje cukraus sudėtyje naudojami natūralūs stėviųjų gliukozidai.
- Be alkoholio, be konservantų, be dažiklių.

\*Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant ne mažiau kaip 0,5 mg prieš einant miegoti pirmą kelionės dieną ir kelias dienas po atvykimo į kelionės tikslo vietą.  
\*Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti.



-40%

## AMBIO

VITAMINŲ B KOMPLEKSAS FORTE, 30 tablečių 7<sup>28</sup> 4<sup>37</sup> €

GERAI NUOTAIKAI, 30 kapsulių 15<sup>48</sup> 9<sup>29</sup> €

### MAISTO PAPILDAI



-50%

BIOMAGNESIUM 300 MG, 30 pakelių 13<sup>49</sup> 6<sup>75</sup> €

BIOMAGNESIUM FORTE, 20 pakelių 14<sup>99</sup> 7<sup>40</sup> €

AQUAMAG+B6 LIQUID, 10 pakelių 8<sup>99</sup> 4<sup>10</sup> €

BIOMAGNIS B6 PREMIUM PULV., 28 pakeliai 11<sup>49</sup> 5<sup>75</sup> €

### MAISTO PAPILDAS

Papildykite savo organizmą magniu, kuris padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, palaikyti normalią energijos apykaitą ir nervų sistemos veiklą. Natūralios kilmės magnis išgaunamas iš Negyvosios jūros. Išsirinkite Jums reikalingą formą ir stiprumą!

**MAŽINKITE NUOVARGI! PADĖKITE SAVO ORGANIZMUI!**



-40%

SALDUS MIEGAS ELIKSYRAS, 150 ml 9<sup>99</sup> 5<sup>69</sup> €

TRIPTAN FORTE, 30 kapsulių 17<sup>99</sup> 10<sup>79</sup> €

### MAISTO PAPILDAS

Linija „Saldus miegas“ – dvejojo poveikio, skirta padėti greičiau užmigti ir atsikelti paisėjus. „Saldus miegas eliksyras“ malonus karamelės skonio, skystas maisto papildas miegui. „Triptan forte“ sudėtyje esantis 5-hidroksitriptofanas (5-HTP) yra natūrali medžiaga, gaunama iš Afrikoje augančių augalų – *Griffonia simplicifolia* – sėklų, kuri kartu su vitaminu B6 reikalinga serotonino – geros nuotaikos hormono – gamybai. Serotonino išsiskyrimas suteikia gerą nuotaiką ir energiją. Tai pat sudėtyje esantis vitaminas B1 ir B6 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą. Vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.



## NERVINIAM NERAMUMUI LENGVINTI

NUO 6<sup>47</sup> €

## SEDATIF PC

SEDATIF PC, 40 tablečių 6<sup>47</sup> €

SEDATIF PC, 90 tablečių 9<sup>97</sup> €

### HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** Atrus precatorius 6 CH, 0,5 mg, Aconitum napellus 6 CH, 0,5 mg, Belladonna 6 CH, 0,5 mg, Calendula officinalis 6 CH, 0,5 mg, Chelidonium majus 6 CH, 0,5 mg, Viburnum opulus 6 CH, 0,5 mg. **Indikacijos:** nervinio neramumo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vaikams nuo 6 metų vartoti po 2 tabletes 3 kartus per parą. „Sedatif PC“ veiksmingumas ir saugumas vaikams iki 6 metų netirtas. Duomenų nėra, todėl vartoti nerekomenduojama. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** šio vaistinio preparato vaikams iki 6 metų vartoti nerekomenduojama. Negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharozės ir izomaltozės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2019-08.

**ĮVEIK STRESĄ, KOL STRESAS NEĮVEIKĖ TAVĘS. „SEDATIF PC“**


-40% 7<sup>61€</sup> 12<sup>69</sup>

## MEMORIL FORTE, 30 kapsulių

### MAISTO PAPILDAS

„Memiril forte“ – subalansuotas, 11 sudedamųjų dalių kompleksas atminčiai bei kraujotakai. Tinka tiems, kuriems sunku susikaupti bei nuolat ką nors pamiršantiems. Vienoje kapsulėje yra 80 mg ginkmedžių ekstrakto, kuris padeda palaikyti normalią atminties funkciją ir kraujotaką. Taip pat sudėtyje yra magnio, vitaminų B, C, E, seleno ir folio rūgšties, kuri padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną.


5<sup>99</sup> €

## MILGAMMA N, 20 minkštųjų kapsulių

### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 40 mg benfotiamino (riebalusoje tirpus vitamino B1 darinio), 90 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6) ir 250 µg cianokobalamino (vitamino B12). **Terapinės indikacijos:** B1, B6, B12 vitaminų trūkumo šalinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems; po 1 kapsulę 3-4 kartus per parą. Kai liga lengva ir jei vaistinis preparatas padeda, per parą užtenka 1-2 kapsulių. Vartoti per burną. Kapsulę reikia praryti po valgio nesukramtytą, užsigeri truputį skysčio. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai vaistinio preparato pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas sojos arba sojų pupelių produktams, pvz., lecitinui. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** vartojama lčiau negu 6 mėn. „Milgamma N“ gali sukelti neuropatiją. Reikia atsivėlginti į adityvų kartu vartojamų vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra sorbitolio (ar fruktozės), ir su maistu vartojamo sorbitolio (ar fruktozės) poveikį. Geriamojo vaistinio preparato sudėtyje esantis sorbitolis gali paveikti kitų kartu vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį priėmumą. Vaistinio preparato sudėtyje yra lecitino (išgauto iš sojų aliejaus). Jeigu yra alergija žemės riešutams arba sojos, šio vaistinio preparato vartoti negalima. Reklamos teksto parengimo data 2024-09-11.

**„MILGAMMA“ – JUDEK LAISVAI!**



-30%

VALERIJONŲ EKSTRAKTAS 20 mg, 50 tablečių 2<sup>49</sup> 1<sup>74</sup> €

VALERIJONAS FORTE 50 tablečių 6<sup>99</sup> 4<sup>89</sup> €

### MAISTO PAPILDAS

Vaistinis valerijonas padeda atsipalaiduoti, palaiko normalią miego funkciją.



-40% 10<sup>79€</sup>  
~~17<sup>90€</sup>~~

### EPITOME VITAL EYE'S FORMULA, 30 minkštųjų kapsulių MAISTO PILDAS

#### SAUSOMS, PAVARGUSIOMS, SUDIRGUSIOMS AKIMS BEI LĖTINIAM AKIŲ SAUSUMUI

NUO 12<sup>97€</sup>

### BEPANTHEN® EYE

BEPANTHEN® EYE, akių lašai, 20 x 0,5 ml vienadozių talpyklių 12<sup>97€</sup>BEPANTHEN® EYE, akių lašai, 10 ml 14<sup>97€</sup>BEPANTHEN® EYE INTENSIVE, akių lašai, 10 ml 16<sup>97€</sup>

#### MEDICINOS PRIEMONĖS

„Bepanthen® Eye“ akių lašų sudėtyje yra natrio hialuronato ir dekspanthenolio. „Bepanthen® Eye Intensive“ akių lašų sudėtyje yra ne tik natrio hialuronato ir dekspanthenolio, bet ir vitaminų A ir E bei fosfolipidų. Natrio hialuronatas suformuoja tvirtą, stabilią ir ilgalaikę apsauginę plėvelę ant akies paviršiaus. Dekspanthenolis geba prisijungti didelį vandens kiekį, drėkina ir apsaugo akis. Vitaminai A ir E veikia kaip antioksidantai, neutralizuodami laisvuosius radikalus (pvz., UV šviesą). Fosfolipidai palengvina ašarų plovėles lipidinio sluoksnio regeneraciją. „Bepanthen® Eye“ akių lašai skirti sausoms ir pavargusioms akims. Drėkina ir apsaugo. Tinka esant mechaniniam stresui, stresui dėl aplinkos poveikio arba intensyvaus žiūrėjimo. „Bepanthen® Eye Intensive“ akių lašai skirti labai sausoms, sudirgusioms akims ir lėtiniam akių sausumui. Drėkina, saugo, regeneruoja ir gydo. Tinka ne tik esant mechaniniam stresui, stresui dėl aplinkos poveikio arba intensyvaus žiūrėjimo, bet ir esant smėlio pojūčiui akyse, sumažėjus ašarų gamybai, esant diskomfortui dėl tam tikrų vaistų vartojimo ar šorinių alergijų. Visi lašai tinka nešiojantiems kontaktinius lęšius. Lašinant kontaktinių lęšių išimti nereikia. Sudėtyje nėra konservantų, todėl lašai labai gerai toleruojami net vartojant ilgą laiką. Lašinoti po 1 lašą į akies junginę mašeliu iki 3-5 kartų per parą. „Bepanthen® Eye“ vienodozės akių lašų talpyklės skirtos naudoti tik vieną kartą. „Bepanthen® Eye“ buteliuką galima vartoti net 12 mėnesių po jo atidarymo. „Bepanthen® Eye Intensive“ buteliuką galima vartoti 2 mėnesius po jo atidarymo. Jei norite sužinoti daugiau, skaitykite visos vartojimo instrukcijos. Reklamoms teksto parengimo data 2025-02, CH-2025/0227-72

PAŠALINKITE SAUSŲ AKIŲ SIMPTOMUS IS KARTO!

#### SAUSOMS AKIMS

-20%



### ARTELAC®

ARTELAC® TRIPLEACTION, 10 ml 16<sup>99€</sup> 13<sup>59€</sup>ARTELAC® NIGHTTIME GEL, 10 g 14<sup>99€</sup> 9<sup>59€</sup>

#### MEDICINOS PRIEMONĖS

„Artelac® TripleAction“ pažangiausias tirpalas, sukurtas taip, kad išliktų ant akies paviršiaus ir intensyviai drėkindamas akimirksniu ir ilgam numalšintų sausų akių simptomus. Sudėtyje esantys komponentai (hialuronas, glicerolis, karbomeris, lipidinis komponentas) atkuria visus tris ašarų plovėles sluoksnius. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius.

„Artelac® Nighttime Gel“ atkuria ašarų plovėlių nakties metu. Produktas suteikia papildomą apsaugą tiems, kam pasireiškia didesnis ir nuolatinis akių sausumas. 2024.11.11

„ARTELAC“ – PAŽANGŲ SPRENDIMAI SAUSOMS AKIMS

#### ALERGINIAM KONJUNKTYVITUI GYDYTI

9<sup>99€</sup>

### LECROLYN SINE, 10 ml

#### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

#### ANTIALERGINIS VAISTAS

- BE KONSERVANTŲ, todėl tinka naudoti su kontaktiniais lęšiais.

- Skiriamas ir vaikams, ir suaugusiems.

- Įprasta dozė: po 1-2 lašus į abi akis 4 kartus per parą.

„Lecrolyn sine“ kiekvienam mililitre yra 40 mg natrio kromoglikato ir pagalbinių medžiagų (glicerolis, dinatrio edetatas, polivinilo alkoholis, injekcinis vanduo). Terapinės indikacijos: suaugusiųjų ir vaikų alerginis konjunktyvitas. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: nerūstatyta. „Lecrolyn sine“ galima vartoti nėštumo ir žindymo metu, nes sisteminis natrio kromoglikato poveikis vartojant vietinai į akis yra nereikšmingas. Specialios laikymo sąlygos: laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Negalima užšaldyti. Pirmą kartą atidarius buteliuką, tinkamumo laikas – 8 savaitės. Informacinio teksto peržiūros data: 2016 m. gruodžio 5 d.

-40% 7<sup>19€</sup>  
~~11<sup>90€</sup>~~

### AMBIO

REGĖJIMUI, 30 kapsulių

#### MAISTO PILDAS

- Kompleksinis maisto papildas akims, kurio sudėtyje yra: mėlynių uogų miltelių, liuteino, zeaksantino, vitaminų bei mineralų.
- Cinkas padeda išsaugoti normalią regėjimą ir palaikyti normalią vitamino A apykaitą.
- Cinkas, varis, selenas, vitaminai C ir E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.
- Selenas, varis ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
- Varis ir vitaminas C padeda palaikyti normalią energijos apykaitą bei normalią nervų sistemos veiklą.

-25%



### AKINIAI SKAITYMAI

Vis daugiau skaitotome ne spausdintą tekstą, o iš ekranų. Pristatome naujieną – skaitymo akiniai su Blue Control lęšiais. Jų privalumai:

- Apsaugo akis nuo kenksmingų mėlynos šviesos spindulių, kurią skleidžia skaitmeniniai prietaisai (išmanūs telefonai; kompiuteris; planšetinis kompiuteris; televizorius; LED apšvietimas)
- Panaikina atspindžius tiek iš išorės, tiek iš vidinės lęšio pusės.
- Mažina akių nuovargį.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

#### AKIŲ VOKŲ HIGIENAI

-20%

BLEPHACLEAN, drėgnos servetėlės akių sritys ir akių vokų valymui, 20 vnt. 13<sup>97€</sup> 11<sup>18€</sup>BLEPHA EYEBAG, daugkartinė šildomoji akių kaukė, 1 vnt. 47<sup>97€</sup> 38<sup>38€</sup>BLEPHAGEL, gelis akių vokų ir blakstienų higienai, 30 g 17<sup>97€</sup> 14<sup>38€</sup>

#### MEDICINOS PRIEMONĖS, KOSMETIKOS PRIEMONĖ

„Blephaclean“ – švelni ir veiksminga akių vokų priežiūra, sergant blefaritu, sausų akių sindromu ar po akių operacijų. Taip pat esant akių alergijai ar infekcijai. Tinka kokiems nors 3 mėn., vaikams, suaugusiems ir vyresnio amžiaus žmonėms! Be konservantų!

„Blepha Eyebag“ daugkartinė šildomoji kaukė gydo Meibomo liaukų funkcijų sutrikimą (MGD) ir blefaritą, lengvina sausų akių simptomus, susijusius su MGD ar kitomis panašiomis akių būklėmis, tokiomis kaip miežis ar chalazionas (šaltasis miežis).

„Blephagel“ yra hipoalerginis sterilus gelis, skirtas kasdienai akių vokų ir blakstienų higienai, sergant blefaritu, kai akys sausos dėl Meibomo liaukų funkcijos sutrikimo, kai akis ir akies vokas pažeisti rožinės aknės ar seborėjinio dermatito. Be konservantų!

KOMPLEKSINĖ AKIŲ VOKŲ PRIEŽIŪRA BE KONSERVANTŲ!

-30%

ABC VIT VITAMINAS A, 60 kapsulių 6<sup>99€</sup> 4<sup>89€</sup>OPTIC BIOLUTEINA 25, 30 tablečių 7<sup>99€</sup> 5<sup>59€</sup>

#### MAISTO PILDAS



8<sup>99</sup> €


## TANTUM VERDE®

TANTUM VERDE®, 1,5 mg/ml, burnos gleivinės purškalas (tirpalas), 30 ml  
TANTUM VERDE®, 3 mg/ml, burnos gleivinės purškalas (tirpalas), 15 ml  
TANTUM VERDE®, 3 mg, 20 kietųjų pastilių  
TANTUM LEMON®, 3 mg, 20 kietųjų pastilių

### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veiklioji medžiaga, stiprumas:** 1 ml burnos gleivinės purškalo yra 15 mg arba 3 mg benzidamino hidrochlorido. 1 pastilėje yra 3 mg benzidamino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** lokalus simptominis skausmingo burnos, ryklės bei dantenu uždegimo ir patinimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti 1 burną ir ryklę. **Purškalai:** reikia purkšti 2–6 kartus per parą. Suaugusiems: po 4–8. Tantum Verde™: išpurškimas: 6–12 m. vaikams: po 4. Tantum Verde™: išpurškimas: 3–5 m. vaikams: po 1. Tantum Verde™: išpurškimas 4 kg kūno svorio (daugiausia 4 išpurškimus). Suaugusiems: po 2–4. Tantum Verde™ forte: išpurškimas: 6–12 m. vaikams: po 2. Tantum Verde™ forte: išpurškimas: 3–5 m. vaikams: po 1. Tantum Verde™ forte: išpurškimas 8 kg kūno svorio (daugiausia 2 išpurškimus). **Pastilės.** Suaugusiems: 1 kietoji pastilė 3–4 kartus per parą; 6–12 m. vaikams galima vartoti tik suaugusiems žmogui prižiūrint; jaunesniems negu 6 m. vaikams vartoti negalima. **Kontraindikacijos:** alergija benzidaminui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Alergija salicilo rūgščiai arba (r) bet kuriam nesteroidiniam vaistui nuo uždegimo. **Specialūs įspėjimai:** per apsirinkimą pavartojus (pvz., vaikų) labai daug vaisto, būtina nedelsiant informuoti gydytoją. Pirmoji pagalbinė gydymo priemonė gali būti vėmimo sukėlimas. Jeigu trumpalaikis gydymas benzidaminu reikiamo poveikio nesukelia, būtina kreiptis į gydytoją. Reikia saugotis, kad vaistinio preparato nepatektų į akis. Ilgalaikis gydymas benzidaminu gali lemti jautrumo padidėjimą. Tokiu atveju vaistinio preparato vartojimą turite nutraukti ir kreiptis į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2025-04-05.

## NUO SLOGOS

NUO 3<sup>50</sup> €


## OLYNTH®

OLYNTH® HA, 0,5 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 6<sup>25</sup> €  
OLYNTH® HA, 1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 6<sup>25</sup> €  
OLYNTH®, 1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 5<sup>75</sup> €  
OLYNTH®, 1 mg/ml, nosies lašai (tirpalas), 10 ml 3<sup>50</sup> €

### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 ml tirpalo yra 0,5 mg arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikis simptominis nosies gleivinės paburkimo lengvinimas, sergant rinitu ar sinusitu. Olynth® HA, 1 mg/ml ir „Olynth“, 1 mg/ml skiriamas vartoti suaugusiems, 12 m. ir vyresniems vaikams. Olynth® HA, 0,5 mg/ml skiriamas vartoti 2–12 m. vaikams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** purkšti po 1 išpurškimo arba lašinti po 1 lašą į kiekvieną nosies landą ne daugiau kaip 3 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; padidėjęs akispūdis, ypač pacientams, sergantiems uždarą kampo glaukoma; sausasis arba vazomotorinis nosies gleivinės uždegimas; pacientai, kuriems atliktas transfenoidalinė hipofizektomija; monoaminooksidazės inhibitorių vartojimas šiuo metu arba per pastarąsias 2 savaites; vaistų, galinčių padidinti kraujospūdį, vartojimas; pacientai, sergantys atrofiniu arba vazomotoriniu rinitu. **Specialūs įspėjimai:** jei gydytojo nepamirškite kitaip, negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Atsargiai vartoti pacientams, kurie jautriai reaguoja į simpatomimetikus, serga širdies ir kraujagyslių ligomis, hipertenzija, hipertiroidizmu, cukriniu diabetu, esant prostatos hiperplazijai ar sergant feochromocitoma. Reklamos teksto parengimo data 2025-02. LT-01U-2025-106030

### GREITAS PALENGVĖJIMAS NOSIAI IR SINUSAMS.

5<sup>99</sup> €


## WINTROZEN

600 mg, 10 šnypščiučių tablečių

### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Kiekvienoje šnypščiučio tablete yra 600 mg acetilsisteino.

**Terapinės indikacijos.** „Wintrogen“ skirtas gleivėms skystinti ir atsislojimo lengvinti sergant peršalimo sukeltu bronchitu, suaugusiems ir vyresniems kaip 14 metų paaugliams. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems ir vyresniems kaip 14 metų paaugliams: rekomenduojama dozė yra 1 tabletė (600 mg) 1 kartą per parą, vakare. Jūsų gydytojas gali pakeisti vartojimo dažnį ir dozę, neviršydamas 600 mg didžiausios paros dozės. „Wintrogen“ negali būti vartojamas ilgiau nei 5 dienas. **Vartojimo metodas.** 1 šnypščią tabletę ištirpinti stiklinėje vandens. Paruoštą tirpalą reikia išgerti per kelias minutes. Rekomenduojama nemaityti „Wintrogen“ su kitais vaistais. **Kontraindikacijos.** „Wintrogen“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija acetilsisteinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Dėl didelio veikliosios medžiagos kiekio „Wintrogen“ negalima vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 14 metų paaugliams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Wintrogen“, jeigu: atsiranda naujų odos ir gleivinės pokyčių. Labai retai gauta pranešimų apie sunkių odos reakcijų, sergate uždegimine bronchų liga, netoleruojate histamino, yra ar anksčiau buvo skrandžio ar žarnyno problemų, vadinamų skrandžio ar dvilypkapištes žarnos opomis, ypač kai kartu su „Wintrogen“ vartojami kiti skrandžio gleivinę dirginantys vaistai. Jeigu jaučiate sėros kvapą, nesijaudinkite, nes tai yra acetilsisteino savybė ir nereikia, kad vaistas pakito.

Reklamos teksto parengimo data: 2025 m. gegužės mėn. ID:000729217

## NUO SLOGOS

5<sup>99</sup> €


## GALANAS

1 mg/50 mg/ml, nosies purškalas, 10 ml

### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido ir 50 mg deksantenolio. **Indikacijos:** „Galanas“ skirtas suaugusiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) ir kaip pagalbinė priemonė odos bei gleivinės pažeidimams gydyti, ne alerginės kilmės išskyros iš nosies (vazomotoriniam rinitui) mažinti ir kvėpavimui per nosį palengvinti esant nosies užgulimui po nosies operacijos; nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu ir ūminiu prienosinių ančių uždegimu (rinosinusitu). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams 1 purškalo tirpalą dozė / kiekvieną šnervę pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Dozavimas priklauso nuo individualaus paciento jautrumo ir klinikinio atsako. „Galanas“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 paras, nebent gydytojas nurodė kitai. Dėl vaikų gydymo trukmės reikia pasikonsultuoti su gydytoju. **Kontraindikacijos:** šio vaistinio preparato vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliosios ar pagalbinės medžiagos; jeigu yra sausasis nosies gleivinės uždegimas (rinitis sicca); po chirurginio posmegeninės liaukos pašalinimo per nosį (transfenoidalinė hipofizektomija) arba po kitų chirurginių intervencijų, pažeidžiančių smegenų dangalą; kodikiams ir jaunesniems kaip 6 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** pasitarti su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Galanas“, jeigu esate gydymas monoaminooksidazės (MAO) inhibitoriais; jeigu padidėjęs akispūdis; jeigu sergate sunkia širdies ar kraujagyslių sistemos liga; jeigu yra antinksinių navikų; sergate cukriniu diabetu ar yra suaktyvėjusi skydlaukės veikla; jei yra padidėjusi prostata (prostatos hiperplazija). Reklamos teksto parengimo data 2021-08.

### ATKĖMSA NOSĮ IR AKTURIA PĄŽEISTĄ NOSIES GLEIVINĘ.

-40%



## AMBIO

GERKLEI AVIEČIŲ SKONIO, 20 čiulpiamųjų tablečių 5<sup>99</sup> 3<sup>41</sup> €

GERKLEI SU ISLANDINE KERPENA IR EUKALIPTU, 20 čiulpiamųjų tablečių 5<sup>99</sup> 3<sup>59</sup> €

GERKLEI SU ISLANDINE KERPENA IR IMBIERU, 20 čiulpiamųjų tablečių 5<sup>99</sup> 3<sup>59</sup> €

### MAISTO PAPILDAI

## NUO GERKLĖS SKAUSMO

7<sup>97</sup> €


## INOVOX

INOVOX HONEY LEMON 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, 24 kietosios pastilės

INOVOX ORANGE 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, 24 kietosios pastilės

### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 kietoji pastilė yra 2 mg lidokaino hidrochlorido, 0,6 mg amilmetakrezolio ir 1,2 mg 2,4-dichlorobenzilo alkoholio. **Indikacijos:** gerklės skausmo malšinimas, vietinis antiseptinis gerklės ir burnos ertmės uždegiminių būklių (pvz., paraudimo, patinimo) gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** po 1 kietąją pastilę kas 2–3 val. ir kai reikia, bet ne daugiau kaip 8 kietąsias pastiles per parą (vaikams – ne daugiau kaip 4 pastiles). Vartoti ant burnos gleivinės. Kietąją pastilę reikia lėtai sučiulpi ir laikant burnoje, bet ne už skruosto. Vaisto nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** jei simptomai neišnyksta ilgiau kaip 2 paras, sunkėja, arba atsiranda naujų simptomų, reikia įvertinti paciento klinikinę būklę. Atsargiai vartoti ūmine liga sergantiems, nusilpusiems pacientams. Nevartoti esant ūmios burnos ir gerklės žaizdoms, prieš valgant ar atsisergiant. Astma sergantys pacientai turi būti prižiūrimi gydytojo. Sudėtyje yra levomentolio terpenų, gliukozės, sacharozės, saulėlydio getonžio ir košenilio raudonojo. Reklamos teksto parengimo data 2022-06-09.

### „INOVOX“. EFEKTAS – JAU PO 1 MINUTES!

NUO 9<sup>99</sup> €


## SINUPRET

SINUPRET, geriamieji lašai (tirpalas), 100 ml 9<sup>99</sup> €

SINUPRET INTENS, 160 mg, 20 dengtųjų tablečių 11<sup>99</sup> €

SINUPRET FORTE, 20 dengtųjų tablečių 9<sup>99</sup> €

### NERECEPTINIAI AUGALINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Terapinės indikacijos.** Geriamieji lašai SINUPRET yra augalinis vaistas, vartojamas tirštam sekretui skystinti sergant ūminiu prienosinių ančių uždegimu (sinusitu) arba jo palmeijimu sergant lėtine ligos forma. SINUPRET INTENS yra augalinis vaistas, skirtas suaugusiųjų ūminiam nekomplikuotam prienosinių ančių uždegimui gydyti, jei pasireiškia tokie simptomai kaip nosies begimės, nosies užgulimas, galvos skausmas, veido skausmas arba spaudimas. SINUPRET FORTE yra augalinis vaistas, vartojamas tirštam nosiaryklės sekretui skystinti sergant ūminiu arba palmeijusiu lėtiniu prienosinių ančių uždegimu (sinusitu). **Veikliosios medžiagos ir stiprumas.** 1 g SINUPRET geriamųjų lašų yra 290 mg skystojo ekstrakto (1:1), pagaminto iš gencionų šaknų, raktazolių žiedų, rūgščių žolės, juodojoji šėvamedžių žiedų, verbenų žolės (13:3:3:3). SINUPRET INTENS veiklioji medžiaga yra gaminis sausosios ekstrakto (1:1) iš gencionų šaknų, raktazolių žiedų, rūgščių žolės, juodojoji šėvamedžių žiedų, verbenų žolės (13:3:3:3). Kiekvienoje dengtąją tablete yra 160 mg gaminio sausosios ekstrakto. SINUPRET FORTE Vienoje dengtąją tablete yra 36 mg verbenų žolės miltelių, 12 mg gencionų šaknų miltelių, 36 mg rūgščių žolės miltelių, 36 mg juodojoji šėvamedžių žiedų miltelių, 36 mg raktazolių žiedų miltelių. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** 2–5 metų vaikams gerti 15 geriamųjų lašų 3 kartus per dieną, 6–11 metų vaikams – 25 geriamuosius lašus 3 kartus per dieną, suaugusiems ir paaugliams nuo 12 metų – po 50 geriamųjų lašų 3 kartus per dieną. Suaugusiems vartoti po 1 dengtąją tabletę SINUPRET INTENS 3 kartus per dieną (daugiausia 3 dengtąsias tabletes per parą). SINUPRET FORTE suaugusiųjų paauglių nuo 12 metų turėtų vartoti po 1 tabletę 3 kartus per parą. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. SINUPRET INTENS vartoti negalima, jeigu turėjote ar turite peptinę opa. **Specialūs įspėjimai.** Jei simptomai išsilaiko ilgiau nei 7–14 dienų ar periodiškai kartojasi arba pasireiškia dusulys, karščiavimas ir atsiranda pūlingų skysčių, reikia kreiptis į gydytoją. Geriamuosius lašus SINUPRET vartoti jaunesniems nei 2 metų vaikams nerekomenduojama. Šio vaisto sudėtyje yra 19 tūno % etanolio (alkoholio). Nerūpinamas sergantiesiems alkohizmu. Būtina atsižvelgti į nešiojimą, šėvmedžių, vaikams ir didelės trūkų grupės pacientams (pvz., sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija). Jeigu nustatytas geritinis ar jeigu paciento skrandis jautrus. SINUPRET INTENS geriausia vartoti po valgio, užgeriant stikline vandens. Vartoti vaikams ir jaunesniems nei 18 metų amžiaus paaugliams nerekomenduojama. SINUPRET FORTE nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams dėl pakankamų duomenų trūkumo. Teksto parengimo data 2025-04-07.

-40% 3<sup>11</sup> €


RHINOSOL aliejiniai nosies lašai, 10 ml

NOSIES LAŠAI

## NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO

NUO 2<sup>49</sup> €

## APAP

APAP, 500 mg, 12 plėvele dengtų tablečių 2<sup>49</sup> €APAP, 500 mg, 24 plėvele dengtos tabletės 4<sup>49</sup> €APAP, 250 mg granulės pakėtyje, vaikams, 10 pakėtylių 6<sup>49</sup> €

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** 1 pakėtyje „APAP 250 mg“ yra 250 mg paracetamolio; 1 plėvele dengtoje tabletėje „APAP 500 mg“ yra 500 mg paracetamolio. **Indikacijos:** silpno ir vidutinio stiprumo skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Apap, 500 mg“ plėvele dengtos tabletės: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1–2 tabletes kas 4–6 valandas, ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. „Apap, 250 mg“ granulių pakėtyliuose, skirtų vaikams, vienkartinė dozė yra nuo 10 iki 15 mg/kg kūno svorio vyresniems nei 4 m. vaikams, ją vartoti ne dažniau kaip kas 4 valandas (didžiausia paros dozė – 4 pakėtyliai). Granules supilti tiesiai į burną ant liežuvio ir praryti neužgerus vandens. **Kontraindikacijos:** vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai:** prieš vartojant būtina pasitarti su gydytoju, jei yra: pažėstos kepenys ar inkstai, astma, gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka, hemolizinė anemija, vartojami kiti vaistai, skysčių netekimas, mitybos nepakankamumas, vartojamas alkoholis bei nėštumo ir žindymo laikotarpiai. Didėsnes nei rekomenduojamos dozes sukelti vidaus organų pažeidimus. **Reikiamos teksto parengimo data** 2025-03-31. „APAP“. KIEKVIENOJE VAISTINĖLĖJE.


## SKAUSMO, TINIMO IR UŽDEGIMO MAŽINIMAS SUAUGUSIESIEMS

12<sup>97</sup> €

DIFORTAN, 100 mg/g gelis, 100 g

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** kiekviename grame „Difortan“ gelio yra 100 mg etofenamato. **Terapinės indikacijos:** lengvų arba vidutinio stiprumo raumenų skausmų, kraujosruvų, potrauminio skausmo, lengvo arba vidutinio stiprumo raumenų skausmo (osteotrozės / osteoartrito), lengvo arba vidutinio stiprumo sąnarių skausmo, sinovito, (neinfekcinio) artrito, bursito, tendinito, vidutinio sunkumo su raumenų ir skeleto sistema susijusio uždegimo, t. y. potrauminio ar reumatinės kilmės, lokalūs gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems kasdien 3–4 kartus per parą, 14 parų, dozės kiekis atitinka nuo 2,5 iki 5 cm išpausto gelio. **Kontraindikacijos:** vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai ar ant egzemos pažėstų paviršių, atvirų žaizdų, vietų su opomis ar pažeidimais. **Specialūs įspėjimai:** „Difortan“ negalima tepti ant gleivinių arba ant akių. Galimas padidėjęs jautrumas dėl kryžminės reakcijos su kitais uždegimą malšinančiais vaistais: rizikos. Kontaktinės fotoalergijos rizika, todėl saugoti nuo saulės spindulių. Negalima atimti sisteminio poveikio reikšmingų galimybių, todėl pacientams, kuriems yra inkstų ar kepenų nepakankamumas, šį vaistinį preparatą reikia vartoti atsargiai. Pasitarti su gydytoju, jeigu būklė nepagerėja arba jei po 7 parų būklė pablogėja. Teksto parengimo data 2024-11-11.

-20% 15<sup>19</sup> €

AMEDIPLUS skausmą malšinantis pleistras, 9 x 14 cm, 10 vnt.

## MEDICINOS PRIEMONĖ

## RAUMENIMS IR SĄNARIAMS

-30%



## AXANOVA

AXANOVA ACTIVE GEL, gelis, 125 ml 13<sup>49</sup> 9<sup>44</sup> €AXANOVA COOL GEL, gelis, 125 ml 12<sup>99</sup> 9<sup>09</sup> €AXANOVA HOT GEL, 125 ml 13<sup>49</sup> 9<sup>44</sup> €

„Axanova“ priemonių pagrindas – eteriniai aliejai. Atsivėlgiant į priemonės sudėtį, šildo arba vėsina, gali būti naudojamos esant sumušimams, patempimams, maudžiant sąnarius ar raumenis. Pagaminta Šveicarijoje.

-30% 7<sup>55</sup> €

## AMEDIPLUS ACTIVE GEL

Šaldomasis-šildomasis kūno gelis, 100 ml  
KOSMETIKOS PRIEMONĖ

## NUO ALERGIJOS

5<sup>49</sup> €

CLARITINE 10 mg, 10 tablečių

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** tabletėje yra 10 mg loratadino. **Terapinės indikacijos:** alerginės slogos (pvz., šienligės) simptomų (šaudulio, slogos, nosies ir akių niežulio bei persėjimo) lengvinimas; lėtinis dilgėlinės sukelto odos niežulio, paraudimo ir pūslių mažinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 6 m., kurie sveria daugiau nei 30 kg, gerti po 1 tabletę 1 kartą per parą su maistu ar be jo, užgeriant stikline vandens. Jaunesniems kaip 6 m. vaikams arba sveriantiems mažiau negu 30 kg tablečių vartoti nerekomenduojama. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jei sergate kepenų liga, prieš pradėdami vartoti vaistą pasitarkite su gydytoju. Nevartokite „Claritine“ 2 dienas iki numatomų alerginių odos mėginių. Nėštumo metu „Claritine“ geriau nevartoti. Loratadino patenka į motinos pieną, todėl žindymą vartoti nerekomenduojama. Sudėtyje yra laktozės. **Reikiamos teksto parengimo data:** 2024-06. CH-20240603-ISI Informacija sutrumpinta.

-40% 6<sup>59</sup> €

RUTIN FORTE + C, 30 kapsulių

## MAISTO PAPILDAS

„Rutin forte+C“ sudėtyje yra rutozido, vitamino C, cinko ir seleno. Normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių funkcijai, susidarymą padeda palaikyti vitaminas C. Normalią imuninės sistemos veiklą padeda palaikyti vitaminas C, cinkas ir selenas. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną.

-30%



## KVAPNIOS „EMILI“ ŽOLELIŲ ARBATOS

Suaugusiems ir vaikams  
DARBINGIAI DIENAI IR JAUKIAM VAKARAI



# Mėgaukimės pavasariu drauge



**Otrivin 1 mg/ml nosies purškalo (tirpalas)** (ksilometazolino hidrochloridas). **Indikacijos.** Nosies gleivinės paburkimo mažinimas peršalus, sergant sinusitu, šienlige ar kitokia alergine sloga. Nosiaryklės gleivinės paburkimo mažinimas, gydant vidurinės ausies uždegimą. Nosies ertmės apžiūros atlikimo lengvinimas. Skirtas vartoti suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams. **Vartojimas.** Po 1 įpurškimą į kiekvieną nosies landą, kai reikia. Negalima purkšti daugiau kaip 3 k./parą į kiekvieną nosies landą. **Kontraindikacijos.** Alergija ksilometazolinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, pacientams, kuriems neseniai buvo atlikta operacija per nosį, sergantiems uždarą kampo glaukoma (padidėjęs spaudimas akyje), lėtiniu nosies uždegimu (sausuoju atrofiniu rinitu). **Specialūs įspėjimai.** Negalima vartoti ilgiau kaip 7 d. iš eilės. Negalima viršyti rekomenduojamos dozės, ypač vaikams ir pagyvenusiems žmonėms. Atsargiai vartoti, jeigu yra padidėjęs kraujospūdis, širdies liga (pvz., pailgėjusio QT intervalo sindromas), cukrinis diabetas, padidėjęs skydliaukės aktyvumas, padidėjusi prostata, gerybinis antinksčių auglys, jei vartojate triciklinių ir tetraciklinių antidepresantų, jeigu vartojate arba per pastutines 2 sav. vartojote vaistų nuo depresijos ar Parkinsono ligos, vadinamų MAOI. Labai jautriems pacientams gali sukelti miego sutrikimą, galvos svaigimą, tremorą. Sudėtyje yra benzalkonio chlorido. **Fenistil 1 mg/g gelis.** Dimetindeni maleatas. **Indikacijos.** Niežulio, susijusio su odos išbėrimu, dilgeline, vabzdžių įkandimu, saulės ar kitokių priežasčių sukeltu paviršinių odos nudegimu. **Vartojimas.** Pažeistą odos plotą tepti 2-4 k./dieną. **Kontraindikacijos.** Alergija dimetindeni maleatui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai.** Jei niežulys labai sunkus arba odą labai pažeista, jei simptomai per 7 d. nepalengvėja, būtina kreiptis į gydytoją. Jei gelio tepamas didelis odos plotas, ilgai būti saulėje draudžiama. Kūdikams ir vaikams iki 2 m. didelio odos ploto, ypač apimto uždegimo arba pažeisto, gelio tepti draudžiama. Nevartoti ant gleivinės. Sudėtyje yra propilenglikolio ir benzalkonio chlorido. **Vibrocil 2,5 mg/0,25 mg/ml nosies purškalo (tirpalas)/deguna aerosols, šķidums** (fenilefrinas/dimetindeni maleatas). **Indikacijos.** Nosies gleivinės paburkimui mažinti peršalus ir susirgus rinitu (nosies gleivinės uždegimu), sergant sezoniniu (žiedadulkių sukeltu) ar nesazoniniu alerginiu rinitu. **Vartojimas.** Suaugusieji ir vyresni kaip 6 m. vaikai: 1-2 įpurškimai į kiekvieną nosies landą 3-4 k./parą. Nosies purškalo nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 6 metų vaikams. **Kontraindikacijos.** Alergija veikliosioms ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, atrofinis rinitas (lėtinis nosies gleivinės uždegimas), MAOI (vaistų nuo depresijos arba psichikos ligų) vartojimas, uždarą kampo glaukoma (padidėjęs akispūdis). **Specialūs įspėjimai.** Pasitarti su gydytoju, sergant širdies ir kraujagyslių liga, cukriniu diabetu, epilepsija, esant padidėjusiam kraujospūdžiui ar skydliaukės aktyvumui, padidėjusiai prostatai ir dėl to pasireiškiant šlapimo susilaikymui. Nevartoti ilgiau kaip 7 d. iš eilės. Sudėtyje yra benzalkonio chlorido. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [NepageidaujamaR@vvkt.lt](mailto:NepageidaujamaR@vvkt.lt) arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje <https://vvkt.lrv.lt/lt/>. Teksto parengimo data 2025/02. Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi jiems licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas. PM-LTI-FENI-25-00001



IKI -50%

**REBRAIN**, 60 kapsulių **59<sup>99</sup> 35<sup>99</sup> € -40 %****LABANAKT**, 14 pakelių **6<sup>99</sup> 4<sup>19</sup> € -40 %****RETINA**, 28 pakeliai **29<sup>99</sup> 17<sup>99</sup> € -40 %****BIOCINKAS 30 mg**, 20 pakelių **10<sup>99</sup> 5<sup>99</sup> € -50 %****MAISTO PAPILDAI**

Išskirtiniai maisto papildai žmonėms, kuriems svarbu, ką vartoja. Išskirtinai reikalingi: „Retina“ – liuteino, cinko, vitamino A, B2 ir „Pycnogenol“ kompleksas, padedantis išsaugoti regėjimą. 1 pakelyje – net 50 mg liuteino. Vitaminai A ir B2 padeda išsaugoti normalią regėjimą. Cinkas padeda palaikyti normalią vitamino A apykaitą. „reBRAIN“ – maisto papildas, kurio sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų poveikis smegenų veiklai, atmintčiai ir gerai nuotakai patvirtintas klinikiniais tyrimais. Fosfolipidai padeda palaikyti kognityvinę funkciją ir ryškiai atminti. Vidutinės grandinės trigliceridai (MCT aliejus) turi sąsają su žmogaus bendra psichologine funkcija, atmintimi, sprendimų priėmimu, mirčių dėstyumu. „Labanakt“ – melatonino, valerijonų ir magnio kompleksas geresniam miegui. Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti. „biOCINKAS 30 mg“ – net 30 mg cinko Jūsų grožiui ir imunitetui.



## GERAI SAVIJAUTAI

-20%

100 METŲ  
Doppelherz  
rūpinamės jūsų sveikata**DOPPELHERZ****MAISTO PAPILDAI**

Maisto papildus „Doppelherz“ gamina viena farmacinių produktų gamintojų lyderių Vokietijoje „Queisser Pharma“, todėl produktai kuriami pasitelkiant naujausias technologijas ir gamybos laimėjimus bei laikantis tarptautinių kokybės standartų. Maisto papildai „Doppelherz“ yra vieni perkamiausių Lietuvoje ir jau daugiau kaip 20 metų garantuoja savo klientams gerą savijautą.

**„DOPPELHERZ“ – DVIEJŲ ŠIRDŽIŲ JĖGA!**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-30%

1<sup>18€</sup>  
~~1<sup>65</sup>~~**DINADAX**

krantmosios lazdelės

**MAISTO PAPILDAI**

„DinadaxActive“ – maisto papildas su laktobakterijomis, fruktooligosacharidais, bičių pieneliu, vitaminais B1 ir B6.

„DinadaxEnergy“ – maisto papildas su bičių pieneliu, želatina ir B grupės vitaminais.

„DinadaxSapiens“ – maisto papildas su cholino bitartratu, omega-3, linolo ir oleino rūgštimis, vitaminais, folio rūgštimi, biotinu ir cinku.

**KRIMSK PASIGARDŽIUODAMASI!**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



-20%

5<sup>03€</sup>  
~~6<sup>35</sup>~~**UNDEVIT** 50 dražečių**MAISTO PAPILDAS**

Vitaminų A, C, E, B grupės (B1, B2, B6, B12) ir niacino, pantoteno rūgšties, folio rūgšties preparatas. Vitaminai C ir A padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo, vitaminas B1 (tiaminas) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, vitaminas B2 (riboflavinas) padeda išsaugoti normalią regėjimą, vitaminas B6 (piridoksinas) padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, vitaminai B12 (cianokobalaminas) padeda palaikyti normalią raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją, pantoteno rūgštis padeda palaikyti normalią protinę veiklą. **Vartojimas:** gerti po 1 dražetę per dieną po valgio. **Gaminiojas:** „Technolog“, Ukraina. **Išskirtinis platiniojas Lietuvoje:** UAB VERATRUM PHARMA, Žarijų g.28, Vilnius

-15%

**NUTRIDRINK, CUBITAN, NUTRIKID****SPECIALIOS MEDICININĖS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAI**

Turi būti vartojami prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

## INKSTAMS IR ŠLAPIMO TAKAMS

-20%

9<sup>11€</sup>  
~~11<sup>39</sup>~~**FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS**, 30 kapsulių**MAISTO PAPILDAS**

„Fitolizyna Nefrocaps PLUS“ yra unikalus 7 koncentruotų augalinių ekstraktų mišinys, kuris:

- padeda palaikyti normalią inkstų ir šlapimo takų veiklą (petražolių šaknis, dirvinii asioklių žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, karpotųjų beržų lapai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė);

- padeda palaikyti normalų vandens pašalinimą iš organizmo, todėl skatinamas nepageidaujimų metabolizmo produktų šalinimas su šlapimu (dirvinii asioklių žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė).

- padeda palaikyti normalią inkstų ir šlapimo takų veiklą.

**Rekomenduojamas vartojimas:** 1 kapsulė 2 kartus per parą prieš valgį, užgeriant dideliu kiekiu vandens (ne mažiau kaip ½ stiklinės).

-20%

**MAGNEX****MAISTO PAPILDAS**

Magnis yra gyvybiškai svarbus elementas žmogaus organizmui. „Magnex“ šeima sudaro penki skirtingi magnio produktai. Kiekvienas „Magnex“ papildas suteikia 375 mg absorbuojamo magnio vienose paros dozėje. Vitaminas B6 kartu su magniu sustiprina magnio poveikį, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, normalią nervų sistemos veiklą, mažina pavargimo jausmą ir nuovargį. „Magnex 375 mg“ – pagrindinis magnio papildas su magnio oksidu. Magnio oksidas yra sveikus skrandžiui, pakanka tik 1 tabletės per dieną. „Magnex 375 mg + B6“, magnio oksidas, papildytas vitaminu B6. 1 tabletė per dieną raumenų ir širdies veiklai palaikyti. „Magnex Citrate + B6“ – gerai įsivartojamas magnio citratas kartu su vitaminu B6. Tinka esant dideliui magnio poreikiui. 2 tabletės per dieną. „Magnex Citrate + B6 Chew“ – gaivaus citrinių skonio krantmosios tabletės, sudarytos iš magnio citrato ir vitamino B6. Šis maisto papildas yra idealus aktyvių, dirbančių ir pagyvenusių žmonių poreikiams patenkinti. Tabletes rekomenduojama vartoti po šilto krūvo arba prieš miegą. Krantmosios tabletės yra puikus pasirinkimas, jei nemėgstate įrašyti tablečių ar kapsulių.

**UNITAL****MAISTO PAPILDAS**

„Unital“ sudėtyje yra 1 mg melatonino. Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. (Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti.) Melatoninas padeda mažinti subjektyvų laiko juostų skirtumą pajautimą. (Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant ne mažiau kaip 0,5 mg prieš einant miegoti pirmą kelionės dieną ir kelias dienas po atvykimo į kelionės tikslo vietą.) Vartojimas: suaugusiems rekomenduojama vartoti ½-1 tabletę. Dozė visada turėtų būti suvartota tuo pačiu metu vakare. Maistas sumažina melatonino absorbciją, taigi vartokite „Unital“ tabletes porą valandų po valgio. Netinka nėščioms ar žindančioms moterims bei vaikams. Sudėtyje nėra cukraus, laktozės, glitimo ar baltymų. **„UNITAL“ PADEDA MAŽINTI LAIKO, REIKALINGO NORINT UŽMIGTI, TRUKMĘ!**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms





**-25%**



**JAUSKITĖS PUIKIAI!**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

## -30%



**„VITIRON D3 + OMEGA3 STRONG“** yra šalės D3 vitamino dozė, paruošta liūų sėmenų aliejais pagrindu, o tai yra natūralūs kilmės omega-3. Liūų sėmenų aliejais pagrįsta skalina gerai D vitamino absorbciją ir biologiinį įsisavinimą. Vitamins D3 padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų ir dantų būklę bei normalią raumens funkciją. Liūų sėmenų aliejus yra natūralus omega-3 šaltinis. **„VITIRON D3 OILVE SUN“** – vitaminas D, išsitraipytas tiesiai iš lygūnių aliejų, kuris užtikrina geresnį jo pasisavinimą. Palogus ir gretas vitamino D kiekvėniam. **„VITIRON KIDS“** – tai vaikai ir uogų skūnis, įvairių formų kramtomoji gumulė su vitamino ir mineralinės medžiagos. **„VITIRON KIDS grow UP“** skirti vaikų kaulų augimui ir vystymuisi, **„VITIRON Kids School for BRAIN“** – smegenims, normaliai psichologinei būklei, pažinimo funkcijai, o **„VITIRON KIDS immunity“** su šėvamedžiū uogų skūtimis – imuninutėi.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

## -30%

4<sup>54</sup> €



**-50%**

**7<sup>50</sup> €**



"Vigor UP!" – vitaminų bomba energijai su gvaraninėmis paulinijomis (guarana), paragvajiniais bugieniais (yerba mate) ir kakava. Paragvajiniai bugieniai ir vitaminai B1, B2, B6 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. Magnis ir vitaminai B3, B5, B12 padeda mažinti pavargimo jausmą bei nuovargį. Gvaraninės paulinijos ir vitaminas B5 padeda palaikyti normalią protinę veiklą. Vartojimas: suaugusiesiems – 1 tabletė per dieną, užsigeriant vandeniu.

**-20%**

**-20%**



|                                                                               |                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| DIAS® FORTE kolagenas, granatų skonio milteliai paketėliuose, 30 paketėlių    | 44 <sup>99</sup> 40 <sup>40</sup> € | -10 % |
| DIAS® FORTE kolagenas, greipfrutų skonio milteliai paketėliuose, 30 paketėlių | 44 <sup>99</sup> 35 <sup>99</sup> € | -20 % |
| DIAS® COLLAGEN LIQUID, paruoštas vartoti skystasis kolagenas, 20 paketėlių    | 25 <sup>99</sup> 23 <sup>30</sup> € | -10 % |

**MAISTO PĀPILDAI**  
„DIAS” Forte – didelės koncentracijos 4 kolagenų kompleksas – „Collagen Quattro Complex™” – sąnariams, kaulams, kremzlėms, dantims, dantenoms ir odai. 1 pakeltyje – daugiau kaip 10 000 mg kolageno!

„DIAS“ Collagen liquid – hidrolizuoto kolageno, hialurono rūgšties, vitaminų ir mineralų derinys su **bioaktyviais prekių ženklų „Peptan“ kolageno peptidais** kaulams, kremzlėms, raumenims, jungiamajam audiniui, odai, plaukams, nagams, normaliai energijos apykaitai ir imuninės sistemos veiklai. 1 paketėlyje (paros dozė) – net 3900 mg II tipo kolageno!

„DIAS® Detox“ – augalinių ekstraktų ir fermentų, vitaminų bei mineralų kompleksas kepenims, virškinimo sistemai, imunitetui.

**BE GLITIMO, LAKTOZĖS IR PRIDĖTINIŲ CUKRŲ!**

**-20%**

**-20%**



„Floradix“ – svarbiausi mineralai ir vitaminai gerai savijautai. „Floradix“ natūralios sudedamosios dalys užtikrina gerą organizmo svarbiausių vitaminų ir mikroelementų pasisavinimą. Skystos formos medžiagos greičiau rezorbuojasi nei esančios tabletėse, o dėl puikaus skonio juos noriai geria maži vaikai ir yra tinkami vartoti nėščioms moterims.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

**-30%**

**-30%**



**MAISTO PAPILDAI**  
Pasimėgauk gyvenimo akimirkomis su BF-ESSE...

**JŪSU GERAI SAVIJAUTAI!**

\*Akciija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

IKI -60%



**AMBIO**  
**INOCYCLE COMPLEX**, 30 miltelių **27<sup>99</sup> 11<sup>19</sup> € -60 %**  
**MULTIVITAMINAI MOTERIMS PIUS**, 60 tablečių **17<sup>48</sup> 10<sup>49</sup> € -40 %**  
**NAKVIŲ IR AGURKLIŲ ALIEJUS**, 60 kapsulių **17<sup>28</sup> 11<sup>23</sup> € -35 %**  
**MAISTO PAPILDAS**

13<sup>97</sup> €

Natūralus bakterinės vaginozės simptomų gydymas



**CANESBALANCE** makšties ovulės, 7 vnt.  
**MEDICINOS PRIEMONĖ**  
 „Canesbalance“ veiksmingai mažina dėl bakterinės vaginozės atsiradusį nemalonų kvapą, neįprastą išskyras ir nemalonių pojūčių intymioje zonoje. Natūralios gydomosios medžiagos (pieno rūgštis ir gliukogenas) atkuria normalią šarmų ir rūgščių pusiausvyrą (pH), makšties mikroflorą. „Canesbalance“ tinka ir nėščiosioms. Be konservantų. Be kvapiųjų medžiagų. Reklamos teksto parengimo data 2023-12. CH-20231222-38

UŽ 1 CT



**GENTLE DAY®**  
**HIGIENOS PRIEMONĖS**  
 „Gentle Day“ produktai – moterims, kurios myli save, saugo savo sveikatą ir rūpinasi aplinka. Menstruacinė taurelė, pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero kuris nealergizuoja. Ekologiškos „Gentle Day“ higienos prekės itin tinka moterims, kurių oda linkusi sudirgti ar alergiška. Produktai yra sertifikuoti Öeko-Tex® 100, Made for Helati®, VEGAN sertifikatais.

-25%



**CLIMENUM**, 28 tabletės su apvalkalu dienai ir 28 tabletės su apvalkalu nakčiai **19<sup>99</sup> 14<sup>99</sup> €**  
**MAISTO PAPILDAS**  
 Padeda palaikyti normalią saviąautą menopauzės periodu. Vartojimo būdas: išgerti 1 tabletę „Climenum“ dieną iš ryto ir 1 tabletę „Climenum“ nakčiai vakare. Skirtas suaugusiems.

9<sup>99</sup> €



**CAGYNOL**, 300 mg, ovulė, 1 vnt.  
**NERECEPTINIS VAISTAS**  
 Kiekvienoje ovulėje yra 300 mg sertakazonolo nitrato.  
**Terapinės indikacijos.** Vietiniam makšties grybelinės Candida infekcijos gydymui. „Cagynol“ skirtas suaugusiems. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Dozavimas. Viena ovulė vakare prieš miegą, vienkartiniam vartojimui, įterpiama giliai į makštį, geriausia gulint. Gydymo trukmė - vienkartinė dozė. Didžiausia vienkartinė dozė yra viena ovulė (300 mg sertakazonolo). Jei klinikiniai požymiai išlieka, antroji ovulė vartojama 7 dienų intervalu. Vartojimo metodas. Vartoti į makštį. Vartojant šį vaistinį preparatą negalima naudoti tamponų ir intravaginalinių dujų. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas priešgrybeliniams imidazolo klasės vaistiniams preparatams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Laktacijos periodas arba diafragmų naudojimas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei kandidozė patvirtinta, reikia atidžiai ieškoti ekologinių veiksnių, kurie sudaro sąlygas ir skatina grybelinės infekcijos vystymąsi. Norint išvengti atkryčių, labai svarbu nustatyti ir eradikuoti infekciją bei atsivėlgti į ją skatinančius veiksnius. Patarina vienu metu gydyti visą grybelinės infekcijos židinį, pripažintą seksualę partnerį. **Nėštumas.** Tyrimais su gyvūnais teratogeninis poveikis nenustatytas. Sertakazonolo vartojimas nėštumo metu turėtų būti svarstomas tik esant būtinybei. Teksto peržiūros data: 2022 m. gegužės 30 d. Reklamos parengimo data: 2023.12.15. CAGYN/2023/12/03  
**OVULĖ VIETINIAM MAKŠTIES CANDIDOZĖS GYDYMUI**  
**VIENOS OVULĖS SĖKMĖS ISTORIJA**

14<sup>99</sup> €



**LENOSTELLA** 1,5 mg tabletė  
**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**  
**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** vienoje tabletėje yra 1,5 mg levonorgestrelio. **Terapinės indikacijos:** skubioji kontracepcija, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms po nesaugaus lytinio akto. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vieną tabletę reikia išgerti kiek galima greičiau, geriausia per 12 valandų ir ne vėliau kaip per 72 valandas po nesaugio lytinio santykio. **Kontraindikacijos:** jautrumas levonorgestrelui arba pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** nevartoti kol nebuvo pirmųjų mėnesinių. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El.paštas: info.lithuania@sandoz.com. BS2403136093. **Teksto patvirtinimo data:** 2024 03 13.  
**SOS TABLETĖ – PADAEDA IŠVENGTI NĖŠTUMO PO NESAUGAUS LYTINIO AKTO**

-30%

Moterų intymiai higienai



**MULTI-GYN**  
**KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS**  
 Mūsų produktai suteikia tinkamą intymią higieną ir padeda sumažinti nemalonių pojūčių toje srityje: nepageidaujamą kvapą, niežulį ar deginimo pojūtį. „Multi-Gyn“ puikiai supranta moterų poreikius, kai atsiranda nepatogumų intymioje zonoje ir kaip tai paveikia jūsų gyvenimą. Todėl mes siūlome produktus, kurie gydo šiuos negalavimus natūraliu būdu, be žinomo šalutinio poveikio („Actigel 2 in 1“, „Liquigel“, „Flora Plus“). Visų produktų sudėtyje esantis unikalus ZOR® kompleksas atkuria ir normalizuoja natūralią makšties mikroflorą.  
 \* ZOR® kompleksas – patentuoti biologiški aktyvūs polisacharidai, gaunami iš sudedamųjų alavijų (Barbadosis Miller) medžiagų. www.ZOR.com  
**JEI NORI BŪTI TIKRA DĖL SAVO SVEIKOS MAKŠTIES!**  
 \*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-40%



**MEFLOVAN FORTE**, 60 kapsulių **28<sup>49</sup> 17<sup>09</sup> €**  
**MAISTO PAPILDAS**  
 „Meflovan forte“ – trijų augalinių medžiagų derinys, skirtas moterims, siekiančioms maksimalaus komforto ir geros saviąautos menopauzės metu. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną.





-43%

## BIODERMA ATODERM CRÈME ULTRA,

kremas normaliai, sausai odai, 500 ml 20<sup>99</sup> 11<sup>96</sup> €

### KOSMETIKOS PRIEMONĖ

„Atoderm Crème Ultra“ greitai ir ilgai atkuria odos komfortą ir drėkina odą maitindamas odą; greitai drėkina\* ir papildo odą omega-3, -6 ir -9 riebiųjų rūgštimis. Kremo sudėtyje esantis patentuotas kompleksas „Skin Protect“ (niacinamidas ir ksilitilgliukozidas) padeda ilgai palaikyti odos drėgmę, biologiskai skatina hialurono rūgšties gamybą, padeda gaivinti apsauginę odos barjerą: oda 100 % visiškai sudrėkinta ir 100 % apsaugota.\*\* Greitai įsigerianti, lengvai pasiskirstanti tekstūra ir malonus kvapas suteikia komforto pojūtį. Labai gerai toleruojamas.

\*27,7 % oda sudrėkinta 24 val. – „Atoderm Crème Ultra“ drėkinamojo efekto stebėjimas 24 valandas.

\*\* Naudojimo testas, atliktas stebint dermatologams ir dalyvaujant 28 asmenims, 21 diena, Bulgarija, 2020.



-30%

## BIODERMA

### KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Prancūzijos dermatologijos laboratorija „Bioderma“ vadovaujasi požiūriu, kad odos priežiūros priemonės turi padėti atkurti natūralius biologinius procesus, šalindamos odos problemų kilmės priežastis bei simptomus. Priežiūros priemonės „Bioderma“ kuriamos tik iš grynų veikliųjų medžiagų, atliekančių svarbų vaidmenį odos veikloje.

### EKOLOGIŠKOSIOS MOKSLAS DERMATOLOGIJAI.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė – NEMOKAMAI!

## URIAGE

URIAGE, terminis vanduo, 50 ml 7<sup>99</sup> €

URIAGE, terminis vanduo, 150 ml 11<sup>59</sup> €

URIAGE, terminis vanduo, 300 ml 19<sup>99</sup> €

### KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Is Alpių gelmių trykstantis „Uriage“ terminis vanduo nuostabus dėl jame esančių mineralų ir mikroelementų, bakteriologiškai švarus ir izotoniškas – papurškus vandeniu, odos nereikia nusausinti. Drėkina, gaivina, padeda raminti odą ir saugoti nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio.

### DREGMĖS IR GAIVOS POJŪTIS!



-30%

## EUCERIN®

### KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Daugiau nei 100 metų patirties dermatologinės odos priežiūros mokslo srityje. Nuolat siekiame mokslinių proveržių ir kuriamo veiksmingus, gerai toleruojamus ir kliniškai patikrintus sprendimus. Odos priežiūra apima kur kas daugiau nei poveikį odai. Išsprendus odos problemas, tavo oda jaučiasi geriau, tu jautiesi geriau.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

## AIMX lakštinės veido kaukės

### KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Inovatyvi veido odos priežiūra. Kaukės gausiai prisotintos veiksmingų aktyviųjų medžiagų. Intensyviai drėkina, ramina, suteikia skaistumo ir gaivina tiek veido, tiek paakių odą. Toliaus sprendimas, norint greitos pagalos veido odai!

### „AIMX“ PADEDA PASIEKTI TIKSLĄ!

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



IKI -40%

## SVR

### KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Laboratoire SVR“ kosmetikos priemonės sukurtos jautrios, sudirgusios, įtopenčios dermatitą, aknę, psoriazė, keratozę linkusios veido ir kūno odos priežiūrai – inovatyvūs sprendimai su aukštos koncentracijos veikliosiomis medžiagomis.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



-25%

## FORCAPIL

### MAISTO PAPILDAI, KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Prancūzijos laboratorijoje sukurty „Forcapil“ plaukų priežiūros priemonių išskirtinumas – vitaminų, mineralų ir augalų ekstraktų mišinys, būtinas, kad jūsų plaukai būtų gražūs ir stiprūs.

„Forcapil“ siūlo visą produktų asortimentą – nuo maisto papildų iki kosmetikos plaukams. Tai leidžia sukurti visavertę plaukų priežiūros rutiną ir tikėtis puikių rezultatų.

### DVIGUBA JĖGA JŪSŲ PLAUKAMS!

### MAISTO PAPILDAI + KOSMETIKA

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

## PAVIRŠINĖMS ŽAIZDOMS IR ODOS DEZINFEKCIJAI PRIEŠ NECHIRURGINES PROCEDŪRAS

7<sup>49</sup> €

## DUOSEPTIC, 1 mg/20 mg/ml odos purškalkas (tirpalas), 50 ml

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veiksmingos medžiagos, stiprumas:** 1 ml „DuoSeptic“ odos purškalo (tirpalo) yra 1 mg oktenidino dihidrochlorido, 20 mg fenoksietanolio. **Terapinės indikacijos:** mažų paviršinių žaizdų antiseptinis gydymas ir odos dezinfekcija prieš nechirurgines procedūras; kartotinis trumpalaikis gleivinių ir greitimų audinių antiseptinis gydymas prieš diagnostines procedūras išangės ir lyties organų srityje, įskaitant makštį, moters išorinius lyties organus ir varpos galvutę, taip pat prieš šlapimo pūslės kateterizaciją; laikinas ribotas pagalbinių antiseptinis tarp pirštines mikozės (grybelinės infekcijos tarp rankų ar kojų pirštų) gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti ant odos. Ant gydymo srities užpurškite 1 kartą per dieną taip, kad jos visiškai sudrėktų. Kitu atveju galite užpurškiti ant tampono ir gydymą vietą patrinti (ne mažiau nei dviem „DuoSeptic“ supurkštams tamponais), kad visiškai sudrėktų. Tinkamiausias būdas – naudojant tamponus. Palaikyti, kol „DuoSeptic“ visiškai išdžiūvis, prieš spręsdami ar užklijuodami žaizdą. Naudojant grybelinės infekcijai gydyti – purškite į ryklę ir vakare. **Kontraindikacijos:** nenaudokite, jei padidėjęs jautrumas oktenidino dihidrochloridui, fenoksietanoliiui ar bet kuriai pagalbine medžiagai. „DuoSeptic“ neturėtų būti naudojamas plūvo ertmė (pvz., atliekant operaciją), šlapimo pūslę ar ausies membraną skalauti. **Specialūs įspėjimai:** nenurykite, ypač didelio kiekio, ir neieskite patekti į kraujotakos sistemą, pvz., dėl atsitiktinio įšvirkštimo. Naujagimiams, ypač neišnešiotiems, vartoti atsargiai, nes „DuoSeptic“ gali sukelti sunkių odos pažeidimų. Pašalinkite vaistinio preparato perteklių ir užtikrinkite, kad tirpalo neliktų ant odos ilgiau nei reikia. Venkite patekimo į akis; patekus – nedelsdami gerai praskalaukite vandeniu. Neieskite švirkštų į giliuosius raumenis. Naudokite tik išorškai. Po gilių žaizdų praplovimo švirkštų buvo pranešama apie nuolatinę edemą (patinimą), eritemą (paraudimą), audinių nekrozę; kai kuriems atvejais prireikė chirurginės intervencijos. **Reikiamos tekstų parengimo data** 2024-11-11.

## NUO VABZDŽIŲ

-15%



## MOUSTICARE

Apyrankė nuo uodų, erkių, mašalų, 1 vnt. 8<sup>95</sup> 7<sup>64</sup> €Purškalkas nuo uodų, erkių, mašalų, 50 ml 12<sup>79</sup> 10<sup>87</sup> €FAMILY purškalkas nuo uodų, erkių, mašalų, 125 ml 14<sup>95</sup> 12<sup>32</sup> €INFESTED purškalkas nuo uodų, erkių, mašalų, 75 ml 15<sup>95</sup> 13<sup>17</sup> €

Nugalėkite uodus ir erkes su „MoustiCare“ iš Prancūzijos! Tinka visai šeimai: vaikams, nešiojams moterims, suaugusiems. Efektyvus prieš įvairių rūšių mašalus: uodus, erkes, blusas, muses, Egipto, Azijos tigirnius ir paprastuosius uodus. Sudėtyje 100% augalinės veikliosios medžiagos. Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudojimą visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

„MOUSTICARE“ GALI PAKEISTI CHEMINIUS REPELENTUS!

-30%

3<sup>91</sup> €AMEDIPLUS, Lūpas apsaugantis balzamas su pantenoliu, 4,5 g  
MEDICINOS PRIEMONĖ

-20%



## AMEDIPLUS

tamprūs pleistrai, 7 x 2 cm, 10 vnt. 1<sup>65</sup> 1<sup>35</sup> €tamprūs pleistrai, 7 x 2 cm, 200 vnt. 20<sup>90</sup> 16<sup>00</sup> €tamprūs pleistrai, 7 x 3,8 cm, 200 vnt. 28<sup>90</sup> 22<sup>40</sup> €Pleistrai rinkinys Šeimai, 20 vnt. 4<sup>45</sup> 3<sup>56</sup> €

## MEDICINOS PRIEMONĖS

## INOVATYVŲ ODOS PROBLEMŲ SPRENDIMAI

-35%



## COMPEED®

„COMPEED®“ pieštukas nuo pūslių, 8 ml 12<sup>49</sup> 8<sup>12</sup> €

## KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Padaeda saugoti odą nuo trynimo ir išvengti pūslių susidarymo. Padeda sukurti apsauginį barjerą, apsauganti nuo trynimo, suteikia nematomą apsaugą, puikiai tinka avint atvirą alyvinę, paprastą naudoti. Įspėjimai: negalima naudoti ant jau susidariusių pūslių ar atvirų žaizdų, gleivinių.

„COMPEED®“ vidutinio dydžio pūslių pleistrai, 5 vnt. 10<sup>95</sup> 6<sup>86</sup> €„COMPEED®“ skirtingų dydžių pūslių pleistrai, 5 vnt. 10<sup>95</sup> 6<sup>86</sup> €„COMPEED®“ lūpų pūselinės pleistras, 15 vnt. 24<sup>75</sup> 14<sup>14</sup> €

## MEDICINOS PRIEMONĖS

**Pleistrai.** Hidrokolidinė technologija. Pleistras padeda greitai malšinti skausmą, kurį sukelia pūslelės, saugo nuo trinties ir ją mažina, skatina greitą žaizdų gijimą. Išsilaiko keletą dienų. Pleistru negalima dėti ant užkirstų žaizdų, naudoti pakartotinai ar karpyti.

**Nematomas lūpų pūselinės pleistras,** kurio nepertraukiama povelis trunka iki 12 val. Padeda saugoti nuo viruso plitimo, paslepia pūseles. Negalima naudoti vaikams, nešiojams ir žindantioms moterims.

„COMPEED“ GELBSTI DIENĄ.

-25%

7<sup>19</sup> €

## AMEDIPLUS, Pantenolio putos, 10%, 150 ml

## KOSMETIKOS PRIEMONĖ

-25%



## AMEDIPLUS

Pleistrai pūslėms, 2 x 6 cm, N5 4<sup>95</sup> 3<sup>74</sup> €Pleistrai pūslėms, 6,9 x 4,4 cm, N5 5<sup>75</sup> 3<sup>89</sup> €

## MEDICINOS PRIEMONĖS

-25%

12<sup>37</sup> €

## AMEDIPLUS pleistras nuo lūpų pūselinės, 15 vnt.

## MEDICINOS PRIEMONĖ





**VISAM SCHOLL ASORTIMENTUI**

**iki -50%**



**FEEL FOOT TASTIC**

**Scholl**

#### NUO GRYBELIO

**IKI -35%**





**MYCOSAN**

**MEDICINOS PRIEMONĖS**

„Mycosan“ skirtas nagų ir pėdų grybelinėms infekcijoms gydyti ir apsaugoti nuo jų. „Mycosan“ serumas gydo ir užkerta kelią rankų ir kojų nagų grybeliui. Serumas prisiskverbia į nagą ir pagerina jo struktūrą, todėl nagas atauga sveikas. Pažeistoje vietoje „Mycosan“ sukuria apsauginį barjerą ir infekcija nebegali plisti į kitus nagus. Labai svarbu gydymą pradėti vos pastebėjus pirmuosius ligos simptomus. Labai svarbu griežtai laikytis produkto naudojimo instrukcijos. „Mycosan“ pėdų gelis nuo grybelių skirtas „atleto pėdai“ gydyti. „Atleto pėda“ yra grybelių sukelta pėdos odos infekcija, kurią reikia gydyti, kad ji neišplistų. Gaivinamasis ir vandeniu nelaizdus pėdų purškiklis „Mycosan Protect“ 12 val. apgaubia pėdą apsaugine plovele, kuri saugo pėdas nuo gresmės susigrįti grybeline pėdų odos infekcija.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

#### ODOS PAŽEIDIMAMS GYDYTI

**-20%**



**BiSilvAloe spray**

„BiSilvAloe spray“, 50 ml **11<sup>29</sup> 9<sup>03</sup> €**

„BiSilvAloe spray“, 125 ml **16<sup>09</sup> 12<sup>87</sup> €**

**MEDICINOS PRIEMONĖ**

„BiSilvAloe spray“ – purškiamieji mineraliniai milteliai, kurių sudėtyje yra **2,5 % joninio sidabro ir alavijų**. Priemonė skirta žaizdoms, nubrozdinimams, nedidelėms nudegimams ir odos įopijimams gydyti. Reguliuoja žaizdos šlapinimą, sukuria švarią ir drėgną terpę, lengvinančią natūralų gijimo procesą, saugo žaizdą nuo išorinių bakterijų dauginimosi. **Vartojimo būdas:** prieš naudojimą žaizdas išvalykite fiziologiniu tirpalu. Talpyklę gerai supurkite trumpais laiko intervalais, lengvai paspausdami dozatorių ir nukreipdami purškiklį į pažeistą vietą.

**SKUBI PAGALBA PAŽEISTAI ODAI.**

#### NUO PLEISKANOJIMO

**5<sup>99</sup> €**



**PSILO-BALSAM 1 % gelis, 20 g**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Diphenhydramini Hydrochloridum. Vietinio poveikio vaistas nuo alergijos. **Indikacijos:** tai puiki priemonė, kai reikia slopinti odos niežėjimą ir malšinti skausną esant pirmo laipsnio nudegimams, vabzdžių įgėlimams, dilgėlei ar kitiems nedidelėms odos pažeidimams. **Vartojimas:** suaugusiems ir vyresniams kaip 12 m. vaikams tepti plonu sluoksniu pažeistas odos vietas ir švelniai įtrinti 3–6 kartus per parą. **Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai:** gėlio naudoti negalima, jeigu yra alergija difenhidraminui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Gėlio negalima tepti ant atvirų žaizdų ar gleivinių. Vengti patekimo į akis. Jei patepus gėlio eme peršalti odą arba atsirado bėrimas, gydymą reikia nutraukti. Pakuotės lapelio peržiūros data 2018-10-15. Reklamoms teksto parengimo data 2022-07-13. Z207\_SB\_Psilo-1\_V01\_L1

**5<sup>99</sup> €**



**KETOCONAZOL-RATIOPHARM**

KETOCONAZOL-RATIOPHARM, 60 ml **8<sup>99</sup> €**

KETOCONAZOL-RATIOPHARM, 120 ml **13<sup>99</sup> €**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Viename mililitre Šampūno yra 20 mg ketokonazolo.

**Terapinės indikacijos.** Galvos seborėjos ir pleiskanojimo (pityriasis capitis) gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** „Ketoconazol-ratiopharm“ šampūną ir paliekama jo poveikiui 3–5 min. prieš nuplaunant vandeniu. Gydymas. Galvos oda ir plaukai gydoma du kartus per savaitę. Gydymo kurso trukmė – 2–4 savaitės. Profilaktika. Norint išvengti simptomų pasikartojimo, plaukai ir galvos oda šio šampūno turi būti plaunami kartą per savaitę arba kas antrą savaitę. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Reikia saugotis, kad šampūno nepatektų į akis. Patekus į akis, jas reikia gerai praplauti vandeniu. Pleiskanojimas ir seborėjinis dermatitas dažnai būna susiję su plaukų slinkimu, tai, nors ir retai, tačiau taip pat pasitaiko vartojant Ketoconazol ratiopharm šampūną. Pacientams, ilgai vartojantiems vienoje odos vietoje vietiniam gydymui kortikosteroidus, rekomenduojama tokių gydymą palaengva per 2–3 savaites užbaigti, kad vartojant „Ketoconazol-ratiopharm“ šampūną būtų išvengta ligos pasikartojimo. Šio vaistinio preparato kvasprios medžiagos sudėtyje yra α-izometilnono, benzilo alkoholio, benzilbenzoato, benzilcinamato, d-trialio, citronelio, kumario, eugenolio, geraniolio, heksilcinamalo, izoeugenolio, linolio, kurie gali sukelti alerginių reakcijų. Kiekviename šio vaistinio preparato mililitre yra 100 mg natrio laurilsulfato, kuris gali sukelti vietinių odos reakcijų (geliančių ar sukeliančių deginimo pojūtį) arba sustiprinti odos reakcijas, kurios sukėlė ant tos pačios vietos pavartoti kiti preparatai. **Reikiamas medžiagos parengimo data:** 2024 m. kovas. OTC-LT-00073

## BURNOS HIGIENAI

-20%



## SUNSTAR GUM

## BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Jau daugiau kaip 80 metų „Sunstar“ yra viena burnos etmės higienos priemonių gamybos lyderių. GUM® sukūrė produktų liniją vaikams su saugiu fluorido kiekiu. Fluoridas padeda dantims greičiau įsisavinti mineralus ir saugo emalį nuo rūgščių poveikio. O sudėtyje esantis izomaltas padeda efektyviau įsisavinti fluoridą.

## SVEIKOS DANTENOS, SVEIKESNIS GYVENIMAS.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

IKI -25%



## TENA

## SAUSKELNĖS, ĮKLOTAI, PAKLOTAI IR KOSMETIKA.

Patikimos, odos sveikatą užtikrinančios TENA sauskelnės, įklotai ir paklotai greitai sugeria šlapimą, apsaugo nuo pratekėjimo ir nemalonaus kvapo. Papildomai naudojamos TENA odos priežiūros priemonės padeda pasirūpinti odos švara, higiena ir pragulų profilaktika.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

UŽ 1 CT

Perkant  
FITYDENT  
SENSITIVE kremą,  
tabletes  
- TIK UŽ 1 CT!



## FITYDENT

## BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Fittydent“ – stiprus, ilgai laikantis fiksuojamasis kremas, neleidžiantis protezams slįsti ir slankioti. Netirpus vandenyje ir atsparus rūgščiai, todėl nenuplaukiamas skysčių ar seilių. „Fittydent“ dantų protezų fiksuojamasis kremas garantuoja stiprų dantų protezų ir dantų sukibimą.

## NAUJAS PAKUOTĖS DIZAINAS.

-25%



## CURASEPT ADS

## BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Curasept ADS priemonių išskirtinumas – vienintelė pasauliye patentuota ADS sistema – formulė, kuri patikrins, kad Jūsų natūralių dantų spalva ir burnos receptorių veikla chlorheksidino preparato naudojimo metu nepakistų.

Curasept ADS chlorheksidinas pasižymi itin stipriomis antibakterinėmis savybėmis, efektyviai naikina pavojingas bakterijas, taip užkirsdamas kelią ir apnašų dėjimuisi. Curasept ADS produkcijos sudėtyje nėra alkoholio, SLS, tad išvengsite burnos etmės sausėjimo, skilinėjimo bei dirglumo pojūčių. Curasept ADS sukurta ir subalansuota gingivitui, periodontitui malšinti, kraujuijančioms dantenoms gydyti. Taip pat skatina burnos audinių gijimą prieš ir po intensyvių burnos higienos ar kitų sudėtingų stomatologinių intervencijų. Tikime, kad sveikas kūnas bei turiningas gyvenimas, pirmiausia prasideda nuo sveikos burnos bei spindinčios šypsenos. Mes ne tik kalbame apie unikumą, mes jį jau sukūrėme. Tu to dar nežinai, bet tai geriausia, kas galėjo nutikti tavo dantims...

## PIRMI, NES MUMS RŪPI.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-20%



## OPALESCE COOL MINT

OPALESCE COOL MINT, balinamoji dantų pasta su fluoru, „Cool Mint“ skonio, 28 g **5<sup>28</sup> 4<sup>23</sup> €**

OPALESCE COOL MINT, balinamoji dantų pasta su fluoru, „Cool Mint“ skonio, 133 g **14<sup>99</sup> 11<sup>99</sup> €**

OPALESCE COOL MINT SENSITIVITY RELIEF, balinamoji nujautrinanti dantų pasta su fluoru ir kalio nitratu, šaltmečių skonio, 133 g **14<sup>25</sup> 11<sup>43</sup> €**

## BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Saugiai balina dantis iki 2 tonų vos per 30 dienų. Efektyvus, greitas ir 4,8 karto didesnis fluoro prisotinimas į dantų emalį nei kitų panašių dantų pastų\*. Žemas abrazyvumo indeksas – RDA 78, todėl nepažeidžiamas dantų emalis. Originalus skonis, išskiriantis šią dantų pastą iš kitų.

\*Schemehorn, BR, Enamel Fluoride Uptake 09-107. Data on file.

1+1

Perkant vieną  
pakuotę, antra  
tokia pati arba  
pigesnė –  
NĖMOKAMA!!



## ELMEX

## BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Elmex“ burnos higienos priemonės sukurios siekiant užtikrinti visapusišką burnos etmės apsaugą – nuo kasdienės priežiūros iki specializuotų sprendimų jautriems dantims ir skirtingoms amžiaus grupėms. **AMINO FLUORIDAS**, esantis daugelyje „Elmex“ dantų pastų, padeda formuoti apsauginį sluoksnį, kuris stiprina dantų emalį ir remineralizuoja pažeistas vietas. Sveiklos valomosios dalelės yra pritaikytos net jautriems dantims, todėl priemonės tinka kasdieninei, sveikatai, bet veiksmingai priežiūrai. **PRO-ARGIN** technologija gali padėti greitai ir veiksmingai mažinti dantų jautrumą – ji padeda sandarinti smulkius kanaliukus, vedančius į danties nervą, ir formuoja kalcio papildytą apsauginį sluoksnį, kuris veikia kaip ilgalaikis barjeras nuo dirgiklių. **NEO-AMINEX** technologija gali užtikrinti dar stipresnį emalio apsaugą nuo rūgštinio atakų – padeda ilgai išlaikyti emalio praradimą ir išsaugoti natūralių dantų atspalvą. Reguliariai naudojant „Elmex“ priemonės padeda palaikyti stiprius dantis ir bendrą burnos etmės pusiausvyrą.

## PASIRINKITE PATIKIMUMĄ, PASIRINKITE MOKSLU PAGRISTĄ VEIKSMINGUMĄ, PASIRINKITE „ELMEX“.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

Pasiūlymai galioja **2025 05 01 – 2025 05 31**.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Nuolaidos taikomos prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą. Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį/informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepažįsta ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [NepageidaujamaR@vvktu.lt](mailto:NepageidaujamaR@vvktu.lt) arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje [www.vvkt.lt](http://www.vvkt.lt).

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Daugiau informacijos NORFOS vaistinėje, tel. +370 800 10008, [www.nvaistine.lt](http://www.nvaistine.lt). MAŽYLIUI IR MAMAI skirtas prekes ypatingomis kainomis greičiau ir patogiau užsisakykite internetinėje vaistinėje [www.nvaistine.lt](http://www.nvaistine.lt). Užsisakius prekių (išskyrus vaistinius preparatus) už 29 € ir daugiau – pristatymas NEMOKAMAS! Reklaminių tekstų parengimo data – 2025 04 14.





# „TENA Discreet“ – apsauga, kokios reikia

Menstruacijų paketai, žinoma, yra reikalinga priemonė – menstruacijoms. Tačiau šlapimui sugerti jie nėra tinkami. Tad kodėl, užuot bandžius gaminius, kurie nežinia kiek padės, nepasirinkus gaminio, kuris tam ir sukurtas? Juk nenaudotumėte plaukų balzamo veido odai drėkinti, tiesa?

Šlapimo nelaikymo paketai specialiai sukurti šlapimui sugerti, o menstruacijų paketai – ne. Be abejo, gali atrodyti, kad menstruacijų paketai tinka ir šlapimui sugerti, tačiau šlapimo pūslės silpnumas ir menstruacijos – du visiškai skirtingi dalykai. Šlapimo ir kraujo sudėtys labai skiriasi: šlapimas yra lengvesnis, stipresnio kvapo ir teka greičiau, o kraujas – daug tirštesnis ir atpalaiduojamas apie 10–20 kartų lėčiau. Pavyzdžiui, per 1 sekundę gali nevaldomai išbėgti iki 50 ml šlapimo, tiek pat kraujo moteris netenka per visą menstruacijų ciklą (4–5 dienas)! Menstruacijų paketai, kai naudojami šlapimui sugerti, greitai sušampa, praranda formą, todėl mažėja jų veiksmingumas – ne visada apsaugo nuo pratekėjimo ir dėmių ant drabužių. Be to, menstruacijų paketai nepašalina šlapimo kvapo, juos tenka dažniau keisti.

## Specialiai sukurti savo funkcijai

„TENA Discreet“ šlapimo nelaikymo paketai veiksmingi dėl keturių savybių, kurios gerokai palengvina gyvenimą esant silpnai šlapimo pūslei.

**Kvapo neutralizavimo sistema „Fresh Odour Control“** su aktyviomis mikrogranulėmis, saugančiomis nuo amoniako išsiskyrimo, slopina nepageidaujamo šlapimo kvapo atsiradimą. Taigi jūs jaučiatės gaiviai ir užtikrintai.

**Ypatingą sausumą** užtikrina „TENA“ paketuose esantys ypač gerai skysčius sugeriantys polimerai. Jie sugeria ir užblokuoja šlapimą, kad jis neprasiskverbtų iš vidaus į paketo paviršių, taip užtikrindami apsaugą nuo pratekėjimo ir iki 12 valandų išliekanti sausumo jausmą.

„TENA Discreet“ paketai šlapimą **sugeria itin greitai**, todėl jausitės švari ir gaivi. Viršutinis ir sugeriamieji sluoksniai specialiai pritaikyti greitai ištekantiui šlapimui, skirtingai nuo menstruacijų paketų, skirtų tirštesniam kraujui.


**Diskretiški ir nepastebimi.** „TENA Discreet“ plonesni, nei galite tikėtis, žinant, kiek daug skysčio jie sugeria. Ar vis dar manote, kad daug sugeriantys gaminiai turi būti dideli, itin stori ir nepatogūs naudoti? Tai jau ne! „TENA“ paketai sukurti atsižvelgiant į moters kūną, kad saugiai ir patogiai priglustų ir liktų nepastebimi po drabužiais. Išbandykite ir įsitikinkite.

**Pasirūpinkite reikiama apsauga ir išlikite savimi!**

APSAUGA,  
KOKIOS REIKIA  
IR DIENĄ,  
IR NAKTĮ




www.tena.lt





# MAŽYLIUI IR MAMAI



**-50%**

## AMBIO KIDS

GELEŽIS, geriamieji lašai, 30 ml **15<sup>98</sup> 7<sup>99</sup> €**  
MAISTO PAPILDAS



**-40%**

## AMBIO KIDS

ŽUVŲ TAUKAI, 60 kramtomųjų kapsulių **17<sup>98</sup> 10<sup>79</sup> €**  
MAISTO PAPILDAS



**1+1**

Dvi tokios pačios  
pakuotės už  
VIENOS KAINĄ!

## AMBIO KIDS

LAKTO-BIFIDOBAKTERIJOS, milteliai, 10 paketėlių **9<sup>48</sup> €**  
MAISTO PAPILDAS



IKI **-40%**

## PREGNACARE

### MAISTO PAPILDAI

„Pregncare“ – maisto papildų linija, sukurta mitybai papildyti planuojant nėštumą, nėštumo bei žindymo laikotarpiams. „Pregncare Conception“ sukurta planuojančioms nėštumą, „Pregncare“ – vitaminų ir mineralų kompleksas, rekomenduojamas nuo pirmojo nėštumo mėnesio. „Pregncare Plus“ papildyta omega-3 riebalų rūgštimis (DHR ir EPR). „Pregncare Breast Feeding“ pritaikyta žindymo laikotarpiui, sudėtis papildyta kalciumu ir omega-3. „Pregncare New Mum“ sukurta mamų grožiui ir energijai palaikyti.

**TVIRTAI KŪDIOKI IR MAMYTĖS DRAUGYSTEI!**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



**-20%**

## INFACOL,

geriamoji suspensija, 50 ml **7<sup>97</sup> 6<sup>38</sup> €**  
Simetikonas 40 mg/ml

### MEDICINOS PREKĖ

**Terapinės indikacijos:** „Infacol“ geriamoji suspensija skirta sumažinti kūdikių pilvuko diegliams ir vidurių skausmams. Skausmo ir dieglių priežastis – kūdikio žarnyne susikaupę maži dujų burbuliukai. „Infacol“ padeda pašalinti susikaupusius dujos. Suspensiją galima skirti naujagimiams ir vyresniems vaikams. Esant pilvuko pūtimui, suspensiją galima vartoti ilgai – tiek, kiek reikia. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** prieš vartojimą gerai suplakite buteliuko turinį. Pilnai pripildykite vieną lašintuvą, paspausdami du kartus gumini balionėli. Suspensijos perteklių nubraukite atgal į buteliuką. Norėdami sugirdyti suspensiją, paspauskite lašintuvo balionėlį ir sulauškite „Infacol“ suspensiją kūdikiui ant liežuviu. Buteliuke yra iki 100 suspensijos dozių. Vieną pilną lašintuvą (0,5 ml) suspensijos sugirdykite kūdikiui prieš kiekvieną maitinimą. Jei būtina, dozę laikinai galima padidinti iki dviejų pilnų lašintuvų (1 ml). Norint pasiekti geresnių rezultatų, „Infacol“ reikėtų vartoti keletą dienų. **Išėjimas:** simetikonas yra inertiška medžiaga, kurios kūdikio organizmas neabsorbuoja. Ji išsiskiria iš organizmo nepakitusi. „Infacol“ šalutinio poveikio reiškiniai iki šiol nėra žinomi. Metilo ir propilo hidroksibenzoatų gali sukelti alerginę reakciją (galbūt pavelduotą). Jei manote, kad Jūsų kūdikis galėtų būti alergiškas kuriai nors iš sudedamųjų dalių, prieš duodami kūdikiui „Infacol“, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.

**MAŽŲ PILVELIŲ DRAUGAIS!**



**-15%**

## CO-LACTASE®, laktazės fermento lašai, 10 ml **19<sup>98</sup> 16<sup>99</sup> €**

### SPECIALIOS MEDICININĖS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAS

„Co-Lactase“ – skirtas pilvo diegliams, atsiradusiems dėl nebrandžios kūdikio žarnos mikrobiotikos ar laktazės netoleravimo, slopinti. „Co-Lactase“ lašai padeda skaidyti laktazę (pieno cukrų) į lengviau virškinamas dalis: gliukozę ir galaktozę. „Co-Lactase“ padeda suskaidyti laktazę prieš jai patenkant į žarnyną, todėl padeda išvengti nemalonių simptomų, tokių kaip pilvo pūtimas, viduriavimas ar spazmai. Įlašinti 2–4 „Co-Lactase“ fermento lašus į motinos pieną ar pieno mišinį kiekvieną kartą maitinant. „Co-Lactase“ rekomenduojama vartoti tol, kol kūdikio žarnynas pats pradės gaminti pakankamai laktazės (maždaug iki 3–4 mėnesių amžiaus).



**-30%**

**PHILIPS  
AVENT**

[www.philips.lt/avent](http://www.philips.lt/avent)



# GAMINAME VAISTUS PAGAL INDIVIDUALIUS RECEPTUS

- Atneškite gydytojo receptą iki 13 val.
- Atsiimkite pagamintą vaistą kitą darbo dieną.



VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS



# LAIMĖS VALANDOS

Darbo dienomis ir šeštadieniais  
**8-9 val. ir 14-15 val.\***

Sekmadieniais  
**14-15 val.\***



**-30%**

Perkant 3\*\*  
ir daugiau  
prekių

**-25%**

Perkant  
2\* prekes

**-20%**

Perkant  
1 prekę

\*\*nereceptiniams vaistams -25%  
receptiniams vaistams -20%

\* vaistams -20%

Nuo 2023 m. spalio 23 d. NORFOS vaistinėje akcijos LAIMĖS VALANDOS metu perkant 1 prekę taikoma 20 % nuolaida, perkant 2 prekes – 25 % nuolaida, vaistams – 20 % nuolaida, o įsigyjant 3 ir daugiau prekių – 30 % nuolaida, nereceptiniams vaistams – 25 %, receptiniams – 20 % nuolaida.

Taikomos momentinės 20 % dydžio nuolaidos receptiniams vaistams, 20 ar 25 % nuolaidos nereceptiniams vaistams ir vaistiniams preparatams, o kitoms prekėms – 20, 25 arba 30 % nuolaidos, atsižvelgiant į atitinkamo pirkimo metu įsigyjamų prekių bendrą kiekį. Nuolaida taikoma perkant pilnas prekių pakuotes, kurių kiekvienos vertė arba priemoka ne mažesnė nei 1,50 euro. Prekės, perkamos su kompensuojamuoju receptu, įskaičiuojamos į įsigyjamų (perkamų) prekių krepšelį (kiekį), tačiau joms nuolaida netaikoma.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaidos netaikomos perkant su kompensuojamuoju receptu, mokant už skiepus, taip pat pradinio maitinimo pieno mišiniams, kartiniams (gaminamiems vaistinėje) ir vardiniam vaistams, įsigyjant dovanų kuponus, pakavimo maišelius. Nuolaidos netaikomos perkant [www.gintarine.lt](http://www.gintarine.lt), net jei už prekes atsiskaitoma jais atsiimant vaistinėse. Nuolaidos netaikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Visos nuolaidos galioja tik su PC NORFA lojalumo kortele.

Informaciją apie kitu nei nurodyta laiku vykstančias LAIMĖS VALANDAS rasite [www.nvaistine.lt](http://www.nvaistine.lt). Informacija apie kitas akcijas ir prekes, kurioms netaikomos akcijos LAIMĖS VALANDOS nuolaidos, suteikiama kiekvienoje vaistinėje, el. paštu [info@nvaistine.lt](mailto:info@nvaistine.lt) arba nemokamu tel. 8 800 10008.

**NVAISTINĖ**  
VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS