

TOP LIEPOS PASIŪLYMAI



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!



AMBIO
OMEGA 3-6-9, 60 kapsulių **15⁹⁸ €**
MAISTO PAPILDAS

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!



VITADAY
VITAMINAS C 200 mg, 50 tablečių **4⁴⁹ €**
GINTARO RŪGŠTIS, 10 tablečių **1⁵⁵ €**
MAISTO PAPILDAS

-50%



VERSAN
SHOTS, 20 geriamųjų dozių po 10 ml **32⁸⁹ 16⁴⁵ €**
MAISTO PAPILDAS
„Versan Shots“ – geriamos skystos dienos dozės sąnariams, sklandžiam jų darbui. Vienas buteliukas per dieną aprūpina sąnarius reikalingomis medžiagomis: kolagenu, hialurono rūgštimi, gliukozaminu, chondroitinu, vitaminais C ir D3.
„VERSAN“ – PROFESIONALI PAGALBA JŪSŲ SĄNARIAMS!

Magnio šaltinis



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

SUPMAGNIT
30 pailginto atpalaidavimo trijų sluoksnių tablečių **10⁹⁹ €**
MAISTO PAPILDAS

„Supmagnit“ – tai inovatyvios technologijos TRIJŲ SLUOKSNIŲ MAGNIO TABLETĖ, nulemianti geresnį magnio pasisavinimą. Trifazis magnio atsipalaidavimas: skirtingu laiku, skirtingose virškinimo trakto vietose. 1 tablete yra 364 mg elementinio magnio. Patogu vartoti – tik 1 tabletė per parą. Magnis yra gyvybiškai svarbus žmogaus organizmui. Jis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir normalią raumenų funkciją bei energijos apykaitą.

NUO 6⁹⁹ €



HESIO
500 mg, 30 plėvele dengtų tablečių **6⁹⁹ €**
500 mg, 60 plėvele dengtų tablečių **12⁹⁹ €**
500 mg, 120 plėvele dengtų tablečių **24⁹⁹ €**
1000 mg, 30 plėvele dengtų tablečių **12⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Kiekvienoje „Hesio“ 500 mg tablete yra 500 mg mikronizuotų flavonoidų (atitinka 450 mg diosminio ir 50 mg kitų flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną). Kiekvienoje „Hesio“ 1000 mg tablete yra 1000 mg mikronizuotų flavonoidų (atitinka 900 mg diosminio ir 100 mg kitų flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną). **Terapinės indikacijos.** „Hesio“ skirtas suaugusiųjų: lėtinio kojų venų nepakankamumo simptomams (kojų sunkumui, kojų patinimui, skausmui, naktiniam kojų mėšlungiui) lengvinti; paūmėjusio hemorojus simptomams (skausmui, kraujavimui ir patinimui išangės srityje) lengvinti. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** „Hesio“ 500 mg tabletes: lėtinis venų nepakankamumas: rekomenduojama dozė suaugusiems yra 2 tabletės per parą 2 mėnesius; 1 tabletė vidurdienį ir 1 tabletė vakare valgio metu. Jei simptomai išlieka, gydymas gali būti tęsiamas dar 2 mėnesius; hemorojus: paūmėjimas: pirmas 4 gydymo dienas rekomenduojama dozė suaugusiems yra 3 tabletės 2 kartus per parą (6 tabletės per parą). Kitas 3 dienas – 2 tabletės 2 kartus per parą (4 tabletės). Tabletes vartokite valgio metu. „Hesio“ 1000 mg tabletes: lėtinis venų nepakankamumas: rekomenduojama dozė suaugusiems yra 1 tabletė per parą 2 mėnesius valgio metu. Jei simptomai išlieka, gydymas gali būti tęsiamas dar 2 mėnesius; hemorojus: paūmėjimas: pirmas 4 gydymo dienas rekomenduojama dozė suaugusiems yra 3 tabletės per parą (1 tabletė 3 kartus per parą arba 1 tabletė pirmą kartą ir 2 tabletės antrą kartą per parą). Kitas 3 dienas – 1 tabletė 2 kartus per parą (2 tabletės). Tabletes vartokite valgio metu. **Kontraindikacijos.** „Hesio“ vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vaikams ir pagylimams „Hesio“ vartoti nerekomenduojama. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025 m. gegužės mėn. 10.000746631

2⁹⁹ €



ZYRTEC
1 mg/ml, geriamasis tirpalas, 75 ml
10 mg, 10 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veiklioji medžiaga ir stiprumas. Cetirizino dihidrochloridas. 10 ml yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. Vienoje plėvele dengtoje tablete yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos.** „Zyrtec“ 1 mg/ml geriamasis tirpalas skirtas suaugusiems ir 2 metų bei vyresniems vaikams. „Zyrtec“ 10 mg plėvele dengtos tabletės skirtos suaugusiems ir 6 metų bei vyresniems vaikams: sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito simptomams (nosies ir akių) palengvinti; dilgelinei palengvinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: rekomenduojama dozė yra 10 ml geriamojo tirpalo 1 kartą per parą. Vaikams nuo 6 iki 12 m.: 5 ml 2 kartus per parą, vaikams nuo 2 iki 6 m.: 2,5 ml 2 kartus per parą. Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: rekomenduojama dozė yra 10 mg, t. y. 1 tabletė 1 kartą per parą, vaikams nuo 6 iki 12 m.: 5 mg 2 kartus per parą. Pacientai, kurių inkstų funkcija sutrikusi: rekomenduojama vartoti 5 mg 1 kartą per parą. Jeigu sergate ar jūs jau sergate inkstų liga, kreipkitės į gydytoją, kuris gali dozė atitinkamai pakoreguoti. **Kontraindikacijos.** „Zyrtec“ vartoti draudžiama, jeigu sergate sunkia inkstų liga, kai reikalingos dializės; jeigu yra alergija cetirizino dihidrochloridui, bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, hidroksiziniui arba bet kuriam piperazino darinui (glaudžiai susijusiai kitų vaistų aktyviai medžiagai). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pastarite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Zyrtec“. **Detali informacija** – preparato vaistinių charakteristikų santraukoje, VVKT prie LR SAM tinklalapyje www.vvk.lt. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-06.



-50 % PIGIAU

IKI **-65%**

MAGNIS + B₆

COMPLEX, 30 kapsulių

SUPERIOR, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAI

„Magnis + B₆ complex“ sudėtyje magnis yra magnio oksido pavidalu. O „Magnis + B₆ superior“ naudojami ypatinga magnio forma – dvi magnio druskos (magnio oksidas ir magnio citratas), kurios organizme išlieka ilgiau, nes suvra skirtingu metu. Abiejų preparatų sudėtis papildyta ir vitaminu B₆. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų ir nervų sistemos veiklą. Magnis ir vitaminas B₆ padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją bei mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

RAMI ŠIRDIS

MAISTO PAPILDAI

„Rami širdis“ – gausios sudėties, dvejopo poveikio maisto papildai, pripažinti Lietuvos vartotojų. Šios linijos preparatai būdinga puikiai suderinta sudėtis, kurioje, be vitaminų ir mineralų, yra natūralių augalinių ekstraktų, šimtmečius naudojamų medicinoje. Maisto papildai „Rami širdis“ padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir psichologinę funkciją, taip pat padeda mažinti nuovargį.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



GASTROVAL

15 kapsulių **4⁹⁵ 2⁴³ €**

FLUXUS, 15 kapsulių **5⁹⁵ 3⁰⁰ €**

FORTE, 12 kapsulių **5⁹⁵ 3⁰⁰ €**

HEPAR FORMULA, 30 kapsulių **9⁹⁵ 4⁹⁵ €**

MAISTO PAPILDAI

„Gastroval“ – net 7 augalinių fermentų ir ekstraktų derinys sklandžiam virškinimui. „Gastroval Forte“ – stipresnis augalinių fermentų ir įvairių augalinių ekstraktų mišinys lengvam virškinimui. „Gastroval Hepar Formula“ – sklandžiai kepenų veiklai. Kepenų apsaugai nuo oksidacinės pažeidimo. Kepenų ląstelių regeneracijai. „Gastroval Fluxus“ – skrandžio rūgštigumo pusiausvyrai. Virškinimui lengvinti. Geltonieji gencijonai tradiciškai vartojami virškinimui palengvinti. Dažinės ožeržolės padeda apsaugoti kepenis nuo oksidacinės pažeidimo, palaikyti normalią cholesterolio lygį kraujyje. Tikrieji margainiai padeda palaikyti normalią ląstelių regeneraciją. Ožragių sėklų ekstraktas padeda palaikyti normalią skrandžio rūgštinę terpę.

„GASTROVAL“ SUPRANTA, KO REIKIA VIRŠKINIMUI, SKRANDŽIO RŪGŠTINGUMUI, KEPENŲ VEIKLAI.



-50%

ZAN™ – maisto papildų linija atminčiai, protinei veiklai, nervų sistemai, psichinei sveikatai bei miegui.

BRAINOZAN SHOTS, 14 buteliukų po 25 ml **32⁹⁵ 16⁵⁰ €**

HARMONIZAN SHOTS, 14 buteliukų po 25 ml **28⁹⁵ 14⁵⁰ €**

HYPNOZAN, 20 kapsulių **9⁹⁵ 4⁹⁰ €**

HYPNOZAN EXPRESS, 30 čiupliamų tablečių N30 **6⁹⁵ 3²⁵ €**

VALEROZAN DROPS, lašai, 50 ml **3⁹⁵ 1⁹⁹ €**

VALEROZAN, 60 tablečių **7⁹⁵ 4⁰⁰ €**

MAISTO PAPILDAI

BrainoZAN™ SHOTS universalus nootropikas atminčiai ir protinei veiklai. Rausvosios radiolės padeda palaikyti normalią protinę veiklą. Mėlynziedės taškuonės padeda palaikyti normalią atmintį, pažinimo funkciją ir yra tonikas smegenims. **HarmoniZAN™ SHOTS** neuroprotektoriaus emocinės sveikatos balansui. Mėlynziedės taškuonės padeda palaikyti normalią psichinę sveikatą, nervų sistemos veiklą. **HypnoZAN Express** čiupliamos tabletės su melatoninu ir fitoterapinių medžiagų deriniu leidžia dar greičiau užmigti, o čiupliamo preparato forma užtikrina greitesnių veiklių medžiagų įsisavinimą. **ValeroZAN Drops** geriama s tirpalas, augalinių ekstraktų derinys su valerijonais tinkamas nervų sistemos veiklai, psichinei sveikatai ir atsipalaidavimui, skysta preparato forma užtikrina greitesnių veiklių įsisavinimą.

„ZAN™“ – ĮKVĖPK... ĮKVĖPK.



-50%

Moterų intymiai higienai

-50%

MULTI-GYN

KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS

Mūsų produktai suteikia tinkamą intymią higieną ir padeda sumažinti nemalonius pojūčius toje srityje: nepageidaujama kvapas, niežulys ar deginimo pojūtis. „Multi-Gyn“ puikiai supranta moterų poreikius, kai atsiranda nepatogumų intymioje zonoje ir kaip tai paveikia jūsų gyvenimą. Todėl mes siūlome produktus, kurie gydo šiuos negalavimus natūraliu būdu, be žinomo šalutinio poveikio („Actigel 2 in 1“, „Liquigel“, „Flora Plus“). Visų produktų sudėtyje esantis unikalus ZOR® kompleksas atkuria ir normalizuoja natūralią makšties mikroflorą.

* ZOR kompleksas – patentuoti biologiškaai aktyvūs polisacharidai, gaunami iš sudedamųjų alavijų (Barbadosis Miller) medžiagų. www.ZOR.com

JEI NORI BŪTI TIKRA DĖL SAVO SVEIKOS MAKŠTIES!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



IKI 5 EURŲ

5€

2⁹⁹ €



PARACETAMOLIS SANITAS 500 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletyje yra 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikis karščiavimo mažinimas, silpno ir vidutinio stiprumo skausmo malšinimas (pvz.: galvos, dantų, gerklės, raumenų, mėnesinių). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** įprastinė rekomenduojama vienkartinė dozė suaugusiems yra 1 tabletė kas 4 val., sunkiais atvejais – 2 tabletės kas 6 val., bet ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. Vartoti per burną. Vaistą vartojant valgio metu, mažiau dirginamas virškinimo traktas. Tablete reikia užgerti ne mažiau kaip 250 ml sulčių, pieno ar vandens, jos kramtyti negalima. **Kontraindikacijos:** alergija paracetamolii arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, pacientas jaunesnis negu 6 m., sunkūs kepenų ar inkstų nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu esate alergiškas acetilsalicilo rūgščiai, persirgote arba dabar sergate sunkia kepenų liga ar viruso sukeltu ūminiu kepenų uždegimu, sutrikusi inkstų funkcija, turite įgimtą bilirubinemiją, jums yra kairių fermentų, skaidančių gliukozę, trūkumas, esate senyvas, sergate sunkia liga arba jeigu sirđies ir kraujagyslių sistemos veikia susilpnėjusi, sergate alkoholiizmu. **Reklamos teksto parengimo data** 2024-11-14.

2⁹⁹ €



OMEP UNO 20 mg, 14 skrandyje netirių kietųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje yra 20 mg omeprazolo. **Terapinės indikacijos:** vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiams refluksinio simptominio gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti po 1 kapsulę per parą, ryte. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas omeprazoliui (taip pat pantoprazoliui, lansoprazoliui, rabeprazoliui, ezomeprazoliui) ar pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** sudėtyje yra sacharozės. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. B52403136087. Teksto patvirtinimo data 2024-05-15.

4⁹⁹ €



ACETERIN EXPRESS 10 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: vienoje tabletyje yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės simptomams palengvinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vyresniems kaip 12 metų – po 1 tabletę per dieną, 6-12 metų vaikams – po pusę tabletės 2 k/d. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pagalbinei medžiagai, hidroksizinui arba bet kuriam pirazolino dariniui. Pacientai, kuriems smarkiai sutrikusi inkstų funkcija. **Specialūs įspėjimai:** atsargiai vartoti sergantiems epilepsija ir pacientams, kuriems yra traukulių pavojus. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas: info.lithuania@sandoz.com. B52403136092. Teksto patvirtinimo data: 2024 03 13.

Esant viduriavimui

3⁹⁹ €



LOPERAMIDUM WZF POLFA

2 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga: loperamido hidrochloridas. **Indikacijos:** simptominis suaugusių ir vyresnių negu 12 metų paauglių ūminio viduriavimo gydymas tokiu atveju, jei negalima pašalinti viduriavimo sukėlusios priežasties. **Dozavimas:** pradžioje geriama 2 tabletės (4 mg), vėliau – po 1 tabletę (2 mg) po kiekvieno išsistūsinimo nesuformuotomis išmatomis. Draudžiama per parą gerti daugiau kaip 6 tabletes (12 mg). **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas loperamido hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jaunesni negu 12 metų pacientai; paralyžinis žarnų nepažeidimas; vidurių užkietėjimas; pilvo pūtimas; organizme per mažai skysčių; pseudomembraninis kolitas, kurį dažniausiai sukelia plataus poveikio antibiotikai; ūminė bakterinė disenterija, bei kitos bakterinės viduriavimas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** loperamido hidrochloridu gydomas pacientas turi vartoti pakankamai vandens bei mineralinių medžiagų. Šio vaistinio preparato reikia atsargiai vartoti ligoniams, kuriems yra kepenų nepakankamumas. Sergant Krono liga, loperamido hidrochloridu reikia vartoti atsargiai. Jeigu pasireiškia vidurių užkietėjimas, pilvo pūtimas ar atsiranda pirmųjų žarnyno obstrukcijos simptomų, šio vaistinio preparato vartojimą būtina nutraukti. Jeigu ligonis karščiuoja bei jo išmatose yra kraujo, prieš pradėdami vartoti loperamido hidrochlorido, būtina išsiaiškinti tokio viduriavimo priežastį. Vartojant loperamido hidrochlorido, gali pasunkėti šlapinimasis. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Reklamos teksto parengimo data** 2017-01.

GREITAI SUSTABDYS VIDURIAVIMĄ.

Skausmui malšinti

3⁹⁹ €



DICUNO 25 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletyje yra 25 mg diklofenako kalio druskos. **Indikacijos:** „Dicuno“ vartojamas ūminio lėgimo ir vidutinio stiprumo skausmo, įskaitant ūminius migreninius galvos skausmus, simptomams gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 18 metų asmenims reikia gerti po 1-2 tabletes kas 4-6 valandas. Vartoti ne daugiau kaip 6 tabletes (150 mg) per parą. Tablete reikia nuryti užgeriant stikline vandens. **Kontraindikacijos:** „Dicuno, 25 mg“ nevartoti, jeigu yra alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu jums kada nors buvo ar yra skrandžio arba žarnyno opa; jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto arba jo praktikuojamas dėl skausmą mažinančių vaistų vartojimo (NVNU); jeigu yra labai sutrikusi kepenų funkcija; jeigu sergate porfirija (medžiagų apykaitos liga); jeigu sergate sunkia inkstų liga; jeigu jums nustatyta širdies liga ir (arba) galvos smegenų kraujagyslių liga, pavyzdžiui, jeigu Jūs patyrėte širdies smūgį, insultą, „mikroinsultą“ (praeinantį smegenų išemijos priepuolį) arba Jums buvo užsikimšusios širdies ar galvos smegenų kraujagyslės, arba Jums buvo atlikta operacija siekiant išvalyti arba šuntuoti užsikimšusias kraujagysles; jeigu Jums yra arba anksčiau buvo sutrikusi kraujotaka (periferinių arterijų liga); jeigu pacientas yra jaunesnis kaip 18 metų vaikas ar paauglys; per paskutinius tris mėnesius; jeigu vaistai nuo skausmo, kurių sudėtyje yra acetilsalicilo rūgšties, arba kiti NVNU grupės (nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo) vaistai nuo skausmo / uždegimo anksčiau buvo sukėlę alerginę reakciją, tokia kaip astmos priepuolis, čiaudulys ar berimas. Nežinosioms draudžiama vartoti „Dicuno“ per paskutinius tris mėnesius. Kita nežinoma laikotarpį „Dicuno“ galima vartoti tik tuo atveju, jei paskyrė gydytojas. **Įspėjimai ir atsargumo priemonės:** prieš pradėdami gydymą pasitarkite su gydytoju, jei sergate ar sirgote bet kuria iš toliau išvardintų ligų: uždegiminė žarnų liga (opinis kolitas, Krono (Crohn) liga); astma, širdies liga, kepenų ar inkstų liga; lėtinė obstrukcinė plaučių liga arba lėtinis kvėpavimo takų uždegimas; nosies gleivinės uždegimas; sisteminė raudonoji vilkligė; dilgėlinė arba angioneurozinė edema; ligos, sukeliančios padidėjusį polinkį kraujoti; kepenų porfirija. Teksto parengimo data: 2023-05-11. Atidžiai perskaitykite informaciją lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama jums svarbi informacija.

Nuo alergijos

4⁹⁹ €



LORATADINE ACTAVIS 10 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: Kiekvienoje tabletyje yra 10 mg loratadino. **Terapinės indikacijos:** Simptominis alerginio rinito ir lėtinės idiopatinės dilgėlinės gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. vaikai: 10 mg 1 kartą per parą; 2-12 m. vaikai: sveriantiems daugiau kaip 30 kg – 10 mg 1 kartą per parą. Tabletes galima vartoti neperklausmai nuo valgyimo laiko. Pacientams, sergantiems sunkiu kepenų funkcijos nepakankamumu, skiriama pradinė 10 mg dozė kas antrą dieną. **Kontraindikacijos.** Loratadino tablečių vartoti negalima, jeigu padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Loratadine Actavis“, jeigu yra sunkūs kepenų funkcijos nepakankamumas (tokiems pacientams gydymojo gali skirti vartoti šio vaisto kas antrą dieną). Antihistamininiai vaistiniai preparatai gali susilpninti odos hipergines reakcijas arba neleistį joms pasireikšti, todėl loratadino tablečių vartojimą reikėtų nutraukti mažiausiai prieš 48 val. iki alerginių odos mėginių. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Reklamos peržiūros data:** 2024 m. balandis. OT-11-00036

NERVŲ SISTEMAI

NUO 4⁹⁹ €



NEUROMULTIVIT

20 plėvele dengtų tablečių 4⁹⁹ €
100 plėvele dengtų tablečių 16⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Indikacijos: „Neuromultivit“ yra vitamino B₁, vitamino B₆ ir vitamino B₁₂, kurie yra ypač svarbūs užtikrinant normalias nervų sistemos medžiagų apykaitos funkcijas, derinys. Vartojant nervų sistemos ligų gydymui B grupės vitaminai atstato jų stoką organizme ir skatina nervinio audinio natūralų gijimo procesą. „Neuromultivit“ vartojamas esant B grupės vitaminų stokos sukeltiems negalavimams. Vitaminas B pasišykia skausmą malšinančiu poveikiu. **Vartojimas:** rekomenduojama dozė yra viena tabletė kartą per parą. Pavieniais atvejais paros dozė galima padidinti iki 3 tablečių. Tabletes reikia vartoti nesuskramtytas po valgymo ir užsigeri truputį skysčio. **Kontraindikacijos:** retai pasitaiko nespecifinių požymių – vėmimas, galvos skausmas ir svajulys. Mažiau tikėtinos padidėjusio jautrumo reakcijos, kurios vartojant vitaminus B arba B₆ dažniausiai reikšiamos požymiais odoje. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Neuromultivit“ vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas vitaminui B₁, vitaminui B₆, vitaminui B₁₂, arba bet kuriai pagalbinei „Neuromultivit“ medžiagai. Negalima vartoti vaikams ir paaugliams (jaunesniems negu 18 metų) dėl per didelio veikliųjų medžiagų kiekio. Nedelsiant pranešti gydytojui, jei yra kontraindikacijų vaisto vartojimui, atsiradę šalutinio poveikio požymiai ar pastojote. Reikėtų vengti vartoti dideles vaisto dozes ilgiau nei 4 savaites. Vitaminas B₆ gali sumažinti kartu vartojamos L-dopos poveikį. **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:** G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. **Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį RTT atstovą:** UAB „GL Pharma Vilnius“, A. Jakšto g. 12, Vilnius, tel. (8 5) 261 0705, el. paštas: office@gl-pharma.lt; www.gl-pharma.lt. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025 03.

5⁹⁹ €



DEEP RELIEF

50 mg / 30 mg/g gelis, 50 g

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 g gelio yra 50 mg ibuprofeno ir 30 mg levomentolio. Terapinės indikacijos: Lokalus sąnario aplinkos minkštųjų audinių uždegimo ir (ar) traumos (pvz., patempimo, išnirimų) sukkelto skausmo malšinimas. Dozavimas: Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: gelį vartoti iki 3 kartų per parą, bet ne dažniau kas 4 valandas. Tępti reikia apie 1–4 cm gelio iš 50 g pakuties. Viena centimetrė gelio iš 50 g tubelės yra vidutiniškai 50 mg ibuprofeno. 4 cm, iš 50 g tubelės yra vidutiniškai 125 mg ibuprofeno. Neviršyti nurodytų dozių. Jeigu simptomai nepaieina per penkis dienas, kreiptis į gydytoją. Vaikų populiacija: Duomenų apie „Deep Relief“ saugumą ir veiksmingumą jaunesniems kaip 12 metų vaikams nėra. Vartojimo metodas: Plonu gelio sluoksniu tepti skaudamą vietą, švelniai masažuoti, kol susigers. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas aspirinui ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, įskaitant ir vartojamus per burną. Astma sergantys pacientai, kuriems aspirinas arba kiti nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, gali sukelti astmos priepuolį, niežėjimą, rinitą ar dilgėlinę. Nubrozidinta, pakeista infekcijos ar uždegimo oda arba netiesioginis odos sluoksnio. Kiti toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu lokaliai vartojami vaistiniai preparatai. Vartojimo vietoje esanti infekcija. Paskutinis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Deep Relief“ gelio sudėtyje yra propilenglikolio, kuris gali sukelti odos sudirginimą, gelio netepti ant (arba) šalia gleivinės ir akių. Metikla tepti po sandarinamųjų tvarsių. Pirmą kartą išbandyti ant mažo odos ploto. Vartoti tik ant odos. Registracijos ir gamintojas: The Mentholatum Company (Ireland) Limited, Airija. **„DEEP RELIEF“ – VĖSINANTIS IR GREITAI VEIKIANČIS TEPALAS NUO SKAUSMO!**

6⁹⁹ €



LARYXIN

LEMON 5 mg/1 mg, 24 suslęgtosios pastilės
MENTHOL 5 mg/1 mg, 24 suslęgtosios pastilės

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Sudėtis: „Laryxin Menthol“ ir „Laryxin Lemon“ sudėtyje yra 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido ir 1 mg lidokaino hidrochlorido monohidrata. **Terapinės indikacijos:** gerklės skausmo simptomų malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems – po 1 pastilę kas 2–3 valandas. Nevartokite daugiau kaip 10 pastilių per dieną. Paaugliams nuo 12 iki 18 m. – po 1 pastilę kas 2–3 valandas. Nevartokite daugiau kaip 5 pastilių per dieną. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija chlorheksidino dihidrochloridui, lidokaino hidrochloridui monohidratui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Šio vaisto draudžiama vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoja, prieš pradėdami vartoti „Laryxin Menthol“ ir „Laryxin Lemon“. „Laryxin Menthol“ ir „Laryxin Lemon“ vartokite tik trumpam laikui skausmui ir dirginimui malšinti. Reikia vengti dažno „Laryxin Menthol“ ir „Laryxin Lemon“ vartojimo. Kreipkitės į gydytoją, jei per 3–4 dienas Jūsų sąjauja nepagerėjo arba karšiuojate, skauda galva, pykina, vemiate ar atsiranda odos išbėrimas. Jeigu esate alergiški kitiems vietiniams amidių grupės anestetikams, pavyzdžiui, lidokaino hidrochloridui monohidratui, vartodami „Laryxin Menthol“ ir „Laryxin Lemon“ turite laikytis saugumo priemonių. Vartojant didesnes nei rekomenduojama dozes (t. y. daugiau kaip 1 pastilę per kartą arba daugiau kaip 5 pastiles per dieną paaugliams ar daugiau kaip 10 pastilių per dieną suaugusiems), gali sumažėti rijimo refleksų valdymas. Dėl to gali padidėti skysčių ir maisto dalelių įkvėpimo (vadinamosios aspiracijos) rizika. Nevartokite „Laryxin Menthol“ ir „Laryxin Lemon“ tuo pačiu metu ar prieš pat kitų turbos ir (arba) gerklės dezinfekavimo priemonių vartojimą arba iš karto po jų vartojimo. Jei tokių vaistų vartojate tuo pačiu metu, jų poveikis gali sumažėti. „Laryxin Lemon“ sudėtyje yra sorbitolio (E 420), aspartamo (E 951), benzilo alkoholio (E 1519), maltodekstrino ir natrio. „Laryxin Menthol“ sudėtyje yra sorbitolio (E 420) ir levomentolio. Reklamos teksto parengimo data 2024-09-27.

2⁹⁹ €



NEOCITRAMONAS 240 mg / 200 mg / 30 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletyje yra 240 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg paracetamolio ir 30 mg kofeino. **Terapinės indikacijos:** vaistas vartojamas trumpalaikiam lengvo ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių ir menstruacinių skausmų malšinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tabletes reikia vartoti nekrantam, užgeriant ne mažiau kaip 250 ml vandens. Atsivėligiant į ligos sunkumą, vartoti po 1 tabletyje 1–4 kartus per dieną. Didžiausia paros dozė – 4 tabletės. Negalima vaisto vartoti dažniau kaip kas 6 val. ir ilgiau kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, esanti ar buvusi virškinimo trakto opa ir (arba) kraujavimas iš virškinimo trakto, buvusi bronchų astma, kurią sukėlė salicilatai ar kitokie nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, pacientas jaunesnis negu 12 m., trys pasikartijusios nėštumo mėnesiai, žindymas, ligos, kurių metu yra padidėjęs kraujavimo pavojus, kraujo krešėjimo sutrikimas, vartojama 15 mg ar didesnė metotretoksato savaitės dozė, sunkus širdies, kepenų, inkstų nepakankamumas, labai sunki aukšto kraujo spaudimo liga, kamuoja nemiga, padidėjęs nervingumas, dirglumas, nerimas, baimė, sujaudinimas ar panašūs simptomai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergama podagra, bronchų astma, kolagenozėmis ar kraujodaros sistemos ligomis, yra sustiprėjusi skydliaukės veikla ar sergama cukriniu diabetu, yra virškinimo trakto, inkstų, kepenų ar širdies funkcijos sutrikimų, yra buvusi alergija kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, planuojama chirurginė operacija, pacientas yra jaunesnis kaip 16 m. ir serga virusinėmis ligomis, pacientas yra senyvas, planuojama pastoti, pakinta šlapimo kiekis, pasireiškia pabrinkimų ar skausmas juosmen srityje, pagelsta oda ar akys, patamsėja šlapimas, atsiranda bendras silpnumas, yra nerimo sutrikimas, panikos sutrikimas ar nemiga. Sudėtyje esantis kofeinas gali sukelti drebulį, dažną širdies plakimą, viduriavimą, susijaudinimą, stiprų širdies plakimą, nemigą, galvos skausmą, raumenų trūkčiojimą ir šlapimo išsiskyrimo padidėjimą. **Reklamos teksto parengimo data 2024-11-14.**

NUO RĖMENS

NUO 2⁹⁹ €



RANIGAST S-O-S

12 kramtomųjų tablečių 2⁹⁹ €
24 kramtomosios tabletės 4⁹⁹ €

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Ranigast S-O-S“ yra skirtas gastroezofaginio refliukso simptomams (rėmeniui, skrandžio skausmui, dispepsijai) malšinti. **Veikia akimirksniu** – nuo to momento, kai tik sučiulpste ar išgeriate tabletę. **•** Didelį ypatingą sudėtis apsaugo skrandžio gleivinę ir sumažina rėmens epizodų skaičių. **•** Tinka naudoti ir kaip papildoma priemonė sergantiems gastritui, peptinei opa. **•** Galima naudoti nėštumo ir žindymo metu, prieš tai pasitarus su gydytoju. **•** Suaugusiems ir vaikams nuo 12 metų: rekomenduojama pavalius vartoti 2 tabletes. Vaikams (6–12 metų): rekomenduojama pavalius vartoti 1 tabletę.

KELIO SĄNARIO OSTEOARTRITUI

24⁹⁹ €



PIASCLEDINE® 300 mg, 30 kietųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 100 mg neesterifikuoto avokadų aliejaus, 200 mg neesterifikuoto sojų aliejaus. **Terapinės indikacijos:** papildomas suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymas, pvz.: esant skausmui ir apskunkintam judėjimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. 1 kapsulę per parą reikia nuryti visą, užgeriant pilna stikline vandens, valgio metu. Kapsulių kramtyti negalima. Įprasta gydymo trukmė yra 3–6 mėnesiai. Gydymą galima tęsti tol, kol vaistą gerai toleruojate ir simptomai vis dar lengvėja. **Kontraindikacijos:** alergija bet kuriai veikliajai arba pagalbinei šio vaisto medžiagai; alergija žemės riešutams arba sojom. **Specialūs įspėjimai:** vaistas skirtas tik suaugusiems. Atsiradus bet kokių kepenų ar tulžies organų sutrikimų požymių ar simptomų (pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas, nuovargis, apeltis paradimas, odos ir akių pageltimas (gelta), šlapimo patamsėjimas), alerginės reakcijos požymių ar simptomų (dilgėlinė, niežėjimas ir (arba) odos išbėrimas / paraudimas, vėdo patinimas ir (arba) kvėpavimo pasunkėjimas), kraujo krešėjimo sutrikimų požymių ar simptomų (raudonų ar purpurinių odos dėmių, dėminių kraujosruvų ar gleivinės kraujavimas) gydymą nutraukite ir tuoj pat kreipkitės į savo gydytoją. Jeigu esate gydymas antikoagulantais, pasakykite savo gydytojui arba vaistininkui prieš pradėdami vartoti vaistą. Pacientams, kurie yra jautrūs žemės riešutų baltymams, yra didesnė rizika pasireikšti sunkioms reakcijoms į sojų preparatus. Reklamos teksto parengimo data 2025-01-15. **„PIASCLEDINE“ MAŽINA SKAUSMĄ IR PALENGVINA JUDĖJIMĄ!**

NUO 2⁹⁹ €



THROMBO ASS

- 50 mg, 100 skrandyje neirių tablečių 2⁹⁹ €
- 75 mg, 100 skrandyje neirių tablečių 3⁹⁹ €
- 100 mg, 100 skrandyje neirių tablečių 4⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: acetylsalicilo rūgštis. **Terapinės indikacijos:** miokardo infarkto rizikos mažinimas sergantiems krūtinės angina. Antrinė miokardo infarkto profilaktika. Trombozės profilaktika po vainikinių arterijų nuosvūrio operacijos. Antrinė praeinančio smegenų išemijos priepuolio (PSP) ar insulto profilaktika. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti po 1 tabletę 1 kartą per dieną (patariama vakare). Skrandyje neirių tablete reikia nuryti nesukramtytą, užsigeriant pakankamu skysčiu kiekį valgio metu arba tarp valgių tuo pačiu paros metu. Įprastinė paros dozė ilgalaikiam vartojimui yra 50–150 mg. Dalyti į dalis „Thrombo ASS“ skrandyje neiros tabletes negalima, nes bus pažeista skrandyje neirių plėvelė. Norint, kad tikty individualiam vartojimui, reikia rinktis atitinkamo stiprumo preparatą (50 mg, 75 mg ir 100 mg). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei salicilatams ir kitiems NVNU; bronchų spazmas; ūminė pepsinė opa; polinkis į kraujavimą, hemofiliją; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; sunkus, nepakankamai kontroliuojamas širdies nepakankamumas; nėštumas; vaikai ir paaugliai iki 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Atsargumo reikia laikytis šiais atvejais: sergant bronchine astma, šienlige, esant nosies gleivinės paburkimui ir esant kito pobūdžio alergijai; vartojant kartu su vaistais, mažinančiais kraujo krešumą; sergant hemolizine anemija; esant skrandžio ir žarnų sutrikimams, esant anamnezėje duomenims apie opalę ar kraujavimą iš virškinimo trakto; esant inkstų ligoms ir (arba) kepenų funkcijos sutrikimui; turintiems polinkį podagrai. Prieš numatytą operaciją 10 dienų acetylsalicilo rūgštis reikia nevartoti. Šio vaisto sudėtyje yra laktazės monohidrato, todėl vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas lopp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Pakuotė: 50 mg, 75 mg arba 100 mg; 100 skrandyje neirių tablečių. Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:** G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025 03.

NUO 9⁹⁹ €



VOLTAREN

- EMULGEL 23,2 mg/g gelis, 100 g 9⁹⁹ €
- EMULGEL 23,2 mg/g gelis, 150 g 14⁹⁹ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Diklofenako dietilaminas. **Terapinės indikacijos:** suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: skausmo ir uždegimo mažinimas, kai yra minkštųjų audinių sužalojimas (sausgyslių, raiščių, raumenų ir sąnarių trauma, pvz., patempimas, sumušimas); vietinis minkštųjų audinių uždegimas (nugaros skausmas, tendinitas, bursitas). **Tik suaugusiems (18 m. ir vyresniems):** sąnarių (pvz., kelių) degeneracinės ligos sukeliamas skausmas, tendinitas, bursitas). **Vartojimas:** Vartoti ant odos. Tepti 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje. **Kontraindikacijos:** Alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitiems vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo; paskutinis nėštumo trimestras; jaunesniems kaip 14 m. paaugliams. **Specialūs įspėjimai:** Netepti ant pažeistos odos, atvirus žaizdos, odos išbėrimo ar egzemos vietas, didelių odos plotų, saugoti, kad nepatektų į akis ir ant gleivinės, pvz., burnos, nenuryti. Jeigu pasireiškia bėrimas, gydymą nutraukti; nenaudoti su oro nepraleidžiančiais tvarstiais. Sudėtyje yra propilenglikolio ir butilhidroksitoleno. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-03. Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi jiems licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas.

6⁹⁹ €



MAGNEROT 500 mg, 50 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekvienoje tabletėje yra 500 mg magnio orotato dihidrato (atitinka 32,8 mg magnio). **Terapinės indikacijos:** Magnio trūkumo, jeigu jis sukelia raumenų veiklos sutrikimą (pvz., mėšlungį), šalinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** **Suaugusiems žmonėms:** jei nepaskirta kitaip, magnio atsargoms papildyti pirmą savaitę reikia gerti po 2 tabletes 3 kartus per parą, po to – po 2–3 tabletes per parą. **Vaičių populiacija:** „magnerot“ nėra skirtas vaikams iki 18 metų. Vartoti per burną. Tablete reikia nuryti visą arba sukramtyti prieš valgį ar valgant, užgeriant nedideliu kiekiu skysčio. Tablete reikia vartoti mažiausiai 6 savaites, galima vartoti ir ilgiau laika. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Inkstų funkcijos sutrikimas ir polinkis formuotis kalcio, magnio ir amonio fosfatų akmenims. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Sudėtyje yra laktazės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Sąveika su kitais vaistais: vaistais, kurių sudėtyje yra kalcio, magnio ir amonio fosfatų. Jeigu kartu vartojama geležies vaistinių preparatų, magnis gali sutrikdyti geležies absorbciją. Tokiu atveju geležies vaistinių preparatų reikia gerti ne anksčiau, kaip praėjus 2–3 val. po magnio vaistinio preparato pavartojimo (arba atvirkščiai). Taip turi būti vartojami ir tetraciklinai bei natrio fluoridas. Nepageidaujamas poveikis. Didelės dozės gali sukelti viduriavimą arba išmatų suminkštėjimą. Sumažinus dozę, toks poveikis išnyksta. **Pakuotė: 50 mg, 50 tablečių. Teksto peržiūros data:** 2024.09.26. **Registruotojas:** Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Vokietija. **ORGANINIS MAGNIO DRUSKA, LENGVAS PASISAVINIMAS.**

EFEKTYVUS IR PATOGUS NAGŲ GRYBELIO GYDYMAS

NUO 22⁹⁹ €



POSAMYK

- 78,22 mg/ml, vaistinis nagų lakas, 3,3 ml 22⁹⁹ €
- 78,22 mg/ml, vaistinis nagų lakas, 6,6 ml 33⁹⁹ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml yra 78,22 mg terbinafina. **Terapinės indikacijos:** suaugusiųjų, sergančių lengva ar vidutinio sunkumo nagų grybeline infekcija, gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** per pirmąsias 4 gydymo savaites „Posamyk“ ant pakenktų nagų reikia tepti 1 kartą per parą, vėliau – 1 kartą per savaitę. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas terbinafinui arba pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** vartoti tik išorškai. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“, filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS240335897. Teksto patvirtinimo data 2024-03-13.

11⁹⁹ €



VOLTAREN AKTIGO 140 mg, vaistinis pleistras, 5 vnt.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga: diklofenako natrio druska. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikis (ne ilgiau kaip 7 d.) vietinis simptominis ūminio patempimų, audinių įtrūkimų, sumušimų, atsirandančių dėl rankų ir kojų traumų (pvz., sporto traumų), gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir paaugliams nuo 16 m.: priklijuoti 1 vaistinį pleistrą ant skausmingos vietos 2 kartus per parą, ryte ir vakare. Negalima vartoti daugiau kaip 2 pleistrai per parą. **Kontraindikacijos:** Alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitiems vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo, aktyvi skrandžio ir žarnyno opa, paskutinis nėštumo trimestras, vaikai ir paaugliai, jaunesni nei 16 m., buvęs asmos priepuolis, dilgėlinė arba nosies gleivinės sudirginimas ir timas, pavartojus acetylsalicilo rūgštis ar kitų vaistų nuo skausmo ir uždegimo. Negalima pleistro klijuoti ant pažeistos odos. **Specialūs įspėjimai:** pastebėjus odos išbėrimą, reikia nedelsiant nuimti pleistrą. Šalutinį poveikį galima sumažinti, vartojant mažiausią veiksmingą dozę trumpiausią laiką. Pleistras neturi būti klijuojamas ar kitų vaistų su diklofenaku tuo pačiu metu. Pastarąsias su gydytoju, jeigu sergate ar sirgote bronchine astma arba alergija, turite inkstų, širdies ar kepenų sutrikimų, anksčiau turėjote skrandžio ar žarnyno opą, žarnyno uždegimą arba turite padidėjusį polinkį kraujavimui. Nuklijavę pleistrą, venkite gydymo vietos kontakto su saulės ar soliariumo spinduliais. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-03. Prekių ženklai priklauso „Haleon“ arba „Haleon“ turi jų licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas.

NUO 2⁴⁹ €



IBUPROFEN LANNACHER

- 400 mg, 10 pėlele dengtų tablečių 24⁹⁹ €
- 400 mg, 20 pėlele dengtų tablečių 3⁹⁹ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Vienoje pėlele dengtoje tabletėje yra 400 mg ibuprofeno. **Indikacijos:** „Ibuprofen Lannacher“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos ibuprofeno. Ibuprofenas malšina uždegimo sukeltą skausmą, patinimą ir karščiavimą, vartojamas trumpą laiką silpno ar vidutinio stiprumo skausmui, tokiame kaip mėnesinių, galvos, dantų, raumenų, sąnarių, malsinti. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** tabletės reikia nuryti valgio metu arba pavėlyus, užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio. **Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams:** 0,5–1 pėlele dengta tablete 3 kartus per parą. Negalima viršyti didžiausios paros dozės 1200 mg ibuprofeno (3 pėlele dengtų tablečių). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofeniui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei yra buvę padidėjęs jautrumo reakcijų, vartojant kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo, acetylsalicilo rūgštis darinius. Sunkus kepenų, inkstų ar širdies funkcijos nepakankamumas. Paskutinių trijų nėštumo mėnesių laikotarpis. Pepsinė opa. Kraujavimas į smegenis, virškinimo trakto ar žarnyno. Sisteminė raudonoji vilkligė. Jaunesni nei 12 m. vaikai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai skirti pacientams, sergantiems širdies ir kraujagyslių, smegenų kraujagyslių ligomis, cukriniu diabetu ir jungiamojo audinio ligomis, senyviems pacientams. Pacientams, sergantiems bronchine astma ar alerginėmis ligomis, gali išsivystyti bronchų spazmas. Virškinimo trakto sutrikimai ir lėtinis uždegiminis žarnyno ligos gali paūmėti. Atsiradus virškinimo trakto kraujavimui ar išopėjimui, gydymas turi būti nedelsiant nutrauktas. Vartojimas gali mažinti moters vaisingumą. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – lopp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Pakuotė:** 10 ir 20 pėlele dengtų tablečių. **Farmakoterapinė grupė:** nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo. **ATC kodas:** M01AE01. **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:** „G.L. Pharma GmbH“, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. **Paskutinė teksto peržiūros data:** 2024-10-18. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025 06 13. **NUSIMESK SKAUSMO KAUKĘ!**

NUO **3⁹⁹** €



IBUPROM

EXPRESS, 400 mg, 10 minkštųjų kapsulių **3⁹⁹** €

EXPRESS, 400 mg, 20 minkštųjų kapsulių **5⁹⁹** €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg. Indikacijos: skausmo (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimas mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems pacientams ir vyresniems nei 12 m. vaikams kaip trumpalaikis pagalbinis gydymas kas 4 val. geriama 1 kapsulė (negerti daugiau kaip 3 kapsulių per parą). Kapsulių negalima kramtyti. Kapsulę reikia užsigerti stikline vandens. Kontraindikacijos: alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, praėjusio buvusio padidėjusio jautrumo reakcijos vartojant kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo, sunkus kepenų, inkstų ar širdies funkcijos nepakankamumas, esama (ar praėjusio buvusio) pepsinės opa, buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, kraujavimas į smegenis, virškinimo trakto arba kitoks kraujavimas, sisteminė raudonoji vilkligė, paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai: specialii atsaugumo priemonių reikia, jeigu sutrikus inkstų, kepenų, širdies ir virškinimo trakto veikla, vartojama kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo, sergama bronchine astma, alerginėmis ligomis ar sisteminė raudonoji vilkligė, senyviems žmonėms. Reklamos teksto parengimo data 2024.11.29.

RENKUOSI „IBUPROM“. RENKUOSI LAISVĖ.

ŽAIZDŲ GIJIMUI SKATINTI

-30%



HELP4SKIN

HELP4SKIN WOUND HEALING, gelis, 20 g **6⁹⁹ 4⁸⁹** €

HELP4SKIN WOUND HEALING, gelis, 50 g **12⁹⁹ 9⁰⁸** €

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Help4skin Wound Healing“ yra hidrokoloidinis gelis be parabeno, skirtas lokaliai sausų ir lėpų žaizdų priežiūrai bei jų gijimui skatinti. Pagreitina ūminį ar lėtinį žaizdų gijimą, pvz.: žaizdų (skaitant chirurgines), įpjūvimo, įbrėžimų, odos nubrozdinimų ir įtrūkimo, paviršinių nudegimų (I ir IIA laipsnio). Greitai padeda malšinti skausmą, mažina randų susidarymo riziką, greičiau gijimą, padeda išvengti infekcijos. Galima naudoti vyresniems nei 2 m. vaikams. PAPRASTA IR EFEKTYVU.

8⁹⁹ €



CAGYNOL 300 mg, ovulė, 1 vnt.

NERECEPTINIAI VAISTAI

Ovulė vietiniam makšties kandidozės gydymui. Kiekvienoje ovulėje yra 300 mg sertakonazolo nitrato. **Terapinės indikacijos.** Vietiniam makšties grybelinės Candida infekcijos gydymui. „Cagynol“ skirtas suaugusiems. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Dozavimas. Viena ovulė vakare prieš miegą, vienkartiniam vartojimui, įterpiama giliai į makštį, geriausia gulint. Gydymo trukmė – vienkartinė dozė. Didžiausia vienkartinė dozė yra viena ovulė (300 mg sertakonazolo). Jei klinikiniai požymiai išlieka, antrą ovulę vartojama 7 dienų intervalu. Vartojimo metodas. Vartoti į makštį. Vartojant šį vaistinį preparatą negalima naudoti tamponų ir intravaginalinių dujų. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas priešgrybeliniams imidazolo klasės vaistiniams preparatams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Latekso prezervatyvų arba diafragmų naudojimas. **Specialūs įspėjimai ir atsaugumo priemonės.** Jei kandidozė patvirtinta, reikia atidžiai ieškoti ekologinių veiksnių, kurie sudaro sąlygas ir skatina grybelinės infekcijos vystymąsi. Norint išvengti atkryčių, labai svarbu nustatyti ir eradikuoti infekciją bei atsivelti į ją skatinančius veiksnius. Patarina vienu metu gydyti visą grybelinės infekcijos židinį, pripažintą sukelėja, partnerį. **Nėštumas.** Tyrimais su gyvūnais teratogeninis poveikis nenustatytas. Sertakonazolo vartojimas nėštumo metu turėtų būti svarstomas tik esant būtinybei. Teksto peržiūros data: 2022 m. gegužės 30 d. Reklamos parengimo data: 2025.06.13.

VIENOS OVULĖS SĖKMĖS ISTORIJA

AKIŲ DIRGINIMO, AŠAROJIMO, PERVERGIMO, VOKŲ KRAŠTŲ UŽDEGIMO LENGINIMAS

8⁹⁹ €



OCULOHEEL

akių lašai (tirpalas), 3 paketėliai po 5 viendozes talpykles

HOMEOPATINIS NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 talpyklyje (0.45 ml tirpalo) yra veikliųjų medžiagų: *Euphrasia* D5 110.7 mg, *Cochlearia officinalis* D5 110.7 mg, *Pilocarpus* D5 110.7 mg, *Echinacea* D5 110.7 mg. **Terapinės indikacijos.** Akių dirginimo, ašarojimo, smėlio akys pojūčio, pervargimo, jautrumo šviesai ir vokų kraštų uždegimo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Vaikams nuo 6 m. ir suaugusiems žmonėms paprastai reikia lašinti į pažeistą akį po 1 lašą 3 kartus per dieną. Jei vartojama ir kitokių akių lašų, tarp jų ir „Oculoheel“ akių lašų vartojimo rekomenduojama daryti 15 minučių pertrauką. Kadangi šio vaistinio preparato sudėtyje yra ežiūklės (*Echinacea*), prieš skiriant jo ilgiam kaip 8 savaitių laikotarpiui, rekomenduojamas individualus įvertinimas. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, arba astriūni (gražlėdžių) seimos augalams. **Specialūs įspėjimai ir atsaugumo priemonės.** *Pagalbinės medžiagos.* Fosfatiniai buferiniai. Kiekvienoje šio vaistinio preparato viendozėje talpyklyje yra 2,81 mg fosfatų, tai atitinka 6,25 mg/g. Kadangi šio vaistinio preparato sudėtyje yra ežiūklės (*Echinacea*), prieš skiriant jo pacientams, turintiems imuninės sistemos funkcijos sutrikimų (pvz., progresuojančių sisteminių sutrikimų, autoimuninių ligų, imunodeficitų, imunosupresijos ir baltųjų kraujo ląstelių sistemos ligų atvejais), rekomenduojamas individualus įvertinimas. Talpyklės turinį galima vartoti tik 1 kartą, t. y. kartą įlašinį į kairiąją ir (arba) dešiniąją akį tiek, kiek reikia. Talpyklę reikia atidaryti tik prieš pat vaisto vartojimą. Naudota talpyklė reikia išmesti, net jeigu joje yra vaistinio preparato likučių. **Registruotojas.** „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). **Registruotojo atstovas.** UAB „Farmahelis“. Reklamos teksto parengimo data 2025-06-16.

NUO GALVOS SVAIGIMO

7⁹⁷ €



VERTIGOHEEL. 50 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Homeopatinis vaistinis preparatas. 1 tabletyje yra veikliųjų medžiagų: Anamirta cocculus D4 210 mg, Conium maculatum D3 30 mg, Ambra grisea D6 30 mg, Petroleum rectificatum D8 30 mg. **Terapinės indikacijos.** Dėl įvairių priežasčių atsiradęs galvos svaigimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Suaugusiems žmonėms, 12 m. ir vyresniems vaikams: paprastai reikia vartoti po 3 tabletes 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol išsirs). Ūmiai atsiradus galvos svaigimui ir pykinimui, pradžioje (pirmas 2 valandos) vartoti po 1 tabletyje kas 15 min. „Vertigoheel“ saugumas ir veiksmingumas jaunesniems nei 12 m. vaikams neįrodyti. Duomenų nėra. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsaugumo priemonės.** Sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas reiš paveldimas sutrikimas – Lapp laktozės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Registruotojas.** „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). **Registruotojo atstovas.** UAB „Farmahelis“. **Teksto parengimo data** 2024-08-01.

NUO SLOGOS

4⁹⁹ €




GALANAS 1 mg/50 mg/ml, nosies purškalas, 10 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido ir 50 mg deksantenolio. **Indikacijos:** „Galanas“ skirtas suaugusiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) ir kaip pagalbinė priemonė odos bei gleivinės pažeidimams gydyti, ne alerginės kilmės išskyros iš nosies (vazomotoriniai rinitai) mažinti ir kvėpavimui per nosį palengvinti esant nosies užgulimui po nosies operacijos; nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu ir ūminiu priesnoriu ančių uždegimu (rinosinustu). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams 1 purškalo tirpalo dozė į kiekvieną šnervę pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Dozavimas priklausio nuo individualaus paciento jautrumo ir klinikinio atsako. „Galanas“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 paras, nebent gydytojas nurodė kitaip. Dėl vaikų gydymo trukmės reikia pasikonsultuoti su gydytoju. **Kontraindikacijos:** šio vaistinio preparato vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliosioms ar pagalbinėms medžiagoms; jeigu yra sausasis nosies gleivinės uždegimas (rhinitis sicca); po chirurginio posmegeninės liaukos pašalinimo per nosį (transsfenoidalinės hipofizektomijos) arba po kitų chirurginių intervencijų, pažeidžiančių smegenų dangalą; kūdikiams ir jaunesniems kaip 6 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** pasitariti su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Galanas“, jeigu esate gydymas monoamino oksidazės (MAO) inhibitoriais; jei yra padidėjęs akispūdis; jeigu sergate sunkia širdies ar kraujagyslių sistemos liga; jeigu yra antinksnių navikas; sergate cukriniu diabetu ar yra suaktyvėjusi skydliaukės veikla; jei yra padidėjusi prostata (prostato hiperplazija). **Reklamos teksto parengimo data** 2021-08.

ATKĖMSA NOSĮ IR ATKURIA PAŽEISTĄ NOSIES GLEIVINĘ.

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMBIO

Ca+Mg+K+Zn+D3, milteliai geriamajam tirpalui, 30 paketėlių 13⁹⁸ €
MAISTO PAPILDAS

IKI -40%



OMRON kraujospūdžio matuokliai

MEDICINOS PRIETAISAI

Japonų prekės ženklą OMRON medicinos prietaisai tiksliai išmatuos kraujospūdį.

„OMRON“ – PATIKIMAS SVEIKATOS PARTNERIS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

IKI -50%



AMEDIPLUS

Automatinis žastinis kraujospūdžio matuoklis DBP-1358 64⁹⁵ 38⁹⁷ € -40 %Automatinis žastinis kraujospūdžio matuoklis DBP-6192 85⁹⁵ 43⁹⁰ € -50 %Kraujospūdžio matuoklio adapteris 10⁹⁵ 8⁷⁹ € -20 %Kompresorinis inhaliatorius VP-D1 65⁹⁵ 46¹⁹ € -30 %Tinklinis inhaliatorius VP-M1 79⁹⁵ 55⁹⁹ € -30 %Manžetė kraujospūdžio matuokliui, XL (22–42 cm) 15⁹⁵ 12⁷⁹ € -20 %Manžetė kraujospūdžio matuokliui, XXL (32–48 cm) 15⁹⁵ 9⁵⁹ € -40 %Termometras skaitmeninis bekontaktis 39⁹⁵ 31⁹⁹ € -20 %

MEDICINOS PRIETAISAI

-30%



ARTILANE FORTE

15 vienadozių buteliukų po 30 ml 20⁹⁵ 14⁶⁹ €

MAISTO PAPILDAS SU SALKIDILIAIS

Maisto papildas sudėtyje yra fermentais hidrolizuoto ypač gryno kolageno, gliukozamino ir chondroitino, hialurono rūgšties, magnio, cinko, pluoštinės bosvelijos (Boswellia serrata), antioksidantų: kofermento Q10, likopeno, kvercetino, vitamino C.

ARTILANE CLASSIC

15 vienadozių buteliukų po 30 ml 16⁹⁵ 11⁷⁵ €

MAISTO PAPILDAS SU SALKIDILIU

Maisto papildas sudėtyje yra fermentais hidrolizuoto ypač gryno kolageno, hialurono rūgšties, magnio, cinko, antioksidantų: kofermento Q10, likopeno, kvercetino, vitamino C.

SĄNARIAMS

9⁹⁹ €

GLUCOSAMIN-RATIOPHARM

1,5 g milteliai geriamajam tirpalui, 20 paketėlių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 paketėlyje yra 1,5 g gliukozamino sulfato, tai atitinka 1,884 g gliukozamino sulfato natrio chlorido arba 1,178 g gliukozamino. **Terapinės indikacijos:** lengvo ar vidutinio sunkumo kelio osteoartrito sukeltų simptomų lengvinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** paketėlio turinį ištirpinti stiklinėje vandens ir gerti 1 kartą per parą. Gliukozaminas netinka vartoti ūminio skausmo simptomams slopinti. Simptomų palengvėjimas (ypač skausmo) gali pasireikšti vartojant kelias savaites, kartais ir dar ilgiau. Jei simptomai nepalengvėja po 2–3 mėnesių vartojimo, reikia iš naujo spręsti, ar gydymą gliukozaminu tęsti toliau. Miltelius galima vartoti tiek valgio metu, tiek nevalgiant. Gliukozaminą negalima vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas gliukozaminui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. „Glucosamin-ratiopharm“ negalima skirti ligoniams, alergiškiems kiaušiniams, žuvių produktams, nes iš jų išgaunama preparato veiklioji medžiaga. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jei pacientui yra sutrikęs gliukozės toleravimas, prieš skiriant gydymą ir vėliau periodiškai rekomenduojama stebėti gliukozės kiekį kraujyje ir, jei reikia, insulino poreikį. Jei pacientai turi širdies ir kraujagyslių ligų rizikos faktorių, rekomenduojama stebėti lipidų kiekį kraujyje, nes vartojantiems gliukozaminą ligoniams buvo nustatyti keli hipercholesterolemijos atvejai. Buvo aprašytas atvejis, kai, pradėjus gliukozamino terapiją, pablogėjo astmos simptomai. Gliukozaminą negalima vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams, nes neįtirtas vartojimo saugumas ir veiksmingumas. Atsargumas reikalingas, jei pacientui yra fenilketonurija. Šio vaistinio preparato paketėlyje yra 151 mg natrio, tai atitinka 8 % dižiausios PSO rekomenduojamos paros normos suaugusiems, kuri yra 2 g natrio. Dėl sudėtyje esančio sorbitolio šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems yra įgimtas fruktozės netoleravimas. Taip pat sorbitolis gali paveikti kitų kartu vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį prieinamumą. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-01-22. GLR-1T-00006

JUDĖJIMUI BE SKAUSMO!

KRAUJOTAKAI IR ATMINČIAI

9⁹⁹ €

GINKOBIL 120 mg, 40 kietųjų kapsulių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 120 mg rafinuoto ir kiekybiškai įvertinto ginkmedžių lapų sausosio ekstrakto. Indikacijos: lengvo ir vidutinio smegenų kraujotakos nepakankamumo, pasireiškiančio susilpnėjusia atmintimi ir dėmesio koncentracija, spengimu ar ūzmu ausyse, svajonių ar galvos skausmu, simptominiams gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: gerti po 1 kapsulę 2–3 kartus per dieną (atitinka 160–240 mg dienos dozė). Kontraindikacijos: vartoti negalima, jei yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Ginkobil“ medžiagai. Specialūs įspėjimai: kadangi dvikiaučių ginkmedžių lapų ekstrakto poveikis depresinei nuotakai ir galvos skausmui, nesusijusiems su silpnoprotystės sindromu, kol kas nėra pakankamai ištirtas, medikamentu gydyti šiuos simptomus galima tik laikinai visų būtinų atsargumo priemonių. Teksto peržiūros data 2017-05-22

VEIKSMINGAI GERINA SUTRIKUSIĄ KRAUJOTAKĄ!



TYLUS RŪPESTIS

Pastebėkite tuos, kurie rūpinasi
ir slaugo savo artimuosius.
Padėkite jiems kasdienybėje,
kad jie nesijaustų vieni.



**Skenuokite QR kodą
ir sužinokite daugiau
apie iniciatyvą.**

www.gintarine.lt/tylus-rupestis



**Gintarinė
vaistinė**

rūpinkimės tais, kurie rūpinasi kitais



-40 % PREKIŲ ŽENKLAMS

-40%



„WALMARK“ VITAMINAI IMUNITETUI VISAI ŠEIMAI

MAISTO PAPILDAI

ŽYDĖK SVEIKATA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-40%



SALUTIL®

MAISTO PAPILDAI

„Salutil“ – produktų linija su gyvybingomis bakterijomis ir elektrolitais.
„Salutil“ Hydra – elektrolitų ir gliukozės mišinys, papildytas vitaminais, mineralinėmis medžiagomis ir cholinu. Idealu vartoti po įtemtos veiklos ar jaučiant nuovargį.
„Salutil“ Shots – gyvybingos bakterijos, prebiotikai ir vitaminai viename flakone. Vaikams nuo 3 metų.
„Salutil“ – kiekvienoje kapsulėje yra 5 milijardai gyvybingųjų bakterijų.
„Salutil“ Premium 9 – sudėtyje yra 9 mikroorganizmų padėmės ir vitaminas D.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

Raumenims
ir sąnariams

-40%



AXANOVA

ACTIVE GEL, gelis, 125 ml 13⁹⁹ 8⁰⁹ €

COOL GEL, gelis, 125 ml 12⁹⁹ 7⁷⁹ €


HOT GEL, 125 ml 13⁹⁹ 8⁰⁹ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Axanova“ priemonių pagrindas – eteriniai aliejai. Atsižvelgiant į priemonės sudėtį, šildo arba vėsina, gali būti naudojamos esant sumušimams, patempimams, maudžianti sąnarius ar raumenis. Pagaminta Šveicarijoje.

Epitome

GERAI JAUSTIS YRA KELIONĖ



2 UŽ 1 KAINĄ



LIVOL vitaminai

MAISTO PAPILDAI

Daniški maisto papildai „Livol“ sukurti, remiantis holistiniu požiūriu į Jūsų organizmo sveikatą, todėl labai veiksmingi. Gaminami Danijoje nuo 1959 m. Kuriami „Livol“, Skandinavijos mokslininkai įvertino skirtingus žmonių poreikius ir pasiūlė saugią dozę bei efektyvų pasisavinimą (su EC gamybos technologija) vitaminus.

„LIVOL“ – AUKŠTOS KOKYBĖS VITAMINAI IŠ DANIJOS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė – NEMOKAMAI!

NAUJIENA



NATASPIN®

CONTROL PRO, 90 kapsulių 39⁹⁹ €

GLUCOSE, 30 kapsulių 16⁴⁹ €


MAISTO PAPILDAI

Ilgalaikiai cholesterolio kontrolei rinkintės 90 dienų kursą – „NatAspin CONTROL PRO“. Tai pažangus, daugiavertis preparatas, kuris padeda palaikyti normalų cholesterolio lygį, širdies ir kraujagyslių sistemos bei kepenų veiklą. Sudėtyje naudojami išskirtinai tik standartizuoti bioaktyvūs ekstraktai. Savo asmeninei gliukozės revoliucijai išbandykite NAUJIENĄ – „NatAspin GLUCOSE“. Šis preparatas sukurtas gliukozės kontrolei, padeda palaikyti angliavandenių apykaitą, kraujotaką, apetitą, kūno svorį, taip pat padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

SUTEIKITE GYVYBĖS KRAUJOTAKAI SU „NATASPIN“.

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



HYDROLESS SLIM, 60 kapsulių 13⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAS

Padeda palaikyti normalų kūno svorį, normalų skysčių pasisavinimą per inkstus, normalią maistinių makromolekulių apykaitą.

Juodieji pipirai padeda palaikyti normalią virškinamojo trakto bei kepenų funkciją. Juodieji pipirai ir kardiniai citrinmedis padeda palaikyti normalų kūno svorį. Didžiųjų dilgėlių ekstraktas padeda palaikyti normalų skysčių pasisavinimą per inkstus, padeda palaikyti normalią šlapimo takų funkciją. Cinkas ir chromas padeda palaikyti normalią maistinių makromolekulių apykaitą. Cinkas padeda palaikyti normalią riebalų rūgščių apykaitą, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo ir padeda palaikyti normalią baltymų sintezę. Vartojimo būdas: 2 kapsulės per dieną. Ryte ir vakare. Vartoti po valgio, užgerti stikline vandens.

HYDROLESS, 30 kapsulių 12⁸⁹ €

MAISTO PAPILDAS

Padeda palaikyti normalų skysčių pasisavinimą per inkstus, normalią šlapimo takų funkciją.

Medžiagos, turinčios fiziologinį poveikį: džiovintų stambiausių spanguolių milteliai, 80 mg; didžiųjų dilgėlių ekstraktas, 50 mg; obuolių acto milteliai, 50 mg; cinkas, 12 mg (120 %). Vartojimo būdas: po 1 kapsulę per dieną. Vartoti po valgio, užgerti stikline vandens.

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

Žarnyno mikroflorai



BIFOVAL®

FORTE, 15 kietųjų kapsulių 9⁸⁹ €

BABE, 25 kramtomosios tabletės 9⁸⁹ €

MAISTO PAPILDAS

Specialiai parinktos sudėties maisto papildai kiekvieno ryto ritualui 15-30 min prieš kiekvienus pusryčius.

„Bifoval Forte“ – 5 milijardai lacto- ir bifidobakterijų. Sudėtyje 3 bakterijų padėrės. Visai šeimai (vaikams nuo 5 metų).

„Bifoval Babe“ – brąšių skonio kramtomos tabletės, kurių sudėtyje yra 4 rūšių Lacto ir Bifido bakterijų kompleksas (3,15 mld. 1 tableteje). Vaikams nuo 3 metų.

Vartojant antibiotikus gerti 1 val. prieš arba po antibiotikų vartojimo.

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

Kaulams ir sąnariams



GLIUKOZAMINAS PLIUS KOLAGENAS, CHONDROITINAS, MSM, 60 tablečių 17⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAS

Daugiau informacijos apie produktus www.vitaminai.lt

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



ASKORBO RŪGŠTIS, 50 mg, 200 dražečių 2⁸⁵ €

MAISTO PAPILDAS

Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės, nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



TRAVELOK, 10 kapsulių 4⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAS

IMBIERIAI PAVEDA PALAIKYTI NORMALIĄ SAVIJAUTĄ KELIAUJANT.

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



ŠALTALANKIŲ ALIEJUS, 100 ml 12⁵⁹ €

MAISTO PAPILDAS

Šaltalankių aliejus padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir širdies veiklą, normalų virškinimą, normalią odos būklę. Vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą.

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

2 UŽ 1 KAINĄ



Akims



OCUVAL

MAISTO PAPILDAS

Akių drėgmei palaikyti – ypač jautrioms, pavargusioms ir daug dirbančioms akims – išbandykite naująją „Ocuvall Hydro Max“. Normaliam regėjimui išsaugoti ir akių sveikatai palaikyti rinkitės „Ocuvall Strong“.

Vaizdo aiškumui, normaliai akių būklei palaikyti – daug dirbant ar mokantis – atraskite „Ocuvall“ tabletes.

„OCUVAL“ – **MATYK, KAI LABIAUSIAI REIKIA!**

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis.

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



VITIRON

MAISTO PAPILDAS

„VITIRON“ D3 + OMEGA3 STRONG yra didelė D3 vitamino dozė, paruošta linų sėmenų aliejaus pagrindu, o tai yra natūralios kilmės omega-3. Linų sėmenų aliejaus pagrindas skatina gerą D vitamino absorbciją ir biologinį įsisavinimą. Vitaminas D3 padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų ir dantų būklę bei normalią raumenų funkciją. Linų sėmenų aliejaus yra natūralus omega-3 šaltinis. „VITIRON“ D3 Olive SUN – vitaminas D, išdirpintas tyrame alyvuogių aliejuje, kuris užtikrina geresnį jo pasisavinimą. Patogus ir greitas vitaminas D kiekvienam! „VITIRON“ KIDS – tai vaisių ir uogų skonių, įvairių formų kramtomieji guminukai su vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis. „VITIRON“ Kids grow UP skirti vaikų kaulų augimui ir vystymuisi, „VITIRON“ Kids School for BRAIN – smegenims, normaliai psichologinei būklei, pažinimo funkcijai, o „VITIRON“ KIDS Immunity su šėvamedžių uogų sultimis – imunitetui.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis.

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė – NEMOKAMAI!



VITAMINAS D3, 100 µg (4000 TV), 60 kapsulių **7⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, padeda palaikyti normalią kaulų, dantų būklę, normalią raumenų funkciją, padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą.

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



DAILEE

LADY

DISCREET

HIGIENOS PRIEMONĖS

DAILEE Lady Premium įklotai – orui laidūs, ploni, daug sugeriantys, minkšti ir švelnūs. Paviršius impregnuotas alijošiaus ekstraktu, saugančiu odą nuo sudirginimo. Puikiai prilimpa, įvairių dydžių. **Kvapo kontrolė iki 12 val.**

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis.

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė – NEMOKAMAI!

JAMIESON SELENAS, 100 mcg, 100 tablečių 13³⁹ €

Maisto papildas

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



JAMIESON VITAMINAS C MIX, 500 mg, 120 kramtomųjų tablečių 18⁴⁹ €

Maisto papildas

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



JAMIESON COLLAGEN, 60 tablečių 22⁷⁹ €

Maisto papildas

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



JAMIESON STRESS PLEX, 90 tablečių 17³⁹ €

Maisto papildas

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



Pagaminta Kanadoje

-30%

6^{64€}
94%

AMBIO

LAKTO-BIFIDOBAKTERIJOS SU INULINU, 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

NUO PILVO PŪTIMO

NUO 2^{49€}

ESPUMISAN

ESPUMISAN, 40 mg, 25 minkštosios kapsulės 2^{49€}

ESPUMISAN, 40 mg, 50 minkštųjų kapsulių 4^{99€}

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: 1 minkštojoje kapsulėje yra 40 mg simetikono. Terapinės indikacijos: „Espumisan“ vartojamas ligų, kurių metu virškinimo trakte kaupiasi dujos (meteorizmas), būna pilvo pūtimas, pilnumo pojūtis, simptomams gydyti; prieš pilvo ertmės organų tyrimus, pvz.: rentgenu, ultragarsu. „Espumisan“ skirtas vaikams nuo 6 metų, paaugliams ir suaugusiems. Kontraindikacijos: „Espumisan“ vartoti draudžiama: jeigu yra alergija veikliajai medžiagai, dažikliai saulėlydžio geltonajam FCF (E110), konservantui metilo parahidroksibenzoatui (E218) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Espumisan“. Jei šie virškinimo veiklos sutrikimai atsiranda ar jie trunka ilgiau, reikia pasitarti su gydytoju. Jis nustatys, ar nėra ligų, kurias reikia gydyti kitais būdais. Dozavimas: kai dėl susilaikiusių dujų sutrinka virškinimo trakto veikla: paaugliams, suaugusiems ir 6–14 m. amžiaus vaikams rekomenduojama skirti vartoti po dvi „Espumisan“ 40 mg minkštasias kapsules 3–4 kartus per parą. „Espumisan“ 40 mg minkštasias kapsules galima vartoti ilgai. Rengiant pacientus tyrimams rekomenduojama skirti po dvi „Espumisan“ 40 mg minkštasias kapsules 3 kartus per parą 1 dieną prieš tyrimus ir dvi „Espumisan“ 40 mg minkštasias kapsules tyrimo dienos rytą. UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ J. Jasinskio g. 16A, LT-05163 Vilnius, tel. +370 5 269 147, LT@berlin-chemie.com Reklama paruošta 2023-12-12 LT_Esp_17_2023_VI_pharma

JEI PILVĖ URAGANAS – JUMS PADĖS „ESPUMISANAS“!

NUO RĖMENS

NUO 5^{99€}

MAALOX

MAALOX 400 mg/400 mg kramtomosios tabletės (be cukraus), 40 tablečių 5^{99€}

MAALOX 40 mg/35 mg/ml geriamoji suspensija, 250 ml 6^{99€}

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: viename vienadžiame 4,3 ml geriamosios suspensijos paketėlyje yra 460 mg aliuminio hidroksido ir 400 mg magnio hidroksido; vienoje kramtomosios tabletėje yra 400 mg magnio hidroksido ir 400 mg aliuminio hidroksido; viename ml geriamosios suspensijos yra 40 mg magnio hidroksido ir 35 mg aliuminio hidroksido. Indikacijos: rėmens ir skrandžio turinio kilimo į stemplę simptomams mažinti suaugusiems ir paaugliams nuo 15 metų. Vartojimo būdas ir dozavimas. Suspensija: gerinama po 1 arba 2 vienadžių paketėlių turinį, pasireiškus rėmeniui arba refliksui; negalima gerti daugiau kaip 3 paketėlius per parą; prieš atpiešant paketėlį, jį reikėtų švelniai paspaudyti; suspensiją reikėtų gerti nešiekia. Buteliuko suspensija gerinama po vieną valgomąjį šaukštą (15 ml) pasireiškus rėmeniui arba skrandžio turinio refliksui į stemplę; negalima gerti daugiau kaip 3 valgomųjų šaukštų (50 ml) per parą; šio vaisto negalima vartoti ilgiau kaip 10 dienų. Tabletės: susiūdyti arba sukrantų 1–2 tabletes, pajutęs rėmenį arba atsisrdis refliksui; negalima vartoti daugiau kaip 6 kartus per parą ir daugiau kaip 8 tablečių per parą. Kontraindikacijos: alergija (padidėjęs jautrumas) aliuminio hidroksidui ar aliuminio hidroksidui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sunki inkstų liga; stiprus pilvo skausmas arba įtarimas žarnų nepažeidimams. Specialūs įspėjimai: vaista galima vartoti tik pasitarus su gydytoju, jeigu mažėja kūno svoris, kraujuoja arba anksčiau yra kraujavę iš virškinimo trakto, sutrikęs rijimas arba nuolat jaučiate nemalonų pojūtį pilve, virškinimo sutrikimų atsirado pirmą kartą arba jie neseniai pakito, sergate inkstų liga. Pacientams, kuriems nustatytas inkstų funkcijos sutrikimas, jaunesniems kaip 2 metų vaikams, senyviems pacientams bei kitoms pacientams, kuriems yra fosforo trūkumo pavojus, prieš pradėdami vartoti „Maalox“ reikia kreiptis į gydytoją. Norint išvengti perdozavimo, negalima kartu vartoti vaistinių preparatų, savo sudėtyje turinčių aliuminio hidroksido ir magnio hidroksido. Atsargumo dėlei tarp bet kokių vartojimo ar antacidinio vaisto vartojimo turi būti bent 2 valandų (vartojant fluorochinolonų – 4 valandų) intervalas. Jeigu gydymo Jums yra saikes, kad netoleruotumėte kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „Maalox“ (be cukraus) tabletes tinka cukriniu diabetu sergantiems pacientams. Teksto parengimo data: 2021 m. kovo mėn. Reklamos teksto parengimo data: 04/2021, MAI-LT-210080 V.1.0 GREITA PAGALBA NUO RĖMENS!

NUO 5^{99€}

DUPHALAC

FRUIT, 667 mg/ml, geriamasis tirpalas, 500 ml 11^{99€}

FRUIT, 667 mg/ml, geriamasis tirpalas, 20 x 15 ml 9^{99€}

667 mg/ml, geriamasis tirpalas, 200 ml / 500 ml / 1000 ml 5^{99€} / 11^{99€} / 17^{99€}

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 ml geriamojo tirpalo yra 667 mg laktuliozės (skystosios laktuliozės 667 g/l pavidalu). Terapinės indikacijos. Vidurių užkietėjimo (retai žarnų judesiai, kietos ir sausos išmatos) gydymas, sergant hemorojais, po storosios žarnos ar išangės operacijos. Kepenų encefalopatijos (kepenų liga sukelianti sumišimas, tremas, sumažėjęs sąmoningumo lygis, skaitant komą) gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas. Vartoti per burną. „Duphalac“ geriamąjį tirpalą galima vartoti atskiesta ar neatskiesta. Viena dozė reikia nuryti visą škart, ilgai nelaikant burnoje. Vieną kartą per parą vartojama dozė reikia išgerti tuo pačiu dienos metu, pvz., per pusryčius. Vartojant „Duphalac“, tiekiamą buteliuke, gali būti naudojama matavimo taurėlė. Suaugusiems žmonėms ir paaugliams pradinė paros dozė 15–45 ml, palaikomoji paros dozė 15–30 ml. 7–14 metų vaikams pradinė paros dozė 15 ml, palaikomoji paros dozė 10–15 ml. 1–6 metų vaikams pradinė paros dozė 5–10 ml, palaikomoji paros dozė 5–10 ml. Kidikiams iki 1 metų pradinė paros dozė iki 5 ml, palaikomoji paros dozė iki 5 ml. Be gydytojo nurodymo ir atidžios priežiūros vaikams (iki 14 metų amžiaus) „Duphalac“ vartoti negalima. Dozavimas esant kepenų encefalopatijai: suaugusiems pradinė dozė yra 30–45 ml geriamojo tirpalo 3–4 kartus per parą. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet pagalbinei medžiagai. Galaktosemija. Virškinimo trakto nepažeidimas arba dalinio nepažeidimo sindromas, virškinimo trakto perforacija ar perforacijos rizika, uždegiminė žarnyno liga. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti „Duphalac“, jei Jums skauda pilvą dėl nepažeidimų priežasčių, jei negalite susivirkinti pieno cukraus (laktozės), jei sergate cukriniu diabetu. Kai vartojama daug didesnė dozė hepatinei encefalopatijai gydyti, būtina atšveiginti jai, kad pacientas serga diabetu. Ilga laiką vartojant neapdirbtomis dozėmis ir netinkamai vartojant vaisto, gali pasireikšti viduriavimas ir elektrolitų pusiausvyros sutrikimai. Reikia atšveiginti jai, kad gydymo metu gali sutrikti tuštinimo refleksas. „Duphalac“ sudėtyje yra yra laktozės, galaktosės, fruktozės ir sulfitų. „Duphalac“ vartoti negalima, jei yra galaktosės arba fruktozės netoleravimas, viskas laktazės trūkumas, gliukozės-galaktosės malabsorbcija. Pacientai, netoleruojantys laktosės, laktuliozės turi vartoti atsargiai. Reklamos teksto parengimo data: 2025.06.16.

-35%

11^{43€}
173%

EPITOME SPIRIT

MELATONIN purškalas, 385 papurškimai, 50 ml

MAISTO PAPILDAS

- Purškiamą maisto papildą patogiai vartoti.
- 1 papurškime yra 1 mg melatonino.
- Sudėtyje esantis melatoninas padeda mažinti subjektyvų laiko juostų skirtumo pajautimą ir mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę².
- Su natūraliais eteriniais aliejais.
- Vietoje cukraus sudėtyje naudojami natūralūs stevijų gliukozidai.
- Be alkoholio, be konservantų, be dažiklių.

¹Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant ne mažiau kaip 0,5 mg prieš einant miegoti pirmą kelionės dieną ir kelias dienas po atvykimo į kelionės tikslą vietą.

²Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti.

-30%



AMBIO

GINKMEDŽIO EKSTRAKTAS, 150 mg, 30 tablečių 10^{48€} 7^{34€}

VITAMINAS B12, 1000 µg, 60 tablečių 11^{98€} 8^{39€}

MAISTO PAPILDAS

IKI -40%



AMBIO

NERVŲ SISTEMAI, mikstūra, 100 ml 7^{48€} 4^{49€} -40%

PATIRIANTIEMS ĮTAMPĄ, 15 kramtomųjų tablečių 5^{98€} 3^{99€} -35%

MAISTO PAPILDAS

NERVAMS, RAUMENIMS, ENERGIJAI

-25%



MAGIC MAGNESIUM™

MAISTO PAPILDAS

Jaučiatės pavargę, trūksta energijos dienos iššūkiams, norite palaukti nervų sistemos veiklą ar papildyti organizmą magniu? „Magic Magnesium™“ gali būti tai, ko ieškote, nes tabletėse yra gerai pasisavinamo magnio, kuris reikalingas daugybei organizmo funkcijų.

- „Magic Magnesium Glycinat“ – nervų sistemos veiklai palaikyti.
- „Magic Magnesium Malat“ – raumenims ir kaulams.
- „Magic Magnesium Citrat“ – nuovargiui mažinti ir energijai palaikyti.

Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą, palaikyti normalią raumenų funkciją, nervų sistemos veiklą ir energijos apykaitą.

„MAGIC MAGNESIUM™“ – LABAI GERAI ĮSISAVINAMO MAGNIO ŠALTINIS!

*Akcija taikoma geltona etiketė pažymėtos prekės.

MIEGUI IR NERVŲ SISTEMAI

-30%



NEUROMED

MAISTO PAPILDAS

Išbandykite „Neuromed Sleep FORTE“ – trejopo efekto čiulpiamąsias tabletes, kurios padės greičiau užmigti, kokybiškai išsimeigti ir iš ryto jaustis žvaliai. „Neuromed Sleep“ – greita pagalba, kad pavyktų lengviau užmigti ir ramiai miegoti. Vartoti epizodiškai, neužmiegančiam, patiriant naktį. „Neuromed Relax“ – streso kontrolei ir nervų sistemai. Vartoti jaučiant lėtinę įtampą ir stresą. „Neuromed Good Mood“ su šafranu ir kurkuminu – gerai nuotaikai, psichologinei funkcijai, nuovargiai mažinti. Vartoti patiriant ilgai užsitęsusį stresą, jaučiant nuovargį, apleidžiant pozityvioms mintims.

KARTU Į RAMYBĘ SU „NEUROMED“!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-40%

4^{79€}


RAMEVAL® 15 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Rameval“ – ramybės augalų puokštė lengvai nervinei įtampai, sukurta iš valerijonų, melisų, pipirinių mėtų, ramunėlių ir apynių. „Rameval“ padeda:
- palaikyti normalią nervų sistemos būklę (vaistiniai valerijonai),
- atsipalaiduoti (vaistinės melisos, pipirinės mėtos, vaistinės ramunės),
- palengvinti užmigimą ir palaikyti miego kokybę (vaistinės melisos, paprastieji apyniai).
IEŠKAI RAMYBĖS? ATRASK JĄ SU „RAMEVAL“.

-30%


VALERIJONŲ EKSTRAKTAS 20 mg, 50 tablečių 2⁹⁹ 1⁷⁴ €

VALERIJONAS FORTE 50 tablečių 6⁹⁹ 4⁸⁹ €

MAISTO PAPILDAS

Vaistinis valerijonas padeda atsipalaiduoti, palaiko normalią miego funkciją.

ŠIRDŽIAI, NERVŲ SISTEMAI, RAUMENIMS

-25%



DOPPELHERZ®

ACTIV MAGNIS 400 + B1 + B6 + B12 + folio rūgštis, 80 tablečių 20⁹⁹ 15⁴⁴ €

ACTIV MAGNIS 400 + B1 + B6 + B12 + folio rūgštis, 30 tablečių 10⁹⁹ 8²⁴ €

ACTIV MAGNESIUM 400 DIRECT + B6 + B12 + folio rūgštis, 20 paketėlių 11⁹⁹ 8⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAS

Tabletės su magniu, folio rūgštimi ir B grupės vitaminais. Maisto papildus „Doppelherz“ gamina viena Vokietijos farmacinių produktų gamintojų lyderių „Queisser Pharma“, todėl produktai kuriama patikrintais naujais technologijomis ir gamybos laimėjimais bei laikantis tarptautinių kokybės standartų. Maisto papildai „Doppelherz“ yra vieni perkamiausių Lietuvoje ir jau ne viena dešimtmetį garantuoja savo klientams gerą savijautą.
„DOPPELHERZ“ – VOKIŠKA KOKYBĖ, KURIA GALITE PASITIKĖTI!

6⁹⁹ €


NEURORUBINE FORTE LACTAB

20 plėvele dengtų tablečių

NERCEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg tiambio nitrato (vitamino B1), 50 mg pridokso hidrochlorido (vitamino B6), 1 mg cianokobalamino (vitamino B12). **Terapinės indikacijos.** Del B grupės vitaminų stokos atsiradusių nervų sistemos ligų gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Per parą reikia išgerti 1-2 tabletes. Vartoti per burną. Kiek laiko vartoti „Neurorubine Forte Lactab“, patars gydytojas. Vėliausiai po 4 savaitų būklė turi įvertinti gydymo. Jeigu simptomai nepagerėja, reikia kreiptis į gydytoją, kad jis parinktų kitą gydymą. Vaikų populiacijai. Saugumas ir veiksmingumas vaikams dar neįrodyti, todėl neturi būti skiriamas vaikams. **Kontraindikacijos.** Jeigu yra alergija vitaminams B1, B6 ar B12 arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu sergate žvyneline. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vaisto sudėtyje esanti didelė vitamino B6 dozė gali silpninti I-Dopos poveikį ir pabloginti Parkinsono ligą. Taip pat vitaminas B6 gali silpninti alitramino (vaisto, vartojamo vėžiui gydyti) poveikį. Kartu vartojamo izoniazido toksinis poveikis gali stiprėti. Tiosemikarbazonas ir 5-fluorouracilas, būdami tiambio antagonistai, gali trikdyti vitamino B1 poveikį. Kartu su „Neurorubine Forte Lactab“ vartojant vaistus, surišiančius skrandžio rūgštis (antacidus), pablogėja vitamino B1 pasisavinimas. **Reklamos teksto parengimo data 2024-02. NEUR-11-00008**

PALIKITE SKAUSMĄ UŽ NUGAROS!

IKI -50%



NEUROZAN

NEUROZAN, 30 tablečių 31⁹⁹ 15⁷⁵ € -50 %

NEUROZAN PLUS, 56 tablečių / kapsulės 50⁹⁹ 35³⁴ € -30 %

MAISTO PAPILDAS

NEUROZAN – platus ir subalansuotas kompleksas normaliai proteinei (pantoteno rūgštis) ir nervų sistemos (jodas, magnis, ir kt.) veiklai palaikyti. Vitaminai B1, B3 ir kt. palaiko normalią psichologinę būklę, o geležis ir cinkas – pažinimo funkciją. Sudėtyje papildyta ginkmedžių ekstraktu ir kofermentu Q10. NEUROZAN PLUS – dviguba pakutė su omega-3 nebiesiomis rūgštimis.

PAMAITINK SAVO PROTĄ!

-35%



EPITOME

MAGNESIUM BISGLYCINATE, 90 kapsulių 24⁹⁹ 16²⁴ €

MUSCULARITY SHOTS, 25 ml x 14 vnt. 29⁹⁹ 19⁴⁹ €

MEMORY FORMULA SHOTS, 25 ml x 14 vnt. 29⁹⁹ 19⁴⁹ €

MAISTO PAPILDAS

-15%



VITA B12

1000 µg, 30 pastilių 8⁹⁹ 7⁶⁴ €

+ FOLIO RŪGŠTIS, 30 pastilių 9⁹⁹ 8³² €

MAISTO PAPILDAS

Prisimink svarbiausias akimirkas! Stiprios koncentracijos, metų skonio vitamino B12 čiulpiamosios pastilės normaliai proteinei ir fizinei veiklai palaikyti. Tik 1 tabletė per dieną. Gaivaus mėty skonio. Be laktozės. Be glitimo. Be cukraus. Tinka veganams.

MULTI-B STRONG

30 tablečių 5⁴⁹ 4⁶⁷ €

100 tablečių 15⁹⁹ 13⁵⁹ €

250 tablečių 32⁹⁹ 27⁶² €

MAISTO PAPILDAS

Visi būtini vitaminai 1 tablete! Skatina normalią nervų sistemos veiklą, padeda mažinti nuovargį. Ypač rekomenduojamas žmonėms, patiriantiems didelį psichologinį ar fizinį stresą. 1-2 tabletes per dieną. Be cukraus, laktozės ir mielių. Suomiška kokybė.

IKI **-35%****AMBIO**

MAGNIS, milteliai geriamajam tirpalui, 30 paketėlių **10⁶⁸ 6⁹⁴ € -35 %**
 GUDOBELĖ SU MAGNIU, 30 kapsulių **8⁴⁸ 5⁹⁴ € -30 %**

MAISTO PAPILDAI

-40%**CITO® FERRUM**, 30 kapsulių **20²⁸ 12⁴⁷ €****MAISTO PAPILDAS**

„CITO“ ferrum[®] sudėtis pasižymi inovatyvia liposominės formos geležimi, kuri geriau pasisavinama lyginant su kitomis geležies formomis. Nėdirgina skrandžio bei neturi geležies poskonio. Geležis padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą bei normalų deguonies pernešimą organizme. Folio rūgštis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei padeda palaikyti normalią kraujodarą. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

CORDISOL

60 kapsulių **11⁹⁹ 7¹⁹ €**
 FORTE, 30 kapsulių **12⁴⁸ 7⁴⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

Esant mineralų trūkumui organizme rekomenduojama vartoti „Cordisol“, kurio sudėtyje yra 100 mg kalio ir 137 mg – magnio, bei „Cordisol forte“, kurio sudėtyje – NET 200 mg kalio ir 187,5 mg magnio!

-30% **12⁵⁹€****AMBIO**

GELEŽIS LIPOSOMOSE, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

-20%**LYSI****MAISTO PAPILDAS**

Tai nepakeičiamųjų omega-3 riebiųjų rūgščių ir vitaminų šaltinis visai šeimai. „Lysi“ žuvų taukai užtikrins Jums vitamino D paros normą ir didelį kiekį svarbiausių omega-3 riebiųjų rūgščių.

„LYSI“ – ŽUVŲ TAUKŲ EKSPERTAI IŠ ISLANDIJOS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

IKI **-40%****AMBIO**CHOLESTEROL BALANCE COMPLEX, 30 kapsulių **14³⁸ 8⁶³ € -40 %**CHOLESTEROL BALANCE COMPLEX, 90 kapsulių **29⁹⁸ 19⁴⁹ € -35 %**

MAISTO PAPILDAS

-40% **0⁸⁹€****VALIDOL**, 10 čiulpiamųjų tablečių**MAISTO PAPILDAS**

Sudėtyje esantis vaistinių valerijonų ekstraktas padeda atsipalaiduoti bei palaikyti gerą psichologinę būseną. Vartojimas: Tablete reikia laikyti po liežuviu tol kol ji visiškai ištirpsta. Vartojama po 1 tabletę 2-4 kartus per dieną.

„VALIDOL ACONITUM“ – JŪSŲ GERAI SAVIJAUTAI!**PIC MATUOKLIAI / INHALIATORIAI / TERMOMETRAI**IKI **-35%****PIC SOLUTION****MEDICINOS PRIETAISAI**

„PIC Solution“ jau daugiau nei 50 metų yra vienas žinomiausių Italijos medicinos priemonių prekių ženklų. Kiekvienas PIC sprendimas yra daugiau nei kraujospūdžio matuoklis, inhaliatorius ar termometras. Tai paprastas būdas parodyti rūpestį ir paklausti „Kaip jautiesi?“.

Savo laboratorijose kuriame pažangius prietaisus, skirtus širdies darbui ar temperatūrai stebėti. Visi prietaisai turi 5 metų garantiją ir jų tikslumas patvirtintas klinikiniais tyrimais**.

* Išskyrus termometrus, matuoklį „LiteRapid“, inhaliatorių „AirCube“.

** Taikoma kraujospūdžio matuokliams

KIEKVIENA ŠIRDIS TURI SAVO RITMĄ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-30% **7²⁰€****OMEGA 3 + VITAMINAI D IR E** 1000 mg, 60 kapsulių**MAISTO PAPILDAS**

EPA (diet. EPR – eikozapentaeno rūgštis) ir DHA (diet. DHR – dokozaheksaeno rūgštis) padeda palaikyti normalią širdies veiklą. DHR (dokozaheksaeno rūgštis) padeda palaikyti normalią smegenų funkciją, išsaugoti normalų regėjimą. Vitaminas D3 padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų, dantų ir raumenų būklę. Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidos.



SKIEPAI NUO ERKINIO ENCEFALITO

SU
LOJALUMO
KORTELE

28⁹⁹ €

SKIEPO KAINA
BE KORTELĖS

31⁹⁹ €

Galima išankstinė registracija:

- internetu www.nvaistine.lt/skiepai
- telefonu **+370 800 10 008**



Nuolaidos taikomos
su PC Norfa kortele.
Akcijos „Laimės valandos“
nuolaidos netaikomos.

NUO SLOGOS

NUO 4⁵⁰ €

OTRIVIN

0,5 mg/ml nosies lašai (tirpalas), 10 ml 4⁵⁰ €1 mg/ml nosies lašai (tirpalas), 10 ml 4⁵⁰ €1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 6²⁵ €MENTHOL, 1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 6⁷⁵ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Ksilotetazolino hidrochloridas. **Terapinės indikacijos.** Nosies gleivinės paburkimo mažinimas peršalus, sergant sinusitu, šienlige ar kitokia alergine sloga. Nosiaryklės gleivinės paburkimo mažinimas, gydyant vidurinės ausies uždegimą. Nosies ertmės apžiūros atlikimo lengvinimas. **Vartojimas.** „Otrivin“ 0,5 mg/ml nosies lašai. 2–5 m. vaikai: po 1–2 lašus į kiekvieną nosies landą 1–2 kartus per parą (kas 8–10 val.). 6–11 m. vaikai ir paaugliai: po 2–3 lašus į kiekvieną nosies landą 2–3 kartus per parą, kai reikia. „Otrivin“ 1 mg/ml nosies lašai. Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: po 1–2 lašus į kiekvieną nosies landą, kai reikia. „Otrivin Menthol“ 1 mg/ml nosies purškalas ir „Otrivin“ 1 mg/ml nosies purškalas. Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: po 1–2 purškimo į kiekvieną nosies landą, kai reikia. Negalima lašinti / puršksti daugiau kaip 3 dozių per parą į kiekvieną nosies landą. **Kontraindikacijos.** Alergija ksilotetazolinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, pacientams, kuriems neseniai buvo atlikta operacija per nosį, sergantiems uždarą kampo glaukoma (padidėjęs spaudimas akyje), lėtinio nosies uždegimo (sausumo arba atrofinio rinito). **Specialūs įspėjimai.** Negalima vartoti ilgiau kaip 7 d. iš eilės. Negalima viršyti rekomenduojamos dozės, ypač vaikams ir pagyvenusiems žmonėms. Atsargiai vartoti, jeigu yra padidėjęs kraujospūdis, širdies liga (pvz., paligėjusio QT intervalo sindromas), cukrinis diabetas, padidėjęs skydlaukės aktyvumas, padidėjusi prostata, gerybinis antinksnių auglys, jei vartojate trichilių antidepresantus, jeigu vartojate arba per pastarąsias 2 sav. vartojote vaistų nuo depresijos ar Parkinsono ligos, vadinamųjų MAOI. Labai jautriems pacientams gali sukelti miego sutrikimą, galvos svaigimą, tremorą. Sudėtyje yra benzalkonio chlorido. Teksto parengimo data 2025-02. Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi jų licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas.

NUO 4⁹⁹ €

COLDREX HOTREM

COLDREX HOTREM LEMON, 750 mg/10 mg/60 mg milteliai geriamajam tirpalui, 5 vnt. 4⁹⁹ €COLDREX HOTREM LEMON, 750 mg/10 mg/60 mg milteliai geriamajam tirpalui, 10 vnt. 8⁹⁹ €COLDREX HOTREM HONEY & LEMON, 750 mg/10 mg/60 mg milteliai geriamajam tirpalui, 10 vnt. 8⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Terapinės indikacijos: trumpalaikis peršalimo ir gripo simptomų (karščiavimo, slogos ir skausmo) lengvinimas. **Vartojimo būdas:** suberti 1 paketėlio turinį į stiklinę, pripilti karšto vandens (maždaug 125 ml), gerai išmaišyti, kol milteliai ištirps. Pagal poreikį pripilti šalto vandens. **Dozavimas:** suaugusiems (skaitant senyvo amžiaus) ir 16 m. bei vyresniems paaugliams, kurių svoris didesnis nei 54 kg: po 1 paketėlį kas 4–6 val., jei reikia. Didžiausia paros dozė: 5 paketėliai per 24 val. **Specialūs įspėjimai:** nevartokite kartu jokių kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio, ar vaistų nuo kosulio ir peršalimo, gripo ir nosies gleivinės paburkimo ar užgulios nosies. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti, jei padidėjusi prostata arba Jums sunku šlapintis; sergate kraujagyslių liga, vadinama Reino (Raynaud) fenomenu; sergate inkstų liga; yra lėtinis mitybos nepakankamumas; reguliariai vartojate alkoholi; sergate Žilberto (Gilbert) sindromu; vartojate kitų vaistų, kurie veikia kepenų funkciją; Jums trūksta fermento gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės; sergate hemolizine anemija; yra dehidratacija; esate senyvo amžiaus, saugaus ar paauglys, kurio kūno svoris mažesnis nei 54 kg; yra šlapimo susilaikymas ar šlapimo takų uždegimas; sergate astma arba Jums yra padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, pasireiškiantis bronchų spazmu; sergate sunkia infekcine liga, nes gali padidėti metabolinės acidozės rizika. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliosios arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu padidėjęs kraujo spaudimas; jeigu padidėjęs skydlaukės aktyvumas; jeigu sergate cukriniu diabetu; jeigu sergate širdies liga; jeigu sergate uždarą kampo glaukoma; jeigu sergate feochromocitoma; jeigu sergate kepenų ar sunkia inkstų liga; jeigu esate nešioja ar žindote kūdikį; jeigu vartojate vaistų, mažinančių nosies paburkimą, slopinančių apetitą, vaistų nuo peršalimo ar apetitą didinančių vaistų; jeigu vartojate vaistus depresijai gydyti, pvz., trichilius antidepresantus, beta blokatorius arba monoaminooksidazės inhibitorius (MAOI) bei dvi savaites po MAOI vartojimo; jaunesniems kaip 16 m. vaikams ir paaugliams. **Reklamos teksto parengimo data 2024-11-11.**

-30% 3^{98€}

AMBIO

GERKLEI, aviečių skonio, 20 čiulpiamųjų tablečių

MAISTO PAPILDAS

-30%



AMBIO

GERKLEI SU ISLANDINE KERPENA IR EUKALIPTU, 20 čiulpiamųjų tablečių 5⁹⁸ 4¹⁹ €GERKLEI SU ISLANDINE KERPENA IR IMBIERU, 20 čiulpiamųjų tablečių 5⁹⁸ 4¹⁹ €GERKLEI SU ISLANDINE KERPENA, purškalas, 20 ml 6⁵⁸ 4⁶¹ €

MAISTO PAPILDAS

NUO SLOGOS

5⁴⁹ €

RHINO-STAS

nosies purškalas, tirpalas, 10 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 ml nosies purškalo yra 1 mg ksilotetazolino hidrochlorido. **Indikacijos:** „Rhino-stas“ yra simpatikomimetikas. Purškalas siaurina kraujagysles, todėl mažina nosies gleivinės paburkimą. Vartojamas trumpalaikiam nosies gleivinės paburkimui mažinti, sergant sloga arba prienosinių ančių uždegimu (sinusitu). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 10 m. vaikams bei paaugliams reikia puršksti po 1 purškimo tirpalo „Rhino-stas“ į kiekvieną nosies landą 1–3 kartus per parą tada, kada reikia. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jei yra sausasis nosies gleivinės uždegimas (sausasis rinitas), pacientams, kuriems po nosį neseniai buvo atlikta smegenų operacija; jaunesniems kaip 10 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** „Rhino-stas“ galima vartoti tik atidžiai įvertinus jo vartojimo riziką ir galimą naudą šiais atvejais: pacientams, kurie vartoją ar vartoja vaistų nuo depresijos (monoaminooksidazės inhibitorių) arba kitų vaistų, kurie gali labai padidinti kraujospūdį; kai padidėjęs akispūdis, ypač sergant uždarą kampo glaukoma; sergant sunkia širdies ir kraujagyslių sistemos liga (pvz., vainikinių širdies arterijų liga, hipertenzija); sergant feochromocitoma (antinksnių naviku); sergant porfirija; sergant medžiagų apykaitos ligomis (pvz., hipertiroze, cukriniu diabetu). **Pakuotės lapelio peržiūros data 2018-10-23. Reklamos teksto parengimo data 2020-02-03.**

PURŠKALAS „RHINO-STAS“ – PIRMOJI PAGALBA SERGANT SLOGA AR SINUSITU!



IKI -40%



AMBIO

GREIPFRUTŲ SĖKLŲ EKSTRAKTAS, 50 ml 17⁹⁸ 10⁷⁹ € -40%HOT HERBAL DRINK SU ISLANDINE KERPENA, milteliai, 10 paketėlių 8⁹⁸ 6²⁹ € -30%

MAISTO PAPILDAS

-30%

IKI -40%



AMBIO

VITAMINAI D3 IR K2, 60 kapsulių 14⁹⁸ 8⁹⁹ € -40%IMUNITETUI SU EŽIUOLE, 30 tablečių 9⁹⁸ 7⁴⁹ € -25%

MAISTO PAPILDAS

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



VITADAY

ASKORBO RŪGŠTIS, 50 mg, 200 dražečių 2⁴⁸ €VITAMINAS D3 1600TV, 40 kramtomųjų tablečių 7⁹⁸ €

MAISTO PAPILDAS

Procto-Glyvenol®
tribenozidas / lidokainas

PROCTO-GLYVENOL skirtas lokaliam simptominiam vidinio ir išorinio hemorojus gydymui. Vartoti į tiesiąją žarną, po 1 žvakutę du kartus per parą arba kremu galima tepti išangės sritį du kartus per parą, ryte ir vakare tol, kol ūminiai ligos požymiai išnyks, paprastai 7-10 dienų. Po to dozė galima sumažinti ir vartoti vieną kartą per parą ne ilgiau kaip 3 savaites. Jei reikia. Vartoti draudžiama jei yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei PROCTO-GLYVENOL medžiagai. Atsargiai vartoti pacientams, sergantiems sunkia kepenų liga. Saugotis, kad nepateiktų į akis, negalima nuryti. Nerekomenduojama vartoti vaikams. Reklamos teksto parengimo data – 2024/07.

RECEPCTINIAI VAISTAI

RECORDATI

-25% **8^{09€}**
~~10^{79€}~~



AMEDIPLUS ACTIVE GEL

šaldomasis-šildomasis kūno gelis, 100 ml
KOSMETIKOS PRIEMONĖ

-20% **0^{68€}**
~~0^{85€}~~



AMEDIPLUS

pipirinis pleistras 12 x 16 cm, 1 vnt.
MEDICINOS PRIEMONĖ

NUO SKAUSMO

NUO 6^{99€}



DITEL

DITEL, 23,2 mg/g, gelis, 50 ml **6^{99€}**
DITEL, 23,2 mg/g, gelis, 100 ml **9^{99€}**

NERECEPCTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga, stiprumas: diklofenako dietilaminas, 23,2 mg/g. **Terapinės indikacijos:** skirtas suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: vietinis skausmo malšinimas, esant ūminiams patempimams ar sumušimams po buko traumos. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** reikia vartoti 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Reikia nuo vėsnios iki graikiško riešuto dydžio kiekio, atitinkantio 1-4 g gėlio. Didžiausia paros dozė – 8 g gėlio. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Ankščiau pasireiškusių padidėjusio jautrumo reakcijos, pavartojus acetylsalicilo rūgšties ar nesteroidinių vaistinių preparatų nuo uždegimo (NVPNU). Vartojimas ant atvirų žaizdų, gleivinių, jei yra odos uždegimas arba infekcija bei egzema. Vartojimas paskutinįjį nėštumo trimestrą. Vartojimas vaikams ir paaugliams iki 14 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai vartoti pacientams, kurių inkstų, širdies ar kepenų funkcija sutrikusi, taip pat pacientams, kuriems yra aktyvi skrandžio ar dvilypkapištes žarnos peptinė opa. Vartoti tik ant nepažeistos ir sveikos odos. Vengti, kad nepateiktų į akis, ir kontakto su gleivinėmis. Nenaudoti orali nepralaidžių vąsčių. Jei yra tiesioginių saulės spindulių arba dirbtinės saulės poveikis, kyla odos reakcijų pavojus. Gydymo metu ir dvi savaites po gydymo reikia vengti saulės spindulių ar dirbtinės saulės. **Reklamos teksto parengimo data 2024-04.**

NUOSPRENDIS SKAUSMUI!

NUO 4^{99€}



DICLAC

1 % gelis, 50 g **4^{99€}**

5 % gelis, 50 g **7^{99€}**

NERECEPCTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g „Diclac“ 5 % gelio yra 50 mg, 1 g „Diclac“ 1 % gelio yra 10 mg diklofenako natrio druskos. **Terapinės indikacijos:** lokaliams skausmams malšinti, uždegimui slopinti ir patinimui mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** plona „Diclac“ 5 % gelio sluoksnį tepti 2 kartus per dieną, „Diclac“ 1 % gelį tepti 3-4 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** jautrumas diklofenakui ar pagalbinėms medžiagoms, jaunesni kaip 14 m. vaikai, 3 paskutiniai nėštumo mėnesiai. **Specialūs įspėjimai:** negalima tepti burnos, nuryti. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS240335891. Teksto patvirtinimo data 2024-03-13.

STIPRUS ATKIRTIS SKAUSMUI!

NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO

NUO 2^{49€}



IBUPROM

200 mg, 10 dengtųjų tablečių **2^{49€}**

200 mg, 20 dengtųjų tablečių **4^{49€}**

400 mg, 10 dengtųjų tablečių **2^{99€}**

400 mg, 20 dengtųjų tablečių **4^{99€}**

NERECEPCTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg ir 200 mg. **Terapinės indikacijos:** skausmo (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimo mažinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Ibuprofen“, 400 mg: suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 1 tabletę 3 kartus per parą. „Ibuprofen“, 200 mg: 6-9 m. vaikams (kūno svoris 20-29 kg) gerti po 1 tabletę kas 6-8 val. (negerti daugiau nei 3 tablečių per parą); 10-12 m. vaikams gerti po 1 tabletę kas 6 val. (negerti daugiau nei 4 tablečių per parą); suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams pradine doze yra 2 tabletės, po to galima gerti po 1-2 tabletes kas 4 val. (negerti daugiau nei 6 tablečių per parą). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, ūminis skrandžio ir dvilypkapištes žarnos opaligės stadija; ankščiau buvusi alergija acetylsalicilo rūgščiai ir kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; sergant sunkiu širdies nepakankamumu; esant trečiam nėštumo trimestrai. **Specialūs įspėjimai:** vartoti nepatartina, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu, bronchu astma. Reklamos teksto parengimo data 2024.11.29.

RENKUOSI „IBUPROM“. RENKUOSI LAISVĖ.

SKAUSMUI, TINIMUI IR UŽDEGIMUI MAŽINTI

11^{99€}



DIFORTAN, 100 mg/g, gelis, 100 g

NERECEPCTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekviename „Difortan“ gelio grame yra 100 mg etofenamato. **Terapinės indikacijos:** lengvų arba vidutinio stiprumo raumenų skausmų, kraujosruvų, potrauminio skausmo, lengvo arba vidutinio stiprumo raumenų skausmo (osteoartrozės / osteoartrito), lengvo arba vidutinio stiprumo sąnarių skausmo, sinovito, (neinfekcinio) artrito, bursito, tendinito, vidutinio sunkumo su raumenų ir skeleto sistema susijusio uždegimo, t. y. potrauminės ar reumatinės kilmės, lokalus gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems kasdien 3-4 kartus per parą, 14 parų, dozės kiekis atitinka nuo 2,5 iki 5 cm išspausito gelio. **Kontraindikacijos:** vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai ar ant egzemos pažeistų paviršių, atvirų žaizdų, vietų su opomis ar pažeidimais. **Specialūs įspėjimai:** „Difortan“ negalima tepti ant gleivinių arba ant akių. Galimas padidėjęs jautrumas dėl kryžminės reakcijos su kitais uždegimus malšinčiais vaistiniais preparatais rizikos. Kontaktinės fotoalergijos rizika, todėl saugoti nuo saulės spindulių. Negalima atimesti sisteminio poveikio reikšminių galimybių, todėl pacientams, kuriems yra inkstų ar kepenų nepakankamumas, šį vaistinį preparatą reikia vartoti atsargiai. Pasitarti su gydytoju, jeigu būklė nepagerėja arba jei po 7 parų būklė pablogėja. Reklamos teksto parengimo data 2025-05-19.

ESANT HEMOROJUI

-20% **9^{58€}**
~~11^{97€}~~



MASTU 10 žvakučių

MEDICINOS PRIEMONĖS

Veikliosios medžiagos: bismuto subglatas, titano dioksidas (E771). „Mastu“ tepalas ir žvakutės yra medicinos priemonės, skirtos naudoti esant hemorojui. Jos slopina negalavimus, kurie dažnai atsiranda esant hemorojui: sudirginimą, niežulį, uždegimą, šlapinimą, skatiną žaizdos gijimą. Naudojimas: tepalo – 2-3 kartus per dieną, žvakučių – 2 kartus per dieną. „Mastu“ tepalą ir žvakutes vartoti draudžiama, jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) vienai iš sudedamųjų dalių.

PAGALBA ESANT HEMOROJUI.

Virškinimo sutrikimai atostogų metu:

kaip pasiruošti išvykai, kad netektų ieškoti vaistinės Graikijoje ar Turkijoje

Atostogų metu pasikeičia ne tik dienos ritmas, bet ir mityba, klimatas, fizinis aktyvumas – visa tai turi tiesioginės įtakos virškinimo sistemai. Būtent todėl kelionėse dažnai pasireiškia viduriavimas, vidurių užkietėjimas, pilvo pūtimas ar skrandžio skausmai. Prieš keliones gyventojai vis dažniau teiraujasi apie preparatus, galinčius apsaugoti žarnyną nuo nemalonių netikėtumų.

„Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Kristina Šnirpūnienė pastebi, kad dažniausi virškinimo sutrikimai kelionėse yra viduriavimas ir vidurių užkietėjimas.

„Vidurių užkietėjimą dažniausiai sukelia mažesnis vandens suvartojimas, pasikeitęs maistas bei mitybos režimas, ilgas sėdėjimas. Vaikams užkietėjimą gali išprovokuoti net toks paprastas dalykas kaip nepatogumo jausmas svetimame tualete – viešbutyje ar lėktuve. Todėl nuo pat pirmos kelionės dienos reikėtų kasdien gerti pakankamai vandens – apie 1,5–2 litrus per dieną, valgyti daug šviežių vaisių ir daržovių, nepersivalgyti, maitintis reguliariai“, – komentuoja ji.

Jei po kelių dienų tuštinimasis neatsistato, jaučiamas pilvo pūtimas ar pilnumo jausmas, vaistininkė rekomenduoja pavartoti švelnaus poveikio vidurius laisvinančių vaistų.

„Vaikams verčiau pasiūlyti džiovintų slyvų, šviežiai spaustų sulčių, taip pat nepamiršti duoti pakankamai vandens. Jei natūralios priemonės nepadeda, tinkamiausias pasirinkimas – laktuliozės sirupas. Patogiausia jį įsigyti vienkartinuose paketėliuose – tai ypač praktiška kelionėje“, – teigia K. Šnirpūnienė.

Kaip sustabdyti viduriavimą?

Kur kas nemalonesnė problema – viduriavimas, kurio priežastis gali būti ne tik pasikeitęs ar riebus maistas, bet ir bakterijų ar virusų sukeltas žarnyno sutrikimas. Dažniausi sukėlėjai – žarnyno lazdelė E. coli, salmonelės, rotavirusas, norovirusas ar pirmuonys. Į organizmą jie patenka kartu su vandeniu, blogai termiškai apdorotu maistu, nepakankamai nuplautais vaisiais ar daržovėmis.

„Reikėtų prieš kiekvieną valgį plauti rankas arba naudoti dezinfekcines priemones, jei nėra galimybės jų nusiplauti. Maistas turi būti gerai išvirtas ar iškeptas, vaisius ir daržoves reikėtų nulupti. Gerti tik buteliuose laikomą vandenį, vengti ledukų, nes jie gali būti pagaminti iš užteršto vandens. Ypač atsargūs turėtų būti keliaujantys po Afriką, Lotynų Ameriką, Aziją ir Turkiją“, – aiškina vaistininkė.

Ji pasakoja apie atvejį, kai vaistinėje apsilankė vaikas, po kelionės į Pietų Ameriką užsikrėtęs patogeniniu grybeliu – pasirodo, kelionės metu jis dažnai gatvėje glostė benamį kačiuką, kuris ir tapo infekcijos šaltiniu.

„Kelionėje reikėtų būti atsargesniems nei įprastoje namų aplinkoje. Rekomenduoju į kelionę pasiimti toksinus ab-

sorbuojančių vaistų, pavyzdžiui, aktyvintos anglies kapsulių, taip pat – rehidratacinių druskų maišelių, nes skysčių organizme atstatymas viduriuojant ar vemiant yra būtinas“, – pabrėžia K. Šnirpūnienė.

Ką pasiimti į kelionę?

Pasak vaistininkės, dažnas keliautojas į kelionę pasiima viduriavimą stabdančių vaistų, pavyzdžiui, loperamido. Tačiau šiuos preparatus būtina vartoti itin atsargiai – jei viduriavimą sukėlė bakterinė infekcija, jų vartojimas gali sukelti storosios žarnos išsiplėtimą. Be to, loperamidas netinka vaikams iki 12 metų ir gali būti vartojamas tik tuo atveju, jei viduriavimas trunka ne ilgiau kaip 48 valandas.

„Viduriavimo metu dažnai pakyla temperatūra, jaučiamas pilvo skausmas, todėl rekomenduoju su savimi turėti paracetamolio bei spazmus malšinančių vaistų. Kaip papildomą profilaktikos priemonę patariu vartoti probiotikus – juos galima pradėti vartoti kelios dienos iki kelionės ir tęsti visos išvykos metu. Tai padeda palaikyti žarnyno mikrofloros pusiausvyrą ir apsaugo nuo patogeninių mikroorganizmų įsitvirtinimo“, – pataria vaistininkė.

Pasitaiko, kad keliautojai „dėl viso pikto“ pasiima ir šeimos gydytojo išrašytų antibiotikų. Tačiau, jei stiprus viduriavimas ir karščiavimas tęsiasi ilgiau nei tris dienas, reikėtų ne eksperimentuoti su antibiotikais, o kreiptis į vietos gydytoją.

„Vietiniai medikai geriausiai žino tam regionui būdingus infekcijų sukėlėjus ir, atsižvelgdami į tyrimų rezultatus, gali paskirti tinkamiausią gydymą“, – akcentuoja „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė.

Ji taip pat priduria, kad kai kurie keliautojai vis dar tiki mitu, esą stiprus alkoholis apsaugos nuo infekcijų. Nors alkoholio dezinfekuojančios savybės žinomos, tačiau tinkama dozė nėra aiški, o dažnas vartojimas gali sukelti daugiau žalos nei naudos.

Gretutinės ligos

Žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu, vartojantiems vaistus nuo padidinto skrandžio rūgštingumo ar turintiems lėtinių virškinimo trakto ligų, rekomenduojama pasiimti papildomų preparatų – virškinimo fermentų ir rūgštingumą mažinančių vaistų. Fermentai vartojami valgant, ypač jei maistas riebesnis nei įprasta. Rūgštingumą mažinantys vaistai geriama vieną ar du kartus per dieną, maždaug pusvalandį prieš valgį.

„Jei refliuksas nėra pastovus ir rūgštingumą išprovokavo netinkamas maistas, galima pavartoti greito poveikio vaistų. Tačiau jei turite lėtinių virškinimo sistemos sutrikimų, prieš kelionę pasitarkite su vaistininku – jis įvertins jūsų būklę, jau vartojamus vaistus ir padės susikompaktuoti tinkamiausią kelioninę vaistinėlą“, – tvirtina K. Šnirpūnienė.

PIRK LIVOL® SINCE 1959 IR LAIMĖK!



x9
SPALVOTIEJI LAGAMINAI
Mandarina Duck
TROLLEY CABIN,
po 3 kas mėnesį



x30
Sveikatinimo rinkinių,
po 10 kas mėnesį



**Gintarinė
vaistinė**

Žaidimas galioja 2025 06 01 – 2025 08 31, fizinėse UAB „Gintarinė vaistinė“ ir UAB „Norfos vaistinė“ vaistinėse arba www.gintarine.lt perkant bent vieną bet kurį LIVOL maisto papildą. Registracijos anketa bei žaidimo sąlygos ir taisyklės rasite www.gintarine.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

VAISTINĖ

IKI **-40%**



SVEIKAŽOLIŲ ARBATOS

ČIOBRELIUS, 20 vnt. **2³⁹ 1⁷⁵ € -20 %**

GERO APETITO, 20 vnt. **2⁴⁸ 1⁴⁹ € -40 %**

GRAKŠTAUS RYTMEČIO, 20 vnt. **2³⁹ 1⁶⁷ € -40 %**

LINŲ SĖKLOS, 200 g **3⁵⁵ 2⁸⁴ € -20 %**

PELYNAS, 20 vnt. **2³⁵ 1⁷² € -20 %**

PELYNAS, 40 g **2⁰⁵ 1⁶⁴ € -20 %**

„Sveikazolių arbatos“ asortimente garantuojame kruopščiai atrinkti vaistažolių mišinius bei pavienių žolelių arbatos, svaiginančios gardžių skonių ir šildančios iš vidaus.

-30% **4⁵⁴ €**



FITOLIZIN valgomoji pasta, 100 g
MAISTO PAPILDAS

-20% **2⁰⁴ €**



AMEDIPUS nosies pleistras nuo knarkimo, 10 vnt.
MEDICINOS PRIEMONĖ

-20% **5⁰³ €**



UNDEVIT 50 dražečių

MAISTO PAPILDAS

Vitaminų A, C, E, B grupės (B1, B2, B6, B12) ir niacino, rutino, pantoteno rūgšties, folio rūgšties preparatas. Vitaminai C ir A padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo, vitaminas B1 (tiaminas) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, vitaminas B2 (riboflavinas) padeda išsaugoti normalų regėjimą, vitaminas B6 (piridoksinas) padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, vitaminas B12 (cianokobalaminas) padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją, pantoteno rūgštis padeda palaikyti normalią proteinę veiklą. **Vartojimas:** gerti po 1 dražetę per dieną po valgio. **Gaminatojas:** „Technolog“, Ukraina. **Išskirtinis platin-tojas Lietuvoje:** UAB VERATRUM PHARMA, Zaraijų g.2B, Vilnius

IMUNITETUI IR GERAI SAVIJAUTAI

-35%

NEW NORDIC
MULTIVITAMINAI

MAISTO PAPILDAI

Skandinavų bendrovės „New Nordic“ multivitaminai – tai puikiai suderinti vitaminų, mineralų, mikroelementų ir augalinių ekstraktų kompleksai imunitetui ir gerai savijautai. „Multivitamin active woman“ – moterims, besirūpinančioms gera savijauta ir grožiu. „Multivitamin active woman 55+“ – vyresnių moterų organizmo poreikiams. „Multivitamin pregnant and breastfeeding woman“ – besilaukiančioms moterims ir žindydėms. „Multivitamin active man“ ir „Multivitamin active man energy boost“ – vyrams. Nepamiršome ir mažųjų – „Mineralai kaulams“, apelsinų arba miško uogų skonio kramtomosios tabletės – kalcio, magnio ir vitamino D šaltinis augančiam organizmui. „Multi vegan GUMMIES“ – gaivaus vaisių ir uogų skonio multivitaminai guminukai imunitetui. Tinka visai šeimai, taip pat vegetarams ir veganams. Sudėtyje esantys vitaminai A, C, D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

JAUSKĖS PUKIAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-40%

7^{86€}
~~13⁴⁰~~

AMBIO

SELENAS IR CINKAS SU VITAMINAI, 90 tablečių
MAISTO PAPILDAS

-30%



EMILI žolelių arbatos

DARBINGAI DIENAI IR JAUKIAM VAKARUI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-35%

3^{24€}
~~4⁹⁸~~

AMBIO

MULTIVITAMINAI SU ŽENŠENIU, 20 tirpiųjų tablečių
MAISTO PAPILDAS

-30%



ABC VIT VITAMINAS A, 60 kapsulių ~~6⁹⁵~~ 4⁸⁹ €

OPTIC BIOLUTEINA 25, 30 tablečių ~~7⁹⁵~~ 5⁵⁹ €

MAISTO PAPILDAS

-30%

11^{08€}
~~15⁸³~~

OCHISAN, 15 g

MEDICINOS PRIEMONĖ

Akių vokų tepalas be konservantų. Padeda palengvinti tokius simptomus, kaip vokų odos niežulys, jų skausmingumas ir patinimas, susijusius, be kita ko, su išorinio miežio ir chalaziono atsiradimu. Veiklioji medžiaga sluotinių seklių medus (manuka) MGO 400+. Sluotinių seklių aliejus (manuka).

IKI -50%

FOMAN® UP SHOTS, 14 x 25 ml ~~36⁹⁵~~ 18⁵⁰ € -50 %

MAISTO PAPILDAS

Foman UP Shots – skirtas seksualiai aktyviems VYRAMS. Viename buteliuke yra koncentruotų veikliųjų medžiagų dozė pritaikyta vyrų: lytiniam potraukiui, erekcijai, pajėgumui ir energijai. Natūralų seksualinį aktyvumą ir energiją padeda palaikyti Peruvinė pipirnė (maca). Lytinį potraukį ir pajėgumą padeda palaikyti Gulsčioji ragužė. Ženšenis padeda palaikyti normalią erekcijos funkciją. Pantoteno rūgštis (vitaminas B₅) padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei padeda palaikyti normalią protinę veiklą bei normalią energijos apykaitą. Sudėtyje taurinas (natūrali amino rūgštis).

VIRŠYK GALIMYBES SU FOMAN UP SHOTS

FOMAN®, 30 kapsulių ~~15⁹⁹~~ 10³⁹ € -35 %

MAISTO PAPILDAS

„Foman“ – maisto papildas, skirtas 3 pagrindinėms vyriškosios funkcijos: **prostato, šlapimo sistemos, reprodukcinė**. Išskirtinė „Foman“ sudėtyje yra 4 kompleksškai veikiantys elementai: gulsčiųjų serenojų vaisių ekstraktas padeda palaikyti šlapimo ir reprodukcinę funkcijas, didžiųjų dilgėlių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią prostatos funkciją; fermentas proteazė padidina vyro mitybą; organinė seleno forma, padeda palaikyti normalią spermatogenezę. Rekomenduojama suaugusiems gerti po 1-2 tabletes per dieną ne valgio metu.

„FOMAN“ – TECHNISKAI TVARKINGAM VYRUI.



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!**EPITOME CARE**BEAUTY MARINE COLLAGEN, 30 pakelių 49⁹⁸ €**MAISTO PAPILDAS**

- Didelės aktyviųjų medžiagų dozės 1 pakelyje:
 - 12 200 mg I tipo kolageno, išgaunamo iš žuvų;
 - 50 mg hialurono rūgšties;
 - 5 000 µg biotino;
 - 136 mg natūralaus vitamino C iš kraštuotųjų maltųjų vaisių sulčių.
- Sudėtyje esantis biotinas padeda palaikyti normalią plaukų ir odos būklę.
- Braškių ir rabarbarių skonio tirpius miltelius malonu ir patogiu vartoti.
- Be cukraus, su natūraliu stevijų saldikliu.

-35%

5^{19€}
~~7⁹⁸~~**AMBIO**VITAMINAS E, 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

-40%

6^{89€}
~~11⁴⁸~~**AMBIO**ANTIOKSIDANTŲ KOMPLEKSAS, 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

-40%

6^{29€}
~~10⁴⁸~~**AMBIO**LAKTO-BIFIDOBAKTERIJŲ KOMPLEKSAS FORTE, milteliai, 10 paketėlių
MAISTO PAPILDAS

-20%

**AMEDIPLUS**

Tamprūs pleistrai, 7 x 2 cm, 10 vnt. 1⁶⁹ 1³⁵ €

Tamprūs pleistrai, 7 x 2 cm, 200 vnt. 28⁰⁰ 16⁰⁰ €

Tamprūs pleistrai, 7 x 3,8 cm, 200 vnt. 28⁰⁰ 22⁴⁰ €

Pleistrų rinkinys šeimai, 20 vnt. 4⁴⁵ 3⁵⁶ €

ULTRA SENSITIVE pleistrai, 10 vnt. 3⁴⁵ 2⁷⁹ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

-35%

**EPITOME VITAL**

ZINC BISGLYCINATE, 25 mg, 90 kapsulių 24⁹⁸ 16²⁴ €


SELENIUM, 200 µg, 90 kapsulių 19⁹⁸ 12⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAS

-30%


3^{14€}
~~4⁴⁸~~**VITADAY**RUTINAS SU VITAMINU C, 60 tablečių
MAISTO PAPILDAS

-30%

5^{59€}
~~7⁹⁸~~**VITADAY**RIBOKSINAS, 50 tablečių
MAISTO PAPILDAS

AMBIO®

Vaistininų atrinkti
maisto papildai
geresnei tavo versijai



Maisto papildai

-35%**3^{43€}****AMBIO**VIRŠKINIMUI, 20 tablečių
MAISTO PAPILDAS**1+1**Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!**AMBIO**MULTIVITAMINAI SU ELEUTEROKOKU, 30 tablečių **13^{48€}**
MAISTO PAPILDAS**1+1**Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!**AMBIO**REGĖJIMUI FORTE, 30 kapsulių **14^{98€}**
MAISTO PAPILDAS**1+1**Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!**VITADAY**MULTIVITAMINŲ KOMPLEKSAS, 60 tablečių **12^{98€}**
MAISTO PAPILDAS**ALERGIJOS SIMPTOMAMS LENGVINTI****4^{49€}****BILASTINE STADA, 20 mg, 10 tablečių****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje tabletėje yra 20 mg bilastino. **Terapinės indikacijos:** vartojamas šienligės (kuriai būdingi simptomai yra čiaudulys, niežulys, sloga, užgulta nosis, paraudusios ir ašarojančios akys) ir kitų alerginės slogos formų simptomams lengvinti. Taip pat gali būti vartojamas niežtinėms odos bėrimams (pūkslės, dilgėlinė) gydyti. Skirtas suaugusiems ir 12 m. bei vyresniems paaugliams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** rekomenduojama dozė yra 1 tabletė per parą. Tabletę reikia nuryti nevalgius, 1 val. prieš valgį arba sulčių gėrimą, arba praėjus 2 val. po valgio arba sulčių gėrimo. Nuryti tabletę užsigeriant stikline vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** esant vidutinio sunkumo arba sunkiam inkstų funkcijos sutrikimui, jei vartojami kiti vaistai (pvz., ketokonazolas, eritromicinas, diltiazemas, ciklosporinas, rifonaviras, rifampicinas), reikia vengti vartoti kartu su bilastinu. Reklamos teksto parengimo data 2024-12.

NUO ALERGIJOS**7^{99€}****ALLERGODIL**

0,1 % nosies purškalas (tirpalas), 10 ml

0,05 % akių lašai (tirpalas), 6 ml

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Allergodil“ 0,1% nosies purškalas (tirpalas). 1 ml tirpalo yra 1 mg (0,1 %) azelastino hidroklorido. **Terapinės indikacijos.** Simptominis nuolatinės alerginės slogos arba sezoninės alerginės slogos (šienligės) gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems ir vyresniems kaip 6 metų vaikams į kiekvieną nosies landą du kartus per dieną reikia įpurkšti po vieną išpurkimą. Jaunesniems kaip 6 metų vaikams vartoti nerekomenduojama. Vartoti į nosį. Pūrkiant vaistinio preparato į nosį, galvą reikia laikyti tiesiai. Vaistas tinka ilgalaikiam gydymui. Nepasitarus su gydytoju nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 4 savaites. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas azelastinui ar pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vaistas neskirtas vartoti į akis. Vengti kontakto su akimis. Vartojant su alkoholiu, gali pasireikšti papildomas budrumo sumažėjimas. **„Allergodil“ 0,05 % akių lašai (tirpalas).** Viena lašė yra 0,015 mg azelastino hidroklorido. 1 ml tirpalo yra 0,5 mg azelastino hidroklorido. Sudėtyje yra benzalkonio chlorido. **Terapinės indikacijos.** Simptominis suaugusiųjų ir vyresnių nei 4 metų vaikų sezoninio alerginio konjunktyvito gydymas ir profilaktika. Simptominis suaugusiųjų ir vyresnių nei 12 metų vaikų nuolatinio alerginio konjunktyvito gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Abiems indikacijoms dozė yra vienas lašas į kiekvieną akį du kartus per dieną. Paėmimo metu – iki 1 lašo į kiekvieną akį 4 kartus per dieną. Gydymo ciklas neturėtų viršyti 6 savaičių. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas azelastinui ar pagalbinėms medžiagoms, negalima vartoti jaunesniems kaip 4 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Allergodil“ nėra skirti akių infekcinėms ligoms gydyti. Prieš lašų vartojimą kontaktiniai lęšiai turi būti šimti ir prieš įsidedant juos atgal reikia palaukti mažiausiai 15 min. Reklamos teksto parengimo data: 2023 04. ALL-2023-0069.

NUO ALERGIJOS**5^{49€}****CLARITINE 10 mg, 10 tablečių****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 10 mg loratadino. **Terapinės indikacijos:** alerginės slogos (pvz., šienligės) simptomų (čiaudulys, sloga, nosies ir akių niežulio bei peršėjimo) lengvinimas; lėtinės dilgėlinės sukelto odos niežulio, paraudimo ir pūkslių mažinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 6 m., kurie sveria daugiau nei 30 kg, gerti po 1 tabletę 1 kartą per parą su maistu ar be jo, užgeriant stikline vandens. Jaunesniems kaip 6 m. vaikams arba sveriantiems mažiau negu 30 kg tablečių vartoti nerekomenduojama. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jei sergate kepenų liga, prieš pradėdami vartoti vaistą pasitarkite su gydytoju. Nevartokite „Claritine“ 2 dienas iki numatomų alerginių odos mėginių. Nėštumo metu „Claritine“ geriau nevartoti. Loratadino patenka į motinos pieną, todėl žindymams vartoti nerekomenduojama. Sudėtyje yra laktozės. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024-06. CH-20240603-131 Informacija trumpinti.

7^{99€}**NASOMETIN**

50 mikrogramų/dozėje nosies purškalas, 60 dozių

NERECEPTINIAI VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje išpurškiamoje dozėje yra 50 µg mometazono furoato. **Terapinės indikacijos:** vaistas skirtas anksčiau gydytojo diagnozuoto suaugusiųjų sezoninio alerginio rinito simptomams gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** 2 įpurškimai į kiekvieną nosies landą 1 kartą per parą, vėliau – po 1 įpurškimą į kiekvieną nosies landą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, neišgydyta vietinė nosies gleivinės infekcija ar neužgijusi žaizda po nosies operacijos ar traumos. **Specialūs įspėjimai:** kvėpavimo takų tuberkuliozė arba kita infekcija. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2403156094. Teksto patvirtinimo data 2024-03-13.

KANKINIA ALERGINĖ SLOGA? METAS TAI PAKESTI!

IKI **-40%**



DAILEE įklotai, paklotai, sauskelnės
HIGIENOS PRIEMONĖS
„DAILEE“ – PATIKIMAS PASIRINKIMAS ARTIMOJO SLAUGAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė – NEMOKAMA!!



TEPE dantų pastos

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

- Kūdikiams, vaikams, suaugusiems.
- Kasdieniai ir esant jautriai burnai.
- Sveikatos metų skonio arba beskonės.
- Be SLS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

DANTŲ PROTEZŲ KLIIJAI

-30%

9^{79€}
~~13^{99€}~~



BLEND-A-DENT

ORIGINAL, 2 x 47 g

FRESH, 2 x 47 g

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Fiksuojamasis dantų protezų kremas „Blend-a-dent“ – puikus pasirinkimas, jei nenorite galvoti apie savo protezus. Nesvarbu, ką darote ar valgo, galite pasitikėti savimi, nes dantų protezai savo vietoje laikosi tvirtai ir patogiai. „Blend-a-dent“ suteikia stiprią fiksiaciją visą dieną, užtikrina komfortą, sukurdamas pagalvėlę tarp dantų protezų, ir apsaugo nuo maisto dalelių patekimo po protezais. Galite atsipalaiduoti ir mėgautis gyvenimu nesivarždami.

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė – NEMOKAMA!!



COREGA

MAX FIXATION + CONTROL fiksuojamasis dantų protezų kremas, 40 g **8^{99€}**

MAX FIXATION + COMFORT fiksuojamasis dantų protezų kremas, 40 g **8^{99€}**

ULTIMATE, dantų protezų fiksuojamasis kremas, 40 g **8^{99€}**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Naudokite COREGA dantų priežiūros priemones kasdien, kad drąsiai galėtumėte valgyti, juoktis ir kalbėti. Corega pilnų/dalinių dantų protezų fiksuojamieji kremo suteikia trigrubą naudą: ypač stiprią fiksiaciją visą dieną, apsaugo nuo maisto dalelių patekimo bei komfortą. Be cinko, todėl tinka kasdieniam naudojimui.

INTYMIAI HIGIENAI

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė – NEMOKAMA!!



LACTACYD

LACTACYD CLASSIC, prausimosi losjonas, 200 ml **11^{99€}**

PHARMA ANTIBACTERIAL, intymios higienos prausiklis apsaugai nuo bakterijų, 250 ml **14^{95€}**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Lactacyd“ intymios higienos prausikliai, skirti kasdieniai intymių zonų priežiūrai. Paprasta naudoti vonioje ar duše. Nuo pirmųjų mėnesinių iki menopauzės. „Lactacyd“ siūlo visą asortimentą intymios higienos prausiklių, kad kiekvieną dieną būtumėte žvali ir jaustumėtės patogiai. „Lactacyd“ gaminiai turi tinkamą pH ir palaiko natūralią makšties rūgštumą. Jie yra švelnūs, be muilo ir tinkami naudoti kasdien. Produktai yra su natūralia pieno rūgštimi. Natūrali pieno rūgštis skatina gerųjų bakterijų dauginimąsi jūsų intymiose vietose ir padeda išsaugoti natūralią makšties floros rūgštumą.

-25%



CURASEPT ADS

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Curasept ADS priemonių išskirtinumas – vienintelė pasaulyje patentuota ADS sistema – formulė, kuri patikrins, kad Jūsų natūralių dantų spalva ir burnos receptorių veikla chlorheksidino preparato naudojimo metu nepakistų. Curasept ADS chlorheksidinas pasižymi itin stipriomis antibakterinėmis savybėmis, efektyviai naikina pavojingas bakterijas, taip užkirsdamas kelią ir apnašų deimui. Curasept ADS produkto sudėtyje nėra alkoholio, SLS, tad išvengsite burnos ertmės sausėjimo, skilėjimo bei dirglumo pojūčių. Curasept ADS sukurta ir subalansuota gingivitui, periodontitui mažinti, kraujaujančioms dantenoms gydyti. Taip pat skatina burnos audinių gijimą prieš ir po intensyvių burnos higienos ar kitų sudėtingų stomatologinių intervencijų. Tikime, kad sveikas kūnas bei turingas gyvenimas, pirmiausia prasideda nuo sveikos burnos bei spindingos šypsenos. Mes ne tik kalbame apie unikalumą, mes jį jau sukūrėme. Tu to dar nežinai, bet tai geriausia, kas galėjo nutikti tavo dantims...

PIRMI, NES MUMS RŪPI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



SKENUOKITE QR KODĄ IR
NORFOS VAISTINĖS
LEIDINIUS VARTYKITE
TELEFONE.





ŽIEDĖ

VAISTINĖJE SUKURTA KOSMETIKA





Sausai odai

IKI **-30%****BIODERMA**

ATODERM

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Sausai odai būdingas tempimo pojūtis ir elastingumo trūkumas, šie simptomai kartais pasireiškia kartu su niežėjimu ir pleiskanojimu. „Bioderma“ sprendimas: „Atoderm“ – produktų linija, skirta sausai, labai sausai ar atopiškai odai, naudojama kasdien ir kartu su atopinio dermatito gydymu... Asortimente yra visi būtini produktai, skirti švelniai ir minkštai odai! Po dušo atsiveikink su sausa ir niežtinčia oda!

„NAOS“ EKOBIOLOGIJA – DERMATOLOGIJOS ESMĖ


**1+1**Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!**BIODERMA**SENSIBIO H₂O micelinis valomasis vanduo, jautriai odai, 100 ml **8⁹⁹ €****KOSMETIKOS PRIEMONĖ**

„Sensibio H₂O“ yra pirmasis „Bioderma“ makiažą pašalinantis micelinis valomasis vanduo, sukurtas net ir pačiai jautriausiai odai. Micelinis vanduo yra sudarytas iš mišelių – ypatingų mikrodalelių, kurios savo sudėtimi yra artimos mūsų odos ląstelių biologijai, todėl yra puikiai toleruojamas.

- „Sensibio H₂O“ švelniai valo veidą ir akis, pašalina visų tipų makiažą (fiziologinis pH).
- Natūralios cukrus mažina nemalonius odos pojūčius, ląstelių žalą ir gali užkirsti kelią uždegiminiams procesams (ramnozė, manitolis, ksilitolis).
- Sudėtyje esantis agurkų ekstraktas atgaivina odą.
- Neužkemša porų.
- Be alkoholio.
- Be pridurtinių kvapiųjų medžiagų.
- Tinka kasdieniam naudojimui.

„NAOS“ EKOBIOLOGIJA – DERMATOLOGIJOS ESMĖ

Svorio kontrolei

**-40%****TALIJA S**, 30 tablečių **15⁴⁹ 9²⁹ €****MAISTO PAPILDAS**

„Talijs S“ – subalansuotas augalinį medžiagų derinys, norintoms turėti gražias kūno linijas. Šio maisto papildas sudėtyje esantis gvaraninių pailniųjų ir kambodžinių garcinijų vaisių ekstraktai padeda palaikyti normalų kūno svorį. Tikrųjų imbierių šaknų ekstraktas padeda palaikyti tonusą, energingumą ir mažinti nuovargį, o chromas – palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Cholinis padeda palaikyti normalią lipidų apykaitą. Vartojimas: gerti po 1 tabletę 2 kartus per dieną 30 min. prieš valgį užgeriant stikline vandens.

DAILU. ŽAVU. GRAKŠTU**-30%****ISEREN CR**, 30 tablečių **15⁹⁹ 11¹⁹ €****MAISTO PAPILDAS**

Maisto papildas su gauruotosios sojos ekstraktu, kuriame gausu natūralių izoflavonų. Vartojimas: po vieną tabletę per dieną.

IKI **-35%****AMBIO**BIOTINAS, 100 kapsulių **15⁷⁸ 10²⁶ € -35 %**GROŽIUI SU KOLAGENU, 60 kapsulių **19⁹⁸ 13⁹⁹ € -30 %****MAISTO PAPILDAI**IKI **-50%****AMBIO**MULTIVITAMINAI MOTERIMS PLUS, 60 tablečių **17⁴⁸ 10⁴⁹ € -40 %**NAKVIŲ IR AGURKLIŲ ALIEJUS, 60 kapsulių **17²⁸ 11²³ € -35 %**INOCYCLE COMPLEX, milteliai geriamajam tirpalui, 30 paketėlių **27⁹⁸ 13⁹⁹ € -50 %****MAISTO PAPILDAI**Natūralus
bakterinės
vagininės
simptomų gydymas**13⁹⁷ €****CANESBALANCE** makšties ovulės, 7 vnt.**MEDICINOS PRIEMONĖ**

„Canesbalance“ veiksmingai mažina dėl bakterinės vaginozės atsiradusį nemalonų kvapą, neįprastą išskyras ir nemalonius pojūčius intymioje zonoje. Natūralios gydymosi medžiagos (pieno rūgštis ir gliukogenas) atkuria normalią šarmų ir rūgščių pusiausvyrą (pH), makšties mikroflorą. „Canesbalance“ tinka ir nėščiosioms. Be konservantų. Be hormonų. Be kvapiųjų medžiagų. Reklamos teksto parengimo data 2023-12. CH-20231222-38


14⁹⁹ €**LENOSTELLA** 1,5 mg tabletė**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veiklos medžiagos, stiprumas: vienoje tabletėje yra 1,5 mg levonorgestrelis. **Terapinės indikacijos:** skubioji kontracepcija, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms po nesaugaus lytinio akto. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vieną tabletę reikia išgerti kiek galima greičiau, geriausia per 12 valandų ir ne vėliau kaip per 72 valandas po nesaugio lytinio santykio. **Kontraindikacijos:** jautrumas levonorgestrelui arba pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** nevartoti kol nebūvo pirmųjų mėnesinių. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. **El.pastas:** info.lithuania@sandoz.com. B52403536093. **Teksto patvirtinimo data:** 2024 03 13.

SOS TABLETĖ – PĖDADE IŠVENGTI NĖSTUMO PO NESAUGAUS LYTINIO AKTO



MAŽYLIUI IR MAMAI



AMBIO KIDS

IMMUNITY COMPLEX, 100 ml ~~12⁹⁸ 779 €~~ -40 %
BRONCHO COMPLEX, 150 ml ~~7¹⁸ 503 €~~ -30 %
MAISTO PAPILDAS

IKI **-40%**

Moterims



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

DIFOLIN

DIFOLIN, 60 tablečių **9⁵⁹ €**
DIFOLIN+, 30 kapsulių **18⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

„Difolin+“ – moters gerai savijautai: hemoglobinui, energijai, nervams, imunitetui. Mikroapskuluota liposomose geležis + folio rūgštis + vitaminai B12, D3, C + varis. „Difolin+“ sudėtyje naudojama mikroapskuluota liposomose geležis yra efektyviai pasisavinama organizmo, neturi geležies poskonio, nedirgina virškinimo trakto, neturi sąveikos su maistu. Geležis, folio rūgštis, vitaminas B12 – vieni būtinausių kraujo gamybai elementų. Vitaminas B12 padeda palaikyti normalią raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, geležis – hemoglobino susidarymą, foliatai – kraujodarą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, varis – nervų sistemos veiklą, geležis, varis, vitaminai C, B12 – energijos apykaitą. „Difolin+“ – planuojančioms pastoti, nėščioms, žindančioms moterims: folio rūgštis + vitaminas D3. Folio rūgštis padeda palaikyti normalią kraujodarą, mažinti nuovargį. Mažas foliatų kiekis nėščiosios kraujo eritrocituose yra besivystančio vaisiaus nervinio vamzdelio defektų rizikos veiksnys. Teigiama poveikis atsiranda per parą papildomai suvartojant 400 µg folio rūgšties ne trumpiau kaip vieną mėnesį iki pastojimo ir iki trijų mėnesių po jo. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, dalyvauja ląstelių dalijimosi procese. „DIFOLIN“ – MAISTO PAPILDAS MOTERIMS.



AMBIO

KIDS VITAMINAS C, 60 guminukų **14²⁰ 923 €**
MAISTO PAPILDAS

-35%

Temperatūrai mažinti ir skausmui malšinti



NUO **4⁵⁰ €**

IBUGARD

100 mg/5 ml geriamoji suspensija, 120 ml **4⁵⁰ €**
200 mg/5 ml geriamoji suspensija, 100 ml **7⁷⁵ €**

NERCEPTINAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: **5 ml IBUGARD 100 mg/5 ml** geriamosios suspensijos yra 100 mg ibuprofeno. 5 ml **IBUGARD 200 mg/5 ml** geriamosios suspensijos yra 200 mg ibuprofeno. Terapinės indikacijos. Įvairios kilmės karščiavimas, įvairios kilmės silpno ir vidutinio stiprumo skausmo, tokio, kaip virusinės ar kitokios infekcijos sukeltos galvos, gerklės ir raumenų skausmo; sąnarių ir kaulų skausmo; pooperacinio skausmo; danties skausmo, galvos skausmo, ausies skausmo, esanti vidurinės ausies uždegimui, mažinimui. Vartojimo būdas ir dozavimas: nustatant ibuprofeno dozę, reikia atsižvelgti į paciento kūno svorį ir amžių. Paprastai vienkartinė ibuprofeno dozė yra 7-10 mg/kg kūno svorio, maksimali paros dozė yra 20-30 mg/kg kūno svorio. Dozė galima kartoti kas 6-8 valandas, tarp dozių turi būti ne mažesnis nei 4 valandų intervalas. Tik trumpalaikiam vartojimui. Kontraindikacijos: Padidėjęs jautrumas ibuprofenui, aspirinui ar kitam nesteroidiniam vaistui nuo uždegimo (NVNU), arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei sergate ar sirgote skrandžio ir (arba) dvylikapirštės žarnos opa ar kraujavimu iš virškinamojo trakto; sergate sunkiu kepenų, širdies ar inkstų funkcijos sutrikimu. Yra polinkis ir kraujavimui. Specialūs įspėjimai: specialų atsargumo priemonių reikia, jei inkstų, kepenų ar širdies funkcija yra sutrikusi, sutrikęs kraujo krešėjimas arba vartojami antikoagulantai; sergama cukriniu diabetu, raudonoja vilkligė, krono liga, opiniu kolitu, hipertenzija, astma, šienlige, yra nosies polipų ar lėtinių infekcinių kvėpavimo takų ligų. Teksto pakeičimo data 2024 01 mėn.



INFACOL

geriamoji suspensija, 50 ml **7⁹¹ 638 €**

MEDICINOS PREKĖ

Simetikonas 40 mg/ml. **Terapinės indikacijos:** „Infacol“ geriamoji suspensija skirta sumažinti kūdikių pilvuko diegliams ir vidurių skausmams. Skausmo ir dieglių priežastis – kūdikio žarnyne susikaupę maži dujų burbuliukai. „Infacol“ padeda pašalinti susikaupusius dujoms. Suspensiją galima skirti naujagimiams ir vyresniems vaikams. Esant pilvuko pūtimui, suspensiją galima vartoti ilgai – tiek, kiek reikia. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** prieš vartojimą gerai suplakite buteliuko turinį. Pilnai pripildykite vieną lašintuvą, paspausdami du kartus gumini balionėlį. Suspensijos perteklių nubraukite atgal į buteliuką. Norėdami sugirdyti suspensiją, paspauskite lašintuvo balionėlį ir sulašinkite „Infacol“ suspensiją kūdikiui ant liežuvio. Buteliuke yra iki 100 suspensijos dozių. Vieną pilną lašintuvą (0.5 ml) suspensijos sugirdykite kūdikiui prieš kiekvieną maitinimą. Jei būtina, dozę laikinai galima padidinti iki dviejų pilnų lašintuvų (1 ml). Norint pasiekti geresnių rezultatų, „Infacol“ reikėtų vartoti keletą dienų. **Įspėjimas:** simetikonas yra inertiška medžiaga, kurios kūdikio organizmas neabsorbuoja. Ji išsiskiria iš organizmo nepakitusi. „Infacol“ šalutinio poveikio reiškiniai iki šiol nėra žinomi. Metilo ir propilo hidroksibenzoatai gali sukelti alerginę reakciją (galbūt paveldimą). Jei manote, kad Jūsų kūdikis galėtų būti alergiškas kuriai nors iš sudedamųjų dalių, prieš duodami kūdikiui „Infacol“, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. **MAŽŲ PILVELIŲ DRAUGAS!**

-20%

IKI **-40%**



PREGNACARE

MAISTO PAPILDAS

„Pregnacare“ – maisto papildų linija, sukurta mitybai papildyti planuojant nėštumą, nėštumo bei žindymo laikotarpiais. „Pregnacare Conception“ sukurta planuojančioms nėštumą. „Pregnacare“ – vitaminų ir mineralų kompleksas, rekomenduojamas nuo pirmojo nėštumo mėnesio. „Pregnacare Plus“ papildyta omega-3 riebiųjų rūgštimis (DHR ir EPR). „Pregnacare Breast Feeding“ pritaikyta žindymo laikotarpiui, sudėtis papildyta kalciumu ir omega-3. „Pregnacare New Mum“ sukurta mamų gyvei ir energijai palaikyti.

TVIRTAI KŪDIOKUI IR MAMYTĖS DRAUGYSTEI!

*Kai kuriai taikoma geltana etiketė pažymėtomis prekėms.

Pasiūlymai galioja **2025 07 01 – 2025 07 31**.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Nuolaidos taikomos prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą sąrašą. Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį/informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Daugiau informacijos NORFOS vaistinėje, tel. +370 800 10008, www.nvaistine.lt. MAŽYLIUI IR MAMAI skirtas prekes ypatingomis kainomis greičiau ir patogiau užsisakykite internetinėje vaistinėje www.nvaistine.lt. Užsisakius prekių (išskyrus vaistinius preparatus) už 29 € ir daugiau – pristatymas NEMOKAMAS! Reklaminių tekstų parengimo data – 2025 06 19.



GAMINAME VAISTUS PAGAL INDIVIDUALIUS RECEPTUS

- Atneškite gydytojo receptą iki 13 val.
- Atsiimkite pagamintą vaistą kitą darbo dieną.



VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS



LAIMĖS VALANDOS

Darbo dienomis ir šeštadieniais
8-9 val. ir 14-15 val.*

Sekmadieniais
14-15 val.*



-30%

Perkant 3**
ir daugiau
prekių

-25%

Perkant
2* prekes

-20%

Perkant
1 prekę

**nereceptiniams vaistams -25%
receptiniams vaistams -20%

* vaistams -20%

Nuo 2023 m. spalio 23 d. NORFOS vaistinėje akcijos LAIMĖS VALANDOS metu perkant 1 prekę taikoma 20 % nuolaida, perkant 2 prekes – 25 % nuolaida, vaistams – 20 % nuolaida, o įsigyjant 3 ir daugiau prekių – 30 % nuolaida, nereceptiniams vaistams – 25 %, receptiniams – 20 % nuolaida.

Taikomos momentinės 20 % dydžio nuolaidos receptiniams vaistams, 20 ar 25 % nuolaidos nereceptiniams vaistams ir vaistiniams preparatams, o kitoms prekėms – 20, 25 arba 30 % nuolaidos, atsižvelgiant į atitinkamo pirkimo metu įsigyjamų prekių bendrą kiekį. Nuolaida taikoma perkant pilnas prekių pakuotes, kurių kiekvienos vertė arba priemoka ne mažesnė nei 1,50 euro. Prekės, perkamos su kompensuojamuoju receptu, įskaičiuojamos į įsigyjamų (perkamų) prekių krepšelį (kiekį), tačiau joms nuolaida netaikoma.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaidos netaikomos perkant su kompensuojamuoju receptu, mokant už skiepus, taip pat pradinio maitinimo pieno mišiniams, kartiniams (gaminamiems vaistinėje) ir vardiniam vaistams, įsigyjant dovanų kuponus, pakavimo maišelius. Nuolaidos netaikomos perkant www.gintarine.lt, net jei už prekes atsiskaitoma jais atsiimant vaistinėse. Nuolaidos netaikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Visos nuolaidos galioja tik su PC NORFA lojalumo kortele.

Informaciją apie kitu nei nurodyta laiku vykstančias LAIMĖS VALANDAS rasite www.nvaistine.lt. Informacija apie kitas akcijas ir prekes, kurioms netaikomos akcijos LAIMĖS VALANDOS nuolaidos, suteikiama kiekvienoje vaistinėje, el. paštu info@nvaistine.lt arba nemokamu tel. 8 800 10008.

NVAISTINĖ
VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS