

TOP RUGPJŪČIO PASIŪLYMAI



-50%



AMBIO
KEPENIMS SU MARGAINIU FORTE, 30 kapsulių **9⁹⁹ 4⁶⁰ €**
MAISTO PAPILDAS

-50%



AMBIO
HYPOTONIC DRINK, uogų skonio, 20 tirpiųjų tablečių **5⁴⁶ 2⁷⁴ €**
MAISTO PAPILDAS

-50%



ACONITUM
B TOTAL + MAGNE, 60 kapsulių **12⁹⁹ 6³⁰ €**
B COMPLEX, 40 kapsulių **14²⁹ 7¹⁵ €**

MAISTO PAPILDAS
„B total + magne“ sudėtis praturtinta ir magniu, kuris padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją bei normalią raumenų funkciją ir padeda mažinti nuovargį. Pakuotėje yra 2 mėnesių kursas. „B complex“ – tai įvairių, gerai subalansuotų B grupės vitaminų derinys, kuris padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą padeda vitaminai B2, B6, B12. Normalią odos būklę padeda palaikyti vitaminai B2, biotinas ir niacinai, o normalią plaukų būklę – biotinas. Normalią protinę veiklą padeda palaikyti pantoteno rūgštis.

-50%



BEOTEBAL® PLUS PLAUKAMS, ODAI, NAGAMS, 30 +10 tablečių **33⁹⁹ 16⁹⁸ €**
MAISTO PAPILDAS
„Beotebal“ PLUS plaukams, odai, nagams“ rekomenduojamas kasdienė plaukų, odos ir nagų būklės bei išvaizdos priežiūra. Ypač tinkamas laikotarpiu, kai plaukus, odą ir nagus veikia aplinkos veiksniai (saulė, vanduo, vėjas, šaltis, sniegas, lietus) ar po intensyvių kirpyklos procedūrų (pvz.: dažymo, tiesinimo, džiovimo) ir kosmetinių nagų procedūrų. Sudėtyje yra originalus koncentruotas „NutriAminoBiotinum“ kompleksas, kuriame yra daug aminorūgščių, mineralų ir vitaminų – įskaitant biotiną ir natūralų silicį, turintį naudingą poveikį plaukams, odai ir nagams. Gaminys nėra glitimo ir laktozės. Tinka vegetarams ir veganams.
GRĖŽIO FORMULĖ TAVO PLAUKAMS, ODAI IR NAGAMS!

NUO **2⁹⁹ €**

HJERTEMAGNYL

150 mg, 30 plėvele dengtų tablečių **2⁹⁹ €**
150 mg, 90 plėvele dengtų tablečių **4⁹⁹ €**
75 mg, 100 plėvele dengtų tablečių **3⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: 1 tabletė yra 75 mg arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties. **Indikacijos:** trombozės profilaktika, sergant širdine širdies liga, po miokardo infarkto, širdinio smegenų insulto ar praeinančiojo smegenų išemijos (kraujotakos sutrikimo) priepuoliu. Vaistas slopina trombocitų (kraujo plokštelių) agregaciją (sukibimą), todėl jo vartojama krešulių, susidariusių iš sukibusių kraujo plokštelių, atsiradimo rizikai mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną, užsigeriant stikline vandens; įprastinė dozė ilgalaikiam vartojimui yra 75–150 mg vieną kartą per parą. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, padidėjęs jautrumas kitiems salicilatams; jei neseniai kraujavo į virškinamąjį traktą; yra polinkis į kraujavimą; ūminė pepsinė opa, sunkūs inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, šlapime padidėję oksalatai, jeigu yra trys paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas; vaikams ir paaugliams, jauniems kaip 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai vartoti, jei pacientas serga bronchu astma, šienlige, nosies polipais ar kita lėtine kvėpavimo takų liga, gydymui atspina hipertenzija, podagra, esant gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stokai, sutrikusiai kepenų ir (ar) inkstų arba virškinimo trakto funkcijai, ilkus 10 parų iki chirurginės operacijos, senyvo amžiaus pacientams nepalartina ilgai vartoti dėl galimos kraujavimo iš virškinamojo trakto rizikos, esant vaikų ir paauglių virusinėms infekcijoms. Teksto parengimo data: 2022-04-07. LI-HJERT-2200001



NUO **1⁹⁹ €**



IBUMETIN

200 mg, 10 plėvele dengtų tablečių **1⁹⁹ €**
400 mg, 20 plėvele dengtų tablečių **3⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: 1 tabletė yra 200 mg arba 400 mg ibuprofeno. **Indikacijos:** trumpalaikis skausmo, tokio kaip galvos, dantų, raumenų, sąnarių ar sukeltos menstruacijų, malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams įprasta vienkartinė dozė yra 1-2 tabletės(s) IBUMETIN 200 mg arba 1 tabletė IBUMETIN 400 mg. Didžiausia paros dozė yra 1200 mg. Tabletę reikia užsigeriti stikline vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, acetilsalicilo rūgščiai arba kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU). Ugnis anksčiau sirgo acetilsalicilo rūgšties arba kitokių NVNU sukelta astma, angioneurozinė edema, digipilne, rinitu ar kitokia padidėjusio jautrumo reakcija. Aktyvi arba buvusi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, opinis kolitas, kraujavimas iš virškinimo trakto ar kitoks kraujavimas, sunkūs kepenų, širdies, inkstų funkcijos nepakankamumas, hemoraginė diatezė, paskutinių 3 mėnesių ar žindymo laikotarpis. Vaikams ir paaugliams iki 12 m. vartoti negalima. **Specialūs įspėjimai:** specialų atsargumo priemonių reikia, jei inkstų, kepenų arba širdies funkcija yra sutrikusi, yra buvę virškinimo trakto pažeidimų, sutrikęs kraujo krešėjimas arba vartojami antikoagulantai, jei vartojama kitų NVNU ar vaistinių preparatų, galinčių padidinti skrandžio opos susidarymo arba kraujavimo pavojų, diuretikų ar nefrotoksinų poveikį turinčių vaistinių preparatų, sergamu cukriniu diabetu, raudojaną virkšinę ar kitomis kolagenozėmis, Krono liga, opinio kolito, hipertenzija, periferinių arterijų liga, galvos smegenų kraujagyslių liga, astma, šienlige, yra nosies polipai ar lėtinis infekcinis kvėpavimo takų ligų, senyviems žmonėms. Prasidėjus kraujavimui, atsiradus opų ar odos reakcijų, vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir kuo skubiau kreiptis į gydytoją. Negalima vartoti, jei nustatytas paveldimas sutrikimas – Lapp laktozės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pirmuosius 6 mėnesius vartoti negalima, nebent tai neabejotinai būtina ir taip pataria gydytojas. Teksto parengimo data: 2023-03-01

 - 50 % PIGIAU

-50%



WALMARK BIORYTHM

MAISTO PAPILDAL

Inovatyvios formos maisto papildų linija „Walmark Biorythm“, kurią sudaro 6 produktai: cinkas, selenas, geležis, vitaminas B12, magnis, ašvaganda (migdomosios vitanijos). Lėto atpalaidavimo mikrogranulės, esančios „Walmark Biorythm“ linijos produktuose, išskiria medžiagas iki 8 valandų per dieną, todėl organizmas pasiima jas tada, kai jam reikia.

„WALMARK BIORYTHM“ VEIKIA TAVO KŪNO RITMŲ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-50%




ARTHROSTOP PROENZI

MAISTO PAPILDAL

„Arthrostop proenzi“ maisto papildai sąnariams su gliukozaminu, chondroitinu, kolagenu, bosvelijos ekstraktu. Jukėk laisvai! NAUJENAI! „Arthrostop proenzi“ collagen shots – unikali dviejų tipų kolageno, vitaminų ir mineralų kombinacija sąnariams. Net 11 000mg hidrolizuoto kolageno viename buteliuke! Z305_SB_Proenzi_V01_LI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-50%



HYDROLESS SLIM, 60 kapsulių 13⁹⁹ 7⁰⁰ €

MAISTO PAPILDAL

Padaeda palaikyti normalų kūno svorį, normalų skysčių pasišalinimą per inkstus, normalią maistinių makromedžiagų apykaitą.

Juodieji pipirai padeda palaikyti normalią virškinamojo trakto bei kepenų funkciją. Juodieji pipirai ir karkavaisis citrinmedis padeda palaikyti normalų kūno svorį. Didžiųjų dilgėlių ekstraktas padeda palaikyti normalų skysčių pasišalinimą per inkstus, padeda palaikyti normalią šlapimo takų funkciją. Cinkas ir chromas padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų apykaitą. Cinkas padeda palaikyti normalią riebalų rūgščių apykaitą, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo ir padeda palaikyti normalią baltymų sintezę. Vartojimo būdas: 2 kapsules per dieną. Ryte ir vakare. Vartoti po valgio, užgerti stikline vandens.

HYDROLESS, 30 kapsulių 12⁹⁹ 6⁴⁵ €

MAISTO PAPILDAL

Padaeda palaikyti normalų skysčių pasišalinimą per inkstus, normalią šlapimo takų funkciją.

Medžiagos, turinčios fiziologinį poveikį: džiovintų stambiauogių spanguolių milteliai, 80 mg; didžiųjų dilgėlių ekstraktas, 50 mg; obuolių acto milteliai, 50 mg; cinkas, 12 mg (120 %). Vartojimo būdas: po 1 kapsulę per dieną. Vartoti po valgio, užgerti stikline vandens.

IKI 5 EURŲ

5€

2⁹⁹ €



PARACETAMOL ACTAVIS,

500 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tablete yra 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikis karščiavimo mažinimas. Lengvo ir vidutinio stiprumo skausmo (pvz., galvos, dantų, sąnarių, raumenų, mėninių) malšinimas. **Davimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems: įprastinė dozė yra 500–1000 mg kas 4–6 val. pagal poreikį. Didžiausia paros dozė yra 3 g, didžiausia vienkartinė – 1000 mg. „Paracetamol Actavis“ saugiamas ir veiksmingas vaikams, sveriantiems iki 50 kg, neįtiršti. Pacientams, kurie nuolat vartoja alkoholi, intervalas tarp dozių vartojimo turi būti bent 8 val. Jiems negalima viršyti 2 g paros dozės. Jeigu praėjus daugiau kaip 3 paroms nuo gydymo pradžios didelis karščiavimas ar infekcijos požymiai išlieka arba jeigu praėjus daugiau kaip 5 paroms nuo gydymo pradžios skausmas išlieka, pacientą reikia iširti dėl simptomų sukėlusios priežasties. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Ilgalais arba dažnas vartojimas nerekomenduojamas, negalima vartoti kartu kitokių paracetamolio turinčių vaistinių preparatų. Visą paros dozę vartojant vienu metu ar perdozavimo atveju, gali pasireikšti sunki kepenų pažeida. Tokiu atveju sūmonės pacientas neperanda, tačiau jis turi nedelsiant kreiptis į gydytoją. Pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų nepakankamumas, lengvas arba vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumas (skaitant Gilbert sindromą), sunkus kepenų nepakankamumas ar ūminis hepatitas, vartojantiems kepenų funkciją veikiančių vaistinių preparatų, taip pat tiems, kuriems yra gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės trūkumas, hemolizinė anemija ar dehidratacija, sergantiems astma, piktnaudžiaujantiems alkoholiu arba nuolat blogai besimatinantiems, paracetamolio vartojimas gali būti pavojingas. Po ilgalaikio (> 3 mėn.) gydymo, kurio metu paracetamolio buvo vartota kas antrą parą arba dažniau, gali pasireikšti arba sustiprėti galvos skausmas. Pacientams, kuriems nustatytas mažas glutatono kiekis, paracetamolio vartojimas gali didinti metabolinės acidozės riziką. Dėl sudėtyje esančios laktazės šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. „Paracetamol Actavis“ sudėtyje yra kveičių krakmolo. Tinka sergantiems celiakija. Šio vaistinio preparato negalima vartoti kveičiams alergiškiems pacientams (ši liga skiriasi nuo celiakijos). **Teksto patvirtinimo data** 2025-01-02. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-04-04. OTC-LT-00094

Nuo alergijos

4⁴⁹ €



CETIRIZIN ACTAVIS

10 mg, 10 dengtųjų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje plevėle dengtoje tablete yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** suaugusiems žmonėms ir 6 m. amžiaus bei vyresniems vaikams cetirizinas vartojamas sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito simptomams (nosies ir akių) palengvinti bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės simptomams palengvinti. **Davimas ir vartojimo metodas:** 6–12 m. vaikams: 5 mg (pusė tabletes) 2 kartus per parą; suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams: 10 mg (1 tablete) 1 kartą per parą. Esant inkstų funkcijos sutrikimui, dozė reikia mažinti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, hidroksizinui arba bet kuriam papirazinui dariniui. Pacientams, sergantiems sunkia lėtine inkstų liga, kai reikalingos dializės. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasikartojanti su gydytoju ar vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Cetirizin Actavis“, jeigu sergate inkstų nepakankamumu (jei būtina, Jums reikės vartoti mažesnę vaisto dozę. Reikalinga dozė nustatys gydytojas); jeigu turite šlapinimosi problemų (tokių kaip nugaros smegenų problemų arba prostatos ar šlapimo pūslės problemų); jei sergate epilepsija ar Jums gali būti traukulių. Kartu su „Cetirizin Actavis“ vartoti alkoholio nerekomenduojama, kaip ir su kitais antihistamininiais vaistais. Dėl sudėtyje esančios laktazės šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-01. OTC-LT-00089



ALMAGEL A GERIAMOJI SUSPENSIJA, 170 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 5 ml geriamosios suspensijos yra 340 mg aliuminio hidroksido (atitinka 28 mg aliuminio oksido), 109 mg magnio hidroksido (atitinka 75 mg magnio oksido) ir 109 mg benzokaino. **Terapinės indikacijos:** virškinimo trakto sutrikimų, susijusių su skrandžio rūgšties pertekliumi, tokių kaip rėmuo, rūgštis sukelti skrandžio negalavimai, skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, simptominis gydymas 14 metų arba vyresniems paaugliams ir suaugusiems žmonėms. **Davimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems, atsižvelgiant į ligos sunkumą, 3–4 kartus per dieną (30 min. prieš valgį ir vakare, prieš miegą) gerti po 1–3 pilnus dozavimo šaukštėlius (1 šaukštėlis yra 5 ml). Jei yra dvylikapirštės žarnos opa ir kai kurių formų skrandžio opa (prievartio opa), „Almagel A“ galima gerti tarp valgių. Prieš vaisių, dirginančių virškinimo traktą, vartojimą profilaktikai reikia išgerti 1–2 pilnus dozavimo šaukštėlius „Almagel A“. Vaistinio preparato rekomenduojama vartoti ne ilgiau kaip 12 parų. Jei inkstų funkcija sutrikusi, atsižvelgiant į sutrikimo laipsnį, suspensijos reikėtų gerti retiau arba mažesne doze. Prieš vartojimą buteliuką reikia stipriai pakratyti. Preparato skysti nerekomenduojama. Išgerus suspensijos, 30 min. negalima gerti kitių. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Fruktozės netoleravimas (nes sudėtyje yra sorbitolio). Hipofosfatemija. Sunkus inkstų funkcijos nepakankamumas (kreatinino klirensas mažesnis kaip 30 ml/min). Alzheimerio liga. Pacientas jaunesnis nei 14 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Almagel A“ nerekomenduojama vartoti, jei yra nuolatinis vidurių užkietėjimas, ūminio apendicito simptomai, metabolinė alkalozė, sergantys ciroze, sunkus stazinis širdies nepakankamumas, nėštumo toksikozė, opinis kolitas, divertikulitė, kolostomija ar ileostomija, inkstų funkcijos sutrikimas, lėtinis viduriavimas. Vaisias gali sunkinti hemorojus sukelius nepakankamumas. Pavyvusiais pacientams gali pasunkėti kaulų ir sąnarių ligos bei Alzheimerio liga. Vaistinio preparato vartoti ilgiau negu 2 savaites galima tik prižiūrint gydytoją. Sudėtyje yra parahidroksobenzoato darinių, kurie gali sukelti alerginių reakcijų, įskaitant uždegimas alergines reakcijas. Sudėtyje yra etanolio, dėl kurio pacientams, sergantiems kepenų, smegenų ligomis, epilepsija ir alkoholiizmu, bei nėščioms moterims ir jaunesniems nei 14 metų vaikams gali atsirasti pažeidimų. „Almagel A“ nepatariama vartoti kartu su alkoholiu ir maistinėmis rūgštimis (citrina, actas ir kt.), nes jos neutralizuoja vaistinio preparato vietinį anestetinį poveikį. Tarp „Almagel A“ ir kitokių vaistų vartojimo reikia daryti ne trumpesnę kaip 1–2 val. pertrauką. Dėl sudėtyje esančio benzokaino vartoti ilgiau kaip 12 parų nepatariama. Vaikams benzokainas gali sukelti metemoglobinemiją. **Reklamos teksto parengimo data** 2023 m. spalio. OTC-LT-00068

4⁹⁹ €

Skausmo ir karščiavimo gydymas

2⁹⁹ €



APAP EXPRESS, 500 mg, 10 minkštųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje „APAP express“ minkštojoje kapsulėje yra 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos:** simptominio lengvo ar vidutinio skausmo ir (arba) karščiavimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir paaugliams, sveriantiems daugiau kaip 55 kg (nuo maždaug 15 m.): 1–2 minkštiosios kapsulės (500–1000 mg) vienu metu, ne daugiau kaip 6 kapsulės (didžiausia paros dozė – 3000 mg) kas 24 valandas. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas paracetamolui, žemės riešutams, sojomis arba bet kuriai vaisto sudėtyje esančiai pagalbinei medžiagai. Sunkus kepenų nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai:** atsargiai reikia vartoti pacientams, kuriems nustatytas inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka, piktnaudžiaujantiems alkoholiu, dehidratuotiems arba nuolat blogai besimatinantiems, sergantiems astma. Gydantis šiuo vaistiniu preparatu, alkoholio vartoti negalima. Ilgas ir dažnas vartojimas nerekomenduojamas. Jeigu per 3 dienas jūsų sąjauja nepagerėja arba net pablogėja, kreipkitės į gydytoją. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-03-31.

Pagalba nuo viduriavimo

4²⁹ €



LOPEDIDIUM EXPRESS 2 mg, kietosios kapsulės, 10 kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje yra 2 mg loperamido hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** simptominis suaugusiųjų ir vyresnių kaip 12 m. paauglių ūminio viduriavimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** iš pradžių reikia gerti 2 kapsules, vėliau (po kiekvieno išsistūtinimo beformėmis išmatomis) – po 1 kapsulę. **Kontraindikacijos:** nevartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliajai ar pagalbinei medžiagai, jei yra bakterijų sukeltas žarnyno uždegimas. **Specialūs įspėjimai:** jei per 48 val. po vaisto išgėrimo viduriavimas nesusilpnėja, jo vartojimą reikia nutraukti ir kreiptis į gydytoją. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2409336090. Teksto patvirtinimo data 2024-03-13.

4⁹⁹ €



LORATIN EXPRESS 10 mg tabletes, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tablete yra 10 mg loratadino. **Terapinės indikacijos:** simptominis alerginės slogos ir lėtinės idiopatinės dilgėlinės gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems negu 2 metų vaikams – po 1 tablete per dieną. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas loratadinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nevartoti jaunesniems nei 2 metų arba sveriantiems mažiau kaip 30 kg vaikams. **Specialūs įspėjimai:** vaistą atslargiai reikia vartoti pacientams, kuriems yra sunkus kepenų veiklos sutrikimas. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2409336091. Teksto patvirtinimo data: 2024-03-15.

NUO 5⁹⁹ €

LIVOSIL

140 mg, 30 kapsulių 5⁹⁹ €
140 mg, 60 kapsulių 11⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietosioje kapsulėje yra 140 mg silimarino. **Indikacijos:** papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livosil“ dozė yra 280–420 mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. „Livosil“ rekomenduojama vartoti ilgiau nei 3 mėnesius. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livosil“ medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemija), bei tuos, kurie vartoja preparatų, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. Teksto peržiūros data 2017-07-12.

NATŪRALI KEPENŲ APSAUGA IR GYDYMAS!

DRĖKINAMIEJI AKIŲ LAŠAI

-40%

STARAZOLIN SAUSOMS IR SUDIRGUSIOMS AKIMS Natrio hialuronatas / deks-pantenolis, 10 ml (be konservantų) 14⁸⁴ 8⁹⁰ €STARAZOLIN HYDROFORTE Natrio hialuronatas, 10 ml (be konservantų) 14⁸⁴ 8⁹⁰ €STARAZOLIN HYDROBALANCE PPH Natrio hialuronatas, 2 x 5 ml 12⁴⁷ 7⁴⁸ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

Drėkinamojo, raminaamojo ir apsauginio poveikio lašai, palengvinantys akies paviršiaus regeneraciją.

„Starazolin“ sausoms ir sudirgusioms akims“ akių lašai skirti padėti sumažinti simptomus, esant lengvam ar vidutinio sunkumo sausų akių sindromui ir (arba) sudirgintam akies paviršiui. **Lašai drėkina akį, stabilizuoja akių plėvelę ir regeneruoja akies paviršių.**

„Starazolin HydroForte“ – intensyviai drėkinantis akių lašai, skirti vartoti esant sunkiam sausų akių sindromui, o „Starazolin HydroBalance PPH“ suteikia veiksmingą ir ilgalaikį akių drėkinimą kiekvieną dieną.

Lašai rekomenduojami: esant akių aplinkos dirgiklams; sumažėjus mirksėjimo dažniui; kai yra nepakankama ašarų gamyba arba jų sudėties pokyčiai. „Starazolin“ sausoms ir sudirgusioms akims“ ir „Starazolin HydroBalance PPH“ gali naudoti žmonės, nešiojantys visų tipų kontaktinius lęšius. Prieš vartojant „Starazolin HydroForte“ reikia išimti kontaktinius lęšius. Įprasta dozė – 1–2 lašai 3 kartus per parą į kiekvienos akies junginę maišelį.

SLENKA PLAUKAI? PASITIKĖK VAISTO GYDOMĄJĄ GALIĄ!

NUO 11⁹⁹ €

BEOTEBAL

BEOTEBAL 10 mg, 30 tablečių 11⁹⁹ €BEOTEBAL 10 mg, 60 tablečių 19⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

BEOTEBAL 10 mg tabletės. Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino.

Terapinės indikacijos. „BEOTEBAL“ priklauso B vitaminų preparatų grupei ir vartojamas biotino trūkumo gydymui suaugusiems. Biotino trūkumas gali sukelti plaukų retėjimą, plaukų slinkimą, nagų ir plaukų augimo sutrikimus bei padidėjusį trapumą, dermatitą (odos uždegimą, kuriam paprastai būdingas niežulys ir paraudimas) aplink akis, nosį, burną, ausis ir kirkšnį, konjunktyvitą (akies junginės uždegimą, dėl kurio akys atrodo paraudusios), nuovargio, parastėžijos (nenormalaus odos pojūčio, pasireiškiančio tokiais simptomais kaip dilgčiojimas, perstėjimas, šalimas, deginimas, tirpimas) simptomus. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems, įskaitant senyvus pacientus, vartoti 10 mg biotino, ty. 1 tabletę „BEOTEBAL“ per parą. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jeigu yra numatoma atlikti laboratorinius tyrimus, turite pasakyti savo gydytojui arba laboratorijos darbuotojams, kad vartojate arba neseniai vartojote „BEOTEBAL“, nes biotinas gali turėti įtakos tokių tyrimų rezultatams. Atsižvelgiant į tai, koks tyrimas atliekamas, dėl biotino poveikio tyrimų rezultatai gali būti klaidingai didesni arba klaidingai mažesni. Reklamos teksto parengimo data 2022-04.

*Slenkantis, silpnai, trapūs plaukai yra viena iš biotino trūkumo išraiškų. „BeotEBal“ yra nereceptinis vaistas skirtas biotino trūkumo gydymui.

CHOLESTEROLIO KONTROLEI

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

ATEROLIP®

ATEROLIP® COMPLEX CAPS, 30 kapsulių 15⁹⁹ €ATEROLIP® COMPLEX CAPS, 90 kapsulių 39⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAI

„Aterolip“ complex caps“ sudėtyje esantis ciberžolių ekstraktas padeda palaikyti normalų cholesterolio kiekį kraujyje, širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą, taip pat normalizuoja kepenų lipidų kiekį.

NUO 6⁹⁹ €

TROXEVASIN

2 %, 40 g gelis 6⁹⁹ €2 %, 100 g gelis 10⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 g gelio yra 20 mg trokserutino. **Indikacijos:** lėtinio venų nepakankamumo simptomų, pavyzdžiui, kojų skausmo, sunkumo, pabrūkimo lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems pacientams iš ryto ir vakare ligos pažeistą vietą reikia patepti nedideliu kiekiu gelio ir švelniai masažuoti tol, kol vaistinis preparatas visiškai įsigers į odą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** vartoti tik ant nepažeistos odos. Gelio negalima tepti atvirų žaizdų bei gleivinės, pvz., akių. Gelio sudėtyje yra benzalkonio chlorido. Vartojant lokaliai gali dirginti, sukelti odos reakcijų. Neštumo metu gelį reikia vartoti atsargiai. Nepastebėta, kad „Troxevasin“ sukeltų nepageidaujamą poveikį žindomam kūdikiui. Reklamos teksto parengimo data 2024-04. TROX-LT-00027

KAD KOJOS BŪTŲ LENGVOS! MĖGAUKITĖS TYRINĖDAMI PASAULĮ BE LĖTINIO VENŲ NEPAKANKAMUMO SUKELTŲ SIMPTOMŲ!

NUO 6⁹⁹ €

ENTEROL®

ENTEROL 250 mg kietosios kapsulės, 10 kapsulių 6⁹⁹ €ENTEROL 250 mg kietosios kapsulės, 20 kapsulių 10⁹⁹ €ENTEROL 250 mg kietosios kapsulės, 30 kapsulių 14⁹⁹ €ENTEROL 250 mg milteliai geriamajai suspensijai, 10 paketėlių 7⁹⁹ €ENTEROL 250 mg milteliai geriamajai suspensijai, 20 paketėlių 11⁹⁹ €

Saccharomyces boulardii CNCM I-745.

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Enterol“ vartojamas ūminio viduriavimo pagalbiniams gydymui kartu su kitais vaistais nuo viduriavimo. **Vartojimo būdas.** Kapsulės nuryti užgeriant gurkšniu vandens arba atidarytos kapsulės turinį supilti į nedidelį kiekį saldinio gėrimo arba į maistą. Miltelių geriamajai suspensijai paketėlio turinį supilti į nedidelį kiekį vandens ar saldinio gėrimo, sumaišyti ir išgerti. Miltelius taip pat galima maišyti su maistu. Vaisto vartoti dar kelias paras, pasibaigus viduriavimo simptomams. **Dozavimas.** Suaugusiems ir vyresniems nei 2 metų amžiaus vaikams rekomenduojama dozė yra 1 kapsulė arba paketėlis vartojama vieną arba du kartus per parą. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Enterol“. Šis vaistas nepakeičia rehidracijos (normalaus organizmo skysčio turio ir sudėties palaikymo), jei jos reikia. „Enterol“ vartoti draudžiama jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu yra alergija mielių grybeliui, ypač Saccharomyces boulardii, jeigu nusilpusi imuninė sistema ar esate gydymas ligoninėje; jeigu jums yra įstatytas centrinės venos kateteris; jeigu pacientas yra jaunesnis kaip 2 metų amžiaus vaikas. Reklamos parengimo data: 2024/10/22 ID 21532404

NUO 5⁹⁹ €**SOLPADEINE**SOLPADEINE, 500 mg/8 mg/30 mg, 12 tablečių 5⁹⁹ €SOLPADEINE, 500 mg/8 mg/30 mg, 12 tirpinamųjų tablečių 7⁴⁹ €**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Kiekvienoje tableteje ir kiekvienoje tirpinamojoje tableteje yra 500 mg paracetamolio, 8 mg kodeino fosfato hemihidrata ir 30 mg kofeino. **Terapinės indikacijos.** Silpno ir vidutinio stiprumo skausmo (šnarių, nugaros, galvos ir migreninio, menstruacinio, neuralginio bei dantų) malšinimas. Persalimo ir gripo simptomų lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Suaugusiems: „Solpadeine“ tirpinamosios tabletės. Po 2 tabletes išvirti iki 10 ml vandens ir gerti 4 kartus per parą (pagal poreikį). „Solpadeine“ tabletės. Po 2 tabletes, jei reikia, iki 4 kartų per parą. Negalima dozės gerti dažniau nei kas 4 val. ir ne daugiau kaip 8 tabletes per bet kurias 24 val. 12–15 metų paaugliams: po 1 tablete kas 6 val. Neviršyti maksimalios paros dozės – 4 tablečių per parą, 16–17 metų paaugliams: po 1–2 tabletes kas 6 val. Neviršyti maksimalios paros dozės – 8 tablečių per parą. Gydymo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 3 paros. **Specialūs įspėjimai.** Pastaraitė su gydytoju arba vaistininku prieš pradėjant vartoti vaistą; jeigu Jūs sergate sunkia inkstų ar kepenų liga; jei sutrikusi žarnyno veikla, įskaitant žarnyno veiklos sustojimą; jei Jums operacijos metu buvo pašalinta tulžies pūsle; jeigu vartojate vaistų nuo depresijos arba kvėpavimo sutrikimų; jei vartojate vaistų nuo pykinimo, vemimo arba padidėjusio cholesterolio kiekio kraujyje; jei valgoite maistą, kuriame yra mažai natrio. Kiekvienoje tirpinamojoje tableteje yra 427 mg natrio; jeigu esate arba kada nors buvotė priklausomas (-a) nuo opioidų, alkoholio, receptinių vaistų arba neteisėtų cheminių medžiagų. Nevartokite per daug produktų, kuriuose yra kofeino. Kartu su šiuo vaistu nevartokite kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio ar kodeino. Kaip ir kitų opioidų, kodeino reikia vartoti atsargiai, jeigu Jūsų kraujo spaudimas yra žemas ar sergate hipotenzija, patyrėte galvos traumą ar turite padidėjusį intrakranijinį (kaukolės vidaus) spaudimą. Nedelsdami pasakykite gydytojui, jeigu sergate sunkiomis ligomis, įskaitant sunkius inkstų funkcijos sutrikimus arba sepsį, netinkamą mitybą, lėtinį alkoholizmą arba jei vartojate ir fluoksalaciną. Gauta pranešimų apie sunkių sveikatos sutrikimų – metabolinę acidozę. Gali sukelti mieguistumą ar svajimą. Jei taip nutiko, nevadykite mechanizmų. **Kontraindikacijos.** „Solpadeine“ vartoti draudžiama: jeigu yra alergija veikliosioms medžiagoms, skausmą malšinantiems opioidams arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio; jeigu yra kvėpavimo funkcijos nepakankamumas; jeigu buvo galvos trauma; jeigu yra padidėjęs intrakranijinis spaudimas; jeigu buvo atlikta tulžies latakų operacija; jeigu yra lėtinis vidurių užkietėjimas; vaikams, jaunesniams kaip 12 metų; mėsiniui skausmą malšinantiems paaugliams (0–18 metų) po gerklių ir ryklės migdolo pašalinimo dėl obstrukcinės miego apnėjos sindromo operacijos; jeigu yra žinoma, kad organizme kodoins labai greitai metabolizuojamas į morfina; moterims nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Reklamos teksto parengimo data 2025-06-11.

**NUO SLOGOS**NUO 3⁹⁹ €**XYMELIN**XYMELIN, 1 mg/ml, nosies lašai (tirpalas), 10 ml 3⁹⁹ €XYMELIN MENTHOL, 1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 5⁴⁹ €XYMELIN, 1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 4⁹⁹ €**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Sudėtis: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidroklorido. **Indikacijos:** susirusęs persalimo ligomis, paburkus nosies gleivinei arba pasireiškus nosies ančių uždegimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 10 metų paaugliams (XYMELIN MENTHOL atveju – vyresniems kaip 12 metų paaugliams) 1 purškimas arba 1–2 lašai į kiekvieną nosies landą 2–3 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, uždarų kampo glaukoma, sausasis nosies gleivinės uždegimas, atrofijos rinitas (XYMELIN MENTHOL atveju), jei hipofizės ar smegenų operacija atlikta pro nosį arba burną; XYMELIN MENTHOL: jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai:** Vartoti atsargiai, jei yra antinksčių navikas (feochromocitoma), sustiprėjusi skydliaukės veikla, sergate cukriniu diabetu ar sutrikęs šlapinimasis dėl padidėjusios prostatos. Sergant sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis ar ligomis, kurių metu susiaurėja kraujagyslės, vartoti tik su gydytojo leidimu. Ilgiau kaip 7 paras šio vaisto vartoti draudžiama. Dažnai ir ilgai vartojant vaistą gali atsirasti nosies gleivinės paburkimas, susilpnėti jo slopinimas ir atsirasti nosies užgulimas. Gali sukelti miego sutrikimų, galvos svaigimą, tremorą, širdies ritmo sutrikimą, aukštą kraujospūdį. XYMELIN nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 10 metų vaikams. XYMELIN MENTHOL: Pastarai su gydytoju arba vaistininku, jei vartojate arba per paskutines dvi savaites vartojote vaistų nuo depresijos, vadinamų monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI). Reklamos teksto parengimo data: 28.03.2024 LT-XYME-Z200004

**NUO GERKLĖS SKAUSMO IR UŽDEGIMO**NUO 6⁹⁹ €**DECATYLEN™**DECATYLEN™, 0,25 mg/0,03 mg, 20 kietųjų pastilių 6⁹⁹ €DECATYLEN, 0,25 mg/0,03 mg, 40 kietųjų pastilių 10⁹⁹ €**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 pastilėje yra 0,25 mg dekvainio chlorido, 0,03 mg cinkochaino hidroklorido. **Terapinės indikacijos:** burnos ir ryklės uždegimo (gingivito, opinio ir aftinio stomatito, faringito) vietinis gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams kas 2 val. lėtai susiūpinti po 1 pastilę, 4–12 m. vaikams kas 3 val. lėtai susiūpinti po 1 pastilę. Kai uždegimo simptomai sumažėja, vartoti po 1 pastilę kas 4 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai ar kelvitriniam amoniūm daniams (pvz., benzalkonio chloridui). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Decatylen“ sudėtyje yra sorbitolio. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurius laisvinantį poveikį. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-01-13, DCT-LT-00019

KAI REIKIA NE TIK MĖSINIUI SIMPTOMUS, BET IR GYDYTI GERKLĖS SKAUSMĄ!

NUO GRYBELIUI GYDYTI22⁹⁹ €

ONYTEC®, 80 mg/g, vaistinis nagų lakas, 3,3 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga: 1 g vaistinio nagų lakso yra 80 mg ciklopiroksolio. **Terapinės indikacijos:** „Onytec“ gydymas lengvos ar vidutinio sunkumo grybelių sukeltos suaugusiųjų nagų ligos, neapimančios nagų matricos, t. y. mėnulio (balto nagų pūslelinės). Vartojimo būdas ir dozavimas: naudoti ant odos, tepinti tik nagus ir odą aplink juos. Rekomenduojama 1 kartą per parą patepti pažeistą nagą (nagų), aplink esančią odą bei panagę. Nenuplauti mažiausiai 6 valandas. **Nagų lako „Onytec“ nereikia pašalinti tirpikliais ar šlifavimais priemonėmis.** Gydymą tęsti, kol problema išnyks ir atauga sveikas nagas. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija ciklopiroksoliui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai ir jaunesniems nei 18 metų pacientams. **Specialūs įspėjimai:** vengti preparato patekimo į akis ar ant gleivinių. „Onytec“ naudojamas tik išorškai. Gydymą nagų nepoliukuoti ir nenaudoti kitų nagų kosmetikos priemonių. Šis preparatas yra degus, saugokite nuo karščio ir atviros liepsnos. Reklamos teksto parengimo data 2025-01-16. **NEGAISK LAIKO NEEFFEKTIVIAM GYDYMUI. RINKIS VAISTĄ „ONYTEC“!**

NUO SUMUŠIMŲ9⁹⁹ €

DOLOBENE™ gelis, 50 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 g gėlio yra 500 TV heparino natrio druskos, 150 mg dimetilsulfoksido, 25 mg dekspantenolio. **Terapinės indikacijos:** patinimo, hematomos ir uždegimo po bukus raumenų, sausgyslių, sausgyslių mąkščių, raščių, šnarių traumos gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tepėti geliu pažeistą vietą 1–2 kartus per parą. Nereikia įtrinti, tik švelniai užtepti ir paskleisti. Nenaudoti po oro nepažeidžiančiais tvarais. „Dolobene“ negalima tepėti ant atviros žaizdos, pažeistos odos ir gleivinės. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sergantiesiems raudonoja virkšle; astma; jaunesniems kaip 5 m. vaikams; esant sunkiems inkstų ir (arba) kepenų pažeidimams, kraujotakos sutrikimams; negalima vartoti kartu su sulindaku. **Specialūs įspėjimai:** nepatariama tepėti ant pažeistos odos ir gleivinės. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024 m. balandis. DLBN-LT-00001

SMECTA 3 G, milteliai geriamajai suspensijai, 10 paketėlių 5⁹⁹ €SMECTA 3 G, milteliai geriamajai suspensijai, 30 paketėlių 12⁴⁹ €**Diosmektitas.****NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

„Smecta“ 3 g milteliai geriamajai suspensijai. **Sudėtis.** Viename paketėlyje yra 3 g diosmektitas. **Terapinės indikacijos.** Vaikų nuo 2 metų ir suaugusiųjų ūminio viduriavimo kartu su geriamais rehidratuojančiais tirpalais bei suaugusiųjų lėtinio viduriavimo gydymui. **Symptomai** suaugusiųjų skausmo, susijusio su funkcine žarnyno sutrikimu, gydymui. **Dozavimas.** Ūminio viduriavimo gydymas. Vaikams nuo 2 metų: 6 gramai (2 paketėliai) per parą. Ūminio viduriavimo pradžioje (pirma 3 dienos) šio dozės gali būti du kartus didesnė. Suaugusiems: 9 gramai (3 paketėliai) per parą. Ūminio viduriavimo pradžioje šio dozės gali būti du kartus didesnė. Ūminio viduriavimo epizodas paprastai trunka ne ilgiau kaip 7 dienas. Kitų ligų gydymas. Suaugusiems: vidutiniškai 9 g (3 paketėliai) per parą. Vartojimo metodas. Vartoti per burną. Paketėlio turinį reikia išpilti prieš pat vartojimą. Vaikams, paketėlio turinį reikia išpilti 50 ml vandens arba sumaišyti su pusiau skystu maistu (pvz., daržovių koše, sriuba, kompotu). Suaugusiems: paketėlio turinį reikia išpilti pusėje stiklinės vandens. **Specialūs įspėjimai.** „Smecta“ nesiekiant vartoti kūdikiams ir vaikams iki 2 metų amžiaus. Gydant ūminį viduriavimą silpnais pacientais ir vaikams nuo 2 metų amžiaus, siekiant išvengti dehidratacijos, turėtų būti skiriama geriamasis rehidratuojančias druskas (GRD). Suaugusiems taip pat turi būti taikoma rehidratacija, jei ji reikalinga. GRD arba intraveninė rehidratacija turi būti skiriama atsižvelgiant į viduriavimo intensyvumą, paciento amžių ir klinikinę situaciją. Reikia apsvarstyti dėl tolimosios „smecta“ vartojimo: jei po 3 ūminio viduriavimo dienų sutrikimas nepažeis, jei yra skausmas kartu su karščiavimu ir vėmimu. Reikia atsargiai skirti diosmektitą pacientams, kuriems praėjus yra buvę sunkių lėtinį vidurių užkietėjimo atvejų. Reikia vengti ilgalaikio „smecta“ vartojimo. „Smecta“ sudėtyje yra gliukozės ir sacharozės. Būlimas atsižvelgti cukrinio diabetu sergančių pacientams. Jeigu gydytojas jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Šio vaisto sudėtyje yra mažas etanolio kiekis (mažiau kaip 10 mg paros dozėje). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas (alergija) diosmektitui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Praneškite apie šalutinį poveikį registruotojo vietiniam atstovui Mayoly Baltics UAB, el. paštu: vigilance.BAL@mayoly.com. **Teksto parengimo data:** 2024-01-01. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024 m. kovo mėn. SME-LT-2024-0000

-40% **17^{39€}**
~~28^{9€}~~



EPITOME Immunity shots, 20 doz.

MAISTO PAPILDAS

• Didelės išskirtinių aktyviųjų medžiagų dozės 1 dozėje:

- 1000 mg bičių pienelio
- 40 mg išgryninto propolio
- 250 mg valgomųjų dantienu (šiitake grybai) ekstrakto
- 250 mg tikrinių blizgučių (reishi grybai) ekstrakto
- 1.4 mg vitamino B6

• Sudėtyje esantys tikriniai blizgučiai (reishi grybai), valgomieji dantienu (šiitake grybai) ir bičių pienelis bei vitaminas B6 gali padėti palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

• Su agavų sirupu.

• Atskiromis porcijomis supakuotą skystosios konsistencijos kompleksą malonu ir patogiu vartoti.

NUO 9^{99€}



PANANGIN

PANANGIN 158 mg/140 mg, 60 plėvele dengtų tablečių

9^{99€}

PANANGIN 316 mg/280 mg, 30 plėvele dengtų tablečių

11^{99€}


Kalio aspartatas ir magnio aspartatas

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 158 mg kalio aspartato ir 140 mg magnio aspartato arba 316 mg kalio aspartato ir 280 mg magnio aspartato. **Terapinės indikacijos:** „Panangin“ tabletes vartojamas magnio ir kalio trūkumo profilaktikai tuo atveju, jei šių jonų pasivsinama per mažai arba pernelyg daug nulenkama, pvz., ilgai vartojant diuretikų. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Panangin 158 mg/140 mg“: paprastai skiriama po 2–3 tabletes 3 kartus per parą. „Panangin 316 mg/280 mg“: paprastai skiriama po 1 tabletę 3 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, ūminis ir lėtinis inkstų nepakankamumas, Addisono liga, hiperkalemija, kalį sulaukiančių diuretikų vartojimas, atriaventriculinė III laipsnio blokada, kardiogeninis šokas (kraujospūdis mažesnis negu 90 mm Hg). **Specialūs įspėjimai:** pacientams, sergantiems ligomis, dėl kurių kraujyje padidėja kalio kiekis, vaistinio preparato būtina vartoti atsargiai ir reguliariai kontroliuoti kalio kiekį kraujyje. **Rinkodaros teisės turėtojas:** „Gedeon Richter Plc.“, Vengrija. **Atstovas Lietuvoje:** „Gedeon Richter“ atstovybė, Maironio g. 23-3, LT-01025 Vilnius, tel. +370 5 268 5392. **Teksto peržiūros data** 2023-05-03 („Panangin 158 mg/140 mg“); 2022-07-01 („Panangin 316 mg/280 mg“). **Reklaminių tekstų paruošimo data** 2025-05-12.

NUO PLEISKANOJIMO

6^{99€}



KETOCONAZOL-RATIOPHARM, 60 ml

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Viename mililitre šampūno yra 20 mg ketokonazolo.

Terapinės indikacijos. Galvos seborėjos ir pleiskanojimo (pityriasis capitis) gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** „Ketoconazol-ratiopharm“ šampūnas vartojamas paaugliams ir suaugusiems pacientams. Plaukų galvą plaukai įtrinami „Ketoconazol-ratiopharm“ šampūnu ir paliekama jo poveikiui 3–5 min. prieš nuplaunant vandeniu. Gydymas. Galvos oda ir plaukai gydyma du kartus per savaitę. Gydymo kurso trukmė – 2–4 savaitės. Profilaktika. Norint išvengti simptomų pasikartojimo, plaukai ir galvos oda šio šampūnu turi būti plaukami kartą per savaitę arba kas antrą savaitę. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Reikia saugotis, kad šampūno nepatektų į akis. Patekus į akis, jis reikia gerai praplauti vandeniu. Pleiskanojimas ir seborėjinis dermatitas dažnai būna susiję su plaukų slinkimu, tai, nors ir retai, tačiau taip pat pasitaiko vartojant Ketoconazol ratiopharm šampūną. Pacientams, ilgai vartojantiems vienoje odos vietoje vietiniams gydymui kortikosteroidus, rekomenduojama toki gydymą palengva per 2–3 savaites užbaigti, kad vartojant „Ketoconazol-ratiopharm“ šampūną būtų išvengta ligos pasikartojimo. Šio vaistinio preparato kvapiosios medžiagos sudėtyje yra α-izometilionono, benzilo alkoholio, benzilbenzoato, benzilcinamato, citralo, citronelolio, kumarino, eugenolio, farnesolio, geraniolio, heksilcinamolio, izoeugenolio, linalolio, kurie gali sukelti alerginių reakcijų. Kiekviename šio vaistinio preparato mililitre yra 100 mg natrio laurilsulfato, kuris gali sukelti vietinių odos reakcijų (geliančių ar sukeliančių deginimo pojūtį) arba sustiprinti odos reakcijas, kurias sukėlė ant tos pačios vietos pavartoti kiti preparatai. **Reklaminių medžiagų parengimo data:** 2024 m. kovas. OTC-LT-00073

-40%



SYSTANE HYDRATION MDPF

10 ml **16^{97€}** **10^{18€}**

Ilgalaikis palengvėjimas sausoms akims. Sudėtyje yra hialurono rūgšties, skirtos pažangiam drėkinimui.

SYSTANE HYDRATION MDPF drėkinamieji akių lašai yra skirti akių sausumo sukeliantiems deginimui ir dirginimui laikinai palengvinti. Drėkinamieji akių lašai SYSTANE HYDRATION MDPF yra sterilūs tirpalas be konservantų, kurio sudėtyje yra natrio hialuronato, polietileno glikolio 400, propileno glikolio, hidroksipropilo guaro, sorbitolio, aminometilo propanolio, boro rūgšties, natrio borato, kalio chlorido, natrio chlorido ir išgryninto vandens. Sudėtyje gali būti vandensilio chlorido rūgšties ir (arba) natrio hidroksido (pH koreguoti).

SYSTANE ULTRA MDPF,

10 ml **15^{97€}** **9^{58€}**

BE KONSERVANTŲ

Drėkinamieji akių lašai, skirti akių sausumo sukeliam deginimui ir dirginimui laikinai palengvinti. Taip pat drėkina kontaktinius lęšius, mažina kontaktinių lęšių nešiojimo sukeltą diskomfortą ir padeda pašalinti smulkias daleles, galinčias sukelti dirginimą ir (arba) diskomfortą. Galiojimo laikas: 3 mėnesiai nuo atidarymo dienos.

SYSTANE GEL DROPS

10 ml **18^{97€}** **11^{08€}**

Pagalba sausoms akims nakties metu. Didžiausiu hidroksipropilo guaro kiekiu pasižymintys drėkinamieji akių lašai iš SYSTANE produktų linijos, ant akies paviršiaus suformuoja gelinį sluoksnį ir sušvelnina akių sausumą, skausmą, deginimo jausmą bei sudirginimą. Galiojimo laikas: 3 mėnesiai nuo atidarymo dienos.

SYSTANE BALANCE

10 ml **18^{97€}** **11^{38€}**

Papildo ašarų plėvelės lipidinį sluoksnį. Drėkinamieji akių lašai pacientams, kurių akių sausumas yra susijęs su Meibomijaus liaukų disfunkcija. Lašai skirti sausoms, pūlingoms, lėtinėms, sudirgusioms bei atšarojančioms akims. Galiojimo laikas: 6 mėnesiai nuo atidarymo dienos.

MEDICINOS PRIEMONĖS

5^{99€}



FENISTIL 1 mg/g gels, 30 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Indikacijos. Niežulio, susijusio su odos išbėrimu, dilgeline, vabzdžių įkandimu arba saulės ar kitokių priežasčių sukeltu paviršinio odos nudegimu, trumpalaikis malšinimas. **Vartojimas.** Pažeistą odos plotą tepti 2–4 kartus per dieną. **Kontraindikacijos.** Alergija dimetindeno maleatui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai.** Jei niežulys labai sunkus arba labai pažeista, jei simptomai per 7 d. nepalengvėja, būtina kreiptis į gydytoją. Jei gelio tepamas didelis odos plotas, ilgai būti saulėje draudžiama. Kodikiams ir vaikams iki 2 m. didelio odos ploto, ypač apimto uždegimo arba pažeisto, gelio tepti draudžiama. Nevartoti ant gleivinės. Sudėtyje yra propilenglikolio ir benzalkonio chlorido. Teksto parengimo data 2025-02. Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi jų licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas.

4^{99€}



MILGAMMA N, 20 minkštųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 40 mg benfotiamino (riebaluose tirpus vitamino B1 darinio), 90 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6) ir 250 µg cianokobalamino (vitamino B12). **Terapinės indikacijos:** B1, B6, B12 vitaminų trūkumo šalinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems: po 1 kapsulę 3–4 kartus per parą. Kai liga lengva ir jei vaistinis preparatas padeda, per parą užtenka 1–2 kapsulių. Vartoti per burną. Kapsulę reikia praryti po valgio nesukramtyta, užsigerti truputį skysčio. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai vaistinio preparato pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas sojos arba sojų pupelių produktams, pvz., lecitinui. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** vartojama ilgiau negu 6 mėn. „Milgamma N“ gali sukelti neuropatiją. Reikia atsivelti į adityvų kartu vartojamų vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra sorbitolio (ar fruktozės), ir su maistu vartojamo sorbitolio (ar fruktozės) poveikį. Geriamojo vaistinio preparato sudėtyje esantis sorbitolis gali paveikti kitų kartu vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį prieinamumą. Vaistinio preparato sudėtyje yra lecitino (išgauto iš sojų aliejaus). Jeigu yra alergija žemės riešutams arba sojos, šio vaistinio preparato vartoti negalima. Reklamos tekstas parengtas 2024-09-11.

„MILGAMMA“ – JUDEK LAISVAI!

NUO RĖMENS

2⁹⁹ €




OMEPRAZOLE INTELI

20 mg, 14 skrandyje neiurių kietųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. „Omeprazole Inteli“ sudėtyje yra aktyvios medžiagos omeprazolo, „Omeprazole Inteli“ mažina rūgšties kiekį Jūsų skrandyje. Vaistas vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refluksio simptomų (rėmens ir rūgšties atpylimo) gydymui. „Omeprazole Inteli“ vartoti negalima jeigu Jūs esate alergiškas omeprazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (nurodyta informaciniame lapelyje); jeigu Jūs esate alergiškas kitiems vaistams, priklausantiems protonų siurblio inhibitorių grupei (pvz., pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, ezomeprazolui); jeigu Jūs vartojate vaisto, kurio sudėtyje yra neflinaviro (vartojamo nuo ŽIV infekcijos). Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Omeprazole Inteli“. Ypač jei vartojate informaciniame lapelyje išvardytų vaistų. Nėštumas ir žindymo laikotarpis. Prieš vartodama „Omeprazole Inteli“, pasakykite savo gydytojui, jog esate nėščia ar ketinate pastoti. Tokiu atveju gydytojas nuspręs, ar šiuo laiku Jums galima vartoti „Omeprazole Inteli“. Kaip vartoti „Omeprazole Inteli“. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Rekomenduojama dozė yra viena 20 mg kapsulė vieną kartą per parą kol išnyksta simptomai, bet ne ilgiau kaip 14 parų. Kad sumažėtų simptomai, gali tekti kapsulių vartoti 2–3 paras iš eilės. Jei po 14 parų laikotarpio simptomai neišnyksta, kreipkitės į savo gydytoją. Galimas šalutinis poveikis. Šis vaistas, kaip ir kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Nedelsdami nutraukite „Omeprazole Inteli“ vartojimą ir kreipkitės į gydytoją, jeigu pastebite kurį nors iš šio reiš, bet sunkaus šalutinio poveikio atveju: staiga prasidėjo švokštimas, lūpų, liežuvio, gerklų ar kūno tinimas, išbėrimas, alpimas ar sutriko rijimas (sunki alerginė reakcija); paraudo, tapo pūslėta ir lupasi oda. Taip pat gali atsirasti lūpų, akių, burnos ertmės, nosies, lytinių organų pūslėtimas ar kraujavimas (tai gali būti Stevens-Johnson sindromas arba toksinė epidermolizė); pagelto oda, patamsėjo šlapimas ir atsirado nuovargis (šie simptomai gali rodyti sutrikusią kepenų funkciją). Ši informacija paskutinį kartą peržiūreta 2023.01.02.

SKAUSMUI MALŠINTI

2⁹⁹ €



MIALDEX 25 mg, 10 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. „Mialdex“ yra vaistas skausmui malšinti, priklausantis nesteroidinių vaistų nuo uždegimo grupei (NVNU). „Mialdex“ veiklioji medžiaga yra deksketoprofenas (deksketoprofeno trometamolio pavidalu). „Mialdex“ vartojamas lengvo ir vidutinio stiprumo raumenų skausmui, skausmingų mėnesinių, dantų skausmui malšinti. **Vartojimas:** visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Įprastinė vaisto dozė yra pusė tabletės (12,5 mg) kas 4–6 valandas arba 1 tabletė (25 mg) kas 8 valandas, bet ne daugiau kaip 3 tabletes per parą (75 mg). **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) deksketoprofeno trometamolui arba bet kuriai pagalbinei „Mialdex“ medžiagai. **Įspėjimai:** jeigu sergate arba sirgote inkstu, kepenų ar širdies ligomis, širdies nepakankamumu, jeigu sergate kraujodaros sistemos ligomis; jeigu sergate sistetine raudonąja vilklige ar mišriomis jungiamojo audinio ligomis; jeigu sergate arba sirgote virškinimo trakto ligomis pasikonsultuokite su gydytoju. **Galimas šalutinis poveikis:** šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Reklamos teksto parengimo data: 2022.11.17

-35%



EPITOME

Joints Bovine Collagen Vital milt. 30 vnt. 44⁹⁹ 29²⁴ €

Vital Resveratrol 200mg, 30 kapsulių 19⁹⁹ 12⁹⁹ €

MAISTO PAPILAI

NERVINĖS ĮTAMPOS MAŽINIMAS IR UŽMIGIMO LENGVINIMAS

NUO 5⁹⁹ €



PERSEN

PERSEN, 40 dengtų tablečių. 7⁹⁹ €

PERSEN FORTE, 20 kietųjų kapsulių. 5⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas. PERSEN tabletėje yra 35 mg valerijonų šaknų sausosio alkoholinio ekstrakto, 17,5 mg melisų lapų sausosio ekstrakto, 17,5 mg pipirmėčių lapų sausosio ekstrakto. **PERSEN FORTE** kapsulėje yra 87,5 mg valerijonų šaknų sausosio alkoholinio ekstrakto, 17,5 mg melisų lapų sausosio ekstrakto, 17,5 mg pipirmėčių lapų sausosio ekstrakto. **Indikacijos.** Vartoti laikinos nedidelės nervinės įtampos mažinimui, pasunkėjusio užmigimo atveju reikia gerti 3-4 PERSEN tab. 1 kartą per parą 1 val. prieš miegą. Tabletes reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai nuo valgyimo laiko. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** PERSEN: Nervinės įtampos mažinimui reikia gerti po 3-4 PERSEN tab. 3 kartus per parą. Pasunkėjusio užmigimo atveju reikia gerti 3-4 PERSEN tab. 1 kartą per parą 1 val. prieš miegą. Kapsules reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai nuo valgyimo laiko. PERSEN ir PERSEN FORTE pradedama vartoti palaipsniui, kad gydymo veiksmingumas būtų optimalus, vaisto rekomenduojama gerti mažiausiai 14 dienų. Gydymo trukmė neribojama. PERSEN ir PERSEN FORTE nėra skirtas jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** PERSEN tablečių sudėtyje yra laktozės ir sacharozės. PERSEN FORTE kapsulių sudėtyje yra laktozės. Reklamos teksto parengimo data: 2025 m. gegužės mėn. ID:000746625 „PERSEN“ - NURAMINK SAVO RŪPESČIUS!

NUO 2⁹⁹ €



VOLTAREN AKTI

12,5 mg, 10 plėvele dengtų tablečių 2⁹⁹ €

25 mg, 10 minkštųjų kapsulių 3⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: diklofenako kalcio druska. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikis nesunkus ir vidutinio sunkumo skausmas (pvz., galvos, dantų, mėnesinių, nugaros, sąnarių ir raumenų), peršalimo ir gripo simptomų, skausmų karščiavimu, malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: 12,5 mg tabletes: pradinė dozė – 2 tabletes, vėliau vartokite po 1 ar 2 tabletes kas 4–6 val., jeigu reikia. Nevartokite daugiau kaip 6 tablečių per 24 val. 25 mg kapsulės: pradinė dozė – 1 kapsulė, vėliau vartoti po 1 kapsulę kas 4–6 val., jeigu reikia. Nevartokite daugiau kaip 3 kapsulių per 24 val. Vartoti ne ilgiau kaip 5 paras skausmui malšinti ir ne ilgiau kaip 3 paras karščiavimui mažinti. **Kontraindikacijos:** alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitiems vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo, širdies ligos, galvos smegenų kraujagyslių liga, sutrikusi kraujotaka, skrandžio ir žarnyno opa, sunkios inkstų ar kepenų nepakankamumas, kraujavimas iš virškinimo trakto arba jo prakurimas, paskutinis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai:** šalutinis poveikis galima sumažinti, vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką. Pasitarkite su gydytoju, jeigu kada nors turėjote virškinimo trakto sutrikimų, sergate ar sirgote žarnyno ligomis, yra pasireiškęs nemalonus pojūtis skrandyje ar rėmose, neseniai atlikta arba bus atliekama skrandžio arba žarnyno operacija, vartojate kitų vaistų nuo skausmo ar uždegimo, sergate bronchų astma arba šienlige, kepenų ar inkstų ligomis, sergate arba sirgote širdies liga arba yra padidėjęs kraujospūdis, brinksna pėdos, esate rečiau daug ysciu, yra kraujavimų sutrikimų ar kitų kraujo sutrikimų, rūkote, sergate diabetu, yra padidėjęs cholesterolio ar trigliceridų kiekis. Senyviems pacientams labai svarbu skubiai pranešti gydytojui apie pastebėtus šalutinius poveikius. Tablečių sudėtyje yra laktozės ir natrto, kapsulių sudėtyje yra sorbitolio ir manitolio. Reklamos teksto parengimo data 2025-05. Prekių ženklai priklauso „Haleon“ arba „Haleon“ turi jų licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas.

5⁹⁹ €



FENKAROL, 25 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kokybė ir kiekybinė sudėtis. Kiekvienoje tabletėje yra 25 mg kvifenadino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos.** Simptominis alerginės slogos (su konjunktyvitu ar be jo), dermatito (egzemos, dilgėlinės) ir niežulio gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems žmonėms dozė yra 25–50 mg (1–2 tabletes) 2–4 kartus per dieną. Vaikams ir paaugliams: vyresniems negu 12 m. vaikams dozė yra 25 mg (1 tabletė) 2–3 kartus per dieną. „Fenkarol“ netinka vartoti 12 m. ir jaunesniems vaikams. **Vartojimo būdas.** Vartoti per burną. „Fenkarol“ tabletes yra geriamos iš karto po valgio. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas kvifenadino hidrochloridui arba sacharozė, bulvių krakmolui, kalcio stearatui. Pirmasis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Atsargiai vaistinio preparato reikia vartoti ligoniams, sergantiems sunkiomis širdies ir kraujagyslių sistemos, virškinimo trakto, kepenų ir (arba) inkstų ligomis. Nevartoti, jeigu nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. **Nepageidaujamas poveikis.** Nepageidaujamo poveikio dažnis apibūdinamas taip: labai dažnas (≥ 1/10), dažnas (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažnas (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100), retas (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1000), labai retas (< 1/10 000) ir nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis). Nedažnas – galvos skausmas, mieguistumas. Dažnas – burnos džiovimas. Nedažnas – virškinimo trakto sutrikimai (pykinimas, vėmimas), kurie paprastai išnyksta, kai dozė sumažėja ar veiklioji medžiaga būna pašalinta. **Registravimo liudijimo turėtojas ir gamintojas.** JSC „Olpha“, Rupnīcu 5, LV-2114 Oļaine, Latvija. Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje <http://www.vvkt.lv>. Jei įmonės prekės ženklą keičimo reklamoje pavaizduoto vaisto pakuotė pereinamojo laikotarpio gali skirtis nuo esančios rinkoje. Reklamos teksto parengimo data 2025-06-05. FEN03062025LT GREITAI NUGALI ALERGIJOS SIMPTOMUS!

SVORIO MAŽINIMUI

29⁹⁹ €

ORLISTAT POLPHARMA

60 mg, 42 kietosios kapsulės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Vienoje kietojoje kapsulėje yra 60 mg orlistato. **Indikacijos:** „Orlistat Polpharma“ yra skirtas antsvorio turintiems (kūno masės indeksas KMI ≥ 28 kg/m²) suaugusiems žmonėms svorio mažinti. Vartojant šį vaistinį preparatą reikia laikytis šiek tiek sumažinto kalorijų ir sumažinto riebalų kiekio dietos. **Dozavimas:** rekomenduojama „Orlistat Polpharma“ dozė yra viena 60 mg kapsulė tris kartus per parą. Per 24 valandas galima išgerti ne daugiau kaip tris 60 mg kapsules. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; kartu taikomas gydymas ciklosporinu; lėtinės malabsorbcijos sindromas; cholestazė; nėštumas; žindymas; kartu taikomas gydymas varfarinu arba kitais geriamaisiais antikoaguliantais. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pacientas turi tvirtai laikytis rekomenduotos dietos. Jei orlistatas vartojamas kiekvieno maitinimosi metu arba valgomas riebus maistas, gali dažniau pasireikšti virškinimo trakto simptomų tikimybė. Gydymas orlistatu gali sutrikdyti riebaluose tirpių vitaminų (A, D, E ir K) absorbciją. Todėl reikia gerti polivitaminų papildą. Cukriniu diabetu sergantis asmuo, prieš pradėdami gydymą „Orlistat Polpharma“ turi pasitarti su gydytoju. Pacientai, vartojantys „Orlistat Polpharma“ kartu su vaistiniais preparatais hipertenzijai arba hipercholesterolemijai gydyti, turi pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Amiodaroną, levotiroksiną vartojantys pacientai, prieš pradėdami gydymą „Orlistat Polpharma“, turi pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Praneša apie kraujavimo iš tiesiosios žarnos atvejus pacientams, vartojantiems orlistatą. Jeigu taip nutinka, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Jeigu prasideda stiprus viduriavimas, geriamieji kontraceptikai gali nesukelti pageidaujamo poveikio, todėl rekomenduojama naudoti papildomas kontracepcijos priemones. Pacientai, sergantys inkstų ligomis, epilepsija prieš pradėdami gydymą „Orlistat Polpharma“, turi pasitarti su gydytoju. Teksto paruošimo data: 2018-04.

SUMAŽINK SVORĮ SAUGIAI.

8⁹⁹ €

LARYXIN MENTHOL, 2 mg/0,5 mg/ml, burnos gleivinės purškalo (tirpalas), 30 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: 1 išpurškime yra 0,17 mg chlorheksidino diglukonato ir 0,043 mg lidokaino hidrochlorido monohidrata. **Terapinės indikacijos:** gerklės skausmo simptomų malšinimas suaugusiems ir 12 m. bei vyresniems paaugliams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti ant burnos gleivinės. Suaugusiems – po 3–5 išpurškimus į galingą gerklės dalį kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 10 kartų per parą. 12–18 m. paaugliams – po 2–3 išpurškimus į galingą gerklės dalį kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 5 kartus per parą. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 5 dienas iš eilės. **Kontraindikacijos:** alergija chlorheksidinui, lidokainui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jaunesniems kaip 12 m. vaikams ir paaugliams. **Specialūs įspėjimai:** vaistą vartokite tik trumpam laikui skausmui ir dirginimui malšinti. Kreipkitės į gydytoją, jei per 3–4 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba karščiujate, skauda galvą, pykina, vemiate ar atsiranda odos išbėrimas. Jeigu esate alergiški kitiems vietiniams amidių grupės anestetikams, pavyzdžiui, lidokainui, turite laikytis saugumo priemonių. Vartojant didesnes nei rekomenduojama dozes, gali sumažėti rijimo refleksų valdymas. Dėl to gali padidėti skysčių ir maisto dauginis įkvėpimo rizika. Nevartokite tuo pačiu metu, prieš pat ar iš karto po kitų burnos ir (arba) gerklės dezinfekavimo priemonių vartojimo. „Laryxin Menthol“ burnos gleivinės purškalo sudėtyje yra etanolio (96 %) ir levomentolio (duodant vartoti mažiems vaikams, kuriems anksčiau yra buvę traukulių, reikia laikytis saugumo priemonių). Mažas alkoholio (etanolio) kiekis, esantis šio vaisto sudėtyje, nesukelia pastebimo poveikio. Reklamos teksto parengimo data 2025-01.

IKI -40%



ODONTE

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

ODONTE – tai patikimas ir dėmesys detalėms, užtikrinantis nepriklausomą burnos priežiūrą kiekvieną dieną

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtos prekės

KAULAMS STIPRINTI

NUO 3⁹⁹ €

CALCIGRAN

CALCIGRAN, 500 mg/200 TV, 30 kramtomųjų tablečių 3⁹⁹ €CALCIGRAN, 500 mg/200 TV, 100 kramtomųjų tablečių 9⁹⁹ €CALCIGRAN FORTE, 500 mg/400 TV, 60 kramtomųjų tablečių 9⁹⁹ €CALCIGRAN FORTE LEMON, 500 mg/800 TV, 60 kramtomųjų tablečių 11⁹⁹ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: 1 tabletėje yra 500 mg kalcio (kalcio karbonato pavidalu) ir 200, 400 arba 800 TV vitamino D3 (cholekaliferolio). **Indikacijos:** vitamino D ir kalcio stokos profilaktika ir gydymas. Pagalbinis specifinis preparatas nuo osteoporozės gydymui pacientų, kuriems yra vitamino D ir kalcio stokos pasireiškimo rizika, gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Calcigran“ suaugusiems vartoti po 1 tabletę 1–3 kartus per parą, vaikams – po 1 tabletę 1–2 kartus per parą. „Calcigran Forte“ suaugusiems vartoti po 1 tabletę 2 kartus per parą, vaikams ir paaugliams netinka. „Calcigran Forte Lemon“ suaugusiems vartoti po 1 tabletę 1 kartą per parą, vaikams ir paaugliams netinka. Tabletes sukramtyti arba suvalgyti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šių vaistų medžiagai. Sunkus inkstų funkcijos sutrikimas. Ligos ar būklės, sukeliančios hiperkalcemiją, hiperkalcemiją, inkstų akmenligę, vitamino D hipervitamiozę. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** gydant ligą, reikia sekti kalcio kiekį kraujyje serume ir stebėti inkstų funkciją; būtina atsargiai vartoti pacientams, kuriems yra hiperkalcemija arba inkstų funkcijos sutrikimo požymių; sarkoidozę sergantiems ligoniams skirti atsargiai, jų kraujyje ir šlapime būtina sekti kalcio kiekį; osteoporozę sergantiems imobilizuotiems ligoniams reikia skirti atsargiai; negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas reikšmingas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2022-04-07. LT-CALC-2200001

VAISTINĖ
VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS

GAMINAME VAISTUS PAGAL INDIVIDUALIUS RECEPTUS

- Atneškite gydytojo receptą iki 13 val.
- Atsiimkite pagamintą vaistą kitą darbo dieną.





SKIEPAI NUO ERKINIO ENCEFALITO

SU
LOJALUMO
KORTELE

28⁹⁹ €

SKIEPO KAINA
BE KORTELĖS

31⁹⁹ €

Galima išankstinė registracija:

- internetu www.nvaistine.lt/skiepai
- telefonu **+370 800 10 008**



Nuolaidos taikomos
su PC Norfa kortele.
Akcijos „Laimės valandos“
nuolaidos netaikomos.

-40%

5^{99€}

VITADAY

CHOLESTEROLIUI MAŽINTI SU ČESNAKU, 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

IKI -50%



AMBIO

GUDOBELĖ SU ALYVMEDŽIŲ IR ČESNAKU, 30 kapsulių 9^{99€} 5^{99€} -40 %
KRILIŲ ALIEJUS, 30 kapsulių 14^{99€} 7^{49€} -50 %
OMEGA 3 SU VITAMINAIŠ D3 IR E, 60 kapsulių 13^{99€} 8^{39€} -40 %
OMEGA 3, 60 kapsulių 10^{48€} 6^{29€} -40 %
MAISTO PAPILDAS

IKI -40%

microlife



MICROLIFE

MICROLIFE BP B2 BASIC, automatinis kraujospūdžio matuoklis 72^{99€} 43^{79€} -40 %
MICROLIFE BP B6 CONNECT, automatinis kraujospūdžio matuoklis 99^{99€} 64^{99€} -35 %
MICROLIFE BP B3 COMFORT PC, automatinis kraujospūdžio matuoklis 89^{99€} 53^{99€} -40 %
MICROLIFE NEB400, inhaliatorius, meškiukas 79^{99€} 51^{99€} -35 %
MICROLIFE NEB 200, inhaliatorius 69^{99€} 48^{99€} -30 %
MICROLIFE NC 200, skaitmeninis bekontaktis termometras 47^{99€} 31^{19€} -35 %
MICROLIFE OXY 300, pulsoksimetras 49^{99€} 32^{49€} -35 %
„MICROLIFE“ INOVATYVŲ TECHNOLOGIJOS

-40% 10^{07€}

TRIPTAN FORTE, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Triptan forte“ sudėtyje esantis 5-hidroksitriptofanas (5-HTP) yra natūrali medžiaga, gaunama iš Afrikoje augančių augalų – *Griffonia simplicifolia* – sėklų, kuri kartu su vitaminu B6 reikalinga serotonino – geros nuotaikos hormono – gamybai. Serotonino išsiskyrimas suteikia gerą nuotaiką ir energiją. Tai pat sudėtyje esantis vitaminas B1 ir B6 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą. Vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

KOJŲ VENOMS

17^{99€}

PATOGI DOZĖ.
TIK Viena TABLETĖ PER PARĄ

VELIOS 1000 mg plėvele dengtos tabletės, 30 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 1000 mg mikronizuoto diosminio. **Terapinės indikacijos:** suaugusiųjų lėtinio veninės kraujotakos nepakankamumo simptomų gydymas, esant: apatinių galūnių venų varikozei, venų opoms, išeminiams varikoziniams ar venoms, sunkumui, nuovargiui, diskomfortui ar nemigai kojų pojūčių, kojų skausmui ar deginimo pojūčių, šaltų kojų pojūčių, naktiniam kojų mėšlungiui, apatinių galūnių patinimui, niežuliui, pareizėjai (odos dilgčiojimui, bėdymui ar niežėjimui), odos eritemai ar cianozei. Suaugusiųjų paūmėjusio hemorojus simptomų gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** lėtinio venų nepakankamumo simptomų gydymas: 1 tabletė per parą valgio metu, vartoti bent kelias savaites. Ūminio hemorojus simptomų gydymas: pirmąsias 4 dienas gerti 3 tabletes per parą, 3 kitas dienas – po 2 tabletes per parą, gydymas turi būti trumpalaikis. Vartoti per burną. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija diosminui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** paūmėjus hemorojus simptomams, reikia prisiminti, kad „Velios“ veiklioji medžiaga trumpai, jei simptomai nepagerėja, reikia atlikti tiesiosios žarnos tyrimą ir parinkti tinkamą gydymą. „Velios“ nėra veiksmingas gydant su stačiumi širdies nepakankamumu susijusią edemą. „Velios“ plėvele dengtų tablečių turi nevartoti pacientai, kuriems yra širdies nepakankamumas. Kai sutrinka kojų veninė kraujotaka, „Velios“ gydymai poveikį gali sustiprinti sausės bei ilgalaikio stovėjimo vengimas, tinkamo kūno svorio palaikymas, specialią kojinių nešiojimas. Kai apatinės kojų dalys patinusios dėl širdies, inkstų arba kepenų ligos, šis vaistas nepadeda. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „Velios“ sudėtyje yra saulėlyčio getonojo dažalo (E110), kuris gali sukelti alerginių reakcijų. **Reklamos teksto parengimo data** 2024-11-18.

PAJUSK KOJŲ LENGVUMĄ.

LENGVAM NERIMUI MALŠINTI IR MIEGUI PALENGVINTI

NUO 6^{99€}

LILANDOR

LILANDOR 80 mg, 14 minkštųjų kapsulių 6^{99€} €
LILANDOR 80 mg, 28 minkštosios kapsulės 12^{49€} €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Lilandor“ 80 mg minkštosios kapsulės, Lavandula angustifolia Miller, eterinis aliejus. „Lilandor“ yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu simptomai pablogėja šio vaisto vartojimo metu, pasitarkite su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrinka, vartoti nerekomenduojama, nes lavandulio aliejaus sudėties medžiagos daugiausia šalinamos iš organizmo perdirbiant jį kepenyse. Kiekvienoje šio vaisto minkštojoje kapsulėje yra apytikriai 12 mg sorbitolio. Dozavimas ir vartojimo metodas. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta pakuotės lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: viena minkštoji kapsulė vieną kartą per parą. Minkštąją kapsulę reikia nuryti nesukramtytą užgeriant pakankamu skysto kiekiu (geriausia stikline vandens). Jeigu simptomai išlieka po vaisto vartojimo dvi savaites, reikia kreiptis į gydytoją arba kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą. Tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“ J. Jasinskio g. 16A, Vilnius LT-03163 Paruošta 2023 m. gruodžio mėn. LT_Lil_21_2023_V1_print

ATGAUK RAMYBĘ IR RAMŲ MIEGĄ



TYLUS RŪPESTIS

Pastebėkite tuos, kurie rūpinasi
ir slaugo savo artimuosius.
Padėkite jiems kasdienybėje,
kad jie nesijaustų vieni.



**Skenuokite QR kodą
ir sužinokite daugiau
apie iniciatyvą.**

www.gintarine.lt/tylus-rupestis



**Gintarinė
vaistinė**

rūpinkimės tais, kurie rūpinasi kitais



-40 % PREKIŲ ŽENKLAMS

SALDUS MIEGAS

SALDUS MIEGAS, 15 kapsulių **10⁹⁹ 5²⁰ € -50 %**

SALDUS MIEGAS eliksyras, 150 ml **11⁹⁹ 6⁸³ € -40 %**

MAISTO PAPILDAI

Linija „Saldus miegas“– dvejoje poveikio, skirta padėti greičiau užmigti ir atsikelti pailsėjus. „Saldus miegas“ padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę bei padeda palaikyti normalią miego kokybę. Sudėtyje esantys simptomei naudojami ramunėlių, valerijonų ekstraktai ir mokslo pagrįstos medžiagos – 5-hidroksitriptofanas ir melatoninas – bei B grupės vitaminai padės patiriantis stresą ir jaudintiems nerimą. Tik 1 kapsulė prieš miegą!

„Saldus miegas eliksyras“ malonus karamėlių skonio, skystas maisto papildas miegui.

GERAM POILSIUI- SALDUS MIEGAS!



IKI **-50%**

VISIONACE, 30 tablečių **25⁹⁹ 15¹¹ €**

VISIONACE PLUS, 28 tabletės / 28 kapsulės **32⁹⁹ 19⁷⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

VISIONACE – subalansuotas luteino, mėlynų ekstrakto, antioksidantų kompleksas. Sudėtyje esančios medžiagos padeda išsaugoti normalų regėjimą (cinkas, vitaminai A, B₂), o antioksidantai – manganas, selenas palaiko ląstelių apsaugą nuo oksidacinės pažeidimo. VISIONACE tinka daug laiko praleidžiantiems prie kompiuterių ar TV ekranų, dirbantiems akims reiklų darbą, dažnai jaudintiems akių nuovargį, vyresnio amžiaus žmonėms, devintiems kontaktinius lęšius. VISIONACE PLUS sudėtis praturtinta omega-3 rūgštimis ir 12 mg luteino.

VISIONACE – REGĖJIMO JĖGA!



-40%

INOLAB

MAISTO PAPILDAI

„Inolab Atsparumas stresui“ – tai 8 veikliųjų medžiagų kompleksas nervų sistemai ir gerai nuotaikai. „Affron“ safrano ekstraktas padeda palaikyti psichinę sveikatą, teigiamą nuotaiką ir atsipalaiduoti. Vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną. „Inolab stiprus magnis“ – tai magnio, kurkumino ir pipirino derinys aktyviam gyvenimo būdui. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją ir išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą. „Cavacurmin“ kurkuminas padeda palaikyti normalią kaulų ir sąnarių būklę. Vartojimas: gerti po 1 paketėlį per dieną. „Inolab širdžiai ir cholesterolio balansui“ – tai 4 veikliųjų medžiagų kompleksas jūsų širdžiai, kraujagyslėms ir cholesterolio balansui. ABG25+ juodųjų česnakų ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies veiklą, normalų cholesterolio kiekį kraujyje. Resveratrolis „Veri-fe“ padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos funkciją. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

SVEICARIŠKAS PRECIZIŠKUMAS IR SINERGINIS POVEIKIS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



-40%

GERIMAX

MAISTO PAPILDAI

Nuolat jaučiatės pavargę ir trūksta energijos? „Gerimax“ papildai grįžta su didele energija. Produktų sudėtyje – augalinės kilmės, adaptogeninių poveikį turintys augalai: ženšeniai, rausvosios rodolės (auksinės šaknys) ir gvaraninių paulinijų seklos. Naudojama standartizuota ir sveikatinimo požiūriu labai veiksminga Azijos ženšenų rūšis Panax ginseng C.A. Meyer. Produktai gaminami Danijoje nuo 1981 m., jų paskirtis – normalizuoti kūno funkcijas taip, kad žmogus jaustųsi energingas, žvalus ir gyvybingas.

„GERIMAX“ – ŽENŠENIŲ ENERGIJA KIEKVIAENAI DIENAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



-40%



JAMIESON turi ilgametę patirtį - savo produkciją eksportuoja po visą pasaulį jau nuo 1922 metų. JAMIESON naudoja išskirtinę „360 Pure“ technologiją, kuri apima net 360 gamybos proceso kontrolės etapų.

-40%

„JAMIESON“ MAISTO PAPILDAMS



Pagaminta Kanadoje



2 UŽ 1 KAINĄ

Vitamino D3 šaltinis



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

OLIDETRIM®

OLIDETRIM® 2000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių **10⁹⁹ €**

OLIDETRIM® 4000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių **14⁹⁹ €**

OLIDETRIM® 2000 TV, 60 minkštųjų kapsulių **11⁴⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

Imunitetui – vitaminas D 2000 ir 4000 TV.

Širdžiai, smegenims – DHR+ EPR omega-3 rūgštys.

Kaulams ir raumenims – vitaminai D ir K2.

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Omega-3 riebiųjų rūgščių DHR (dokoheksaeno) ir EPR (eikozapentaeno) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą. Siekiant maksimaliai padidinti vitamino D papildito naudą, juos naudinga vartoti kartu su vitaminu K2.

GERIAUSIA GYNYBA – STIPRUS IMUNITETAS.

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!



LIUBERIN

LIUBERIN + LUTEIN 35mg, 30 kapsulių **21⁸⁹ €**

LIUBERIN SUPERIOR, 30 kapsulių **21⁸⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

Linija „Liuberin“ skirta padėti išsaugoti normalų regėjimą bei palaikyti akies kraujotaką. „Liuberin superior“ net 18 aktyviųjų medžiagų kompleksas sausoms, pavargusioms, daug į skaitmeninių įrenginių ekranus žiūrinčioms akims. Sudėtis praturtinta ginkmedžiu, kuris padeda palaikyti akies kraujotaką. O „Liuberin + LUTEIN 35 mg“ – naujiausia formulė akims! Šio preparato sudėtis praturtinta karotenoidais: net 35 mg luteino ir 3 mg zeaksantino, kurių su amžiumi koncentracija akyse mažėja. Gausi sudėtis išsiskiria ir melynų uogų ekstraktu, kuris padeda palaikyti normalią akių funkciją, vaizdo aiškumą ir kraujotaką. Normalų regėjimą padeda išsaugoti vitaminai A ir cinkas. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

RYŠIOMS GYVENIMO SPALVOMS!

1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra tokia
pati arba pigesnė –
NEMOKAMAI!

NAUJIENA



HERBITASSIN®

HERBITASSIN® ICELAND MOSS HYDRO, 12 pastilių **5²⁹ €**

HERBITASSIN® SALVIA + VIT C, 12 pastilių **4⁵⁹ €**

HERBITASSIN® ICELAND MOSS + HONEY, 12 pastilių **4⁵⁹ €**

HERBITASSIN® INTENSE, 12 pastilių **4⁵⁹ €**

HERBITASSIN® Icedinukai su šalavijais ir svilarožėmis, aviečių ir obuolių skonio, 4 vnt. **4⁹⁹ €**


MEDICINOS PRIEMONĖ, MAISTO PAPILDAI, MAISTO PRODUKTAI

„Herbitassin“ įvairių skonių pastilės bei ledinukai su augaliniais ekstraktais ir vitaminu C – gerklės ir imunitetui. Islandinės kerpenos padeda palaikyti normalią gerklės ir balso stygų funkciją, mentolis – normalią kvėpavimą, o vitaminas C – normalią imuninės sistemos veiklą. „Herbitassin“ Iceland moss HYDRO® pastilės su hialuronu drėkina gerklės gleivinę, ramina gerklės skausmą, mažina sauso kosulio ir užkimimo simptomus. Naujiena: „Herbitassin“ Intense® – mentolio ir eukalipto skonio pastilės gerklės ir kvėpavimui.

1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra tokia
pati arba pigesnė –
NEMOKAMAI!

Cholesterolio
kontrolėi



ATEROLIP®

ATEROLIP® FIBER, 15 paketėlių **18⁸⁹ €**

ATEROLIP® D, 30 kapsulių **17³⁵ €**

ATEROLIP® RYTHMO, 30 kapsulių **13⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

„Aterolip Rythmo“ sudėtyje yra vienas iš gudobelės žiedų, kurios padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą.

„Aterolip Fiber“ sudėtyje esančių beta glukanų ir avių ar miežių vartojimas su maistu padeda mažinti padidėjusią gliukozės koncentraciją kraujyje iš karto pavaldus.

1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra tokia
pati arba pigesnė –
NEMOKAMAI!



VELYM

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Velym pH neutro“ – klinikiškai tyrimais patikrintas balinamasis dantų kremas. Kasdienė apsauga. Sudėtyje – natūralios kilmės medžiagos ir 1450 ppm fluoro. Skirtas suaugusiems.

„Velym Mineral 03“ sudėtyje – ozono prisotintas alyvuogių aliejus. Daugiau dėmesio dantenoms. Aukštas apnašų valymo koeficientas (angl. Pellicle Cleaning Ratio, PCR).

*Akcija taikoma geltona etiketė pažymėtomis prekėms.

1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra tokia
pati arba pigesnė –
NEMOKAMAI!



WALMARK – vitaminai ir mineralai visai šeimai

KALCIS MAGNIS CINKAS FORTE, 30 tablečių **8⁶⁹ €**

KALCIS MAGNIS CINKAS FORTE, 100 tablečių **16⁹⁹ €**

CINKAS AKTIV, 30 tablečių **8⁹⁵ €**

CHROM FORTE, 200 µg, 30 tablečių **9²⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

„Kalcis, magnis, cinkas forte“. Aukštos kokybės mineralai su vitaminu D. Padeda palaikyti normalią kaulų būklę, tinkami ir vaikams nuo 4 metų.

„Cinkas Aktiv“, 15 mg. Aukštos kokybės cinkas grožiui ir imunitetui! Padeda palaikyti normalią nagų, plaukų odos ir kaulų būklę. Padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Visos dienos dozė vienoje tabletėje!

„Chrom forte“, 200 µg. Aukštos kokybės chromas normaliai gliukozės koncentracijai kraujyje. Tik viena tabletė per dieną!

„WALMARK“ – ŽYDĖK SVEIKATA!

Makšties
mikrofloros
atstatymui



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!


ECOCILLIN ORAL, 15 geriamųjų kapsulių **15⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

5 milijardai gyvų laktobakterijų (*Lactobacillus plantarum* P 16730, *Lactobacillus paracasei* | 1688, *Lactobacillus salivarius* 1794). Vartoti po 1 kapsulę per dieną. Kapsulę nurytį užsigieriant vandeniu.

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!



CLINSKIN® FIBROMA, 1 vnt. **22⁶⁹ €**

MEDICINOS PRIETAISAS


„ClinSkin Fibroma“ – tai savarankiško gydymo priemonė, skirta lengvai, saugiai ir neskausmingai pašalinti fibromas. Ant odos uždėta „ClinSkin Fibroma“ priemonė sustabdo kraujo pritekėjimą į fibromą, ją tarsi „peršildama“. Taip fibroma palaipsniui išdžiūsta saugiai, neskausmingai ir su neįjima randų atsiradimo rizika. „ClinSkin Fibroma“ pakuotėje yra aplikatorius ir 3 fibromos šalinimo priemonės, kiekviena jų skirta vienai fibromai pašalinti.



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMBIO

LAKTO-BIFIDOBAKTERIJŲ KOMPLEKSAS FORTE, milteliai, 10 paketėlių **10⁴⁸ €**
MAISTO PAPILDAS


1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

EPITOME

VITAL MUSCULARITY 25ml, 14 vnt **29⁹⁸ €**
VITAL MEMORY FORMULA 25ml, 14 vnt **29⁹⁸ €**
MAISTO PAPILDAS


1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMBIO KIDS

GERKLEI SU ISLANDINE KERPE, BRAŠKIŲ SKONIO, 6 ledinukai **5⁹⁸ €**
GERKLEI SU ČIOBRELIU, AVIEČIŲ SKONIO, 6 ledinukai **5⁹⁸ €**
VITAMINAS C, 60 GUMINUKŲ **14²⁰ €**
MAISTO PAPILDAS


1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMBIO

ŠIRDŽIAI, 30 tablečių **10⁹⁸ €**
KIDS VITAMINAS D3, geriamieji lašai, 10 ml **2⁴⁹ €**
MAISTO PAPILDAS


1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

VITADAY

FOLIO RŪGŠTIS, 400 mcg, 90 tablečių **3⁴⁸ €**
KOMPLEKSAS SĄNARIAMS SU GLIUKOZAMINU, 60 tablečių **9⁹⁸ €**
MAISTO PAPILDAS


1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMBIO

CHOLESTEROL BALANCE COMPLEX, 90 kapsulių **29⁹⁸ €**
LAXATIVE COMPLEX, 10 kapsulių **4¹⁸ €**
MAISTO PAPILDAS


1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMBIO

GELEŽIS LIPOSOMOSE, 30 kapsulių **17⁹⁸ €**
SELENAS IR CINKAS SU VITAMINAI, 90 tablečių **13¹⁰ €**
VITAMINAS D3 3200IU, 30 kramtomųjų kapsulių **10⁴⁸ €**
MAISTO PAPILDAS


1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMBIO

MULTIVITAMINAI MOTERIMS PLUS, 60 tablečių **17⁴⁸ €**
AUGALINIS KOMPLEKSAS VYRIŠKUMUI, 60 kapsulių **19⁹⁸ €**
MAISTO PAPILDAS

NUO **3⁴⁹** €

MEZYM

MEZYM 10000V, 10 skrandyje neirių tablečių **3⁴⁹ €**

MEZYM 20000V, 20 skrandyje neirių tablečių **7⁴⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Vienoje skrandyje neirių „Mezym 10000V“ tablečių yra 80-110 lgt. mg kiaušulių kasos miltelių, kurių aktyvumas atitinka ne mažiau kaip: 10 000 lipazės vienetų, 7 500 amilazės vienetų, 375 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. Vienoje skrandyje neirių „Mezym 20000V“ tablečių yra 160-222,22 mg kasos miltelių (8 kiaušulių kasos pagaminto pankreatino), kurių minimalus aktyvumas atitinka 20 000 lipazės vienetų, 15 000 amilazės vienetų, 500 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. „Mezym“ vartojamas tuomet, kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentus ir tai sukelia virškinimo sutrikimų. „Mezym“ vartoti negalima: jeigu yra alergija kasos milteliams, kiaušulių (baltymams) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; šio vaisto negalima vartoti, jeigu jūs sergate ūminiu kasos uždegimu (pankreatitu) arba jums paaiškėjo lėtinis kasos uždegimas, kai ligos požymiai yra stipriai išreikšti. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju ir vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Mezym“. Čstinė fibrozė kartais gali komplikuoti žarnyno nepažeidimą. Esant simptomų, panašių į žarnyno nepažeidimo požymius, reikia apvarstyti žarnyno susiaurėjimo galimybe. Jeigu pajutote neįprastą diskomfortą skrandyje ar žarnyne arba pasikėlė nesuskandymo pojūtis, būtinai kreipkitės į gydytoją, kuris jus apžiūrės, kad atmetstų žarnų pažeidimo galimybę. „Mezym“ sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas yra saikes, kad netoleruojate laktozės nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „Mezym“ būtinyje reikia nuryti nekrankius. „Mezym 10000V“ sudėtyje esantis dažiklis azorubinas (E122) gali sukelti alerginių reakcijų. Dozavimas: „Mezym“ vada vartoti tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. „Mezym“ dozės priklauso nuo virškinimo sutrikimų laipsnio, optimali dozė nustatoma individualiai. Jeigu kitap nenurodyta, valgant išgeriamos 2-4 plevėle dengtos „Mezym 10000V“ tabletės arba 1-2 plevėle dengtos „Mezym 20000V“ tabletės. Dienos dozė – 15 000-20 000 lipazės vienetų kilogramo kūno svorio – neturėtų būti viršijama. Dozės vaikams turi paskirti gydytojas. Atsižvelgiant į maistą ar virškinimo sutrikimo sunkumą, rekomenduojama dozė gali būti padidinta. Plevėle dengtos tabletės nurijamos nekrantant ir užsigeriant dideliu kiekiu skysčio. Ilgalaikio gydymo atveju vartojimo trukmę nustato gydytojas. Vartojimo trukmę vaikams taip pat nustato gydytojas. Reklamimo teksto paruošimo data 2023-12. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 1947, LT@berlin-chemie.com LT_Mez_03_2023_VI_plgama

„MEZYM“ PADEDA PAGERINTI SUTRIKUSĮ VIRŠKINIMĄ!

*Kai kasa išsina nepakankamai virškinimo fermentų.

NUO SPAZMINIO SKAUSMO

NUO **6⁴⁹** €

NO-SPA

NO-SPA 40 mg, 24 tabletės **6⁴⁹ €**

NO-SPA 40 mg, 24 plevėle dengtos tabletės **6⁹⁹ €**

(Drotaverino hidrochloridas)

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 tableteje ir plevėle dengtoje yra 40 mg drotaverino hidrochlorido. **Indikacijos:** lygiųjų raumenų spazmas, susijęs su tulžies latakų ligomis (tulžies pūslės ir (arba) latakų akmenligė, tulžies pūslės ir (arba) šalia jos esančių audinių, tulžies latakų ar didžiojo dvilypkapištes žarnos spenelio uždegimas), šalinai. Inkstų ir (arba) šlapimtakio akmenligės, inkstų gėdelių ar šlapimo pūslės uždegimo sukeltų šlapimo takų lygiųjų raumenų spazmams šalinai, mėšlungiskam norui šlapintis slopinti. Kaip pagalbinis gydymas šalinant skrandžio ir žarnyno lygiųjų raumenų spazmus, jei yra skrandžio ir dvilypkapištes žarnos opa, skrandžio, plonosios ar storosios žarnos uždegimas, įskrandžio ir prievardo spazmas bei esant skausmingoms mėnesinėms. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** reikia vartoti po 1-2 tabletes 1-3 kartus per parą, įprastinė suaugusio žmogaus paros dozė yra 3-6 tabletės. **Kontraindikacijos:** alergija drotaverinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Sunkus kepenų, inkstų ir širdies nepakankamumas. Negalima vartoti jaunesniems kaip 1 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** vaikams ir paaugliams iki 18 m. vartoti NO-SPA nerekomenduojama. Jei kraujospūdis mažas, vaista reikia vartoti labai atsargiai. Jeigu gydytojas Jums yra saikes, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Drotaverino vartojant su levodopa, mažėja pastarojo vaisto poveikis parkinsonizmui, todėl stiprėja drebulys ir raumenų stingulys. Teksto parengimo data 2023-06.

KEPENIMS

NUO **9⁹⁹** €

ESSENTIALE® FORTE N

ESSENTIALE® FORTE N, 300 mg, 30 kietųjų kapsulių **9⁹⁹ €**

ESSENTIALE® FORTE N, 300 mg, 90 kietųjų kapsulių **19⁹⁹ €**

ESSENTIALE® FORTE N, 600 mg, 30 kietųjų kapsulių **14⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulyje yra 300 mg arba 600 mg sojų fosfolipidų. **Terapinės indikacijos:** simptomų, tokių kaip apetito stoka, spaudimo pojūtis dešinėje pošonkaulinėje srityje, atsiradusių dėl toksinio ir mitybos kepenų pažeidimo ar hepatito, malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams vienkartinė dozė – dvi 300 mg kietosios kapsulės arba viena 600 mg kietoji kapsulė. Paros dozė – po dvi 300 mg kietasias kapsules arba po vieną 600 mg kietąją kapsulę 3 kartus per parą (1800 mg sojų fosfolipidų). „Essentiale forte N“ saugumas ir veiksmingumas vaikams ir paaugliams iki 12 m. neįvertinti. Del šios priežasties „Essentiale forte N“ neturėtų būti vartojamas vaikams ir paaugliams iki 12 m. Kapsulės geriamos valgio metu, nekrantytos, užgeriant dideliu kiekiu skysčio (pvz., stikline vandens). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Padidėjęs jautrumas žemės riešutams, sojos arba sojų pupelių produktams, pvz., fosfatidilcholinui. **Specialūs įspėjimai:** „Essentiale forte N“ neapsaugo nuo toksinių medžiagų (pvz., alkoholio) sukkelto kepenų pažeidimo. Jei yra kepenų pažeidimas, negalima vartoti alkoholio. „Essentiale forte N“ gali silpninti kraują skystinančių vaistų poveikį, todėl gali prireikti koreguoti šių vaistų dozę. „Essentiale forte N“ sudėtyje yra rafinuoto sojų aliejaus, hidrinto ricinos aliejaus ir etanolio. Ricinos aliejaus gali sukelti skrandžio sutrikimų ir viduriavimą. Šio vaisto sudėtyje yra mažas natrio ir etanolio kiekis. Reklamos teksto parengimo data 2023-09. 2201_SB_Essentiale_V01_LT

MAKSIMALI PAGALBA KEPENIMS!

NUO PILVO PŪTIMO

-20%

SIMETIGAST FORTE

240 mg kapsulės, 10 kapsulių **2⁹⁶ 237 €**

SIMETIGAST FORTE

240 mg kapsulės, 60 kapsulių **9⁴⁰ 752 €**

SIMETIGAST FORTE BABY

geriamieji lašai, 30 ml **5⁴⁴ 435 €**

MEDICINOS PRIEMONĖS

„SIMETIGAST FORTE“ 240 mg kapsulės (simetikonas) skirtos vartoti vyresniems nei 12 m. pacientams, esant pilvo pūtimui, pilnumo jausmui pilve, ragėjimui. Taip pat galima naudoti prieš pilvo ertmės diagnostines procedūras, nes tai pagamina vaizdų kokybę. Vartoti: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. amžiaus jaunuoliai – po 1 kapsulę 2-3 kartus per parą. Prieš diagnostines procedūras: 1 kapsulę vakare dieną prieš tyrimą ir 1 kapsulę rytą tyrimo dieną. „SIMETIGAST FORTE BABY“ geriamieji lašai (simetikonas) skirti kūdikiams nuo 28-os gyvenimo dienos ir vaikams iki 12 metų. Vartoti: kūdikiams (nuo 28-os gyvenimo dienos) ir vaikams iki 2 metų 3 lašai prieš, per ar po kiekvieno valgio. Negalima vartoti daugiau kaip 18 lašų per dieną. GREITAI PAGALBA IŠPŪSTAM PILVUI.

IKI **-40%**

AMBIO

LAKTO-BIFIDOBAKTERIJŲ KOMPLEKSAS, 20 kapsulių **9⁹⁶ 5⁹⁹ € -40 %**

LAKTO-BIFIDOBAKTERIJOS SU S.BOULARDI, 20 kapsulių **14⁴⁸ 9⁴¹ € -35 %**

KOMPLEKSAS ŽARNYNUI SU GEROSIOMIS BAKTERIJOMIS, 30 kapsulių **12⁴⁸ 8¹¹ € -35 %**

MAISTO PAPILDAI

-20% **0^{47€}**

VITADAY

AKTYVINTOJI ANGLIS, 10 tablečių

MAISTO PAPILDAI

VIRŠKINIMO SISTEMAI

NUO **5⁹⁹** €

GUTTALAX

GUTTALAX, 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 15 ml **5⁹⁹ €**

GUTTALAX, 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml **9⁹⁹ €**

(Natrio pikosulfatas)

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 ml tirpalo (15 lašų) yra 15 mg natrio pikosulfato. **Indikacijos:** „Guttalax“ vartojamas, jei pacientas yra varginamas vidurių užkietėjimo; yra būklė, kai reikia palengvinti tuštinimą. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** „Guttalax“ geriamas vakare. Suaugusiems ir vyresniems nei 10 m. vaikams: 10-20 lašų per parą, 4-10 m. vaikams: 5-10 lašų per parą. Vartoti per burną. Rekomenduojama gydymą pradėti nuo mažiausios dozės. Didžiausios rekomenduojamos paros dozės viršyti negalima. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; žarnų nepažeidimas ar obstrukcija; stiprus pilvo skausmas ir (arba) karščiavimas dėl ūminės pilvo būklės (pvz., apendicito), galimai susijęs su pykinimu, vėmimu; ūminė uždegiminė žarnų liga; sunki dehidracija; jaunesni kaip 4 m. vaikai; retos paveldimos būklės, kurios gali būti nesuderinamos su preparato pagalbine medžiaga. **Specialūs įspėjimai:** Neušaudus vidurių užkietėjimo priežasčių, negalima vartoti nepertraukiamai kasdien ar ilgiai. „Guttalax“ pavartojusius žmonės buvo galvos svaigimo (arba) sinkopės atvejų. Vaikams be gydytojo nurodymo „Guttalax“ vartoti negalima. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas fruktozės netoleravimas. Nevartokite šio vaisto noredami numesti svorio. Teksto parengimo data 2024-12.

UŽKIETĖJUS VIDURIAMS VEIKIA PATIKIMAI IR NIEKAM NEPASTEBINT.

-30% **NAUJIENA**

CIDERLIN, 28 pakeliai **13⁹⁹ 9⁷⁹ €**

SILYMARIN LIPID, 28 pakeliai **13⁶⁹ 9⁵⁸ €**

MAISTO PAPILDAI

NAUJIENOS – maisto papildai „Ciderlin“ ir „Silymarin Lipid“ – „Ciderlin“ – natūralios kilmės kompleksas su 2000 mg obuolių sidro acto milteliais, inulino skaidulomis (net 3000 mg) ir kitių arbatmedžių ekstraktų, kuris padeda palaikyti: medžiagų apykaitą ir svorio kontrolę, riebiųjų deginimą, normalų cukraus kiekį kraujyje ir bendrą sąjauktą. „Silymarin Lipid“ – kompleksas kepenų riebiųjų apsaugai, kepenų ląstelių regeneracijai ir kepenų funkcijai. Komplexas padeda: normaliai lipidų apykaitai (cholinai); palaikyti nuo riebiųjų kaupimosi ir daugybinę jų atsargų kaupimąsi kepenyse (ciberžolės ekstraktas); normaliai kepenų ląstelių regeneracijai (atsnaujinimui) (silymarinas). **VEIKSMINGAS DUETAS: SVORIO KONTROLEI IR KEPENŲ APSAUGAI.**

-35%

3^{59€}

AMBIO

NERVŲ SISTEMAI, 15 kramtomųjų tablečių

MAISTO PAPILDAS

- Valerijonų šaknų ekstraktas padeda atsipalaiduoti ir palankiai geria psichologinę būseną streso metu.
- Melisų žolės ekstraktas padeda palaikyti gerą nuotaiką ir normalią miego kokybę.
- Ženšenio šaknų ekstraktas padeda palaikyti pažintines funkcijas ir atmintį.
- Folio rūgštis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

-40%

8^{57€}

MEMIRIL FORTE, 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

„Memiril forte“ – subalansuotas, 11 sudedamųjų dalių kompleksas atminčiai bei kraujotakai. Tinka tiems, kuriems sunku susikaupti bei nuolat ką nors pamiršantiems. Vienoje kapsulėje yra 80 mg ginkmedžių ekstrakto, kuris padeda palaikyti normalią atminties funkciją ir kraujotaką. Taip pat sudėtyje yra magnio, vitaminų B, C, E, seleno ir folio rūgšties, kuri padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojamas: gerti po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną.

-40%

4^{49€}

AMBIO

PATIRIANTIEMS ĮTAMPĄ, 20 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

- Augalinių ekstraktų ir melatonino kompleksas.
- Maisto papildas sudėtyje esantis karcinogenų citrinmedžių ir ramunėlių ekstraktai padeda atsipalaiduoti.
- Raudonėdžių pasiflorų ekstraktas padeda nusiraminti.
- Vaistinių melisų ekstraktas padeda palaikyti normalią miego kokybę.
- Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti.
- Tik 1 kapsulė per dieną.

-25%

11^{24€}

PERIFERISAN 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

Tiaminas, vitaminai B12, B6 ir magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vitaminai B12, B6 ir magnis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. Niacinas, vitaminai B6, B12 ir magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją. Vartoti po 1 kapsulę per dieną.

-40%

4^{79€}

AMBIO


PATIRIANTIEMS ĮTAMPĄ, 100 ml

MAISTO PAPILDAS

-40%


AMBIO

CINKAS, 45 tablečių ^{6%} 4^{19 €}

TIRUBEN COMPLEX, 20 tablečių ^{7%} 4^{79 €}
MAISTO PAPILDAS


SKENUOKITE QR KODĄ IR
NORFOS VAISTINĖS
LEIDINIUS VARTYKITE
TELEFONE.



NUO 6⁹⁹



GRIPLEX THERMAL, 1000/100/12,2 mg. milteliai geriamajam tirpalui, 8 paketėliai	7 ⁹⁹ €
GRIPLEX THERMAL, 1000/100/12,2 mg. milteliai geriamajam tirpalui, 12 paketėliai	9 ⁹⁹ €
GRIPLEX THERMAL, 650/50/10 mg. milteliai geriamajam tirpalui, 8 paketėliai	6 ⁹⁹ €
GRIPLEX THERMAL, 300/20/5 mg. milteliai geriamajam tirpalui, 12 paketėliai	8 ⁹⁹ €

[illegible]

NUO 5⁹⁹



GRIPEX, 325/30/10 mg, 12 plėvele dengtų tablečių	5 ⁹⁹ €
GRIPEX, 325/30/10 mg, 24 plėvele dengtos tabletės	8 ⁹⁹ €
GRIPEX, 500/30/15 mg, 10 plėvele dengtų tablečių	6 ⁴⁹ €
GRIPEX, 500/30/15 mg, 20 plėvele dengtų tablečių	9 ⁴⁹ €

Vekliosis medžiagos, stiprumas: 1 tabletė, Griepex 500/30/15 mg 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudofedrinro hidrochlorido, 15 mg dekstrometorano hidrobrodimo. 1 tabletė, Griepex 325/50/10 mg 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudofedrinro hidrochlorido, 10 mg dekstrometorano hidrobrodimo. Terapinės indikacijos: peršalimo ar gripo simptomai (galvos, raumenų, gerklės skausmas, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginimo kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas. „Griepex 500/30/15“ suaugusiems po 1-2 tabletes 4-6 kartus per parą, „Griepex 325/50/10“ suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams įprasta doze po 1-2 tabletes 4-6 kartus per parą, kas 4-6 val. tada, kada reikia. Neviršyti vienkartinės 2 tablečių dozės. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 12 tablečių. Kontraindikacijos: negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šių vaistų sudedamajai medžiagai; sunkūs inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; smarkiai padidėjęs kraujospūdis, chromos akimokas. Negalima vartoti su alkoholiu, alkoholiniu gėrimu, kofeinu, kofeino turinčiais vaistais, su kitais gripo ir peršalimo vaistais, su kitais vaistais, turinčiais dekstrometorano. Sutrūkinėjus kepenų funkcijai, sergant alkoholizmu, sutrikus mitybai yra didesnis gepatų toksinio pažeidimo pavojus. Gydančias šias vaistus, nepartaria vartoti alkoholiu. Įsigu per 3 dienas išties sąvartojta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreiptis į gydytoją. Reklamos tekstas parengiamas data 2025-03-31. „GRIPEX“, VEIKU!

9⁹⁹ €

[illegible]

NUO 5⁹⁹



2,5 mg/0,25 mg/ml nosies lašai (tirpalas) **5⁹⁹ €**
2,5 mg/0,25 mg/ml nosies purškals (tirpalas) **6⁹⁹ €**

Indikācijas. Nosies gļēvības paburkmiņš mazāstīriņš ir sīguris turis (nosies gļēvības uzdegumi), sergants sezoninis (ziēdādūkurūks) ir nesēzoninis algerūinis turis. **Vārtījums.** Samagstīriņš ir vīrsni kais 6 m. vāikais: 3-4 lāsāi kļēvības nosies lāndā 3-4 vārtus par kūrūks. 1-2 pūrkūkslāi kļēvības nosies lāndā 3-4 vārtus par kūrūks. 1-6 m. vāikais: 1-2 lāsāi kļēvības nosies lāndā 3-4 vārtus par kūrūks. Nosū lāsā nērekomēdūjūmā vārtū jausniems nē 1 m. kōdikūms. Nosū lānkū nērekomēdūjūmā vārtū jausniems nē 6 m. vāikams. **Kontraindikācijas.** Algērija vēikūsioms ar kēp kūrūl pagālinētiē ākūpūdi, afroūnis turis (lētūis nosies gļēvības uzdegumi), MAD (vāistū nū dēkūris ākū psichūks ilgū) vārtūjums, ūzardō kamp kūrūlā pādēdējū pādēdējū ākūpūdi. **Speciāls ŗēpūmā.** Pastāstū sū gūdijūsi, sergants sīdies lūg, cūpūnis diabeti, epilepsija, esant pādēdējūmā kraupšōnizāci sū skydūkūlās ākūtvūm, pādēdējū pādēdējū ākūpūdi nē lēdō pāsēirskūti šlāpōm sūsālikūmā. Nevārtōis ilgū kais 7 d. ēsles. Sudzētye vārtūjūmā chloridō. Tēkōtō pāreino dā dā 2020-01. NP-LT-WIBR-20-00001

NUO **3⁷⁵** €



BRONTEX, 15 mg/5 ml, sirupas, 100 ml **4⁵⁰ €**
BRONTEX, 30 mg, 20 tablečių **3⁷⁵ €**
BRONTEX, 7,5 mg/ml, geriamieji lašai, tirpalas, 100 ml **5⁷⁵ €**

[illegible]

Reklamos teksto parengimo data: 2023 m. rugsėjis. BRO-LT-00026

7⁹⁷ €

[illegible]

7⁹⁷ €

[illegible]

-20%



Isla pastilų su islandėmis kerpomis sudedamosios dalys padengia gleivines, gerklę ir ryklę kaip balzamas. Tokiu būdu sudirgus gleivinei apsaugoma nuo tolesnio dirginto ir greičiau atsigauna dėl malonaus pastilų poveikio, ypač esant užšalimui ir peršalinėjimui gerklės.

Isla Moos, Cassis, Ginger, Mint: suaugusieji ir vyresni kaip 4 metų vaikai turi išlaidų už 1 pastilę kelis kartus per dieną pagal poreikį.

Isla Junior: vyresniems kaip 4 metų amžiaus vaikams pagal poreikį galima duoti lėtai sučiulpti iki 6 pastilų per dieną.


Reikia įsitikinti, kad vaikai jau sugeba kontroliuojamai čiulpti pastilą.

Isla medic: suaugusiems ir vyresniems kaip 6 metų vaikams pagal poreikį galima sučiulpti iki 6 pastilų per dieną.

Reklamos teksto pareinamoji data 2024-10-22 PM-IT-2024-10-6135

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

-35% 24^{04€}
~~36^{95€}~~



EPITOME Cardiovascular formula, 90 kaps.

MAISTO PAPILDAS

- Augalinės sudėties produktas.
- Didelės išskirtinių aktyviųjų medžiagų dozės 1 kapsulėje:
- Fermentuotų sojų ekstrakto, kuriame yra 2000 FU (fibrino vienetai) natokinazės
- Fermentuotų ryžių ekstrakto, kuriame yra 2,9 mg monokolino K
- Bergaminų citrimedžių vaisių sulčių ekstrakto, kuriame yra 50 mg polifenolių
- Dažnių ciberžolės šaknų ekstrakto kuriame yra 20 mg kurkumino ir 20 mg polikosanolio
- Sudėtyje esantis dažnių ciberžolės šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje bei normalią širdies ir kraujagyslių sistemos funkciją.

IKI -40%



CARDIOACE

CARDIOACE, 30 tablečių 25⁹⁹ 15²⁹ € -40 %

CARDIOACE PLUS, 60 kapsulių 40⁹⁹ 28³⁴ € -30 %

MAISTO PAPILDAI

CARDIOACE – širdinio veikimo kompleksas, kuriame derinamos naudingosios žesnakų ekstrakto savybės su vitaminais, mineralais bei antioksidantais. Sudėtyje yra medžiagų normaliai širdies veiklai (vitaminas B1, EPR, DHR), kraujotakai (žesnakai), ląstelių apsaugai nuo oksidacinio pažeidimo (varis, selenas, vitaminai C, E).

CARDIOACE PLUS – sudėtis papildyta net 1300 mg veiksmingųjų augalinių sterolių normaliai cholesterolio koncentracijai ir patentuotu Cardiol kompleksu. Teigiamas poveikis jaučiamas suvartojant per parą ne mažiau 0,8 g augalinių sterolių

„CARDIOACE“ – KIEKVIENAM ŠIRDIES DŪŽIUI!

IKI -40%



FERGLOBIN, FERGLOBIN PLUS

MAISTO PAPILDAI

„Ferglobin“ – geležies, vitaminų ir mineralų kompleksas normaliai kraujodarai (foliatų), raudonųjų kraujo kūnelių gamybai (vitaminai B6, B12, geležis), hemoglobino susidarymui (geležis) palaikyti. „Ferglobin“ puikiai padidina mitybą nėštumo ir laktacijos laikotarpiu, vaikystėje ir paaugulystėje, sveikstant po ligos ar operacijos.


„Ferglobin Plus“ ne tik padidina geležies atsargas, bet ir padeda mažinti pavargimo jausmą (vitaminai B6 ir B12), palaiko fizinę ir protinę energiją (sibirinis ženšenis).

GELEŽIS, KURIAI NĖRA LYGIŲ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-30% 14^{69€}
~~20⁹⁹~~

NAUJIENA



NATASPIN® CARDIO PROTECT, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAI

„NatAspin® CARDIO PROTECT“ – tai japonų ilgaamžiškumo filosofijos įkvėpta, daugiakomponentė formulė širdžiai ir jos apsaugai. Ypač stiprus, skirtingi antioksidantai, suderinti su kraujotakai naudingais komponentais taip, kad padėtų palaikyti esmines, nuo sveikos širdies veiklos neatsiejamas funkcijas:

- Širdies ir kraujotakos sistema,
- apsauga nuo oksidacinės pažeidimo,
- normalų ląstelių senėjimą ir energijos apykaitą,
- cholesterolio balansą,
- nervų sistemą.

Sudėtyje naudojami išskirtinai tik standartizuoti, bioaktyvūs ekstraktai.

APSAUGOTA ŠIRDIS – SVEIKA ŠIRDIS SU „NATASPIN® CARDIO PROTECT“.

IKI -50%



BIOKALIS 400 mg, 30 pakelių 9⁹⁹ 5⁰⁰ € -50 %

BIOKALIS FORTE 750 mg, 30 pakelių 11⁹⁹ 6⁰⁰ € -50 %

COR4 COMPLEX, 28 pakeliai 18⁹⁹ 12²⁸ € -35 %

MINERALVIT CARDIO, 20 pakelių 9⁹⁹ 6¹⁷ € -35 %

VENOLEGS 750:75, 28 pakeliai 19⁹⁹ 12²⁹ € -35 %

MAISTO PAPILDAI

Išskirtiniai maisto papildai žmonėms, kuriems svarbu, ką vartoja. Išskirtinė reikalinga: „bioKalis 400 mg“ ir „bioKalis forte“ sudėtyje – grynas kalio citratas miltelių pavidalu. Kalis padeda palaikyti normalią kraujospūdį, normalią nervų sistemos ir raumenų veiklą. „COR4 Complex“ – širdžiai ir kraujotakai. Mineralai kalis ir magnis, vitaminas B1 ir augalinės kilmės medžiagos padeda palaikyti normalią širdies veiklą, kraujospūdį, cholesterolio koncentraciją kraujyje, gerina kraujo kokybę ir kraujotaką. „Mineralvit Cardio“ – viename miltelių pakelyje gausu mineralų, vitaminų ir yra net 200 mg gudobelės ekstrakto, kurie padeda palaikyti normalią širdies veiklą. „VENOLEGS 750:75“ – didelio kiekio flavonoidų (750 mg diosmido ir 75 mg hesperidino), mineralų, vitaminų, kolageno ir 4 augalų ekstraktų kompleksas pavargusioms kojom, kojų venoms stiprinti, hemorojui ir normaliai venų mikrocirkuliacijai. Sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos!

KAI SVARBU, KĄ VARTOJI – ŠIRDŽIAI, KRAUJOSPŪDŽIUI IR VENOMS!

-40% 7^{49€}
~~12⁴⁵~~



AMBIO

KALIS IR MAGNIS, milteliai geriamajam tirpalui, 30 pakelių

MAISTO PAPILDAS

- Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį.
- Kalis padeda palaikyti normalią raumenų veiklą, o magnis – normalią raumenų funkciją.
- Kalis ir magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.

-40%



KALICORD 850 FORTE, 30 kapsulių 12⁹⁹ 7⁵⁵ €

KRIOMEGA+, 30 minkštųjų kapsulių 20⁹⁹ 12⁴⁷ €

MAISTO PAPILDAI

Norintiems papildyti kalio atsargas organizme, rekomenduojama vartoti „Kalicord“, kurio sudėtyje yra net 307 mg kalio. Padeda palaikyti normalų kraujospūdį ir palaiko normalią raumenų veiklą. Žuvų taukai „KriOmega+“ yra iš krilių. Kriliai yra laikomi vienu geriausių, veiksmingiausių ir prieinamiausių omega-3 riebiųjų rūgščių šaltinių. Sudėtyje esantis omega-3 fosfolipidai, gaunami iš vežagynių – krilių – ekstrakto, greičiau patenka į audinių ląsteles ir tolygiau pasiskirsto nei omega-3 trigliceridai, randami žuvų taukuose.

-45% 10^{33€}
~~18^{99€}~~



AMBIO

KOFERMENTAS Q10, 100 mg, 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

-30% 3^{91€}
~~5^{59€}~~



AMEDIPUS, Lūpas apsaugantis balzamas su pantenoliu, 4,5 g
MEDICINOS PRIEMONĖ

-35%



AMBIO

URO COMPLEX, 30 kapsulių **10^{42€} 6^{58€}**
HEPALIPID COMPLEX, 30 kapsulių **11^{48€} 7^{46€}**
MAISTO PAPILDAS

IKI **-50%**



AMBIO

GROŽIUI, 30 tablečių **15^{98€} 7^{99€} -50 %**
VITAMINAI A IR E FORTE, 30 kapsulių **6^{48€} 4^{54€} -30 %**
MAISTO PAPILDAS

IKI **-40%**



AMBIO

GERKLEI SU ISLANDINE KERPENA, juodųjų serbentų skonio, 24 minkštosios pastilės **6^{98€} 4^{19€} -40 %**
GERKLEI SU ŠALTALANKIŲ IR MEDETKŲ ALIEJAIS, purškalas, 20 ml **6^{98€} 4^{54€} -30 %**
BRONCHO COMPLEX, 120 ml **6^{98€} 4^{99€} -30 %**
RUTINAS PLUS, 30 kapsulių **9^{98€} 5^{99€} -40 %**
MAISTO PAPILDAS

-40% 14^{99€}
~~24^{48€}~~



EPITOME Coenzyme Q10, 200 mg, 30 minkštųjų kapsulių
MAISTO PAPILDAS

- Itin didelė kofermento Q10 dozė – net 200 mg.
- 260 mg linų sėmenų aliejaus, kuriame yra nepakeičiamosios omega-3 riebiųjų rūgšties – alfa linoleno rūgšties.
- Minkštas maisto papildas lengviau praryti.

-40% 8^{99€}
~~14^{99€}~~



AMBIO

REGĖJIMUI SU GINKMEDŽIO EKSTRAKTU, 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

-40% 11^{09€}
~~18^{48€}~~



AMBIO

MULTIVITAMINAI VYRAMS PLUS, 60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

- Cinkas padeda palaikyti normalų vaisingumą ir reprodukciją, o selenas – normalią spermatogenezę.
- Cinkas padeda palaikyti normalią testosterono koncentraciją kraujyje.
- Cinkas padeda palaikyti normalią vitamino A apykaitą. Cinkas ir vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą.
- Cinkas ir selenas padeda palaikyti normalią plaukų būklę.
- Selenas, cinkas, vitaminai A, B6 ir C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
- Tiamasas, riboflavinas, niacinas, pantoteno rūgštis, biotinas, vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.
- Tiamasas, niacinas, biotinas, vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją.
- Riboflavinas padeda palaikyti normalią geležies apykaitą ir išsaugoti normalų regėjimą.
- Riboflavinas, tiamasas, niacinas, biotinas, vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.
- Riboflavinas, niacinas, pantoteno rūgštis, vitaminai B6 ir B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.



PIRK LIVOL[®] SINCE 1959 IR LAIMĖK!



x9

SPALVOTIEJI LAGAMINAI
Mandarina Duck
TROLLEY CABIN,
po 3 kas mėnesį



x30

Sveikatinimo rinkinių,
po 10 kas mėnesį



Gintarinė
vaistinė

Žaidimas galioja 2025 06 01 – 2025 08 31, fizinėse vaistinėse arba www.gintarine.lt perkant bent vieną bet kurį LIVOL maisto papildą. Registracijos anketa bei žaidimo sąlygos ir taisyklės rasite www.gintarine.lt. Nuolaidos pasiūlymas galioja 2025 08 01 – 2025 08 31, administracijos patvirtintam prekių sąrašui, perkant fizinėse vaistinėse su vaistinių lojalumo kortelėmis ir www.gintarine.lt lojalumo programos „Draugystė“ dalyviams. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Prekių kiekis ribotas. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.



VAISTINĖ

INKSTAMS IR ŠLAPIMO TAKAMS

-20%

9^{99€}
~~12^{49€}~~



FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Fitolizyna Nefrocaps PLUS“ yra unikalus 7 koncentruotų augalinių ekstraktų mišinys, kuris:
– padeda palaikyti normalią inkstų ir šlapimo takų veiklą (petražolių šaknis, dirvinų asišklių žolė, paprastųjų varpūčių šakniastiebiai, karpotųjų beržų lapai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė);
– padeda palaikyti normalų vandens pašalinimą iš organizmo, todėl skatinamas nepageidaujimų metabolizmo produktų šalinimas su šlapimu (dirvinų asišklių žolė, paprastųjų varpūčių šakniastiebiai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė).
Rekomenduojamas vartojimas: 1 kapsulė 2 kartus per parą prieš valgį, užgeriant dideliu kiekiu vandens (ne mažiau kaip ½ stiklinės).

AUSIMS

6^{47€}



OTINUM 200 mg/g ausų lašai (tirpalas), 10 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: 1 g ausų lašų (tirpalo) yra 200 mg cholino salicilato. **Indikacijos.** Ūmus išorinės, vidurinės ausies ar būgnelio uždegimo sukkelto skausmo malšinimas. Sukietėjusiems sieros kamsčiams suminkštinti, prieš šalinant juos iš išorinės ausies landos. **Dozavimas.** Dozė suaugusiems serganti ūminiu išorinės, vidurinės ausies ar būgnelio uždegimu: 3–4 lašai lašų lašinti į išorinę ausies landą 3–4 kartus per dieną. Prieš sieros kamsčio šalinimo procedūrą: 3–4 lašai lašų lašinti į išorinę ausies landą 2 kartus per dieną 4 dienas. Vaikams nuo 1 metų dozės koreguoti nereikia. Vartojimo būdas. Vaistai lašinami ant šono gulintiam pacientui. Įlašinus vaisto, žmogus privalo kelias minutes ramiai pailsėti. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Praligus ausies būgnelei. Jaunesni nei 1 metų kūdikiai. **Specialūs įspėjimai.** Kiekvienoje šio vaistinio preparato dozėje yra 100 mg alkoholio (etanolio), tai atitinka 100 mg/l g. Ant pažeistos odos plauti etanolis gali sukelti deginimo pojūtį. **Reikiamos teksto parengimo data:** 2023 02, 07C-2023-0007

-40%



PROSTOSAN FORTE, 30 kapsulių 15⁴⁵ 9⁰⁹ €
POTENZINE SUPERIOR, 30 tablečių 27⁹⁵ 16³⁷ €
TOTALPOWER MAN, 30 tablečių 20⁹⁵ 12⁵⁹ €

MAISTO PAPILDAS

„Prostosan forte“ – pagalba vyresnio amžiaus vyrų prostatai. Sudėtyje esantys sabelalpinių ir rūgių žiedadulkių ekstraktai padeda palaikyti normalią prostatos funkciją, o afrikinių pigių ekstraktas – normalią šlapimo pūslės funkciją. Kininio ženšenio ekstraktas padeda išlaikyti energingumą. Šio preparato sudėtis taip pat praturtinta vitaminu D3 ir cinku. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 2 kartus per dieną, valgio metu.

„Potenzine superior“ – subalansuotas derinys potencijai. Šio maisto papildas sudėtyje esantis ženšenio šaknų ekstraktas padeda palaikyti lytinę funkciją, ištvermę ir energingumą. Normalų lytinį potraukį ir seksualinį pajėgumą padeda palaikyti gulsčiosios ragūžės vaisių ekstraktas, o normalų vaisingumą ir testosterono koncentraciją kraujyje – cinkas. Sudėtyje taip pat yra L-arginino. Vartojimas: gerti po 1 tablete per dieną, valgio metu.

„TotalPower man“ – galingi multivitaminai aktyviam vyrui su 23 aktyviosiomis medžiagomis. Šis maisto papildas puikiai tinka intensyviai gyvenantiems vyrams. Jo sudėtyje esantis eleuterokokas padeda palaikyti normalią proteinę veiklą ir energiją; magnis padeda palaikyti normalią raumėnų funkciją, o vitaminai B6 ir B12 – palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vartojimas: gerti po 1 tablete per dieną.

KIEKVIENO VYRO PASIRINKIMAS!

-30%



„EMILI“ ŽOLELIŲ ARBATOS

Atsirkite natūralų kasdienės ramybės ir geros savijautos šaltinį – „Emili“ žolelių arbatas iš kruopščiai atrinktų augalų.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

ŠLAPIMO TAKŲ SISTEMAI

-30%



URINAL

MAISTO PAPILDAI

„Urinal“ – šlapimo takų sistemos. Unikalus spanguolių ekstrakto, paprastųjų rykštenių ir vitamino D derinys.
„Urinal Akut“ – didelės koncentracijos spanguolių ekstrakto „ExoCyan“, paprastųjų rykštenių ekstrakto ir vitamino D derinys.
„Urinal sirupas“ – tinka vaikams nuo 1 metų.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-25%



SMARTHIT IV® FERRUM

EFEKTYVAUS PASISAVINIMO MAISTO PAPILDAI

Naudojant patentuotą technologiją „Miosol™“ pagaminamos mikrokapsulės, į kurias įterpiamos geležies molekulės. Mikrokapsulių tikslas – apsaugoti veikliąją medžiagą nuo skrandžio rūgščių ir užtikrinti, kad ji pasiektų plonąją žarnyną. Šis technologinis sprendimas leidžia kelis kartus pagerinti veikliosios medžiagos pasisavinimą ir sumažinti įprastai geležiai būdingus šalutinius poveikius. Geležis svarbi, nes padeda palaikyti normalų hemoglobino ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą bei padeda palaikyti normalų deguonies pernešimą organizme.

„SMARTHIT IV® Ferrum“ galima rinktis kapsules arba skystį.

„SMARTHIT IV® Ferrum“ – 1 kapsulėje yra 28 mg mikrokapsuluotos geležies. Tinka suaugusiems ir vaikams nuo 12 metų.

Naujieta „SMARTHIT IV® Ferrum Strong“ – tai išmanus ir kompleksinis sprendimas, padedantis efektyviai palaikyti geležies atsargas organizme. 2 kapsulėse – 40 mg mikrokapsuluotos geležies versija su bioaktyvia folio rūgštimi bei aminorūgštimi L-histidinu.

„SMARTHIT IV® Ferrum Liquid“ – 5 ml skystio yra 14 mg mikrokapsuluotos geležies. Tinka suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų.

„SMARTHIT IV® Lactoferrin“, 100 ml – laktoferinas yra natūraliai organizme aptinkamas geležį surišantis glikoproteinas.

„SMARTHIT IV® FERRUM“ – GELEŽIS, KURI PASIEKIA TIKSLĄ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-20%



VIRIDIAN

MAISTO PAPILDAI

„Viridian“ – tai natūralūs, aukštos kokybės vitaminai ir maisto papildai, sukurti remiantis mokslu, etiška gamyba ir gryna sudėtimi.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-30%



ŠALTALANKIŲ ALIEJUS, 50 ml 9⁹⁹ 6⁹² €
ŠALTALANKIŲ ALIEJUS, 100 ml 12⁹⁹ 8⁸¹ €

MAISTO PAPILDAI

Šaltalankių aliejus padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir širdies veiklą, normalų virškinimą, normalią odos būklę. Vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą.

-15%



NUTRIDRINK, CUBITAN, NUTRIKID

SPECIALIOS MEDICININĖS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAI

Turi būti vartojami prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

GROŽIUI, ENEGIJAI, IMUNITETUI, SVORIO KONTROLEI

IKI -30%



ACORUS BALANCE

MAISTO PAPILDAI

„Acorus Balance“ produktų linija skirta subalansuotam gyvenimui. Asortimente rasite skirtingų produktų, įvairioms organizmo funkcijoms palaikyti: imunitetui, grožiui, virškinimui ir žarnyno funkcijai, svorio kontrolei, sąnariams. Produktai pasižymi išskirtinėmis vartojimo formomis – nuo gumukų ir vienadozių buteliukų (shot'ų).

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

IKI -50%

„MÖLLER'S“ ŽUVŲ TAUKAI IR OMEGA-3 KAPSULĖS**MAISTO PAPILDAI**

„Möller's“ – tai šimtmečiais puoselejami žuvų taukai visai šeimai. „Möller's“ žuvų taukų kapsulės išsiskiria kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyvių medžiagų deriniais. Tyri ir gerai išvalyti „Möller's“ žuvų taukai puikiai tinka vartoti kasdien visą gyvenimą. Įvairaus skonio kramtomosiose žuvėlėse „Möller's Junior“ yra omega-3 ir vitamino D – augančiam vaikų organizmui naudingų medžiagų.

OMEGA-3 EKSPERTAI JAU 170 METŲ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

**NUO ALERGIJOS**5⁹⁹ €**TAVEGYL 1 mg, 20 tablečių.****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje tabletėje yra 1 mg klemastino fumarato, kuris atitinka 1 mg klemastino. **Indikacijos:** „Tavegyl“ lengvina alerginę slogą (šienligę, ašarojimą, čiaudulį, nosies varvėjimą); alerginę odos reakciją (paraudimą, spuogelius, niežėjimą, patinimą); vabzdžių įgėlimo ir įkandimo sukeltą reakciją. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: iš ryto ir vakare gerti po 1 tabletę, 6–12 m. vaikams: gerti prieš pusryčius ir vakare prieš miegą po 0,5 arba 1 tabletę, 3–6 m. vaikams: gerti prieš pusryčius ir vakare prieš miegą po 0,5 tabletės. Tabletes gerti prieš valgių užsigeriant vandeniu. **Kontraindikacijos:** alergija klemastinui, kitokiems antihistamininiams vaistams ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Porfirija. Jaunesniems nei 3 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** atsargiai turi vartoti pacientai, sergantys uždaro kampo glaukoma; stenozę sukeliančia peptine opa; dvilykapištes žarnos obstrukcija; prostatos hipertrofija, dėl kurios susiaukio šlapimas, bei šlapimo pūslės kaklelio obstrukcija. Reikia atsargiai skirti epilepsijai sergantiems arba praėjus traukulių patyrimams pacientams. Sudėtyje yra laktozės. Reklamos teksto parengimo data 2024-07.

NUO 10⁹⁹ €**NICORETTE**

NICORETTE COOLMINT 1 mg/išpurškime burnos gleivinės purškalas (tirpalas),

150 išpurškimų **22⁹⁹ €**

NICORETTE INVISIPATCH 10 mg/16 h (15 mg/16 h; 25 mg/16 h) transderminis pleistras,

7 transderminiai pleistrai **23⁹⁹ €**NICORETTE FRESHFRUIT 2 mg (4 mg) vaistinė kramtomoji guma, 30 vienetų **10⁹⁹ €**NICORETTE FRESHMINT 2 mg (4 mg) vaistinė kramtomoji guma, 30 vienetų **10⁹⁹ €****NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI.**

Veiklosios medžiagos, stiprumas: vienoje gumoje yra 2 mg (4 mg) nikotino (režinato pavidalu), viename pleistre yra 15,75 mg (25,62 mg; 39,37 mg) nikotino; kiekviename išpurškime (0,07 ml tirpalo) yra 1 mg nikotino. 1 ml tirpalo yra 13,6 mg nikotino. **Indikacijos:** vaistinė kramtomoji guma, transderminis pleistras, priklausomybei nuo tabako gydyti, lengvinant nutraukimo simptomus, kad būtų lengviau laikinai susilaikyti nuo rūkymo, o aspirendus – mesti rūkyti; purškalas: priklausomybės nuo tabako gydymas, sumažinant potraukį nikotinui ir palengvinant nutraukimo simptomus, kurie atsiranda metant rūkyti staiga ar palaipsniui. Tikslas yra visam laikui nutraukti tabako vartojimą. „Nicorette coolmint“ geriausia vartoti kartu su elgesio pakeitimo programa. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** paprastai pakanka kramtyti 8–12 tam tikro stiprumo vaistinių kramtomųjų gumų per dieną. Pleistrą reikia priklijuoti ant odos ryte, o vakare jį nuimti. Purškalo reikia įsiskusti 1–2 vaisto dozės tuo laiku, kai paprastai rūkoma, arba jeigu jaučiamas poreikis rūkyti. Galima vartoti iki 4 purškimų per valandą. Negalima puršksti daugiau kaip 2 špurškimus 6 karto, per 24 valandas neviršyti 64 purškimų (4 purškimai per valandą, 16 valandų perodė). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas nikotinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Gūmos negalima kramtyti vaikams iki 12 metų. Purškalo negalima vartoti jaunesniems kaip 18 m. pacientams, nerūkantiems pacientams. **Specialūs įspėjimai:** prieš vartodami „nicorette“, pasitarkite su gydytoju, jeigu turite širdies infarkto, insultą, sergate nestabilia ar progresuojančia krūtinės angina, sunkiomis širdies aritmijomis, yra nekontroliuojama hipertenzija. Pacientai, sergantys cukriniu diabetu, pradžiai naudoti nikotino pakeičiamąją terapiją, turi atidžiai sekti savo cukraus kiekį kraujyje. Galima rizika ir lankoma gydymo nauda turi būti apsvaiztyta gydytoju, jeigu pacientai serga inkstų ir kepenų nepakankamumu, lechodomocitoma ir nekontroliuojama hipertenzija, virškinimo trakto ligomis. Jeigu sergate žvyneline, lėtiniu dermatitu ar dilgeline, neįkūpiukite „nicorette“ pleistro ant pažeistos odos. Norint išvengti nudegimų rizikos, pleistrą reikia nuimti prieš atliekant magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą. Kramtomoji guma gali prilipsti prie dantų protezo ir jį sugadinti. Kramtomųjų gumų ir purškalo sudėtyje yra butilhidroksitoluono, kuris gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivinę. Kramtomųjų gumų sudėtyje yra kaliochlorido, kuris gali lėtinėti vidurius. Reklamos teksto parengimo data: 2025-04, LI-NIC-2025-153229

-25% 5⁰² €**LIDONIUM® 700 mg, 42 tabletės****SPECIALIOS MEDICININĖS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAS SU UGNIAŽOLE**

Tik mitybai reguliuoti esant susilpnėjusiam ląsteliniam imunitetui, vėžio profilaktikos metu, siekiant pagerinti onkologinių ligonių gyvenimo kokybę ir esant skrandžio, žarnyno, kepenų ir tulžies pūslės latakų, kvėpavimo takų spazmams, uždegimams.

AMEDIPLUS

Šildantis arklų balzamas, 250 ml

Šaldantis arklų balzamas, 250 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

-30%

**AMEDIPLUS**vandeniui atsparūs pleistrai, 7 x 2 cm, 10 vnt. **1⁴⁵ 1¹⁶ €**vandeniui atsparūs, permatomi pleistrai, 7 x 2 cm, 10 vnt. **1⁴⁵ 1³⁵ €**vandeniui atsparūs, apvalūs pleistrai, 10 vnt. **1⁴⁵ 0⁹⁵ €**vandeniui atsparūs, karpomas pleistras, 6 x 100 cm **2⁰⁹ 1⁶⁷ €**juodas aksominis 7x2 cm, 10 vnt. **1⁷⁹ 1⁴³ €**su alavijų ekstraktu 7x2 cm, 10 vnt. **1⁷⁹ 1⁴³ €**pleistrai nuospaudoms, 7 x 2,2 cm, 10 vnt. **2⁹⁹ 2⁹⁹ €****MEDICINOS PRIEMONĖS****PROPOLIO-MEDETŲ KREMAS, 40 g** **6⁹⁹ 4⁸⁹ €****PROPOLIO ALIEJUS, 15 ml** **5⁹⁹ 4¹⁹ €****KOSMETIKOS PRIEMONĖS**

ANTIALERGINIS VAISTAS

5²⁵ €

OPEXA®, 20 mg, 10 tablečių
Bilastinas

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

„Opexa“ vartojamas šienligės (kuriai būdingi simptomai yra čiaudulys, niežulys, sloga, užgulta nosis, paraudusios ir ašarojančios akys) ir kitų alerginio rinito formų simptomams slopinti. Jis taip pat gali būti vartojamas niežtinėms odos ligėms (pūkliams arba dilgėlei) gydyti. „Opexa“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija bilastinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Pastarąjį su gydytoju arba vaistininku, jei Jums nustatytas vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų veiklos sutrikimas, mažas kalcio, magnio, kalio kiekis kraujyje, jeigu Jums pasireiškia arba pasireiškė širdies ritmo sutrikimų, arba Jūsų širdies susitraukimų dažnis yra labai mažas, jeigu vartojate vaistų, galinčių paveikti širdies ritmą, jeigu Jums yra arba buvo tam tikrų širdies ritmo sutrikimų (vadinamasis OLC intervalo pažeidimas elektrokardiogramoje), kurie gali pasireikšti sergant kai kuriomis širdies ligų formomis, ir vartojate kitus vaistus. Nedukite šio vaisto jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Neviršykite rekomenduojamos dozės. Gydyimo trukmė priklauso nuo jūsų ligos simptomų, trukmės ir eigos. Nevartokite „Opexa“ ilgiau nei 10 dienų nepasikonsultavę su gydytoju. Jei po 3 dienų jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Rekomenduojama dozė suaugusiems, įskaitant senyvus žmones ir 12 m. bei vyresnius paauglius, yra 1 tabletė (20 mg) per dieną. Tabletę reikia nuryti nevalgius, 1 valandą prieš valgį arba sulčių gėrimą, arba praėjus 2 valandoms po valgyimo arba sulčių gėrimo.

SUTRAMDYK ALERGIJĄ!

-40% 18^{83€} 21³⁹

MEFLOVAN FORTE, 60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Meflovan forte“ – trijų augalinių medžiagų derinys, skirtas moterims, siekiančioms maksimalaus komforto ir geros savijautos menopauzės metu. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną.

-25% 14^{99€} 19⁹⁹

CLIMENUM, 28 tablečių su apvalkalu dienai ir 28 tablečių su apvalkalu nakčiai

MAISTO PAPILDAS

Padaeda palaikyti normalią savijautą menopauzės periodu. Vartojimo būdas: išgerti 1 tabletę „Climenum“ dienai iš ryto ir 1 tabletę „Climenum“ nakčiai vakare. Skirtas suaugusiems.

-40% 6^{95€} 11³⁹

RUTIN FORTE + C, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Rutin forte+C“ sudėtyje yra rutozido, vitamino C, cinko ir seleno. Normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių funkcijai, susidarymą padeda palaikyti vitaminas C. Normali imuninės sistemos veikla padeda palaikyti vitaminą C, cinką ir seleną. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną.

-10% 2^{96€} 3³⁵

GINTARO RŪGŠTIS, 20 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Vartojimas: gerti po 1 tabletę 3 kartus per dieną valgant. Rekomenduojamame suvartoti per parą kiekyje (3 tabletės) yra 0,3 g gintaro rūgšties. Gamintojas: UAB „Medicata Filia“, Žarijų g.28, Vilnius

Išskirtinis platintojas Lietuvoje: UAB „VERATRUM PHARMA“, Žarijų g. 28, Vilnius

-30%



ABC VIT VITAMINAS C, 500 mg, ananasų skonio, 50 tablečių 5⁸⁹ 4¹² €

ABC VIT VITAMINAS C, 500 mg, apelsinų skonio, 50 tablečių 5⁸⁹ 4¹² €

ABC VIT VITAMINAS C, 500 mg, braškių skonio, 50 tablečių 5⁸⁹ 4¹² €

MAISTO PAPILDAS

Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės, nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

NORFOS
VAISTINĖJE GALITE
PASISKIEPYTI NUO
PNEUMOKOKO

SKIEPO KAINA

84⁰⁰ €

SU LOJALUMO KORTELE

77⁰⁰ €

Nuolaidos taikomos su PC Norfa kortele.
Akcijos „Laimės valandos“ nuolaidos netaikomos.



PĖDŲ IR ODOS GRYBELIUI GYDYTI

NUO 8⁹⁹ €



EXODERIL

EXODERIL 10 mg/ml odos tirpalas, 10 ml 8⁹⁹ €
EXODERIL 10 mg/ml odos tirpalas, 20 ml 13⁹⁹ €
EXODERIL 10 mg/g kremas, 15 g 8⁹⁹ €
EXODERIL 10 mg/g kremas, 30 g 13⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 grame vaisto yra 10 mg naftifino. **Terapinės indikacijos:** „Exoderil“ tirpalas naudojamas pėdų grybeliui gydyti. „Exoderil“ kremas naudojamas rankų, pėdų, odos grybeliams, įvairiaspalvei dedervinei bei uždegimams dermatomikozėms gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** pažeistą odą ir aplink ją esantį plotą tepti 1 kartą per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas naftifinui arba pagalbineis medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** saugoti, kad vaistas nepatektų į akis ir aktyviai žaizdos. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 214, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS240336088. Teksto patvirtinimo data 2024-03-13.

PAVIRŠINIŲ ODOS ŽAIZDŲ GIJIMO GERINIMUI

NUO 5⁹⁹ €



BEPANTHEN

BEPANTHEN 50 mg/g kremas, 30 g 5⁹⁹ €
BEPANTHEN 50 mg/g tepalas, 30 g 5⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. 1 g preparato yra 50 mg dekspantenolio. **Terapinės indikacijos:** įvairios kilmės paviršinių odos ir gleivinių pažeidimų pagalbinis gydymas, drėkinant odą ir atkuriant epidermio barjerą, paliekant epitelizaciją su atlikimu priešuždegiminio ir niežėjimo mažinančio poveikio, paviršinių, nedidelių pažeidimų (nedidelių nudegimų arba nubrozdinimų), odos sudirginimų, išbrėmo nuo sauskelnių, skausmingų ir įtrūkusių spenelių maitinimo, prieš žindant nuplauti. Tepėti kiekvieną kartą keičiant sauskelnes, prieš tai odą reikia kruopščiai nuvalyti. Gydymo trukmė priklauso nuo ligos pobūdžio ir eigos. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jei sergate kita liga, esate alergiškas arba vartojate kitus vaistus, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Naudojant tepalą ar kremą reikia vengti kontakto su akimis. Reikiamos teksto parengimo data 2024-10. CH-2024030-71

BEPANTHEN PLUS 50 mg/5 mg/g kremas, 30 g 6⁴⁹ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. 1 g kremo yra 50 mg dekspantenolio ir 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** lokalis įvairių paviršinių žaizdų, pvz., nubrozdinimų, įgyvimų, įbrėžimų, odos įtrūkų, nudegimų gydymas, kai yra infekcijos pavojus. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** kūdikiams nuo 1 mėn., vaikams, paaugliams ir suaugusiems išvalytą žaizdą arba pažeistą odą vietai reikia tepėti plonu kremo sluoksniu viena arba kelis kartus per dieną, kol žaizda užgis. Venkite tepėti didelius odos plotus. **Kontraindikacijos:** alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai: gilių arba stipriai užkreštų žaizdų; jei trūkės ausies būgnelis, negalima tepėti ausies srityje. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** saugokitės, kad kremo nepatektų į akis, ausis ir ant gleivinių. Negalima tepėti ant sudirgintos, bet neinfekuotos odos. Negalima vartoti kartu su kitomis antiseptinėmis medžiagomis, muilu. Jei pasireiškia sunkios alerginės reakcijos simptomai, vartojimą nedelsdami nutraukite ir pasitarkite su gydytoju. Reikiamos teksto parengimo data: 2024-10. CH-2024030-71

LAIMEI, YRA „BEPANTHEN“ GYDO IR APSAUGO ODA

NIEŽULIUI MALŠINTI

5⁹⁹ €



GRIVIX 1 mg/g gelis, 30 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: kiekviename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato. **Pagalbinės medžiagos:** benzalkonio chloridas ir propilenglikolis. **Terapinės indikacijos:** dermatozės, dilgėlinės, vabzdžių įkandimo, nudegimo saulėje arba paviršutinio odos nudegimo (pirmojo laipsnio) sukeltą niežėjimo trumpalaikis malšinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** vaikams, suaugusiems ir senyviems pacientams: ant pažeistos ir niežtinčios odos GRIVIX reikia tepėti plonu sluoksniu 2–4 kartus per parą. Kūdikiams ir mažiems vaikams (jaunesniems nei 2 metų amžiaus) reikia vengti vartoti ant didelių odos plotų. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Antrojo ir trečiojo laipsnio nudegimai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jei GRIVIX gydymas didelis odos plotas, reikia vengti ilgalaikių šių paviršių saulės apšvietimo. Kūdikiams ir mažiems vaikams (jaunesniems nei 2 metų amžiaus) didelio odos ploto, ypač pažeisto ar apimto uždegimo, gelio tepėti reikia vengti. Vaistinio preparato sudėtyje yra benzalkonio chlorido, kuris dirgina, gali sukelti odos reakcijų, ir propilenglikolio, kuris gali sudirginti odą. **Reikiamos teksto parengimo data:** 2018-04.

NUMARKINK SUDIRGINTĄ IR NIEŽTINČIĄ ODĄ!

NUO ODOS SUDIRGINIMO

6⁹⁹ €



HYDROCORTISON TAKEDA 10 mg/g, gelis, 10 g.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis. 1 g gelio yra 10 mg hidrokortizono. **Indikacijos.** Trumpalaikis lengvo odos niežulio ir sudirginimo malšinimas, esant nedideliams odos pažeidimams (pvz., po vabzdžių įgėlimo ar įkandimo). **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Suaugusiems 1–5 kartus per parą, vyresniems kaip 2 m. vaikams 1–2 kartus per parą ant odos tepi ploną sluoksnį gelio. Vartoti ne ilgiau kaip 7 paras. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, rožinė, perioralinis dermatitas, paprastieji spuogai, bakterinė, grybelinė arba parazitinė odos infekcija, kai netaikomas reikiamas gydymas, įtrijamas ausies būgnelio prakiurimas, vartojimas ant veido, išangės ar lytinių organų srities arba atvirų žaizdų, jaunesniems nei 2 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai.** Vartoti tik išorškai, saugotis, kad nepatektų į akis. Gali atsitrasti odos atrofiija, paūmėti virusinė, bakterinė ar grybelinė infekcija, suletėti žaizdų gijimas, pasireiškė regėjimo sutrikimai, ilgalaikis vartojimas ant veido gali sukelti kataraktą ar glaukomą. Jei atsiranda padidėjusio jautrumo simptomų, gydymą reikia nutraukti. Vengti vartojimo po uždaros drabužių (įskaitant uždaras sauskelnes) ar vietoje, kur oda liečiasi su oda. Teksto parengimo data: 2022-04-14 LT-HYCO-Z200001

NUMALŠINK IR ODOS SUDIRGINIMĄ, IR NIEŽĖJIMĄ!

ODOS IR LŪPŲ PŪSLELINEI GYDYTI

5⁹⁹ €



ACIC 5 % kremas, 2 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g kremo yra 50 mg acikloviro. **Terapinės indikacijos:** odos ir lūpų pūslelinė, kurią sukelia Herpes simplex virusas, gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** pažeistą odą vietai tepi plonu sluoksniu 5 kartus per parą kas 4 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas aciklovirui, valaciklovirui, propilenglikoliui arba bet kurioms pagalbinėms medžiagoms. Netepti ant gleivinės (burnos, akių, makšties). **Specialūs įspėjimai:** vaisto draudžiama nuryti. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 214, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS240336084. Teksto patvirtinimo data: 2024-03-13.

UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSLELINĘ SU „ACIC“!

7⁹⁷ €



TERBINAFIN-RATIOPHARM 10 mg/g kremas, 15 g.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g kremo yra 10 mg terbinafino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** odos infekcija, sukelta dermatofitų, tokių kaip *Trichophyton*, *Microsporum canis* ir *Epidermophyton floccosum*; mieliagrybių, daugiausia *Candida* genties; įvairiaspalvė dedervinė, sukelta *Phytosporum orbiculare* (*Malassezia furfur*). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir paaugliui (>12 m.): pėdos grybelis, blauzdos grybelis ir liemens grybelis: 1 kartą per parą, savaitę; odos kandidozė: 1 kartą per parą, 1–2 savaites; įvairiaspalvė dedervinė: 1–2 kartus per parą, 2 savaites. Tepi ant sausos ir švarios odos. „Terbinafin-ratiopharm“ 10 mg/g kremas turi būti tepamas ant pažeistos ir aplinkinės odos plonu sluoksniu ir tada švelniai įtrinama. Jei infekcija yra raukšlėse (po krotimi, tarpupiršiuose, sėdmenų raukšlėse arba kirkšnyje), po kremo užtepimo odą galima uždengti steriliu marlės gabaliu, ypač naktį. Simptomai palengvėja dažniausiai per kelias paras. Nereguliarius vaisto vartojimas arba ankstyvas nutraukimas padidina simptomų pasikartojimo riziką. Jei per 2 sav. nesterbima pagerėjimo, diagnozė turi būti svarstoma iš naujo. „Terbinafin-ratiopharm“ 10 mg/g kremo nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams, nes duomenų apie saugumą nepakanka. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** „Terbinafin-ratiopharm“ 10 mg/g kremas yra skirtas tik naudoti išorškai. Vengti patekimo į akis. Gali atsitrasti akių dirginimo požymiai. Atsitiktinai patekęs į akis, gerai plaukite jas tekančiu vandeniu. „Terbinafin-ratiopharm“ 10 mg/g kremą reikia laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Sudėtyje esantis cetosteario alkoholis ir celiulo alkoholis gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą). Benzilo alkoholis gali sukelti alerginių reakcijų ir nesukuri vietinį sudirginimą. **Reikiamos teksto parengimo data** 2025-01. OTC-LT-00090

-30% 6⁷¹ €



AMEDIPLUS, Pantenolio putos, 10%, 150 ml
KOSMETIKOS PRIEMONĖ

-25%



AMEDIPLUS

Pleistrai pūslelės, 2 x 6 cm, N5 4⁹⁹ 3⁷⁴ €
Pleistrai pūslelės, 6,9 x 4,4 cm, N5 5¹⁹ 3⁸⁹ €
MEDICINOS PRIEMONĖS

Mažas pajamas gaunantiems senjorams ir neįgaliesiems – kompensuojamos sauskelnės be priemokos

Lietuvoje šlapimo nelaikymas vargina apie 300 tūkst. gyventojų. Vieni su tuo susiduria tiesiogiai, kiti – slaugydami artimuosius. Tai moralinė našta – kaip kokybiškai prižiūrėti artimąjį, kad jis jaustųsi patogiai ir nenukentėtų jo orumas, o kai kuriais atvejais ir finansinė našta, nes reikia įsigyti tinkamų medicinos pagalbos priemonių.

Priemokų už kompensuojamas sauskelnes nėra mažas pajamas gaunantiems pensininkams ir negalia turintiems žmonėms, taip pat visiems vyresniems nei 75 metų senjorams.

Sveikatos apsaugos ministerijos priimti pokyčiai leidžia sumažinti finansinę naštą. Mažas pajamas gaunantys, sunkiai besiverčiantys senjorai ir turintieji negalią kompensuojamas sauskelnes gauna nemokėdami priemokų. Numatyta, kad priemokų už sauskelnes nebėra visiems 75 metų ir vyresniems žmonėms, taip pat senatvės pensininkams ir turintiesiems negalią (55 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis), kurių mėnesio pajamos (pensijos, socialinės išmokos, pašalpos) mažesnės nei 95 proc. praėjusių metų minimalių vartojimo poreikių dydis, tai yra 450 Eur.

Renkantis sauskelnes, itin svarbu rasti poreikius atitinkantį gaminį

Slaugant lovoje gulintį asmenį, labai svarbi kokybiška priežiūra, taigi – ir higienos priemonių, sauskelnių pasirinkimas. Mažai judantiems ar gulintiems asmenims rekomenduojama rinktis anatomines tradicinės formos sauskelnes „TENA Slip“. Slaugantieji

turėtų žinoti, kad kompensuojamos ne tik įprastos sauskelnės, bet ir sauskelnės-kelnaitės, pvz., „TENA Pants“. Dėl paprasto naudojimo, tarsi mūvint įprastas apatines kelnaites, nesikeičia nusistovėję dėvėjimo įpročiai, todėl tai yra puikus pasirinkimas sergantiesiems demencija, ar neramiems pacientams, kurie nepripažįsta įprastų sauskelnių. Jas renkami ir gulintys ligonius prižiūrintys slaugantieji, nes palengvėja priežiūra – sauskelnės-kelnaitės paprasta užmauti ir numauti, o drėgmės indikatorius parodo, kada reikia keisti.

Šlapimo nelaikymas – ne priežastis atsisakyti visaverčio gyvenimo

Šlapimo nelaikymas vargina ne tik slaugomus pacientus, bet ir darbingus, aktyvius senjorus. Neretai dėl šlapimo nelaikymo žmonės puola į depresiją, užsisklendžia, atsiriboja nuo viešumos. Svarbu nepamiršti – gyvename mokslo ir medicinos pažangos laikais, kai sergantieji gali jaustis patogiai, džiaugtis gyvenimu, užuot užsidarę tarp keturių sienų. Būtent

„TENA Pants“ kelnaitės, dėvimos kaip įprasti apatiniai drabužiai, leis gyventi aktyvų socialinį gyvenimą nesibaiminant, kad aplinkiniai pastebės problemą. Jos padės jaustis saugiai ir patikimai, nes šiuolaikinės technologijos apsaugo ne tik nuo šlapimo pratekėjimo, bet ir nuo nemalonaus kvapo.

Sveikos odos išsaugojimas

Tyrimai rodo, kad bene labiausiai šlapimo nelaikančiųjų odai kenkia papildoma drėgmė. Dėl specialios „FeelDry Advanced™“ technologijos „TENA Pants“ sauskelnės-kelnaitės akimirksniu sugeria skystį nuo paviršiaus į vidų, kad oda išliktų sausa. Tai mažina odos sąlytį su drėgme ir palaiko natūralų odos mikroklimatą. Pažangių technologijų dėka, rūpinimąsi sveikos odos išsaugojimu ne tik diena, bet ir naktį, palengvins specialiai nakčiai sukurtos sauskelnės-kelnaitės.



Tarptautinė odos sveikatos organizacija „Skin Health Alliance“ patvirtina, kad „TENA“ padeda išlaikyti odą sveiką.



www.tena.lt

N VAISTINĖ



KOSMETIKAI „ŽIEDĖ“

iki **-40%**





-40%

EPITOME Woman's Formula, 60 minkštųjų kapsulių 27⁹⁹ 16⁷⁹ €

MAISTO PAPILDAS

Specialiai moterims sukurtas kompleksas.

- Sudėtyje yra net 21 aktyvioji medžiaga – vitaminai, mineralai, omega-3 riebalų rūgštys ir antioksidantai: 500 mg žuvų taukų, 60 mg palmitoino rūgšties iš šaltalankių aliejaus, 3,5 mg silicio iš dirvinų asiūklių ekstrakto, citrusinių vaisių bioflavonoidų, 10 mg ECG polifenolių iš žaliosios arbatos ekstrakto, 8 grupės vitaminai, vitaminai C, D3, E ir tokie mineralai kaip cinkas, geležis, varis ir selenas.
- Sudėtyje naudojamos aktyvios ir aukštą bioįsisavinamumą turinčios mineralinės druskos: cinko bisglucinat, geležies fumaratas, L-selenometioninas, vario gliukonatas.
- Aukštos koncentracijos žuvų taukai, kurių 500 mg yra net 300 mg EPR + DHR.
- Natūralus silicis iš asiūklių ekstrakto.
- Patogu vartoti – tik 1 minkštoji kapsulė per dieną.

Intymiai higienai



IKI -30%

VAGISAN

KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS

Priemonės „Vagisan“ su natūraliu pieno rūgštimi skirtos tinkamai lytinių organų priežiūrai. Rūgštis aplinka – būtina sąlyga, kad laktobakterijos galėtų pačios gaminti pieno rūgštį ir daugintis. Taip užtikrinama optimali natūrali apsauga nuo infekcijos. Intymiosios higienos priemonės „Vagisan“ tinka kasdieni intymiajai higienai. Drėkinamasis makšties kremas „Vagisan“ sumažina tokius simptomus kaip sausumas, niežulys, deginimo pojūtis ir skausmas. Ovulės su pieno rūgštimi, skirtos natūraliai makšties pH terpei palaikyti ir atkurti.

TAVO INTYMIAI SVEIKATAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė – NEMOKAMAI!

GROŽVITA

GROŽVITA

MAISTO PAPILAI ODAI, NAGAMS, PLIAUKAMS

- GROŽVITA, 80 kapsulių 7⁹⁹ €
- GROŽVITA COLLAGEN, 42 tabletės 13⁹⁹ €
- GROŽVITA PLUS, 42 tabletės 11⁹⁹ €

GROŽVITA PRO

Kosmetika nuo plaukų slinkimo

- GROŽVITA PRO šampūnas, 200 ml 14⁹⁹ €
- GROŽVITA PRO serumas, 125 ml 14⁴⁹ €
- GROŽVITA PRO plaukų kaukė nuo plaukų slinkimo, 200 ml 19⁹⁹ €

GROŽVITA – tai vienas kitą papildantis produktai, bet galima naudoti ir atskirai pagal poreikį. Geriausią efektą pasieksite šampūną naudodami kartu su serumu nuo plaukų slinkimo, papilddami plaukus tos pačios linijos plaukų kauke ir sustiprinsite priežiūros poveikį gerdami maisto papildus Grožvita. BŪK GRAŽI SU „GROŽVITA“!

Makšties mikrobiotai normalizuoti ir palaikyti



12⁹⁷ €

COCILLO 10⁸ KSV makšties minkštosios kapsulės, 6 kapsulės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga yra *Lactobacillus plantarum* P 17630. Kiekvienoje makšties kapsulėje yra 10⁸ KSV (kolonijas sudarančių vienetų) *Lactobacillus plantarum* P 17630. **Indikacijos:** sutrikusios makšties mikrobiotos normalizavimui po bakterinės vaginozės gydymo antibiotikais; normalios makšties mikrobiotos palaikymui pasikartojančių makšties infekcijų atveju. 1 kapsulė reikia įstumti giliai į makštį naktį prieš miegą 6 paras, normalios makšties mikrobiotos palaikymui pasikartojančių makšties infekcijų atveju: 6 paras iš eilės naktį prieš miegą giliai į makštį reikia įstumti 1 makšties kapsulę. Jei reikia, ciklą galima kartoti kartą per mėnesį daugiau nei 2 mėnesius iš eilės. Moterys, sergančios menstruacijomis, turi pradėti gydymą iškart po menstruacijų. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai vaisto pagalbinei medžiagai; vaikams ir paauglėms iki 18 metų. **Specialūs įspėjimai:** nevartoti vietoje gydymo antibiotikais ar chemoterapijos, naudojant infekcijoms gydyti, bet jiems papildyti; nevartoti kartu su prezeratyvais ar kitais vietiniais kontracepcijos metodais (pvz., diaphragma), nes gali sumažinti jų veiksmingumą; gydymo COCILLO metu makšties drėkinimo antiseptiniais preparatais negalima taikyti; kapsulės sudėtyje yra parahidrosobenzoato, kurie gali sukelti alerginių reakcijų (jos gali būti uždelstos). **Reikiamas tekstas parengtas 2025-07-14.**



NUO 5⁷⁵ €

CANESTEN®, 10 mg/g kremas, 20 g 5⁷⁵ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: 1 g kremo yra 10 mg klotrimazolo. **Terapinės indikacijos:** odos ir išorinių gleivinių infekcijų, sukeltų klotrimazoliu jautrių mikroorganizmų, gydymas, *Candida* sukeltos vulvito gydymas kartu gydant vulvovaginalinę mikozę infekciją, *Candida* sukeltos balanito gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartojamas 2-3 kartus per parą. Užtepti plonu sluoksniu ir švelniai įtrinti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas klotrimazoliui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** gali sumažinti laktosio gaminių veiksmingumą ir saugumą, jeigu tepama lytinių organų srityje. Poveikis imunosupresantais, chemoterapija, sergantys diabetu, infekcija ŽIV, jaunesnės kaip 16 m. paauglės, nėščiosios per pirmuosius tris nėštumo mėnesius, prieš vartodami turi pasitarti su gydytoju. Vaikams (jaunesniems negu 12 m.) ir senyviems pacientams vartoti tik prižiūrint gydytoją. Vengti ilgalaikio gydymo dideliuose odos plotuose. Galima vartoti žindymo metu. Jeigu vartojamas šepetėlio srityje, prieš maitinant reikia nusiplauti krūtis. Sudėtyje yra cetosetario alkoholio ir benzoilo alkoholio, kurie gali sukelti vietinę odos bei alerginių reakcijų. **Reikiamas tekstas parengimo data 2024-11-01 CH-20240325-30** „CANESTEN“ KREMAS - GRYBELINĖS INFЕКЦИЈS GYDYMU! *Nr. 1 pasulyje pagal pardavimus nereguliuojamų ginekologinių priešgrybelinių preparatų kategorijoje. Remiantis 2023 m. pasulyne Nicholas Hall's OTC duomenų baze D86

CANESTEN® 500 mg makšties minkštoji kapsulė 11⁵⁰ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kapsulė yra 500 mg klotrimazolo. **Terapinės indikacijos:** makšties ir moters išorinių lyties organų infekcijų, sukeltų klotrimazoliu jautrių mikroorganizmų, tokių kaip grybeliai, gydymas. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** suaugusioms moterims ir paauglėms nuo 16 m.: 1 kapsulė įdedama kiek įmanoma giliai į makštį, naudojant pakuotėje esantį aplikatorių, geriausia gulint, vakare prieš miegą. Nėštumo metu kapsulė turi būti įdedama įpišt, be aplikatoriaus. Reikalinga gydytojo konsultacija, jei simptomai nepagerėja per 7 dienas. Jaunesnėms kaip 16 m. paauglėms galima vartoti tik po gydytojo konsultacijos. Saugumas ir veiksmingumas jaunesnėms kaip 12 m. mergaitėms neįrodyti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas klotrimazoliui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** reikia kreiptis į gydytoją, jeigu makšties infekcija pasiekia pirmą kartą, pirmojo nėštumo trimestro metu per pastaruosius šešis mėnesius infekcija pasikartoję daugiau nei du kartus; yra karščiavimas (≥ 38 °C); skauda apatinę pilvo dalį, nugara; atsiranda nemalonus kvapo išskyų iš makšties; pykinas; kraujuoja iš makšties ir (arba) tuo pat metu jautamas pečių skausmas. Nerekomenduojama gydyti menstruacijų metu. Vartojant vaistą negalima naudoti tamponų, makšties ploviklių, spermicidinių ar kitokių į makštį vartojamų preparatų, rekomenduojama vengti lytinių santykių. **Reikiamas tekstas parengimo data 2024-11-01 CH-20240325-30** „CANESTEN“ MAKŠTIES MINKŠTOJI KAPSULĖ - 1-OS DIENOS MAKŠTIES GRYBELINĖS INFЕКЦИЈS GYDYMAS!

MENOPACE, 30 tablečių 20⁴⁹ 12²⁹ €

MAISTO PAPILAI MOTERIMS MENOPAUZĖS PERIODU

„Menopace“ – biologikai aktyvių medžiagų kompleksas su sojų izoflavonais, kurie pagal savo struktūrą ir poveikį panašūs į moters lytinį hormoną estrogeną. Menopauzės laikotarpiu subalansuotas derinys pasižymi kompleksiniu poveikiu: hormonų balansui (vitaminas B6), psichologinei būsenai (foliatas, biotinas, magnis), kaulų funkcijai (cinkas, magnis), nuovargio mažinimui (geležis, pantoteno rūgštis). „MENOPACE“ – NELEISK MENOPAUZEI TAVĘS SUSTAABDYTI!



-40%



-30%

INTIMOHELP

MEDICINOS PRIEMONĖS

Makšties tabletės „Intimohelp“ atkuria ir palaiko fiziologinį makšties pH, slopina bakterijų plitimą. Priemonės sudėtyje esantis inulinas skatina natūralios bakterinės floros augimą, sugeria pagrausėjusias išskyras, naikina blogą kvapą. Sudėtyje yra inulino, hialurono rūgšties ir vitamino E. Naudojimo instrukcija: naudokite po 1 makšties tabletę vieną kartą per parą. **Intymios higienos emulsija „Intimohelp“** su rožių vandeniu ir hialurono rūgštimi padeda atkurti natūralią mikroflorą. Sudėtyje yra pieno rūgšties ir prebiotikų. Rožių vanduo veikia antiseptiškai ir ramina. Nėšdėję kiekį emulsijos užtepti ant rankos, nuplauti intymias vietas, pasukli nuskauti šiltu vandeniu. **Drėgnos intymios higienos servetėlės „Intimohelp“** su alavijų lapų ekstraktu ir D-pantenoliu švelniai valo ir nedirgina odos, užtikrina optimalią higieną bei kokioms intymios higienos. „INTIMOHELP“ – MOTERS INTYMIOS SVEIKATOS RECEPTAS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

Skubios pagalbos kontraceptikas



13⁹⁷ €

AVODELE 1,5 mg, 1 tabletė

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Avodele yra skubios pagalbos kontraceptikas, kurį galima pavartoti per 72 valandas (t. y. per tris paras) po lytinio akto, kurio metu kontraceptinės priemonės nebuvo naudotos arba naudota kontraceptinė priemonė nebuvo veiksminga. Avodele sudėtyje yra sintetinio hormono, veikliosios medžiagos, vadinamos levonorgestrelu. Suvaržtas per 72 valandas po nesaugaus lytinio akto, jis 79 % atvejų apsaugo nuo nėštumo. Vartojimas šiais atvejais: – lytinio akto metu nebuvo naudota kontraceptinė priemonė. Kaip vartoti Avodele: Viena tabletė įsivaista įvairiais būdais: 1) vartoti 1 tabletę 12 valandų (bet ne daugiau kaip 16 val.) po pirmosios tabletės išgerimo. Jei žinote arba manote, jog nesate nėščia, Avodele galite vartoti bet kurią ciklo dieną. Tablete nurykite nekratydami, užsigerkite vandeniu. Ji bus tuo veiksmingesnė, kuo greičiau ją išgersite. Avodele vartoti negalima: Jeigu yra alergija levonorgestrelui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos informacijoje lapelio 6 skyriuje). Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Prieš vartodama, pasitarkite su gydytoju, nes Avodele, kaip skubios kontracepcijos priemonė, jums gali netikti. Gydymo galia jums skirti kitokią skubios kontracepcijos priemonę. Kaip dažnai galima vartoti Avodele. Avodele vartojama tik neaiškliai atvejais ir nėra reguliarios kontracepcijos metodas. Galimas šalutinis poveikis. Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Labai dažnas. Šešėlytys (pykinimas); Gali būti nereguliaraus pakraujavimo; Ji pradedant mėnesinėms. Gali skaudėti pilvo apačią; Nuovargis; Galvos skausmas. Dažni Vėmimas; Gali pakenkti mėnesinių ciklas; Išgėrus šio vaisto, gali atsirasti krūtų jutrumas, viduriavimas, sąvaigulo pojūtis. Labai retas Berimasis, dilgėlinė, niežulys, veido patinimas, dubens sritys skausmas, skausmingos mėnesinės. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti. Jūsų sveikatai. Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant informaciname lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Ši informacija paskutinį kartą peržiūrėta 2024-09-01.



MAŽYLIUI IR MAMAI



IKI **-70%**

AMBIO KIDS

LAKTO-BIFIDOBAKTERIJOS, milteliai, 10 paketėlių **9⁹⁸ 2⁸⁴ € -70 %**

VITAMINAS D 400 TV, 30 kramtomųjų tablečių **7⁹⁸ 5¹⁹ € -35 %**

HYDROLIT COMPLEX, 200 ml **5⁴⁸ 3⁸⁴ € -30 %**

MAISTO PAPILDAS

Odos priežiūra ir
apsauga



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

SUDOCREM® MULTI-EXPERT

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Sudocrem“ Multi-Expert“ skirtas įvairių išsūtinių ir vystyklų bėrimų gydymui ir profilaktikai. Tinka kūdikių ir suaugusiųjų odos priežiūrai. Dėka subalansuotos sudėties, kremas švelniai gydo odos uždegimus, apsaugo odą nuo išorinių dirgiklių suformuodamas apsauginį odos barjerą. Sudėtyje esantis natūralus emolientas lanolinas gerai sugeria drėgmę ir minkština odą. Kremas išsaugo odos drėgmę ir nepalieka riebių sluoksnių odos paviršiuje kaip kiti kosmetiniai kremai nuo išsūtinių. Tepti plonu sluoksniu.

„SUDOCREM“ – TRIGUBAS EFEKTAS: ŠVELNIAI GYDO. RAMINA. APSAUGO

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



-35%

AMBIO

VITAMINAS C, geriamieji lašai, 30 ml **3⁸⁸ 2¹³ €**

MAISTO PAPILDAS

Žarnyno
mikroflorai



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

ACIDOLAC® JUNIOR, 20 meškiuko formos tablečių **10¹⁹ €**

ACIDOLAC® JUNIOR braškių skonio, 20 meškiuko formos tablečių **10¹⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

ACIDOLAC® JUNIOR meškiuko formos tablečių sudėtyje yra gerųjų žarnyno bakterijų *Lactobacillus acidophilus* La-14TM ir *Bifidobacterium lactis* BI-04TM, inulinis ir vitamino B6, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vartojamas: vyresniems kaip 3 m. vaikams ir suaugusiems vartoti po 1 meškiuko formos tabletę 2 kartus per parą. Be sacharozės ir gliutimo.

Karščiavimui mažinti ir
skausmui malšinti



NUO **4⁵⁰ €**

IBUSTAR

IBUSTAR 20 mg/ml geriamoji suspensija vaikams, 100 ml **4⁵⁰ €**

IBUSTAR 40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams, 100 ml **7⁷⁵ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Viename geriamosios suspensijos ml yra 20 mg arba 40mg ibuprofeno. „Ibustar“ yra uždegimą slopinantis ir skausmą malšinantis vaistinis preparatas (nesteroidinis vaistas nuo uždegimo), turintis karščiavimą mažinančių savybių. „Ibustar“ vartojamas kaip trumpalaikio simptominių gydymo priemonė: silpnas ar vidutinio stiprumo skausmai, karščiavimai malšinti. „Ibustar 20 mg/ml“ geriamoji suspensija tinka vaikams, svėriantiems 5–29 kg (amžius nuo 6 mėnesių iki 9 metų). „Ibustar 40 mg/ml“ geriamoji suspensija tinka vaikams, svėriantiems 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), paaugliams ir suaugusiems. Tinka vartoti tik per burną ir trumpai. Jeigu šio vaistinio preparato vaikams ir paaugliams reikia vartoti ilgiau kaip 3 dienas arba jeigu ligos požymiai blogėja, pasitarkite su gydytoju. Prieš vartojimą buteliuką supurtkite. „Ibustar“ vartoti negalima: jeigu yra alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu praėjusio buvo bronchų spazmas, astma, nosies gleivinės paburkimas, angioedema ar odos reakcijų po acetalisalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių uždegimų malšinamųjų vaistų vartojimo; jeigu yra nesėkmingų kraujojardos sutrikimų; jeigu buvo kraujavimas iš viršutinio trakto ar jo praeinimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; jeigu yra ar buvo praeityje skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa arba kraujavimas; jeigu yra kraujavimas iš smegenis arba kitoks kraujavimas; jeigu yra sunkios infekcijos, kepenų funkcijos ar sunkios širdies nepakankamumas; netekus daug skysčių; jeigu yra paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Ibustar“. Šalutinis poveikis gali sumažėti vartojant mažesniąją vaisto dozę trumpiausią laiką, būtina simptomų kontrolė. „Ibustar“ reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius. Jeigu Jūsų vaikai atsiranda skrandžio kraujavimas ar išopėjimas, nutraukite „Ibustar“ vartojimą. Nedelsdami informuokite gydytoją, jeigu atsiranda bet koks neįprastas simptomas pilve. Pastebėję bet kurį alerginės reakcijos į šį vaistą požymį ar sunkių odos reakcijų simptomų, nedelsdami nutraukite „Ibustar“ vartojimą ir kreipkitės į gydytoją arba greitosios medicinos pagalbos tarnybą. „Ibustar“ gali slopinti tokius infekcijos simptomus, kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl „Ibustar“ gali vėluoti tinkamai infekcijos gydymą, todėl gali padidėti komplikacijų rizika. Jei vartojate šį vaistą sirgdamas infekcine liga ir simptomai išlieka arba blogėja, nedelsdami pasitarkite su gydytoju. Sergant vėjaupais reikia vengti vartoti „Ibustar“. IT, Ibu_01_2024_VI_print UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 1947, IT@berlin-chemie.com Reklaminių tekstų paruošimo data 2024-08.

GREIT IR VĖL KARALIUS!



-30%

DOCTOR FISH OMEGA-3 + VITAMINS D & E, 30 kapsulių **11⁹⁸ 8³⁹ €**

MAISTO PAPILDAS SU SALKIKLIU

Maisto papildas sudėtyje yra omega-3 riebiųjų rūgščių (EPR ir DHR) ir vitaminų D ir E: EPR (eikozapentaeno rūgštis) ir DHR (dokozaheksaeno rūgštis) padeda palaikyti normalią širdies veiklą; DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją, išsaugoti normalų regėjimą; vitaminas D padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų, raumenų, dantų būklę; vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.

Pasiūlymai galioja **2025 08 01 – 2025 08 31**.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Nuolaidos taikomos prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą sąrašą. Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį/informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.


Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Daugiau informacijos NORFOS vaistinėje, tel. +370 800 10008, www.nvaistine.lt. MAŽYLIUI IR MAMAI skirtas prekes ypatingomis kainomis greičiau ir patogiau užsisakykite internetinėje vaistinėje www.nvaistine.lt. Užsisakius prekių (išskyrus vaistinius preparatus) už 29 € ir daugiau – pristatymas NEMOKAMAS! Reklaminių tekstų parengimo data – 2025 07 18.



AMBIO[®]

Vaistininų atrinkti
maisto papildai
geresnei tavo versijai



Maisto papildai



LAIMĖS VALANDOS

Darbo dienomis ir šeštadieniais
8-9 val. ir 14-15 val.*

Sekmadieniais
14-15 val.*



-30%

Perkant 3**
ir daugiau
prekių

-25%

Perkant
2* prekes

-20%

Perkant
1 prekę

**nereceptiniams vaistams -25%
receptiniams vaistams -20%

* vaistams -20%

Nuo 2023 m. spalio 23 d. NORFOS vaistinėje akcijos LAIMĖS VALANDOS metu perkant 1 prekę taikoma 20 % nuolaida, perkant 2 prekes – 25 % nuolaida, vaistams – 20 % nuolaida, o įsigyjant 3 ir daugiau prekių – 30 % nuolaida, nereceptiniams vaistams – 25 %, receptiniams – 20 % nuolaida.

Taikomos momentinės 20 % dydžio nuolaidos receptiniams vaistams, 20 ar 25 % nuolaidos nereceptiniams vaistams ir vaistiniams preparatams, o kitoms prekėms – 20, 25 arba 30 % nuolaidos, atsižvelgiant į atitinkamo pirkimo metu įsigyjamų prekių bendrą kiekį. Nuolaida taikoma perkant pilnas prekių pakuotes, kurių kiekvienos vertė arba priemoka ne mažesnė nei 1,50 euro. Prekės, perkamos su kompensuojamuoju receptu, įskaičiuojamos į įsigyjamų (perkamų) prekių krepšelį (kiekį), tačiau joms nuolaida netaikoma.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaidos netaikomos perkant su kompensuojamuoju receptu, mokant už skiepus, taip pat pradinio maitinimo pieno mišiniams, kartiniams (gaminamiems vaistinėje) ir vardiniam vaistams, įsigyjant dovanų kuponus, pakavimo maišelius. Nuolaidos netaikomos perkant www.gintarine.lt, net jei už prekes atsiskaitoma jais atsiimant vaistinėse. Nuolaidos netaikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Visos nuolaidos galioja tik su PC NORFOS lojalumo kortele.

Informaciją apie kitu nei nurodyta laiku vykstančias LAIMĖS VALANDAS rasite www.nvaistine.lt. Informacija apie kitas akcijas ir prekes, kurioms netaikomos akcijos LAIMĖS VALANDOS nuolaidos, suteikiama kiekvienoje vaistinėje, el. paštu info@nvaistine.lt arba nemokamu tel. 8 800 10008.

NVAISTINĖ
VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS