

TOP SPALIO PASIŪLYMAI



1+1


Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!



AMBIO
PATIRIANTIEMS ĮTAMPĄ, 15 kramtomųjų tablečių **6⁹⁹ €**
MAISTO PAPILDAS

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!



EPITOME
CARE DETOX FORMULA, milteliai, 240g **25⁹⁹ €**
MAISTO PAPILDAS

IKI -65%



RAMI ŠIRDIS
MAISTO PAPILDAS
„Rami širdis“ – gausios sudėties, dviejų poveikio maisto papildai, pripažinti Lietuvos vartotojų. Šios linijos preparatams būdinga puikiai suderinta sudėtis, kurioje, be vitaminų ir mineralų, yra natūralių augalinių ekstraktų, šimtmečius naudojamų medicinoje. Maisto papildai „Rami širdis“ padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir psichologinę funkciją, taip pat padeda mažinti nuovargį.
RAMIAME KŪNE-RAMI ŠIRDIS
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-50%



NATASPIN
CONTROL PRO, 30 kapsulių **18⁹⁹ 9⁵⁰ €**
CARDIO PROTECT, 30 kapsulių **20⁹⁹ 10⁵⁰ €**

MAISTO PAPILDAS
Išbandytė naujiena – 30 dienų kursą širdžiai ir jos apsaugai su „NatAspin CARDIO PROTECT“ – tai daugiafunkcė formulė, įkvėpta japonų ilgaamžiškumo filosofijos: širdžiai ir kraujotakai, apsaugai nuo oksidacinės pažeidimo, energijai ir normaliam ląstelių senėjimui, cholesterolio balansui, nervų sistemos ir psichologinei funkcijai. Teisinga cholesterolio kontrolė rinkitės 90 dienų kursą – „NatAspin CONTROL PRO“. Tai – pažangi, daugiafunkcė formulė, sukurta suteikti ilgalaikę cholesterolio kontrolę, palaikyti širdies ir kraujagyslių sistemos bei kepenų veiklą.
SUTEIKITE GYVYBĖS KRAUJOTAKAI.

NUO 4⁹⁹ €



GRIPEX THERMAL
GRIPEX THERMAL, 1000/100/12,2 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 8 paketėliai **6⁹⁹ €**
GRIPEX THERMAL, 1000/100/12,2 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 12 paketėlių **8⁹⁹ €**
GRIPEX THERMAL, 650/50/10 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 8 paketėliai **4⁹⁹ €**
GRIPEX THERMAL, 300/20/5 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 12 paketėlių **7⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veiklosios medžiagos, stiprumas: (1 paketėlyje): „Griplex Thermal 300/20/5 mg“: 300 mg paracetamolio, 20 mg askorbo rūgšties, 5 mg fenilefrino hidroklorido; „Griplex Thermal 650/50/10 mg“: 650 mg paracetamolio, 50 mg askorbo rūgšties, 10 mg fenilefrino hidroklorido; „Griplex Thermal 1000/100/12,2 mg“: 1000 mg paracetamolio, 100 mg askorbo rūgšties, 12,2 mg fenilefrino hidroklorido. Terapinės indikacijos: peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. „Griplex Thermal 300/20/5 mg“: 6–12 m. vaikams: 1 paketėlis kas 4–6 val.; suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams: 1–2 paketėliai kas 4–6 val. „Griplex Thermal 650/50/10 mg“ arba „Griplex Thermal 1000/100/12,2 mg“: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. vaikai: po 1 paketėlį kas 4–6 val. Nepasitarti su gydytoju, nevertokite ligių nei 7 d. Nevartokite didesnę nei rekomenduojamą dozę. Pasakykite gydytojui, jei įsitū į kitų ar kepenų veiklą sutrikus ar nusilp vartojate alkoholi. Kontraindikacijos: alergija veikliosioms arba pagalbinėms medžiagoms, taip pat vaistams, kurių sudėtyje yra simpatomimetinių aminių, širdies ligos, padidėjęs kraujospūdis, gliukozės-6-fosfodehidrogenazės arba metilglobozino reduktazės stoka; sunkus kepenų ar inkstų nepakankamumas; tirdoksinas; šlapimo užsilaikymas arba feochromocitoma; židovudino, MAO inhibitorių vartojimas; nėštumas ar kūdikio žindymas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju, jei sergate kepenų arba inkstų nepakankamumu, bronchine astma, prostatos hiperplazija, Reino sindromu (rankų ar kojų pirštų, ausies kraštų ir nosies galuko išblyškimas, dažnai sukeltas šalčio arba emocinio streso), širdies liga, padidėjusiu kraujospūdžiu, cukriniu diabetu. Reklamos teksto parengimo data 2025-05-09.
„GRIPEX THERMAL“: VEIKIUI!

4⁹⁹ €



VOLTAREN EMULGEL, 23,2 mg/g gelis, 50 g

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Diklofenako dietilaminas. **Terapinės indikacijos.** Suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: skausmo ir uždegimo mažinimas, kai yra minkštųjų audinių sužalojimas (sausgyslių, raiščių, raumėnų ir sąnarių trauma, pavyzdžiui, patempimas, sumušimas); vietinės minkštųjų audinių uždegimas (nugaros skausmas, tendinitas, bursitas). Tik suaugusiems (18 m. ir vyresniems): sąnarių (pvz., kelio) degeneracinės ligos sukeltam skausmui malšinti. **Vartojimas.** Vartoti ant odos. Tepti 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje. **Kontraindikacijos.** Alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitoms vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo; paskutinis nėštumo trimestras; jaunesniems kaip 14 m. paaugliams. **Specialūs įspėjimai.** Nelepti ant pažeistos odos, atvirus žaizdas, odos išbrimo ar egzemos vietos, didelės odos plotų, saugoti, kad nepatektų į akis ir ant gleivinės, pvz., burnos, nerūgti. Jeigu pasireiškia bėrimas, gydymą nutraukti; nenaudoti su oro nepraleidžiančiais tvarstiais. Sudėtyje yra propilenglikolio ir butilhidroksitolueno. Teksto parengimo data 2025-03. Prekių ženklai priklauso „Haleon“ arba „Haleon“ turi jų licenciją. ©2025 „Haleon“ arba licencijos turėtojas.

 - 50 % PIGIAU

-50%



ACONITUM

B TOTAL + MAGNE, 60 kapsulių **12⁹⁹ 6³⁰ €**

B COMPLEX, 40 kapsulių **14²⁹ 7¹⁵ €**

MAISTO PAPILDAI

„B total + magne“ sudėtis praturtinta ir magniu, kuris padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją bei normalią raumenu funkciją ir padeda mažinti nuovargį. Pakuotėje yra 2 mėnesių kursas. „B complex“ – tai įvairių, gerai subalansuotų B grupės vitaminų derinys tiems, kurie jaučia nervinę įtampą bei nuovargį. Mažinti nuovargį, palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą padeda vitaminai B2, B6, B12. Normalią odos būklę padeda palaikyti vitaminai B2, biotinas ir niacinas, o normalią plaukų būklę – biotinas. Normalią proteinę veiklą padeda palaikyti pantoteno rūgštis.

-50%



„LIVOL“ VITAMINAI

MAISTO PAPILDAI

Skandinaviski maisto papildai „Livol“ sukurti, remiantis holistiniu požiūriu į Jūsų organizmo sveikatą, todėl labai veiksmingi. Gaminami Danijoje nuo 1959 m. Kurdami „Livol“, Skandinavijos mokslininkai įvertino skirtingus žmonių poreikius ir pasiūlė saugią dozių bei efektyvius pasisavinimo (su EC gamybos technologija) vitaminus.

„LIVOL“ – AUKŠTOS KOKYBĖS DANIŠKI VITAMINAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-50%



ARTHROSTOP PROENZI

MAISTO PAPILDAI

„Arthrostop Proenzi“ maisto papildai sąnariams su gliukozaminu, chondroitinu, kolagenu ir bosvelijų ekstraktu. „Arthrostop Proenzi Collagen shots“ – dviejų tipų kolageno, vitaminų ir mineralų kombinacija sąnariams. Net 11000 mg hidrolizuoto ir 20 mg nendratuoto antrio tipo kolageno viename buteliuke! Naujiena – juodųjų serbentų skonio!

JUDEK LAISVA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-50%



PERMEN MAX, 30 tablečių **22⁹⁹ 11³⁵ €**

PROSTENAL CONTROL, 30 tablečių **11⁹⁹ 6⁰⁰ €**

PROSTENAL CONTROL, 60 tablečių **20⁹⁹ 10⁴⁵ €**

MAISTO PAPILDAI

„Permen Max“ – lytiniam potraukiui, pajėgumui ir normaliai erekcijos funkcijai palaikyti. „Permen Max“ yra patobulintas augalinių medžiagų derinys, papildytas L-argininu.

„Prostenal Control“ – normaliai prostatos funkcijai ir potencijai. Gulsčiųjų serenojų (Serenoa repens) vaisių ekstraktas padeda palaikyti normalią prostatos funkciją bei normalų šlapimo nutekėjimą. Didžiųjų dilgėlių (Urtica Dioica) šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią šlapimo takų ir inkstų funkciją.

Imunitetui

-50%



ISKIAL

ISKIAL MAX, 120 kapsulių **25⁹⁹ 13⁰⁰ €**

ISKIAL JUNIOR, 30 kramtomųjų kapsulių **22⁹⁹ 11⁵⁰ €**

MAISTO PAPILDAI

„Iskial“ – ryklių kepenų aliejus iš Islandijos, papildytas didele doze vitamino D3, kuris yra svarbus normaliai imuninės sistemos veiklai. Ryklių kepenų aliejus – tai vienas gausiausių natūralių, vertingų, biologiskai aktyvių medžiagų – alkilglicerolio ir skvaleno – šaltinių. „Iskial Junior“ sudėtyje kartu yra ir žuvų taukų, kuriuose gausu DHR rūgščių, svarbių normaliai smegenų funkcijai ir padedančių išsugauti normalų regėjimą. Tiks vaikams nuo 3 metų. „Iskial Max“ tiks suaugusiems ir vaikams nuo 6 metų.

„ISKIAL“ – RŪPINASI VISOS ŠEIMOS IMUNITETUI!

Kaulams ir sąnariams

-50%



GLUKOZAMINAS PLUS KOLAGENAS, CHONDROITINAS, MSM, 60 tablečių **17⁹⁹ 9⁰⁰ €**

MAISTO PAPILDAS

daugiau informacijos apie produktus www.vitaminai.lt

IKI 5 EURŲ

5€

Moderni kapsulė
nuo rėmens

3⁹⁹
€



ESCADRA 20 mg,

7 skrandyje neierios kietosios kapsulės

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: ezomeprazolas, 20 mg. **Terapinės indikacijos:** vaistas skirtas suaugusiųjų gastroezofaginio refliksio simptomų (pvz., rėmens ir skrandžio rūgšties regurgitacijos) trumpalaikiam gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 kapsulė) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, kapsules gali prireikti vartoti 2–3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Simptomams visiškai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Jeigu per 2 savaites nepagerėja simptomai, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Nėra tinkamų „Escadra“ vartojimo rekomendacijų jaunesnių kaip 18 metų vaikų populiacijai. **„Escadra“** yra trumpalaikis gastroezofaginio refliksio simptomo (pvz., rėmens ir rūgšties regurgitacijos) gydymas. Kapsulių negalima kramtyti ar smulkinti. Kapsules galima aldyti ir granules išmaitinti pusę stiklinės negazuoto vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pakeičiusiems benzimidazolams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Ezomeprazolo negalima vartoti kartu su neflinaviru. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pacientas reikia informuoti, kad kreiptis į gydytoją, jeigu jie patiria didelį kūno svorio mažėjimą dėl nežinomų priežasčių, pasikartojantį vėmimą, disagiją, vėmimą krauju ar mėlena, arba jeigu įtariama ar diagnozuojama skrandžio opa, būtina iširti, ar nėra piktybinės ligos, nes gydymas ezomeprazolu gali palengvinti šiuos simptomus ir uždelsti diagnozę nustatymą; jeigu jie anksčiau sirgo skrandžio opa arba patyrė virškinimo trakto operaciją; jeigu jiems 4 savaites arba ilgiau buvo taikomas nepatraukiamas simptominis nevirškinimo arba rėmens gydymas; jeigu jie serga gelta arba sunikia kepenų ląsčių; jeigu jie yra vyresni kaip 55 metų ir turi naują ar esančią piktąją simptomą. Pacientai, kurių pasikartojantis nevirškinimo ar rėmens simptomai ilgalaikiai, turi reguliarius intervalus lankytis pas savo gydytoją. Kaip ilgalaikio profilaktinio vaistinio preparato „Escadra“ pacientai neturi vartoti. Pacientai, kuriems reikia atlikti endoskopiją ar ureazės kvėpavimo testą, turi pasitarti su savo gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistinį preparatą. Ezomeprazolo skirti kartu su atazanaviru nerekomenduojami. Ezomeprazolo derinimas su klopidogrelu nepatvirtintas. Kitų PPI arba H2 receptorių blokatorių kartu su ezomeprazolu pacientams vartoti negalima. „Escadra“ sudėtyje yra sacharozės. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems yra fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktazės malabsorbcija arba sacharozės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2025.07.

Sloguojant

3⁴⁹
€



GALAZOLIN

0,05 % nosies lašai, tirpalas, 10 ml

0,1 % nosies lašai, tirpalas, 10 ml

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: ksilometazolino hidrochloridas. **Indikacijos:** nosies gleivinės paburkimo mažinimas peršalus ar susirgus alergine sloga, nosiaryklės gleivinės paburkimo mažinimas, gydant vidurinės ausies uždegimą. **Dozavimas:** 2–6 metų vaikams į kiekvieną nosies landą lašinti po 1–2 lašus 0,05 % koncentracijos tirpalo kas 8 val. Vyresniems negu 7 metų pacientams į kiekvieną nosies landą lašinti po 2–3 lašus 0,1% koncentracijos tirpalo kas 8–10 val. „Galazolin“ vartoti ilgiau kaip 5–7 dienas negalima. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, sausasis rinitas, uždaros kampo glaukoma. **Specialūs įspėjimai:** preparato negalima vartoti sergantiems lėtine ar vazomotorine sloga, jei jos gydymas užtrunka ilgiau negu dvi savaites. Atsargiai vartoti pacientams, kuriems negalima vartoti simpatikomitetikų. Nevartoti kartu su MAO inhibitoriais bei trikliais antidepresantais. NB! Informacija vartotojui yra sutrumpinta. Reklamos teksto parengimo data: 2025.01.

ĮŠLAISVINS TAVO NOSĮ!

Skausmui malšinti

3⁹⁹
€



NEOASKOFENAS, 200 mg/200 mg/40 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletyje yra 200 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg paracetamolio ir 40 mg kofeino. **Terapinės indikacijos:** vaistas vartojamas silpnų ir vidutinių stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių ir menstruacinių skausmų malšinimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Tabletes reikia vartoti nekrantant, užgeriant ne mažiau kaip 250 ml vandens. Atsižvelgiant į ligos sunkumą, vartoti po 1 tablete 1–4 kartus per dieną. Didžiausia paros dozė – 4 tabletės. Negalima vaisto gerti dažniau kaip kas 6 valandas. Skausmui malšinti vaisto galima vartoti ne ilgiau kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, esanti ar buvusi virškinimo trakto opa ir (arba) kraujavimas iš virškinimo trakto, buvusi bronchų astma, kurią sukėlė salicilatai ar kitokio nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, pacientas jaunesnis negu 12 metų, tų psichiniai nežinomi mėnesiai, žindymas, ligos, kurių metu yra padidėjęs kraujavimo pavojus, kraujo krešėjimo sutrikimas, vartojama 15 mg ar didesnė metotreksato savaitės dozė, sunkios širdies, kepenų, inkstų nepakankamumas, labai sunki padidėjusio kraujo spaudimo liga, kamuoja nemiga, padidėjęs nervingumas, dirglumas, nerimas, baimė, sąjūdimo ar kiti panašūs simptomai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergama podagra, bronchų astma, kolagenozėmis ar kraujodaros sistemos ligomis, susijusios su skydliaukės veikla ar sergama cukriniu diabetu, yra virškinimo trakto, inkstų, kepenų ar širdies funkcijos sutrikimai, yra buvusi alergija kitoms nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, planuojama chirurginė operacija, pacientas jaunesnis kaip 16 metų ir serga virusinėmis ligomis, pacientas yra senyvas, planuojama pastoti, atsiranda šlapimo pakitimų, pasireiškia paburkimas ar skausmas juosmens srityje, pagelsta oda ar akys, pasireiškia bendras silpnumas, yra nerimo sutrikimas, nemiga. Sudėtyje esantis kofeinas gali sukelti drebulį, dažną širdies plakimą, viduriavimą, susijaudinimą, stiprų širdies plakimą, nemiga, galvos skausmą, raumenų trūkčiojimą ir šlapimo išskyrimo padidėjimą. Reklamos teksto parengimo data 2024-11-12.

2⁷⁵
€



PARACETAMOL ZENTIVA 500 MG, 20 tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Kiekvienoje tabletyje yra 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos.** Trumpalaikis simptominis lengvo ar vidutinio stiprumo skausmo ir (arba) karščiavimo malšinimas. „Paracetamol Zentiva“ 500 mg tabletės skirtos suaugusiems, paaugliams ir 6 metų bei vyresniems vaikams, sergantiems daugia kaip 21 kg. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Reikia vartoti mažiausią veiksmingą dozę kiek galima trumpesį laiką. Didžiausios paros dozės viršyti negalima. Paracetamol dozuojamas atsižvelgiant į kūno svorį ir amžių, paprastai skiriant vienkartinę 10-15 mg/kg kūno svorio dozę, nevirsiant didžiausios paros dozės – 60 mg/kg kūno svorio. Tabletes reikia nuryti užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio, vartoti valgio metu arba po valgio. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas. Ūminis hepatitas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Paracetamol Zentiva“ nevartokite kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio. Vartojant didesnes nei rekomenduojama vaisto dozes, padidėja sunkaus kepenų pažeidimo pasireiškimo rizika. Vartodami šį vaistą negerkite alkoholinių gėrimų. Reklamos teksto parengimo data: 2025. rugsejis men. ID:000785499

4⁹⁹
€



LORATIN EXPRESS 10 mg tabletės, 10 tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletyje yra 10 mg loratadino. **Terapinės indikacijos:** simptominiis alerginės slogos ir lėtinės idiopatinės dilgėlinės gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems negu 2 metų vaikams – po 1 tablete per dieną. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas loratadinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nevartoti jaunesniems nei 2 metų arba sergantiems mažiau kaip 30 kg vaikams. **Specialūs įspėjimai:** vaistą atsargiai reikia vartoti pacientams, kuriems yra sunkus kepenų veiklos sutrikimas. „Sandoz Pharmaceuticals a.d.“: filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lt@lithuania@sandoz.com. BS2403136091. Teksto patvirtinimo data: 2024-03-13.

3⁹⁹
€



ACEMIS 600 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Acemis“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos acetilsalicilo rūgšties. „Acemis“ vartojamas gleivėms skystinti sergant lėtinėmis bronchų bei plaučių ligomis, kurių metu būna sutrikusi gleivių gamyba bei salinimas suaugusiems. Jeigu per 4–5 dienas Jūsų svajautas nepagerėja arba net pablogėja, kreipkitės į gydytoją. **Atidžiai perskaitykite visą pakuotės lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.** Visada vartokite šį vaistą tiksliai, kaip aprašyta lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. „Acemis“ vartoti draudžiama: • jeigu yra alergija acetilsalicinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos informacijoje lapelio 6 skyriaus); • jeigu pacientas yra jaunesnis negu 18 metų amžiaus. **Nėštumas ir žindymo laikotarpis.** Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. **Kaip vartoti „Acemis“.** Jeigu gydytojo nepadidinti kitoje, rekomenduojamas toliau nurodytas dozavimas. Suaugusiems žmonėms reikia įsigerti 1 disperguojamąją tablete (600 mg) kartą per dieną. Neviršyti 600 mg dozės per parą. **Vartojimo metodas.** Vaistas vartojamas po valgio. Disperguojamąją tablete reikia išstipinti stiklineje šilto vandens ir gerai išmaišyti, kad būtų gautas bespalvis, drumzės geriamasis tirpalas, kurį rekomenduojama įsigerti šilta. Gausius skysčius vartojimas stiprina „Acemis“ gleivių skystinamąjį poveikį. **Vartojimo trukmė.** Jeigu Jūsų simptomai sunkeja arba po 4–5 parų gydymo būklė nepagerėja, kreipkitės į gydytoją. **Tekstas pastarajį kartą peržiūrėtas 2023-12-14.** Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Vaistų vartojimo kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje <http://www.vvkt.lt/>.

NUO **1⁹⁹** €**IBUMETIN**400 mg, 10 pėvelė dengtų tablečių **1⁹⁹** €
400 mg, 20 pėvelė dengtų tablečių **3⁹⁹** €**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Veiklioji medžiaga: 1 tablete yra 200 mg arba 400 mg ibuprofeno. **Indikacijos:** trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip galvos, dantų, raumenų, sąnarių ar sukelto menstruacijų, malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams įprasta vienkarinė dozė yra 1-2 tabletės (IBUMETIN 200 mg arba 1 tablete IBUMETIN 400 mg). Didžiausia paros dozė yra 1200 mg. Tablete reikia užgerti stikline vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, acetilsalicilo rūgščiai arba kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU). Ugnias anksčiau sirgę acetilsalicilo rūgšties arba kitokių NVNU sukelta astma, angioneurozinė edema, dilgėlinė, rinitas ar kitokia padidėjusio jautrumo reakcija. Aktyvi arba buvusi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, opinis kolitas, kraujavimas iš virškinimo trakto ar kitoks kraujavimas, sunkūs kepenų, širdies, inkstų funkcijos nepakankamumas, hemoraginė diatezė, psukulinis ir nežinomo kilmės ar žindymo laikotarpis. Vaikams ir paaugliams iki 12 m. vartoti negalima. **Specialūs įspėjimai:** specialų atsargumo priemonių reikia, jei inkstų, kepenų arba širdies funkcija yra sutrikusi, yra buvę virškinimo trakto pažeidimų, sutrikęs kraujo krešėjimas arba vartojami antiagregantai, jei vartojama kiti NVNU ar vaistinių preparatų, galinčių padidinti skrandžio opos susidarymo pavojų, diuretikų ar nesteroidinių poveikį turinčių vaistinių preparatų, sergama cukriniu diabetu, nuodijama vilkligė ar kitomis kolagenozėmis. Krono liga, opinis kolitas, hipertenzija, periferinių arterijų liga, galvos smegenų kraujagyslių liga, astma, šienligė, yra nosies polipų ar lėtinę infekciją kvepavimo takų ligų, senyviams žmonėms. Pradėjus kraujavimui, abstradus opų ar odos reakcijų, vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir kuo skubiau kreiptis į gydytoją. Negalima vartoti, jei nustatytas paveldimas sutrikimas – Lapo lakazės stygius arba gliukozės ir galaktazės malabsorbcija. Pirmuosius 6 nėštumo mėnesius vartoti negalima, nebent tai neabejotina būtina ir taip pataria gydytojas. Teksto parengimo data: 2023-03-01

DRĖKINAMIEJI AKIŲ LAŠAI**-40%****STARAZOLIN SAUSOMS IR SUDIRGUSIOMS AKIMS** Natrio hialuronatas / deks-pantenolis, 10 ml (be konservantų) **14⁸⁰** €**STARAZOLIN HYDROFORTE** Natrio hialuronatas, 10 ml (be konservantų) **14⁸⁴** €**STARAZOLIN HYDROBALANCE PPH** Natrio hialuronatas, 2 x 5 ml **12⁴⁷** €**MEDICINOS PRIEMONĖS**

Drėkinamojo, raminaamojo ir apsauginio poveikio lašai, palengvinantys akies paviršiaus regeneraciją.

Starazolin sausoms ir sudirgusioms akims akių lašai skirti padėti sumažinti simptomus, esant lengvam ar vidutinio sunkumo sausų akių sindromui ir (arba) sudirgintam akies paviršiui. **Lašai drėkina akį, stabilizuoja akių pėvelę ir regeneruoja akies paviršių.**

Starazolin HydroForte – intensyviai drėkinantis akių lašai, skirti vartoti esant sunkiam sausų akių sindromui, o „Starazolin HydroBalance PPH“ suteikia veiksmingą ir ilgalaikį akių drėkinimą kiekvieną dieną.

Lašai rekomenduojami: esant akių aplinkos dirglumams; sumažėjus mirksėjimo dažniui; kai yra nepakankama ašarų gamyba arba jų sudėties pokytis; „Starazolin sausoms ir sudirgusioms akims“ ir „Starazolin HydroBalance PPH“ gali naudoti žmonės, nesijaušantys visų tipų kontaktinius lęšius. Prieš vartojant „Starazolin HydroForte“ reikia išsimiti kontaktinius lęšius. Įprasta dozė – 1-2 lašai 3 kartus per parą į kiekvienos akies junginę maišėlį.

NUO **2⁹⁹** €**BRONTEX**15 mg/5 ml, sirupas, 100 ml **4⁹⁹** €
30 mg, 20 tablečių **2⁹⁹** €
7,5 mg/ml, geriamieji lašai, tirpalas, 100 ml **5⁹⁹** €
60 mg šnypščiosios tabletės, 10 tablečių **4⁹⁹** €**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Veiklioji medžiaga, sirupas: 5 ml sirupo yra 15 mg, 1 tablete yra 30 mg, 1 ml tirpalo (14-je lašų) yra 7,5 mg, 1 šnypščioji tablete yra 60 mg ambroksolio hidrochlorido.

Dozavimas ir vartojimo metodas: 2-5 m. vaikams – 3 kartus per parą po 7,5 mg ambroksolio (1 ml lašų arba 2,5 ml sirupo); 6-12 m. vaikams – 2-3 kartus per parą po 15 mg (2 ml lašų arba 5 ml sirupo, arba po 1/2 tabletes); suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams – 2-3 kartus per parą po 30 mg (4 ml lašų arba 10 ml sirupo, 1 tablete arba 1/2 šnypščiosios tabletės) arba inhaliuoti lašus 1-2 kartus per parą po 15-22,5 mg (po 2-3 ml lašų). Sergantiesiems sunkių inkstų veiklos nepakankamumu, dozę mažinti ir (arba) vartoti rečiau. Ambroksolio neperatama vartoti ilgiau negu 4-5 paras. Jei simptomai negerėja arba po 5 parų paliegia, reikalinga gydytojo konsultacija. Šnypščiosios tabletės reikia trinti stikline vandens.

Kontraindikacijos: „Bronxex“ (visų formų) negalima vartoti jaunesniems kaip 2 m. vaikams, tablečių – jaunesniems kaip 6 m. vaikams, šnypščiųjų tablečių – jaunesniems kaip 12 m. vaikams. „Bronxex“ negalima vartoti, jei padidėjęs jautrumas ambroksoliui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** vartoti atsargiai, jei sutrikusi bronchų motorika ir padidėjus gleivių sekrecija, sutrikusi inkstų veikla, sergant sunkia kepenų liga, buvęs pepsinės opal, nutačius fruktozės netoleravimą, sergantiems cukriniu diabetu (vartojant sirupą). Pasirūšiusi odos išbėrimai (kartais susijusiam su poodėmis ar gleivinės pažeidimais), reikia nedelsiant nutraukti gydymą. „Bronxex“ tablečių (dėl sudėtyje esančios laktozės) ir šnypščiųjų tablečių (dėl sudėtyje esančių laktozės ir maltodekstrino) negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas viskas laktozės stygius arba gliukozės ir galaktazės malabsorbcija. „Bronxex“, 60 mg šnypščiųjų tablečių sudėtyje esantis benzilo alkoholis gali sukelti alerginių reakcijų. Vartoti atsargiai nėščioms moterims ir žindydams. Dėl sudėtyje esančio sorbitolio šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas į gimtą fruktozės netoleravimas. **Teksto perėjimo data:** „Bronxex“, 15 mg/5 ml, sirupas – 2024-07-22; „Bronxex“, 30 mg, tabletės, ir „Bronxex“, 7,5 mg/ml, geriamieji lašai, tirpalas – 2027-08-02; „Bronxex“, 60 mg, šnypščiosios tabletės – 2022-10-29. Reklamos teksto parengimo data 2025-07-01, BROT-11-00061

NUO **2⁹⁹** €**HJERTEMAGNYL**150 mg, 30 pėvelė dengtų tablečių **2⁹⁹** €150 mg, 90 pėvelė dengtų tablečių **6⁹⁹** €75 mg, 100 pėvelė dengtų tablečių **4⁹⁹** €**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Veiklioji medžiaga: 1 tablete yra 75 mg arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties. **Indikacijos:** trombozės profilaktika, sergant išemine širdies liga, po miokardo infarkto, išeminio smegenų insulto ar praeinančiojo smegenų išemijos (kraujotakos sutrikimo) priepuolio. Vaistas slopina trombocitų (kraujo plokštelių) agregaciją (sukibimą), todėl jo vartojama krešulių, susidariusių iš sukibusių kraujo plokštelių, atsiradimo rizikai mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną, užsigeriant stikline vandens; įprastinė dozė ilgalaikiam vartojimui yra 75 – 150 mg vieną kartą per parą. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, padidėjęs jautrumas kitiems salicilatams; jei neseniai kraujavo į virškinamąjį traktą; yra polinkis į kraujavimą, ūminė pepsinė opa, sunkūs inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, šlapime padaugėjo oksalatų, jeigu yra trys paskutiniai mėnesiai žindymas; vaikams ir paaugliams, jaunesniems kaip 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai vartoti, jei pacientas serga bronchų astma, šienlige, nosies polipais ar kita lėtine kvėpavimo takų liga, gydymui atsparia hipertenzija, podagra, esant gliukozės 6-fosfatdehidrogenazės stokai, sutrikusiai kepenų ir (ar) inkstų arba virškinimo trakto funkcijai, likus 10 parų iki chirurginės operacijos, senyvo amžiaus pacientams nepatartina ilgai vartoti dėl galimos kraujavimo iš virškinamojo trakto rizikos, esant vaikų ir paauglių virusinėms infekcijoms. Teksto parengimo data: 2022-04-07, LT-HJERT-220001

NUO **5⁹⁹** €**LARYXIN**LARYXIN LEMON, 5 mg/1 mg, 24 suslėgtosios pastilės **5⁹⁹** €LARYXIN MENTHOL, 5 mg/1 mg, 24 suslėgtosios pastilės **5⁹⁹** €LARYXIN MENTHOL, 2 mg/0,5 mg/ml, burnos gleivinės purškalas (tirpalas), 30 ml **6⁹⁹** €**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Sudėtis: suslėgtosios pastilės: 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido ir 1 mg lidokaino hidrochlorido monohidrato; burnos gleivinės purškalas: 1 išpurškime yra 0,17 mg chlorheksidino diglukonato ir 0,043 mg lidokaino hidrochlorido monohidrato. **Indikacijos:** gerklės skausmo simptomų malšinimas suaugusiems ir 12 m. bei vyresniams paaugliams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suslėgtosios pastilės: leiskite pastilėi lėtai ištirpti burnoje. Suaugusiems – po 1 pastilę kas 2-3 val., bet ne daugiau kaip 10 pastilių per dieną, 12-18 m. paaugliams – po 1 pastilę kas 2-3 val., bet ne daugiau kaip 5 pastiles per dieną. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 5 dienas iš eilės. Burnos gleivinės purškalas: vartoti ant burnos gleivinės. Suaugusiems – po 3-5 išpurškimus į galingę gerklės dalį kas 2-3 val., bet ne daugiau kaip 10 kartų per parą, 12-18 m. paaugliams – po 2-3 išpurškimus į galingę gerklės dalį kas 2-3 val., bet ne daugiau kaip 5 kartus per parą. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 5 dienas iš eilės. **Kontraindikacijos:** alergija chlorheksidiniui, lidokainui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jaunesniems kaip 6 m. vaikams ir paaugliams. **Specialūs įspėjimai:** vaistą vartokite tik trumpą laiką skausmui ir dirginimui malšinti. Kreipkitės į gydytoją, jei per 3-4 dienas jūsų sąjauja nepagerėjo arba karščiujate, skauda galvą, pykina, vemiate ar atsiranda odos išbėrimas. Jeigu esate alergiški kitiems vietiniams amidių grupės anestetikams, parvadžiu, lidokainui, turite laikytis saugumo priemonių. Vartojant didesnes nei rekomenduojamas dozes, gali sumažėti rijimo refleksų valdymas. Dėl to gali padidėti skystųjų ir maisto daiktų įkvėpimo rizika. Nevartokite tuo pačiu metu, prieš pat ar iš karto po kitų burnos ir (arba) gerklės dezinfekavimo priemonių vartojimo. „Laryxin Lemon“ suslėgtųjų pastilių sudėtyje yra sorbitolio (fruktozės šaltinis, taip pat gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurius laisvinantį poveikį), aspartamo (fenilalanino šaltinis, gali būti kenksmingas sergantiems fenilketonurija), benzilo alkoholio (gali sukelti alerginių reakcijų), maltodekstrino (jis skaidomas į gliukozę) ir natrlio (dėl maisto kiekio jis beveik neturi reikšmės). „Laryxin Menthol“ suslėgtųjų pastilių sudėtyje yra sorbitolio ir levomentolio (dodant vartoti mažesnę dozę), vaikams, kuriems anksčiau yra buvę traukulių, reikia laikytis saugumo priemonių. „Laryxin Menthol“ burnos gleivinės purškalo sudėtyje yra etanolio (96 %) ir levomentolio. Mažas alkoholio (etanolio) kiekis, esantis šio vaisto sudėtyje, nesukelia pastebimo poveikio. Reklamos teksto parengimo data 2024-12-12, LT-LARY-240000X

NERVŲ SISTEMAINUO **3⁹⁹** €**NEUROMULTIVIT**20 pėvelė dengtų tablečių **3⁹⁹** €100 pėvelė dengtų tablečių **15⁹⁹** €**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Indikacijos: „Neuromultivit“ yra vitamino B₁, vitamino B₆ ir vitamino B₁₂, kurie yra ypač svarbūs užtikrinant normalias nervų sistemos medžiagų apykaitos funkcijas, derinys. Vartojant nervų sistemos ligų gydymui B grupės vitaminai atstato jų stoką organizme ir skatina nervinio audinio natūralų gijimo procesą. „Neuromultivit“ vartojamas esant B grupės vitaminų stoks sukeltiems negalavimams. Vitaminas B₁₂ pasižymi skausmą malšinančiu poveikiu. **Vartojimas:** rekomenduojama dozė yra viena tablete kartą per parą. Pavieniais atvejais paros dozė galima padidinti iki 3 tablečių. Tabletes reikia nuryti nesukramtytas po valgyimo ir užsigeriant truputį skysčio. **Kontraindikacijos:** retai pasitaiko nespecifinių požymių – vėmimas, galvos skausmas ir svajulys. Mažiau tikėtinos padidėjusio jautrumo reakcijos, kurios vartojant vitaminus B₁, arba B₆, dažniausiai reikšiasi požymiais odoje. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Neuromultivit“ vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas vitaminui B₁, vitaminui B₆, vitaminui B₁₂, arba bet kuriai pagalbinei „Neuromultivit“ medžiagai. Negalima vartoti vaikams ir paaugliams (jaunesniems negu 18 metų) dėl per didelio veikliųjų medžiagų kiekio. Nedelsiant pranešti gydytojui, jei yra kontraindikacijų vaisto vartojimui, atsiradę šalutinio poveikio požymiai ar pastojė. Reikėtų vengti vartoti dišleto vaisto dozes ilgiau nei 4 savaites. Vitaminas B₁₂ gali sumažinti kartu vartojamos L-dopos poveikį. **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:** G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. **Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį RTT atstovą:** UAB „G.L. Pharma Vilnius“, A. Jakšto g. 12, Vilnius, tel. (8) 261 0705, el. paštas: office@gl-pharma.lt; www.gl-pharma.lt. Reklamos teksto parengimo data: 2025 06 13.

NUO SLOGOS

NUO 3⁹⁹ €

XYMELIN

XYMELIN, 1 mg/ml, nosies lašai (tirpalas), 10 ml 3⁹⁹ €
 XYMELIN MENTHOL, 1 mg/ml, nosies purškalo (tirpalas), 10 ml 5⁴⁹ €
 XYMELIN, 1 mg/ml, nosies purškalo (tirpalas), 10 ml 4⁹⁹ €

NERECIPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Sudėtis: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. **Indikacijos:** susirgus persalimo ligomis, paburkus nosies gleivinei arba pasireiškus nosies ančių uždegimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 10 metų paaugliams XYMELIN MENTHOL atveju – vyresniems kaip 12 metų paaugliams 1 įpurškimas arba 1–2 lašai į kiekvieną nosies 2–3 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, uždaro kampo glaukoma, sausasis nosies gleivinės uždegimas, atrofinitis rinitas (XYMELIN MENTHOL atveju), jei hipofizės ar smegenų operacija atlikta pro nosį arba burną; XYMELIN MENTHOL: jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai:** Vartoti atsargiai, jei yra antinksčių navikas (feochromocitoma), susiję su skydliaukės veikla, sergate cukriniu diabetu ar sutrikęs šlapinimasis dėl padidėjusios prostatos. Sergant sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis ar ligomis, kurių metu susiaurėja kraujagyslės, vartoti tik su gydytojo leidimu. Ilgiau kaip 7 paras šio vaisto vartoti draudžiama. Dažnai ir ilgai vartojant vaisto gali atsinaujinti nosies gleivinės paburkimas, susilpnėti jo slopinimas ir atsirasti nosies užgulimas. Gali sukelti miego sutrikimų, galvos svaigimą, tremorą, širdies ritmo sutrikimą, aukštą kraujospūdį. XYMELIN nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 10 metų vaikams. XYMELIN MENTHOL: Pasitarti su gydytoju arba vaistininku, jei vartojate arba per paskutines dvi savaites vartojote vaistų nuo depresijos, vadinamų monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI). Reklamos teksto parengimo data: 28.03.2024 LT-XYME-Z200004

NUO 9⁹⁹ €

NICORETTE

NICORETTE COOLMINT 1 mg/išpurškime burnos gleivinės purškalo (tirpalas), 150 išpurškimų 19⁹⁹ €
 NICORETTE INVISIPATCH 10 mg/16 h (15 mg/16 h; 25 mg/16 h) transderminiai pleistras, 7 transderminiai pleistrai 24⁹⁹ €
 NICORETTE FRESHFRUIT 2 mg (4 mg) vaistinė kramtomoji guma, 30 vienetų 9⁹⁹ €
 NICORETTE FRESHMINT 2 mg (4 mg) vaistinė kramtomoji guma, 30 vienetų 9⁹⁹ €

NERECIPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: viename įpurškime yra 2 mg (4 mg) nikotino (režinas pavaldus); viename pleistre yra 15,75 mg/23,62 mg/39,37 mg nikotino kiekviename išpurškime (0,01 ml tirpalo) yra 1 mg nikotino. 1 ml tirpalo yra 15,75 mg nikotino. **Indikacijos:** vaistinė kramtomoji guma, transderminiai pleistrai: priklausomybė nuo tabako gydyti, lengvinant nutraukimo simptomus, kad būtų lengviau laikinai susikaupti nuo rūkymo, o aspirendis – mesti rūkyti; purškalo: priklausomybė nuo tabako gydymas, sumažinant potraukį nikotinui ir palengvinant nutraukimo simptomus, kurie atsiranda metant rūkyti staiga ar palaipsniui. Tikslas yra visam laikui nutraukti tabako vartojimą. „nicorette coolmint“ geluosis vartoti kartu su elgesio pakaitymo programa. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** paprastai rūkoma, arba įvairių rūkymo poreikis rūkyti. Galima vartoti iki 4 įpurškimų per valandą, negalima pūsti daugiau kaip 2 įpurškimus iš karto, per 24 valandas nevirsyti 64 įpurškimų (4 įpurškimai per valandą, 16 valandų periode). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas nikotinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Guminis negalima kramtyti vaikams iki 12 metų. Purškalo negalima vartoti jaunesniems kaip 18 m. pacientams, nerūkantiems pacientams. **Specialūs įspėjimai:** prieš vartojimą „nicorette“ pleistrai su gydytoju, įsigyti turėtų širdies infarkto, insulto, sergate nestabilia arba progresuojančia krūtinės angina, sunkiomis širdies aritmijomis, yra nekontroliuojama hipertenzija, pradėję naudoti nikotino pakeičiamąją terapiją, turi atidžiau sekti savo cukraus kiekį kraujyje. Galima rizika ir laukiamo gydymo nudausta turi būti apsvaistyta gydytoju, jeigu pacientas serga inkstų ir kepenų nepakankamumu, feochromocitoma ir nekontroliuojama hipertenzija, virškinimo trakto ligomis. Jeigu sergate žvyneline, lėtinu dermatitu ar dilgeline, neikiškite „nicorette“ pleistro ant pažeistos odos. Norint išvengti nudegimų rūkosis, pleistrai reikia nuimti prieš atliekant magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą. Kramtomoji guma gali prikloti prie dantų protezo ir jį sugadinti. Kramtomąją gumą ir purškalo sudėtyje yra buthidrokisobuteno, kuris gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivinę. Kramtomųjų gumų sudėtyje yra ksilitolio, kuris gali kaupti vidutinis. Reklamos teksto parengimo data: 2025.04. LT-NC-2025-15329

NUO GERKLĖS SKAUSMO IR UŽDEGIMO

NUO 6⁹⁹ €

DECATYLEN™

DECATYLEN™, 0,25 mg/0,03 mg, 20 kietųjų pastilių 6⁹⁹ €
 DECATYLEN, 0,25 mg/0,03 mg, 40 kietųjų pastilių 9⁹⁹ €

NERECIPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 pastilėje yra 0,25 mg dekalvilio chlorido, 0,03 mg cinkochaino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** burnos ir ryklės uždegimo (gingivito, opinio ir aftinio stomatito, faringito) vietinis gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams kas 3 val. lėtai susiūplinti po 1 pastilę, 4–12 m. vaikams kas 3 val. lėtai susiūplinti po 1 pastilę. Kai uždegimo simptomų sumažėja, vartoti po 1 pastilę kas 4 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai ar keltiviniams aminorio dariniams (pvz., benzalkonio chloridui). **Specialūs įspėjimai ir atargumo priemonės:** „Decatylene“ sudėtyje yra sorbitolio. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurius laisvinantį poveikį. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-01-13. DCTL-LT-00019

KAI REIKIA NE TIK MALŠINTI SIMPTOMUS, BET IR VYDYTI GERKLĖS SKAUSMĄ!

NUO 4⁹⁹ €

STREPSILS INTENSIVE

8,75 mg, 16 kietųjų pastilių 4⁹⁹ €
 8,75 mg, 24 kietosios pastilės 9⁹⁹ €

NERECIPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg flurbiprofeno. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikis simptominis gerklės skausmo gydymas suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. amžiaus vaikams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: kas 3–6 val. (kai reikia) lėtai susiūplinti (leisti ištirpti) burnoje, čiulpti reikia įdėti burnoje, kad būtų išvengta lokalaus dirginimo po 1 kietojo pastilę. Per 24 val. galima suvartoti ne daugiau kaip 5 kietąsias pastiles. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; anksčiau buvusios acetalicidinio rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) sukeltos padidėjusio jautrumo reakcijos (pvz., astma, bronchų spazmas, rinitas, angioneurozinė edema ar dilgėlinė); yra ar anksčiau buvo pepsinė opa ar kraujavimas iš opos (nustatyti du ar daugiau neuįsigijusių opalų epizodų) bei žarnyno opos; anksčiau buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo perforacija; sunkus koštas; kraujavimo ar kraujodaros sutrikimai; susiję su ankstesniu NVNU vartojimu; paskutinis nėštumo trimestras; sunkus širdies, inkstų, kepenų nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai:** reikia atsargiai vartoti pacientams, kurie serga sistetine raudonoja vilkige ir mišria jungiamojo audinio liga, serga tonzilitu (tonzilių uždegimu) ar mano, kad serga bakterijų sukelta gerklės infekcine liga, turi širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų, sirgo virškinimo trakto ligomis (pvz., opinio kolito, Krono liga), jei pasireiškia pirmosios odos reakcijos (šbėrimas, lupimasis, pūslių atsiradimas) arba kitokio alerginės reakcijos požymiai, nešiosios pirmuosius 6 mėnesius ar žindydami bei senyviems pacientams. Tokie vaistai gali būti susiję su nedideliu širdies priepuoliu (miokardo infarkto) ar insulto rizikos padidėjimu. Vaisto sudėtyje yra gliukozės ir sacharozės (cukraus), i tai turėtų būti atsižvelgiama sergant cukriniu diabetu. Jeigu pacientas yra alergiškas (alergiska) kvėčiama (ši liga skiriasi nuo celiakijos), šio vaisto vartoti negalima. Sudėtyje esantys citralis, citronėlis, d-limonenas, farnezolis, geraniolis ir linalolis gali sukelti alerginių reakcijų, siera dioksidas gali sukelti sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų ir bronchų spazmą, buthidrokisobuteno gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivinę. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktosės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2025-09-18.

6⁹⁹ €

STREPSILS

STREPSILS HONEY & LEMON, 1,2 mg/0,6 mg, 24 kietosios pastilės
 STREPSILS MENTHOL & EUCALYPTUS, 1,2 mg/0,6 mg/8 mg, 24 kietosios pastilės
 STREPSILS VITAMIN C, 1,2 mg/0,6 mg/100 mg, 24 kietosios pastilės

NERECIPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 1,2 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio, 0,6 mg amilmetakrezolio, 100 mg askorbo rūgšties („Strepsils Vitamin C“) ir 8 mg levomentolio („Strepsils Menthol & Eucalyptus“). **Terapinės indikacijos:** lokalaus simptominio ryklės uždegimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Strepsils Honey & Lemon“ ir „Strepsils Vitamin C“: suaugusiems ir vyresniems nei 6 m. amžiaus vaikams bei paaugliams: 1 kietojo pastilę kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 8 kietosias pastiles per 24 val. „Strepsils Menthol & Eucalyptus“: suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. amžiaus vaikams bei paaugliams: 1 kietojo pastilę kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 8 kietosias pastiles per 24 val. Vartoti 1 burną ir ryklę. Kietąją pastilę leisti lėtai ištirpti burnoje. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šių vaistų medžiagai; jaunesniems nei 12 m. vaikams („Strepsils Menthol & Eucalyptus“); jaunesniems nei 6 m. vaikams („Strepsils Honey & Lemon“ ir „Strepsils Vitamin C“). **Specialūs įspėjimai:** dėl užspringimo pavojaus nerekomenduojama vartoti mažiems vaikams. Šių vaistų negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktosės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. „Strepsils Vitamin C“ sudėtyje yra azodaktilis – Ponso 4R (E124) ir saulelydyto geltonejo (E110), kurie gali sukelti alerginių reakcijų. Jeigu pacientas yra alergiškas kvėčiama (ši liga skiriasi nuo celiakijos), tuomet šių vaistų vartoti negalima. „Strepsils Honey & Lemon“ ir „Strepsils Vitamin C“ kvapiosios medžiagos sudėtyje yra citralis, citronėlio („Strepsils Vitamin C“ sudėtyje), d-limoneno, geraniolio ir linalolio. Citralis, d-limonenas, geraniolis ir linalolis gali sukelti alerginių reakcijų. „Strepsils Menthol & Eucalyptus“ kvapiosios medžiagos sudėtyje yra d-limoneno. D-limonenas gali sukelti alerginių reakcijų. Šių vaistų sudėtyje yra siera dioksido (E220). Retais atvejais gali sukelti sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų ir bronchų spazmą. Reklamos teksto parengimo data 2025-09-18.

DIENAI BE STRESO, GERESNIAI MIEGUI NAKTĮ

6⁹⁹ €

NEUREXAN, 50 tablečių

HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS

NERECIPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tablečių yra veikliųjų medžiagų: 0,6 mg *Avena sativa* D2, 0,6 mg *Coffea arabica* D2, 0,6 mg *Passiflora incarnata* D2, 0,6 mg *Zincum isovalericum* D4. **Indikacijos:** Miego sutrikimų ir nerimastingumo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Suaugusiems žmonėms ir paaugliams nuo 12 metų vartoti po 1 tablete 3 kartus per dieną. Pradžioje, jei simptomai stiprūs, galima vartoti po 1 tablete kas 0,5–1 val., neviršyti 12 tablečių per dieną. Simptomams palengvėjus, gydymą tęsti prastine doze. „Neurexan“ saugumas ir veiksmingumas jaunesniems kaip 12 metų vaikams neįrodyti. Duomenų nėra. Prieš nuryjant tablete reikia ištrinti burną. Ją vartoti likus ne mažiau kaip 30 min. iki valgio. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veiklosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atargumo priemonės.** „Neurexan“ sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktosės netoleravimas, visiškas laktozės stygius arba gliukozės ir galaktosės malabsorbcija. „Neurexan“ nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Registravimas.** „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). **Registravimas atstovas.** UAB „Farmahel“, www.heel.lt. Teksto parengimo data 2022-10-04.

NUO 4⁹⁹ €

ACC

ACC LONG 600 mg, 10 šnypščiujų tablečių 6⁹⁹ €ACC 200 mg, 20 šnypščiujų tablečių 5⁴⁹ €ACC 200 mg milteliai geriamajam tirpalui, 20 paketėlių 5⁴⁹ €ACC 100 mg milteliai geriamajam tirpalui, 20 paketėlių 4⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: ACC 100 mg milteliai geriamajam tirpalui, ACC 200 mg milteliai geriamajam tirpalui, ACC 200 mg šnypščiosios tabletės, ACC 600 mg šnypščiosios tabletės, acetylcisteinas. **Terapinės indikacijos:** gleivių skystinimas sergant ūminėmis ar lėtinėmis bronchių bei plaučių ligomis, kurių metu būna sutrikusi gleivių gamyba bei šalinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** 2–5 m. vaikams – 100 mg 2 kartus per dieną; 6–14 m. vaikams – 200 mg 2 kartus per dieną; vyresniems kaip 14 metų – 600 mg acetylcisteino. Vartoti per burną. **Kontraindikacijos:** jaunesni nei 2 metų vaikai; ACC LONG 600 mg šnypščiosios tabletės netinka jaunesniems nei 14 metų vaikams; padidėjęs jautrumas acetylcisteinui arba pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** bronchinė astma, skrandžio ar žarnų opaligė, padidėjęs jautrumas histaminui. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-I, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS240336086. Teksto patvirtinimo data: 2024-03-13.

„ACC“. PASIRŪPINSIME JŪSŲ KOSULIU.

NUO 9⁹⁹ €

PANANGIN

PANANGIN 158 mg/140 mg, 60 plėvele dengtų tablečių 9⁹⁹ €PANANGIN 316 mg/280 mg, 30 plėvele dengtų tablečių 11⁹⁹ €

Kalio aspartatas ir magnio aspartatas

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 158 mg kalio aspartato ir 140 mg magnio aspartato arba 316 mg kalio aspartato ir 280 mg magnio aspartato. **Terapinės indikacijos:** „Panangin“ tabletes vartojamas magnio ir kalio trūkumo profilaktikai tuo atveju, jei šių jonų pasisavinama per mažai arba pernelyg daug netenkama, pvz., ilgai vartojant diuretikų. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Panangin 158 mg/140 mg“: paprastai skiriama po 2–3 tabletes 3 kartus per parą. „Panangin 316 mg/280 mg“: paprastai skiriama po 1 tabletę 3 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, ūminis ir lėtinis inkstų nepakankamumas, Addisono liga, hiperkalemijs, kalį sulaukiančių diuretikų vartojimas, atriiventrikulinė III laipsnio blokada, kardiologeninis šokas (kraujospūdis mažesnis negu 90 mm Hg). **Specialūs įspėjimai:** pacientams, sergantiems ligomis, dėl kurių kraujyje padidėja kalio kiekis, vaistinio preparato būtina vartoti atsargiai ir reguliariai kontroliuoti kalio kiekį kraujyje. **Rinkodaros teisės turėtojas:** „Gedeon Richter Plc.“, Vengrija. **Atstovas Lietuvoje:** „Gedeon Richter“ atstovybė, Maironio g. 23-3, LT-01025 Vilnius, tel. +370 5 268 5392. Teksto peržiūros data 2023-05-03 („Panangin 158 mg/140 mg“); 2022-07-07 („Panangin 316 mg/280 mg“). **Reklamavimo teksto paruošimo data** 2025-05-12.

SLENKA PLAUKAI? PASITIKĖK VAISTO GYDOMĄJĄ GALIA!

NUO 15⁹⁹ €

BEOTEBAL

BEOTEBAL 10 mg, 30 tablečių 15⁹⁹ €BEOTEBAL 10 mg, 60 tablečių 20⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

BEOTEBAL 10 mg tabletės. Kokybėnė ir kiekybinė sudėtis. Kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino. **Terapinės indikacijos:** „BEOTEBAL“ priklauso B vitaminų preparatų grupei ir vartojamas biotino trūkumo gydymui suaugusiems. Biotino trūkumas gali sukelti plaukų retėjimą, plaukų slinkimą, nagų ir plaukų augimo sutrikimus bei padidėjusį trapumą, dermatitą (odos uždegimą, kuriam paprastai būdingas niežulys ir paraudimas) aplink akis, nosį, burną, ausis ir kirkšnį, konjunktyvitą (akies junginės uždegimą, dėl kurio akys atrodo paraudusios), nuovargio, parestezijos (nenormalaus odos pojūčio, pasireiškiančio tokiais simptomais kaip dilgčiojimas, peršėjimas, šalimas, deginimas, tirpimas) simptomus. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems, įskaitant senyvus pacientus, vartoti 10 mg biotino, ty, 1 tabletę „BEOTEBAL“ per parą. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir pagaugliams. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jei yra numatoma atlikti laboratorinius tyrimus, turite pasakyti savo gydytojui arba laboratorijos darbuotojams, kad vartojate arba neseniai vartojote „BEOTEBAL“, nes biotinas gali turėti įtakos tokių tyrimų rezultatams. Atsižvelgiant į tai, koks tyrimas atliekamas, dėl biotino poveikio tyrimų rezultatai gali būti klaidingai didesni arba klaidingai mažesni. Reklamos teksto parengimo data 2022-04.

*Slenkantis, silpni, trapūs plaukai yra viena iš biotino trūkumo išraiškų. „Beotebal“ yra nereceptinis vaistas skirtas biotino trūkumo gydymui.

NUO 9⁹⁹ €

DICALAC

DICALAC 5% gelis, 100g 9⁹⁹ €DICALAC 5% gelis, 150g 14⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 g „Dicalac“ 5 % gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos. **Terapinės indikacijos:** lokaliai skausmui malšinti, uždegimui slopinti ir patinimui mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** plona „Dicalac“ 5 % gelio sluoksnį tepti 2 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** jautrumas diklofenakui ar pagalbinėms medžiagoms, jaunesni kaip 14 m. vaikai, 3 paskutiniai nėštumo mėnesiai. Specialūs įspėjimai: negalima tepti burnos, nuryti. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-I, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS240335891. Teksto patvirtinimo data 2024-03-13.

STIPRUS ATKIRTIS SKAUSMUI!

SKAUSMUI MALŠINTI

2⁹⁹ €

MIALDEX 25 mg, 10 plėvele dengtų tablečių

Veiklosios medžiagos, stiprumas: „Mialdex“ yra vaistas skausmui malšinti, priklausantis nesteroidinių vaistų nuo uždegimo grupei (NVNU). „Mialdex“ veiklioji medžiaga yra deksketoprofenas (deksketoprofeno trometamolio pavidalu). „Mialdex“ vartojamas lengvo ir vidutinio stiprumo raumenų skausmui, skausmingų mėnesinių, dantų skausmui malšinti. **Vartojimas:** visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Įprastinė vaisto dozė yra pusė tabletės (12,5 mg) kas 4–6 valandas arba 1 tabletė (25 mg) kas 8 valandas, bet ne daugiau kaip 3 tabletes per parą (75 mg). **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) deksketoprofeno trometamolui arba bet kuriai pagalbinei „Mialdex“ medžiagai; jeigu sergate arba sirgote inkstų, kepenų ar širdies ligomis, širdies nepakankamumu, jeigu sergate kraujodaros sistemos ligomis; jeigu sergate sisteminė raudonoja vilkige ar mišriomis jungiamąjo audinio ligomis; jeigu sergate arba sirgote virškinimo trakto ligomis pasikonsultuokite su gydytoju. **Galimas šalutinis poveikis:** šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Reklamos teksto parengimo data: 2022.11.17.

VYRŲ IR MOTERŲ PLAUKŲ SLINKIMO GYDYMUI

NUO 19⁹⁹ €

MINOXIDIL INTELI

MINOXIDIL INTELI 2 % odos tirpalas 60 ml 19⁹⁹ €MINOXIDIL INTELI 5 % odos tirpalas 60 ml 24⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. MINOXIDIL INTELI veiklioji medžiaga minoksidilis. MINOXIDIL INTELI 5 % odos tirpalas vartojamas gydyti vidutinio stiprumo vyrų nuplikimą, susijusį su hormonais. Gydymas šiuo tirpalu rekomenduojamas pacientams po nesėkmingo 4 mėnesių gydymo MINOXIDIL INTELI 2 % odos tirpalu. KAIP VARTOTI MINOXIDIL INTELI: MINOXIDIL INTELI 2 % ar MINOXIDIL INTELI 5 % odos tirpalą visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. **Dozavimas:** MINOXIDIL INTELI 2 % odos tirpalas ar MINOXIDIL INTELI 5 % odos tirpalas reikia tepti ant pažeistos galvos odos po 1 ml (10 purškiklio paspaudimų) kas 12 valandų. Nesvarbu, koks alopecijos plotas, rekomenduojama dienos dozė visada tokia pati. Maksimali dienos dozė yra 2 ml (20 paspaudimų). **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas minoksidiliui arba bet kuriai pagalbinei MINOXIDIL INTELI medžiagai. Dėl galimo kitų kūno vietų plaukuotumo padidėjimo, MINOXIDIL INTELI 5 % moterims vartoti negalima. MINOXIDIL INTELI 5 % odos tirpalą draudžiama vartoti jaunesniems kaip 18 ir vyresniems kaip 65 metų asmenims. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Pacientams su galvos odos dermatologine liga ar rezorbuoti po oda. Prieš pradėdant vartoti MINOXIDIL INTELI 5 % reikėtų pasitikrinti sveikatą. Dėl preparato esančio propilenglikolio poveikio gali atsirasti sudirginimas ir kontaktinis dermatitas. Pacientams, kurie sirgo širdies ir kraujagyslių ligomis, MINOXIDIL INTELI reikia vartoti ypą atsargiai dėl galimo sisteminio preparato poveikio. Vartojant MINOXIDIL INTELI reikia saugotis, kad preparato nepatektų į akis. Jei preparato atsitiktinai patenka ant jautrių vietų, reikia kruopščiai nuplauti dideliu vandens kiekiu. Teksto peržiūros data: 2021.05.20. „MINOXIDIL INTELI“ ... IR PLAUKAI SUGRĮŽTA...

NERECEPTINAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veiklosiuosiu medžiagų stiprumas: 1 kietosios kapsulės yra 120 mg rafinuoto ir kiekybiškai įvertinto ginkmedžių jungtų sausosios ekstrakto. Indikacijos: lengvo ir vidutinio smegenų kraujotakos nepakankamumo, pasireiškiančio suvokiamos atmintimi ir dėmesio koncentracija, spengimu ar ūzių ausyse, svajulių ar galvos svaigimo, simptominių gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: gerti po 1 kapsulę 2-3 kartus per dieną (pilnai 160-240 mg dienos doze). Kontraindikacijos: vartoti negalima, jei yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba šalies komponentams „Ginkobil“ medžiagai. Specialūs įspėjimai: kadangi dviskaidžių ginkmedžių jungtų ekstrakto poveikis depresinei nuotaikai ir galvos skausui, nesijusiuos su silpnoprotektinės sindromu, kol nėra pakankamai širtingas, medikamentu gydyti šiuos simptomus galima tik laikantis visų būtinų atsargumo priemonių. Teksto peržiūros data 2017-05-22

VEIKSMINGAI GERINANT SUTRUKUSIA KRAUJOJATKĄ

5⁹⁹ €

SEPTABENE

3 mg/1 mg, 16 kietųjų pastilių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Septabene“ dezinfekuoja burną ir ryklę bei lengvina ryklės uždegimo požymius: skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. Kietosios pastilės „Septabene“ vartojamos uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti: jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas; sergant dantenų uždegimu (gingivitu), ryklės uždegimu (faringitu). **Dozavimas:** suaugusiems rekomenduojama paros dozė yra 3-4 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3-6 valandas. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 m. vaikas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Septabene“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydymo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Šaukėla su kitais vaistinėmis preparatais ir kitokia šaukėla. „Septabene“ negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Kietųjų pastilių negalima vartoti kartu su pienu, nes jis silpnina cetilpiridinio chlorido antimikrobinį poveikį. Reklamos teksto parengimo data 2022-10-12.

TAVO GERKLE – TAVO JĖGA!

4⁹⁹ €

SEPTANAZAL

SEPTANAZAL VAIKAMS 0,5 mg/50 mg/ml nosies purškalo (tirpalas), 10 ml
SEPTANAZAL SUAUGUSIESIEMS 1 mg/50 mg/ml nosies purškalo (tirpalas), 10 ml
Ksilometazolino hidrochloridas / Dekspantenolis

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

„Septanazal“ nuo 6 metų amžiaus vartojamas:

- nosies gleivinės paūkinimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) bei gleivinės pažeidimo gijimui skatinti;
- nealerginiam nosies gleivinės uždegimui (vazomotoriniam rinitui) lengvinti;
- kvėpavimo pro nosį pasunkėjimui po nosies operacijos šaliniai.

Rekomenduojama dozė 6 metų bei vyresniems vaikams yra po vieną įpurškimą į kiekvieną šnervę iki 3 kartų per parą.

Kontraindikacijos. „Septanazal“ suaugusiems vartoti negalima, jeigu yra alergija ksilometazolino hidrochloridui, dekspantenoliui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu Jums arba Jūsų vaikui yra sausasis nosies gleivinės uždegimas ir atsiranda šašų (sausasis rinitas), jeigu Jums arba Jūsų vaikui buvo chirurginiu būdu pašalinta posmegeninė liauka arba buvo atlikta kita operacija, susijusi su smegenų dangalais. **Specialūs įspėjimai.** „Septanazal“ galima vartoti tik atidžiai vertinus rizikos ir naudos santykį, jeigu: pacientas yra gydomas monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI) ar kitokiais kraujospūdį didinanti galinčiais vaistinėmis preparatais, yra padidėjęs akispūdis (ypač jei sergama uždarą kampo glaukoma), pacientas serga sunkia širdies ir kraujagyslių liga, yra feochromocitoma, yra metabolinių sutrikimų, yra porfiriya, yra prostatos hiperplazija. **Teksto peržiūros data:** 2023-11-20.

ATKĖMAS UŽGULUSIĄ NOSĮ IR ŠVELNIAI GYDO ĮSAUSEJUSIĄ NOSIES GLEIVINĘ.

NUO 2⁹⁹ €

VOLTAREN AKTI

12,5 mg, 10 plevėle dengtų tablečių 2⁹⁹ €25 mg, 10 minkštųjų kapsulių 4⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: diklofenako kalio druska. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikis nesunkus ir vidutinio sunkumo skausmo (pvz., galvos, dantų, mėnesinių, nugaros, šnarių ir raumenų), peršalimo ir gripo simptomų, skatant karščiavimą, malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: 12,5 mg tabletes: pradinė dozė – 2 tabletės, vėliau vartokite po 1 ar 2 tabletes kas 4-6 val., jeigu reikia. Nevartokite daugiau kaip 8 tablečių per 24 val. 25 mg kapsules: pradinė dozė – 1 kapsulė, vėliau vartoti po 1 kapsulę kas 4-6 val., jeigu reikia. Nevartokite daugiau kaip 3 kapsules per 24 val. Vartoti ne ilgiau kaip 5 paras skausmui mažinti ir ne ilgiau kaip 3 paras karščiavimui mažinti. **Kontraindikacijos:** alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitoms vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo, širdies ligos, galvos smegenų kraujagyslių liga, sutrikusi kraujotaka, skrandžio ar žarnyno opa, sunkūs inkstų ar kepenų nepakankamumas, kraujavimas iš virškinimo trakto arba jo prakiurimas, paskutinis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai:** šalutinį poveikį galima sumažinti, vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką. Pasitarkite su gydytoju, jeigu kada nors turėjote virškinimo trakto sutrikimų, sergate ar sirgote žarnyno ligomis, yra pasireiškę nemalonūs pojūtis skrandyje ar rėmu, neseniai atlikta arba bus atliekama skrandžio arba žarnyno operacija, vartojate kitų vaistų nuo skausmo ar uždegimo, sergate bronchų astma arba sloga, kepenų ar inkstų ligomis, sergate arba sirgote širdies liga arba yra padidėjęs kraujospūdis, bėrniška pėdos, esantė netekę daug svorio, yra kraujavimo sutrikimų ar kitų kraujavimo sutrikimų, rėkite, sergate diabetu, yra padidėjęs cholesterolio ar trigliceridų kiekis. Senyviems pacientams labai svarbiau skubiai pranešti gydytoji apie pastebėtus šalutinius poveikius. Tablečių sudėtyje yra laktozės ir natrto, kapsulių sudėtyje yra sorbitolio ir manitolio. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-03. Prekių ženklai priklauso „Haleon“ arba „Haleon“ turi jų licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas.

PERŠALIMO IR GRIPO SIMPTOMAMS LENGVINTI

NUO 4⁹⁹ €

GRIPEX

GRIPEX, 325/30/10 mg, 12 plevėle dengtų tablečių 4⁹⁹ €
GRIPEX, 325/30/10 mg, 24 plevėle dengtos tabletės 8⁹⁹ €
GRIPEX, 500/30/15 mg, 10 plevėle dengtų tablečių 5⁹⁹ €
GRIPEX, 500/30/15 mg, 20 plevėle dengtų tablečių 9⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tableteje „Gripex 500/30/15 mg“ yra 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudofedrinio hidrochlorido, 15 mg deksketometorano hidrobro-mido. 1 tableteje „Gripex 325/30/10 mg“ yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudofedrinio hidrochlorido, 10 mg deksketometorano hidrobro-mido. Terapinės indikacijos: peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas. „Gripex 500/30/15 mg“ suaugusiems po 1-2 tabletes 3-4 kartus per parą. „Gripex 325/30/10 mg“ suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams įprasta dozė yra 2 tabletes 3-4 kartus per parą, kas 4-6 val. tada, kada reikia. Neviršyti vienkartinės 2 tablečių dozės. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. Kontraindikacijos: negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šių vaistų sudedamajai medžiagai; sunkūs inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; smarkiai padidėjęs kraujospūdis; chronišis alkoholizmas. Negalima vartoti kartu su monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI) arba anksčiau negu 2 savaites baigus juos vartoti. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: esant sutrikusiai kepenų funkcijai, sergant alkoholizmu, sutrikus mitybai yra didesnis kepenų toksinio pažeidimo pavojus. Gydantis šiais vaistais, nepatrina vartoti alkoholio. Jeigu per 3 dienas jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2025-03-31. „GRIPEX“. VEIKIU!

NORMALIZUOJA ŽARNYNO VEIKLĄ

NUO 6⁹⁹ €

LINEX

LINEX, 16 kietųjų kapsulių 6⁹⁹ €LINEX, 32 kietosios kapsulės 11⁹⁹ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje yra ne mažiau kaip 1,2 x 10⁷ KSV liofilizuotų gyvybingų bakterijų (*Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium infantis*, *Enterococcus faecium*). **Terapinės indikacijos:** viduriavimui, pilvo pūtimui ir kitokiems virškinimo sutrikimams gydyti kaip pagalbinė priemonė. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** mažiems kaip 2 m. vaikams gerti po 1 kapsulę 3 kartus per dieną, 2-12 m. vaikams – po 1 kapsulę 3 kartus per dieną, o vyresniems nei 12 m. – po 2 kapsules 3 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pieno baltymams ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** specialiai atsargumo priemonių reikia, jei išmatose yra kraujo ar gleivių. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2403356080. Teksto patvirtinimo data 2024-05-15.

7⁹⁹ €

TONZIRIN 8,75 mg, 24 kietosios pastilės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

TONZIRIN 8,75 mg kietosios pastilės yra flurbiprofeno. Flurbiprofenas priklauso vaistų, kurie vadinami nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU), grupei. Šie vaistai pašalina skausmą ir karščiavimą mažindami bei priešūdeginį poveikį. TONZIRIN kietosios pastilės yra vartojamos skaudantis gerklės simptomams palengvinti, tokiems kaip gerklės skausmas, skausmingumas ir patinimas, sunkumas nurinti, suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams. Jei po 3 dienų ligos požymiai lieka ar pasunkėja, kreipkitės į gydytoją. Prieš pradėdami vartoti TONZIRIN, turite atidžiai perskaityti informacinį lapelį. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti TONZIRIN. TONZIRIN vartoti draudžiama: - jeigu yra alergija; jeigu kada nors buvo pasireiškę astma, netikėtas švokštimas ar dusulys, sloga, vėdo patinimas ar niežintis berimas (dilgėlė) pavartojus aspirino ar kitų NVNU; - paskutiniuosius 3 nėštumo mėnesius; - jeigu Jums yra ar kada nors buvo pasireiškę sunkių širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų. Tačiau svairių ir regos sutrikimai yra galimi šalutiniai poveikiai pavartojus nesteroidinių vaistų nuo uždegimo. Jeigu tokių pasireiščių, nevaraukite ir nevadykite mechanizmus. Suaukusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams. - Viena kietąją pastilę įdėkite į burną ir lėtai ištirpinkite. - Čiulpiamo metu nuolat judinkite kietąją pastilę burnos ertmėje. - Pastilių gydymas poveikiu turėtų pasireikšti po 30 minučių. - Jeigu reikia, vartokite po vieną pastilę kas 3-6 valandas. - Vartoti daugiau kaip 5 kietąsias pastiles per 24 valandas negalima. Jaunesniems kaip 12 metų vaikams vartoti negalima. **Nutraukite šio vaisto vartojimą ir nedelsiant susisiekiite su gydytoju, jeigu Jums pasireiškia:** alerginės reakcijos, vėdo, lėtinio ar gerklės patinimas, širdies ritmo padidėjimas ir kraujospūdžio sumažėjimas, sunkios odos reakcijos. **Teksto patvirtinimą kartą peržiūrėte 2024-01-12**

NUO RĖMENS

2⁹⁹ €




OMEPRAZOLE INTELI

20 mg, 14 skrandyje neiurių kietųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. „Omeprazole Inteli“ sudėtyje yra aktyvios medžiagos omeprazolo. „Omeprazole Inteli“ mažina rūgšties kiekį Jūsų skrandyje. Vaistas vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refluksinio simptomo (rėmens ir rūgšties atpylimo) gydymui. „Omeprazole Inteli“ vartoti negalima jeigu Jūs esate alergiškas omeprazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (nurodyta informaciniame lapelyje); jeigu Jūs esate alergiškas kitiems vaistams, priklausantiems protonų siurblio inhibitorių grupei (pvz., pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, ezomeprazolui); jeigu Jūs vartojate vaisto, kurio sudėtyje yra neflinavio (vartojamo nuo ŽIV infekcijos). Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Omeprazole Inteli“. Ypač jei vartojate informaciniame lapelyje išvardytų vaistų. Neštumas ir žindymo laikotarpis. Prieš vartodama „Omeprazole Inteli“, pasakykite savo gydytoju, jog esate nėščia ar ketinate pastoti. Tokiu atveju gydymo nuspėja, ar šiuo laikui Jums galima vartoti „Omeprazole Inteli“. Kaip vartoti „Omeprazole Inteli“. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Rekomenduojama dozė yra viena 20 mg kapsulė vieną kartą per parą kol išnyksta simptomai, bet ne ilgiau kaip 14 parų. Kad sumažėtų simptomai, gali tekti kapsulių vartoti 2–3 paras iš eilės. Jei po 14 parų laikotarpio simptomai neišnyksta, kreipkitės į savo gydytoją. Galimas šalutinis poveikis. Šis vaistas, kaip ir kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Nedelsdami nutraukite „Omeprazole Inteli“ vartojimą ir kreipkitės į gydytoją, jeigu pastebite kurį nors iš šio reiš, bet sunkaus šalutinio poveikio atvejų: staiga pasididėjo švokštimas, lūpių, liežuvio, gerklų ar kūno tinimas, išbėrimas, alpimas ar sutrūko rijimas (sunki alerginė reakcija); paraudo, tapo pūslėta ir lupasi oda. Taip pat gali atsirasti lūpių, akių, burnos ertmės, nosies, lytinių organų pūslėtimas ar kraujavimas (tai gali būti Stevens-Johnson sindromas arba toksišinė epidermio detekcija); pagelto oda, patamsėjo šlapimas ir atsirado nuovargis (šie simptomai gali rodyti sutrikusią kepenų funkciją). Ši informacija paskutinį kartą peržiūreta 2023.01.02.

NUO PLEISKANOJIMO

5⁹⁹ €



KETOCONAZOL-RATIOPHARM, 60 ml

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Viename mililitre šampūno yra 20 mg ketokonazolo.

Terapinės indikacijos. Galvos seborėjos ir pleiskanojimo (pityriasis capitis) gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** „Ketoconazol-ratiopharm“ šampūnas vartojamas paaušgiams ir suaugusiems pacientams. Plaukiant galvą plaukai įtrinami „Ketoconazol-ratiopharm“ šampūnu ir paliekama jo poveikiui 3–5 min. prieš nuplaunant vandeniu. Gydymas. Galvos oda ir plaukai gydoma du kartus per savaitę. Gydymo kursas trunka – 2–4 savaites. Profilaktika. Norint išvengti simptomų pasikartojimo, plaukai ir galvos oda šiuo šampūnu turi būti plaujami kartą per savaitę arba kas antrą savaitę. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Reikia saugotis, kad šampūno nepatektų į akis. Patekus į akis, jas reikia gerai praplauti vandeniu. Pleiskanojimas ir seborėjinis dermatitas dažnai būna susiję su plaukų slinkimu, tai, nors ir retai, tačiau taip pat pastebima vartojant Ketoconazol-ratiopharm šampūną. Pacientams, ilgai vartojantiems vienoje odos vietose vietinių gydymui kortikosteroidų, rekomenduojama tokių gydymą palengva per 2–3 savaites užbaigti, kad vartojant „Ketoconazol-ratiopharm“ šampūną būtų išvengta ligos pasikartojimo. Šio vaistinio preparato kvaspomos medžiagos sudėtyje yra a-izometilono, benzilo alkoholio, benzilbenzato, benzilcinamo, citralo, citronelio, kumarino, eugenolio, geraniolio, heksilcinamo, izoeugenolio, linalolio, kurie gali sukelti alerginio tipo reakcijas. Kiekviename šio vaistinio preparato mililitre yra 100 mg natrio laurilsulfato, kuris gali sukelti vietinių odos reakcijų (gelonių ar suliškančių deginimo pojūtį) arba sustiprinti odos reakcijas, kurias sukėlė ant tos pačios vietos pavartoti kiti preparatai. **Reklaminės medžiagos parengimo data:** 2024 m. kovas. OTF-LI-00073

NUO 2⁴⁹ €



NUROFEN 200 mg, 12 tablečių 2⁴⁹ €

NUROFEN FORTE 400 mg, 12 tablečių 2⁹⁹ €

NUROFEN FORTE EXPRESS 400 mg, 12 tablečių 3⁴⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

NUROFEN sudėtyje yra 200 mg ibuprofeno. **NUROFEN FORTE ir NUROFEN FORTE EXPRESS** sudėtyje yra 400 mg ibuprofeno. **Terapinės indikacijos.** Trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių, mėnesinių skausmų skausmas, karščiavimo mažinimas. **NUROFEN dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams pradinė dozė yra 2 tabletes, užgeriant vandeniu. Po to, jei reikia, gerti po 1–2 tabletes kas 4 valandas. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 6 tabletes (1200 mg). **NUROFEN FORTE ir NUROFEN FORTE EXPRESS dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams pradinė dozė yra 1 tabletė, užgeriant vandeniu. Po to, jei reikia, gerti po vieną tabletę kas 8 valandas. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 3 tabletes (1200 mg). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai; jei praėjus 3 savaitėms po padidėjusio jautrumo reakcijų (astma, rinitas, angioneurozinis patinimas, dilgėlinė); sunkus kepenų, inkstų, širdies nepakankamumas; paskutinis trijų nėštumo mėnesių laikotarpis; esama ar buvusi pepsinė opa (du ar daugiau atskirų įvykių išėjimo ar kraujavimo epizodų); buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar iš prakurimas; susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu kraujavimas ir smegenų, virškinimo trakto arba kitos kraujavimas; jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai.** Reikia atsargiai vartoti pacientams, kuriems yra sisteminė raudonoji vilkligė; anksčiau buvo padidėjęs kraujospūdis ir (arba) širdies nepakankamumas; jei yra nesunkus inkstų pažeidimas ar inkstų funkcijos pablogėjimas; jei yra nesunkus kepenų funkcijos sutrikimas; pacientams, kurie sirgo opiniu kolitu, Krono liga; pacientams, kurie vartoja kraują skystinančių vaistinių preparatų bei vaistų, galinčių padidinti išėjimo ar kraujavimo pavojų. Reikės atsisakyti pastebėta sunkių odos reakcijų (kai kurios iš jų buvo mirtinos), įskaitant eksfoliacinį dermatitą, Stevenso-Johnson sindromą bei toksiškę epidermio nekrolizę – Lajelo (Lyell) sindromą, susijusiu su NVNU vartojimu. Gauta pranešimų apie ūminės generalizuotos egzantemines pustuloides (AGEP) atvejus. Pasireiškus pirmiesiems sunkių odos reakcijų požymiams ir simptomams, pvz., odos išbėrimui, gleivinės pažeidimams ar kitoms padidėjusio jautrumo požymiams, ibuprofeno vartojimą reikia nutraukti. Šie vaistai gali būti susiję su nedideliu širdies priepuolio (miokardo infarkto) ar insulto pavojaus padidėjimu. Šie vaistiniai preparatai gali maskuoti infekcijos simptomus, dėl to gali būti vėlyvama pradėti tinkamą gydymą, o tai gali pabloginti infekcijos gydymo rezultatus. Šių vaistų negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Kiekvienoje tablete yra natrio, būtina atsižvelgti, jei kontroliuojamas natrio kiekis maiste. Reklamos tekstas parengtas 2025-09-08.

NUO 5⁹⁹ €



NUROFEN

NUROFEN FORTE ORANGE, 40 mg/ml, geriamoji suspensija, 100 ml 8⁹⁹ €

NUROFEN FORTE STRAWBERRY, 40 mg/ml, geriamoji suspensija, 100 ml 8⁹⁹ €

NUROFEN ORANGE, 100 mg, 12 kramtomųjų minkštųjų kapsulių 5⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml „Nurofen Forte Orange“, 40 mg/ml, ir „Nurofen Forte Strawberry“, 40 mg/ml, geriamosios suspensijos yra 40 mg ibuprofeno. Kiekvienoje „Nurofen Orange“, 100 mg, kramtomųjų minkštųjų kapsulėje yra 100 mg ibuprofeno. **Terapinės indikacijos.** „Nurofen Forte Orange“ ir „Nurofen Forte Strawberry“ trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip gerklės, dantų, ausies, galvos, nedidelio maudimo ir pastiprėjimo, mažinimas. Dozavimas ir vartojimo metodas: „Nurofen Forte Orange“ ir „Nurofen Forte Strawberry“ naudojant pakaušio esantį dozavimo švirkštą dozuoti, kaip nurodyta toliau: svieriantiems daugiau nei 5 kg (3–5 mėn.) kūdikiams gerti po 1,25 ml 3 kartus per parą, 7–9 kg (6–11 mėn.) kūdikiams – po 1,25 ml 3–4 kartus per parą, 10–15 kg (1–3 metų) vaikams – po 2,5 ml 3 kartus per parą, 16–19 kg (4–5 metų) vaikams – po 3,75 ml 3 kartus per parą, 20–29 kg (6–9 metų) vaikams – po 5 ml 3 kartus per parą, 30–40 kg (10–12 metų) vaikams – po 7,5 ml 3 kartus per parą. „Nurofen Orange“ vaikams ibuprofeno dozė priklauso nuo kūno svorio, paprastai vienkartinė dozė yra 5–10 mg kūno svorio. Didžiausia „Nurofen Orange“ paros dozė yra 20–30 mg/kg kūno svorio. Rekomenduojama paros dozė gali būti pasiekta remiantis šiais nurodymais: 20–29 kg svieriantiems vaikams – 100 mg ibuprofeno (atitinka 2 kapsules), didžiausia paros dozė – 600 mg ibuprofeno (atitinka 6 kapsules); 30–40 kg svieriantiems vaikams – 300 mg ibuprofeno (atitinka 3 kapsules), didžiausia paros dozė – 900 mg ibuprofeno (atitinka 9 kapsules). Jei reikia, dozės turėtų būti skiriamos maždaug kas 6–8 val. (mažiausias laiko tarpas tarp dozių yra 6 val.). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai vaisto pagalbinei medžiagai; jei praėjus 3 savaitėms po padidėjusio jautrumo reakcijų (astma, rinitas, angioneurozinis patinimas, dilgėlinė); sunkus kepenų, inkstų, širdies nepakankamumas; paskutinis trijų nėštumo mėnesių laikotarpis; esama ar buvusi pepsinė opa (du ar daugiau atskirų įvykių išėjimo ar kraujavimo epizodų); buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar iš prakurimas; susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu kraujavimas ir smegenų, virškinimo trakto arba kitos kraujavimas; jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai:** Reikia atsargiai vartoti pacientams, kuriems yra sisteminė raudonoji vilkligė, anksčiau buvo padidėjęs kraujospūdis ir (arba) širdies nepakankamumas; jei yra nesunkus inkstų pažeidimas ar inkstų funkcijos pablogėjimas; jei yra nesunkus kepenų funkcijos sutrikimas; pacientams, kurie sirgo opiniu kolitu, Krono liga; pacientams, kurie vartoja kraują skystinančių vaistinių preparatų bei vaistų, galinčių padidinti išėjimo ar kraujavimo pavojų. Reikės atsisakyti pastebėta sunkių odos reakcijų (kai kurios iš jų buvo mirtinos), įskaitant eksfoliacinį dermatitą, Stevenso-Johnson sindromą ir toksiškę epidermio nekrolizę – Lajelo (Lyell) sindromą, susijusiu su NVNU vartojimu. Gauta pranešimų apie ūminės generalizuotos egzantemines pustuloides (AGEP) atvejus, pasireiškusius vartojant ibuprofeno sudėtyje turintus vaistus. Pasireiškus pirmiesiems sunkių odos reakcijų požymiams ir simptomams, pvz., odos išbėrimui, gleivinės pažeidimams ar kitoms padidėjusio jautrumo požymiams, vaisto vartojimą reikia nutraukti. Šie vaistai gali būti susiję su nedideliu širdies priepuolio (miokardo infarkto) ar insulto pavojaus padidėjimu. „Nurofen Forte Orange“ ir „Nurofen Forte Strawberry“ negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas. Gėnamosios suspensijos sudėtyje yra skystojo malto, kuris gali traupti liaisvint dantis, natrio – būtina atsižvelgti, jei kontroliuojamas natrio kiekis maiste. „Nurofen Orange“ negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos tekstas parengtas 2025-09-08.

NUO RAUMENŲ IR SĄNARIŲ SKAUSMO

NUO 5⁹⁹ €



FLUDITEC

20 mg/ml, sirupas, 125 ml 4⁹⁹ €

50 mg/ml, sirupas, 125 ml 4⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Karbocisteinas

„Fluditec“ 20 mg/ml sirupas skiriamas bronchų sekrecijos sutrikimams gydyti vaikams nuo 2 m., ypač ūminio bronchito atveju: ūminis bronchitas ir ūminė lėtinis bronchopneumonijos krizė. **Dozavimas.** 1 dozavimo taurelė (sugrąduotoje po 5 ml) yra 100 mg karbocisteino. Vyresni kaip 5 m. vaikai: 3 kartus per parą geriama po 100 mg (vieną iki 5 ml žymos pripildytą dozavimo taurelę). 2–5 m. vaikai: 2 kartus per parą geriama po 100 mg (vieną iki 5 ml žymos pripildytą dozavimo taurelę). „Fluditec“ 50 mg/ml sirupas skiriamas suaugusiems (nuo 15 m. ir vyresniems) kvėpavimo takų ligoms, susijusioms su apsinikintu skreplių išsiskyrimu (kai sunku pašalinti bronchų sekretą kosint), gydyti. **Dozavimas.** Rekomenduojama gerti po 1 dozavimo taurelę ryte, per pietus ir vakare, nevalgius, nevirsijant 3 dozavimo taurelių per parą. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, sergant aktyvia pepsine opa, kūdikiams ir jaunesniems kaip 2 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai.** Esant produktiviam kosuliui su pilingais skrepliais, karščiui ar sergant lėtine bronchų medžio ar plaučių liga, klinikinė situacija turi būti vertinama pakartotinai. Produktivūs kosulys yra esminė bronchų ir plaučių gynybos mechanizmo dalis, todėl neturi būti slopinamas. Neracionalu bronchų gleivinės modifikatoriaus derinti su vaistais nuo kosulio ir (arba) sekretų sausinančiomis medžiagomis (cholinoblokatoriais, pvz., atropinu). Esant oro srauto bronchuose sutrikimui, pavojinga vartoti kosulį slopinančių ir (ar) gleivies skystinančių preparatų dėl bronchų užsikimšimo sekretu tikimybės. Mukoliziniai vaistiniai preparatai kūdikiams gali sukelti bronchų užsikimšimą. Kūdikiai ir jaunesni kaip 2 m. vaikų gebėjimas iškosti bronchose užsikimšiančias gleives yra ribotas dėl jų fiziologinio kvėpavimo takų ypatybių. Juos draudžiama vartoti kūdikiams ir jaunesniems kaip 2 m. vaikams. Jeigu simptomai ar liga išlieka arba pasunkėja, gydymo taktiką būtina įvertinti iš naujo. Reklamos teksto parengimo data 2025-09.

VIPROSAL B®

VIPROSAL B®, tepalas, 50 g 5⁹⁹ €

VIPROSAL B®, tepalas, 75 g 7⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo yra 0,05 V gvaizdžių nuodų, 10 mg salicilo rūgšties, 30 mg raceminio kamparo ir 30 mg terpentino eterinio aliejaus. **Indikacijos:** sąnarių ir raumenų skausmų malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** nedidelis „Viprosal B“ kiekis (5–10 g, t. y. 1 ar 2 arbatiniai šaukšteliai, atsižvelgiant į pažeistos vietos plotą) užtepamas ant skaudamos vietos ir įtrinamas į odą 1 arba 2 kartus per parą. Tepli ant odos. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, odos opa ar kitos odos ligos. **Specialūs įspėjimai:** „Viprosal B“ negalima tepti ant pažeistos odos. Saugotis, kad tepalo nepatektų ant gleivinės ar į akis. Vietinis rinkodaros teisės turėtojas atstovauja: UAB Grindex Kalceks Lietuva, Kalvarijų g. 30, LT-08318 Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2025-09-09.



JAMIESON turi ilgametę patirtį - savo produkciją eksportuoja po visą pasaulį jau nuo 1922 metų. JAMIESON naudoja išskirtinę „360 Pure“ technologiją, kuri apima net 360 gamybos proceso kontrolės etapų.

-40%

„JAMIESON“ MAISTO PAPILDAMS



Pagaminta Kanadoje

-40 % PREKIŲ ŽENKLAMS



-40%

MAGNIS + B₆ COMPLEX, 30 kapsulių **13⁹⁹ 7⁹⁷ €**
MAGNIS + B₆ SUPERIOR, 30 kapsulių **13⁹⁹ 8⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

Magnis + B₆ complex sudėtyje magnis yra magnio oksido pavidalu. O „**Magnis + B₆ superior**“ naudojama ypatinga magnio forma – dvi magnio druskos (magnio oksidas ir magnio citratas), kurios organizme išsiskiria ilgiau, nes suvra skirtingu metu. Abiejų preparatų sudėtis papildyta ir vitaminu B₆. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų ir nervų sistemos veiklą. Magnis ir vitaminas B₆ padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją bei mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.



-40%

VISIONACE, 30 tablečių **25⁹⁹ 15¹¹ €**

VISIONACE PLUS, 28 tablečių / 28 kapsulės **32⁹⁹ 19⁷⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

VISIONACE – subalansuotas luteino, mėlynių ekstrakto, antioksidantų kompleksas. Sudėtyje esančios medžiagos padeda išsaugoti normalų regėjimą (cinkas, vitaminai A, B₂), o antioksidantai – manganas, selenas palaiko ląstelių apsaugą nuo oksidacinių pažeidimų. **VISIONACE** tinka daug laiko praleidžiantiems prie kompiuterių ar TV ekranų dirbantiems akims reiklų darbą, dažnai jaučiantiems akių nuovargį, vyresnio amžiaus žmonėms, devinties kontaktinius lęšius. **VISIONACE PLUS** sudėtis praturtinta omega-3 rūgštimis ir 12 mg luteino.

VISIONACE – REGĖJIMO JĖGA!



-40%

KALICORD 850 FORTE, 30 kapsulių **12⁹⁹ 7⁵⁵ €**
KRIOMEGA+, 30 minkštųjų kapsulių **20⁹⁹ 12⁴⁷ €**

MAISTO PAPILDAI

Norintiems papildyti kalio atsargas organizme, rekomenduojama vartoti „**Kalicord**“, kurio sudėtyje yra net 307 mg kalio. Padeda palaikyti normalų kraujospūdį ir palaiko normalią raumenų veiklą. Žuvų taukai „**KriOmega+**“ yra iš krilių. Kriliai yra laikomi vienu geriausių, veiksmingiausių ir prieinamiausių omega-3 riebiųjų rūgščių šaltinių. Sudėtyje esantis omega-3 fosfolipidai, gaunami iš vėžiagyvių – krilių – ekstrakto, greičiau patenka į audinių ląsteles ir tolygiau pasiskirsto nei omega-3 trigliceridai, randami žuvų taukuose.



-40%

VIRONOX

MAISTO PAPILDAI

„Vironox“ epigenetinė linija, sukurta Šveicarijos ir Lietuvos mokslininkų. „Stiprus imunitetas“ sudėtyje esantis vitaminas C, cinkas bei dygliuotųjų šaltalankių vaisių ekstraktas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Energijos šaltinis – „Jėgoms atstatyti“ – kitių žeršėnių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalų organizmo gyvybingumą, vitaminas B₆ – normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą ir mažinti nuovargį. „Smegenų rūšis“ – proteino veiklai. Rausniųjų roduolių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją. Niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą. „Vironox gerklės“ dujųpaimios tabletės esantis islandinių kerpelių ekstraktas padeda palaikyti normalią kvėpavimo (gerklės, ryklės ir trachėjos) sistemos funkciją.

„VIRONOX“ – NELEISK TAVĘS SUSTABDYTI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



-40%

WALMARK BIORYTHM

MAISTO PAPILDAI

Inovatyvios formos maisto papildų linija su lėto atpalaidavimo mikrogranulėmis, kurios išskiria maistingąsias medžiagas iki 8 valandų per dieną. Palyginti su įprastomis tabletėmis ar kapsulėmis, šiemis papildams būdingas didesnis biologinis prieinamumas – medžiagos pasisavinamos palaipsniui žarnyne.

BIORYTHM maisto papildų liniją sudaro 6 produktai – „Ashwaganda“ (migdomosios vitanijos), „Cinkas 15 mg“, „Geležis 28 mg“, „Vitaminas B12 Max“, „Selenas 100 µg“ ir „Magnis su vitaminu B6“. **„BIORYTHM“ – INOVATYVI PRAILGINTO VEIKIMO LINIJA!**

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



-40%

PROSTOSAN FORTE, 30 kapsulių **15⁹⁹ 9⁹⁹ €**

POTENZINE SUPERIOR, 30 tablečių **20⁹⁹ 12⁵⁹ €**

TOTALPOWER MAN, 30 tablečių **20⁹⁹ 12⁵⁹ €**

MEFLOVAN FORTE, 60 kapsulių **31⁹⁹ 18⁸³ €**

MAISTO PAPILDAI

„Prostosan forte“ – pagalba vyresnio amžiaus vyrų prostatai. Sudėtyje esantis sabelalpių ir rugių žieduolių ekstraktas padeda palaikyti normalią prostatos funkciją, o afrikinių pigių ekstraktas – normalią šlapimo pūsles funkciją. Kininio ženšenio ekstraktas padeda išlaikyti energingumą. Šio preparato sudėtis taip pat praturtinta vitaminu D3 ir cinku. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 2 kartus per dieną, valgio metu.

„Potenzine superior“ – subalansuotas derinys potencijai. Šio maisto papildu sudėtyje esantis ženšenio šaknų ekstraktas padeda palaikyti lytinę funkciją, išvengti erektingumą. Normali lytinė potraukis ir seksualinė pajėguma padeda palaikyti gulsčiosios ragųžės vaisių ekstraktas, o normali vaisingumą ir testosterono koncentraciją kraujyje – cinkas. Sudėtyje taip pat yra L-arginino. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną, valgio metu.

„Totalpower man“ – galingi multivitaminai aktyviam vyrai su 23 aktyviomis medžiagomis. Šis maisto papildas puikiai tinka intensyviai gyvenantiems vyrams. Jo sudėtyje esantis jodas eleuterokokas padeda palaikyti normalią prolino veiklą ir energiją, magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, o vitaminai B6 ir B12 – palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną.

„Meflovan forte“ – trijų augalinių medžiagų derinys, skirtas moterims, siekiančioms maksimalaus komforto ir geros savijautos menopauzės metu. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną.

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMBIO

ŠIRDŽIAI FORTE, 30 tablečių 17⁹⁸ €ŠIRDŽIAI, 100 ml 4⁶⁸ €

MAISTO PAPILDAI

NUO 6⁹⁹ €

TROXEVASIN

2 %, 40 g gels 6⁹⁹ €2 %, 100 g gels 9⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 g gelio yra 20 mg trokserutino. **Indikacijos:** lėtinio venų nepakankamumo simptomų, pavyzdžiui, kojų skausmo, sunkumo, pabrinkimo lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems pacientams iš ryto ir vakare ligos pažeistą vietą reikia patepti nedideliu kiekiu gelio ir švelniai masažuoti tol, kol vaistinis preparatas visiškai įsisers į odą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** vartoti tik ant nepažeistos odos. Gelio negalima tepti atvirų žaizdų bei gleivinės, pvz., akių. Gelio sudėtyje yra benzalkonio chlorido. Vartojant lokaliai gali dirginti, sukelti odos reakcijų. Neštumo metu gelį reikia vartoti atsargiai. Nepastebėta, kad „Troxevasin“ sukeltų nepageidaujamą poveikį žindomam kūdikiui. Reklamos teksto parengimo data 2024-04. TROX-LT-00027

KAD KOJOS BŪTŲ LENGVOS! MĖGAUKITĖS TYRINĖDAMI PASAULĮ BE LĖTINIO VENŲ NEPAKANKAMUMO SUKELTŲ SIMPTOMŲ!

LENGVAM NERIMUI MALŠINTI IR MIEGUI PALENGVINTI

NUO 6⁹⁹ €

LILANDOR

LILANDOR 80 mg, 14 minkštųjų kapsulių 6⁹⁹ €LILANDOR 80 mg, 28 minkštosios kapsulės 11⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Lilandor“ 80 mg minkštosios kapsulės, Lavandula angustifolia Miller, eterinis aliejus. „Lilandor“ yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu simptomai pablogėja šio vaisto vartojimo metu, pastarąjį sustabdyti ir kreiptis į gydytoją arba vaistininką. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: viena minkštosios kapsulės vieną kartą per parą. Minkštosios kapsulės reikia nuryti nesukramtytą užsigeriant pakankamu skystu kiekiu (geriausia stikline vandens). Jeigu simptomai išlieka po vaisto vartojimo dvi savaites, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: viena minkštosios kapsulės vieną kartą per parą. Minkštosios kapsulės reikia nuryti nesukramtytą užsigeriant pakankamu skystu kiekiu (geriausia stikline vandens). Jeigu simptomai išlieka po vaisto vartojimo dvi savaites, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltica“ J. Jasinskio g. 16A, Vilnius LT-05163 Paruošta 2023 m. gruodžio mėn. LT_Lil_21_2023_V1 print

ATGAUK RAMYBĘ IR RAMŲ MIEGĄ

IKI -40%



MICROLIFE

MICROLIFE BP B2 BASIC, automatinis kraujospūdžio matuoklis 70⁹⁹ 46¹⁴ € -35 %MICROLIFE BP B6 CONNECT, automatinis kraujospūdžio matuoklis 99⁹⁹ 59⁹⁹ € -40 %MICROLIFE BP B3 COMFORT PC, automatinis kraujospūdžio matuoklis 89⁹⁹ 53⁹⁹ € -40 %MICROLIFE NEB400, inhaliatorius, meškiukas 79⁹⁹ 47⁹⁹ € -40 %MICROLIFE NEB 200, inhaliatorius 72⁹⁹ 47⁹⁹ € -35 %MICROLIFE NC 200, skaitmeninis bekontakts termometras 47⁹⁹ 28⁷⁹ € -40 %MICROLIFE OXY 300, pulsoksimetras 49⁹⁹ 32⁴⁹ € -35 %

„MICROLIFE“ INOVATYVIOS TECHNOLOGIJOS

-20%



FITYDENT

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Fittydent“ – šlapias, ilgalankis fiksuojamasis kremas, neleidžiantis protezams slįsti ir sklankioti. Netiprus vandeninyje ir atsparus rūgščiui, todėl nenuplaukiamas iš dantų ar seilių. „Fittydent“ dantų protezų fiksuojamasis kremas garantuoja stiprų dantų protezų ir dantelių sukibimą.

NAUJAS PAKUOTĖS DIZAINAS.

*Akcija taikoma geltona etiketė pažymėtos prekės.

KOJŲ VENOMS

17⁹⁹ €PATOGI DOZĖ.
TIK VIENA TABLETĖ PER PARĄ

VELIOS 1000 mg plėvele dengtos tabletės, 30 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 1000 mg mikronizuoto diosmino. **Terapinės indikacijos:** suaugusiųjų lėtinio veninės kraujotakos nepakankamumo simptomų gydymas, esant: apatinių galūnių venų varikozai, venų opoms, išangės kraujavimams ir reikšmingiems varikozams ar venoms, sunkumui, nuovargiui, diskomfortui ar neramių kojų pojūčiui, kojų skausmui ar deginimo pojūčiui, šaltų kojų pojūčiui, naktiniams kojų mėšlungiams, apatinių galūnių patinimui, niežuliui, parestzijai (odos dilgčiojimui), bėdymui ar niežėjimui, odos eritemai ar dancozi. Suaugusiųjų paūmėjusio hemorojus simptomų gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** lėtinio venų nepakankamumo simptomais gydymas: 1 tabletė per parą valgio metu, vartoti bent kelias savaites. Ūminio hemorojus simptomais gydymas: pirmąsias 4 dienas gerti 3 tabletes per parą, 3 kitas dienas – po 2 tabletes per parą, gydymas turi būti trumpalaikis. Vartoti per burną. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija diosminui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** paūmėjusio hemorojus simptomams, reikia prisiminti, kad „Velios“ veiklioji medžiaga yra diosminas, kuris yra širdies glikozidų grupės narkotinis vaistas. Jeigu simptomai nepagerėja, reikia atlikti širdies žarnos tyrimą ir parinkti tinkamą gydymą. „Velios“ nėra veiksmingas gydymas su stažiniu širdies nepakankamumu susijusia edema. „Velios“ plėvele dengtų tablečių turi vartoti pacientai, kuriems yra širdies nepakankamumas. Kai sutrūks kojų veninė kraujotaka, „Velios“ gydymui poveikį gali sustiprinti saulės bei ilgalaikio stovėjimo vengimas, tinkamo kūno svorio palaikymas, speciali kojinių nešiojimas. Kai apatinės kojų dalys patinusios dėl širdies, inkstų arba kepenų ligos, šis vaistas nepadeda. Jeigu gydymo jums yra saikes, kad netoleruotumėte kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „Velios“ sudėtyje yra saulėlydžio geltonos dažalo (E110), kuris gali sukelti alerginių reakcijų. **Reklamos teksto parengimo data 2024-11-18.**

PAJUSK KOJŲ LENGVUMĄ.



LAIMĖS VALANDOS

Darbo dienomis ir šeštadieniais
8-9 val. ir 14-15 val.*

Sekmadieniais
14-15 val.*



-30%

Perkant 3**
ir daugiau
prekių

-25%

Perkant
2* prekes

-20%

Perkant
1 prekę

**nereceptiniams vaistams -25%
receptiniams vaistams -20%

* vaistams -20%

Nuo 2023 m. spalio 23 d. NORFOS vaistinėje akcijos LAIMĖS VALANDOS metu perkant 1 prekę taikoma 20 % nuolaida, perkant 2 prekes – 25 % nuolaida, vaistams – 20 % nuolaida, o įsigyjant 3 ir daugiau prekių – 30 % nuolaida, nereceptiniams vaistams – 25 %, receptiniams – 20 % nuolaida.

Taikomos momentinės 20 % dydžio nuolaidos receptiniams vaistams, 20 ar 25 % nuolaidos nereceptiniams vaistams ir vaistiniams preparatams, o kitoms prekėms – 20, 25 arba 30 % nuolaidos, atsižvelgiant į atitinkamo pirkimo metu įsigyjamų prekių bendrą kiekį. Nuolaida taikoma perkant pilnas prekių pakuotes, kurių kiekvienos vertė arba priemoka ne mažesnė nei 1,50 euro. Prekės, perkamos su kompensuojamuoju receptu, įskaičiuojamos į įsigyjamų (perkamų) prekių krepšelį (kiekį), tačiau joms nuolaida netaikoma.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaidos netaikomos perkant su kompensuojamuoju receptu, mokant už skiepus, taip pat pradinio maitinimo pieno mišiniams, kartiniams (gaminamiems vaistinėje) ir vardiniais vaistams, įsigyjant dovanų kuponus, pakavimo maišelius. Nuolaidos netaikomos perkant www.gintarine.lt, net jei už prekes atsiskaitoma jas atsiimant vaistinėse. Nuolaidos netaikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Visos nuolaidos galioja tik su PC NORFA lojalumo kortele.

Informaciją apie kitu nei nurodyta laiku vykstančias LAIMĖS VALANDAS rasite www.nvaistine.lt. Informacija apie kitas akcijas ir prekes, kurioms netaikomos akcijos LAIMĖS VALANDOS nuolaidos, suteikiama kiekvienoje vaistinėje, el. paštu info@nvaistine.lt arba nemokamu tel. 8 800 10008.

NVAISTINĖ
VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS



2 UŽ 1 KAINĄ



„WALMARK“ VITAMINAI IR MINERALAI VISAI ŠEIMAI

MAISTO PAPILDAI

„Mega Vitaminas D 4000 IU“ – didelė dozė vitamino D imunitetui, kaulams ir dantims. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei normalią kaulų ir dantų būklę. Taip pat padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą.

„Super Vitaminas C“ – prailginto veikimo vitaminas imunitetui. Papildytas erškėtuogių vaisių milteliais, kurie padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir kvėpavimo takų veiklą.

„Kalcis, Magnis, Cinkas FORTE“ – aukštos kokybės mineralai, papildyti vitaminu D. Padeda palaikyti normalią kaulų būklę, tinkami ir vaikams nuo 4 metų.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtais prekėmis.

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMAI!

Vitamino D3 šaltinis



OLIDETRIM®

OLIDETRIM® 2000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių **10⁹⁹ €**

OLIDETRIM® 4000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių **14⁹⁹ €**

OLIDETRIM® 2000 TV, 60 minkštųjų kapsulių **11⁴⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

Imunitetui – vitaminas D 2000 ir 4000 TV.

Širdžiai, smegenims – DHR+ EPR omega-3 rūgštys.

Kaulams ir raumenims – vitaminai D ir K2.

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Omega-3 riebalų rūgštys DHR (dokozaheksaeno) ir EPR (eikozapentaeno) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą. Siekiant maksimaliai padidinti vitamino D papildą naudoti, juos naudinga vartoti kartu su vitaminu K2.

GERIAUSIA GYNYBA – STIPRUS IMUNITETAS.

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

DETRICAL 2000 IU, 60 plėvele dengtų tablečių **8⁹⁹ €**

DETRICAL 4000 IU, 60 plėvele dengtų tablečių **11⁴⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

Didelė vitamino D dozė tablete imunitetui, kaulams ir dantims. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų bei raumenų funkciją ir dantų būklę. 1 tablete per dieną. Užgeriti stikline vandens.

Šlapimo takų sistemos



1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMAI!

URINAL

MAISTO PAPILDAS

„Urinal“ – šlapimo takų sistemos. Unikalus spanguolių ekstrakto, paprastųjų rykštenių ir vitamino D derinys.

„Urinal Akut“ – didelės koncentracijos spanguolių ekstrakto „ExoCyan“, paprastųjų rykštenių ekstrakto ir vitamino D derinys.

„Urinal sirupas“ – tinkama vaikams nuo 1 metų.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtais prekėmis.



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

FJORD STRONG OMEGA-3

GENIUS DROPS žuvų taukų lašai, 50ml **16⁹⁹ €**

SMART GUMMIES, 45 guminukai **19⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

FJORD STRONG OMEGA-3 GENIUS DROPS – genialūs lašai genialiems protams.

✓ Tokios stiprios koncentracijos omega-3, kad užtenka vos keletą lašų per dieną (su pipete).

✓ Sertifikuota aukščiausia kokybė iš natūralių žuvų taukų.

✓ Ypač tyras šaltinis iš laukinių, mažų, riebių žuvų, be žuvies skonio.

FJORD STRONG OMEGA-3 SMART GUMMIES – revoliucinė kramtoma omega-3 forma.

✓ Norvegijos mokslininkų sukurta technologija, leidžianti organizmui geriau pasisavinti omega-3.

✓ Natūralaus pasifloro skonio, visai nesijaučia žuvies. Be cukraus. Be gliukozės.

„FJORD STRONG OMEGA-3“ – GALI DAUGIAU, NEI TIKIESI.



1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMAI!

HERBITASSIN®

HERBITASSIN® ICELAND MOSS HYDRO, 12 pastilių **5²⁹ €**

HERBITASSIN® SALVIA + VIT C, 12 pastilių **4⁹⁹ €**

HERBITASSIN® ICELAND MOSS + HONEY, 12 pastilių **4⁵⁹ €**

HERBITASSIN® ICELAND MOSS + BLACKCURRANT, 12 pastilių **4⁵⁹ €**

HERBITASSIN® INTENSE, 12 pastilių **4⁵⁹ €**

HERBITASSIN® ledinukai su šalavijais ir svilarožėmis, aviečių ir obuolių skonio, 4 vnt. **4⁹⁹ €**

HERBITASSIN® ledinukai HERBAL EXTRACTS + VIT C, braškių ir miško uogų skonio, 4 vnt. **4⁹⁹ €**

MEDICINOS PRIEMONĖ, MAISTO PAPILDAS, MAISTO PRODUKTAI

„Herbitassin“[®] įvairių skonių pastilės bei ledinukai su augaliniais ekstraktais ir vitaminu C – gerklės ir imunitetui. Islandinės kerpenos padeda palaikyti normalią gerklės ir balso stygų funkciją, mentolis – normalų kvėpavimą, o vitaminas C – normalią imuninės sistemos veiklą. „Herbitassin“[®] Iceland moss HYDRO[®] pastilės su hialuronu drėkina gerklės gleivinę, ramina gerklės skausmą, mažina sauso kosulio ir užkirmos simptomus. Naujiena: „Herbitassin“[®] Intense[®] – mentolio ir eukalipto skonio pastilės gerklės ir kvėpavimui.



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

BEOTEBAL® PLUS PLAUKAMS, ODAI, NAGAMS, 30 +10 tablečių **33⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

„Beotbal“[®] PLUS plaukams, odai, nagams[®] rekomenduojamas kasdienė plaukų, odos ir nagų būklės bei išvaizdos priežiūra. Ypač tinkamas laikotarpiu, kai plaukus, odą ir nagus veikia aplinkos veiksniai (saulė, vanduo, vėjas, šaltis, sniegas, lietus) ar po intensyvių kirpyklos procedūrų (pvz.: dažymo, tiesinimo, džiovimo) ir kosmetinių nagų procedūrų. Sudėtyje yra originalus koncentruotas „NutriAminoBiotinum“ kompleksas, kuriame yra daug aminorūgščių, mineralų ir vitaminų – įskaitant biotiną ir natūralią silicį, turintį naudingą poveikį plaukams, odai ir nagams. Gaminyje nėra gliukozės ir laktozės. Tinka vegetarams ir veganams.

GRIZIO FORMULĖ TAVO PLAUKAMS, ODAI IR NAGAMS!



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

DAILEE

LADY

DISCREET

HIGIENOS PRIEMONĖS

„DAILEE Lady Premium“ įklotai – orui laidūs, ploni, daug sugeriantys, minkšti ir švelnūs. Paviršius impregnuotas alijošiaus ekstraktu, saugančiu odą nuo sudirginimo. Puikiai prilimpa, įvairių dydžių. **Kvapo kontrolė iki 12 val.**

„DAILEE Discreet Premium“ įklotai – orui laidūs, ploni, daug ir greitai sugeriantys, minkšti ir švelnūs. Lankstūs apsauginiai barjerai padeda užtikrinti didesnę apsaugą. Puikiai prilimpa, įvairių dydžių. Supakuoti atskirai po vieną. **Kvapo kontrolė iki 12 val.**

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtais prekėmis.

IKI **-50%****„MÖLLER'S“ ŽUVŲ TAUKAI IR OMEGA-3 KAPSULĖS****MAISTO PAPILDAI**


„Möller's“ – tai šimtmečiais puoselėjami žuvų taukai visai šeimai. „Möller's“ žuvų taukų kapsulės išsiskiria kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyviu medžiagų deriniais. Tyri ir gerai išvalyti „Möller's“ žuvų taukai puikiai tinka vartoti kasdien visą gyvenimą. Įvairaus skonio krantomosios žuvėlės „Möller's Junior“ yra omega-3 ir vitamino D – augančiam vaikų organizmui naudingų medžiagų.

OMEGA-3 EKSPERTAI JAU 170 METŲ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

**-25%** **13^{49€}**
17^{99€}

Su natokinazės fermentu

**NATASPIN H**, 30 kapsulių
SPECIALIOS MED. PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAS

Tik mitybos reguliavimui esant kraujotakos sutrikimams ir padidėjusiai trombozės susidarymo rizikai.

Grymasis kiekis: 30 kapsulių - 13,8 g

SUTEIKITE GYVYBĖS KRAUJOTAKAI SU „NATASPIN“

-30%**FERGLOBIN, FERGLOBIN PLUS****MAISTO PAPILDAI**

„Ferglobin“ – geležies, vitaminų ir mineralų kompleksas normaliai kraujodarai (foliatai), raudonųjų kraujo kūnelių gamybai (vitaminai B6, B12, geležis), hemoglobino susidarymui (geležis) palaikyti. „Ferglobin“ puikiai padidina mitybą nešumo ir laktacijos laikotarpį, vaikystėje ir paauglystėje, sveikstant po ligos ar operacijos.

„Ferglobin Plus“ ne tik padidina geležies atsargas, bet ir padeda mažinti pavargimo jausmą (vitaminai B6 ir B12), palaiko fizinę ir protinę energiją (sibirinis ženšenis).

GELEŽIS, KURIAI NĖRA LYGIŲ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

Virtuali klinika

Šeimos gydytojas
tavo telefone

Konsultacijos kasdien ...

6-22



Tyrimai



E. receptai



Siuntimai



Programėlę atsisiųsti:

Download on the
App StoreGET IT ON
Google Play

9⁹⁹ €

THERAFLU

THERAFLU ND, 1000 mg/60 mg/30 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 10 pakelių
THERAFLU NT, milteliai geriamajam tirpalui, 10 pakelių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Terapinės indikacijos. „Theraflu ND“: peršalimo sukeltų simptomų (skausmo, nosies gleivinės užburkimo, erzinančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. „Theraflu NT“: peršalimo sukeltų simptomų (skausmo, nosies gleivinės užburkimo ir sekrecijos, čiaudulio, erzinančio kosulio, akių ašarojimo ir niežėjimo bei karščiavimo) lengvinimas. **Vartojimas.** Suaugusiems žmonėms bei 16 m. ir vyresniems paaugliams: gerti po 1 pak. kas 6 val. pagal poreikį. Negalima vartoti daugiau kaip 4 pak. per 24 val. Gyvyje būkite neturi viršyti 5 parų. 1 pak. turinį išsupti stiklinėje karšto, tačiau ne verdančio vandens (maždaug 250 ml). Vartoti per burną. **Kontraindikacijos.** Alergija veiklioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, jei vartojate ar per pastarąsias 2 sav. vartojote vaistų nuo depresijos arba Parkinsono ligos, vadinamųjų MAOI, vartojate kitų simpatomimetikų, yra uždaržio kampo glaukoma (padidėjęs akispūdis), netūmus laikotarpis. „Theraflu ND“: labai aukštas kraujospūdis, širdies kraujagyslių liga, sunkus inkstų veiklos sutrikimas, yra kvepavimo nepakankamumas, plaučių liga ar astmos priepuolis, jei vartojate oksazolidinono klasės antibiotikų, žindymo laikotarpis. „Theraflu NT“: sunki širdies liga, kepenų ar inkstų veiklos sutrikimas. **Specialūs įspėjimai.** Nevartoti kitų vaistų, kuriuose yra paracetamolio. Nevartoti alkoholio. Pasitarti su gydytoju, jei yra inkstų ar kepenų liga, lėtinis alkoholizmas, gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės nepakankamumas, padidėjęs širdies ritmas, aukštas kraujospūdis, padidėjęs skydliaukės aktyvumas, cukrinis diabetas, padidėjusi prostata, psichikos liga, kosulys su dideliu kiekiu šlapio, lėtinis kosulys, aukšta temperatūra, išbėrimas, pastovus galvos skausmas, jei vartojate vaistų nuo depresijos ar psichotropeikų, netekus skystų ar badaujant. Pasitarkus karščiavimui ir išplitusiai raudonei su smulkiais pūlinėliais, staigiam pilvo skausmui, kraujavimui iš tiesiosios žarnos ar kitoms išeminio kolito simptomams, likus kelioms dienoms iki operacijos, būtina nutraukti vaisto vartojimą ir kreiptis į gydytoją. Gali sukelti priklausomybę. Sudėtyje yra aspartamo ir sacharozės. „Theraflu ND“: pasitarti su gydytoju, jeigu yra širdies liga ar antinksčių auglys, vyresniems nei 60 m. Pasitarkus stipriam galvos skausmui, pykinimui, vėmimui, regėjimo sutrikimams, būtina nutraukti vaisto vartojimą. „Theraflu NT“: pasitarti su gydytoju, jeigu yra kvepavimo nepakankamumo pavojus, hemolitinė anemija. Daugiau informacijos pateikią šių vaistų pakuotės lapeliuose. Reklamos teksto parengimo data 2024 m. Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi jų licenciją. ©2024 HALEON arba licencijos turėtojas.

8⁹⁹ €

ACTIFED®

ACTIFED® 60 mg/2,5 mg tabletės, 12 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tablete yra 60 mg pseudoelefidino hidroklorido ir 2,5 mg triprolidino hidroklorido. **Terapinės indikacijos:** nosies ir viršutinių kvėpavimo takų gleivinės užburkimo mažinimas; nosies tekėjimo ir čiaudulio slopinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: po 1 tabletę kas 4–6 val., iki 4 kartų per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, pacientai, kurie per pastarąsias 14 dienų vartojo monoaminooksidazės inhibitorių; širdies ir kraujagyslių ligos; sunki hipertenzija arba jeigu hipertenzija nesureguliuota skiriant vaistų; sunki širdies ir kraujagyslių liga arba inkstų nepakankamumas; cukrinis diabetas, feochromocitoma; hipertirozė; uždario kampo glaukoma; kitų simpatomimetikų gleivinės paturkijimą mažinančių vaistų ir beta blokatorių vartojimas; vaikai iki 12 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Actifed“ gali sukelti mieguistumą. Nevartoti kartu alkoholio. „Actifed“ vartojimą reikia nutraukti, jei pasireiškia šie sutrikimai: haliucinacijos, nematymas, miego sutrikimai, karščiavimas ir išplitusi raudonė su smulkiais pūlinėliais, staigus regos netekimas arba regos aštrumo sumažėjimas, staigus pilvo skausmas, kraujavimas iš išangės ar kiti išeminio kolito simptomai. Nedelsdami nutraukite „Actifed“ vartojimą ir kreipkitės skubios medicinos pagalbos, jeigu pasireiškė stiprus staiga prasidėjęs galvos skausmas, pykinimas, vėmimas, sumišimas, traukuliai, pakilusi sudėtyje yra laktozės. Reklamos teksto parengimo data 2024-09-18. LT-AC-2400001.

ATKĖMSA NOSĮ IR SINUSUS. STABDO NOSIES VARVĖJIMĄ. SLOPINA ČIAUDULĮ.

-30%

5^{17€}

AMEDIPLUS

Skaitmeninis termometras kietu galiuku, 1 vnt.

MEDICINOS PRIETAISAS

NOSIES GLEIVINĖS PABURKIMUI MAŽINTI

5⁴⁹ €

RHINO-STAS nosies purškalas, tirpalas, 10 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 ml nosies purškalo yra 1 mg ksilometazolino hidroklorido. **Indikacijos:** „Rhino-stas“ yra simpatikomimetikas. Purškalas siaurina kraujagysles, todėl mažina nosies gleivinės paburkimą. Vartojamas trumpalaikiam nosies gleivinės paburkimui mažinti, sergant sloga arba prienosinių ančių uždegimu (sinusitu). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 10 m. vaikams bei paaugliams reikia purkšti po 1 įpurškimą tirpalo „Rhino-stas“ į kiekvieną nosies landą 1–3 kartus per parą tada, kada reikia. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jei yra sausasis nosies gleivinės uždegimas (sausasis rinitas); pacientams, kuriems pro nosį neseniai buvo atlikta smegenų operacija; jaunesniems kaip 10 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** „Rhino-stas“ galima vartoti tik atidžiai įvertinus jo vartojimo riziką ir galimą naudą šiais atvejais: pacientams, kurie vartoja ar vartoja vaistų nuo depresijos (monoaminooksidazės inhibitorių) arba kitų vaistų, kurie gali labai padidinti kraujospūdį; kai padidėjęs akispūdis, ypač sergant uždaruo kampo glaukoma; sergant sunkia širdies ir kraujagyslių sistemos liga (pvz., vainikinių širdies arterijų liga, hipertenzija); sergant feochromocitoma (antinksčių naviku); sergant porfirija; sergant medžiagų apykaitos ligomis (pvz., hipertiroze, cukriniu diabetu). Pakuotės lapelio peržiūros data 2018-10-23. Reklamos teksto parengimo data 2020-02-03.

PURŠKALAS „RHINO-STAS“ – PIRMOJI PAGALBA SERGANT SLOGA AR SINUSITU!

-15%

STERIMAR
MEDICINOS PRIEMONĖS

„Sterimar“ nosies purškalai pagaminti iš natūralaus jūros vandens, papildyto mineralais ir mikroelementais, kurie padeda palaikyti nosies gleivinės sveikatą. Produktai tinka kasdieninei nosies higienai, alergijos simptomams lengvinti, peršalimo prevencijai ir užsikimšusiai nosiai atkūrimui tiek suaugusiems, tiek vaikams. „Sterimar“ užtikrina švelnią ir veiksmingą priežiūrą, padedančią kvėpuoti laisvai ir natūraliu būdu.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

6⁹⁹ €

HEXORALETTEN N, 5 mg/1,5 mg, kietosios pastilės, 16 vnt.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje pastilėje yra 5 mg chlorheksidino dihidroklorido ir 1,5 mg benzokaino. **Terapinės indikacijos:** lokalus burnos ir ryklės infekcinių ligų: faringito, stomatito, gingivito, simptomų slopinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: jei nepaskirta kitaip, sučiulpti po 1 kietąją pastilę keletą kartų per parą. Jei reikia, galima čiulpti po 1 kietąją pastilę kas 1–2 val., daugiausia 8 kietąsias pastiles per parą. 6–12 m. vaikams: jei nepaskirta kitaip, sučiulpti po 1 kietąją pastilę keletą kartų per parą. Jei reikia, galima čiulpti po 1 kietąją pastilę kas 1–2 val., daugiausia 4 kietąsias pastiles per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; sumažėjęs plazmos cholinesterazės kiekis; burnoje ar gerklėje yra žaizdų ar opų; jaunesni kaip 6 m. vaikai. **Specialūs įspėjimai:** jeigu sergate sunkia infekcine liga, pasireiškiančia aukšta temperatūra, galvos skausmu, vėmimu, būtina gydytojo konsultacija, ypač jei savijauta nepagerėja per 3 dienas. Jei yra burnos gleivinės epitelio defektų ar gleivinė lupasi, šio vaisto vartoti nereikėtų. Benzokainas gali sukelti metemoglobinemiją (pasireiškia odos, lūpų ir nagų guolių blyškumu, pilkumu ar mėlynumu, galvos skausmu, svajulių, dusuliu, nuovargiu ir dažnu širdies plakimu). Kietosios pastilės gali sukelti užspringimo riziką. Šio vaisto reikia vartoti atsargiai, jeigu turite aspiracijos ir rijimo problemų. Vengti valgyti ar gerti iškart po pastilės vartojimo. „Hexoraletten N“ sudėtyje yra aspartamo ir izomalto. Reklamos teksto parengimo data 2024-06. LT-HXR-2400001.

NORFOS VAISTINĖJE GALITE PASISKIEPYTI NUO GRIPO

SKIEPO KAINA

18⁹⁹ €

SU LOJALUMO KORTELE

15⁹⁹ €

Galima išankstinė registracija:

- internetu www.nvaistine.lt/skiepai
- telefonu +370 800 10 008

Nuolaidos taikomos su PC Norfa kortele.
Akcijos „Laimės valandos“ nuolaidos netaikomos.



PERŠALIMO LIGŲ SIMPTOMAMS LENGVINTI

NUO 7⁹⁹ €

FERVEX

FERVEX vaikams, granulės geriamajam tirpalui paketėlyje, 8 pak. 7⁹⁹ €
FERVEX suaugusiems, granulės geriamajam tirpalui paketėlyje, 8 pak. 7⁹⁹ €
FERVEX suaugusiems, be cukraus, granulės geriamajam tirpalui paketėlyje, 8 pak. 8⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 paketėlyje „Ferve“ suaugusiems ir suaugusiems, be cukraus, yra 500 mg paracetamolio, 25 mg fenilaminio maleato, 200 mg askorbo rūgšties; 1 paketėlyje „Ferve“ vaikams yra 280 mg paracetamolio, 10 mg fenilaminio maleato, 100 mg askorbo rūgšties. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikis ūminis peršalimo ligų simptomų (karščiavimo, nosies gleivinės paburkimo, skausmo) lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Ferve“ suaugusiems, be cukraus: suaugusiems ir paaugliams nuo 15 m. (sveikantiems daugiau kaip 50 kg) gerti po 1 paketėlį, jei reikia, kartoti mažiausiai po 4 val., neviršijant 3 paketėlių per parą. „Ferve“ vaikams: 6–10 m. vaikams gerti po 1 paketėlį 2 kartus per parą (mažiausiai kas 12 val.); 10–12 m. vaikams – po 1 paketėlį 3 kartus per parą (mažiausiai kas 8 val.); 12–15 m. paaugliams – po 1 paketėlį 4 kartus per parą, bet ne dažniau kaip kas 6 valandas. Mažiausią gydymo trukmę yra 5 dienas, vartojant „Ferve“ suaugusiems, ir 3 dienas – „Ferve“ vaikams. Jei inkstų ar kepenų funkcija sutrikusi, vartoti atsargiai, rekomenduojama sumažinti dozę ir palaikyti minimalų intervalą tarp dozių. Rekomenduojama, kad paruoštas tirpalas būtų laikomas ne ilgiau kaip 3 valandas. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas vaisto sudedamosioms dalims, sunkus kepenų nepakankamumas, aktyvios kepenų ligos, ūdariojo kampo glaukoma, šlapimo susilaikymas, skrandžio prievarto stenozė, šlapimo takų akmenys, „Ferve“ suaugusiems: draudžiama vartoti vaikams ir paaugliams iki 15 m. „Ferve“ vaikams: draudžiama vartoti vaikams iki 6 metų. „Ferve“ suaugusiems, be cukraus – fenilketonurija. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pastarąjį su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergate Žilbero (Gilbert) sindromu, sergate kepenų arba inkstų liga, piktnaudžiaujate alkoholiniu gerimu, yra anoreksija, kacheksija arba ligalaidė bloga mityba (glutatioino atsargų kepenyse būna mažos), yra dehidracija, hipovolemija, sutrikusi gleivės apykaita, yra polinkis susidaryti akmenis šlapimo takuose, pacientams, sveikantiems mažiau nei 50 kg, trūksta gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės, yra hemolitinė anemija, yra padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, psichikos, bronchų spazmo priepuolių, jei sergate ar pasireikšė ūminis virusinis hepatitas arba jei vartojate fluoksalaciną (antibiotiką), labai pažeidę kepenis, atsidarę miegutumas, pykinimas ir vėmimas. Atsiradus odos išbėrimui ar kitoms alergijos požymiams, nutraukite gydymą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Reikia patikrinti, ar tuo pat metu nevartojama kitų vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra paracetamolio, fenilaminio ar kitų antihistamininių vaistų, vitamino C, ir neviršyti didžiausios leistinos dozės. Sergantiems cukriniu diabetu atsargiai vartoti „Ferve“ suaugusiems, sergantiems fenilketonurija atsargiai vartoti „Ferve“ suaugusiems, be cukraus, esant nustatytai gliukozės ir galektos mėsos baltymams, šio vaistinio preparato negalima vartoti. Daugiau informacijos žr. vaistinių preparatų charakteristikų santraukose arba pakuotų lapeliuose. Reklamos teksto parengimo data 2025-09-10. PM-LT-2025-9-5344.



VIRUSINIŲ PERŠALIMO LIGŲ SIMPTOMAMS LENGVINTI

NUO 7⁹⁷ €

OSCILLOCOCCINUM

OSCILLOCOCCINUM, vienodozės talpyklės, 6 piliulės 7⁹⁷ €
OSCILLOCOCCINUM, vienodozės talpyklės, 30 piliulių 27⁹⁷ €

HOMEOPATINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 doze (1 g) yra 0,01 ml laukinių ančių (*Anas Barbaria*) kepenų ir širdies ekstrakto 200K potencijos. **Indikacijos:** virusinių peršalimo ligų simptomų lengvinimas. **Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.** Jei ligos eiga sunkesnė, jai gydyti reikia naudoti klinikiniais tyrimais patikrintas priemones. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** dozė priklauso nuo ligos stadijos. Inkubacijos laikotarpiu ir kai tik atsiranda simptomų – 1 dozė. Kartoti 2 ar 3 kartus kas 6 valandas. Sergant – 1 dozė 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare) 1–3 paras. 1 dozės turinį suberti po liežuviu ir leisti ištirpti. Vartojimas vaikams: prieš vartojimą piliulės ištirpinti vandenyje. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galektos mėsos baltymų arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Taip pat tiems, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galektos mėsos baltymų. Teksto parengimo data 2018-11.

NELEISK PERŠALIMUI TAVĘS ĮVEIKTI! „OSCILLOCOCCINUM“!



-30% 2^{00€}



ASKORBO RŪGŠTIS, 50 mg, 200 dražečių

MAISTO PAPILDAS


Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės, nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

-20% Perkant bent DVI bet kurias pakuotes

MOSS linija

MAISTO PAPILDAS, MEDICINOS PRIEMONĖS

„ColdMoss“ augalinis ekstraktų mišinys, praturtintas vitaminu C, padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą. Sirupas „BronchoMoss“ skirtas drėgnam ir sausam, dirginančiam kosuliui palengvinti bei susiduriantis tirštoms gleivėms skystinti. Biologikai aktyvių veiklių medžiagų kompleksas sukuria apsauginį gleivinės sluoksnį, sumažina dirginimą, stabdo infekcijos plitimą, mažina kosulio priepuolius ir lengvina atsisveijimą. Sirupas „BronchoMoss Baby“ skirtas vaikų nuo 1 m. apatinių kvėpavimo takų funkcijai pagerinti. „BronchoMoss“ tabletės esantys islandinės kepenų gniuoliai ir baltųjų pušų žievės padeda palaikyti kvėpavimo takų funkciją, vitaminas C – imuninės sistemos funkciją. „SinuMoss“ minkštosios kapsulės ir „SinuMoss Baby“ geriamieji lašai pagaminti iš natūralių biologškai aktyvių eterinių aliejų ir augalų ekstraktų, kurie padeda palaikyti viršutinių kvėpavimo takų funkciją. Kapsulės skirtos suaugusiems ir vaikams nuo 6 m., o geriamieji lašai – vaikams nuo 1 m. Minkštosios „ImunoMoss“ daugiakomponentė sudėtis pasižymi kompleksiniu poveikiu – stiprina ne vien tik imuninę, kartu palaiko kvėpavimo takų ir virškinamojo trakto funkciją. Tinka vaikams nuo 3 m.



NUO PERŠALIMO

NUO 4⁹⁹ €

DALERON COLD3

DALERON COLD3, 12 plėvele dengtų tablečių 4⁹⁹ €
DALERON COLD3, 24 plėvele dengtos tabletės 8⁹⁹ €



NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Vienoje plėvele dengtoje tablete yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudofedrinio hidrochlorido ir 15 mg deksketometorano hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** Peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, sąnarių, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Paracetamolio dozė suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vaikams yra 2 tabletės. Tokia dozė galima gerti daugiausia 4 kartus per parą. Tarp dozių vartojimo turi būti praėjus mažiausiai 4 valandos. Didžiausia paros dozė yra 8 tabletės. **Kontraindikacijos, specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Sunki hipertenzija ar išeminė širdies liga. Vartojama MAO inhibitorių, guanidino arba jo darinių, beta blokatorių arba vartojama kitų vaistinių preparatų, kuriuose yra paracetamolio. Sunkus kepenų arba inkstų funkcijos sutrikimas. Kartu vartojamas kitų kraujagysles sutraukiančių vaistinių preparatų nosies gleivinės paburkimui mažinti, įskaitant vartojimą per burną ar į nosį. Anksčiau persirgęs miokardo infarktas, buvęs insultas arba šiuo metu esantis insulto rizikos faktorius. Sergama lėtiniu alkoholiizmu, glaukoma, feochromocitoma, sisteminė raudonoji vilkligė, cukrinis diabetas, hipertirozizmas ar bėdijama. Esant prostatos padidėjimui ar ankščiau buvę traukuliai. Reklamos teksto parengimo data: 2023 10 17.

PRADEDA VEIKTI JAU PER 20 MINUČIŲ!

IKI -50%



RUTIN FORTE + C, 30 kapsulių 11⁸⁵ 6⁹⁵ € -40 %

VITAMIN C PROLONG, 40 kapsulių 11²⁹ 5⁶⁵ € -50 %

MAISTO PAPILDAS

„Rutin forte+C“ sudėtyje yra rutozido, vitamino C, cinko ir seleno. Normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių funkcijai, susidarymą padeda palaikyti vitaminas C. Normalią imuninės sistemos veiklą padeda palaikyti vitaminas C, cinkas ir selenas. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną.

„Vitamin C prolong“ kapsulės yra pagamintos patentuotas vitaminas „Ester-C“. Moksliniai tyrimai rodo, kad patentuota „Ester-C“ forma organizme išlieka iki 24 valandų, nedirgina skrandžio, nėra toksiška kepenims, lėčiau pasišalina iš organizmo. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, taip pat apsaugoti organizmą nuo oksidacinės pažeidos bei sumažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę „Vitamin C prolong“ per dieną, užgeriant stikline vandens.

GERKLĖS PERŠTĖJIMUI IR UŽKIMIMUI LENGVINTI

-20%



ISLA

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Isla“ pastilių su islandinėmis kepenimis sudedamosios dalys padengia gleivinę, gerklę ir ryklę kaip balzamas. Tokiu būdu sudirgusi gleivinė apsaugoma nuo tolesnio dirginimo ir greičiau atsigaus dėl malonaus pastilių poveikio, ypač esant užkimimui ir peršalimui gerkle.

Isla Moos, Cassis, Ginger, Mint: suaugusieji ir vyresni kaip 4 metų vaikai turi lėtai čiulpti 1–2 pastiles keletą kartų per dieną pagal poreikį.

Isla Junior: vyresniems kaip 4 metų amžiaus vaikams pagal poreikį galima duoti lėtai sučiulpti iki 6 pastilių per dieną.

Reikia įsitikinti, kad vaikai jau sugeba kontroliuojamai čiulpti pastilę.

Isla medic: suaugusiems ir vyresniems kaip 6 metų vaikams pagal poreikį galima sučiulpti iki 6 pastilių per dieną.

Reklamos teksto parengimo data 2024-10-22. PM-LT-2024-10-6135

*Akcija taikoma gėtona etiketė pažymėtoms prekėms

7⁹⁷ €**ILOXEN 200 mg/30 mg** plėvele dengtos tabletės, 12 tablečių**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veiklosios medžiagos ir siurupas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg fenilo ir 30 mg pseudoeferidino hidroklorido. **Tarpinės indikacijos:** „Iloxen“ vartojamas kaip suaugusiųjų ir 15 m. bei vyresnių paauglių peršalimo (nosies užgulimas, pasireiškęs kartu su galvos skausmu ir (arba) karščiavimu) simptominių gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tabletes reikia nurinti nepažeidus ir nekamtyti, užgeriant didele stikline vandens, geriausia – valgio metu. Suaugusiems ir 15 m. bei vyresniems paaugliams – po 1 tabletę kas 6 val. pagal poreikį. Jeigu simptomai išreikšti stipriai, po 2 tabletes kas 6 val. pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 6 tabletes per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios ar pagalbinės šio vaisto medžiagoms; padėtos yra vaikas iki 15 m.; moterims trečio nėštumo trimestro, žindymo laikotarpio; ankštesnė pasireišusi alerginė reakcija arba dusulys, astma, šėrimas, nosies niežulys ir varijavimas arba vėdo patinimas, sukelti acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU); virškinimo trakto kraujavimas arba perforacija, anksčiau pasireišę vartojant NVNU; skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa ar kraujavimas arba anksčiau buvo 2 ar daugiau atskirų pavirtimų opų ar kraujavimo epizodų; sunkus kepenų nepakankamumas; sunki ūminė ar lėtinė inkstų liga arba sunkus ūminis ar lėtinis inkstų nepakankamumas; sunkus širdies nepakankamumas; sunkus širdies arba kraujagyslių sutrikimas (širdies liga, aukšta kraujospūdis, krūtinės angina, padidėjęs širdies susitraukimų, padidėjęs širdies kraujotakos aktyvumas, diabetas arba feochromocitoma (antinksčių navikas); jei anksčiau patyrėte širdies priepuolį (miokardo infarktą); patyrėte insultą arba gydytojas yra jums sakęs, kad turite padidėjusią insulto riziką, yra labai padidėjęs kraujospūdis arba jeigu hipertenzija nesureguliuota skirtingais vaistais; jei Jums yra buvę traukulių dėl neaiškios priežasties sutrūkęs kraujagyslių gumbas; padidėjęs akispūdis (sergale uždarą kampo glaukoma); pasunkėjęs šlapinimasis dėl prostatos sutrikimų; diagnozuota sisteminė raudonoji vilkligė; negalima vartoti kartu su kitais vaistais nuo nosies užgulimo, metilfenidatu, kai kuriuos vaistus nuo depresijos. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Iloxen“ reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU. Pastarąsias su gydytoju arba vaistininku, jei sergate bronchių astma, cukriniu diabetu, psichozu, yra padidėjęs širdies kraujotakos aktyvumas, yra buvę koks nors virškinimo trakto sutrikimas ar sergate arba sergate virškinimo trakto liga, padidėjęs kraujospūdis, nesveiki inkstai ar kepenys, sutrikęs kraujagyslių kraujotakos, sergate infekcine liga, sergate širdies liga, skatinant širdies nepakankamumą ir krūtinės angina (krūtinės skausmas), arba jeigu anksčiau Jūs būvo iškęs širdies priepuolį, atlikta kraujagyslių šuntavimo operacija, sergate periferinių arterijų liga arba Jūs būvo iškęs bet koks insultas, jeigu padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje, Jūs šėmėsi nariai serga ar sergo širdies liga ar insultu, rūkote. Nutraukite „Iloxen“ vartojimą ir susisiekiite su gydytoju arba skubiai kreipkitės medicinos pagalbos, jei pasireiškia staigus pilvo skausmas, kraujavimas iš tiesiosios žarnos ar kiti išeminio kolito simptomai, jei Jums pasireiškia odos išbėrimas, gleivinių paraudimas, pūsles ar kitų alergijos požymių, jeigu staiga praradote regėjimą, jeigu Jums pasireiškia užpakalinės grįžamosios encefalopatijos sindromas (UGES) ar grįžamosios smegenų vazokonstriktijos sindromas (GSVS) simptomų; stiprus staiga prasidėjęs galvos skausmas, pykinimo jausmas, vėmimas, sumišimas, traukuliai, pakitusi rega.

Reikiamo testo parengimo data: 2018-11-12**DVIGULBAS SMŪGIS SINUSITUI!****KOSULIUI LENGVINTI**6⁹⁹ €**STODAL Sirupas, 200 ml****HOMOEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veiklosios medžiagos, siurupas: *Antimonium tartaricum* 6CH, 59.375 mg, *Bryonia* 3CH, 59.375 mg, *Coccus cacti* 3CH, 59.375 mg, *Drosera* TM, 59.375 mg, *Ipecac* 3CH, 59.375 mg, *Myricade* 6CH, 59.375 mg, *Pulsatilla* 6CH, 59.375 mg, *Rumex crispus* 6CH, 59.375 mg, *Spongia tosta* 3CH, 59.375 mg, *Silicta pulmonaria* 3CH, 59.375 mg. **Indikacijos:** kosulio lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms ir paaugliams po 15 ml matavimo laurėlį 3-5 kartus per parą; vaikams (2-12 m.) po 5 ml matavimo laurėlį 3-5 kartus per parą. Vaistinio preparato sudėtyje yra etanolio, todėl vaikams iki 2 m. vartoti negalima. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios ar pagalbinės šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** šio vaistinio preparato sudėtyje yra 1,74 tūrio % etanolio (alkoholio). Vienoje 5 ml dozėje yra 0,059 g etanolio ir vienoje 15 ml dozėje yra 0,205 g etanolio. Kenksminga sergantiems alkoholizmu. Būtina atsargiai vartoti nėščioms, žindyvioms, vaikams ir didelės rizikos grupės (pvz., sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija) pacientams. Negalima ilgai kaip savaitę vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams, nes sudėtyje yra etanolio. Vienoje 5 ml dozėje yra 3,75 g sacharozės ir vienoje 15 ml dozėje yra 11,25 g sacharozės. I tai reikia atsižvelgti gydant sergančius cukriniu diabetu. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas relas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Teksto parengimo data 2018-11.

PRASIDEDA KOSULYS? VARTOK „STODAL“ IR JIS IŠNYKYS!

-30%

NAUJIENA

**DR. PAKALNS****MAISTO PAPILDAI**

Prekių ženklas „Dr. Pakalns“ – tai pagarba mokslui, gamtai ir žmogui. Įkvėptas vaistininko ir biologijos mokslų daktaro Dailonio Pakalno palikimo, jis jungia tradicijas, mokslą ir rūpestį žmogui.

Produktai:

- BETA IMMUNE balzamas** – su beta gliukanais ir šeimamedžių uogomis. Šeimamedžių vaisių ekstraktas, vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Sudėtyje – itin grynai beta gliukanai. Tinka vaikams nuo 3 metų. **Be glitimo. Be GMO. Be alkoholio. Kokybė patvirtinta GMP standartu.**
- GYSLIOČIŲ balzamas** – su siauralapių gysločių ekstraktu, padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų funkciją ir gerklės komfortą. Tinka vaikams nuo 3 metų. **Be glitimo. Be GMO. Be alkoholio. Kokybė patvirtinta GMP standartu.**
- PINI PLUS sirupas** – su pušų pumpurais ir diobreliais, tradiciškai vartojamais kvėpavimo takų funkcijai palaikyti, padeda išlaikyti gerklės komfortą ir natūralų atsisakymo procesą. Tinka vaikams nuo 4 metų. **Be glitimo. Be GMO. Kokybė patvirtinta GMP standartu.**
- ISLANDINIŲ KERPUŲ sirupas** – su pipirėčių tinktūra. Padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų funkciją ir gerklės komfortą. Tinka vaikams nuo 12 metų. **Be glitimo. Be GMO. Kokybė patvirtinta GMP standartu.**

DR. PAKALNS – GAMTOS GALIA.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-20%

6³¹ €**MEDISTUS® ANTIVIRUS, 10 tablečių****MEDICINOS PRIETAISAI**

Reguliarus „Medistus“ Antivirus pastilių vartojimas, esant padidėjusiai oru plintantių infekcijų rizikai, palaiko apsaugą nuo virusinės ir bakterinės kilmės kvėpavimo takų infekcijų, sukuria fizinį apsauginį barjerą burnos ir ryklės gleivinėje. Veiklosios medžiagos esančios Kistosyn™ 200 ekstrakte padengia burnos ir ryklės gleivinės membraną paviršių ir yra tarsi fizinis apsauginis barjeras. Tai padeda atsikratyti virusų ir bakterijų prieš jiems patenkant į organizmą. Kistosyn™ 200 veikliųjų medžiagų kompleksas sudėtyje yra tik natūralios, augalinės kilmės medžiagos. **Vartojimas.** Rekomenduojama vartoti po 1 pastilę kas 2 valandas, 3-6 pastiles per dieną. Jei vartojate per burną vartojami vaistai, tarp vartojimų darykite 2 valandų pertrauką. **Grynasis kiekis:** 20 g (10 pastilių po 2 g). **Gaminiojas.** Nutrin GmbH, Schnaid 36b, 91552 Hallendorf, Vokietija. **Platintojas Lietuvoje.** UAB „Litfas“, Vytauto g.6, LT-55175 Jonava, Lietuva, tel. (8 37) 330664, www.vaistas.lt, www.medistusantivirus.com Medicinos prietaisas CE 0481

**FARINGOSPRAY, ATMOSIL****MEDICINOS PRIEMONĖS, MAISTO PAPILDAI**

„Faringospray“ – natūralios sudėties burnos ir gerklės purškalas su šaltalankių ir medetkų aliejais, skirtas burnos gleivinės ir ryklės sudirginimams palengvinti. Formulė, sukurta naudojant tik augalinius aliejus, suformuoja apsauginį sluoksnį, kuris ramina gleivinę, mažina peršėjimą, sausumą, padeda išvengti nemalonaus diskomforto rijimo metu. **Be etanolio. Be dirbtinių dažiklių. Be konservantų.** **„Faringo lollipops“** – natūralaus skonio čulpiami ledinukai su šaltalankių aliejumi ir vitaminu C padeda palaikyti normalią gleivinių būklę bei imuninės sistemos veiklą. **Puikiai tinka vaikams. Be dirbtinių dažiklių. Be konservantų.** **„Faringo soft“ pastilės** – minkštos pastilės su šaltalankių aliejumi, hialurono rūgštimi, vitaminu C, B2 ir biotin. Duglyuotieji šaltalankiai ir hialurono rūgštis padeda drėkinti gleivinę ir palaikyti normalią jos būklę. Duglyuotieji šaltalankiai ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. **Be GMO. Be cukraus. Be laktozės.** **„Atmosil“ kapsulės ir balzamas** – pluoštinių bosveljų ekstraktas ir paprastųjų pušų žievės ekstraktas padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų funkciją ir bendrą sąjaują.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

NORFOS

VAISTINĖJE GALITE PASISKIEPYTI NUO PNEUMOKOKO

SKIEPO KAINA

84⁰⁰ €

SU LOJALUMU KORTELE

77⁰⁰ €

Galima išankstinė registracija:

- internetu www.nvaistine.lt/skiepai
- telefonu +370 800 10 008

Nuolaidos taikomos su PC Norfa kortele.
Akcijos „Laimės valandos“ nuolaidos netaikomos.



GERKLĖS DIRGINIMUI, UŽKIMIMUI IR SAUSAM KOSULIUI MALŠINTI

-30%



HERBISLAND

HERBISLAND, 16 kietųjų pastilių 8⁹⁹ 6²⁹ €
HERBISLAND, sirupas, 150 ml 8²⁹ 5⁸⁰ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

Be cukraus. Apelsinų skonio. Kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 3 mg islandinių kepenų sausojo ekstrakto (Cetraria islandica (L.) Acharius s.l., thallus), atitinkancio 90–120 mg islandinių kepenų. Tai yra tradicinis augalinis preparatas, rekomenduojamas ryklės ir burnos gleivinės dirginimui ir su tuo susijusiam sausam kosuliui palengvinti. „Herbisland“ mažina kosulio receptorių dirginimą ir drėkina sausą ryklės gleivinę. Pastilių dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams po 1 kietąją pastilę 8 kartus per dieną. Sirupo dozavimas: 1–4 m. vaikams – 2,5 ml (1/2 matavimo šaukšto) 4 kartus per dieną; 4–10 m. vaikams – 5 ml (1 matavimo šaukštas) 4 kartus per dieną; 10–16 m. vaikams – 10 ml (2 matavimo šaukštai) 4 kartus per dieną; 16 m. ir vyresniems žmonėms – 15 ml (3 matavimo šaukštai) 4 kartus per dieną.

PASAKYK „STOP“ SAUSAM KOSULIUI!

-15% 35^{69€} 4⁷⁹



LIDONIUM® 700 mg, 42 tabletės

SPECIALIOS MEDICININĖS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAS SU UGNIĄŽOLE

Tik mitybai reguliškai esant susilpnėjusiam ląsteliniam imunitetui, vėžio profilaktikos metu, siekiant pagerinti onkologinių ligonių gyvenimo kokybę ir esant skrandžio, žarnyno, kepenų ir tulžies pūslės latakų, kvėpavimo takų spazmams, uždegimams.

NOSIES UŽGULIMUI MAŽINTI IR KASDIENEI PRIEŽIŪRAI

-5%



QUIXX®

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Quixx“ efektyviai mažina peršalimo, gripo ar alergijos sukeltą nosies ir sinusų užsikimšimą. Dozavimas. Kūdikiams (nuo 6 mėn.) ir vaikams: 1–2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2–3 kartus per dieną. Suaugusiems: 1–3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2–3 kartus per dieną. „Quixx Acute“ padeda mažinti dėl peršalimo, gripo, alergijų ar alerginio rinito sudirgusių nosies latakų užsikimšimą. Vaikams nuo 3 m. ir suaugusiems. Vartokite iki 5 kartų per parą, kol vargina užsikimšusi nosi ar sausi nosies latakai. „Quixx Extra“ su eukaliptų aliejumi, mažina nosies ir sinusų užsikimšimą peršalus ir sergant gripu, stimuluoja nosies ertmės išvalymą, suteikia stiprų gaivumo pojūtį. Dozavimas. Vaikams nuo 6 m.: 1–2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2–3 kartus per dieną. Suaugusiems ir paaugliams: 1–3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2–3 kartus per dieną. „Quixx Soft“ su aliejumi ekstraktu – natūrali priemonė, drėkinanti įdusius nosies sienelės ir apsauganti nuo peršalimo sukeliamu nosyje jaučiamu simptomu. Dozavimas. Kūdikiams (nuo 6 mėn.) ir vaikams iki 5 m.: 1 įpurškimas į kiekvieną šnervę iki 4 kartų per dieną. Kūdikiams ir vaikams nuo 6 mėn. bei suaugusiems: priekius 1–3 įpurškimai į kiekvieną šnervę kelis kartus per dieną. „Quixx Daily“ kruopščiai praskalauja nosį ir mažina bakterijų, virusų, alergenų bei žiedadulkių, kietųjų dalelių, dulkių kiekį. Vaikams nuo 2 m. ir suaugusiems. Vartokite iki 5 kartų per parą, kol vargina sausa ar sudirgusi nosies ertmė. „Quixx baby“ – mažiųjų nosies priežiūra ir higienai nuo pirmosios gyvenimo dienos. Dozavimas. 1–3 lašai į kiekvieną nosies šnervę 2–6 kartus per dieną ar dažniau, jei reikia. Naujagimiams ir kūdikiams iki 3 mėn. rekomenduojama vartoti netiesiogiai, užlašinus ant vatų tamponėlio. Natūralios priemonės. Be konservantų UT_04_2024_VI_pharma Reklama paruošta 2024 m. spalio mėn. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, LT-05163 Vilnius

KVĖPUOK LENGVAI!

*Akcija taikoma geltona etiketė pažymėtomis prekėms

-20% 7^{11€} 8⁹⁹



ALPIKOL HOTFLUX DRINK, 10 paketėlių

MAISTO PAPILDAS

Su vitaminu C, cinku, selenu, augaliniais ekstraktais ir saldikliais. Aviečių skonio tirpos milteliai paketėliuose. Maisto papildas sudėtyje yra medžiagų, kurios padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą: vitaminas C, cinkas ir selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Rekomendacijos: maisto papildą rekomenduojama vartoti kaip papildomą biologinei aktyvių medžiagų šaltinį normaliai imuninės sistemos veiklai palaikyti. (Vitaminas C ir cinkas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. Vitaminas C, cinkas ir selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.) ŠILTAS PALENGVĖJIMAS PERSALUS – „ALPIKOL HOTFLUX DRINK“.

-40% 4^{79€} 7⁹⁹



RAMEVAL® 15 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„RAMEVAL“ – ramybės augalų puokštė sukurta iš valerijonų, melisų, pipirinių mėtų, ramunėlių ir apynių, kuri padeda:
- palaikyti normalią nervų sistemos būklę (vaistiniai valerijonai),
- atsipalaiduoti (vaistinės melisos, pipirinės mėtos, vaistinės ramunės),
- palengvinti užmigimą ir palaikyti miego kokybę (vaistinės melisos, paprastieji apyniai)
IESKAI RAMYBĖS? ATRASK JĄ SU RAMEVAL.

NERVINIAM NERAMUMUI LENGVINTI

NUO 6⁴⁹ €



SEDATIF PC

SEDATIF PC, 40 tablečių 6⁴⁹ €
SEDATIF PC, 90 tablečių 9⁹⁹ €

HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: Atrus precatorius 6 CH, 0,5 mg, Aconitum napellus 6 CH, 0,5 mg, Belladonna 6 CH, 0,5 mg, Calendula officinalis 6 CH, 0,5 mg, Chelidonium majus 6 CH, 0,5 mg, Viburnum opulus 6 CH, 0,5 mg. Indikacijos: nervinio neramumo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vaikams nuo 6 metų vartoti po 2 tabletes 3 kartus per parą. „Sedatif PC“ veiksmingumas ir saugumas vaikams iki 6 metų neįvertinti. Duomenų nėra, todėl vartoti nerekomenduojama. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: šio vaistinio preparato vaikams iki 6 metų vartoti nerekomenduojama. Negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas relas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharozės ir izomaltazės stygius. Reikiamas teksto parengimo data 2019-08.

JVEIK STRESĄ, KOL STRESAS NEVEIKTŲ TAVĘS. „SEDATIF PC“

5⁹⁹ €



MILGAMMA N, 20 minkštųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 40 mg bentofitamins (riebaluose tirpus vitamino B1 darinio), 90 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6) ir 250 µg cianokobalamino (vitamino B12). Terapinės indikacijos: B1, B6, B12 vitaminų trūkumo šalinimas. Dozavimas ir vartojimo metodas: suaugusiems: po 1 kapsulę 3–4 kartus per parą. Kai liga lengva ir jei vaistinis preparatas padeda, per parą užtenka 1–2 kapsulių. Vartoti per burną. Kapsulę reikia praryti po valgio nesukramtyti, užsigerti truputį skysčio. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai vaistinio preparato pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas sojos arba sojų pupelių produktams, pvz., lecitinui. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: vartojama ilgiau negu 6 mėn. „Milgamma N“ gali sukelti neuropatiją. Reikia atsivelti į adityvų kartu vartojamų vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra sorbitolio (ar fruktozės), ir su maistu vartojamo sorbitolio (ar fruktozės) poveikį. Geriamojo vaistinio preparato sudėtyje esantis sorbitolis gali paveikti kitų kartu vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį prieinamumą. Vaistinio preparato sudėtyje yra lecitino (išgauto iš sojų aliejaus). Jeigu yra alergija žemės riešutams arba sojos, šio vaistinio preparato vartoti negalima. Reklamos tekstas parengtas 2024-09-11.

„MILGAMMA“ – JUDEK LAISVAI!

NORMALIAI PERIFERINIŲ NERVŲ SISTEMOS VEIKLAI

-25% 11^{24€} 14⁹⁹



PERIFERISAN 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Tamias, vitaminai B12, B6 ir magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vitaminai B12, B6 ir magnis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. Niacinas, vitaminai B6, B12 ir magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją. Vartoti po 1 kapsulę per dieną.

KEPENIMS

NUO 9⁹⁹ €

ESSENTIALE® FORTE N

ESSENTIALE® FORTE N, 300 mg, 30 kietųjų kapsulių 9⁹⁹ €
ESSENTIALE® FORTE N, 600 mg, 30 kietųjų kapsulių 14⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje yra 300 mg arba 600 mg sojų fosfolipidų. **Terapinės indikacijos:** simptomų, tokių kaip apetito stoka, spaudimo pojūtis dešinėje pošonkaulioje srityje, atsiradusių dėl toksinio ir mitybos kepenų pažeidimo ar hepatito, malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams vienkartinė dozė – divi 300 mg kietosios kapsulės arba viena 600 mg kietoji kapsulė. Paros dozė – po divi 300 mg kietosias kapsules arba po vieną 600 mg kietąją kapsulę 3 kartus per parą (8000 mg sojų fosfolipidų). „Essentiale forte N“ saugumas ir veiksmingumas vaikams ir paaugliams iki 12 m. neįvertinti. Dėl šios priežasties „Essentiale forte N“ neturėtų būti vartojamas vaikams ir paaugliams iki 12 m. Kapsulės geriamos valgio metu, nekratyti, užgeriant dideliu kiekiu skysčio (pvz., stikline vandens). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Padidėjęs jautrumas žemės riešutams, sojos arba sojų pupelių produktams, pvz., fosfatidilcholinui. **Specialūs įspėjimai:** „Essentiale forte N“ neapcaudo nuo toksinių medžiagų (pvz., alkoholio) sukkelto kepenų pažeidimo. Jei yra kepenų pažeidimas, negalima vartoti alkoholio. „Essentiale forte N“ gali silpninti kraują skystinančių vaistų poveikį, todėl gali prireikti koreguoti šių vaistų dozę. „Essentiale forte N“ sudėtyje yra rafinuotų sojų aliejaus, hidrinto ricinos aliejaus ir etanolio. Ricinos aliejus gali sukelti skrandžio sutrikimų ir viduriavimą. Šio vaisto sudėtyje yra mažas natrio ir etanolio kiekis. Reklamos teksto parengimo data 2023-09, 2201_38 „Essentiale_V01_LT

MAKSIMALI PAGALBA KEPENIMS!



IKI -40%

LINEX®

MAISTO PĖLIDAI

Vienoje „Linex® Complex“ kapsulėje yra 10 mlrd. moksliškai ištirtų gyvų *Lactobacillus rhamnosus* GG bakterijų, taip pat vitaminų B1, B2, B6 ir cinko. Vienoje „Linex® Forte“ kapsulėje yra 2 mlrd. gerai žinomų ir moksliškai ištirtų gyvų *Lactobacillus acidophilus*, DSM 13241, ir *Bifidobacterium animalis* subsp. lactis, DSM 15954, bakterijų. Viename „Linex® Kids“ paketylyje arba 6-iose „Linex® Baby“ lašuose yra 1 mlrd. *Bifidobacterium animalis* subsp. lactis, DSM 15954, bakterijų. **Vartojimas:** „Linex® Complex“ suaugusiems ir vyresniems nei 6 m. vaikams gerti po 1–2 kapsules per dieną. „Linex® Forte“ suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams gerti po 1 kapsulę 1–3 kartus per dieną; 3–12 m. vaikams – po 1 kapsulę 1–2 kartus per dieną. „Linex® Kids“ kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – po 1 paketėlį 1 kartą per dieną. „Linex® Baby“ naujagimiams, kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – po 6 lašus 1 kartą per dieną. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Uptės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2403136085. Teksto patvirtinimo data 2024-03-13.

KOKYBĖ, KURIA GALIMA PASITIKĖTI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtos prekės



VIRŠKINIMO SISTEMAI

NUO 5⁹⁹ €

GUTTALAX

GUTTALAX, 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 15 ml 5⁹⁹ €
GUTTALAX, 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml 9⁹⁹ €

(Natrio pikosulfatas)

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 ml tirpalo (15 lašų) yra 7,5 mg natrio pikosulfato. **Indikacijos:** „Guttalax“ vartojamas, jei pacientas yra varginamas vidurių užkietėjimo; yra būklė, kai reikia palengvinti tuštinimą. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** „Guttalax“ geriamas vakare. Suaugusiems ir vyresniems nei 10 m. vaikams: 10–20 lašų per parą. 4–10 m. vaikams: 5–10 lašų per parą. Vartoti per burną. Rekomenduojama gydymą pradėti nuo mažiausios dozės. Didžiausios rekomenduojamos paros dozės viršyti negalima. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; žarnų nepraeinamumas ar obstrukcija; stiprus pilvo skausmas ir (arba) karščiavimas dėl ūminės pilvo būklės (pvz., apendicito), galimai susijęs su pykinimu, vėmimu; ūminė uždegiminė žarnų liga; sunki dehidracija; jaunesni kaip 4 m. vaikai; retos paveldimos būklės, kurios gali būti nesuderinamos su preparato pagabine medžiaga. **Specialūs įspėjimai:** Nenustačius vidurių užkietėjimo priežasties, negalima vartoti nepertraukiamai kasdien ar ilgiau. „Guttalax“ pavartojusis žmogus buvo galvo svajavimo ir (arba) sinkopės atvejų. Vaikams be gydytojo nurodymo „Guttalax“ vartoti negalima. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas fruktozės netoleravimas. Nevartokite šio vaisto noredami nurosti svorio. Teksto patvirtinimo data 2024-12.

UŽKIETĖJUS VIDURIAMS VEIKIA PATIKIMAI IR NIEKAM NEPASTEIBINTI.



3⁹⁹ €

OMEPRAZOLE ZENTIVA

20 mg, 14 kietųjų kapsulių

GREITO ATPALAIDAVIMO VAISTAS

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo. **Terapinės indikacijos:** „Omeprazole Zentiva“ vartojamas trumpą laiką suaugusių žmonių refliksio simptomams (pvz., reminiui ir rūgšties atpylimui) gydyti. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** Rekomenduojama dozė yra viena 20 mg kapsulė 1 kartą per parą ne ilgiau kaip 14 parų. Jei po šio laikotarpio simptomai neišnyksta, kreiptis į gydytoją. Kad sumažėtų simptomai, gali kelti kapsulių vartoti 2–3 paras 8 savaites. Daugumai pacientų nemus visiška pagelavę per 7 dienas. Kai simptomai visškai išnyksta, turite nustoti vartoti „Omeprazole Zentiva“. Vartoti tuščiu skrandžiu. Kiekvieną dieną tuo patu laiku. Kapsules nurinti nepažeistas, užgeriant pus stiklinės vandens, jų kramtyti ar atidaryti negalima, nes tai gali pakenkti vaisto veikimui. **Kontraindikacijos:** „Omeprazole Zentiva“ vartoti negalima esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai, benzimidazolo dariniams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Omeprazolo, kaip ir kitų protonų siurblio inhibitorių, draudžiama vartoti kartu su nelfinaviru. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Omeprazole Zentiva“ nėra skirtas vaikams ir jaunesniems kaip 18 m. paaugliams. Nevartokite vaisto ilgiau kaip 14 parų, nepasikonsultavę su gydytoju. Jei būklė negerėja ar simptomai pasunkėja, kreiptis į gydytoją. Pacientams draudžiama vartoti omeprazolo profilaktikai. Reklamos teksto parengimo data 2023-08, ID-000785487



NUO 6⁹⁹ €

SMECTA 3 G

miltiliai geriamajai suspensijai, 10 paketėlių 6⁹⁹ €

miltiliai geriamajai suspensijai, 30 paketėlių 12⁹⁹ €

Diosmektilitas

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Smecta“ 3 g miltiliai geriamajai suspensijai. Sudėtis. Viename paketylyje yra 3 g diosmektilito. **Terapinės indikacijos:** Vaikų nuo 2 metų ir suaugusiųjų ūminio viduriavimo kartu su geriamaisiais rehidratuojančiais tirpalais bei suaugusiųjų lėtinio viduriavimo gydymui. Simptominiam suaugusiųjų skausmo, susijusio su funkciniu žarnyno sutrikimu, gydymui. **Dozavimas:** ūminio viduriavimo gydymas. Vaikams nuo 2 metų: 6 gramai (2 paketėliai) per parą. ūminio viduriavimo pradžioje (pirmąsias 3 dienas) šią dozę gali būti du kartus didesnę. Suaugusiems: 9 gramai (3 paketėliai) per parą. ūminio viduriavimo pradžioje šią dozę gali būti du kartus didesnę. ūminio viduriavimo epizodais paprastai trunka ne ilgiau kaip 7 dienas. Kitų ilgų gydymų. Suaugusiems: vidutiniškai 9 g (3 paketėliai) per parą. Vartojimo metodas. Vartoti per burną. Paketėlio turinį reikia išvirti prieš pat vartojimą. Vaikams: paketėlio turinį reikia išvirti 50 ml vandens arba sumalyti su pusiu šaukštu maisto (pvz., daržovių koše, sriuba, kompotu). Suaugusiems: paketėlio turinį reikia išvirinti pusę stiklinės vandens. **Specialūs įspėjimai:** „smecta“ nesikita vartoti kūdikiams ir vaikams iki 2 metų amžiaus. Gydant ūminį viduriavimą silpnais pacientais ir vaikams nuo 2 metų amžiaus, siekiant išvengti dehidracijos, kartu būtina skirti geriamąsias rehidratuojančias druskas (GRD). Suaugusiems taip pat turi būti taikoma rehidracija, jei ji reikalinga. GRD arba intraveninė rehidracija turi būti skiriama atsivėliant į viduriavimo intensyvumą, paciento amžių ir klinikinę situaciją. Reikia apsaugyti dėl tolimosios „smecta“ vartojimo: je po 3 ūminio viduriavimo dienų sutrikimas nepaieja, jei yra skausmas kartu su karščiavimu ir vėmimu. Reikia atsargiai skirti diosmektilą pacientams, kuriems praėjus yra buvę sunkių lėtinio vidurių užkietėjimo atvejų. Reikia vengti ilgalaikio „smecta“ vartojimo. „smecta“ sudėtyje yra gliukozės ir sacharozės. Būna atsivėlioti cukriniu diabetu sergantys pacientams. Jeigu gydymoje jums yra saikes, kad netoleruotumėte kokių nors angliavandenių, kreiptis į jį prieš pradėjus vartoti šį vaistą. Šio vaisto vartojimo yra mažas etanolio kiekis (mažiau kaip 100 mg paros dozėje). **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas (alergija) diosmektilui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Prieš pradėję vartoti šį vaistą, pasitarkite su savo gydytoju apie salutinį poveikį registruotojo vietiniame atstovui Maybel Baltics UAB, el. paštu: vigilance.BLT@maybel.com. Teksto patvirtinimo data: 2024-01-01. Reklamos teksto parengimo data: 2024 m. kov mėn. SME-LT-2024-0000



NUO PILVO PŪTIMO

-20%

SIMETIGAST FORTE

240 mg kapsulės, 10 kapsulių 2⁹⁶ 2³⁷ €

SIMETIGAST FORTE

240 mg kapsulės, 60 kapsulių 9⁹⁸ 7⁵² €

SIMETIGAST FORTE BABY

geriamieji lašai, 30 ml 5⁴⁴ 4³⁵ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

„SIMETIGAST FORTE“ 240 mg kapsulės (simetikonas) skirtos vartoti vyresniems nei 12 m. pacientams, esant pilvo pūtimui, pilnumo jausmui pilve, raugėjimui. Taip pat galima naudoti prieš pilvo ertmės diagnostines procedūras, nes tai pagerina vaizdų kokybę. Vartoti: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. amžiaus jaunuoliai – po 1 kapsulę 2–3 kartus per parą. Prieš diagnostines procedūras: 1 kapsulė vakare dieną prieš tyrimą ir 1 kapsulė ryte tyrimo dieną. „SIMETIGAST FORTE BABY“ geriamieji lašai (simetikonas) skirti kūdikiams nuo 28-os gyvenimo dienos ir vaikams iki 12 metų. Vartoti: kūdikiams (nuo 28-os gyvenimo dienos) ir vaikams iki 2 metų 3 lašai prieš, per ar po kiekvieno valgio. Negalima vartoti daugiau kaip 18 lašų per dieną. GREITOJI PAGALBA IŠPŪSTAM PILVUI.



NUO RĖMENS IR PADIDĖJUSIO RŪGŠTINGUMO

4⁴⁹ €

RENNIE, 680 mg/80mg, 24 kramtomosios tabletės

RENNIE ORANGE, 680 mg/80 mg, 24 kramtomosios tabletės

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 kramtomosios tabletėje yra 680 mg kalcio karbonato ir 80 mg sunkiojo magnio subkarbonato. **Terapinės indikacijos:** „Rennie“ veiklosios medžiagos – kalcio karbonatas ir sunkusis magnio subkarbonatas – neutralizuoja skrandžio rūgštį ir mažina rūgštinės dispepsijos sukeliamus negalavimus – rėmenį, skrandžio pilnumo arba sunkumo jausmą, virškinimo sutrikimą, rūgštaus skysčio atpylimą į burnos ertmę, pilvo pūtimą, skrandžio skausmą. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: sučiulpti arba sukratyti 1–2 kramtomąsias tabletes, praėjus 1 val. po kiekvieno valgio, prieš miegą ir kai pasireiškia rėmuo ar skausmas. Negalima vartoti daugiau kaip 11 kramtomųjų tablečių per 24 valandas. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 2 savaites. **Specialūs įspėjimai:** vaistinių preparatų reikia vengti vartoti ilgai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. „Rennie“ nešumo ir žindymo laikotarpiu vartoti laikantis rekomendacijų galima, bet reikia vengti vartoti ilgą laiką. Vaistas neturi būti vartojamas su dideliu kiekiu pieno ar jo produktų. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veiklosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jeigu yra sunkus inkstų nepakankamumas arba inkstų akmenlige; jeigu yra padidėjęs kalcio kiekis kraujyje arba sumažėjęs fosfatų kiekis kraujyje. Reklamos teksto parengimo data 2024-10 CH-2024030-74.



SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO GYDYMAS

2⁹⁹ €



APAP EXPRESS, 500 mg, 10 minkštųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje „APAP express“ minkštųjų kapsulėje yra 500 mg paracetamolio. Terapinės indikacijos: simptominio lengvo ar vidutinio skausmo ir (arba) karščiavimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir paauguliams, svėriantiems daugiau kaip 55 kg (nuo maždaug 15 m.): 1-2 minkštiosios kapsulės (500-1000 mg) vienu metu, ne daugiau kaip 6 kapsulės (didžiausia paros dozė – 3000 mg) kas 24 valandas. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas paracetamolui, žemės riešutams, sojosms arba bet kuriai vaisto sudėtyje esančiai pagalbinei medžiagai. Sunkus kepenų nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: atsargiai reikia vartoti pacientams, kuriems nustatytas inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka, piktnaudžiaujantiems alkoholiu, dehidratuotiems arba nuolat blogai besimalinantais, sergantiems astma. Gydančis šiuo vaistiniu preparatu, alkoholio vartoti negalima. Ligas ir dažnas vartojimas nerekomenduojamas. Jeigu per 3 dienas jūsų sąvijausta nepagerėja arba net pablogėja, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2025-03-31.

AUSŲ UŽDEGIMUI GYDYTI

5⁷⁵ €



OTIPAX® 40 mg/10 mg/1 g, ausų lašai (tirpalas), 16 g

Fenazonas / lidokaino hidrochloridas.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: veikliosios medžiagos yra fenazonas ir lidokaino hidrochloridas. 1 g ausų lašų yra 40 mg fenazono ir 10 mg lidokaino hidrochlorido. Farmacinė forma: ausų lašai (tirpalas). Terapinės indikacijos: ūminio neperforuoto (kai ausies būgnelis nėra įtrūkęs) vidurinės ausies uždegimo, pūslinio virusinio ausies uždegimo ir slėgio pokyčių metu atsiradusios traumos sukkelto ausies uždegimo gydymas, turi skausmo malšinamąjį poveikį. Vartojimo būdas ir dozavimas: lašinti po 4 ausų lašus 2-3 kartus per dieną į šorinę ausies landą. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Otipax“. Prieš vartojant „Otipax“ ausų lašus, Jūsų gydytojas turi patikrinti, ar nėra pažeistas ausies būgnelis. Šio vaisto negalima nuryti ar įkvepti. Saugokitės, kad jo nepatektų į akis ar ant gleivinės. Kontraindikacijos: „Otipax“ vartoti draudžiama, jei yra ausies būgnelio įtrūkimas, atsiradęs dėl traumos ar infekcinių ligų, jeigu yra alergija fenazonui, lidokaino hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą: „Biocodex Oy“ Lietuvos filialas, Savanorių pr. 345, LT-51480 Kaunas, tel. +370 37 408 681, el. paštas info@biocodex.lt.

ID dab89672. Reklamos parengimo data 2025-03-14.

ABRAKADABRA – IR AUSŲ SKAUSMO KAIP NEBŪTA!

5⁹⁹ €



SOLPADEINE EXPRESS,

500 mg/65 mg, 16 šnypščijų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Terapinės indikacijos: lengvam ar vidutinio sunkumo skausmui (pavyzdžiui, galvos skausmui, skausmą migreną (su aura ir be jos), nugaros skausmą, dantų skausmą, raumenų skausmą, neuralgiją, sąnarių skausmą, dišmenorėją, rėvės skausmą) ir karščiavimui, gelimams bei skausmams, pasireiškiems sergant peršalimo ligomis ir gripu, mašinai. Vartojimo būdas ir dozavimas: neviršinti dozės nei kas 4 valandas. Suaugusiesiems (įskaitant senyves pacientus) ir 16 m. bei vyresni paaugliai: 1 ar 2 tabletes (vieną ar dvi tabletes) bent pusę stiklinės vandens ir pagal poreikį vartokite kas 4-6 valandas. Nėvėykite 4 dienas, tai atitinka 8 tabletes (4000 mg paracetamolio / 520 mg kofeino) per 24 valandas. 12-15 m. paaugliai: 1 tablete (vieną ar dvi tabletes) bent pusę stiklinės vandens ir pagal poreikį vartokite kas 4-6 valandas. Nėvėykite daugiau kaip 4 tablečių (2000 mg paracetamolio / 260 mg kofeino) per 24 valandas. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, jeigu: sergate kepenų ar inkstų liga, įskaitant alkoholine kepenų ligą; sergate astma ir esate jautrus acetilsalicilo rūgščiai; sergate Žilberto sindromu (nehemolizine šeimine gelta); gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kai kurių angliavandenių, esant gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės ar glutatono stokai; sergate hemolizine anemija, esant lėtiniam mitybos nepakankamumui ar dehidracijai, esate suaugusysis ar paauglys, kurio kūno svoris mažesnis nei 50 kg, esate vyresnis kaip 65 m. amžius, kontroliuojamas natrlio kiekis maiste. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija paracetamolui, kofeinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu Jūs vartojate kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio. Reklamos teksto parengimo data 2022-02-05.

KARŠČIAVIMUI MAŽINTI IR SKAUSMUI MALŠINTI

NUO 4⁵⁰ €



IBUSTAR

IBUSTAR 20 mg/ml geriamoji suspensija vaikams, 100 ml 4⁵⁰ €

IBUSTAR 40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams, 100 ml 7⁷⁵ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Viename geriamosios suspensijos ml yra 20 mg arba 40 mg ibuprofeno. „Ibustar“ yra uždegimą slopinantis ir skausmą malšinantis vaistinis preparatas (nesteroidinis vaistas nuo uždegimo), turintis karščiavimą mažinančių savybių. „Ibustar“ vartojamas kaip trumpalaikio simptominio gydymo priemonė: silpną ar vidutinio stiprumo skausmą, karščiavimą malšinti. „Ibustar 20 mg/ml“ geriamoji suspensija tinka vaikams, svėriantiems 5-29 kg (amžius nuo 6 mėnesių iki 5 metų). „Ibustar 40 mg/ml“ geriamoji suspensija tinka vaikams, svėriantiems 30 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), paaugliams ir suaugusiems. Tinka vartoti tik per burną ir trumpai. Jeigu šio vaistinio preparato vaikams ir paaugliams reikia vartoti ilgiau kaip 3 dienas arba jeigu ligos požymiai blogėja, pasitarkite su gydytoju. Prieš vartojimą būtina užtikrinti, kad „Ibustar“ vartoti negalima: jeigu yra alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu praėjusio buvo bronchų spazmas, astma, nosies gleivinės paburkimas, angiodemė ar odos reakcijų po acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių uždegimų malšinamųjų vaistų vartojimo; jeigu yra reidiųjų kraujodaros sutrikimų; jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakūrimas, susijęs su ankstesniu VNU vartojimu; jeigu yra ar buvo praėjusio skrandžio arba dvilypkapištes žarnos opa arba kraujavimas; jeigu yra kraujavimas iš smegenų arba kitoks kraujavimas; jeigu yra sunkūs inkstų, kepenų funkcijos ar sunkūs širdies nepakankamumas; netekus daug skysčių; jeigu yra paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Ibustar“. Skaudūs poveikis gali sumažėti vartojant mažesniąją vaisto dozę trumpąja laika, būtiną simptomų kontrolei. „Ibustar“ reikia vengti vartoti kartu su kitais VNU, įskaitant COX-2 inhibitorius. Jeigu Jūsų vaikai atsidaro skrandžio kraujavimas ar išopojimas, nutraukite „Ibustar“ vartojimą. Nedelsdami informuokite gydytoją, jeigu atsiranda bet koks neįprastas simptomas pilve. Pastebėję bet kuri alerginės reakcijos į šį vaistą požymį ar sunkių odos reakcijų simptomus, nedelsdami nutraukite „Ibustar“ vartojimą ir kreipkitės į gydytoją arba greitosios medicinos pagalbos tarnybą. „Ibustar“ gali slopinti infekcijos simptomus, kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl „Ibustar“ gali vėlini tikinamą infekcijos gydymą, todėl gali padidėti komplikacijų rizika. Jei vartojate šį vaistą sirgami infekcine liga ir simptomai išlieka arba blogėja, nedelsdami pasitarkite su gydytoju. Sergant vėjaraupiais reikia vengti vartoti „Ibustar“. LT „ibu_01_2024_V1“ print UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“). J. Jasinskių g. 16A, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 1947, LT@berlin-chemie.com Reklaminio teksto parengimo data 2024-08.

GREIT IR VĖL KARALYŠ!

EFEKTYVI PAGALBA ESANT SUMUŠIMUI, PATEMPIMUI, PANIRIMUI

17⁹⁷ €



TRAUMEEL S, tepalas, 100 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS

100 g tepalo yra veikliųjų medžiagų: Arnica montana D3 1,5 g, Calendula officinalis 0,45 g, Hamamelis virginiana 0,45 g, Echinacea angustifolia 0,15 g, Echinacea purpurea 0,15 g, Chamomilla recutita 0,15 g, Symphytum officinale 0,40 g, Bellis perennis 0,1 g, Hypericum perforatum D6 0,09 g, Achillea millefolium 0,09 g, Aconitum napellus D1 0,05 g, Atropa belladonna D1 0,05 g, Mercurius solubilis Hahnemannii D6 0,04 g, Hepar sulfuris D6 0,025 g. Terapinės indikacijos. Buikų traumų (pvz., raiščių patempimo, sumušimo, panirimo, mėlynų), kaulų ir sąnarių degeneracijos simptomais gydymas. Indikacijos pagyrimas tik homeopatijos principais. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: vartoti 2 kartus per dieną arba, jei reikia, dažniau. 0-2 m. vaikams: vartoti 2 kartus per dieną arba, jei reikia, dažniau. 2-6 m. vaikams: vartoti 2 kartus per dieną arba, jei reikia, dažniau. 6-12 m. vaikams: vartoti 2 kartus per dieną arba, jei reikia, dažniau. Vartoti ant odos. Patepti ploni sluoksniais pažeistą vietą. Ant gydymo vietos galima uždėti tvarstį. „Traumeel S“ tepalu negalima tepti didelio ploto, vartoti ilgai arba tepti tiesiai ant atvirų žaizdų. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms, pvz., kalninei arnikai (Arnica montana), vaistinei ramūnei (Chamomilla recutita), paprastajai kraujažolei (Achillea millefolium), kitiems astrinių (graizžiedžių) šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Tepalo sudėtyje yra cetosteirilo alkoholio. Cetosteirilo alkoholis gali sukelti lokalų (vietinę) odos reakciją (pvz., kontaktinį dermatitą). Sudėtyje yra 13,8 % (V/V) etanolio. Kiekviename šio vaistinio preparato gramme yra III ml alkoholio (etanolio), tai atitinka 11,1% m/m. Ant pažeistos odos etanolis gali sukelti deginimo pojūtį, reikia saugotis, kad tepalo nepatektų į akis, ant gleivinės, atvirų žaizdų ar pažeistos odos. Netepti tepalu didelio ploto. Registracijos. „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). Registruotojo atstovas. UAB „Farmahel“. Reklamos teksto parengimo data 2025-09-04. NAUJA, DIDESNĖ 100 g TEPALO PAKUOTĖ!

-25% 5⁰² €



AMEDIPLUS

Šildantis arklų balzamas, 250 ml

Šaldantis arklų balzamas, 250 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

AUSŲ SKAUSMUI MALŠINTI

-20% 8⁶³ €



FONIX® EAR PAIN purškalas, 15 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

Pirmoji pagalba pasireiškus dažnoms ausų problemoms, tokioms kaip:

- skausmas
- infekcijos
- susikaupusi siera
- dirginimas

„Fonix“ Ear Pain“ yra medicinos priemonė, kurios sudėtyje yra augalinių aliejų mišinio, skirto ausiai apsaugoti nuo dažnų problemų ir jas palengvinti. Sudėtis: alyvuogių aliejus, indinij sezamų aliejus, gulsčiųj serenojji ekstraktas, fitosterolių kompleksas, bisabololis, kvapiųjų murejų lapų aliejus, celonių cinamonų lapų aliejus, vingerių ekstraktas, mėtų aliejus.

Suaugusiems ir vyresniems kaip 3 metų vaikams.

Vartojimas: puršksti po 1-2 įpurškimus į kiekvieną ausį 3 kartus per parą.

AMEDIPLUS

pipirinis pleistras 12 x 16 cm, 1 vnt.

MEDICINOS PRIEMONĖ



-25%



„SMARTHIT IV“ EFEKTYVAUS PASISAVINIMO MAISTO PAPILDAI

MAISTO PAPILDAI

Microl technologijos dėka pagaminami produktai, kurie pasisavinami itin gerai. Be to, mikrokapsulės sumažina šalutinių poveikių riziką. Efektyvus pasisavinimo maisto papildų SMARTHIT IV[®] linijai sudaro:

SMARTHIT IV[®] Lactoferrin. Laktoferrinas – tai geležį surišantis baltymas, dalyvaujantis geležies pasisavinimo procese. Galima vartoti kartu su SMARTHIT IV[®] Ferum kapsulėmis arba SMARTHIT IV[®] Ferum Liquid skysta geležies forma, tinkanda suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų. Geležis padeda palaikyti normalų hemoglobino ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą.

SMARTHIT IV[®] Vitamin B5 – kaulams, dantims, raumenims.

SMARTHIT IV[®] Vitamin B5+K2 – širdies, vitamino B5 ir K2 poveikis kaulams ir kraujotakai.

SMARTHIT IV[®] Vitamin B12 – normaliai kraujodarai bei psichologinei funkcijai palaikyti ypač daug dirbantiems ir besimokantiems.

SMARTHIT IV[®] Polifenol – polifenolių šaltinis gerai saujautai.

SMARTHIT IV[®] Curcumin – mikrokapsuluota kurkumino forma imuninei sistemai, kepenų funkcijai, normaliam cholesterolio lygiui kraujyje palaikyti.

Naujiene SMARTHIT[®] Curcumin+Beta-glucans – mikrokapsuluotas kurkuminas su beta gliukanais nuo šiol ir kapsulėmis imuninei sistemai, cholesterolio ir gliukozės kontrolei. Išbandyti! „SMARTHIT IV“ – MENAS VEIKTI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

IKI -40%



ECOSH

MAISTO PAPILDAI

„Ecosh“ – Estijos maisto papildų gamintojas, siekiantis gaminti kuo natūralesnius, kokybiškus ir efektyvius maisto papildus. Naudojamos veganinės, augalinės kilmės kapsulės, maisto papildai yra be konservantų, dauguma tinkami vegetarams ir veganams.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

IKI -40%



DAILEE įklotai, paklotai, sauskelnės

HIGIENOS PRIEMONĖS

„DAILEE“ – PATIKIMAS PASIRINKIMAS ARTIMOJO SLAUGAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-25% 14^{99€}

CLIMENUM, 28 tabletės su apvalkalu dienai ir 28 tabletės su apvalkalu naktčiai

MAISTO PAPILDAS

Padeda palaikyti normalią saviąją menopauzės periodu. Vartojimo būdas: išgerti 1 tabletę „Climenum“ dienei ir 1 tabletę „Climenum“ naktčiai vakare. Skirtas suaugusiems.

-30%



ABC VIT

VITAMINAS C, 500 mg, 50 apelsinų skonio tablečių **5^{89€} 4^{12€}**

VITAMINAS C, 500 mg, 50 braškių skonio tablečių **5^{89€} 4^{12€}**

MAISTO PAPILDAI

Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninę, nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vitaminas A padeda išsaugoti normalią regėjimą, palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, taip pat palaikyti normalią odos būklę. Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

-30% 11^{08€}

OCHISAN, akių vokų tepalas, 15 g

MEDICINOS PRIEMONĖ

Akių vokų tepalas be konservantų. Padeda palengvinti tokius simptomus, kaip vokų odos niežulys, jų skausmingumas ir patinimas, susijusius, be kita ko, su šorinio miežio ir chalaziono atsiradimu. Veiklioji medžiaga šluotinių sekulių medus (manuka) MGO 400+, šluotinių sekulių aliejus (manuka).

INKSTAMS IR ŠLAPIMO TAKAMS

-20% 9^{99€}

FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Fitolizyna Nefrocaps PLUS“ yra unikalus 7 koncentruotų augalinių ekstraktų mišinys, kuris:

– padeda palaikyti normalią inkstų ir šlapimo takų veiklą (petražolių šaknis, dirvinių asiūklių žolė, paprastųjų varpūčių šakniastiebiai, karpotųjų beržų lapai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė);

– padeda palaikyti normalų vandens pašalinimą iš organizmo, todėl skatinamas nepageidaujamy metabolizmo produktų šalinimas su šlapimu (dirvinių asiūklių žolė, paprastųjų varpūčių šakniastiebiai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė).

Rekomenduojamas vartojimas: 1 kapsulė 2 kartus per parą prieš valgi, užgeriant dideliu kiekiu vandens (ne mažiau kaip ½ stiklinės).

NORMALIAI GLIUKOZĖS KONCENTRACIJAI KRAUJYJE PALAIKYTI

-40% 16^{49€}

MULBERRY™, 60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

„Mulberry“ – skirtas normaliai gliukozės koncentracijai kraujyje palaikyti. Jis gaminamas iš standartizuoto baltųjų šilkmėdžių lapų ekstrakto ir chromo. Šilkmėdžių lapų ekstraktas padeda palaikyti normalią angliavandenių apykaitą organizme. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. **TIKRAS CUKRAUS PRIEŠAS!**

-35%**SVEIKAŽOLIŲ ARBATOS**

„Sveikazolių arbatos“ asortimente garuoja kruopščiai atrinkti vaistažolių mišiniai bei pavienių žolelių arbatos, svaiginančios gardžių skonių ir šildančios iš vidaus.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

IKI -50%

ATLANT MAXIMUS, milteliai geriamajam tirpalui, 28 pakeliai **79⁹⁹ 51⁹⁹ € -35 %**

BIO CA+K+MG+ZN SU VITAMINU D3, milteliai geriamajam tirpalui, 28 pakeliai **14⁹⁵ 74⁸ € -50 %**

BIOKALIS FORTE, milteliai geriamajam tirpalui, 30 pakelių **11⁹⁹ 60⁰⁰ € -50 %**

MAISTO PAPILDAI

Naūjena! „Atlant Maximus“ – dar daugiau kolageno (net 15 000 mg), kurio poveikis sąnariams įrodytas moksliškai! Be to, kompleksas papildytas hialurono rūgštimi (net 500 mg), ciberžolių (500 mg) ir bosvelijų (100 mg) ekstraktais.

„bioCa+K-Mg+Zn su vitaminu D“ – papildykite savo organizmą svarbių mineralų kompleksu – kalcis, kalis, magnis ir cinkas 1 pakelyje!

„bioKalis forte“ – perkamiausias kalio maisto papildas Lietuvoje 2019–2024 metais! 100 % organinės kilmės!

Produktuose – tik aktyviosios medžiagos, be konservantų, be kvapiųjų medžiagų ir dažiklių, be saldiklių.

PASIRŪPINKITE SAVO ŠIRDIM, SĄNARIAIS IR PUKIA SAVIJAUTA!

-40%

MEMORIL FORTE, 30 kapsulių **14²⁹ 8⁵⁷ €**

TRIPTAN FORTE, 30 kapsulių **16²⁹ 10⁰⁷ €**

MAISTO PAPILDAI

„Memoril forte“ – subalansuotas, 11 sudedamųjų dalių kompleksas atminčiai bei kraujotakai. Tinka tiems, kuriems sunku susikaupti bei nuolat ką nors pamiršantiems. Vienoje kapsulėje yra 80 mg ginkmedžių ekstrakto, kuris padeda palaikyti normalią atminties funkciją ir kraujotaką. Taip pat sudėtyje yra magnio, vitaminų B, C, E, seleno ir folio rūgšties, kuri padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną.

„Triptan forte“ sudėtyje esantis 5-hidroksitriptofanas (5-HTP) yra natūrali medžiaga, gaunama iš Afrikoje augančių augalų – „Griffonia simplicifolia“ – sėklių, kuri kartu su vitaminu B6 reikalinga serotonino – geros nuotaikos hormono – gamybai. Serotonino išsiskyrimas suteikia gerą nuotaiką ir energiją. Tai pat sudėtyje esantis vitaminas B1 ir B6 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą. Vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

ŽARNYNO MIKROFLORA**1+1**

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!



ACIDOLAC® JUNIOR, 20 meškiuko formos tablečių **10¹⁹ €**

ACIDOLAC® JUNIOR braškių skonio, 20 meškiuko formos tablečių **10¹⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

ACIDOLAC® JUNIOR meškiuko formos tablečių sudėtyje yra gerųjų žarnyno bakterijų *Lactobacillus acidophilus* La-14TM ir *Bifidobacterium lactis* BI-04TM, inulino ir vitamino B6, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vartojimas: vyresniems kaip 3 m. vaikams ir suaugusiems vartoti po 1 meškiuko formos tabletę 2 kartus per parą. Be sacharozės ir gliutimo.

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!



MENOPACE, 30 tablečių **20⁴⁹ €**

MAISTO PAPILDAS MOTERIMS MENOPAUZĖS PERIODU

„Menopace“ – biologikai aktyvių medžiagų kompleksas su sojų izoflavonais, kurie pagal savo struktūrą ir poveikį panašūs į moters lytinį hormoną estrogeną. Menopauzės laikotarpiui subalansuotas derinys pasižymi kompleksiniu poveikiu: hormonų balansui (vitaminas B1), psichologinei būsenai (foliatai, biotinas, magnis), kaulų funkcijai (cinkas, magnis), nuovargio mažinimui (geležis, pantoteno rūgštis).

„MENOPACE“ – NELEISK MENOPAUZEI TAVĘS SUSTABDYTI!

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!



ISEREN CR, 30 tablečių **15⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

Maisto papildas su gauruotosios sojos ekstraktu, kuriame gausu natūralių izoflavonų. Vartojimas: po vieną tabletę per dieną.

-10%**2⁹⁶ €**

GINTARO RŪGŠTIS, 20 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Vartojimas: gerti po 1 tabletę 3 kartus per dieną valgant.

Rekomenduojame suvartoti per parą kiekį (3 tabletes) yra 0,3 g gintaro rūgšties.

Gamintojas: UAB „Medicata Filia“, Žarijų g.2B, Vilnius

Išskirtinis platintojas Lietuvoje: UAB „VERATRUM PHARMA“, Žarijų g.2B, Vilnius

-20%

BIOMAGNESIUM, 300 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 30 pakelių **13⁹⁹ 6⁷⁵ € -50 %**
BIOMAGNESIUM FORTE, 500 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 20 pakelių **14⁹⁹ 7⁴⁰ € -50 %**
BIOMAGNIS + BIOKALIS, milteliai geriamajam tirpalui, 30 pakelių **14⁹⁹ 7⁵⁰ € -50 %**
BIO SILYMARIN, granulės, 28 pakeliai **9⁹⁹ 5⁰⁰ € -50 %**
INULIN, milteliai geriamajam tirpalui, 28 pakeliai **9⁹⁹ 6⁴⁹ € -35 %**
LAXMAG, milteliai geriamajam tirpalui, 7 pakeliai **8⁹⁹ 5⁸⁴ € -35 %**
MAGNULIN, milteliai geriamajam tirpalui, 28 pakeliai **15⁹⁹ 10³⁹ € -35 %**
SPORT & JOINTS, milteliai geriamajam tirpalui, 14 pakelių **17⁹⁹ 8⁷⁵ € -50 %**

MAISTO PAPILDAI

Išsirkinkite iš „Biofarmacijos“ asortimento Jums reikalingiausią produktą, kuris padėtų mažinti nuovargį, išlaikytų elektrolitų pusiausvyrą, padėtų virškinimo sistemai, kepenų funkcijai ir palaikytų normalų cukraus kiekį kraujyje. Natūralios kilmės magnis išgaunamas iš Negyvosios jūros. Produktuose nėra medžiagų, kurios suteiktų papildui patrauklumo ar skonio, tačiau nepridėtų vertingųjų savybių. Tad Jūs nerasite jokių konservantų, emulsiklių, dažiklių, tirštiklių ar stabilizatorių. Tik aktyviosios medžiagos!

ARČIAU GAMTOS | NATŪRALIOS KILMĖS

**AKIŲ VOKŲ HIGIENAI****-20%**

BLEPHACLEAN, drėgnos servetėlės akių srities ir akių vokų valymui, 20 vnt. **13⁹⁹ 11¹⁸ €**

BLEPHA EYEBAG, daugkartinė šildomoji akių kaukė, 1 vnt. **47⁹⁹ 38³⁸ €**

BLEPHAGEL, gelis akių vokų ir blakstienų higienai, 30 g **17⁹⁹ 14³⁸ €**

MEDICINOS PRIEMONĖS, KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Blephaclean“ – švelni ir veiksminga akių vokų priežiūra, sergant blefaritu, sausų akių sindromu ar po akių operacijų. Taip pat esant akių alergijai ar infekcijai. Tinka kūdikiams nuo 3 mėn., vaikams, suaugusiems ir vyresnio amžiaus žmonėms! Be konservantų!

„Blepha Eyebag“ daugkartinė šildomoji kaukė gydo Meibomo liaukų funkcinių sutrikimų (MGD) ir blefaritą, lengvina sausų akių simptomus, susijusius su MGD ar kitomis panašiomis akių būklėmis, tokiomis kaip miežis ar chalazionas (šaltasis miežis).

„Blephagel“ yra hipoalerginis sterilus gelis, skirtas kasdieninei akių vokų ir blakstienų higienai, sergant blefaritu, kai akys sausos dėl Meibomo liaukų funkcijos sutrikimo, kai akis ir akies vokas pažeisti rožinės aknės ar seborėjinio dermatito. Be konservantų!

KOMPLEKSINĖ AKIŲ VOKŲ PRIEŽIŪRA BE KONSERVANTŲ!**-30%****DINADAX**

kratomosios lazdelės

MAISTO PAPILDAI

„DinadaxActive“ – maisto papildas su laktobakterijomis, fruktooligosacharidais, bičių pieneliu, vitaminais B1 ir B6.

„Dinadax Energy“ – maisto papildas su bičių pieneliu, želatina ir B grupės vitaminais.

„Dinadax Sapiens“ – maisto papildas su cholino bitartratu, omega-3, linolo ir oleino rūgštimis, vitaminais, folio rūgštimi, biotinu ir cinku.

KRIMSK PASIGARDŽIUODAMAS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtos prekės

-25%**VIRIDIAN****MAISTO PAPILDAI**

„Viridian“ – tai natūralūs, aukštos kokybės vitaminai ir maisto papildai, sukurti remiantis mokslu, etiška gamyba ir gryna sudėtimi.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtos prekės

ŠIRDŽIAI IR KRAUJAGYSLĖS, MOTERIMS MENOPAUZĖS METU**IKI -20%**

EVELOR® 50 mg, 90 kapsulių **30⁹⁹ 24³⁹ € -20 %**

EVELOR® H 200 mg, 30 tablečių **21⁹⁹ 18⁶⁹ € -15 %**

MAISTO PAPILDAI

Augaliniai antioksidantai, kurie priklauso polifenolių grupei. „Evelor“ ir „Evelor H“ sudėtyje esantis trans resveratrolis yra mikronizuotas ir išgautas iš didžiausią šios medžiagos kiekį kaupiančių augalų – plačialapių rūgčių (lot. *Polygonum cuspidatum*) – šaknų.

Mikronizacijos procesas (medžiagos susmulkinimas iki labai mažų dalelių) padidina resveratrolio biologinį prieinamumą ir veiksmingumą. Resveratrolis padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą. Dėl panašios cheminės struktūros ir hormoną estradiolį jis taip pat padeda palaikyti normalią moters sąvijaų menopauzės metu.

Vartojimas. Gerti po 1 kapsulę arba tabletę rytinio valgio metu, užgeriant vandeniu.

ŠALTALANKIŲ ALIEJUS, 50 ml **9⁹⁹ 6⁹² €**
ŠALTALANKIŲ ALIEJUS, 100 ml **12⁹⁹ 8⁸¹ €**

MAISTO PAPILDAI

Šaltalankių aliejus padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir širdies veiklą, normalų virškinimą, normalią odos būklę. Vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą.



NAUJIENA

MAGNUS REX

Natūralios kilmės magnio
bisglicinatas iš Negyvosios
jūros vandens!

-25%

Magnio
bisglicinatas –
kodėl verta
rinktis šią
magnio formą?

- ✓ Lengvai įsisavinama;
- ✓ Švelniai veikianti formulė – nedirgina virškinimo trakto;
- ✓ Tinkama kasdieniam vartojimui.

16⁹⁹
12⁷⁴ €



25⁹⁹
19⁴⁹ €

Magnis
padeda
palaikyti:

- ✓ Normalią nervų sistemos veiklą ir raumenų funkciją;
- ✓ Energijos apykaitą ir elektrolitų pusiausvyrą;
- ✓ Psichologinę funkciją ir padeda mažinti nuovargį.



Maisto papildai

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

biofarmacija

ODOS IR LŪPŲ PŪSLELINEI GYDYTI

13⁹⁹ €

ACIC, 200 mg, 25 tabletės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 200 mg acikloviro. **Terapinės indikacijos:** anksčiau gydytojo diagnozuotas pasikartojantis lūpų pūslelinės gydymas suaugusiems žmonėms. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** gerti po 1 tabletę 5 kartus per parą kas 4 val. Gydymo trukmė – 5 paros. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas aciklovirui, valaciklovirui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** palietus viruso pažeistą vietą, reikia tuoj pat nusiplauti rankas. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037, el. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS240336084. Teksto patvirtinimo data 2024-03-13.

UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSLELINĘ IŠ VIDAUS!

ODOS IR LŪPŲ PŪSLELINEI GYDYTI

5⁹⁹ €

ACIC 5% kremas, 2 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 g kremo yra 50 mg acikloviro. **Terapinės indikacijos:** odos ir lūpų pūslelinę, kurią sukelia Herpes simplex virusas, gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** pažeistą odos vietą tepti plonu sluoksniu 5 kartus per parą kas 4 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas aciklovirui, valaciklovirui, propilenglikoliui arba bet kurioms pagalbinėms medžiagoms. Netepti ant gleivinės (burnos, akių, makšties). **Specialūs įspėjimai:** vaisto draudžiama nurijoti. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037, el. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS240336084. Teksto patvirtinimo data 2024-03-13.

UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSLELINĘ SU „ACIC“!

PAVIRŠINIŲ ODOS ŽAIZDŲ GIJIMO GERINIMUI

NUO 5⁹⁹ €

BEPANTHEN

BEPANTHEN 50 mg/g kremas, 30 g 5⁹⁹ €BEPANTHEN 50 mg/g tepalas, 30 g 5⁹⁹ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. 1 g preparato yra 50 mg dekspantenolio. **Terapinės indikacijos:** įvairios kilmės paviršinių odos ir gleivinių pažeidimų pagalbinis gydymas, drėkinant odą ir atkuriant epidermio barjerą, paliekant epitelizaciją su atitinkamu prieuždegiminiu ir niežėjimo malšinančiu poveikiu, pavyzdžiui, nedidelių pažeidimų (nedidelių nudegimų arba nubrodinimų), odos sudirginimų, išbėrimo nuo sauskelnių, skausmingų ir įtrūkusių spenelių gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** pažeistą odą tepti plonu sluoksniu preparato vieną ar daugiau kartų per dieną, kai reikia. Skausmingus ir įtrūkusių spenelių tepti po kiekvieno maitinimo, prieš žindant nuplauti. Tepti kiekvieną kartą keičiant sauskelnes, prieš tai odą reikia kuo kruopščiau nuvalyti. Gydymo trukmė priklauso nuo ligos pobūdžio ir eigos. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jei sergate kita liga, esate alergikas arba vartojate kitus vaistus, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Naudojant tepalą ar kremą reikia vengti kontakto su akimis. Reklamos teksto parengimo data 2024-10. CH-2024030-71.

BEPANTHEN PLUS 50 mg/5 mg/g kremas, 30 g 6⁴⁹ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. 1 g kremo yra 50 mg dekspantenolio ir 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** lokalus įvairių paviršinių žaizdų, pvz., nubrodinimų, įgyvimų, įbrėžimų, odos įtrūkų, nudegimų gydymas, kai yra infekcijos pavojus. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** kūdikams nuo 1 mėn., vaikams, paaugliams ir suaugusiems išvalytą žaizdą arba pažeistą odos vietą reikia tepti plonu kremu sluoksniu vieną ar kelis kartus per dieną, kol žaizda užgis. Venkite tepti didelius odos plotus. **Kontraindikacijos:** alergija veiklosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; gilios arba stipriai užkrėstos žaizdos; jei trūkės ausies būgnelis, negalima tepti ausies srityje. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** saugokitės, kad kremu nepatektų į akis, ausis ir ant gleivinių. Negalima tepti ant sudirgintos, bet neinfekuotos odos. Negalima vartoti kartu su kitomis antiseptinėmis medžiagomis, muilu. Jei pastebėjus kitas alergines reakcijas simptomai, vartojimą nedelsdami nutraukite ir pasitarkite su gydytoju. Reklamos teksto parengimo data: 2024-10. CH-2024030-71.

LAIMEI, YRA „BEPANTHEN“ GYDO IR APSAUGO ODA

-35% 13^{97€} 24⁴⁹

boderm



OLIPROX nagų lakas grybeliui

(gelis vandens pagrindu), 12 ml

„Oliprox“ nagų lakas (gelis vandens pagrindu) – veiksminga priemonė, padedanti užkirsti kelią grybelinei infekcijai bei pagalbinė priemonė gydant onichomikozę (nagų grybelį).

ŽAIZDŲ GIJIMUI SKATINTI

-20%



HELP4SKIN

WOUND HEALING gelis, 20 g 6⁹⁹ 5⁵⁹ €WOUND HEALING gelis, 50 g 12⁹⁹ 10³⁸ €

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Help4skin Wound Healing“ yra hidrokoloidinis gelis be parabenų, skirtas lokaliai sausų ir šlapių žaizdų priežiūrai bei jų gijimui skatinti. Skirtas gydyti ūminiams ar lėtinėms žaizdoms, tokioms kaip: žaizdos (įskaitant chirurgines); įgyvimai, įbrėžimai; odos nubrodinimai ir įtrūkimai; atviros kojų opos; paviršiniai nudegimai (I ir II laipsnio); pragulos. Galima naudoti vyresniems nei 2 m. vaikams.

PAPRASTA IR EFEKTYVU.

AMEDIPLUS

Rankų kremas su pantenoliu, 100 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ



Pasiūlymai galioja 2025 10 01 – 2025 10 31.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Nuolaidos taikomos prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą. Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį/informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Daugiau informacijos NORFOS vaistinėje, tel. +370 800 10008, www.nvaistine.lt MAŽYLIUI IR MAMAI skirtas prekes ypatingomis kainomis greičiau ir patogiau užsisakykite internetinėje vaistinėje www.nvaistine.lt. Užsisakius prekių (išskyrus vaistinius preparatus) už 29 € ir daugiau – pristatymas NEMOKAMAI! Reklaminio teksto parengimo data – 2025 09 17.



7⁹⁷ €



TERBINAFIN-RATIOPHARM 10 mg/g kremas, 15 g.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 g kremo yra 10 mg terbinafin hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** odos infekcija, sukelta dermatofitų, tokių kaip *Trichophyton*, *Microsporum canis* ir *Epidermophyton floccosum*; mieliagrybių, daugiausia *Candida* genties; įvairiaspalvė dedervinė, sukelta *Phytonysson orbiculare* (*Malassezia furfur*). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusieji ir paaugliai (12 m.); pėdos grybelis, blauzdos grybelis ir liemens grybelis: 1 kartą per parą, savaite; odos kandidozė: 1 kartą per parą, 1–2 savaites; įvairiaspalvė dedervinė: 1–2 kartus per parą, 2 savaites. Tepiti ant sausos ir švarios odos. „Terbinafin-ratiopharm“ 10 mg/g kremas turi būti tepamas ant pažeistos ir aplinkinės odos plonu sluoksniu ir tada švelniai įtrinamas. Jei infekcija yra raukšlėse (po krūtinių, tarpupirščiuose, sėdmenų raukšlėse arba kirkšnyje), po kremo užtepimo oda galima uždenkti steriliu marlės gabaleliu, ypač naktį. Simptomai palengvėja dažniausiai per kelias paras. Nereguliaraus vaisto vartojimas arba ankstyvas nutraukimas padidina simptomų pasikartojimo riziką. Jei per 2 sav. nesitęsia pagerėjimo, diagnozė turi būti svarstoma iš naujo. „Terbinafin-ratiopharm“ 10 mg/g kremo nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams, nes duomenų apie saugumą nepakanka. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** „Terbinafin-ratiopharm“ 10 mg/g kremas yra skirtas tik naudoti išorškai. Vengti patekimo į akis. Gali atsirasti akių dirginimo požymių. Atsiktinai patekus į akis, gerai plaukite jas tekančiu vandeniu. „Terbinafin-ratiopharm“ 10 mg/g kremą reikia laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Sudėtyje esantys cetostearyl alkoholis ir cello alkoholis gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą). Benzilo alkoholis gali sukelti alerginių reakcijų ir nesunkų vietinį sudirginimą. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-01. OTC-LI-00090

INOVATYVŲ ODOS PROBLEMŲ SPRENDIMAI

-35%



COMPEED®

Pieštukas nuo pūslių, 8 ml 12⁹⁵ 8¹² €

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Padaeda saugoti odą nuo trynimų ir išvengti pūslių susidarymo. Padeda sukurti apsauginį barjerą, apsaugantį nuo trynimų, suteikia nematomą apsaugą, puikiai tinka avint atvirą alyvinę, paprastai naudoti. Įspėjimai: negalima naudoti ant jau susidariusių pūslių ar atvirų žaizdų, gleivinių.

Vidutinio dydžio pūslių pleistrai, 5 vnt. 10⁵⁵ 6⁸⁶ €

Skirtingų dydžių pūslių pleistrai, 5 vnt. 10⁵⁵ 6⁸⁶ €

Lūpų pūselinės pleistras, 15 vnt. 21⁷⁵ 14¹⁴ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

Pleistrai. Hidrokolidinė technologija. Pleistras padeda greitai maitinti skausmą, kurį sukelia pūsles, saugo nuo trinties ir ją mažina, skatina greitą žaizdų gijimą. Išsilaiko keletą dienų. Pleistru negalima dėti ant užkrestų žaizdų, naudoti pakartotinai ar karpyti.

Nematomos lūpų pūselinės pleistras, kurio nepertraukiamas poveikis trunka iki 12 val. Padeda saugoti nuo viruso plitimo, paslepia pūseles. Negalima naudoti vaikams, nešiojams ir žindančioms moterims.

„COMPEED“ GELBSTI DIENĄ.

-20%



AMEDIPLUS

Pleistrai nuospaudoms, 7 x 2,2 cm, 10 vnt. 2⁹⁵ 2³⁹ €

Vandeniui atsparūs pleistrai, 7 x 2 cm, 10 vnt. 1⁴⁵ 1¹⁶ €

Vandeniui atsparūs pleistrai, 7 x 3,8 cm, 10 vnt. 2⁹⁵ 1⁶⁷ €

Pleistrai su alavijų ekstraktu, 7 x 2 cm, 10 vnt. 1⁷⁵ 1⁴³ €

Juodi aksominiai pleistrai, 7 x 2 cm, 10 vnt. 1⁷⁵ 1⁴³ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

-25%



AMEDIPLUS

Pleistrai pūslėms, 2 x 6 cm, N5 4⁹⁵ 3⁷⁴ €

Pleistrai pūslėms, 6,9 x 4,4 cm, N5 5⁹⁵ 3⁸⁹ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

-40%



PROPOLIO-MEDETŲ KREMAS, 40 g 6⁹⁵ 4¹⁹ €

PROPOLIO ALIEJUS, 15 ml 5⁹⁵ 3⁵⁹ €

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

-25%



ILON®

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„ilon“ – priemonės kasdienės sauso, jautrios, į sudirgimus linkusios odos priežiūrai. „ilon“ Lippencreme HS – bespalvė priemonė lūpoms, sudirgusioms dėl aplinkos veiksmų, saulės ar po estetinių procedūrų, su SPF 30. „ilon“ Nail Spray – purškiamą priemonę pakitusių ir silpnų kojų nagų priežiūrai. „ilon“ Gel – gelis labai sauso ir jautrios kūno odos priežiūrai. „ilon“ Cracked Heel Cream – intensyviai drėkinantis pėdų ir kulnų kremas, papildytas 20 % šlapalo.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-25%

2⁰² €



AMEDIPLUS

Vazelino kremas, 50 g

Vazelino kremas su vitaminais A ir E, 50 g

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

-20%

3⁹⁶ €



AMEDIPLUS

Cinko kremas, 20 g

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Gali padėti minkštinti paraudusią odą.

SAUSOMS AKIMS

-20%

ARTELAC®

ARTELAC® SPLASH, 10 ml 15⁹⁹ 12⁶³ €
 ARTELAC® REBALANCE, 10 ml 15⁹⁹ 12⁷⁹ €
 ARTELAC® TRIPLEACTION, 10 ml 16⁹⁹ 13⁵⁹ €
 ARTELAC® NIGHTTIME GEL, 10 g 11⁹⁹ 9⁵⁹ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Artelac“ Splash – mūsų populiarusis produktas su hialuronu, skirtas sausoms akims greitai nuraminti ir sudrėkinti. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesiai.

„Artelac“ Rebalance – užtikrina stiprų drėkinamąjį poveikį ir palengvėjimą, esant nuolat pasikartojančiam akių sausumui. Drėkina akis ir apsaugo jų paviršių, papildoma ašarų plevėle paviršiaus jona ir vitaminu B12, sureguliuoja osmosinį akies paviršiaus balansą ir taip padeda ilgam sustabdyti sausų akių simptomų pasireišimą.

„Artelac“ TripleAction® pažangus tirpalas, sukurtas taip, kad išliktų ant akies paviršiaus ir intensyviai drėkindamas greitai ir ilgam numalšintų sausų akių simptomus. Sudėtyje esantys komponentai (hialuronas, glicerolis, karbomeras, lipidiniai komponentas) atkuria visus tris ašarų plevėles sluoksnius. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesiai.

„Artelac“ Nighttime Gel® atkuria ašarų plevę nakties metu. Produktas suteikia papildomą apsaugą tiems, kam pasireiškia didesnis ir nuolatinis akių sausumas. 2024-11-11

„ARTELAC“ – PAŽANGŲ SPRENDIMAI SAUSOMS AKIMS



AKIMS

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

NAUJIENA

Geriamos
kapsulės
akių
drėgmei



OCUAL

MAISTO PAPILAI

Akių drėgmei palaikyti – ypač jautrioms, pavargusioms ir daug dirbančioms akims – išbandykite naująją „Ocual Hydro Max“.

Normaliam regėjimui išsaugoti ir akių sveikatai palaikyti rinkitės „Ocual Strong“.

Vaizdo aiškumui, normaliai akių būklei palaikyti – daug dirbant ar mokantis – atraskite „Ocual“ tabletes.

„OCUAL“ – MATYK, KAI LABIAUSIAI REIKIA!

*Akių taikoma geltona etiketė pažymėtos prekės.

7⁹⁷ €

VISINE, 0,5 mg/ml akių lašai (tirpalas), 15 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekviename akių lašų mililitre yra 0,5 mg tetrazolino hidroklorido (t. y. 21 µg laše). **Terapinės indikacijos:** „Visine“ skirtas akių paraudimui, kurį sukelia nedidelis neinfekcinis akių sudirginimas, pvz., dūmai, dulks, vėjas, chloruotas vanduo, šviesa ar alergija, trumpam laikui gydyti suaugusiems, paaugliams ir 2 m. bei vyresniems vaikams. Vaikams nuo 2 iki 6 m. amžiaus „Visine“ galima vartoti tik su sveikatos priežiūros specialisto rekomendacija. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti ant akių. Vaikams nuo 6 m. amžiaus, paaugliams ir suaugusiems: jei gydytojas nenurodė kitaip, lašinoti po 1–2 lašus ant paveiktos akies (-ių) 2–3 kartus per parą. Vaikams nuo 2 iki 6 m. „Visine“ galima vartoti tik su sveikatos priežiūros specialisto rekomendacija. Jei nenurodyta kitaip, rekomenduojama dozė yra 1 lašas ant paveiktos akies (-ių) 2–3 kartus per parą. Vaikams iki 12 m. ši vaista įlašinti galima tik su suaugusiųjų pagalba. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija tetrazolino hidrokloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, sergate uždarą kampo glaukoma, jaunesniams kaip 2 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** pasitarkite su gydytoju, jeigu sergate sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis (pvz., koronarinė širdies liga, padidėjusi kraujospūdis, feochromocitoma), gerybinę prostatos hiperplaziją, medžiagų apykaitos sutrikimus (pvz., hipertiroidizmo, cukrinio diabeto, raudojojo kraujo pigmento susidarymo sutrikimų), sausąjį rinitą (priekinės nosies dalies lėtinio uždegimo), sausąjį keratokonjunktivitą (junginės ir ragenos sausumas), glaukomą (akių būklę, kai pažeidžiamas regos nervas, jungiantis akį su smegenimis). Jei per 48 valandas simptomai nepagerėja arba jeigu akių dirginimas ar paraudimas išlieka arba didėja, jeigu pastebite regėjimo pokyčių ar akių skausmą, vaisto vartojimą nutraukite ir kreipkitės į gydytoją. Jeigu pasireiškia galvos skausmas, regėjimo praradimas, regos sutrikimai (pvz., judančios dėmelės regėjimo lauke ar dviejimasis akyse), stiprus ūminis ar tik vienos akies paraudimas, arba šviesa sukelia skausmą, vaisto vartojimą nutraukite ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Nenaudokite šio vaisto daugiau ir ilgiau nei 3–5 dienas iš eilės, nes tai gali pabloginti akių paraudimą ar nosies simptomus. Vartojant šį vaistą, lūšų vyzdžiai gali laikinai išsiplešti. Paprastai kontaktinių lęšių negalima nešioti sergant akių ligomis. Jei nešiojate kontaktinius lęšius, prieš vartodami vaistą juos išimkite ir vėl įdėkite atgal ne mažiau kaip po 15 minučių. „Visine“ sudėtyje yra fosfatų. Jeigu Jums yra akies priekinė dalį gaubiančio skaidraus sluoksnio (ragenos) akių pažeidimų, labai retais atvejais fosfatų gali sukelti drumzlinius ragenos plotelius dėl gydymo metu susiformavusių kalcio nusėdimų. Reklamos teksto parengimo data 2024-11-11 LT-VI-2400001.



BE KONSERVANTŲ

-20%

OCUTEARS ALO+ oftalm.tirp. 10ml 15⁹⁷ 12⁷⁸ €
 OCUTEARS HYDRO+ 0,2% lašai, 10ml 14⁹⁷ 11⁹⁸ €

AKIŲ LAŠAI

„Ocutears“ ALO+ sudėtyje esantys alavijai turi akių paraudimą ir paburkimą mažinantį, antimikrobinį, prieš uždegimą, žaizdų gijimą skatinantį, antioksidacinį poveikį. Alavijai stiprina hialurono drėkinamąjį ir regeneracinį poveikį, užtikrinant komfortą ir akies paviršiaus apsaugą.

„OCUTEARS ALO+“ IR „OCUTEARS HYDRO+“ – EFEKTYVI IR ILGALAIKIAUSI SAUSOMS AKIMS BE KONSERVANTŲ.



NUO ALERGIJOS

5⁹⁹ €

TAVEGYL 1 mg, 20 tablečių.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje tableteje yra 1 mg klemastino fumarato, kuris atitinka 1 mg klemastino. **Indikacijos:** „Tavegyl“ lengvina alerginę slogą (šienligę, ašarojimą, čiaudulį, nosies varvėjimą); alerginę odos reakciją (paraudimą, spuogelius, niežėjimą, patinimą); vabzdžių įgėlimo ir įkandimo sukeltą reakciją. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: iš ryto ir vakare gerti po 1 tabletę. 6–12 m. vaikams: gerti prieš pusryčius ir vakare prieš miegą po 0,5 arba 1 tabletę. 3–6 m. vaikams: gerti prieš pusryčius ir vakare prieš miegą po 0,5 tabletes. Tabletes gerti prieš valgį užsigeriant vandeniu. **Kontraindikacijos:** alergija klemastinui, kitokiams antihistamininiams vaistams ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Porfirija. Jaunesniems nei 3 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** atsargiai turi vartoti pacientai, sergantys: uždarą kampo glaukoma; stenozę sukeliančia peptine opa; dvylikapirštės žarnos obstrukcija; prostatos hipertrofija, dėl kurios susilauko šlapimas, bei šlapimo pūslės klapelio obstrukcija. Reikia atsargiai skirti epilepsijai sergantiems arba praėjus traukulius patyrusiems pacientams. Sudėtyje yra laktozės. Reklamos teksto parengimo data 2024-07.

ANTIALERGINIS VAISTAS

4⁹⁹ €

OPEXA®, 20 mg, 10 tablečių

Bilastinas

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

„Opexa“ vartojamas šienligės (kuriai būdingi simptomai yra čiaudulys, niežulys, sloga, užgulta nosis, paraudusios ir ašarojančios akys) ir kitų alerginio rinito formų simptomams slopinti. **Js taip pat gali būti vartojamas niežtinėmis odos išbėrimams (pūksliams arba dilgėlinei) gydyti.** „Opexa“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija bilastinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jei Jums nustatytas vidurinio sunkumo arba sunkus inkstų veiklos sutrikimas, mažas kalcio, magnio, kalio kiekis kraujyje, jeigu Jums pasireiškia arba pasireiškė širdies ritmo sutrikimai, arba Jūsų širdies susitraukimų dažnis yra labai mažas, jeigu vartojate vaistų, galinčių paveikti širdies ritmą, jeigu Jums yra arba buvo tam tikrų širdies ritmo sutrikimų (vadinamasis QTc intervalo pailgėjimas elektrokardiogramoje), kurie gali pasireikšti sergant kai kuriais širdies ligų formomis, ir vartojate kitus vaistus. Neduohte šio vaisto jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Neviršykite rekomenduojamos dozės. Gydymo trukmę priklauso nuo Jūsų ligos simptomų, trukmės ir eigos. Nevartokite „Opexa“ ilgiau nei 10 dienų nepasikonsultavę su gydytoju. Jei po 3 dienų Jūsų sąvija nepagerėja arba net pablogėja, kreipkitės į gydytoją. Rekomenduojama dozė suaugusiems, įskaitant senyves žmones ir 12 m. bei vyresnius paauglius, yra 1 tabletė (20 mg) per dieną, tabletę reikia nuryti nevalgius, 1 valandą prieš valgį arba sulčių gerimą, arba praėjus 2 valandoms po valgyimo arba sulčių gerimo.

SUTRAMDYK ALERGIJĄ!

NUO ALERGIJOS

4⁴⁹ €

CETIRIZIN ACTAVIS

10 mg, 10 dengtųjų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje plevėle dengtoje tableteje yra 10 mg cetirizino dihidroklorido. **Terapinės indikacijos:** suaugusiems žmonėms ir 6 m. amžiaus bei vyresniems vaikams cetirizinas vartojamas sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito simptomams (nosies ir akių) palengvinti bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės simptomams palengvinti. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** 6–12 m. vaikams: 5 mg (pusė tabletes) 2 kartus per parą; suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams: 10 mg (1 tabletė) 1 kartą per parą. Esant inkstų funkcijos sutrikimui, dozė reikia mažinti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, hidroksizinui arba bet kuriam piperazino darinui. Pacientams, sergantiems sunkia lėtine inkstų liga, kai reikalingos dializės. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju ar vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Cetirizin Actavis“; jeigu sergate inkstų nepakankamumu (jei būtina, Jums reikės vartoti mažesnę vaisto dozę. Reikalinga dozė nustatys gydytojas); jeigu turite šlapimoimo problemų (tokių kaip nugaros smegenų problemų arba prostatos ar šlapimo pūslės problemų); jeigu sergate epilepsija ar Jums gali būti traukuliu, kurtu su „Cetirizin Actavis“ vartoti alkoholio nerekomenduojama, kaip ir su kitais antihistamininiais vaistais. Del sudėtyje esančios laktozės šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktozės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-01. OTCT-01-00089

NIEŽULIUI MALŠINTI

5⁹⁹ €

GRIVIX 1 mg/g gels, 30 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: kiekviename grame gėlo yra 1 mg dimetindeno maleato. **Pagalbinės medžiagos:** benzalkonio chloridas ir propilenglikolis. **Terapinės indikacijos:** dermatozės, dilgėlinės, vabzdžių įkandimo, nudegimo sauslė arba paviršinio odos nudegimo (pirmojo laipsnio) sukeltą niežėjimą trumpalaikis malšinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** vaikams, suaugusiems ir senyviems pacientams: ant paveiktos ir niežtinčios odos GRIVIX reikia tepti plonu sluoksniu 2–4 kartus per parą. Kūdikiams ir mažiesiems vaikams (jaunesniems nei 2 metų amžiaus) reikia vengti vartoti ant didelės odos plotų. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Antrinio ir trečiojo laipsnio nudegimai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jei GRIVIX gydymas didels odos plotas, reikia vengti ilgalaikio šių paviršių saulės apšvietimo. Kūdikiams ir mažiesiems vaikams (jaunesniems nei 2 metų amžiaus) didelės odos plotu, ypač paveikto ar apimto uždegimo, gelio tepti reikia vengti. Vaistinio preparato sudėtyje yra benzalkonio chlorido, kuris dirgina, gali sukelti odos reakciją, ir nuplėmikliui, kuris gali sudirginti odą. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-01.

NUORAMINKI SUDIRGINATY IR NIEŽTINČIA ODĄ!



NUO **5⁷⁵ €**

CANESTEN® 10 mg/g kremas, 20 g **5⁷⁵ €**

NERECIPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: 1 g kremo yra 10 mg klotrimazolo. **Terapinės indikacijos:** odos ir išorinių gleivinių infekcijų, sukeltų klotrimazoliu jautrių mikroorganizmų, gydymas. **Conidia** sukelto vulvito gydymas kartu gydant vulvovaginalinę mikozę infekcija. **Candida** sukelto balanito gydymas. **Varžymo būdas ir dozavimas:** vartojamas 2-3 kartus per parą. Užtepti plonu sluoksniu ir švelniai įtrinti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas klotrimazoliui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** gali sumažinti latekso gaminių veiksmingumą ir saugumą, jeigu tepama lytinių organų srityje. Poveikis pasireiškia tik gydymo metu, todėl jo metu naudokite alternatyvias apsaugos priemones. Venkite sąlyčio su akimis. Nėdėkite kremo į burną ir neuorvokite. Pacientai, gydomi imunosupresantais, chemoterapija, sergantys diabetu, infekuoti ŽIV, jaunesnės kaip 16 m. paauglės, nežinosios per pirmuosius tris nėštumo mėnesius, prieš vartodami turi pasitarti su gydytoju. Vaikams (jaunesniems negu 12 m.) ir senyviems pacientams vartoti tik prižiūrint gydytoją. Vengti ilgalaikio gydymo didelės odos plotuose. Galima vartoti žindymo metu. Jeigu vartojamas spenelių srityje, prieš maitinant reikia nusiplauti krūtis. Sudėtyje yra cetoestaro alkoholio ir benzilo alkoholio, kurie gali sukelti vietinių odos bei alerginių reakcijų. **Bėdamos laiko parengimo data:** 2024-II, CH-20240205-30

"CANESTEN"™ KREMAS - GRYBELINIS INFЕКЦИJOS GYDYMI!

*Nr. 1 pasulėje pagal pardavimus nerceptinių ginekologinių priešgrybelinių preparatų kategorijoje. Remiantis 2023 m. pasuline Nicholas Hall's OTC duomenų baze DB6

CANESTEN® 500 mg makšties minkštoji kapsulė **11⁵⁰ €**

NERECIPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kapsulėje yra 500 mg klotrimazolo. **Terapinės indikacijos:** makšties ir moters išorinių lyties organų infekcijų, sukeltų klotrimazoliu jautrių mikroorganizmų, tokių kaip grybeliai, gydymas. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** saugusios moters ir paauglės nuo 16 m.: 1 kapsulė įdedama kiek įmanoma giliai į makštį, naudojant pakuotėje esantį aplikatorių, geriausia gulint, vakare prieš miegą. Nėštumo metu kapsulę turi būti įdedama į makštį, be aplikatoriaus. Reikalinga gydytojo konsultacija, jei simptomai nepalengvėja per 7 dienas. Jaunesnėms kaip 16 m. paauglėms galima vartoti tik po gydytojo konsultacijos. Saugumas ir veiksmingumas jaunesnėms kaip 12 m. mergaitėms neįrodyti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas klotrimazoliui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** reikia kreiptis į gydytoją, jeigu makšties infekcija pasireiškia pirmą kartą; pirmojo nėštumo trimestro metu; per pastuosius šešis mėnesius infekciją pasikartoję daugiau nei du kartus; yra karščiavimas ($\geq 38^{\circ}\text{C}$); skauda apatinę pilvo dalį, nugara; atsiranda nemalonus kvapo išskyų iš makšties; pykinas; kraujuoja iš makšties ir (arba) tuo pat metu jūntas pečių skausmas. Nerekomenduojama gydyti menstruacijų metu. Vartojant vaistą negalima naudoti tamponų, makšties ploviklių, spermicidinių ar kitokių į makštį vartojamų preparatų, rekomenduojama vengti lytinių santykių. Latekso kontraceptinių priemonių veiksmingumas ir patikimumas gali sumažėti. **Bėdamos laiko parengimo data:** 2024-II, CH-20240205-30

"CANESTEN"™ MAKŠTIES MINKŠTOJI KAPSULĖ - 1-OS DIENOS MAKŠTIES GRYBELINIS INFЕКЦИJOS GYDYMAS!

Intymiai higienai



VAGISAN

KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS

Priemonės „Vagisan“ su natūraliu pieno rūgštimi skirtos tinkamai lytinių organų priežiūrai. Rūgštis aplinka – būtina sąlyga, kad laktobakterijos galėtų pačios gaminti pieno rūgštį ir dauginis. Taip užtikrinama optimali natūrali apsauga nuo infekcijos. Intymiosios higienos prausiklis „Vagisan“ tinka kasdieniai intymiajai higienai. Drėkinamasis makšties kremas „Vagisan“ sumažina tokius simptomus kaip sausumas, niežulys, deginimo pojūtis ir skausmas. Ovulės su pieno rūgštimi, skirtos natūraliai makšties pH terpei palaikyti ir atkurti.

TAVO INTYMAI SVEIKATAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-25%

Veidui



BIODERMA

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Prancijijos dermatologijos laboratorija „Bioderma“ vadovaujasi požiūriu, kad odos priežiūros priemonės turi padėti atkurti natūralius biologinius procesus, šalindamos odos problemų kilmės priežastis bei simptomus. Priežiūros priemonės „Bioderma“ kuriamos tik iš grynų veikliųjų medžiagų, atliekančių svarbų vaidmenį odos veikloje.

„NAOS“ EKOLOGIJA – DERMATOLOGIJOS ESMĖ.

IKI -30%

Makšties drėgmei ir mikroflorai atstatyti

-15%



FEMINELLA® PLUS, 10 ovulė 16⁹⁹ 14¹⁰ € BIOHYL® LACTO, 7 ovulės 14⁹⁹ 12⁷¹ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Feminella“ Plus™ makšties ovulės yra naudojamos kaip profilaktinė ir gydymo priemonė esant nespecifiniam makšties sausumui bei atrofiniam makšties uždegimui. Jos gali būti naudojamos ir kaip papildoma priemonė esant makšties dirginimui, deginimui ir niežėjimui, kuriuos sukelia tiek makšties uždegimėms ligos, tiek infekcijos. Priemonė skirta vaisingo amžiaus moterims, taip pat moterims perimenopauzės ir menopauzės laikotarpiu. „Biohyl“ Lacto™ ovulės yra vartojamos siekiant atkurti normalią makšties mikroflorą; slopinti uždegimų procesus makštyje; apsaugoti makšties gleivinę ir skatinti jos regeneraciją.

Motery intymiai higienai

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMAI!



MULTI-GYN

KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS

Mūsų produktai suteikia tinkamą intymią higieną ir padeda sumažinti nemalonius pojūčius toje srityje: nepageidaujamą kvapą, niežulį ar deginimo pojūtį. „Multi-Gyn“ puikiai suprantama moterų poreikius, kai atsiranda nepatogumų intymioje zonoje ir kaip tai paveikia jūsų gyvenimą. Todėl mes siūlome produktus, kurie gydo šiuos negalavimus natūraliu būdu, be žinomo šalutinio poveikio („Actigel 2 in 1“, „Liquigel“, „Flora Plus“). Visų produktų sudėtyje esantis unikalus ZOR™ kompleksas atkuria ir normalizuoja natūralią makšties mikroflorą.

*ZOR kompleksas – patentuoti biologiniai aktyvūs polisacharidai, gaunami iš sudedamųjų alavijų (Barbadosis Miller) medžiagų. www.ZOR.com

JEI NORI BŪTI TIKRA DĖ SAVO SVEIKOS MAKŠTIES!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

Skubios pagalbos kontraceptikas



13⁹⁷ €

AVODELE 1,5 mg, 1 tabletė

NERECIPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Avodele yra skubios pagalbos kontraceptikas, kurį galima pavartoti per 72 valandas (t. y. per tris paras) po lytinio akto, kurio metu kontraceptinės priemonės nebuvo naudotos arba naudota kontraceptinė priemonė nebuvo veiksminga. Avodele sudėtyje yra sintetinio hormono, veikliosios medžiagos, vadinamos levonorgestrelu. Suvartotas per 72 valandas po nesaugaus lytinio akto, jis 79 % atvejų apsaugo nuo nėštumo. Vartotinas šiais atvejais:

– lytinio akto metu nebuvo naudota kontraceptinė priemonė.
– Jei kontraceptinė priemonė naudota netinkamai.
Kaip vartoti Avodele: Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Po nesaugaus lytinio akto išgerkite vieną tabletę kuo greičiau, bet ne vėliau kaip po 72 valandų (3 parų). Tablete geriausia išgerti per 12 valandų. Antrą tabletę išgerkite praėjus 12 val. (bet ne daugiau kaip 16 val.) po pirmosios tabletės išgerimo. Jei žinoate arba manote, jog nesate nėščia, Avodele galite vartoti bet kurią ciklo dieną. Tablete nurykite nekratyty, užsigerkite vandeniu. Jūs bus tuo veiksmingesnė, kuo greičiau ją išgeriate. Avodele vartoti negalima, jeigu yra alergija levonorgestrelui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos informacinio lapelio 6 skyriuje). Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Prieš vartodama, pasitarkite su gydytoju, nes Avodele, kaip skubios kontracepcijos priemonė, jums gali netikti. Gydytojas gali jums skirti kitokią skubios kontracepcijos priemonę. Kaip dažnai galima vartoti Avodele. Avodele vartotina tik neaiškliai atvejais ir nėra reguliarios kontracepcijos metodas. Galimas šalutinis poveikis. Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Labai dažnas. Šleikštulys (pykinimas); Gali būti nereguliarus pakajavimas iki prasidedant mėnesinėms; Gali skaudėti pilvo apačią; Nuovargis; Galvos skausmas. Dažni Vėmimas; Gali pakisti mėnesinių ciklas; Išgėrus šio vaisto, gali atsirasti krūtų jutrumas, viduriavimas, sąvaulgio pojūtis. Labai retas Bėrimas, dilgėlinė, niežulys, veido patinimas, dubens sritys skausmas, skausmingos mėnesinės. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant informaciname lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Ši informacija paskutinį kartą peržiūrita 2024-09-01.

-25%**JORDAN****BURNOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS**

Platus dantų priežiūros priemonių asortimentas visai šeimai - nuo pirmo dantuko! Rinkitės dantų šepetėlius, pastas bei tarpdančių valymo priemones pagal savo individualius poreikius.

„JORDAN“ RŪPINASI ŠYPSENOMIS NUO 1927-ŲJŲ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

BURNOS HIGIENAI**-20%****SUNSTAR GUM****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

Jau daugiau kaip 80 metų „Sunstar“ yra viena burnos etrmės higienos priemonių gamybos lyderių. GUM® sukūrė produktų liniją vaikams su saugiu fluorido kiekiu. Fluoridas padeda dantims greičiau įsisavinti mineralus ir saugo emalį nuo rūgščių poveikio. O sudėtyje esantis izomaltas padeda efektyviau įsisavinti fluoridą.

SVEIKOS DANTENOS, SVEIKSNIS GYVENIMAS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

DANTŲ PRIEŽIŪRAI, BURNOS HIGIENAI**IKI -30%****TEPE****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

„TePe“ dantų ir tarpdančių šepetėliai yra kasdienės dantų higienos pagrindas. „TePe“ siūlo didelį dantų ir tarpdančių šepetėlių pasirinkimą kasdienai dantų priežiūrai ir turintiems specialiuji poreikių. „TePe“ dantų pastos yra švelnios, su fluoru, neputojančios arba mažai putojančios. Skirtos kūdikiams nuo pirmo dantuko, vaikų pienuiams dantims, suaugusiems kasdienai ar turintiems sausą burnos gleivinę.

*Akcija taikoma kainų skirtuku pažymėtomis prekėms

TOBULAI BURNOS HIGIENAI**-20%****CURAPROX****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

„Curaprox“ – tai aukščiausios kokybės šveicariškos burnos higienos priemonės: platus spektras dantų šepetėlių, tarpdančių šepetėlių, dantų pastų. Taip pat kūdikiams ir vaikams skirtos priemonės. „Curaprox“ dantų šepetėlių šereliai gaminami ne iš nailono, o iš patalutuos „Curen“ medžiagos, todėl šie šepetėliai efektyviai pašalina apnašas, ne-traumuoja dantenu. Tarpdančių šepetėliai gaminami iš labai plonos, tačiau tvirtos „Cural“ patalutuos medicininės vielutės, todėl tarpdančius išvalysite kruopščiai ir be skausmo. Dantų pastos profilaktikai įvairaus amžiaus grupėms ir antibakterinė „Perio Plus“ linija.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-30%**CURASEPT ADS****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

Curasept ADS priemonių išskirtinumas – vienintelė pasaulyje patentuota ADS sistema – formulė, kuri patikrins, kad Jūsų natūralių dantų spalva ir burnos receptorių veikla chlorheksidino preparato naudojimo metu nepakistų.

Curasept ADS chlorheksidinas pasižymi itin stipriomis antibakterinėmis savybėmis, efektyviai naikina pavojingas bakterijas, taip užkirsdamas kelią ir apnašų deimuisi. Curasept ADS produkcijos sudėtyje nėra alkoholio, SLS, tad išvengsite burnos etrmės sausėjimo, skilinėjimo bei dirglumo pojūčių. Curasept ADS sukurta ir subalansuota gingivitui, periodontitui malšinti, kraujuojančioms dantenoms gydyti. Taip pat skatina burnos audinių gijimą prieš ir po intensyvių burnos higienos ar kitų sudėtingų stomatologinių intervencijų. Tikime, kad sveikas kūnas bei turinčias gyvenimas, pirmiausia prasideda nuo sveikos burnos bei spindinčios šypsenos. Mes ne tik kalbame apie unikumą, mes jį jau sukūrėme. Tu to dar nežinai, bet tai geriausia, kas galėjo nutikti tavo dantims...

PIRMI, NES MUMS RŪPI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

DANTŲ PROTEZŲ KLIIJAI**-30%****BLEND-A-DENT**

COMPLETE STRONG HOLD, fiksuojamasis dantų protezų kremas, be skonio, 47 g, 2 vnt.

COMPLETE STRONG HOLD FRESH FLAVOR, fiksuojamasis dantų protezų kremas, 47 g, 2 vnt.

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Fiksuojamasis dantų protezų kremas „Blend-a-Dent“ – puikus pasirinkimas, jei nenorite galvoti apie savo protezus. Nesvarbu, ką darote ar valgate, galite pasikilti savimi, nes dantų protezai savo vietoje laisvą laiką tvirtai ir patogiai. „Blend-a-Dent“ suteikia stiprią fiksaciją visą dieną, užtikrina komfortą, sukurdamas pagalvėlę tarp dantų ir dantų protezų, ir apsaugo nuo maisto dalelių patekimo po protezus. Galite atsipalaiduoti ir mėgautis gyvenimu nesivarždami.

-30%**WOOM****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

Pasiroškite naujam burnos higienos etapui su „Woom“! Priemonės su kruopščiai atrinktomis medžiagomis suteikia šypsenai gaivumą, švaros ir komforto pojūtį, padeda palaikyti dantų paviršiaus švarą ir natūralų jų baltumą. Elegantiškas dizainas ir modernios formulės užtikrina, kad kiekvienas produktas būtų ne tik praktiškas, bet ir malonus naudoti. „Woom“ paverčia burnos priežiūrą ritualu, kuriuo norisi mėgautis kasdien.

„WOOM“ – PRIEŽIŪRA ŠYPSENAI, KURI ĮKVĖPIA KASDIENYBĖ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



-35%

PHILIPS
AVENT
www.philips.lt/avent


1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMEDIPLUS
Ovuliacijos testas, 2 vnt. 379 €
MEDICINOS PREKĖ


-30%

DOCTOR FISH OMEGA-3 + VITAMINS D & E, 30 kapsulių 11⁹⁹ 8³⁹ €

MAISTO PAPILDAS SU SALKIKLIU

Maisto papildas sudėtyje yra omega-3 riebiųjų rūgščių (EPR ir DHR) ir vitaminų D ir E:
EPR (eikozapentaeno rūgštis) ir DHR (dokozaheksaeno rūgštis) padeda palaikyti normalią širdies veiklą;
DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją, išsaugoti normalų regėjimą;
vitaminas D padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų, raumenų, dantų būklę;
vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinių pažeidimų.
Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.

GAMINAME VAISTUS PAGAL INDIVIDUALIUS RECEPTUS

- Atneškite gydytojo receptą iki 13 val.
- Atsiimkite pagamintą vaistą kitą darbo dieną.


VAISTINĖ
VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS




AMBIO®

Epitome

NUOLAIIDŲ MĖNUO

GERI PASIŪLYMAI VISAM ASORTIMENTUI



Pasiūlymai galioja 2025 10 01 - 2025 10 31. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą. Prekių kiekis ribotas. UAB „Norfos vaistinė“ pasilieka teisę bet kada keisti akcijos sąlygas. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.