

NVAISTINĖ

TOP BALANDŽIO PASIŪLYMAI



-50%




AMBIO
KEPENIMS SU MARGAINIU FORTE, 30 kapsulių **9⁹⁹ 4⁶⁰ €**
MAISTO PAPILDAS

-50%



EPITOME
JOINTS BOVINE COLLAGEN, 12.000 mg, milteliai, 30 paketėlių **49⁹⁹ 25⁰⁰ €**
MAISTO PAPILDAS

IKI -65%



RAMI ŠIRDIS
MAISTO PAPILDAS
„Rami širdis“ – dvejoje poveikio maisto papildai, pripažinti Lietuvos vartotojų. Šios linijos preparatams būdinga puikiai suderinta sudėtis, kuri, be vitaminų ir mineralų, papildyta natūraliais augaliniais ekstraktais, šimtmečius naudojamais medicinoje. „Rami širdis“ maisto papildai padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir psichologinę funkciją, taip pat padeda mažinti nuovargį.

RAMIAME KŪNE – RAMI ŠIRDIS
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMAI!



ATEROLIP® COMPLEX CAPS
30 kapsulių **15⁹⁹ €**
90 kapsulių **39⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAS
„Aterolip“ complex caps* sudėtyje esantis ciberžolių ekstraktas padeda palaikyti normalų cholesterolio kiekį kraujyje, širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą, taip pat normalizuoti kepenų lipidų kiekį.

4⁹⁹ €



SEPTABENE
3 mg/1 mg, (eukaliptų/citrinų ir medaus/citrinų ir šėvamedžio/ kolos skonio), 16 kietųjų pastilių
NERECETINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
„Septabene“ dezinfekuoja burną ir ryklę bei lengvina ryklės uždegimo požymius: skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. Kietosios pastilės „Septabene“ vartojamos uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniams poveikiui sukelti: jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas; sergant dantenų uždegimu (gingivitu), ryklės uždegimu (faringitu). **Dozavimas:** suaugusiems rekomenduojama paros dozė yra 3–4 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3–6 valandas. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 m. vaikas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Septabene“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydymo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Sąveika su kitais vaistinėmis preparatais ir kitokia sąveika. „Septabene“ negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Kietųjų pastilių negalima vartoti kartu su pienu, nes jis silpnina cetilpiridinio chlorido antimikrobinį poveikį. Reklamos teksto parengimo data 2022.10.12.

TAVO GERKLĖ – TAVO JĖGA!

4⁹⁹ €



IBUMETIN EXPRESS
600 mg, 30 kietųjų kapsulių

NERECETINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veiklioji medžiaga: kiekvienoje minkštoji kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno. **Terapinės indikacijos:** suaugusiems ir paaugliams, sergantiems ne mažiau kaip 40 kg (12 m. ir vyresniems), trumpalaikis lengvo ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip galvos, dantų, raumenų, sąnarių ar sukeltų menstruacijų, mėšlinimas. Karščiavimo, susijusio su peršalimu, mėšlinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** įprasta vienkartinė dozė yra 1 kapsulė. Didžiausia paros dozė yra 1 200 mg ibuprofeno (3 kapsulės). Kapsulę reikia užgerti stikline vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Anksčiau buvo pasireikšiusi acetalicilio rūgšties arba kitokių nesteroidių vaistų nuo uždegimo (NVNU) sukelta astma, dusulys, sloga, patinimas ar (retinėti) išbėrimas. Aktyvi arba buvusi paskaitojanti skrandžio opa arba kraujavimas iš skrandžio, su NVNU susijęs kraujavimas iš virškinimo trakto arba virškinimo trakto perforacija. Jei yra sunkios kepenų, širdies, inkstų funkcijos nepakankamumas, kraujavimas ir smegenis arba kitas aktyvus kraujavimas, pasireiškia kraujo krešėjimo sutrikimų arba kitų kraujavimo sutrikimų, sunki skydliaukės liga (sukelta vėmimo, viduriavimo arba nepakankamo skysčių vartojimo), paskutiniai trys mėnesiai. Netikima vaikams ir paaugliams iki 12 m. **Specialūs įspėjimai:** specialiu atsargumo priemonių reikia, jei padidėjęs kraujospūdis, sergate širdies, inkstų ir kepenų liga, turite paveldimą kraujodaros sutrikimą (ūminę kintančią porfirią), turite arba anksčiau esate turėję žarnyno problemų arba ligų (opinis kolitas, Krono liga), sergate astma, sisteminė raudonoji vilkligė arba mirtina jungiamųjų audinių liga, jei jums senesni ar turite didelę apimtį chirurginės operacijos, sergate širdimi, turite nosies polipus arba lėtinį obstrukcinį kvėpavimo sutrikimą. Ligai vartojant skausmą malšinančius vaistus nuo galvos skausmo, jis gali pasunkėti. Tai pavojinga arba žalinga, turėtumėte nustoti vartoti šį vaistą ir kreiptis į gydytoją. Dėl nosies (ikiu rūšių) skausmą malšinančių vaistų vartojimas gali sukelti ilgalaikį sunkių inkstų pažeidimą, ligai vartojant šio vaisto, būtina reguliariai tirti kepenų ir inkstų veiklą bei atlikti bendrą kraujo tyrimą. Reikia vengti „Ibumetin Express“ vartoti sergant vėžavirajais ar kartu su kitais NVNU. Vaistas nuo uždegimo ir (arba) skausmo, tokie kaip ibuprofenas, gali būti susiję su nedideliu širdies priepuolio ar insulto rizikos padidėjimu, ypač vartojant dideles dozes. Neviršykite rekomenduojamos dozės ar gydymo trukmės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu jums pasireiškia širdies problemų, įskaitant širdies nepakankamumą, krūtinės anginą, arba jeigu jums buvo širdies priepuolis, atlikta širdies kraujagyslių jungčių suformavimo operacija, diagnozuota periferinių arterijų liga arba buvo širdies bet kokios rūšies insultas; įtari kraujo spaudimas yra padidėjęs, sergate cukriniu diabetu, nustatytas didelis cholesterolio kiekis, buvo širdies liga susijusi gimnastika arba gimnastika, kuriuos išliko insultas, arba jeigu rūkote. Jeigu vartojate šio vaisto sirgami infekcine liga ir įtari infekcijos simptomai nepasiraišo arba pasunkėja, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Buvo pranešta apie alergines reakcijas į šį vaistą požiūriu, įskaitant kvėpavimo sutrikimus, veido ir kaklo srityje patinimą, krūtinės skausmą. Gydyant ibuprofenu buvo pranešta apie sunkias odos reakcijas, įskaitant eksfoliacinį dermatitą, daugiaformę eritemą, Stivenso-Džonsono sindromą, toksišką epidermio nekrolizę, vaisto sukeltą reakciją su eozinofilija ir sisteminiais simptomais, ūminę generalizuotą egzantemine pustuloze. Jei pastebėsite bet kurį sunkių odos reakcijų ar alergijos simptomų, nutraukite „Ibumetin Express“ vartojimą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Vaisto negalima vartoti, jei nustatytas paveldimas sutrikimas – visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pirmuosius 6 mėnesius vartoti negalima, nebent tai neabejotinai būtina ir taip pataria gydytojas. Teksto parengimo data 2025-06-05.

 -50 % pigiau

Vitaminai ir mineralai visai šeimai

-50%



WALMARK

MAISTO PAPILDAS

NAUJIENA! „Walmart NutriPack Immuno“ – tai keturių vitaminų ir mineralų rinkinys, supakuotas į patogius kasdienius paketėlius – lengva naudoti ir pasiimti visur su savimi.

1 paketėlyje yra: vitamino D 4000 IU kapsulė, prailginto veikimo vitamino C 600 mg tabletė, cinko tabletė ir seleno su juodųjų pipirų ekstraktu tabletė. Vitaminai D ir C, cinkas bei selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. 1 paketėlis – kasdienis tavo imuniteto skydas!

NAUJIENA! „Vitaminai D3 + K2“ – aliejuje mikrokapsuluoti vitaminai D ir K užtikrina gerą bioaktyvumą, stabilumą ir tikslią bei vienodą maistingųjų medžiagų dozę kiekvienoje kapsulėje. Vitaminų poveikis išlieka ilgiau, nes jie veikia palaipsniui ir ilgesnį laiką. Patentuota vitamino K2 technologija „Mena07“!

„Super Vitaminas C“ – prailginto veikimo vitaminas imunitetui. Papildytas erškėtuogių vaisių milteliais, kurie padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir kvėpavimo takų veiklą.

„Mega Vitaminas D 4000 IU“ – didelė dozė vitamino D imunitetui, kaulams ir dantims. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei normalią kaulų ir dantų būklę. Taip pat padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą. 2601_SB_Walmart_V01_LT.

„WALMARK“ – ŽYDĖK SVEIKATA! VITAMINAI IR MINERALAI VISAI ŠEIMAI.

*Kącija taikoma geltona etiketė pažymėtos prekės

-50%



AMBIO

VITAMINAS D3 4000IU, 120 minkštųjų kapsulių **26⁹⁸ 13⁴⁹ €**
KALCIS, MAGNIS, CINKAS, 100 tablečių **45²⁸ 7⁶⁴ €**

MAISTO PAPILDAS

-50%



RAMI ŠIRDIS, 14 x 25 ml **32⁹⁹ 16⁵⁰ €**

MAISTO PAPILDAS

„Rami Širdis patiriantiems stresą“ – plačios sudėties, dviejų poveikių maisto papildas, sukurtas taip, kad ne tik padėtų palaikyti normalią širdies veiklą ir psichologinę funkciją, bet ir padėtų nusiraminti bei palaikyti pažintinę ir protinę veiklą.

Siauralapių bazilių lapų ir plunksnapių gudobelų vaisių ekstraktai padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Raudonžiedžių pasiflorų žiedų ekstraktas turi raminamąjį poveikį, o vitaminas B2 ir magnis padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją. Siauralapių bazilių lapų ir rausvųjų radiolių šaknų ekstraktai padeda palaikyti normalią pažintinę ir protinę veiklą.

RAMIAME KŪNE – RAMI ŠIRDIS

-50%



AMBIO

LAKTO-BIFIDOBAKTERIJOS SU S.BOULARDI, 20 kapsulių **44⁴⁸ 7²⁴ €**
NERVŲ SISTEMAI, 15 kramtomųjų tablečių **5²² 2⁷⁶ €**

MAISTO PAPILDAS

-50%



LIUBERIN

LIUBERIN SUPERIOR, 35 mg, 30 kapsulių **24⁸⁹ 10⁹⁵ €**
LIUBERIN + LUTEIN, 30 kapsulių **22⁹⁸ 11⁴⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

Linija „Liuberin“ skirta padėti išaugoti normalų regėjimą bei palaikyti akies kraujotaką. „Liuberin superior“ net 18 aktyviųjų medžiagų kompleksas sausos, pavargusios, daugį skaitmeninių įrenginių ekranus žiūrončioms akims. Sudėtis praturtinta ginkmedžiu, kuris padeda palaikyti akies kraujotaką. O „Liuberin + LUTEIN 35 mg“ – naujas formulė akims! Šio preparato sudėtis praturtinta karotenoidais: net 35 mg liuteino ir 3 mg zeaksantino, kurių su amžiumi koncentracija akyse mažėja. Gausi sudėtis išsiskiria ir melnyčių uogų ekstraktu, kuris padeda palaikyti normalią akių funkciją, vaizdo aiškumą ir kraujotaką. Normalų regėjimą padeda išaugoti vitaminas A ir cinkas. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

RYŠKIOMS GYVENIMO SPALVOMS!

-50%



IMUNITAL

IMUNITAL SHOTS, 20 geriamųjų dozių po 10 ml **34⁷⁹ 17⁴⁰ €**
IMUNITAL FORTE+, 30 kapsulių **49⁹⁸ 10⁰⁰ €**

MAISTO PAPILDAS

Imuninė sistema – tai žmogaus organizmo atsakas neigiamiems aplinkos veiksniams. Tam tikru metu laiku ar pasikeitus įprastoms gyvenimo sąlygoms (pvz., esant peršalimo ligų sezonui) gali prireikti stipresnio palaikymo imuninei sistemai. „Imunital“ – skirtingų vartojimo formų ir sudėčių produktai, skirti imuninei sistemai.

„Imunital SHOTS“ – itin stipri programa imunitetui su bičių pieneliu, priešpieno koncentratu, reishi (tikriniai blizgučiai) ir shiitake (valgomieji danteniai) grybų ekstraktais bei vitaminu B6. Tinka vaikams nuo 3 metų.

„Imunital FORTE+“ – ypač didelės vitaminų D, C ir cinko dozės 1 kapsulėje su vertingais beta gliukanais ir augaliniais ekstraktais. Komponentai veiksdami kartu padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą, apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo bei mažinti nuovargį.

MAGIŠKAI TVIRTAS IMUNITETAS!

Nuo alergijos

**CETIRIZIN ACTAVIS**

10 mg, 10 dengtųjų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje plevėle dengtoje tabletėje yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** suaugusiems žmonėms ir 6 m. amžiaus bei vyresniems vaikams cetirizinas vartojamas sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito simptomams (nosies ir akių) palengvinti bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės simptomams palengvinti. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** 6–12 m. vaikams: 5 mg (pusė tabletės) 2 kartus per parą; suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams: 10 mg (1 tabletė) 1 kartą per parą. Esant inkstų funkcijos sutrikimui, dozė reikia mažinti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, hidroksizinui arba bet kuriam piperazino dariniiui. Pacientams, sergantiems sunkia lėtine inkstų liga, kai reikalingos dializės. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju ar vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Cetirizin Actavis“: jeigu sergate inkstų nepakankamumu (jei būtina, Jums reikės vartoti mažesnę vaisto dozę. Reikalingą dozę nustatys gydytojas); jeigu turite šlapimo sistemos problemų (tokių kaip nugaros smegenų nepakankamumą, arba prostatos ar šlapimo pūslės problemų); jei sergate epilepsija ar Jums gali būti traukulių. Kartu su „Cetirizin Actavis“ vartoti alkoholio nerekomenduojama, kaip ir su kitais antihistaminiais vaistais. Dėl sudėtyje esančios laktazės šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktazės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktazės malabsorbcija. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-01. OT-CT-00089

4⁴⁹ €

Nuo skausmo

**METAFENEX, 200 mg/500 mg, 10 plevėle dengtųjų tablečių****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Kiekvienoje plevėle dengtoje tabletėje yra 200 mg ibuprofeno ir 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos.** „Metafenex“ skirtas trumpalaikiam lengvo ar vidutinio stiprumo skausmui, siejamam su migrena, galvos skausmu, nugaros skausmu, mėnesinių skausmu, dantų skausmu, reumatinio bei raumenų skausmu, nestiprių artritų skausmu, peršalimo ir gripo simptomais, gerklės (ryklės) skausmu bei karščiavimu, malšinti. Šis vaistinis preparatas ypač tinka skausmui, kuriam reikia stipresnės analgezijos nei vartojant vien ibuprofeną ar paracetamolį. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems gerti po 1 tabletę ne dažniau kaip 3 kartus per parą valgio metu užgeriant vandeniu. Tarp dozių išlaikyti ne mažiau kaip 6 valandų tarpą. Jei, vartojant po 1 tabletę, simptomai neišnyksta, daugiausia galima vartoti po 2 tabletes ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių per bet kurį 24 valandų laikotarpį. „Metafenex“ negalima vartoti ilgiau kaip 3 dienas. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų asmenims. **Kontraindikacijos.** Šio vaistinio preparato vartoti negalima pacientams, kuriems yra padidėjęs jautrumas ibuprofenui, paracetamolui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti kartu su kitais vaistinėmis preparatais, kurių sudėtyje yra paracetamolio ar kitų NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius ir didesnes kaip 75 mg acetilsalicilo rūgšties paros dozes; jei anksčiau buvo padidėjusio jautrumo reakcija, susijusi su acetilsalicilo rūgštimi arba kitais nesteroidiniais vaistinėmis preparatais nuo uždegimo; jeigu anksčiau buvo aktyvi arba buvusi pasikartojanti peptinė opa; buvo ar yra virškinimo trakto išopėjimas ir (arba) ar jo praeitimas ar kraujavimas, susijęs su ankstesniu gydymu NVNU. Pacientams, kuriems yra kraujų krešėjimo sutrikimų; kuriems yra sunkus kepenų, inkstų arba širdies nepakankamumas. Negalima vartoti paskutinio nėštumo trimestro metu. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Būtinas ypatingas atsargumas: jei pacientas serga infekcine liga, pacientas yra senyvo amžiaus; serga ar anksčiau sirgo astma; yra inkstų, širdies, kepenų arba žarnyno sutrikimas; serga sisteminė raudonoji vilkligė; yra virškinimo trakto sutrikimų arba lėtinė uždegiminė žarnyno liga; paciento nėščia pirmuosius 6 nėštumo mėnesius arba žindo. Reklamos teksto parengimo data 2025-01.

SKAUSMĄ KEISK Į „METAFENEX“!4⁴⁹ €**HEXORALETTEN N, 5 mg/1,5 mg, 16 kietųjų pastilių****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 kietoji pastilė yra 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido ir 1,5 mg benzokaino. **Terapinės indikacijos:** lokalus burnos ir ryklės infekcinių ligų: faringito, stomatito, gingivito, stomatopio slopinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: jei nepaskirta kitaip, sučiulpti po 1 kietąją pastilę keletą kartų per parą. Jei reikia, galima čiulpti po 1 kietąją pastilę kas 1–2 val., daugiausia 4 kietąsias pastiles per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; sumažėjęs plazmos cholinesterazės kiekis; burnoje ar gerklėje yra žaizdų ar opų; jaunesni kaip 6 m. vaikai. **Specialūs įspėjimai:** jeigu sergate sunkia infekcine liga, pasireiškiančia aukšta temperatūra, galvos skausmu, vėmimu, būtina gydytojo konsultacija, ypač jei savijauta nepagerėja per 3 dienas. Jei yra burnos gleivinės epitelio defektų ar gleivinė lupasi, šio vaisto vartoti nereikėtų. Benzokainas gali sukelti metemoglobinemiją (pasireiškia odos, lūpų ir nagų guolių blyškumu, pilkumu ar mėlynumu, galvos skausmu, svajuliu, dusuliu, nuovargiu ir dažnu širdies plakimu). Kietosios pastilės gali sukelti užspringimo riziką. Šio vaisto reikia vartoti atsargiai, jeigu turite aspiracijos ir rijimo problemų. Vengti valgyti ar gerti iškart po pastilės vartojimo. „Hexoraletten N“ sudėtyje yra aspartamo ir izomalto. Reklamos teksto parengimo data 2025-08. LT-HXA-2025-215192

4⁹⁹ €**ALMAGEL A, geriamoji suspensija, 170 ml****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

5 ml geriamosios suspensijos yra 340 mg aluminio hidroksido (atitinka 218 mg aluminio oksido), 109 mg magnio hidroksido (atitinka 75 mg magnio oksido) ir 109 mg benzokaino. **Terapinės indikacijos.** Virškinimo trakto skrandžio rūgšties perteklių, tokiu kaip rėmuo, rūgšties sukelti skrandžio negalavimai, skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, simptominių gydymas 14 m. arba vyresniems paaugliams ir suaugusiems žmonėms. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems, atsivėligiant į ligos sunkumą, 3–4 kartus per dieną (30 min. prieš valgį ir vakare prieš miegą) gerti po 1–3 pilnus dozavimo šaukštelių (1 šaukštelis yra 5 ml). Jei yra dvylikapirštės žarnos opa ir kai kurių formų skrandžio opa (prievartio opa), „Almagel A“ galima gerti tarp valgių. Prieš vaistų, dirginančių virškinimo traktą, vartojimą profilaktikai reikia išgerti 1–2 pilnus dozavimo šaukštelių „Almagel A“. Vaistinio preparato rekomenduojama vartoti ne ilgiau kaip 12 parų. Jei inkstų funkcija sutrikusi, atsivėligiant į sutrikimo laipsnį, suspensijos reikėtų gerti rečiau arba mažesnę dozę. Prieš vartojimą buteliuką reikia stipriai pakratyti. Preparato skiesti nerekomenduojama. Išgėrus suspensijos, 30 min. negalima gerti skysčių. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosios arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Fruktozės netoleravimas (nes sudėtyje yra sorbitolio). Hipofosfatemija. Sunkus inkstų funkcijos nepakankamumas (kreatinino klirensas yra mažesnis kaip 30 ml/min.). Alzheimerio liga. Pacientas jaunesnis nei 14 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Almagel A“ nerekomenduojama vartoti, jei yra nuolatinis vidurių užkietėjimas, ūminis apendicito simptomas, metabolinė alkalozė, kepenų cirozė, sunkus stažinis širdies nepakankamumas, nėštumo toksikozė, opinis kolitas, divertikuliozė, kolostomija ar ileostomija, inkstų funkcijos sutrikimas, lėtinis viduriavimas. Vaistas gali sunkinti hemorojus sukeltus negalavimus. Pagyvenusiems pacientams gali pasunkėti kaulų ir sąnarių ligos bei Alzheimerio liga. Vaistinio preparato vartoti ilgiau negu 2 savaites galima tik prižiūrint gydytoją. Pacientai yra parahidroksibenzoato darinii, kurie gali sukelti alerginių reakcijų, įskaitant uždegstas alergines reakcijas. Sudėtyje yra etanolio, dėl kurio pacientams, sergantiems kepenų, smegenų ligomis, epilepsija ir alkoholizmu, bei nėščioms moterims ir jaunesniems nei 14 m. vaikams gali atsirasti padėčių. „Almagel A“ nepatariama vartoti kartu su alkoholiu ir maistinėmis rūgštimis (citrina, acto ir kt.), nes jos neutralizuoja vaistinio preparato vietinį anestetinį poveikį. Tarp „Almagel A“ ir kitokių vaistų vartojimo reikia daryti ne trumpesnę kaip 1–2 val. pertrauką. Dėl sudėtyje esančio benzokaino vartoti ilgiau kaip 10–12 parų nepatariama. Vaikams benzokainas gali sukelti metemoglobinemiją. **Teksto peržiūros data.** 2023-04-05. **Reklamos teksto parengimo data.** 2025-11. OT-CT-000102

4⁹⁹ €**LORATIN EXPRESS, 10 mg, 10 tablečių****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 10 mg loratadino. **Terapinės indikacijos:** simptominių alerginės slogos ir lėtinės idiopatinės dilgėlinės gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems negu 2 m. vaikams gerti po 1 tabletę per dieną. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas loratadinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nevalyti jaunesniems nei 2 m. arba sveriantiems mažiau kaip 30 kg vaikams. **Specialūs įspėjimai:** vaistą atsargiai reikia vartoti pacientams, kuriems yra sunkus kepenų veiklos sutrikimas. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Ūpės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 265 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. B52601069675. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

NUO 2⁹⁹ €**HJERTEMAGNYL**

150 mg, 30 plėvele dengtų tablečių 2⁹⁹ €
 150 mg, 90 plėvele dengtų tablečių 6⁹⁹ €
 150 mg, 100 plėvele dengtų tablečių 4⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: 1 tablete yra 75 mg arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties. **Indikacijos:** trombozės profilaktika, sergant išemine širdies liga, po miokardo infarkto, išeminio smegenų insulto ar praeinančio smegenų išemijos (kraujotakos sutrikimo) priepuolio. Vaistas slopina trombocitų (kraujo plokštelių) agregaciją (sukibimą), todėl jo vartojama krešulių, susidariusių iš sukibusių kraujo plokštelių, atsiradimo rizikai mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną, užsigeriant stikline vandens; įprastinė dozė ilgalaikeiam vartojimui yra 75 – 150 mg vieną kartą per parą. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, padidėjęs jautrumas kitiems salicilatams; jei neseniai kraujavo į virškinamąjį traktą; yra polinkis į kraujavimą, ūminė pėsinė opa, sunkūs inkstų ar kepenų funkcijos nepakankumumas, šlapime padidėję oksalatų, jeigu yra trys paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas; vaikams ir paaugliams, jaunesniems kaip 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai vartoti, jei pacientas serga bronchių astma, šienlige, nosies polipais ar kita lėtine kvėpavimo takų liga, gydytumi atsparia hipertenzija, podagra, esant gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stokai, sutrikusiai kepenų ir (ar) inkstų arba virškinimo trakto funkcijai, ilkus 10 parų iki chirurginės operacijos, senyvo amžiaus pacientams nepatartina ilgai vartoti dėl galimos kraujavimo iš virškinamojo trakto rizikos, esant vaikų ir paauglių virusinėms infekcijoms. Teksto parengimo data: 2022-04-07. LT-HJERT-2200001

NUO 3⁹⁹ €**DICLAC**

1 % gelis, 50 g 3⁹⁹ €
 5 % gelis, 50 g 6⁹⁹ €
 5 % gelis, 100 g 10⁹⁹ €
 5 % gelis, 150 g 14⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g „Diclac“ 5 % gelio yra 50 mg, 1 g „Diclac“ 1 % gelio yra 10 mg diklofenako natrio druskos. **Terapinės indikacijos:** lokaliai skausmui malšinti, uždegiminiui slopinti ir patiniminiui mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** ploną „Diclac“ 5 % gelio sluoksnį tepti 2 kartus per dieną, „Diclac“ 1 % gelį tepti 3–4 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** jautrumas diklofenakui ar pagalbinėms medžiagoms, jaunesni kaip 14 m. vaikai, 3 paskutiniai nėštumo mėnesiai. **Specialūs įspėjimai:** negalima tepti burnos, nuryti. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 265 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. B52601069663. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

STIPRUS ATKIRTIS SKAUSMUI!

-35 %

**VIZIK**

ALLERGY, 10 ml 46⁹² 11⁰³ €
 Pavargusioms ir sausoms akims, 10 ml 42⁹² 8⁴³ €
 Sudurgusioms ir paraudusioms akims, 10 ml 42⁹² 8³¹ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

Be konservantų.

ATIDARIUS BUTELIUKUS GALIMA NAUDOTI NET VIENERIUS METUS!**NUO GERKLĖS SKAUSMO IR UŽDEGIMO**NUO 6⁹⁹ €**DECATYLEN™**

0,25 mg/0,03 mg, 20 kietųjų tablečių 6⁹⁹ €
 0,25 mg/0,03 mg, 40 kietųjų tablečių 9⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 pastilėje yra 0,25 mg dekvainio chlorido, 0,03 mg cinkchokaino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** burnos ir ryklės uždegimo (gingivito, opinio ir aftinio stomatito, faringito) vietinis gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams kas 2 val. lėtai susiūpti po 1 pastilę, 4–12 m. vaikams kas 3 val. lėtai susiūpti po 1 pastilę. Kai uždegimo simptomų sumažėja, vartoti po 1 pastilę kas 4 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai ar ketvirtniams amonio dariniams (pvz., benzalkonio chloridui). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Decatylen“ sudėtyje yra sorbitolio. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurių išsiviniantį poveikį. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-01-13. DCTL-LT-00079

KAI REIKIA NE TIK MALŠINTI SIMPTOMUS, BET IR GYDYTI GERKLĖS SKAUSMĄ!NUO 1⁹⁹ €**IBUMETIN**

200 mg, 10 plėvele dengtų tablečių 1⁹⁹ €
 400 mg, 10 plėvele dengtų tablečių 2⁹⁹ €
 400 mg, 20 plėvele dengtų tablečių 3⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: 1 tablete yra 200 mg arba 400 mg ibuprofeno. **Indikacijos:** trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip galvos, dantų, raumenų, sąnarių ar sukkelto menstruacijų, malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams įprasta vienkartinė dozė yra 1-2 tabletės (s) IBUMETIN 200 mg arba 1 tabletė IBUMETIN 400 mg. Didžiausia paros dozė yra 2400 mg. Tablete reikia užsigerinti stikline vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, acetilsalicilo rūgščiai arba kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU). Ligos anksčiau sirgo acetilsalicilo rūgšties arba kitokių NVNU sukelta astma, angioneurozinė edema, dilgėlinė, rinitu ar kitokia padidėjusio jautrumo reakcija. Aktyvi arba buvusi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, opinis kolitas, kraujavimas iš virškinimo trakto ar kitoks kraujavimas, sunkūs kepenų, širdies, inkstų funkcijos nepakankumumas, hemoraginė diatezė, paskutinių 3 nėštumo mėnesių ar žindymo laikotarpis. Vaikams ir paaugliams iki 12 m. vartoti negalima. **Specialūs įspėjimai:** specialų atsargumo priemonių reikia, jei inkstų, kepenų arba širdies funkcija yra sutrikusi, yra buvę virškinimo trakto pažeidimų, sutrikęs kraujo krešėjimas arba vartojami antikoagulantai, jei vartojama kitų NVNU ar vaistinių preparatų, galinčių padidinti skrandžio opos susidarymo arba kraujavimo pavojų, diuretikų ar nefrotoksinių poveikį turinčių vaistinių preparatų, sergamu cukriniu diabetu, raudonąja vilkige ar kitomis kolagenozėmis, Krono liga, opiniu kolitu, hipertenzija, periferinių arterijų liga, galvos smegenų kraujagyslių liga, astma, šienlige, yra nosies polipų ar lėtinii infekcinių kvėpavimo takų ligų, senyviams žmonėms. Prasidėjus kraujavimui, atsiradus opų ar odos reakcijų, vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir kuo skubiau kreiptis į gydytoją. Negalima vartoti, jei nustatytas paveldimas sutrikimas – lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pirmuosius 6 nėštumo mėnesius vartoti negalima, nebent tai neabejotinai būtina ir taip pataria gydytojas. Teksto parengimo data: 2023-03-01.

NUO SLOGOSNUO 4⁹⁹ €**XYMELIN**

1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 4⁹⁹ €
 MENTHOL, 1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 5⁴⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Sudėtis: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. **Indikacijos:** susirusęs peršalimo ligomis, paburkus nosies gleivinei arba pasireiškus nosies ančių uždegimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 10 metų paaugliams (XYMELIN MENTHOL atveju – vyresniems kaip 12 metų paaugliams) 1 įpuskimas į kiekvieną nosies landą 2-3 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, uždarą kampo glaukoma, sausasis nosies gleivinės uždegimas, atrofinsis rinitas (XYMELIN MENTHOL atveju), jei hipofizės ar smegenų operacija atlikta pro nosį arba burną; XYMELIN MENTHOL: jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai:** Vartoti atsargiai, jei yra antinksinių navikų (feochromocitoma), sustiprėjusi skydlaukės veikla, sergate cukriniu diabetu ar sutrikęs šlapinimasis dėl padidėjusios prostatos. Sergant sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis ar ligomis, kurių metu susiaurėja kraujagyslės, vartoti tik su gydytojo leidimu. Ilgiau kaip 7 paras šio vaisto vartoti draudžiama. Dažnai ir ilgai vartojant vaisto gali atsirasti nosies gleivinės paburkimas, susipineli jo slopinimas ir atsirasti nosies užgulimas. Gali sukelti miego sutrikimų, galvos svaigimą, tremorą, širdies ritmo sutrikimą, aukštą kraujospūdį. XYMELIN nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 10 metų vaikams. XYMELIN MENTHOL: Pastarbi su gydytoju arba vaistininku, jei vartojate arba per paskutines dvi savaites vartojote vaistų nuo depresijos, vadinamų monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI). Reklamos teksto parengimo data: 28.03.2024 LT-XYME-2200004

NUO 4⁹⁹ €



ACC
100 mg milteliai geriamajam tirpalui, 20 paketėlių 4⁹⁹ €
20 mg/ml, geriamasis tirpalas, 100 ml 7⁴⁹ €
200 mg, 20 šnypščiujų tablečių 5⁴⁹ €
200 mg milteliai geriamajam tirpalui, 20 paketėlių 5⁴⁹ €
LONG, 600 mg, 6 šnypščiujų tablečių 4⁹⁹ €
LONG, 600 mg, 10 šnypščiujų tablečių 7⁴⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: ACC 100 mg milteliai geriamajam tirpalui, ACC 200 mg/ml geriamasis tirpalas, ACC 200 mg šnypščiujų tablečių, ACC 600 mg šnypščiujų tablečių, aceticysteinas. **Terapinės indikacijos:** gleivių skystinimas sergant ūminėmis ar lėtinėmis bronchių bei plaučių ligomis, kurių metu būna sutrikusi gleivių gamyba bei šalinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** 2-5 m. vaikams – 100 mg, 2 kartus per dieną; 6-14 m. vaikams – 200 mg, 2 kartus per dieną; vyresniems kaip 14 m. paaugliams – 600 mg aceticisteino. Vartoti per burną. **Kontraindikacijos:** jaunesni nei 2 m. vaikai, „ACC long“ 600 mg šnypščiujų tablečių netinka jaunesniems nei 14 m. vaikams; padidėjęs jautrumas aceticisteinui arba pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** bronchinė astma, skrandžio ar žarnų opa, padidėjęs jautrumas histaminui. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-I, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. B52601069360. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

„ACC“, PASIRŪPINSIME JŪSŲ KOSULIU.

NUO 8⁹⁹ €



PANANGIN

158 mg/140 mg, 60 plėvele dengtų tablečių, 8⁹⁹ €
316 mg/280 mg, 30 plėvele dengtų tablečių, 10⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 158 mg kalio aspartato ir 140 mg magnio aspartato arba 316 mg kalio aspartato ir 280 mg magnio aspartato. **Terapinės indikacijos:** „Panangin“ tabletes vartojamas magnio ir kalio trūkumo profilaktikai tuo atveju, jei šių jonų pasisavinama per mažai arba pernelyg daug netenkama, pvz., ilgai vartojant diuretikų. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Panangin 158 mg/140 mg“: paprastai skiriama po 2-3 tabletes 3 kartus per parą. „Panangin 316 mg/280 mg“: paprastai skiriama po 1 tabletę 3 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, ūminis ir lėtinis inkstų nepakankamumas, Addison liga, hiperkalemija, kalį sulaukiančių diuretikų vartojimas, atriiventrikulinė III laipsnio blokada, kardiogeninis šokas (kraujospūdis mažesnis negu 90 mm Hg). **Specialūs įspėjimai:** pacientams, sergantiems ligomis, dėl kurių kraujyje padidėja kalio kiekis, vaistinio preparato būtina vartoti atsargiai ir reguliariai kontroliuoti kalio kiekį kraujyje. **Rinkodaros teisės turėtojas:** „Gedeon Richter Plc“, Vengrija. **Atstovas Lietuvoje:** „Gedeon Richter“ atstovybė, Maironio g. 25-3, LT-01125 Vilnius, tel. +370 5 268 5392. **Texto peržiūros data** 2023-05-03 („Panangin 158 mg/140 mg“); 2022-07-07 („Panangin 316 mg/280 mg“). **Reklaminio teksto paruošimo data** 2025-05-12.

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



SMECTAGO®

paruošta vartoti suspensija, 12 paketėlių 14⁹⁷ €

MEDICINIS PRIEMONĖ

SmectaGo® paruošta vartojimui geriamoji diosmektito suspensija paketėliuose. Suaugusiųjų ir vyresnių kaip 8 metų vaikų ūminiam viduriavimui gydyti, ne ilgiau kaip 3 dienas. Jei viduriavimas tęsiasi ilgiau kaip 3 dienas, pasikonsultuoti su gydytoju. Suaugusiųjų lėtiniam viduriavimui arba pilvo skausmui gydyti, ne ilgiau kaip 2 savaites nesikreipiant medicininės pagalbos. **Praneškite apie šalutinį poveikį** gamintojo vietiniam atstovui „Mayoly Baltics“ UAB, el. paštu: vigilance.BAL@mayoly.com. **Texto parengimo data** 2024-02-15. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026.01.02 SCGO-LT-2026-0014

1+1

Perkant vieną pakuotę, antrą pigesnę arba tokia pati – NEMOKAMAI!



„BIOFARMICIJA“ MAISTO PAPILDAI

MAISTO PAPILDAI

Išsirinkite Jums reikalingiausią: nuovargiui mažinti, energijai, sportui, imunitetui, raumenims, nervų sistemai, širdžiai, kraujospūdžiui, imunitetui, odai, stipriems nagams ir plaukams, kaulams. Sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, be stabilizatorių, be kvapiųjų medžiagų. Dauguma mineralų – citratų formos, tai organizmo lengvai pasisavinama ir gerai toleruojama forma. Magnis išgaunamas iš Negryvosios jūros.

ARČIAU GAMTOS | NATŪRALIOS KILMĖS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

NORMALIZUOJA ŽARNYNO VEIKLĄ

NUO 8⁹⁹ €



LINEX

16 kietųjų kapsulių 8⁹⁹ €
32 kietosios kapsulės 11⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje yra ne mažiau kaip 1,2 x 107 KSV liofilizuotų gyvybingų bakterijų (*Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium infantis*, *Enterococcus faecium*). **Terapinės indikacijos:** viduriavimui, pilvo pūtimui ar kitokiam virškinimo sutrikimui gydyti kaip pagalbinė priemonė. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** mažesniems kaip 2 m. vaikams gerti po 1 kapsulę 3 kartus per dieną, 2-12 m. vaikams – po 1-2 kapsules 3 kartus per dieną, o vyresniems nei 12 m. – po 2 kapsules 3 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pieno baltymams ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** specialią atsargumo priemonių reikia, jei išmatose yra kraujo ar gleivių. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-I, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. B52601069673. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

KOJŲ VENOMS

17⁹⁹ €



VELIOS, 1000 mg, 30 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 1000 mg mikronizuoto diosmio. **Terapinės indikacijos:** suaugusiųjų lėtinio veninės kraujotakos nepakankamumo simptomų gydymas, esant: apatinių galūnių venų varikozei, venų opoms, telangiektazijoms ir retikulinėms varikozėms ar venoms, sunkumui, nuovargiui, diskomfortui ar neramumui kojų pojuočių, kojų skausmui ar deginimo pojūčiui, šaltų kojų pojūčiui, naktiniam kojų mėšlungiui, apatinių galūnių patinimui, niežuliui, parestzijai (odos dilgčiojimui, bėdymui ar niežėjimui), odos eritemai ar cianozėi. Suaugusiųjų paūmėjusio hemorojaus simptomų gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** lėtinio venų nepakankamumo simptomais gydymas: 1 tabletė per parą valgio metu, vartoti bent kelias savaites. Ūminio hemorojaus simptomais gydymas: pirmąsias 4 dienas gerti 3 tabletes per parą, 3 kitas dienas – po 2 tabletes per parą, gydymas turi būti trumpalaikis. Vartoti per burną. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija diosminui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** paūmėjus hemorojaus simptomams, reikia prisiminti, kad „Velios“ veikia tik simptomus ir turi būti vartojamas trumpai. Jei simptomai nepaieina, reikia atlikti tiesiosios žarnos tyrimą ir parinkti tinkamą gydymą. „Velios“ nėra veiksmingas gydant su staziniu širdies nepakankamumu susijusią edemą. „Velios“ plėvele dengtų tablečių turi nevartoti pacientai, kuriems yra širdies nepakankamumas. Kai sutrikusi kojų veninė kraujotaka, „Velios“ gydymą poveikį gali sustiprinti saulės bei ilgalaikio stovėjimo vengimas, tinkamo kėdės svorio palaikymas, specialių kojinių nešiojimas. Kai apatinės kojų dalys patinusios dėl širdies, inkstų arba kepenų ligos, šis vaistas nepadeda. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „Velios“ sudėtyje yra saulėlydžio geltonojo dažalo (E110), kuris gali sukelti alerginių reakcijų. **Reklamos teksto parengimo data** 2024-11-18.

PAJUSK KOJŲ LENGVUMĄ.

-35 %



STARAZOLIN

MEDICINOS PRIEMONĖS

Drekinamojo, raminamojo ir apsauginio poveikio akių lašai.

„Starazolin sausoms ir sudirgusioms akims“ (be konservantų) – akių lašai, skirti padėti sumažinti simptomus, esant lengvam ar vidutinio sunkumo sausų akių sindromui ir (arba) sudirgintam akių paviršiui. Jie greitai palengvina nemalonius pojūčius, tokius kaip sausumas, smilgio pojūtis, niežėjimas, ašarojimas ar akių nuovargis, kuriuos sukelia darbas kompiuteriu, vėjas, saulė ar kontaktinių lęšių nešiojimas. „Starazolin Hydroforte“ (be konservantų) – intensyviai drekinantis akių lašai, skirti vartoti esant sunkiam sausų akių sindromui, kai jaučiamas stiprus sausumas, aštrus dirginimas ar diskomfortas po chirurginių intervencijų, ilgai dirbant kompiuteriu ar esant sausam orui. „Starazolin Lipid Multi Balance“ (be konservantų) – drekinamieji akių lašai, skirti visų tipų sausų akių simptomams palengvinti. Jie atkuria ir stabilizuoja lipidinį ir kitus ašarų plėvelės sluoksnius, optimaliai drėkina akies paviršių. Ypač tinka, kai yra ryšius akių traškanėjimas, voku sulipimas. „Starazolin BlueLight Protect“ (be konservantų) – akių lašai, drekinantys ir saugantys akis nuo UV spindulių ir mėlynosios ekranų šviesos poveikio. Tinka daug laiko praleidžiant prie ekrano arba lauke. „Starazolin Lipid Multi Balance“, „Starazolin HydroBalance PPH“ ir „Starazolin BlueLight Protect“ gali vartoti žmonės, naudojančius visų tipų kontaktinius lęšius. Prieš vartojant „Starazolin Hydroforte“ reikia išsiimti kontaktinius lęšius. Įprasta dozė – 1–2 lašai 3 kartus per parą į kiekvienos akies junginę maišėlį.

*Akių lašai geltona etikete pažymėtos priemonės

HEPATITUI, KEPENŲ CIROZEI IR TOKSINIAMI KEPENŲ PAŽEIDIMUI PAPILDOMAI GYDYTI

7⁹⁹ €

CARSIL, 110 mg, 30 kietųjų kapsulių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: veiklioji medžiaga – silimarinas. 1 kietojoje kapsulėje yra 200–275 mg margainių vaisių (*Silybum marianum* (L.) Gaertn., *fructus*) rafinuoto ir standartizuoto sausio ekstrakto (35–50:1), atitinkančio 110 mg silimarino, išreikšto silibinino. Ekstrakcijos tirpiklis – 98 % (V/V) metanolis. **Indikacijos:** papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms, sergantiems lengvu arba vidutiniu sunkumo kepenų liga, rekomenduojama vartoti po 1 kietąją kapsulę 2–3 kartus per parą, gydymo kurso trukmė turėtų būti ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai. Kapsulių nekrantyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. **Kontraindikacijos:** preparato „Carsil“ vartoti negalima, jeigu yra alergija silimarinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, taip pat astriai ar graižtėdžiui (*Asteraceae* / *Compositae*) šeimos augalams. **Specialūs įspėjimai:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Carsil“. Jeigu sergate diabetu ar yra sumažėjusi gliukozės koncentracija kraujyje, vartojant „Carsil“ gali sumažėti gliukozės koncentracija kraujyje. Vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems nei 18 metų paaugliams, nes duomenų apie šio preparato saugumą ir veiksmingumą nepakanka. **Kitų vaistų vartojimas:** duomenų apie „Carsil“ sąveiką su kitais preparatais nėra. „Carsil“ vartojimas su maistu ir gėrimais: duomenų nėra. **Neštumas ir žindymo laikotarpis:** jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Klinikinių duomenų apie silimarino vartojimą neštumo metu nėra, taip pat nežinoma, ar silimarino patenka į motinos pieną.

KAD JŪSŲ KEPENYS BŪTŲ SVEIKOS!

NUO 5⁹⁹ €

DUPHALAC

FRUIT, 667 mg/ml, geriamasis tirpalas, 500 ml 11⁹⁹ €

FRUIT, 667 mg/ml, geriamasis tirpalas, 20 x 15 ml 9⁹⁹ €

667 mg/ml, geriamasis tirpalas, 200 ml / 500 ml / 1000 ml 5⁹⁹ / 11⁹⁹ / 19⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 ml geriamojo tirpalo yra 667 mg laktuliozės (skystosios laktuliozės 667 g/l pavidalu). **Terapinės indikacijos.** „Duphalac“ ir „Duphalac Fruit“ vartojami vidurių užkietėjimui (reti žarnų judesiai, kietos ir sausos išmatos) gydyti, pvz., sergant hemoroidais, po storosios žarnos ar išangės operacijos. „Duphalac“ vartojamas kepenų encefalopatijai (kepenų liga, sukelianti sumišimą, tremorą, sumažėjusį sąmoningumo lygį, įskaitant komą) gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Vartoti per burną. „Duphalac“ ir „Duphalac Fruit“ geriamuosius tirpalus galima vartoti truputį atskiestus ar neatskiestus. 1 dozė reikia nuryti visą iškart, ilgai nelaikant burnoje. 1 kartą per parą vartojamą dozė reikia išgerti tuo pačiu dienos metu, pvz., per pusryčius. Vartojant „Duphalac“ ir „Duphalac Fruit“, tiekiamus buteliukuose, gali būti naudojama matavimo taurėlė. Suaugusiems žmonėms ir paaugliams pradinė paros dozė yra 15–45 ml, palaikomoji paros dozė – 15–30 ml. 7–14 m. vaikams pradinė paros dozė – 15 ml, palaikomoji paros dozė – 10–15 ml. 1–6 m. vaikams pradinė paros dozė – 5–10 ml, palaikomoji paros dozė – 5–10 ml. Kodikiams iki 1 m. pradinė paros dozė – iki 5 ml, palaikomoji paros dozė – iki 5 ml. Nenurodžius gydytoju ir atidžiai neprižiūrint, vaikams (iki 14 m. amžiaus) „Duphalac“ ir „Duphalac Fruit“ vartoti negalima. „Duphalac“ dozavimas, esant kepenų encefalopatijai: suaugusiems pradinė dozė yra 30–45 ml geriamojo tirpalo 3–4 kartus per parą. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliąjai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Galaktozemija. Virškinimo trakto nepažeidimas, virškinimo trakto prakiurimas ar prakiurimo rizika, uždegiminė žarnyno liga. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti „Duphalac“ ar „Duphalac Fruit“, jei Jums skauda pilvą dėl nepaaiškinamų priežasčių, jei negalite suvirškinti pieno cukraus (laktozės), jei sergate cukriniu diabetu. Pasitarkite su gydytoju prieš pradėdami vartoti „Duphalac Fruit“, jei Jums yra virškinimo trakto ir širdies sindromas arba Roemheldio sindromas. Kai vartojama daug didesnė dozė kepenų encefalopatijai gydyti, būtina atsisveikinti 1 tui, kad pacientas serga diabetu. Išlaikyti laukiant nepriklausomai dozių ir netikimai vartojant vaistą, gali pasireikšti viduriavimas ir elektrolitų pusiausvyros sutrikimai. Reikia atsisveikinti 1 tui, kad gydymo metu gali sutrikti tuštinimo refleksas. „Duphalac“ ir „Duphalac Fruit“ sudėtyje yra elektrolitų, fruktozės, fruktozės, „Duphalac“ sudėtyje yra sulfitų. „Duphalac“ vartoti negalima, jei yra: galaktazės arba fruktozės netoleravimas, visiškas laktazės trūkumas, gliukozės-galaktozės malabsorbcija. „Duphalac Fruit“ vartoti negalima, jei yra: galaktazės arba fruktozės netoleravimas, Lapp laktozės trūkumas, gliukozės-galaktozės malabsorbcija. Pacientai, netoleruojantys laktozės, laktuliozės turi vartoti atsargiai. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-09-23.

NUO 3⁹⁹ €

BRONTEX

15 mg/5 ml, sirupas, 100 ml 4⁹⁹ €

30 mg, 20 tablečių 3⁹⁹ €

60 mg šnypščiosios tabletės, 10 tablečių 4⁹⁹ €

7,5 mg/ml, geriamieji lašai, tirpalas, 100 ml 5⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 5 ml sirupo yra 15 mg, 1 tabletė yra 30 mg, 1 ml tirpalo (14-oje lašų) yra 7,5 mg, 1 šnypščiojoje tabletėje yra 60 mg ambrosolio hidroklorido. **Terapinės indikacijos:** kvėpavimo takų sekreto skystinimas pacientams, sergantiems ūmine arba lėtine bronchių ar plaučių liga, kurios metu sutrinka sekreto išsiskyrimas ir šalinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** 2–5 m. vaikams – 3 kartus per parą po 7,5 mg ambrosolio (1 ml lašų arba 2,5 ml sirupo); 6–12 m. vaikams – 2–3 kartus per parą po 15 mg (2 ml lašų arba 5 ml sirupo, arba po ½ tabletės); suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams – 2–3 kartus per parą po 30 mg (4 ml lašų arba 10 ml sirupo, 1 tabletė arba ½ šnypščiosios tabletės) arba inhaliuoti lašus 1–2 kartus per parą po 15–22,5 mg (po 2–3 ml lašų). Sergantiems sunkiu inkstų veiklos nepakankumu, dozė mažinti ir (arba) vartoti rečiau. Ambrosolio nepatariama vartoti ilgiau negu 4–5 paras. Jei simptomai negereja arba po 5 parų pablogėja, reikalinga gydytojo konsultacija. Šnypščiosias tabletes reikia ištrinti stiklinėje vandens. **Kontraindikacijos:** „Bronlex“ (visų formų) negalima vartoti jaunesniems kaip 2 m. vaikams, tablečių – jaunesniems kaip 6 m. vaikams, šnypščiųjų tablečių – jaunesniems kaip 12 m. vaikams. „Bronlex“ negalima vartoti, jei padidėjęs jautrumas ambrosoliui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** vartoti atsargiai, jei sutrikusi bronchių motorika ir padidėjusi gleivių sekrecija, sutrikusi inkstų veikla, sergant sunkia kepenų liga, buvus pepsinei opai, nustatius fruktozės netoleravimą, sergantiems cukriniu diabetu (vartojant sirupą). Pasireiškus odos išbėrimui (kartais susijusiam su pūslelėmis ar gleivinės pažeidimais), reikia nedelsiant nutraukti gydymą. „Bronlex“ tablečių (dėl sudėtyje esančios laktozės) ir šnypščiųjų tablečių (dėl sudėtyje esančių laktozės ir maltodekstrino) negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktazės malabsorbcija. „Bronlex“, 60 mg, šnypščiųjų tablečių sudėtyje esantis benzilo alkoholis gali sukelti alerginių reakcijų. Vartoti atsargiai nėščioms moterims ir žindymėms. Dėl sudėtyje esančio sorbitolio šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas įgimtas fruktozės netoleravimas. **Tekstų peržiūros data:** „Bronlex“, 15 mg/5 ml, sirupas – 2024-07-22; „Bronlex“, 30 mg, tabletės, ir „Bronlex“, 7,5 mg/ml, geriamieji lašai, tirpalas – 2021-08-02; „Bronlex“, 60 mg, šnypščiosios tabletės – 2022-10-29. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-07. BRO-LT-00061

NUGAROS, ŠŲNARIŲ SKAUSMAMS IR RADIKULITUI GYDYTI

4⁹⁹ €

KAPSİKAM®, vaistinis šildomasis tepalas, 50 g

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo yra 50 mg dimetilsulfoksido, 30 mg racemino kamparo, 30 mg terpentino eterinio aliejaus, 20 mg benzilnikotinato, 2 mg nonivamido. **Terapinės indikacijos:** vietinis raumenų ir sąnarių skausmo malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** ant skaudamos vietos, naudojant aplikatorių, užtepama 1–3 g tepalo 2–3 kartus per parą, atsisveikinti į skausmo intensyvumą. Norint ilgiau išlaikyti šildantį tepalo poveikį, ant skaudamos vietos reikia uždėti tvarstį. Didžiausia vienkartinė dozė – 3 g. Didžiausia paros dozė – 9 g. Po kiekvienos procedūros reikia nusiplausti rankas šaltu vandeniu su muilu. Vartoti ant odos. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veiklosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Odos opos, žaizdos bei ligos, kai yra pažeistas odos paviršius. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Nerekomenduojama naudoti karštą procedūrą (pirties, vonios ir kt.) prieš ar iš karto po Kapsikam vartojimo. Kapsikam tepalo negalima tepti ant pažeistos odos, atvinių žaizdų, egzemos pažeistų vietų. **Vietinis rinkodaros teisės turėtojas atstovs:** Grindeks Kalceks Lietuva UAB, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius. **Reklamos teksto parengimo data** 2026-03-12.

MANO JĖGA JUDĖJIME!

PAGALBA NUO RĖMENIS

4⁹⁹ €

NEXMEZOL

20 mg, 14 skrandyje neiuri tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: vienoje tabletėje yra 20 mg ezomeprazolo. **Terapinės indikacijos:** vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refliksio simptomų gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti po 1 tabletę per parą bet kuriuo paros laiku, valgio metu arba nevalgius. Tablečių nekrantyti ir netraiškinti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ezomeprazolui (taip pat pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, omeprazolui) ar pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** sudėtyje yra sacharozės. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Ufės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El. paštas: info.lituanija@sandoz.com. 852601079720. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026 01 07.

PERŠALIMO IR GRIPO SIMPTOMAMS LENGVINTI

NUO 5⁹⁹ €



GRIPEX

325/30/10 mg, 12 plėvele dengtų tablečių 5⁹⁹ €
325/30/10 mg, 24 plėvele dengtos tabletės 8⁹⁹ €
500/30/15 mg, 10 plėvele dengtų tablečių 6⁹⁹ €
500/30/15 mg, 20 plėvele dengtų tablečių 9⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tableteje „Gripex 500/30/15 mg“ yra 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido, 15 mg dekstrometorano hidrochlorido. 1 tableteje „Gripex 325/30/10 mg“ yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido, 10 mg dekstrometorano hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Gripex 500/30/15 mg“ suaugusiems po 1–2 tabletes 3–4 kartus per parą. Neviršyti vienkartinės 2 tablečių dozės. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. **Kontraindikacijos:** negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šių vaistų sudedamajai medžiagai; sunkūs inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, smarkiai padidėjęs kraujospūdis; chroninis alkoholizmas. Negalima vartoti kartu su monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI) arba anksčiau negu 2 savaites baigus juos vartoti. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** esant sutrikusiai kepenų funkcijai, sergant alkoholizmu, sutrikus mitybai yra didesnis kepenų toksinio pažeidimo pavojus. Gydančias šias vaistus, nepartartina vartoti alkoholio. Jeigu per 3 dienas jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2025-03-31.

„GRIPEX“. VEIKIUI!

NUO 6⁹⁹ €



GRIPEX THERMAL

1000/100/12,2 mg, milteliai geramajam tirpalui, 8 paketėliai 7⁹⁹ €
650/50/10 mg, milteliai geramajam tirpalui, 8 paketėliai 6⁹⁹ €
300/20/5 mg, milteliai geramajam tirpalui 12 paketėlių 8⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: (1 paketėlyje): „Gripex Thermal 300/20/5 mg“: 300 mg paracetamolio, 20 mg askorbo rūgšties, 5 mg fenilefrino hidrochlorido; „Gripex Thermal 650/50/10 mg“: 650 mg paracetamolio, 50 mg askorbo rūgšties, 10 mg fenilefrino hidrochlorido; „Gripex Thermal 1000/100/12,2 mg“: 1000 mg paracetamolio, 100 mg askorbo rūgšties, 12,2 mg fenilefrino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** peršalimo ar gripo simptomų lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. „Gripex Thermal 300/20/5 mg“: 6–12 m. vaikams: 1 paketėlis kas 4–6 val.; suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams: 1–2 paketėliai kas 4–6 val. „Gripex Thermal 650/50/10 mg“ arba „Gripex Thermal 1000/100/12,2 mg“: suaugusiems ir vyresni nei 12 m. vaikai: po 1 paketėlį kas 4–6 val. Nepasitarsu su gydytoju, nevertokite ilgiau nei 7 d. Nevertokite didesnę nei rekomenduojama dozę. Pasakykite gydytojui, jei jūsų inkstų ar kepenų veikla sutrikusi ar nuolat vartojate alkoholi. **Kontraindikacijos:** alergija veikliosioms arba pagalbinėms medžiagoms, taip pat vaistams, kurių sudėtyje yra simpatomimetinių aminių; širdies ligos, padidėjęs kraujospūdis; gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės arba metemoglobino reduktazės stoka; sunkūs kepenų ar inkstų nepakankamumas; tirotoksikozė; šlapimo užšalimas arba feochromocitoma; židovudino, MAO inhibitorių vartojimas; nėštumas ar kūdikio žindymas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju, jei sergate kepenų arba inkstų nepakankamumu, bronchine astma, prostatos hiperplazija, Reino sindromu (rankų ar kojų pirštų, ausies kraštų ir nosies galiuko išblyškimas, dažnai sukeltas šalčio arba emocinio streso), širdies liga, padidėjusiu kraujospūdžiu, cukriniu diabetu. Reklamos teksto parengimo data 2025-09-26.

„GRIPEX THERMAL“. VEIKIUI!

NUO REFLIUKSO

-30%



NEOBIANACID

14 tablečių 12⁹⁹ 9⁰⁰ €
45 tablečių 26²³ 18⁷¹ €
PEDIATRIC, granulės, 36 paketėliai 24⁹² 17⁴⁸ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

- 100 % natūralus
- Tinka vartoti nėštumo, žindymo metu
- Malšina rėmenį, skausmą, gastrozofaginį refliuksą
- Malšina funkcinės dispepsijos simptomus
- Saugo skrandžio ir stemplės gleivinę
- Gali būti vartojamas profilaktiškai, kai sudirginama skrandžio gleivinė

4⁹⁹ €



SEPTANAZAL

SUAUGUSIESIEMS, 1 mg/50 mg/ml nosies purškalo (tirpalas), 10 ml
VIAKAMS, 0,5 mg/50 mg/ml nosies purškalo (tirpalas), 10 ml

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Ksilometazolino hidrochloridas / Dekspantenolis „Septanazal“ nuo 6 metų amžiaus vartojamas: - nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) bei gleivinės pažeidimo gimimui skatinti; - nealerginiam nosies gleivinės uždegimui (vazomotoriniam rinitui) lengvinti; - kvėpavimo pro nosį pasunkėjimui po nosies operacijos šalinti. Rekomenduojama dozė 6 metų bei vyresniems vaikams yra po vieną įpurškimą į kiekvieną šnervę iki 3 kartų per parą. **Kontraindikacijos:** suaugusiems vartoti negalima, jeigu yra alergija ksilometazolino hidrochloridui, dekspantenoliui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu Jums arba Jūsų vaikui yra sausasis nosies gleivinės uždegimas ir atsiranda šauš (sausasis rinitas), jeigu Jums arba Jūsų vaikui buvo chirurginiu būdu pašalinta posneginė liauka arba buvo atlikta kita operacija, susijusi su smegenų dangalais. **Specialūs įspėjimai:** „Septanazal“ galima vartoti tik atidžiai įvertinus naudą ir naudos santykį, jeigu: pacientas yra gydomas monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI) ar kitokiais kraujospūdį didinančiais vaistais; pacientas yra padidėjęs akispūdis (ypač jei sergama uždarą kampo glaukoma), pacientas serga sunkia širdies ir kraujagyslių liga, yra feochromocitoma, yra metabolinių sutrikimų, yra porfirija, yra prostatos hiperplazija. **Teksto peržiūros data:** 2023.11.20.

ATKĖMSA UŽGULUSIĄ NOSĮ IR ŠVELNIAI GYDO IŠSAUSĘJUSIĄ NOSIES GLEIVINĘ.

8⁹⁹ €



SEPTABENE

1,5 mg/5 mg/1 ml burnos gleivinės purškalo, 30 ml

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Septabene“ dezinfekuoja burną ir ryklę bei lengvina ryklės uždegimo požymius - skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. „Septabene“ vartojamas uždegimui ir skausmui mažinti bei antisepsiniam poveikiui sukelti: - jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas; - sergant dantenų uždegimu (gingivitu), ryklės uždegimu (faringitu); - prieš dantų traukimą ir po jo. **Dozavimas suaugusiems:** Vienkartinė dozė yra suvartojama purkštuvo galvute paspaudus vieną arba du kartus. Tokia dozė kartotinali galima vartoti kas 2 valandas 3-5 kartus per parą. **6-12 metų vaikams:** Vienkartinė dozė yra suvartojama purkštuvo galvute paspaudus vieną kartą. Tokia dozė kartotinali galima vartoti kas 2 valandas 3-5 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 metų vaikas. „Septabene“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydymo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. „Septabene“ negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Vaistinio preparato negalima įkvėpti. **Teksto peržiūros data:** 2023.08.09.

TAVO GERKLĖ – TAVO JĖGA!

6⁹⁹ €



FURASOL, 100/900 mg, 5 paketėliai

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Kiekviename miltelių paketėlyje yra 100 mg furagino kalio druskos ir 900 mg natrio chlorido. **Terapinės indikacijos.** Lokalus infekcijos sukeltos burnos ertmės ir ryklės uždegimo gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 4 m. vaikams. Tirpalą reikia ruošti prieš pat vartojimą. Paketėlyje esančių miltelių reikia ištirpinti stiklinėje karšto virinto vandens ir šiltu tirpalu 2–3 kartus per dieną skalauti burną arba gargaliuoti. Tirpalą reikia suvartoti iš karto. Jo laikyti negalima. **Vartojimo būdas.** Sergant burnos ertmės ligomis skalauti, o sergant ryklės ligomis - gargaliuoti apie 20–30 sekundžių, po to tirpalą išspjauti. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas furaginui, nitrofurano grupės junginiams. Pacientas yra jaunesnis negu 4 m. vaikas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Tirpalą burnai ir ryklės skalauti reikia ruošti prieš pat vartojimą. Nesuvalytas vaisto likučius reikia išpilti. **Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika.** Jokios klinikai reikšmingos sąveikos nepastebėta. Naujaisiu pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje <http://www.vvkt.lt>. Prashome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaista vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujama@vvkt.lt. Arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-10-10. FUR10102025LT

SKALAUK GERKLĘ VISU BALSU!

NUO 6⁹⁹ €**ENTEROL®**

250 mg kietosios kapsulės, 10 kapsulių 6⁹⁹ €
 250 mg kietosios kapsulės, 20 kapsulių 11⁹⁹ €
 250 mg kietosios kapsulės, 30 kapsulių 14⁹⁹ €
 250 mg milteliai geriamajai suspensijai, 10 paketėlių 7⁹⁹ €
 250 mg milteliai geriamajai suspensijai, 20 paketėlių 11⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Saccharomyces boulardii CNCM I-745.

„Enterol“ vartojamas kaip pagalbinė ūminio viduriavimo priemonė kartu su kitais vaistais nuo viduriavimo. „Enterol“ vartojamas su antibiotikų vartojimu susijusio viduriavimo profilaktikai. Vartojimo būdas: kapsules nuryti užgeriant gurkšniu vandens arba atidarytos kapsulės turinį supilti į nedidelį kiekį saldinio gėrimo ar į maistą. Mažiesiems (iki 6 m.) vaikams kapsulių negirdyti, kad vaikas neužspringtų, bet jas atidarius turinį supilti į gėrimą ar maistą. Miltelių geriamajai suspensijai pakėtelio turinį supilti į nedidelį kiekį vandens ar saldinio gėrimo, sumaišyti ir išgerti. Miltelius taip pat galima maišyti su maistu. Vaisto vartoti dar kelias paras, pasibaigus viduriavimo simptomams. Dozavimas: suaugusiems ir vyresniems nei 2 m. amžiaus vaikams rekomenduojama dozė yra 1 kapsulė arba 1 pakėtelis vartojami 1–2 kartus per parą. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Enterol“. Pacientams, kuriems įstatytas centrinės venos kateteris, pasitarkite pavienius sisteminius grybelinės infekcijos atvejų. Šis vaistas nepakeičia rehidracijos (normalaus organizmo skysčio tūrio ir sudėties palaikymo), jei jos reikia. Kietųjų kapsulių sudėtyje yra laktozės monohidrato. Miltelių geriamajai suspensijai sudėtyje yra laktozės monohidrato, fruktozės ir sorbitolio. „Enterol“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu yra alergija mielių grybeliui, ypač Saccharomyces boulardii; jeigu nusilpusi imuninė sistema ar esate gydomas liginėmis; jei esate kritinės sveikatos būklės arba Jums yra įstatytas centrinės venos kateteris; jeigu pacientas yra jaunesnis kaip 2 m. amžiaus vaikas. ID 10c0a5f4. Reklamos teksto parengimo data: 2025-12-17.

NUO RĖMENS IR PADIDĖJUSIO RŪGŠTINGUMONUO 2⁹⁹ €**ELFIMEST**

20 mg, 7 skrandyje neiros tabletes 2⁹⁹ €
 20 mg, 14 skrandyje neiuriu tablečių 4⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Kiekvienoje skrandyje neiuriu tablete yra 20 mg ezomeprazolo (atitinkančio 21,75 mg ezomeprazolo magnio druskos dihidrato). Terapinės indikacijos. „Elfimest“ skirtas suaugusių žmonių gastroezofaginio refliksų simptomams (pvz., rėmens ir skrandžio rūgšties regurgitacijos) trumpam laikui gydyti. Dozavimas. Rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 tabletė) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, tabletes gali prireikti vartoti 2–3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaites. Simptomams visiškai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Reikia nuryti visą tabletę, užgeriant puše stiklinės vandens. Tablečių negalima nei kramtyti, nei traukinti. Kitoks pasirinkimas – tabletę galima ištrinti pusėje stiklinės negazoto vandens, kitokiu skysčiu netrinkti. Kontraindikacijos. Jeigu yra alergija ezomeprazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu yra alergija bet kuriam kitam protonų siurblio inhibitoriui (pvz., pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, omeprazolui); jeigu po „Elfimest“ ar kitų panašių vaistų vartojimo kada nors pasireiškė sunkūs odos išbėrimas arba odos lupimasis, pūsles ir (arba) burnos opos; jeigu vartojate vaistinių preparatų, kuriuose yra neflinaviro (vaistas ŽIV infekcijai gydyti). Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu anksčiau sirgote skrandžio opa arba patyrėte skrandžio operaciją; jeigu 4 savaites arba ilgiau neperkultūriškai gydytės dėl refliksų ar rėmens; jeigu yra gelta (odos arba akių pageltimas) arba sunkių kepenų sutrikimų; jeigu turite sunkių inkstų veiklos sutrikimų; jeigu esate vyresnis negu 55 metų ir pasireiškė nauji arba neseniai pakito refliksų simptomai, arba jeigu kasdien Jums reikia vartoti neįprastai daug vaistų nuo virškinimo ar rėmens; jeigu Jums kada nors pasireiškė odos reakcija po gydymo vaistu, panašiu į „Elfimest“, kuriuo mažinamas skrandžio rūgštingumas; jeigu bus atliekama endoskopija arba šlapalo kvėpavimo testas, arba specialus kraujo tyrimas (dėl chromogranino A). Reikia kreiptis į gydytoją, jeigu nelekote daug kūno svorio dėl nežinomų priežasčių; rydami juntate sunkumą arba skausmą; patiriate skrandžio skausmą arba nevirškinimo požymius, pvz., pykinimą, pilnumą, vidurių lūžimą, ypač pavale; pradėjote vėmti maistu arba krauju, kuris vėmaloje gali atrodyti kaip tamsios kavos triščių; pasitūštinote juodomis išmatomis (krauju nudažytos išmatos); patiriate stiprų arba apuolėtinį viduriavimą; ezomeprazolo vartojimas siejamas su nedidele infekcinio viduriavimo padidėjimo rizika; jeigu Jums išbėrė oda, ypač sauslės aplauštos vietose, kuo skubiau pasakykite apie tai savo gydytojui, nes Jums gali tekti nutraukti gydymą „Elfimest“, taip pat nepamirškite pasakyti, jeigu Jums pasireiškia bet koks kitas šalutinis poveikis, pvz., sąnarių skausmas. Reklamos teksto peržiūros data 2025-03-03. Reklamos parengimo data 2025-07. ELF-LT-00010

GREITA IR INOVATYVI PAGALBA NUO RĖMENS!6⁹⁹ €**MAGNEROT, 500 mg, 50 tablečių****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Kiekvienoje tablete yra 500 mg magnio orotato dihidrato (atitinka 32,8 mg magnio). Terapinės indikacijos. Magnio trūkumo, jeigu jis sukelia raumenų veiklos sutrikimą (pvz., mėšlungį), šalinimas. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems žmonėms: jei nepaskirta kitaip, magnio atsargoms papildyti pirmą savaitę reikia gerti po 2 tabletes 3 kartus per parą, po to – po 2–3 tabletes per parą. Vaikų populiacijai: „magnerot“ nėra skirtas vaikams iki 18 metų. Vartoti per burną. Tablete reikia nuryti visą arba sukratyti prieš valgią ar valgant, užgeriant nedideliu kiekiu skysčio. Tablete reikia vartoti mažiausiai 6 savaites. Galima vartoti ir ilga laiką. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Inkstų funkcijos sutrikimas ir polinkis formuotis kalcio, magnio ir amonio fosfatų akmenims. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktozės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Sąveika su kitais vaistais: preparatas ir kitokia sąveika. Jei kartu vartojama geležies vaistinių preparatų, magnis gali sutrikdyti geležies absorbciją. Tokiu atveju geležies vaistinių preparatų reikia gerti ne anksčiau, kaip praėjus 2–3 val. po magnio vaistinio preparato pavartojimo (arba atvirkščiai). Taip turi būti vartojami ir traktaciniai bei natrino fluoridai. Nepageidaujamas poveikis. Didelės dozės gali sukelti viduriavimą arba išmatų suminkštėjimą. Sumažinus dozę, toks poveikis išnyksta. Pakuotė: 50 tablečių. Teksto peržiūros data: 2024-09-26. Registracijos. Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Vokietija. Reklamos teksto parengimo data 2025-09-29.

ORGANINĖ MAGNIO DRUSKA, LENGVAS PASISAVINIMAS.

IKI -50 %

**DAILEE****HIGIENOS PRIEMONĖS**

„DAILEE“ – PATIKIMAS PASIRINKIMAS ARTIMOJO SLAUGAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtais prekėmis

NUO SLOGOS4⁹⁹ €**GALATHENAL**

1 mg/50 mg/ml, nosies purškalas, 10 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido ir 50 mg deksantenolio. Terapinės indikacijos: „Galathenal“ skirtas suaugusiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) ir kaip pagalbinė priemonė odos bei gleivinės pažeidimams gydyti, nealerginės kilmės išskyros iš nosies (vazomotoriniam rinitui) mažinti ir kvėpavimui per nosį palengvinti esant nosies užgulimui po nosies operacijos; nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu ir ūminiu prienosinių ančių uždegimu (rinosinusitu). Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams – 1 purškalo tirpalo dozė į kiekvieną šnervę pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Dozavimas priklauso nuo individualaus paciento jautrumo ir klinikinio atsako. „Galathenal“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 paras, nebent gydytojas nurodė kitaip. Dėl vaikų gydymo trukmės reikia pasikonsultuoti su gydytoju. Kontraindikacijos: šio vaistinio preparato vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliosios ar pagalbinės medžiagos; jeigu yra sausasis nosies gleivinės uždegimas (rinitis sicca); po chirurginio posmegeninės liaukos pašalinimo per nosį (transfenoidinės hipofizektomijos) arba po kitų chirurginių intervencijų, pažeidžiančių smegenų dangalą; kūdikiams ir jaunesniems kaip 6 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Galathenal“, jeigu esate gydomas mononamino oksidazės (MAO) inhibitoriais; jeigu sergate sunkia širdies ar kraujagyslių sistemos liga; jeigu yra antinksčių navikas; sergate cukriniu diabetu ar yra suaktyvėjusi skydliaukės veikla; jei yra padidėjęs prostata (prostato hiperplazija). Reklamos teksto parengimo data 2025-08.

ATKĖMSA NOSĮ IR ATKURIA PAŽEISTĄ NOSIES GLEIVINĘ.12⁹⁹ €**CANIFUG CREMOLUM, 200 mg, 3 ovulės****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje ovulėje yra 200 mg klotrimazolo. Indikacijos: mieliagrybių (dažniausiai Candida albicans) sukelti makšties uždegimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: 1 „Canifug Cremolum“ ovulė (tai atitinka 200 mg klotrimazolo) įkišti kuo giliau į makštį vieną kartą per parą, vakare. Dažniausiai pakanka 3 dienų gydymo šio vaistu kursu. Prieiktus galima paskirti antrą 3 dienų trukmės gydymo kursą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Canifug Cremolum“ medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: specialiai atsargumo priemonių reikia neštumo ir žindymo laikotarpiu; jeigu vartojami dezodorantai arba intymiosios higienos priemonės; jeigu kartu yra lytinis lūpų ir gretimos srities odos infekcinė liga: šiais atvejais reikia papildomai skirti lokalių gydymą tinkamais vaistais; jeigu atsiranda tokių požymių – paraudimas, dilgčiojimas, niežėjimas, makšties išskyros, makšties uždegimas su skausmu: šie požymiai taip pat gali būti dėl to, kad ligos sukėlėjas neįėjus „Canifug Cremolum“; jeigu tuo pačiu metu vartojamas „Canifug Cremolum“ su latekso produktais (pvz., prezervatyvais, diafragmomis), dėl vaisto sudėties esančių pagalbinųjų medžiagų (ypač stearatų) šių produktų veiksmingumas gali sumažėti ir jie tampa mažiau patikimi. Vaisto sudėtyje yra cetostearilo alkoholio. Cetostearilo alkoholis gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą). Geriausia gydytis ne mėnesiniu metu ir (arba) gydymą baigti prieš mėnesinių pradžią. Gydyti mėnesinių metu galima tik esant sunkiems klinikiniams simptomams. Neštumo metu gydymą gali skirti tik gydytojas. Jeigu kartu yra lytinis lūpų ir gretimų sričių infekcija ir (arba) partneriui mediciniškai diagnozuotas varpos galvutės ir apyvarpės uždegimas, partneriui reikia papildomai vartoti lokalią gydymą tinkamais vaisto formomis. Siekiant išvengti galimos pakartotinės infekcijos, tuo pat metu reikia mediciniškai tirti ir partnerį. Ugali pasireiškus pirmą kartą arba jeigu liga pasireiškė dažniau nei 4 kartus per paskutinius 12 mėnesių vaisto galima vartoti tik gydytoju nurodžius ir jam prižiūrin. Reklamos teksto parengimo data 2024-01-15

BURNOS INFEKCIŲS LIGOMS GYDYTI

7⁹⁹ €



JOX
85/1 mg/ml burnos gleivinės, gerklų ir ryklės purškalo (tirpalas), 30 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 ml tirpalo yra 85 mg joduoto povidono ir 1 mg alantoino. **Terapinės indikacijos:** papildomas lokalus lengvų burnos ir ryklės infekcinių ligų faringito, stomatito, gingivito gydymas; papildomas bakterijų sukeltų tonzilito gydymas kartu su antibiotikais; burnos ertmės infekcijos profilaktika ligoniams, kuriems atliekamos burnos ar ryklės operacijos. „Jox“ purškalo gali vartoti suaugusieji ir vyresni kaip 8 m. vaikai. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 8 m. vaikams įprastinė dozė – purkšti 2–4 kartus per parą, bet jeigu būtina, galima vartoti ir dažniau (kas 4 val.), purkšti ne daugiau kaip 3 kartus į dieną ir kairę burnos ertmės pusę, bet ne daugiau kaip 6 kartus per parą. Pertrauka tarp atskirų įpurškimų turi būti ne mažesnė kaip 4 valandos. Vaistinio preparato negalima įkvėpti ar nuryti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; inkstų funkcijos sutrikimas; dekomensuotas širdies nepakankamumas; nėštumo ir žindymo laikotarpis; 2 sav. prieš planuojamą tyrimą arba gydymą radioaktyviuoju jodu ir 2 sav. po to; nuolat vartoti ligoniams, kuriems diagnozuotas skydliaukės funkcijos sutrikimas; nuolat vartoti ligoniams, kurie kartu vartoja ličio vaistinių preparatų; jaunesniems kaip 8 m. vaikams (dėl farmacinės formos). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Jeigu „Jox“ atsitiktinai patenka į akis, jas reikia gerai nuplauti vandeniu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, „Jox“ purškalo reikia vartoti atsargiai. Šiems pacientams preparatas gali sukelti kepenų transaminazių kiekio padidėjimą. Ligoniams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, „Jox“ vartoti draudžiama. Vaistinio preparato vartoti ilgiau kaip 7 dienas negalima. Jeigu pasireiškia jautrumas arba nuolatinis lokalus dirginimas, vaistinio preparato vartojimą reikia nutraukti. Sergant laringitu, vaistinio preparato galima vartoti tik būtinu atveju. **Reklaminio teksto parengimo data** 2024-07. OTC-LT-00080

„JOX“ – VIENINTELIS TOKS!

SKAUSMUI MALŠINTI

2⁹⁹ €



MIALDEX, 25 mg, 10 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

„mialdex“ yra vaistas skausmui malšinti, priklausantis nesteroidinių vaistų nuo uždegimo grupei (NVNU). „mialdex“ veiklioji medžiaga yra deksketoprofenas (deksketoprofeno trometamolio pavidalu). „mialdex“ vartojamas lengvo ir vidutinio stiprumo raumenų skausmui, skausmingų mėnesinių, dantų skausmui malšinti. **Vartojimas:** visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Įprastinė vaisto dozė yra pusė tabletės (12,5 mg) kas 4–6 valandas arba 1 tabletė (25 mg) kas 8 valandas, bet ne daugiau kaip 3 tabletes per parą (75 mg). **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) deksketoprofeno trometamoliui arba bet kuriai pagalbinei „mialdex“ medžiagai. Įspėjimai: jeigu sergate arba sirgote inkstų, kepenų ar širdies ligomis, širdies nepakankamumu, jeigu sergate kraujodaros sistemos ligomis; jeigu sergate sisteminė raudonoja vilkige ar mišriomis jungiamojo audinio ligomis; jeigu sergate arba sirgote virškinimo trakto ligomis pasikonsultuokite su gydytoju. **Galimas šalutinis poveikis:** šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Reklamos teksto parengimo data: 2025.09.17

5⁹⁹ €



FENKAROL, 25 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kokybė ir kokybinė sudėtis. Kiekvienoje tabletėje yra 25 mg kifenadino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos.** Simptominis alerginės slogos (su konjunktyvitu ar be jo), dermatito (egzemos, dilgėlinės) ir niežulio gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems žmonėms dozė yra 25–50 mg (1–2 tabletės) 2–4 kartus per dieną. Vaikams ir paaugliams: vyresniems negu 12 m. vaikams dozė yra 25 mg (1 tabletė) 2–3 kartus per dieną. „Fenkarol“ netinka vartoti 12 m. ir jaunesniems vaikams. **Vartojimo būdas.** Vartoti per burną. „Fenkarol“ tabletės yra geriamos iš karto po valgio. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas kifenadino hidrochloridui arba sacharozės, bulvių krakmolui, kalcio stearatui. Pirmasis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Atsargiai vaistinio preparato reikia vartoti ligoniams, sergantiems sunkiomis širdies ir kraujagyslių sistemos, virškinimo trakto, kepenų ir (arba) inkstų ligomis. Nevartoti, jeigu nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Registravimo liudijimo turėtojas ir gamintojas: JSC „Olpha“, Rupnicų 5, LV-2114 Oline, Latvija. Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje <http://www.vvkt.lt>. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-06-05. FEN03062025LT

GREITAI NUGALI ALERGIJOS SIMPTOMUS!

NUO RĖMENS

NUO 2⁹⁹ €



RANIGAST S-O-S
12 kramtomųjų tablečių 2⁹⁹ €
24 kramtomosios tabletės 4⁹⁹ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Ranigast S-O-S“ yra skirtas gastroezofaginio refliukso simptomams (rėmeniui, skrandžio skausmui, dispepsijai) malšinti.

- Veikia akimirksniu – nuo to momento, kai tik sučiulpste ar išgersite tabletę.
- Dėl ypatingos sudėties apsaugo skrandžio gleivinę ir sumažina rėmens epizodų skaičių.
- Tinka naudoti ir kaip papildoma priemonė sergantiems gastritu, peptine opa.
- Galima naudoti nėštumo ir žindymo metu, prieš tai pasitarus su gydytoju.
- Suaugusiems ir vaikams nuo 12 metų: rekomenduojama pavalgius vartoti 2 tabletes.
- Vaikams (6–12 metų): rekomenduojama pavalgius vartoti 1 tabletę.

NUO ALERGIJOS

5⁹⁹ €



TAVEGYL, 1 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje tabletėje yra 1 mg klemastino fumarato, kuris atitinka 1 mg klemastino. **Indikacijos:** „Tavegyl“ lengvina alerginę slogą (šienligę, ašarąjimą, čiaudulį, nosies varvėjimą); alerginę odos reakciją (paraudimą, spuogelius, niežėjimą, patinimą); vabzdžių įgėlimo ir įkandimo sukelia reakciją. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: iš ryto ir vakare gerti po 1 tabletę. 6–12 m. vaikams: gerti prieš pusryčius ir vakare prieš miegą po 0,5 arba 1 tabletę. 3–6 m. vaikams: gerti prieš pusryčius ir vakare prieš miegą po 0,5 tabletes. Tabletės gerti prieš valgį užsigeriant vandeniu. **Kontraindikacijos:** alergija klemastinui, kitokiems antihistamininiams vaistams ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Porfirija. Jaunesniems nei 3 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** atsargiai turi vartoti pacientai, sergantys: uždaro kampo glaukoma; stenozė sukeliančia peptine opa; dvilykapištes žarnos obstrukcija; prostatos hipertrofija, dėl kurios susilauko šlapimas, bet šlapimo pūslės karkelio obstrukcija. Reikia atsargiai skirti epilepsijai sergantiems arba praėjus traukulius patyrusiems pacientams. Sudėtyje yra laktozės. Reklamos teksto parengimo data 2024-07. 2603_SB_Tavegyl_V01_LT.

PATIKIMA PAGALBA NUO ALERGIJOS VISAI ŠEIMAI!

NUO KARŠČIAVIMO IR SKAUSMO

7⁹⁹ €



IBUPROM

40 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams, 100 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml „Ibuprom“ 40 mg/ml geriamosios suspensijos yra 40 mg ibuprofeno. **Indikacijos:** trumpalaikis silpno ir vidutinio skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. „Ibuprom“ skirtas 3 mėn. ir vyresniems vaikams ir vaikams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. 3–6 mėn. kūdikiams (> 5 kg) gerti po 1,25 ml 3 k. per parą, 6–12 mėn. kūdikiams (8–10 kg) – po 1,25 ml 3–4 k. per parą, 1–3 m. vaikams (10–15 kg) – po 2,5 ml 3 k. per parą, 3–6 m. vaikams (15–20 kg) – 3,75 ml 3 k. per parą, 6–9 m. vaikams (20–30 kg) – po 5 ml 3 k. per parą, 9–12 m. vaikams (30–40 kg) – po 7,5 ml 3 k. per parą. Nurodą vaisto dozė reikia skirti maždaug kas 6–8 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofenui, kitoms nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU) ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitų NVNU vartojimas, kraujo krešėjimo sutrikimai, paskutinis nėštumo trimestras, trombocitopenija, sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas, praėjus buvusios padidėjusio jautrumo reakcijos (astma, rinitas, angioneurozinis patinimas, dilgėlinė) vartojant kitą NVNU, įskaitant ir acetalisalicilo rūgšties darinius, esama ar buvusi pepsinė opa / hemoragija, buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu, kraujavimas į smegenis, virškinimo trakto ar kitoks kraujavimas, sisteminė raudonoji vilkigė. **Specialūs įspėjimai:** senyviems pacientams, pacientams, turintiems inkstų, kepenų, žarnyno, virškinimo trakto problemų, pacientams, kuriems anksčiau buvo virškinimo trakto opa ar infarktas, sergantiems diabetu, sisteminė raudonoja vilkigė, širdies nepakankamumu, virškinimo trakto opa, hipertenzija, bronchių astma, rūkantiems pacientams, taip pat pacientams, kuriems padidėjęs cholesterolio kiekis, yra įgimtas porfirino apykaltos sutrikimas, dehidracija, vartojantieji vaistus, galinčius padidinti opų ar kraujavimo pavojų, ibuprofeną reikia vartoti atsargiai. **Reklamos teksto parengimo data** 2024-11-29.

RENKUOSI „IBUPROM“. RENKUOSI LAISVĖ.

NUO MIGRENINIO GALVOS SKAUSMO

3⁹⁹ €

SUMATRIPTAN ACTAVIS, 50mg, 2 dengtos tabletės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tabletėje yra 50 mg sumatriptano (sumatriptano sukinato pavidalu). **Terapinės indikacijos.** Neatidėliotinas migrenos priepuolių, pasireiškiančių su aura ar be jos, gydymas suaugusiems, kuriems mediciniškai patvirtinta migrenos diagnozė ir turintiems triptanų vartojimo patirties. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Prasidėjus migrenos priepuoliui, rekomenduojama sumatriptano dozė suaugusiam žmogui yra 50 mg. Kai kuriems pacientams gali reikėti 100 mg. Nevartokite daugiau kaip 100 mg sumatriptano (2 tablečių po 50 mg) per parą (24 val.). „Sumatriptan Actavis“ negalima vartoti dažniau kaip 9 dienas per mėnesį. Pacientai, kuriems migrena mašini pririekia dažniau, turėtų kreiptis į gydytoją dėl kitokio gydymo (migrenos profilaktikos). Jeigu pirmą dozę migrenos simptomus palengvino, tačiau vėliau jie atsinaujino, 24 val. laikotarpiu tokią pačią dozę galima gerti antrą kartą, bet tarp dozių turi būti ne mažesnis nei 2 val. laiko tarpas. **Kontraindikacijos.** „Sumatriptan Actavis“ vartoti negalima, jeigu yra alergija sumatriptanui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu buvo miokardo infarktas; jeigu sergate bet kokia širdies liga; jeigu yra simptomų, galinčių rodyti, kad yra širdies liga, pvz., laikinas kritinis skausmas ar spaudimas; jeigu buvo smegenų insultas ar praeinančiųjų smegenų išemijos priepuolių (PS), maži insultai, trunkantys trumpiau negu 24 val.; jeigu yra kojų kraujotakos sutrikimas, sukeliantis į mėšlungį panašų skausmą vaikštant (periferinių kraujagyslių liga); jeigu yra reikšmingai didelis kraujospūdis arba kraujospūdis yra didelis nepaisant vaistų vartojimo; jeigu labai susilpnėjusi kepenų veikla; jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų nuo migrenos, kuriuose yra ergotamino ar jį panašių vaistų, tokių kaip melžergidžio maleatas arba bet kurių triptanų ar 5-hidroksitriptamino (5-HT) receptorių agonistų (tokių kaip almotriptanas, eletriptanas, frovatriptanas, naratriptanas, rizatriptanas ar zolmitriptanas); jeigu vartojate arba neseniai vartojote monoaminooksidazės (MAO) inhibitorių, pvz., moklobemido (vaisto nuo depresijos) ar selegilio (preparato nuo Parkinsono ligos); jeigu esate vyresnis negu 65 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Sumatriptan Actavis“ galima vartoti tik tuo atveju, jeigu nustatyta, kad galvos skausmas tikrai yra migreninis. Pavartojus „Sumatriptan Actavis“, gali pasireikšti laikinas skausmas ir spaudimas, kurie gali būti gana stiprūs ir plintantys į gerklę. Labai retais atvejais šių simptomų priežastis gali būti vaisto poveikis širdžiai. Jeigu jie neišnyksta, reikia kreiptis į gydytoją. Atsargumo priemonės reikalingos pacientams, kurie serga vidutinio laipsnio kontroliuojama hipertenzija, moterims postmenopauzės periodu ar vyresniems negu 40 metų vyrams, kuriems yra širdies ligų rizikos veiksniai, pacientams, kuriems anksčiau yra buvę traukulių, arba esant kitoms rizikos veiksniams, kurie mažina smegenų kraujotakos aktyvumą. **Specialūs įspėjimai:** sudėtyje yra sacharozės, „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-I, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El. paštas: info.lituanian@sandoz.com. BS260107917. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026-01. OFC-LT-00104

GYDO MIGRENINĮ GALVOS SKAUSMĄ

2⁹⁹ €

OMEP UNO, 20 mg, 14 skrandyje neiurių kietųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo. **Terapinės indikacijos:** vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refluksinio simptomų gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti po 1 kapsulę per parą, ryte. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas omeprazolui (taip pat pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, ezomeprazolui) ar pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** sudėtyje yra sacharozės, „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-I, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El. paštas: info.lituanian@sandoz.com. BS260107917. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026 01 07.

IKI -40 %



MICROLIFE

BP B2 BASIC, automatinis kraujospūdžio matuoklis **70⁹⁹ 46¹⁴ € -35 %**
 BP B3 COMFORT PC, automatinis kraujospūdžio matuoklis **89⁹⁹ 53⁹⁹ € -40 %**
 BP B6 CONNECT, automatinis kraujospūdžio matuoklis **99⁹⁹ 64⁹⁹ € -35 %**
 NEB 200, inhaliatorius **72³³ 47⁹⁹ € -35 %**
 NEB 400, inhaliatorius, šešiuokas **79⁹⁹ 47⁹⁹ € -40 %**
 OXY 300, pulsoksimetras **49⁹⁹ 34⁹⁹ € -30 %**
 NC 200, skaitmeninis bekontaktis termometras **47⁹⁹ 31¹⁹ € -35 %**

MEDICINOS PRIETAISAI

„MICROLIFE“ INOVATYVIOS TECHNOLOGIJOS

|VAIRIOS KILMĖS MAKŠTIES UŽDEGIMUI GYDYTI|

9⁹⁹ €

BETADINE®, 200 mg, 7 ovulės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kokybė ir kiekybinė sudėtis. Kiekvienoje ovulėje yra 200 mg joduoto povidono. **Terapinės indikacijos.** Ūminio ar lėtinio mišrios, nespecifinės (sukelto *Gardnerella vaginalis*), grybelių ar *Trichomonas vaginalis* infekcijos sukkelto vaginito gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Gydant lengvą infekciją, rekomenduojama vartoti 1 ovulę per parą 7 paras. Kai infekcinė liga yra įsisėjęs, vaistinio preparato galima vartoti 2 kartus per parą ir gydyti ilgiau. „Betadine“ ovulius negalima vartoti mergaitėms iki lytinio subrendimo. Vartoti į makštį. Gydymą galima tęsti menstruacijų metu. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Ilgalakis vartojimas gali sukelti dirginimą, kontaktinį dermatitą. Turint skydliaukės sutrikimų, dėl didelių jodo kiekių suvartojimo kyla skydliaukės funkcijos suaktyvėjimo rizika. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai. Nešumas ir žindymo laikotarpis. Čia pateiktas sutrumpintas vaistinio preparato aprašas. Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Valstybės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje <http://www.vvkt.lt>. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026-03-12.

IR GYVENIMO DŽIAUGSMAS GRĮŽTA!

NUO 5⁹⁹ €

TONZIRIN

8,75 mg, 12 kietųjų pastilių **5⁹⁹ €**8,75 mg, 24 kietosios pastilės **8⁹⁹ €**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

TONZIRIN 8,75 mg kietosios pastilės yra flurbiprofeno. Flurbiprofenas priklauso vaistų, kurie vadinami nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU), grupei. Šie vaistai pasižymi skausmą ir karščiavimą mažinančiu bei priešuždegiminiu poveikiu. TONZIRIN kietosios pastilės yra vartojamos skaudančios gerklės simptomams palengvinti, tokiems kaip gerklės skausmas, skausmingumas ir patinimas, sunkumas nuryti, suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams. Jei po 3 dienų ligos požymiai išlieka ar pasunkėja, kreipkitės į gydytoją. Prieš pradėdami vartoti TONZIRIN, turite atidžiai perskaityti informacinį lapelį. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti TONZIRIN. TONZIRIN vartoti draudžiama: - jeigu yra alergija, jeigu kada nors buvo pasireiškusi astma, netikėtas svoris, sloga, veido patinimas ar niežintis bėrimas (dilgėlinė) pavartojus aspirino ar kitų NVNU; - paskutiniuosius 3 mėnesius; - jeigu Jums yra ar kada nors buvo pasireiškę sunkių širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų. Suaugusiems ir mechanizmo valdymas. Tyrimų poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus nebuvo atlikti. Tačiau saugaus ir regos sutrikimai yra galimi šalutiniai poveikiai pavartojus nesteroidinių vaistų nuo uždegimo. Jeigu tokių pasireišimų, nevairuokite ir nevaldykite mechanizmų. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: vieną kietąją pastilę įsidėkite į burną ir lėtai išdulkite. Čiulpiamo metu nuolat judinkite kietąją pastilę burnos ertmėje. Pastilę gydymasis poveikis turėtų pasireikšti po 30 minučių. Jeigu reikia, vartokite po vieną pastilę kas 3-6 valandas. - Vartoti daugiau kaip 5 kietąsias pastiles per 24 valandas negalima. Jaunesniems kaip 12 metų vaikams vartoti negalima. **Nutraukite šio vaisto vartojimą ir nedelsiant susisieki su gydytoju, Jeigu Jums pasireiškia:** alerginės reakcijos, veido, liūzio ar gerklės patinimas, širdies ritmo padidėjimas ir kraujospūdžio sumažėjimas, sunkios odos reakcijos. **Textas paskutinį kartą peržiūrėtas 2025 08 08**

OCHISAN, akių vokų tepalas, 15 g

MEDICINOS PRIEMONĖ

Akių vokų tepalas be konservantų. Padeda palengvinti tokius simptomus, kaip vokų odos niežulys, jų skausmingumas ir patinimas, susijusius, be kita ko, su šorinio miežio ir chalaziono atsiradimu. Veiklioji medžiaga šluotinių sekulių medus (manuka) MGO 400+, šluotinių sekulių aliejus (manuka).

4⁹⁹ €



OTRIVIN

1 mg/ml nosies purškalo (tirpalas), 10 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Ksilometazolino hidrochloridas. Terapinės indikacijos. Nosies gleivinės paburkimo mažinimas peršalus, sergant sinusitu, sienlige ar kitokia alergine sloga. Nosiaraklės gleivinės paburkimo mažinimas, gydančios vidurinės ausies uždegimą. Nosies ertmės apžiūros atlikimo lengvinimas. Vartojimas. Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: po 1 įpurškimą į kiekvieną nosies landą, kai reikia. Negalima purkšti daugiau kaip 3 dozių per parą į kiekvieną nosies landą. Kontraindikacijos. Alergija ksilometazolui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, pacientams, kuriems neseniai buvo atlikta operacija per nosį, sergantiems uždarą kampo glaukoma (padidėjęs spaudimas akyje), lėtiniu nosies uždegimu (sausuoju arba atrofiniu rinitu). Specialios įspėjimai. Negalima vartoti ilgiau kaip 7 d. iš eilės. Negalima viršyti rekomenduojamos dozės, ypač vaikams ir pagyvenusiems žmonėms. Atsargiai vartoti, jeigu yra padidėjęs kraujospūdis, širdies liga (pvz., paalėjusio QT intervalo sindromas), cukrinis diabetas, padidėjęs skydliaukės aktyvumas, padidėjusi prostata, gerybinis antinksnių auglys, jei vartojate trichiklų ir tetraciklų antidepresantų, jeigu vartojate arba per pastarąsias 2 sav. vartojote vaistų nuo depresijos ar Parkinsono ligos, vadinamųjų MAOI. Labai jautriems pacientams gali sukelti miego sutrikimą, galvos svaigimą, tremorą. Sudėtyje yra benzalkonio chlorido. Teksto parengimo data 2025-02. Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi jų licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas.

PAVIRŠINIŲ ODOS PAŽEIDIMŲ GYDYMAS

3⁹⁹ €



RECREOL

50 mg/g kremas, 50 g
50 mg/g tepalas, 50 g

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo yra 50 mg deksantenolio. Terapinės indikacijos: paviršinių odos pažeidimų (tokių kaip maži nudegimai ir žaizdos, odos nubrozdinimai ir įtrūkimai), odos uždegimo (atsirandančio dėl spindulinio gydymo, fototerapijos ar ultravioletinių spindulių) pagalbinis gydymas. Dozavimas ir vartojimo būdas: vartoti išorškai. Įprastinis dozavimas yra viena ar kelis kartus per parą plonu sluoksniu tepi pažeistą odą. Gydymo trukmė priklauso nuo ligos kilmės ir eigos. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialios įspėjimai ir atsargumo priemonės: reikia vengti atsitiktinio deksantenolio kontakto su akimis. Vietinis rinkodaros teisės turėtojas: UAB „Grindeks Kalceks Lietuva“, Kalvanijų g. 300, LT-08318 Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2026-05-18.

NIEŽULIUI MALŠINTI

4⁹⁹ €



GRIVIX, 1 mg/g gels, 30 g


NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: kiekviename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato. Pagalbinės medžiagos: benzalkonio chloridas ir propilenglikolis. Terapinės indikacijos: dermatozės, dilgėlinės, vabzdžių įkandimo, nudegimo saulėje arba paviršutinio odos nudegimo (pirmojo laipsnio) sukkelto niežėjimo trumpalaikis malšinimas. Dozavimas ir vartojimo metodas: vaikams, suaugusiems ir senyviems pacientams: ant pažeistos ir niežtinčios odos GRIVIX reikia tepi plonu sluoksniu 2-4 kartus per parą. Kodikiams ir mažiems vaikams (jaunesniems nei 2 metų amžiaus) reikia vengti vartoti ant didelių odos plotų. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Antrojo ir trečiojo laipsnio nudegimai. Specialios įspėjimai ir atsargumo priemonės: jei GRIVIX gydymas didelis odos plotas, reikia vengti ilgalaikio šio paviršinio saulės apšvietimo. Kodikiams ir mažiems vaikams (jaunesniems nei 2 metų amžiaus) didelio odos plotu, ypač pažeisto ar apimto uždegimo, gelio tepi reikia vengti. Vaistinio preparato sudėtyje yra benzalkonio chlorido, kuris dirgina, gali sukelti odos reakcijų, ir propilenglikolio, kuris gali sudirginti odą. Reklamos teksto parengimo data: 2025.01.

NURAMINK SUDIRGINĄ IR NIEŽTINČIĄ ODĄ!

ESANT AKIŲ UŽDEGIMUI

-40% 14^{98€} 24⁹⁷



DESODROP®, akių lašai, 8 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

Liposominis ozonuotas tirpalas akims su „LipozonEye“.

Ozonas – galingas natūralus antiseptikas, turintis plataus spektro antibakterinį, antivirusinį, priešgrybelinį poveikį. Preparatas skirtas uždegimo simptomams gydyti, taip pat ir infekcinės kilmės (konjunktyvitui, keratitui, blefaritui ir pan.), sergantiems paskartojančiomis akių infekcijomis, infekcijų profilaktikai po chirurginių intervencijų, traumų. Apsaugo ragenos epitelį, skatina gijimą, stabilizuoja ašarų plevėkė. 2024-11-19

OZONO TERAPIJA AKIES PAVIRŠIAUS LIGOMS

VYRŲ IR MOTERŲ PLAUKŲ SLINKIMO GYDYMU

NUO 19⁹⁹ €



MINOXIDIL INTELI

2 % odos tirpalas, 60 ml 19⁹⁹ €
5 % odos tirpalas, 60 ml 24⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

MINOXIDIL INTELI veiklioji medžiaga minoksidilis. MINOXIDIL INTELI 5 % odos tirpalas vartojamas gydyti vidutinio stiprumo vyrų nuplikimą, susijusį su hormonais. Gydymas šiuo tirpalu rekomenduojamas pacientams po nesėkmingo 4 mėnesių gydymo MINOXIDIL INTELI 2 % odos tirpalu. KAIP VARTOTI MINOXIDIL INTELI: MINOXIDIL INTELI 2 % ar MINOXIDIL INTELI 5 % odos tirpalą visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Dozavimas: MINOXIDIL INTELI 2 % odos tirpalą ar MINOXIDIL INTELI 5 % odos tirpalą reikia tepti ant pažeistos galvos odos po 1 ml (10 purškiklio paspaudimų) kas 12 valandų. Nesvarbu, koks alopecijos plotas, rekomenduojama dienos dozė visada tokia pati. Maksimali dienos dozė yra 2 ml (20 paspaudimų). Kontraindikacijos: Padidėjęs jautrumas minoksidiliui arba bet kuriai pagalbinei MINOXIDIL INTELI medžiagai. Del galimo kitų kūno vietų plaukuotumo padidėjimo, MINOXIDIL INTELI 5 % moterims vartoti negalima. MINOXIDIL INTELI 5 % odos tirpalą draudžiama vartoti jaunesniems kaip 18 ir vyresniems kaip 65 metų asmenims. Specialios įspėjimai ir atsargumo priemonės: Pacientams su galvos odos dermatoze preparatas gali reaguoti po oda. Prieš pradėdami vartoti MINOXIDIL INTELI 5 % reikėtų pasitikrinti sveikatą. Del preparato esančio propilenglikolio poveikio gali atsirasti sudirginimas ir kontaktinis dermatitas. Pacientams, kurie serga širdies ir kraujagyslių ligomis, MINOXIDIL INTELI reikia vartoti ypač atsargiai dėl galimo sisteminio preparato poveikio. Vartojant MINOXIDIL INTELI reikia saugotis, kad preparato nepatektų į akis. Jei preparato atsitiktinai patenka ant jautrių vietų, reikia kruopščiai nuplauti dideliu vandens kiekiu. Teksto peržiūros data: 2024-09-03.

„MINOXIDIL INTELI“ ... IR PLAUKAI SUGRĮŽTA...

NUOVARGIO SUKELTŲ NERVINIŲ NEGALAVIMŲ LENGVINIMAS

6⁹⁹ €



NERVOHEEL N, 50 tablečių

NERECEPTINIS HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tablete yra veikliųjų medžiagų: Acidum phosphoricum D4 60 mg, Strychnos ignatii D4 60 mg, Sepia officinalis D4 60 mg, Kalium bromatum D4 30 mg, Zincum sulfuricum D4 30 mg. Terapinės indikacijos. Nuovargio sukeltų nervinių negalavimų lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 m.: vartoti po 1 tablete 3 kartus per dieną, 6-11 m. vaikams: vartoti po 1 tablete 2 kartus per dieną, 2-5 m. vaikams: vartoti po 1 tablete 1-2 kartus per dieną. Jaunesniems kaip 2 m. vaikams: vartoti po 1 tablete 1 kartą per dieną. Tablete lėtai išstiprinti burnoje. Ją reikia vartoti ne valgio metu. Vaikams tablete galima susmulkinti ir išstiprinti nedideliame kiekyje vandens. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialios įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas relas paveldimas sutrikimas – Lapp laktažės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Registruotojas. „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). Registruotojo atstovas. UAB „Farmahel“. www.heel.lt. Reklamos teksto parengimo data 2026-03-18.

-40 %

**AMBIO**

CINKAS, 45 tabletės **8⁹⁹ 5³⁹ €**
 REGĖJIMUI SU GINKMEDŽIO EKSTRAKTU, 30 kapsulių **17⁹⁸ 10⁷⁹ €**
 GERAM POILSIUI, 30 kapsulių **10⁹⁹ 6⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!**AMBIO**

ŠIRDŽIAI, mikstūra, 100 ml **4⁶⁸ €**
 CHOLESTEROL BALANCE COMPLEX, 30 kapsulių **11⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

-40 % 4^{79€}**RAMEVAL®**15 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

„RAMEVAL“ – ramybės augalų puokštė sukurta iš valerijonų, melisų, pipirinių mėtų, ramunijų ir apynių, kuri padeda:
 - palaikyti normalią nervų sistemos būklę (vaistiniai valerijonai),
 - atsipalaiduoti (vaistinės melisos, pipirinės mėtos, vaistinės ramunės),
 - palengvinti užmigimą ir palaikyti miego kokybę (vaistinės melisos, paprastieji apyniai)

IEŠKAI RAMYBĖS? ATRASK JĄ SU „RAMEVAL“

-30 %

**FITTYDENT****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

„Fittydent“ – stiprus, ilgai laikantis fiksuojamasis kremas, neleidžiantis protezams slysti ir slankioti. Netirpus vandenyje ir atsparus rūgščiai, todėl nenuplaunamas skysčių ar seilių. „Fittydent“ dantų protezų fiksuojamasis kremas garantuoja stiprų dantų protezų ir dantenu sukibimą.

NAUJAS PAKUOTĖS DIZAINAS.

*Akcija taikoma gėtoja etiketė pažymėtomis prekėms

NUO 6⁹⁹ €**TROXEVASIN**

2 %, 40 g gelis **6⁹⁹ €**
 2 %, 100 g gelis **9⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 g gelio yra 20 mg trokserutino. **Terapinės indikacijos:** lėtinio venų nepakankamumo simptomų (kojų skausmo, sunkumo, patinimo) lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems pacientams iš ryto ir vakare ligos pažeistą vietą reikia patepti nedideliu kiekiu gelio ir švelniai masažuoti, kol vaistinis preparatas visiškai įsisers į odą. Gydomo gelio veiksmingumas daugiausia priklauso nuo vaistinio preparato dozės, vartojimo reguliarumo ir trukmės (patariama vartoti ilgai). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs išėjimai ir atsargumo priemonės:** vartoti tik ant nepažeistos odos, negalima tepti atvirų žaizdų bei gleivinės, pvz., akių. Gelio sudėtyje yra benzalkonio chlorido, kuris gali sudirginti odą. Nesitikiama, kad vartojimas nėsuteno ir žindymo laikotarpiu gali būti susijęs su žalingu poveikiu motinai, nes benzalkonio chlorido absorbcija per odą yra minimali. **TROX-LT-00034. Teksto peržiūros data 2024-11-13. Reklaminių medžiagų parengimo data 2026-03.**

KAD KOJOS BŪTŲ LENGVOS! MĖGAUKITĖS TYRINĖDAMI PASAULĮ BE LĖTINIO VENŲ NEPAKANKAMUMO SUKELTŲ SIMPTOMŲ!

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!**VITADAY**

KOMPLEKSAS SAŃARIAMS SU GLIUKOZAMINU, 60 tablečių **9⁹⁸ €**
 MAISTO PAPILDAS

AMBIO[®]

Vaistinių atrinkti
maisto papildai
geresnei tavo versijai



Maisto papildai



-40 % PREKIŲ ŽENKLAMS

IKI -45%

„MÖLLER'S" ŽUVŲ TAUKAI IR OMEGA-3 KAPSULĖS

MAISTO PAPILDAI

„Möller's" – tai šimtmečiui puoselėjami žuvų taukai visai šeimai. „Möller's" žuvų taukų kapsulės išsiskiria kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyviu medžiagų deriniais. Tyri ir gerai išvalyti „Möller's" žuvų taukai puikiai tinka vartoti kasdien visą gyvenimą. Įvairaus skonio kramtomosiose žuvelėse „Möller's Junior" yra omega-3 ir vitamino D – augančiam vaikui organizmui naudingų medžiagų.

OMEGA-3 EKSPERTAI JAU DAUGIAU NEI 170 METŲ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



-40%

„LIVOL" VITAMINAI

MAISTO PAPILDAI

Kviečiame Jus atrasti iš naujo „Livol" vitaminų prekių ženklą – dabar naujose pakuotėse. Atnaujintas „Livol" įkvėptas Danijos vertybių, šiaurietiškos estetikos ir Hygge balanso, kuris atspindi harmoningą požiūrį į kasdienę gerą savijautą. Danų kultūroje gyvenimo pusiausvyrą gimsta iš paprastų, bet prasmingų kasdienybės akimirkų – judėjimo, ramybės, artumo, šypsenų bei sąmoningo rūpesčio savimi. Šia filosofija vadovaujasi ir „Livol" vitaminai, sukurti Danijoje, naudojant pažangias, subalansuotas formules ir efektyvią gamybos technologiją, kuri užtikrina maksimalų pasisavinimą.

„LIVOL" – GEROS SAVIJAUTOS MEISTRAI IŠ DANIJOS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



-40%

ACONITUM

B COMPLEX, 40 kapsulių **14²⁹ 8⁵⁷ €**

MAGNIS + B6 COMPLEX, 30 kapsulių **13²⁹ 8³⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

„B complex" – tai įvairių, gerai subalansuotų B grupės vitaminų derinys tiems, kurie jaučia nervinę įtampą bei nuovargį. Mažinti nuovargį, palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą padeda vitaminai B2, B6, B12. Normali odos būklė padeda palaikyti vitaminai B2, biotinas ir niacinas, o normalią plaukų būklę – biotinas. Normalią protinę veiklą padeda palaikyti pantoteno rūgštis. **„B total + magne"** sudėtis praturtinta ir magniu, kuris padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją bei normalią raumenų funkciją ir padeda mažinti nuovargį. Pakuotėje yra 2 mėnesių kursas.



-40%

VIRONOX

MAISTO PAPILDAI

Maisto papildų linija „Vironox" – epigenetinė linija, sukurta bendradarbiaujant su Šveicarijos mokslininkais. **„Stiprus imunitetas"** – tik 7 dienos organizmo apsaugai ir imunitetui. 1 pakeltyje yra net 10,4 g aktyviųjų medžiagų. Sudėtyje esantis vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. **„Jėgoms atstatyti"** – maisto papildas tiems, kurie siekia greičiau atgauti jėgas. Kininių žensenių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalų organizmo gyvybingumą, vitaminai B6 ir B12 – normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą ir mažinti nuovargį. **„Smegenų rūšas"** – protinei veiklai. Rausvųjų rodiolių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją. Niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą. Balzamo **„Veiksminga apsauga"** sudėtyje esantis interferonas, hidrolizuotas kolagenas, lizocimas ir eteriniai aliejai veikia sinergiškai ir padeda suformuoti apsauginį barjerą.

„VIRONOX" – NELEISK TAVĘS SUSTABDYTI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



-40%

ODONTE

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

ODONTE – tai patikimumas ir dėmesys detalėms, užtikrinantis nepriekaištingą burnos priežiūrą kiekvieną dieną.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



-40%

CORDISOL

60 kapsulių **13⁴⁹ 8⁰⁹ €**

FORTE, 30 kapsulių **12⁴⁹ 7⁴⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

„Cordisol" ir **„Cordisol forte"** – maisto papildai, rinkoje siūlomi jau daugiau nei 10 metų! Sudėtyje esantis kalis bei magnis reikalingi siekiant palaikyti normalią raumenų ir nervų sistemos veiklą, o kalis taip pat skirtas ir normaliam kraujospūdžiui palaikyti. Esant mineralų trūkumui organizme rekomenduojama vartoti „Cordisol", kurio sudėtyje yra 100 mg kalio ir 137 mg magnio, bei „Cordisol forte", kurio sudėtyje – NET 200 mg kalio ir 187,5 mg magnio!

„CORDISOL" IR „CORDISOL FORTE" – SAUGUS MINERALŲ ŠALTINIS!



-40%

ARTHROSTOP PROENZI

MAISTO PAPILDAI

„Arthrostop Proenzi Collagen Shots" – unikali dviejų tipų kolageno, vitaminų ir mineralų kombinacija sąnariams. Net 11 000 mg hidrolizuoto ir 20 mg nendratūro II tipo kolageno viename buteliuke! Naujiena – juodųjų serbentų skonio.

„Arthrostop Proenzi Intensive" tabletės – sąnariams su gliukozaminu, chondroitinu, bosvelijų žievės ekstraktu ir II tipo kolageno. Tik 1 tabletė per dieną!

„Arthrostop Proenzi Rapid" tabletės – kompleksas su gliukozaminu, chondroitinu, bosvelijų žievės ekstraktu sąnariams.

„Arthrostop Proenzi PLUS" tabletės – sąnariams su MSM, gliukozaminu ir bosvelijų žievės ekstraktu, kuris padeda palaikyti sąnarių lankstumą bei bendrą sąnarių funkciją.

2603_SB_Proenzi_VOI_LT

JUDEK LAISVAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



JAMIESON turi ilgametę patirtį - savo produkciją eksportuoja po visą pasaulį jau nuo 1922 metų. JAMIESON naudoja išskirtinę „360 Pure“ technologiją, kuri apima net 360 gamybos proceso kontrolės etapų.

-40%


„JAMIESON“ MAISTO PAPILDAMS



Pagaminta Kanadoje

Epitome

GERAI JAUSTIS YRA KELIONĖ



Miegui ir nervų
sistamai

NEUROMED
MAISTO PAPILDAI

Nuo šiol dūpiamosios „Neuromed“ tabletės – ne tik nakčiai, bet ir ramiai dienai! Išbandykite NAUJENA „Neuromed Anti-Stress“ – greitai įsisavinamas, dūpiamas tabletės, kurios padeda nusiraminti, suvaldyti stresą ir mėgautis akimirką be įtampos jausmo. Greitam užmigimui rinkitės „Neuromed Sleep“, o trigubo poveikio „Neuromed Sleep Forte“ padės ne tik greitai užmigti, gerai išsimiegoti, bet ir ryte jaustis žvaliai. „Neuromed Relax“ – streso kontrolei ir nervų sistemai. Vartoti jaučiant laikiną nerimą ir stresą. „Neuromed Good Mood“ su Safranu ir kurkuminiu – gerai nuotaikai, psichologinei funkcijai, nuovargiai mažinti. Vartoti patiriant ilgai užsėdusį stresą, jaučiant nuovargį, apleidžiant pozityvioms mintims.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

Vitamino D3 šaltinis


OLIDETRIM®

2000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių **10³⁹ €**

2000 TV, 60 minkštųjų kapsulių **11⁴⁹ €**

4000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių **14⁹⁹ €**
MAISTO PAPILDAI

Imunitetui – vitaminas D 2000 ir 4000 TV.

Širdžiai, smegenims – DHR+ EPR omega-3 rūgštys.

Kaulams ir raumenims- vitaminai D ir K2.

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Omega-3 riebalų rūgštys DHR (dokozaheksaeno) ir EPR (eikozapentaeno) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą. Siekiant maksimaliai padidinti vitamino D papildų naudą, juos naudinga vartoti kartu su vitaminu K2.

GERIAUSIA GYNYBA – STIPRUS IMUNITETAS.

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

VITIRON
MAISTO PAPILDAI

„Vitiron“ D3+Omega-3 Strong“ yra didelė vitamino D3 dozė, paruošta linų sėmenų aliejaus pagrindu, o tai yra natūralios kilmės omega-3. Linų sėmenų aliejaus pagrindas skatina gerą vitamino D absorbciją ir biologinį įsisavinimą. „Vitiron“ D3 Olive SUN“ – vitaminas D, išdirpintas gryname alyvuogių aliejuje, kuris užtikrina geresnį jo pasisavinimą. Patogiai ir greitai vartojamas vitaminas D kiekvienam! „Vitiron“ KIDS“ – tai vaisių ir uogų skoniu, įvairių formų kramtomajai guminiškai su vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis. Maisto papildai „Vitiron“ Kids grow UP“, „Vitiron“ Kids School for BRAIN“, „Vitiron“ Kids Sports“ sudėtyje esantys vitaminai C, A, B12, folio rūgštis, selenas ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. „Vitiron“ KIDS Immunity“ su šėvamedžių sultimis. VTR-LT-00166

KAD PASIEKTUMĖTE DAUGIAU!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra
pigesnė arba tokia pati
– NEMOKAMAI!

Gerklei


HERBITASSIN®
MAISTO PAPILDAI, MEDICINOS PRIEMONĖS, MAISTAS

„Herbitassin“ įvairių skoniu pastilės bei ledinukai su augaliniais ekstraktais ir vitaminu C – gerklei ir imunitetui. Islandinės kerpenos padeda palaikyti normalią gerklių ir balso stygų funkciją, o vitaminas C – normalią imuninės sistemos veiklą. „Herbitassin“ Iceland moss HYDRO“ pastilės su hialuronu drėkina gerkles gleivine, ramina gerkles skausmo pojūtį, mažina sauso kosulio ir užkimimo simptomus.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra
pigesnė arba tokia pati
– NEMOKAMAI!

Inkstams ir šlapimo
takams

FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS, 30 kapsulių 12⁴⁹ €
MAISTO PAPILDAS

„Fitolizyna Nefrocaps PLUS“ yra unikalus 7 koncentruotų augalinių ekstraktų mišinys, kuris: – padeda palaikyti normalią inkstų ir šlapimo takų veiklą (petražolių šaknis, dirvinio asiūklėlio žolė ir paprastųjų varpučių šakniastiebiai, krapotųjų beržų lapai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė); – padeda palaikyti normalų vandens pašalinimą iš organizmo, todėl skatinamas nepageidaujamų metabolizmo produktų šalinimas su šlapimu (dirvinio asiūklėlio žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė). **Rekomenduojamas vartojimas:** 1 kapsulė 2 kartus per parą prieš valgį, užgeriant dideliu kiekiu vandens (ne mažiau kaip ½ stiklinės).

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra
pigesnė arba tokia pati
– NEMOKAMAI!

VELYM
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Velym pH neutro“ – klinikiniais tyrimais patikrintas balinamasis dantų kremas. Kasdienė apsauga. Sudėtyje – natūralios kilmės medžiagos ir 1450 ppm fluoro. Skirtas suaugusiems. „Velym Mineral O3“ sudėtyje – ozono prisotintas alyvuogių aliejus. Daugiau dėmesio dantenoms. Aukštas apnašų valymo koeficientas (angl. Pellicle Cleaning Ratio, PCR).

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

Žarnyno mikroflorai


ACIDOLAC® JUNIOR

20 meškiuko formos tablečių **10¹⁹ €**

braškių skonio, 20 meškiuko formos tablečių **10¹⁹ €**
MAISTO PAPILDAI

ACIDOLAC® JUNIOR meškiuko formos tablečių sudėtyje yra gerųjų žarnyno bakterijų *Lactobacillus acidophilus* La-14TM ir *Bifidobacterium lactis* BI-04TM, inulinu ir vitaminu B6, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vartojimas: vyresniems kaip 3 m. vaikams ir suaugusiems vartoti po 1 meškiuko formos tabletę 2 kartus per parą. Be sacharozės ir gliutimo.

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

ZYLIA

3D WHITE, dantų pasta, 75 ml **8⁵⁵ €**


PARODONT, dantų pasta, 75 ml **8⁵⁵ €**
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Zylia 3D White“ dantų pasta nepriekeistingai burnos higienai padeda šalinti apnašas, vizualiai šviesina dantis ir suteikia gaivų burnos kvapą. „Zylia Parodont“ dantų pasta – kasdienę dantų ir įautrių dantenų priežiūrą.

1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra
pigesnė arba tokia pati
– NEMOKAMAI!


-40% 22^{19€}
26^{99€}



EPITOME

CARDIOVASCULAR FORMULA, 90 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

• Augalinės sudėties produktas.

• Didelės išskirtinių aktyviųjų medžiagų dozės 1 kapsulėje:

- Fermentuotų sojų ekstrakto, kuriame yra 2000 FU (fibрино vienetas) natokinazės
- Fermentuotų ryžių ekstrakto, kuriame yra 2,9 mg monokolino K
- Bergaminų citrimedžių vaisių sučių ekstraktas, kuriame yra 50 mg polifenolių
- Dažniųjų ciberžolių šaknų ekstrakto kuriame yra 20 mg kurkumino ir 20 mg polikosanolio

• Sudėtyje esantis dažniųjų ciberžolių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje bei normalią širdies ir kraujagyslių sistemos funkciją.

-40%



AMBIO

PATIRANTIEMS ĮTAMPĄ, 15 kramtomųjų tablečių ~~6^{99€}~~ 4^{19€}

ATMINČIAI PLUS, 30 tablečių + 30 kapsulių ~~27^{99€}~~ 16^{79€}

MAISTO PAPILDAS

6^{99€}



NEURORUBINE FORTE LACTAB, 20 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg tiaino nitrato (vitamino B1), 50 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6), 1 mg cianokobalamino (vitamino B12). **Terapinės indikacijos.** Del B grupės vitaminų stokos atsiradusių nervų sistemos ligų gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Per parą reikia išgerti 1–2 tabletes. Vartoti per burną. Kiek laiko vartoti „Neurorubine Forte Lactab“, patars gydytojas. Vėliausiai po 4 savaitių būkle turi įvertinti gydytojas. Jeigu simptomai nepaieina, reikia kreiptis į gydytoją, kad jis parinktų kitą gydymą. **Vaičių populiacija.** Saugumas ir veiksmingumas vaikams dar neįvertintas, todėl vaistas neturi būti skiriamas vaikams. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija vitaminams B1, B6 ar B12 arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu sergate žvyneline. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vaisto sudėtyje esanti didelė vitamino B6 dozė gali silpninti I-Dopos poveikį bei pabloginti Parkinsono ligą. Taip pat vitaminas B6 gali silpninti altretamino (vaisto, vartojamo vėžiui gydyti) poveikį. Kartu vartojamo izoniizidato toksinis poveikis gali stiprėti. Trietaminikarbazonas ir 5-fluorouracilas, būdami tiaino antagonistais, gali trikdyti vitamino B1 poveikį. Kartu su „Neurorubine Forte Lactab“ vartojant vaistus, surišiančius skrandžio rūgštis (antiacidus), pablogėja vitamino B1 pasisavinimas. **Teksto peržiūros data** 2024-02-01. **Reklamos teksto parengimo data** 2026-01. NEUR-LT-00012

PALIKITE SKAUSMĄ UŽ NUGAROS!

FEROGLOBIN, FEROGLOBIN PLUS

MAISTO PAPILDAS

„FeroGlobin“ – geležies, vitaminų ir mineralų kompleksas normaliai kraujodarai (foliatui), raudonųjų kraujo kūnelių gamybai (vitaminai B6, B12, geležis), hemoglobino susidarymui (geležis) palaikyti. „FeroGlobin“ puikiai papildė mitybą nėštumo ir laktacijos laikotarpiu, vaikystėje ir paauglystėje, sveikstant po ligos ar operacijos.

„FeroGlobin Plus“ ne tik papildė geležies atsargas, bet ir padeda mažinti pavargimo jausmą (vitaminai B6 ir B12), palaiko fizinę ir protinę energiją (sibirinis ženšenis).

GELEŽIS, KURIAI NĖRA LYGIŲ!

*Akcija taikoma geltona etiketė pažymėtomis prekėmis

KOJŲ VENOMS

NUO 14^{99€}



VENORUTON

FORTE, 500 mg, 30 tablečių 14^{99€}

1000 mg, 15 šnypščiančių tablečių 16^{99€}

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje „Venoruton forte“ tabletėje yra 500 mg O-(β-hidroksietil)-rutozidų; kiekvienoje Venoruton šnypščiosioje tabletėje yra 1000 mg O-(β-hidroksietil)-rutozidų (HR). **Indikacijos:** lėtinio venų nepakankamumo simptomams (edemos, kojų nuovargio, sunkumo, skausmo, mėšlungio, parestezijos) lengvinti, hemorojaus simptomams mažinti. Papildomai diabetinės retinopatijos (diabeto komplikacijos tinklainės kraujagyslių pažeidimo) ir limfos sąstovio gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Venoruton forte“ – 1 tabletė 2 kartus per parą; Venoruton šnypščiosios tabletės: 1 tabletė – 1 kartą per parą, Venoruton neskirtas vartoti vaikams. Dozavimas, esant visoms indikacijoms, pateikiamas pakuotės lapelyje arba www.vkf.lt. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** negalima vartoti, jeigu yra kojų edema dėl širdies, inkstų arba kepenų ligų. Venoruton 1000 mg šnypščiuųjų tablečių sudėtyje yra kalio ir natrio. Reklamos teksto parengimo data 2023 balandžio mėn. 2603_SB_Venoruton_V01_LT.

LENGVAM NERIMUI MALŠINTI IR MIEGUI PALENGVINTI

NUO 6^{99€}



LILANDOR

80 mg, 14 minkštųjų kapsulių 6^{99€}

80 mg, 28 minkštosios kapsulės 11^{99€}

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Lavandula angustifolia Miller eterinis aliejus

„Lilandor“ yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jeigu simptomai pablogėja šio vaisto vartojimo metu, pasitarkite su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, vartoti nerekomenduojama, nes levandų aliejaus sudėties medžiagos daugiausia šalinamos iš organizmo perdirbant jas kepenyse. Kiekvienoje šio vaisto minkštosios kapsulėje yra apytikriai 12 mg sorbitolio. Dozavimas ir vartojimo metodas. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta pakuotės lapelyje arba kaip nurodė gydytojas ar vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: 1 minkštoji kapsulė 1 kartą per parą. Minkštąją kapsulę reikia nurinti nesukramtytą užsigeriant pakankamiu kiekiu skystis (geriausia stikline vandens). Jeigu simptomai išlieka po vaisto vartojimo dvi savaites, reikia kreiptis į gydytoją arba kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą. LT-LIL-10-2025_MFLOW_2025/12

ATGAUK RAMYBĘ IR RAMŲ MIEGĄ

ATMINČIAI IR DĖMESIO KONCENTRACIJAI PAGERINTI

NUO 11^{99€}



GINGIUM

120 mg, 30 plėvele dengtų tablečių 11^{99€}

120 mg, 60 plėvele dengtų tablečių 19^{99€}

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: vienoje tabletėje yra 120 mg dviskaidžio ginkmedžio lapų ekstrakto. **Terapinės indikacijos:** vyresnio amžiaus žmonių lengvo ir vidutinio sunkumo smegenų kraujotakos nepakankamumo, protarpinio šlavavimo, galvos svaigimo simptomams mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** 1 tabletė 1–2 k/d. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai ar pagalbinėms medžiagoms, nėštumas. **Specialūs įspėjimai:** neskirtas vartoti jaunesniems nei 18 metų žmonėms. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Ulpės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2636507. El.paštas: info.lithuania@sandoz.com. B52601069670. Reklamos teksto parengimo data: 2026 01 06.

-15% 22^{09€}
25^{99€}



OLP APOFERIN™, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„OLP Apoferin™“ – tai geležies kompleksas su laktoferinu hemoglobiniui ir kraujodarai:

- geležis padeda palaikyti hemoglobino susidarymą ir normalų deguonies pernėšimą organizme;
- geležis ir vitaminas B12 padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą;
- geležis, vitaminas C, folio rūgštis ir vitaminas B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

Mikrokapsuliota liposomos geležies forma sukurta pasitelkiant efektyvą pasisavinimo technologiją, kuri užtikrina kelis kartus geresnį ir greitesnį mikroelemento pasisavinimą. Tokia forma neturi įprastai geležiai būdingų šalutinių reiškinų.

Laktoferinas yra geležį surišantis baltymas, priklausantis pernėšėjų transferinų grupei, dalyvaujantis geležies reguliavimo procese.

Skrandyje neiros kapsulės užtikrina medžiagų apsaugą nuo degradacijos – skrandžio rūgščių, fermentų (pepsino ir kt.), druskų ir maisto poveikio.

5⁹⁹ €**ESPUMISAN**, 240 mg, 20 minkštųjų kapsulių**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veiklioji medžiaga: 1 minkštoji kapsulė yra 240 mg simetikonas. **Terapinės indikacijos.** „Espumisan“ vartojamas su dujomis susijusiems virškinimo trakto sutrikimams, pvz., dujų kaupimuisi virškinimo trakte ar vidurių pūtimui, pilnumo pojūčiui, simptomiskai gydyti; kaip pagalbinė priemonė atliekant pilvo ertmės organų diagnostikos procedūras, pvz., rentgeno ar ultrasono (sonografijos) tyrimus. „Espumisan“, 240 mg, skirtas vartoti paaugliams nuo 15 m. ir suaugusiems. **Kontraindikacijos.** „Espumisan“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija simetikonui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Espumisan“. Jei atsiranda naujų virškinimo veiklos sutrikimų ir (ar) jie išlieka 3 dienas, reikia pasitarti su gydytoju, nes reikia nustatyti šių sutrikimų priežastį, taip pat ar nėra kitos galimos ligos, dėl kurios reikia gydyti. **Dozavimas.** Rekomenduojama dozė paaugliams nuo 15 m. ir suaugusiems: savarankiškai gydantis dėl su dujomis susijusių virškinimo trakto negalavimų (pvz., dujų kaupimosi virškinimo trakte, vidurių pūtimu, pilnumo pojūčiu) – po vieną „Espumisan“ kapsulę po kiekvieno pagrindinio valgio (pietų ir vakarienės); kaip pagalbinė priemonė atliekant pilvo ertmės diagnostikos procedūras (pvz., rentgeno ar ultrasono (sonografijos) tyrimus) gydytojo nurodymu – viena „Espumisan“ kapsulė dieną prieš tyrimą. „Espumisan“ reikia išgerti po pagrindinio valgio, užgeriant stikline vandens. Prieškus „Espumisan“ galima vartoti tol, kol yra nusiskundimų. Be to, jeigu reikia, „Espumisan“ gali būti vartojamas 30 dienų. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 1947, LT@berlinchemie.com. LT-ESP-1-2026_MFLOW, 2026/02.

KAI PUČIA PILVĄ!

-30 %

**LINEX®****MAISTO PAPILDAI**

Vienoje „Linex“ kapsulėje yra 10 mlrd. geriausiai iki šiol pasaulyje mokslškai ištirtų gyvų *Lactobacillus rhamnosus* GG bakterijų, taip pat – vitaminų B1, B2, B6 ir cinko. Vienoje „Linex“ kapsulėje yra 2 mlrd. gerai žinomų ir mokslškai ištirtų gyvų *Lactobacillus acidophilus*, DSM 15241 ir *Bifidobacterium animalis* subsp. lactis, DSM 15954 bakterijų. Vienoje „Linex“ kapsulėje yra 6-uoje „Linex“ kapsulėse yra 1 mlrd. *Bifidobacterium animalis* subsp. lactis, DSM 15954 bakterijų. **Vartojimas:** „Linex“ kapsulės suaugusiems ir vyresniems nei 6 m. vaikams gerti po 1-2 kapsules per dieną. „Linex“ kapsulės suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams gerti po 1 kapsulę 1-3 kartus per dieną; 3-12 m. vaikams – po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną. „Linex“ kapsulės kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – po 1 kapsulę 1 kartą per dieną. „Linex“ kapsulės naujagimiams, kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – po 6 lašus 1 kartą per dieną. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. B52601069672. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

KOKYBĖ, KURIA GALIMA PASITIKĖTI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

NUO RĖMENSNUO 6⁴⁹ €**MAALOX**

400 mg/400 mg, be cukraus, 40 kramtomųjų tablečių 6⁴⁹ €
40 mg/35 mg/ml, geriamoji suspensija, 250 ml 6⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kramtomoji tabletė yra 400 mg magnio hidroksido ir 400 mg aliuminio hidroksido; 1 ml geriamosios suspensijos yra 40 mg magnio hidroksido ir 35 mg aliuminio hidroksido. **Terapinės indikacijos:** rėmens ir skrandžio turinio kilimo į stemplę simptomams malšinti suaugusiems ir paaugliams nuo 15 metų. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suspensija reikėtų gerti neskiedžiant. Buteliuko suspensija geriama po 1 valgomąjį šaukštą (15 ml) pasireiškus rėmeniui arba skrandžio turinio refliuksui į stemplę; negalima gerti daugiau kaip 6 valgomųjų šaukštų (90 ml) per parą; šio vaisto negalima vartoti ilgiau kaip 10 dienų; susulpiuti arba sukratyti 1-2 tabletes, pajutęs rėmenį arba atsiradus refliuksui; negalima vartoti daugiau kaip 6 kartus per parą ir daugiau kaip 8 tablečių per parą. **Kontraindikacijos:** alergija (padidėjęs jautrumas) magnio hidroksido ir aliuminio hidroksido arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sunki inkstų liga; stiprus pilvo skausmas arba įtarimas žarnų nepraeinamumas. **Specialūs įspėjimai:** vaista galima vartoti tik pastarais su gydytoju, jeigu mažėja kūno svoris, kraujavimas arba anksčiau iš virškinimo trakto, sutrūkęs rijimas arba nuolat jaučiate nemalonų pojūtį pilve, virškinimo sutrikimų atsiradimą pirmą kartą arba jei neseniai pakito, sergate inkstų liga. Pacientams, kuriems nustatytas inkstų funkcijos sutrikimas, jaunesniems kaip 2 m. vaikams, senyviems pacientams bei kitiems pacientams, kuriems yra fosforo trūkumo pavojus, prieš pradėdami vartoti „Maalox“ reikia kreiptis į gydytoją. Norint išvengti perdozavimo, negalima kartu vartoti vaistinių preparatų, savo sudėtyje turinčių aliuminio hidroksido ir magnio hidroksido. Atsargumo dėlei tarp bet kokių per burną vartojamo vaisto ir antacidinio vaisto vartojimo turi būti bent 2 val. (vartojant fluorochinolonų – 4 val.) intervalas. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „Maalox“ (be cukraus) tabletes tinku cukriniu diabetu sergantiems pacientams. **Reklamos teksto parengimo data 2024-12-2603_SB_Maalox_V01_LT.**

GREITA PAGALBA NUO RĖMENS!**VIRŠKINIMO SISTEMAI**NUO 6⁹⁹ €**GUTTALAX**

7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 15 ml 6⁹⁹ €
7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml 10⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 ml tirpalo (15 lašų) yra 7,5 mg natrio pikosulfato. **Indikacijos.** „Guttalax“ vartojamas, jei pacientas yra varginamas vidurių užkietėjimo; yra būklė, kai reikia palengvinti tuštinimąsi. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** „Guttalax“ geriamas vakare. Suaugusiems ir vyresniems nei 10 m. vaikams: 10–20 lašų per parą. 4–10 m. vaikams: 5–10 lašų per parą. Vartoti per burną. Rekomenduojama gydymą pradėti nuo mažausios dozės. Didžiausios rekomenduojamos paros dozės viršyti negalima. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; žarnų nepraeinamumas ar obstrukcija; stiprus pilvo skausmas ir (arba) karščiavimas dėl ūminės pilvo būklės (pvz., apendicito), galimai susijęs su pykinimu, vemimu; ūminė uždegiminė žarnų liga; sunki dehidracija; jaunesni kaip 4 m. vaikai; retos paveldimos būklės, kurios gali būti nesuderinamos su preparato pagalbine medžiaga. **Specialūs įspėjimai.** Nustačius vidurių užkietėjimo priežastis, negalima vartoti nepertraukiamai kasdien ar ilgiau. „Guttalax“ pavartojusiems žmonėms buvo galvos svaigimo ir (arba) sinkopės atvejų. Vaikams be gydytojo nurodymo „Guttalax“ vartoti negalima. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas fruktozės netoleravimas. Nevartokite šio vaisto norėdami numesti svorio. Teksto peržiūros data 2024-12-2603_SB_Guttalax_V01_LT.

UŽKIETĖJUS VIDURIAMS VEIKIA PATIKIMAI IR NIEKAM NEPASTEIBINT.**NUO PILVO PŪTIMO**

-20 %

**SIMETIGAST FORTE****MEDICINOS PRIEMONĖS**

„SIMETIGAST FORTE“ 240 mg kapsulės (simetikonas) skirtos vartoti vyresniems nei 12 m. pacientams, esanti pilvo pūtimui, pilnumo jausmui pilve, raugėjimui. Taip pat galima naudoti prieš pilvo ertmės diagnostines procedūras, nes tai pagerina vaizdų kokybę. Vartoti: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. amžiaus jaunuoliai – po 1 kapsulę 2-3 kartus per parą. Prieš diagnostines procedūras: 1 kapsulė vakare dieną prieš tyrimą ir 1 kapsulė ryte tyrimo dieną. „SIMETIGAST FORTE BABY“ geriamieji lašai (simetikonas) skirti kūdikiams nuo 28-os gyvenimo dienos ir vaikams iki 12 metų. Vartoti: kūdikiams (nuo 28-os gyvenimo dienos) ir vaikams iki 2 metų 3 lašai prieš, per ar po kiekvieno valgio. Negalima vartoti daugiau kaip 18 lašų per dieną.

GREITOJI PAGALBA IŠPŪSTAM PILVUI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

Pasiūlymai galioja 2026 04 01 – 2026 04 30.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Nuolaidos taikomos prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą. Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį/informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepažeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojiui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvktu.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Daugiau informacijos NORFOS vaistinėje, tel. +370 800 10008, www.nvaistine.lt. MAMAI skirtas prekes ypatingomis kainomis greičiau ir patogiau užsisakykite internetinėje vaistinėje www.nvaistine.lt. Užsisakius prekių (išskyrus vaistinius preparatus) už 29 € ir daugiau – pristatymas NEMOKAMAS! Reklaminio teksto parengimo data – 2026 02 19.



NUO ALERGIJOS

8⁹⁹ €**ALLERGODIL**0,05 % akių lašai (tirpalas), 6 ml
0,1 % nosies purškalas (tirpalas), 10 ml**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

„Allergodil“, 0,1 % nosies purškalas (tirpalas): 1 ml tirpalo yra 1 mg (0,1 %) azelastino hidroklorido. **Terapinės indikacijos.** Simptominis nuolatinis alerginis slogos arba sezoninės alerginės slogos (Sienligės) gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Suaugusiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams įprastinė dozė yra 1 įpurškimas į šnervę 2 kartus per parą (ryte ir vakare). „Allergodil“ nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 6 m. vaikams. Vartoti į nosį. Pūrkiant vaistinio preparato į nosį, galvą reikia laikyti tiesiai. Vaistas tinka gydyti ilgą laiką. Nepasitarus su gydytoju, nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 4 savaites. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas azelastinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Nosies purškalas neskirtas vartoti į akis. Vengti kontakto su akimis. Vartojant kartu su alkoholiu, gali pasireikšti papildomos budrumo sumažėjimas. „Allergodil“, 0,05 %, akių lašai (tirpalas): 1 lašas tirpalo yra 0,05 mg azelastino hidroklorido. 1 ml tirpalo yra 0,5 mg azelastino hidroklorido. **Terapinės indikacijos.** Simptominis suaugusių ir vyresnių nei 4 m. amžiaus vaikų sezoninio alerginio konjunktyvito gydymas ir profilaktika. Simptominis suaugusių ir vyresnių nei 12 m. vaikų nuolatinio (nesazoninio) alerginio konjunktyvito gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Abiem indikacijoms įprastinė dozė yra 1 lašas į kiekvieną akį 2 kartus per dieną. Smarkaus paūmėjimo metu dozė gali būti padidinta iki 4 kartų per dieną po 1 lašą į kiekvieną akį. Gydymo ciklas neturėtų viršyti 6 savaičių. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas azelastino hidrokloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Jaunesni kaip 4 m. vaikai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Allergodil“ netinka akių infekcijoms gydyti. Sudėtyje yra benzalkonio hidroklorido, kuris gali sukelti akies sudirginimą, sausos akies simptomus ir gali daryti poveikį asarų plevėlei bet ragenos paviršiui. turi būti atsargiai vartojamas sergantys akies sausume ir jei yra ragenos paviršiaus pažeidimai. Prieš „Allergodil“ vartojimą kontaktiniai lęšiai turi būti išimti ir prieš įdėjant juos atgal reikia palaukti mažiausiai 15 minučių. **Reklamos teksto parengimo data** 2026-09-09.

5²⁵ €**OPEXA**

20 mg, 10 burnoje disperguojamų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Bilastinas, Opexa™ vartojamas Sienligės (kuriai būdingi simptomai yra čiaudulys, niežulys, sloga, užgulta nosis, paraudusios ir ašarojančios akys) ir kitų alerginio rinito formų simptomams slopinti. Jis taip pat gali būti vartojamas niežintiems odos išbėrimams (pūkslėms arba dilgėlinei) gydyti. Rekomenduojama paros dozė yra viena „Opexa“ 20 mg burnoje disperguojama tabletė. Tabletes reikia įgerti 1 valandą prieš valgymą arba praėjus 2 valandoms po valgymo arba subūlių gerimo. Burnoje disperguojama tabletė reikia įdėti į burną; selkėse į greitai disperguojasi ir tampa lengvai nuryjama. Kitaip burnoje disperguojamas tabletes prieš vartojimą gali būti ištrinti vandenyje. „Opexa“ vartoti draudžiama, jeigu Jums yra alergija bilastinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš pradėdami vartoti „Opexa“, jei Jums nustatytas vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų veiklos sutrikimas, mažas kalio, magnio, kalcio kiekis kraujyje, jeigu Jums pasireiškia arba pasireiškė širdies ritmo sutrikimai arba Jūsų širdies susitraukimų dažnis yra labai mažas, jeigu vartojate vaistų, galinčių paveikti širdies ritmą, jeigu Jums yra arba buvo tam tikrų širdies ritmo sutrikimų (vadinamasis QTc intervalo pailgėjimas elektrokardiogramoje), kurie gali pasireikšti sergant kitomis širdies ligų formomis, ir Jūs vartojate kitų vaistų. Neduokite šio vaisto jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Neviršykite rekomenduojamos dozės. Nevartokite „Opexa“ ilgiau nei 10 dienų nepasitarę su gydytoju. Jeigu per 3 dienas Jūsų sąjaujta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. **Nustatyta, kad bilastino 20 mg dozė nesukuria suaugusiųjų gebėjimo vairuoti.** Tačiau kiekvieno paciento reakcija į vaistą gali būti skirtinga. Todėl prieš vairuodami ar valdydami mechanizmus turite patikrinti, kaip šis vaistas Jūs veikia. **Reklamos teksto parengimo data** 2026-01. LT-OPE-1-2026_MFLOW. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, Lietuva.

**SUTRAMDYK ALERGIJĄ!**7⁴⁹ €**NASOMETIN**

50 mikrogramų/dozėje nosies purškalas, 60 dozių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje įpurškiamojo dozėje yra 50 mikrogramų mometazono furoato. **Terapinės indikacijos:** vaistas skirtas anksčiau gydytoju diagnozuoto suaugusiųjų sezoninio alerginio rinito simptomams gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** 2 įpurškimai į kiekvieną nosies landą 1 kartą per parą, vėliau – po 1 įpurškimą į kiekvieną nosies landą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, nesūdyta vietinė nosies gleivinės infekcija ar neužgyjusi žaizda po nosies operacijos ar traumos. **Specialūs įspėjimai:** kvėpavimo takų tuberkuliozė arba kita infekcija. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2636057. El.paštas: info.lithuania@sandoz.com. B52601079716. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026 01 07.

**KANKINA ALERGINĖ SLOGA? METAS TAI PAKEISTI!**

NUO ODOS SUDIRGINIMO

6⁹⁹ €**HYDROCORTISON ORIFARM, 10 mg/g gels, 10 g.****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Sudėtis. 1 g gelio yra 10 mg hidrokortizono. **Indikacijos.** Trumpalaikis lengvo odos niežulio ir sudirginimo malšinimas, esant nedideliams odos pažeidimams (pvz., po vabzdžių įgėlimo ar įkandimo). **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Suaugusiems 1–3 kartus per parą, vyresniems kaip 2 m. vaikams 1–2 kartus per parą ant odos tepi ploną sluoksnį gėlio. Vartoti ne ilgiau kaip 7 paras. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, rožinė, perioralinis dermatitas, paprastieji spuogai, bakterinė, grybelinė arba parazitinė odos infekcija, kai netaikomas reikiamas gydymas, įtariamas ausies būgnelio prakiurimas, vartojimas ant veido, išangės ar lytinių organų srities arba atvirų žaizdų, jaunesniems nei 2 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai.** Vartoti tik išorškai, saugotis, kad nepatektų į akis. Gali atsirasti odos atrofija, paūmėti virusinė, bakterinė ar grybelinė infekcija, sulėtėti žaizdų gijimas, pasireikšti regėjimo sutrikimai, ilgalaikis vartojimas ant veido gali sukelti kataraktą ar glaukomą. Jei atsiranda padidėjusio jautrumo simptomų, gydymą reikia nutraukti. Vengti vartojimo po uždarais drabužiais (įskaitant uždaras sauskelnes) ar vietoje, kur oda liečiasi su oda. **Reklamos teksto parengimo data:** 2022-04-14. LT-HYKO-2200001

NUMALŠINK IR ODOS SUDIRGINIMĄ, IR NIEŽĖJIMĄ!-40% 7^{49€} 12⁹⁹**ACONITUM**

VITAMIN C PROLONG, 40 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Vitamin C prolong“ kapsulėse yra prailginto veikimo patentuotas vitaminas Ester-C®. Moksliniai tyrimai rodo, kad patentuota Ester-C forma organizme išlieka iki 24 valandų, nedirgina skrandžio, nėra toksiška kepenims, lėčiau pašalinama iš organizmo. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, taip pat apsaugoti organizmą nuo oksidacinių pažeidimų bei sumažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: „Vitamin C prolong“ gerti po 1 kapsulę per dieną, užgeriant stikline vandens.

GERKLĖS DIRGINIMUI, UŽKIMIMUI IR SAUSAM KOSULIUI MALŠINTI

-20%

**HERBISLAND**16 kietųjų pastilių 8⁹⁹ 7¹⁹ €
sirupas, 150 ml 8⁹⁹ 6⁶³ €**MEDICINOS PRIEMONĖS**

Be cukraus. Apelsinų skonio. Kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 3 mg islandinių kerpenų sausosio ekstrakto (Cetraria islandica (L.) Acharius s.l., thallus), atitinkančio 90–120 mg islandinių kerpenų. Tai yra tradicinis augalinis preparatas, rekomenduojamas ryklės ir burnos gleivinės dirginimui ir su tuo susijusiam sausam kosuliui palengvinti. „Herbisland“ mažina kosulio receptorių dirginimą ir drėkina sausa ryklės gleivinę. Pastilių dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams po 1 kietąją pastilę 8 kartus per dieną. Sirupo dozavimas: 1–4 m. vaikams – 2,5 ml (1/2 matavimo šaukšto) 4 kartus per dieną; 4–10 m. vaikams – 5 ml (1 matavimo šaukštas) 4 kartus per dieną; 10–16 m. vaikams – 10 ml (2 matavimo šaukštai) 4 kartus per dieną; 16 m. ir vyresniems žmonėms – 15 ml (3 matavimo šaukštai) 4 kartus per dieną.

PASAKYK „STOP“ SAUSAM KOSULIUI!

GERKLĖS PERŠTĖJIMUI IR UŽKIMIMUI LENGVINTI

IKI -35%

**ISLA®****MEDICINOS PRIEMONĖS**

„Isla™“ pastilių su islandinėmis kerpenomis sudedamosios dalys padengia gleivines, gerklę ir ryklę kaip balzamas. Tokiu būdu sudirgusi gleivinė apsaugoma nuo tolesnio dirginimo ir greičiau atsigauja dėl maļonaus pastilių poveikio, ypač esant užkimimui ir perštinčiai gerklei. „Isla“ Ginger™, „Isla“ Mint™ suaugusieji ir vyresni kaip 4 metų vaikai turi lėtai čiulpti 1–2 pastiles keletą kartų per dieną pagal poreikį. „Isla“ Junior™, vyresniems kaip 4 metų amžiaus vaikams pagal poreikį galima duoti lėtai sučiulpti iki 6 pastilių per dieną. Reikia įsitikinti, kad vaikai jau sugeba kontroliuoti galimą čiulpti pastilę. „Isla“ Medic Acute™: suaugusiems ir vyresniems kaip 4 metų vaikams pagal poreikį galima sučiulpti iki 6 pastilių per dieną. **Reklamos teksto parengimo data** 2026-02-09. PM-LT-2026-2-709

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

NOSIES UŽGULIMUI MAŽINTI IR KASDIENI PRIEŽIŪRAI

-5%

**QUIXX®****MEDICINOS PRIEMONĖS**

„Quixx™“ efektyviai mažina peršalimo, gripo ar alergijos sukeltą nosies ir sinusų užsikimšimą. Dozavimas. Kūdikiams (nuo 6 mėn.) ir vaikams: 1–2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2–3 kartus per dieną. Suaugusiems: 1–3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2–3 kartus per dieną. „Quixx“ Acute™ padeda mažinti dėl peršalimo, gripo, alergijų ar alerginio rinito sudirgusių nosies landų užsikimšimą. Vaikams nuo 3 m. ir suaugusiems. Vartokite iki 5 kartų per parą, kol vargina užsikimšusi nosis ar sausi nosies takai. „Quixx“ Extra™ su eukaliptų aliejumi, mažina nosies ir sinusų užsikimšimą peršalus ir sergant gripu, stimuliuoja nosies ertmių išsivymą, suteikia stiprų gaivumo pojūtį. Dozavimas. Vaikams nuo 6 m.: 1–2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2–3 kartus per dieną. Suaugusiems ir paaugliams: 1–3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2–3 kartus per dieną. „Quixx“ Soft™ su alavijų ekstraktu – natūrali priemonė, drėkinanti jautrias nosies sienelės ir apsauganti nuo peršalimo sukeliamą nosyje jaučiamų simptomų. Dozavimas. Kūdikiams (nuo 6 mėn.) ir vaikams iki 5 m.: 1 įpurškimas į kiekvieną šnervę iki 4 kartų per dieną. Kūdikiams ir vaikams nuo 6 mėn. bei suaugusiems: prireikus 1–3 įpurškimai į kiekvieną šnervę kelis kartus per dieną. „Quixx“ Daily™ kruopščiai praskalauja nosį ir mažina bakterijų, virusų, alergenų bei žiedadulkių, kietųjų dalelių, dulkių kiekį. Vaikams nuo 2 m. ir suaugusiems. Vartokite iki 5 kartų per parą, kol vargina sausa ar sudirgusi nosies ertmė. „Quixx“ baby™ – mažųjų nosies priežiūra ir higienai nuo pirmosios gyvenimo dienos. Dozavimas. 1–3 lašai į kiekvieną nosies šnervę 2–6 kartus per dieną ar dažniau, jei reikia. Naujagimiams ir kūdikiams iki 3 m. rekomenduojama vartoti netiesiogiai, užlašinus ant vatų tamponėlių. Natūralios priemonės. Be konservantų LT_QUI_24_2024_V1_ Pharma Reklama paruošta 2024 m. spalio mėn. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius

KVEPUOKI LAUGA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

NUO 2⁴⁹ €

NUROFEN, 200 mg, 12 tablečių 2⁴⁹ €
NUROFEN FORTE, 400 mg, 12 tablečių 3⁴⁹ €
NUROFEN FORTE EXPRESS, 400 mg, 12 tablečių 3⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

NUROFEN I dengtoje tablete yra 200 mg ibuprofeno. **NUROFEN FORTE** ir **NUROFEN FORTE EXPRESS** I dengtoje tablete yra 400 mg ibuprofeno. **Terapinės indikacijos.** Trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių, mėnesinių sukeltos skausmo mažinimas, karščiavimo mažinimas. **NUROFEN dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams pradinė dozė yra 2 tabletės, užgeriant vandeniu. Po to, jei reikia, gerti po 1-2 tabletes kas 4 valandas. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 6 tabletes (1200 mg). **NUROFEN FORTE ir NUROFEN FORTE EXPRESS dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams pradinė dozė yra 1 tabletė, užgeriant vandeniu. Po to, jei reikia, gerti po vieną tabletę kas 8 valandas. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 3 tabletes (1200 mg). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai; jei praėjusieji yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijų (astma, rinitas, angioneurozinis patinimas, dilgėlinė); sunkus kepenų, inkstų, širdies nepakankamumas; paskutinis trijų nėštumo mėnesių laikotarpis; esama ar buvusi pepsinė opa (du ar daugiau atskirų įrodytų išėjimų ar kraujavimo epizodų); buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; kraujavimas iš smegenų, virškinimo trakto arba kitos kraujavimas; jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai.** Reikia atsargiai vartoti pacientams, kuriems yra sisteminė raudonoji vilkligė; anksčiau buvo padidėjęs kraujospūdis ir (arba) širdies nepakankamumas; jei yra nesunkūs inkstų, pakeičiamas ar inkstų funkcijos pažeidimas, jei yra nesunkūs kepenų funkcijos sutrikimai, pacientams, kurie sirgo opiniu kolitu, Krono liga, pacientams, kurie vartoja kraują skystinančių vaistinių preparatų bei vaistų, galinčių padidinti išėjimą ar kraujavimo pavojų. Gydytį ibuprofenu buvo pranešta apie sunkios odos reakcijas, įskaitant ekzimą, dermatitą, daugialopę eritemą, Stivenso-Žilersono sindromą, toksiinę epidermio nekrolizę, vaisto sukelta reakcija su eozinofilija ir sisteminiais simptomais (VRESS), ūmine generalizuota egzantemine pustuloze (IGEP), kuri gali būti pavojinga gyvybei arba mirtina. Jei atsiranda šių reakcijų požymių ir simptomų, ibuprofeno vartojimą reikia nedelsiant nutraukti. Šie vaistai gali būti susiję su nedideliu širdies priepuoliu ("miokardo infarkto") ar insulto pavojaus padidėjimu. Šie vaistiniai preparatai gali maskuoti infekcijos simptomus, todėl tai gali būti vėluojama pradėti tinkamą gydymą, o tai gali pabloginti infekcijos gydymo rezultatus. Šių vaistų negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Kiekvienoje tablete yra natrto, būtina atsisakyti, jei kontroliuojamas natrto kiekis maiste. Reikiamos tekstų parengimo data 2023-05-18.

NUO PERŠALIMO

NUO 4⁹⁹ €

DALERON COLD3

12 plėvele dengtų tablečių 4⁹⁹ €
24 plėvele dengtos tabletės 8⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Vienoje plėvele dengtoje tablete yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrinio hidrohlorido ir 15 mg deksketometorano hidrobromido. **Terapinės indikacijos.** Peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, sąnarių, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Įprasta dozė suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vaikams yra 2 tabletės. Tokią dozę galima gerti daugiausia 4 kartus per parą. Tarp dozių vartojimo turi būti praėjusio mažiausiai 4 valandos. Didžiausia paros dozė yra 8 tabletes. **Kontraindikacijos, specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Sunki hipertenzija ar šėminė širdies liga. Vartojama MAO inhibitorių, guanetidino arba jo darinių, beta blokiatorių arba vartojama kitų vaistinių preparatų, kuriuose yra paracetamolio. Sunkus kepenų arba inkstų funkcijos sutrikimas. Kartu vartojama kitų kraujagysles sutraukiančių vaistinių preparatų nosies gleivinės paburkimui mažinti, įskaitant vaistų vartojimą per burną ar į nosį. Anksčiau persirgęs miokardo infarktas, buvęs insultas arba šiuo metu esantis insulto rizikos faktorai. Sergama lėtiniu alkoholiu, gliukoma, feochromocitoma, sisteminė raudonoji vilkligė, cukrinii diabetu, hipertenzizmu ar badaujama. Esant prostatos padidėjimui ar anksčiau buvo traukuliai. Reikiamos tekstų parengimo data: 2023.10.17.

PRADEDA VEIKTI JAU PER 20 MINUČIŲ!

6⁹⁹ €

PELAFEN

geriamieji lašai (tirpalas), 20 ml
sirupas, 100 ml

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Vieklisios medžiagos, stiprumas: 10 g „Pelafen“ geriamųjų lašų (~10 ml) yra 8 g Pelargonium sidoides DC ir (arba) Pelargonium reniforme Curt., radix (pelargonijų šaknų) tinktūros (13–10). Ekstrakcijos tipikis: 1 g = 20 lašų. Kiekviename „Pelafen“ sirupo mililitre yra 8 mg Pelargonium sidoides DC ir (arba) Pelargonium reniforme Curt., radix (pelargonijų šaknų) sausgo ekstrakto (4-25). Ekstrakcijos tipikis: 1 l = 11 (m/m) etanolis. Terapinės indikacijos: „Pelafen“ yra tradicinis augalinis vaistas, skirtas peršalimo simptomams gydyti. Tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. „Pelafen“ skirtas suaugusiems, paaugliams ir vyresniems nei 6 m. vaikams. Dozavimas ir vartojimo metodas: geriamuosius lašus vartoti per burną, 12 m. ir vyresniems paaugliams, suaugusiems ir senyviems pacientams: po 30 lašų 3 kartus per parą, 6–11 m. vaikams ir paaugliams: po 20 lašų 3 kartus per parą. Reikiamą kiekį lašų galima gerti tiesiai iš šaukšto arba, jei pageidaujama, galima sumaišyti su puse stiklinės vandens ir iš karto išgerti visa stiklinę turini. Dozė reikia gerti ryte, vidurdienį ir vakare. Jaunesniems nei 6 m. vaikams šio vaistinio preparato vartoti nerekomenduojama. Jei vartojant vaistinį preparatą po 7 dienų simptomai pasunkėja arba išlieka, pacientui būtina kreiptis į gydytoją. Sirupą vartoti per burną, naudojant pridėjamą matavimo taurelę. Prieš vartojimą buteliuką reikia gerai pakratyti. 12 m. ir vyresniems paaugliams, suaugusiems ir senyviems žmonėms: po 25 ml sirupo 3 kartus per parą, 6–11 m. vaikams ir paaugliams: po 25 ml sirupo 2 kartus per parą. Jaunesniems nei 6 m. vaikams šio vaistinio preparato vartoti nerekomenduojama. Jei vartojant vaistinį preparatą po 7 dienų simptomai pasunkėja arba išlieka, pacientui būtina kreiptis į gydytoją. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: pastirkite su gydytoju, jei pasireiškia dusulys, karščiavimas arba atsiranda kraujingų ar pilingų gleivių. Jei atsiranda toksiškos poodinės kepenims požymių (pvz., pykinimas, apeltis pragalimas, epigastrinio (viršutinio pilvo dalies) skausmas, nuovargis, geltona odos spalva), reikia nedelsiant nutraukti vaisto vartojimą ir kreiptis į gydytoją. Kasdienas, nešumo ir žindymo laikotarpis. „Pelafen“ nerekomenduojama vartoti nėštumo ir žindymo metu. Registravimas: „Phytopharm Kleja S.A.“, Kleja 1, 65-040 Nove Mesto nad Warf, Lenkija. Atstovs Lietuvoje: UAB „Sirona Vilnius“. Reikiamos tekstų parengimo data 2023-02-21.

-30 %

SILVANOLS

MAISTO PAPILAI

„Atmosil“ kapsulės – unikalūs maisto papildas kvėpavimo sistemai su augaliniais ekstraktais ir augalinės kilmės medžiagomis. Produkto sudėtis sukuria remiantis augalinių ekstraktų ir bioaktyvių medžiagų deriniais, kurie yra tiriami atliekant mokslinius stebėjimus. Nuo 12 metų. „Silvadep“ kapsulės – augalinės kilmės maisto papildas suaugusiems, skirtas emocinei pusiausvyrai ir bendrai savijautai palaikyti. „Faringospray KIDS“ – naujienat! Gerklės pūskalas vaikams su čiobreliais ir liepžiedžiais. Čiobreliai ir liepžiedžiai padeda palaikyti normalią gerklės, ryklės ir burnos ertmės būklę. Vaikams nuo 4 metų. Be etanolio. Be konservantų. Be dirbtinių dažiklių. „Faringospray“ – minkštosios gerklės pastilės su šaltalankiais ir medetkomis normaliai kvėpavimo takų veiklai. Klasikinio arba apelsinų skonio. Nuo 12 metų. Be etanolio. Be konservantų. Be dirbtinių dažiklių. „Faringo Lollipop“ – šaltalankių ledinukai su vitaminu C. Šaltalankiai padeda palaikyti normalią gleivinių būklę. Vitaminas C palaiko tinkamą imuniteto sistemos veiklą. Be konservantų. Be dirbtinių dažiklių. „Faringo SOFT“ – minkštosios gerklės pastilės su šaltalankiais aliejumi, hialuronu rožstimi, vaistinėmis svirazolemis(KKCI1), vitaminais B2, C ir biotinu. Vaikams nuo 4 metų ir suaugusiems. Be cukraus. Be laktozės. „Laringospray“ – gerklės pūskalas su propoliu ir medetkų žiedų tinktūra. Nuo 12 metų. Be dirbtinių dažiklių.

*Kai kuriose apelsinų etiketėse pažymėtos prekės

8⁹⁹ €

ACTIFED®, 60 mg/2,5 mg, 12 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tablete yra 60 mg pseudoefedrinio hidrohlorido ir 2,5 mg triprolidino hidrohlorido. **Terapinės indikacijos:** nosies ir viršutinių kvėpavimo takų gleivinės užburkimo mažinimas; nosies tekėjimo ir čiaudulio slopinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: po 1 tablete kas 4-6 val., iki 4 kartų per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; pacientai, kurie per pastarąsias 14 dienų vartojo monoamino oksidazės inhibitorių; širdies ir kraujagyslių ligos; sunki hipertenzija arba jeigu hipertenzija nesureguliuota skiriant vaistų; sunki ūminė ar lėtinė inkstų liga arba inkstų nepakankamumas; cukrinis diabetas; feochromocitoma; hipertirozė; ūdaro kampo gliukoma; kitų simpatimimetinių gleivinės paburkimo mažinančių vaistų ir beta blokiatorių vartojimas; vaikai iki 12 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Actifed“ gali sukelti mieguistumą. Nevartoti kartu alkoholio. „Actifed“ vartojimą reikia nutraukti, jei pasireiškia šie sutrikimai: haluciacijos, neramumas, miego sutrikimai, karščiavimas ir išplitusi raudonė su smulkiais pūlinėliais, staigus regos neaiškumas arba regos aštrumo sumažėjimas, staigus pilvo skausmas, kraujavimas iš išangės ar kiti išeminio kolito simptomai. Nedelsiant nutraukite „Actifed“ vartojimą ir kreipkitės suaugusiųjų medicinos pagalbos, jeigu pasireiškė stiprus, staiga prasidėjęs galvos skausmas, pykinimas, vėmimas, sumišimas, traukuliai, pakitusi rega. Ligoniai, sergančys kepenų liga, vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimu, „Actifed“ turėtų vartoti atsargiai. Vaistas negali būti vartojamas vaikams raminti. „Actifed“ tablečių sudėtyje yra laktozės. Reikiamos tekstų parengimo data 2026-03-12. LT-ACF-2026-309012.

7⁹⁷ €

ILOXEN, 200 mg/30 mg 12 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Vieklisios medžiagos ir stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tablete yra 200 mg feno ir 30 mg pseudoefedrinio hidrohlorido. **Terapinės indikacijos:** „Iloven“ vartojamas kaip suaugusiųjų ir 15 m. bei vyresnių paauglių peršalimo (nosies užgulimas, pasireiškęs kartu su galvos skausmu ir (arba) karščiavimu) simptomais gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tablete reikia nuryti nepažeistą ir nekramtytą, užgeriant didele stikline vandens, geriausia – valgio metu. Suaugusiems ir 15 m. bei vyresniems paaugliams – po 1 tablete kas 6 val. pagal poreikį. Jeigu simptomai išlieka stipriai: po 2 tabletes kas 6 val. pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 6 tabletes per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios šio vaisto medžiagoms; pacientas yra vėles kaip 15 m. moteris trečią nėštumo trimestrą, žindymo laikotarpis; anksčiau pasireiškę alerginiai reakcija arba dusulys, astma, šėminis, nosies ir nosies gleivinės ir nosies patinimas, sukeliantis nosies ar kitų nosies ertmės vaistų nuo uždegimo (NVNU), virškinimo trakto kraujavimas arba perforacija, anksčiau pasireiškę vartojant NVNU, skundžiai ar dykligės žarnos opa ar kraujavimas arba anksčiau buvo 2 arba daugiau atskirų patvirtintų opas ar kraujavimo epizodų; sunkus kepenų nepakankamumas; sunki ūminė ar lėtinė inkstų liga arba sunkus ūminis ar lėtinis inkstų nepakankamumas; sunkus širdies ar kraujagyslių sutrikimas (širdies liga, aukštas kraujospūdis, lėtinė angina, padidėjęs širdies susitraukimų, padidėjęs širdies kraujavimas, diabetas arba feochromocitoma (atriuščių navikas); jei anksčiau patyrė širdies priepuolį (miokardo infarktą), patyrė insultą arba gydytojas yra Jums sakęs, kad turite padidėjusio insulto riziką; yra labai padidėjęs kraujospūdis arba jeigu hipertenzija nesureguliuota skiriant vaistų; jei Jums yra buvę traukulių, dėl neaiškios priežasties sutrūkių kraują ganybą; padidėjęs akispūdis (sergate ūdaro kampo gliukoma); pasunkėjęs šlapinimasis dėl prostatos sutrikimų, diagnozuota sisteminė raudonoji vilkligė; negalima vartoti kartu su kitais vaistais nuo nosies užgulimo, medžiagomis, kitiems vaistams nuo depresijos. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Iloven“ reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU. Pastariktis su gydytoju arba vaistininku, jei sergate bronchių astma, cukrinii diabetu, psichozė, yra padidėjęs širdies kraujavimas, yra buvęs kolitas nosies virškinimo trakto sutrikimas ar sergate arba sirgote virškinimo trakto liga, padidėjęs kraujospūdis, nesveiki įstai ar kepenys, sutrikęs kraujo kreėjimas, sergate infekcine liga, sergate širdies liga, įskaitant širdies nepakankamumą ir krūtinės anginą (krūtinės skausmą), arba jeigu anksčiau Jūs buvę širdies širdies priepuolį, atlikta kraujagyslių šuntavimo operacija, sergate periferinių arterijų liga arba Jūs buvę išties bet koks insultas, jeigu padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje. Jūsų sėmos naria serga ar sirgo širdies liga ar insultu, rikoletė. Nutraukite „Iloven“ vartojimą ir susisieki su gydytoju arba skubiai kreipkitės medicinos pagalbos, jei pasireiškia staigus pilvo skausmas, kraujavimas iš išangės ar kiti išeminio kolito simptomai, jei Jums pasireiškė odos bėrimas, gleivinių pažeidimas, pūslės ar kitų alergijos požymių, jeigu staiga pradedate regėjimą; jeigu Jums pasireiškė ūplėtinis gliūzmosos encefalopatinis sindromas (UEES) ar gliūzmosos smegenų vazokonstriktinis sindromas (GSVS) simptomai; stiprus staiga prasidėjęs galvos skausmas, pykinimo jausmas, vėmimas, sumišimas, traukuliai, pakitusi rega. Reikiamos tekstų parengimo data: 2024-11-27.

DVGUBAS SMŪGIS SINUSITUI!

4⁹⁹ €

FLUDITEC

20 mg/ml, sirupas, 125 ml
50 mg/ml, sirupas, 125 ml

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Karbocisteinas

„Fluditec“ 20 mg/ml sirupas skiriamas bronchių sekrecijos sutrikimams gydyti vaikams nuo 2 m., ypač ūminio bronchito atveju; ūminis bronchitas ir ūminė lėtinė bronchopneumonijos krizė. **Dozavimas.** 1 dozavimo taurele (sugrudojute po 5 ml) yra 100 mg karbocisteino. Vyresni kaip 5 m. vaikai: 3 kartus per parą geriami po 100 mg (vieną iki 5 ml žymos pripildyta dozavimo taurele). 2-5 m. vaikai: 2 kartus per parą geriami po 100 mg (vieną iki 5 ml žymos pripildyta dozavimo taurele). „Fluditec“ 50 mg/ml sirupas skiriamas suaugusiems nuo 15 m. ir vyresniems kvėpavimo takų ligoms, susijusioms su apsinkečiu skreplių išsiskyrimu (kai sunku pašalinti bronchių skreplius kosint), gydyti. **Dozavimas.** Rekomenduojama gerti po 1 dozavimo taurelę ryte, per pietus ir vakare, nevajgius, nevirsijant 3 dozavimo taurelių per parą. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, sergant aktyvia pepsine opa, kitiškiams ir jaunesniems kaip 2 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai.** Esant produktiviam kosuliui su pilnais skrepliais, karščiavimu ar sergant lėtine bronchių medžio ar plaučių liga, klinikinė situacija turi būti vertinama pakartotinai. Produktivus kosulys yra esminė bronchių ir plaučių grybos mechanizmo dalis, todėl netur būti slopinamas. Neacionalu bronchių gleivinės modifikatoriaus derinti su vaistais nuo kosulio ir (arba) skreplų sausinančiomis medžiagomis (cholinoblokatoriais, pvz., atropinu). Esant oro srauto bronchose sutrikimui, pavojinga vartoti kosulį slopinančių ir (ar) gleivies skystinančių preparatų dėl bronchių užsikimšimo sekreto tikimybės. Mukoliziniai vaistiniai preparatai kodiškiams gali sukelti bronchių užsikimšimą. Kudiškių ir jaunesnių kaip 2 m. vaikų gebėjimas iškosti bronchose išsiskiriančias gleives yra ribotas dėl jų fiziologinių kvėpavimo takų ypatybių. Juos draudžiama vartoti kodiškiams ir jaunesniems kaip 2 m. vaikams. Jeigu simptomai ar liga išlieka arba pasunkėja, gydymo taktiką būtina įvertinti iš naujo. Reikiamos tekstų parengimo data 2025-11.



ODOS IR LŪPŲ PŪSLELINEI GYDYTI

5⁹⁹ €



ACIC, 5% kremas, 2 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g kremo yra 50 mg acikloviro. **Terapinės indikacijos:** odos ir lūpų pūslelinė, kurią sukelia *Herpes simplex* virusas, gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** pažeista odos vietą tepti plonu sluoksniu 5 kartus per parą kas 4 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas acikloviro, valacikloviro, propilenglikoliui arba bet kurioms pagalbinėms medžiagoms. Netepti ant gleivinės (burnos, akių, makšties). **Specialūs įspėjimai:** vaisto draudžiama nuryti. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS260106962. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSLELINĘ SU „ACIC“!

ODOS PRIEŽIŪRAI

-20%

BEPANTHEN®

ANTI-EXEM, kremas, 50 g **14⁹² 11⁹⁸ €**

MEDICINOS PRIEMONĖ

Kliniškai patikrintas kremas be hormonų slopina atopines egzemas (atopinio dermatito), odos išsausėjimo sukelia niežėjimą ir paraudimą, atstoja apsauginį odos barjerą. Numalšina odos niežėjimą vos per 30 minučių, poveikis išlieka mažiausiai 7 valandas. Krema galima vartoti tiek gydymo hormoniniais preparatais, tiek pertraukiant tarp hormoninio gydymo metu. Tinka kūdikiams, vaikams ir suaugusiems. Galima vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu, odai apie akis.

SENSICONTROL®, prausimosi gelis, 400 ml **17⁹⁹ 14³⁹ €**

SENSICONTROL®, kremas, 200 ml **17⁹⁹ 14³⁹ €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Bepanthen Sensitive“ – kasdienis prausimosi gelis jautriai ir į egzemą linkusiai odai. Nuramina, drėkina odą, prisitaiko prie jūsų odos pH, saugo natūralų odos barjerą ir mikrobiomą. Sudėtyje yra provitamino B5 ir prebiotikų. Tinka visai šeimai.

„Bepanthen Sensitive“ – kremas, skirtas jautriai, atopinei, į egzemą linkusiai odai. Kliniškai patikrinta „Dermo-Defense“ formulė, papildyta prebiotikų, sukelia kasdienio odos apsaugą: palaiko odos apsauginę mikroflorą, stiprina odos barjerinę funkciją, užtikrina ilgalaikį, iki 24 val. trunkantį, drėkinimą ir padeda raminti sausą, niežtinčią odą. Greitai įsigėriantis kremas tinka kūniui, veidui ir akių vokams. Tinka visai šeimai.

Reklamos teksto parengimo data 2026-02. CH-20260203-57

„BEPANTHEN“ PRODUKTŲ LINIJA | EGZEMĄ LINKUSIOS ODOS SVEIKATAI!

BAKTERIJŲ AUGIMĄ STABDANTIS PAVIRŠINIŲ ŽAIZDŲ ANTISEPTIKAS

NUO 6⁹⁹ €



OCTEZY

OCTEZY, 1 mg/20 mg/g, odos purškalas (tirpalas), 50 ml **6⁹⁹ €**

OCTEZY, 1 mg/20 mg/g odos purškalas (tirpalas), 100 ml **9⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos stiprumas: kiekviename tirpalo gramе yra 1 mg oktenidino dihidrochlorido ir 20 mg fenoksietanolio. **Terapinės indikacijos:** visų amžiaus grupių pacientų kartotinis trumpalaikis pagalbinis mažų, paviršinių žaizdų antiseptinis gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems žmonėms ir vaikams „Octezy“ vartojamas ant gydymo srities, kol ji bus visiškai sudrėkinta. Pavartojus šį vaistinį preparatą ir prieš imantis kitų priemonių, pvz., uždedant ant žaizdos tvarstį, reikia palaukti mažiausiai 1–2 minutes. „Octezy“ turi būti vartojamas ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Jaunesniems kaip 6 m. vaikams vartojimą reikia riboti iki kelių dienų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Octezy“ negalima nuryti, vartoti didesniais kiekiais nei būtina. Siekiant išvengti ausinių pažeidimų, reikia būti atsargiems plaukiant žaizdą ir užtikrinti, kad vaistinis preparatas nebūtų naudojamas su slėgiu ar suleidžiamas į ausinius. Esant žaizdai su eritemomis, reikia užtikrinti, kad bet kurio metu būtų užtikrintas jo išsileidimas. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. „Octezy“ draudžiama vartoti pilvo ertmei (t. y. intraoperacinei), šlapimo pūslės ar ausies būgneliui plauti. Čia pateiktas sutrumpintas vaistinio preparato aprašas. Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje <http://www.vvkt.lt>. Reklamos teksto parengimo data 2026-03.

-30%

Perkant bent DVI bet kurias pakuotes



DERMATONICS

DRY SKIN, balzamas, 60 ml **9⁹⁹ €**

ULTRAveen ITCH RELIEF, kremas, 60 ml **9⁹⁹ €**

ONCE, kulnų balzamas, 60 ml **8⁹⁹ €**

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Dermatronics Itch Relief Cream“ ramina sudirgintą odą ir efektyviai mažina niežėjimą, todėl gali būti siūlomas kaip alternatyva atopiniu dermatitu sergantiems žmonėms. Specialioje kremo sudėtyje yra 3% koloidinių alyvuogių drabužių ir 5% šlapalo.

„Dermatronics Dry Skin Balm“ greitai ir itin efektyviai padeda gerinti odos drėkinimą ir bendrą jos būklę. Sudėtyje yra 10% karbamido ir kitų palaikomųjų emolientų. Tinka kūno, rankų ir pėdų odai drėkinti. Tinka cukrinii diabetu sergantiems žmonėms.

„Dermatronics Once Heel Balm“ – sausas, šlurkščias, suragėjusiai kulnų ir padų odai. Produkto sudėtyje yra 25% šlapalo, kuris veikia kaip drėkiklis, sulauko vandenį raginamą sluoksnį, padeda šalinti negyvas odos ląsteles. Užtenka naudoti kartą per dieną. Rezultatas matomas po 24 valandų.

IKI -30%



URGO

„Urgo“ pleistrai – inovatyvūs produktai padės prižiūrėti paviršines žaizdas. Tai patogūs, alergijos nesukeliantys bei orui pralaidūs pleistrai, kurių nelipni pleistro pagalvėlė impregnuota antiseptiniu tirpalu, žaizdeles saugančiu nuo bakterijų.

„Urgo Filmogel“ geliai – naujos kartos technologija pažeistiems nagams, pūslelinei, burnos žaizdoms, gelis odos įtrūkims ir purškiamas pleistras mažiems odos įtrūkims.

„URGO“ – PLEISTRŲ EKSPERTAI JAU 60 METŲ. PRIŽIŪRIMOS ŽAIZDOS GYJA GREIČIAU!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-40%



NIZORAL

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Nizoral“ Care“ šampūnas sausai ir jautriai galvos odai. Labai sausi, pleiskanojančiai, jautriai ir į egzemą linkusiai galvos odai.

„Nizoral“ Care“ šampūnas riebiai galvos odai ir plaukams. Valo galvos odą, šalina pleiskanas, mažina niežėjimą.

„Nizoral“ Care“ galvos odos ir plaukų kondicionierius. Maitina plaukus, ramina galvos odą.

„Nizoral“ Care“ galvos tonikas. Greitai ramina niežtinčią ir pleiskanojančią galvos odą.

2603_SB_Nizoral_V01_LT

„NIZORAL“ KOSMETIKOS PRIEMONĖS NUO PLEISKANŲ KASDIENEI JŪSŲ GALVOS ODOS PRIEŽIŪRAI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

ŽAIZDŲ GIJIMUI SKATINTI

-20%



HELP4SKIN

WOUND HEALING, gelis, 20 g **6⁹⁹ 5⁹⁹ €**

WOUND HEALING, gelis, 50 g **12⁹² 10⁹⁸ €**

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Help4skin Wound Healing“ yra hidrokoloidinis gelis be parabenų, skirtas lokaliai sausų ir šlapių žaizdų priežiūrai bei jų gijimui skatinti. Skirtas gydyti ūminėmis ar lėtinėmis žaizdoms, tokioms kaip: žaizdos (įskaitant chirurgines); įpjovimai, įbrėžimai; odos nubrozdinimai ir įtrūkimai; atviros kojų opos; paviršiniai nudegimai (I ir IIA laipsnio); pragulos. Galima naudoti vyresniems nei 2 m. vaikams.

PAPRASTA IR EFEKTYVU.

-40%

boderm



OLIPROX

nagų lakas grybeliui (gelis vandens pagrindu), 12 ml **24⁹⁸ 12⁹⁹ €**

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Oliprox“ nagų lakas (gelis vandens pagrindu) – veiksminga priemonė, padedanti užkirsti kelią grybelinei infekcijai bei pagalbinė priemonė gydant onichomikozę (nagų grybelį).

NUO 4⁹⁹ €

OLFEN
1 % gelis, 50 g 4⁹⁹ €
1 % gelis, 100 g 7⁹⁹ €
23,2 mg/g gelis, 50 g 5⁹⁹ €
23,2 mg/g gelis, 100 g 8⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 g gelyo yra 10 mg diklofenako natrio druskos arba 23,2 mg diklofenako dietilamino, atitinkančio 20 mg diklofenako natrio druskos. **Terapinės indikacijos.** Suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams skirtas lokaliai skausmo simptomams malšinti, esant trimains (šilpimams, patempimams ar sumušimams po bukus traumos; minkštųjų audinių uždegimų slopinti (esant tendinitui, bursitui), 14 m. ir vyresniems paaugliams vaistinis preparatas skirtas gydyti trumpą laiką. **Dovavimas ir vartojimo metodas.** Atsivėlgiant į gydomos kūno dalies dydį, 2-4 g (maždaug 1-2 pilnus antšaukus), Olfen 1% gelyo tepama 3-4 kartus per parą ir toliau paskirstoma (štrichi nereikia). Neviršyti 16 g gelyo paros dozės. Gydymo trukmė priklauso nuo terapinių indikacijų bei vaistinio preparato poveikio. Nepašalinus sužalojimo suaugusiems, Olfen 1% gelyo negalima tepti ilgiau kaip 14 parų, o paaugliams – ilgiau kaip 7 paras. Jeigu per 7 dienas simptomai išlieka arba būklė pasivėluoja, reikia kreiptis į gydytoją. **„Olfen“ 23,2 mg/g gelyo reikia vartoti ant odos 2 kartus per parą (geriausiu atveju vakare).** Atsivėlgiant į gydomos paviršiaus vietos dydį, reikia nuo viršaus iki galios išreidžiu dydžio gelyo kiekio, atitinkančio 1-4 g gelyo, kuris atitinka 20-80 mg diklofenako natrio druskos. Didžiausia paros dozė yra 8 g gelyo, kuris atitinka 165 mg diklofenako dietilamino (atitinkančio 160 mg diklofenako natrio druskos). Vartojimo trukmė priklauso nuo simptomų bei pagrindinės ligos. Be gydytojo patarimo „Olfen“ negalima vartoti ilgiau kaip 1 savaitę. Jeigu per 3-5 dienas simptomai nepagerėja arba net pablogėja, būtina gydytojo konsultacija. **Kontraindikacijos.** „Olfen“ vartoti draudžiama: jeigu yra alergija diklofenakiui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu Jums kada nors anksčiau pasireikšė acetilsalicilo rūgšties arba kitų NVNU (pvz., ibuprofeno) buvusi sunki kvėpavimo (astma, bronchų spazmas), odinė, šlapimo, virškinimo trakto, kraujavimo, inkstų, kepenų, širdies, kraujagyslių, aritmijų, vidurių užkietėjimo, uždegimų, odinių reakcijų, taip pat sergant egzema; psichinių nežmonių immedžiavimui kaip 14 m. vaikams ir paaugliams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės** reikalingi, jei sergate astma, širdelio, nesios, gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės trūkumo, inkstų, kepenų, kraujagyslių, inkstų, infekcijomis arba yra padidėjęs jautrumas kitiems skausmo malšantiems vaistams ir bet kuriems vaistams nuo reumatizmo, taip pat pacientams, kurie yra alergiški kitiems medžiagoms ir kuriems būna odos reakcijų, pasireiškus nelygumams arba odinėms. Kai „Olfen“ vartojamas dideliais odos plotais ir ilgą laiką, negalima parengti galimo sisteminio šalutinio poveikio. „Olfen“ galima vartoti tik ant nepažeistos ir sveikos odos. Venkite patekimo į akis ir kontakto su gleivinėmis. Nesuvaldoma oru nepažeidžiamas tvarstis. „Olfen“ vartojama reikia nubausti, jei atsiranda odos bėrimas. Vartojant šį vaistą vengti saulės spindulių, taip pat nesirūpinkite soliariumu. Saugokite, kad vaikai negalėtų patekti šio vaisto gydomos odos vietai. „Olfen“ 1% vartoti atargiai, jeigu inkstų, širdies ar kepenų funkcija sutrikusi, turite arba buvę anksčiau skrandžio opa, žarnyno uždegimas ar esate linke į kraująvą. **Teksto peržiūros data „Olfen“, 1% – 2024-09-05, „Olfen“, 23,2 mg/g – 2025-10-10. Reklaminių medžiagų parengimo data 2025-03. OLF-00047.**

NUO 2⁴⁹ €

PARACETAMOL ACTAVIS

500 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tablete yra 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos.** Trumpalaikis karščiavimas mažinimas. Lengvo ir vidutinio stiprumo skausmo (pvz., galvos, dantų, sąnarių, raumenų, mėnesinių) malšinimas. **Dovavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems: įprastinė dozė yra 500-1000 mg kas 4-6 val. pagal poreikį. Didžiausia paros dozė yra 3 g, didžiausia vienkartinė – 1000 mg. „Paracetamol Actavis“ saugumas ir veiksmingumas vaikams, svėriantiems iki 50 kg, neštišti. Pacientams, kurie nuolat vartoja alkoholi, intervalas tarp dozių vartojimo turi būti bent 8 val. Jiems negalima viršyti 2 g paros dozės. Jeigu praėjus daugiau kaip 3 paroms nuo gydymo pradžios didelis karščiavimas ar infekcijos požymiai išlieka arba jeigu praėjus daugiau kaip 3 paroms nuo gydymo pradžios skausmas išlieka, pacientą reikia iširti dėl simptomų sukeliusios priežasties. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Sunkios kepenų funkcijos nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Ilgalaikis arba dažnas vartojimas nerekomenduojamas, negalima vartoti kartu kitokių paracetamolio turinčių vaistinių preparatų. Visą paros dozę vartojant vienu metu ar perdozavimo atveju, gali pasireikšti sunki kepenų pažeida. Tokiu atveju samones pacientas neperanda, tačiau jis turi nedelsiant kreiptis į gydytoją. Pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų nepakankamumas, lengvas arba vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumas (skaitant Gilbert sindromą), sunkus kepenų nepakankamumas ar ūminis hepatitas, vartojantiems kepenų funkciją veikiančių vaistinių preparatų, taip pat tiems, kuriems yra gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės trūkumas, hemolizė anemija ar dehidracija, sergantiems astma, piktnaudžiaujantiems alkoholiu arba nuolat blogai besimatinantiems, paracetamolio patariama vartoti atsargiai. Po ilgalaikio (> 3 mėn.) gydymo, kurio metu paracetamolio buvo vartota kas antra parą arba dažniau, gali pasireikšti arba sustiprėti galvos skausmas. Pacientams, kuriems nustatytas mažas gliukotino kiekis, paracetamolio vartojimas gali didinti metabolinės acidozės riziką. Dėl sudėtyje esančios laktazės šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. „Paracetamol Actavis“ sudėtyje yra kviečių krakmolo. Tinka sergantiems celiakija. Šio vaistinio preparato negalima vartoti kvėpiams alergiškiems pacientams (ši liga skiriasi nuo celiakijos). **Teksto peržiūros data 2025-01-02. Reklamų teksto parengimo data 2025-04-04. OTC-01-00094**

SKAUSMUI MALŠINTI

NUO 3⁹⁹ €

NEOASKOFENAS, 200 mg/200 mg/40 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tablete yra 200 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg paracetamolio ir 40 mg kofeino. **Terapinės indikacijos:** vaistas vartojamas silpno ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių ir menstruaciniam skausmui malšinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Tabletes reikia vartoti nekrantant, užgeriant ne mažiau kaip 250 ml vandens. Atsivėlgiant į ligo sunkumą, vartoti po 1 tablete 1-4 kartus per dieną. Didžiausia paros dozė – 4 tabletes. Negalima vaisto gerti dažniau kaip 6 valandas. Skausmui malšinti vaisto galima vartoti ne ilgiau kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, esanti ar buvusi virškinimo trakto opa ir (arba) kraujavimas iš virškinimo trakto, buvusi bronchų astma, kurią sukėlė salicilatai ar kitokie nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, pacientas jauniems negu 12 metų, trys paskutiniai nęštumo mėnesiai, žindymas, ligos, kurių metu yra padidėjęs kraujavimo pavojus, kraujo krešėjimo sutrikimas, vartojama 15 mg ar didesnė metotreksato savaitės dozė, sunkus širdies, kepenų, inkstų nepakankamumas, labai sunki padidėjusio kraujo spaudimo liga, kamuoja nemiga, padidėjęs nervingumas, dirglumas, nemigos, baimė, sąjauadinimas ar kiti panašūs simptomai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pastarite su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergate podagra, bronchų astma, kolagenozėmis ar kraujodaros sistemos ligomis, sustiprėjusį skydliaukės veiklą ar sergate cukriniu diabetu, yra virškinimo trakto, inkstų, kepenų ar širdies funkcijos sutrikimų, yra buvusi alergija kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, planuojama chirurginė operacija, pacientas jaunesnis kaip 16 metų ir serga virusinėmis ligomis, pacientas yra senyvas, planuojama pastoti, atsiranda šlapimo pakitimu, pasireiškia pabrinkimų ar skausmas juosmens srityje, pagelsta oda ar akys, pasireiškia bendras silpnumas, yra nerimo sutrikimas, nemiga. Sudėtyje esantis kofeinas gali sukelti drebulį, dažną širdies plakimą, viduriavimą, susijaujinimą, stiprų širdies plakimą, nemigą, galvos skausmą, raumenų trūkčiojimą ir šlapimo išsiskyrimo padidėjimą. **Reklamų teksto parengimo data 2024-11-12.**

EFEKTYVI PAGALBA ESANT SUMUŠIMUI, PATEMPIMUI, PANIRIMUI

NUO 9⁹⁹ €

TRAUMEEL S

tėpalas, 50 g 9⁹⁹ €
tėpalas, 100 g 16⁹⁹ €


NERECEPTINIS HOMOOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS

100 g tepalo yra veikliųjų medžiagų: *Arnica montana* 0,15 g, *Galendula officinalis* 0,45 g, *Hamamelis virginiana* 0,45 g, *Echinacea angustifolia* 0,05 g, *Echinacea purpurea* 0,05 g, *Chamomilla recutita* 0,05 g, *Symphoricarpos officinalis* 0,04 g, *Bellis perennis* 0,01 g, *Hypericum perforatum* 0,09 g, *Achillea millefolium* 0,09 g, *Aconitum napellus* 0,005 g, *Atropa belladonna* 0,005 g, *Mercurius solubilis* Hahnemann 0,04 g, *Hepar sulfuris* 0,025 g. **Terapinės indikacijos.** Būki traumų (pvz., raiščių patempimų, sumušimų, panirimo, mėlynių), kaulų ir sąnarių degeneracijos simptomams gydymas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Dovavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: vartoti 2 kartus per dieną arba, jei reikia, dažniau. 0-2 m. vaikams: vartoti 2 kartus per dieną arba, jei reikia, dažniau. 2-6 m. vaikams: vartoti 2 kartus per dieną arba, jei reikia, dažniau. 6-12 m. vaikams: vartoti 2 kartus per dieną arba, jei reikia, dažniau. Vartoti ant odos. Patepti otonu slopsniai pažeista vieta. Ant gydomos vietos galima uždėti tvarstį. **„Traumeel S“ tepalu negalima tepi didelio ploto, vartoti ilgiai arba tepti tiesiai ant atvirų žaizdų. Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms, pvz., kalninei amikai (*Arnica montana*), vaistinei ramnei (*Chamomilla recutita*), paprastajai kraujazolei (*Achillea millefolium*), kitiems astriūnų (gražibiedžių) šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Tepalo sudėtyje yra cetoestero alkoholio. Cetoestero alkoholis gali sukelti lokalų (vietinę) odos reakciją (pvz., kontaktinį dermatitą). Sudėtyje yra 13,8 % (V/V) etanolio. Kiekviename šio vaistinio preparato gramme yra 11 ml alkoholio (etanolio), tai atitinka 11,7 mg. Ant pažeistos odos etanolis gali sukelti deginimo pojūtį. Reikia saugotis, kad tepalo nepatektų į akis, ant gleivinės, atvirų žaizdų ar pažeistos odos. Netepti tepalu didelio ploto. **Registruotojas.** „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). **Registruotojo adresas.** UAB „Farmahels“. **Reklamų teksto parengimo data 2025-09-04.**

NAUJA, DIDESNĖ 100 G TEPALO PAKUOTĖ!

SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO GYDYMAS

3⁴⁹ €



APAP EXPRESS, 500 mg, 10 minkštųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje „APAP express“ minkštojoje kapsulyje yra 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos:** simptominio lengvo ar vidutinio skausmo ir (arba) karščiavimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir paaugliams, svėriantiems daugiau kaip 55 kg (nuo maždaug 15 m.): 1-2 minkštiosios kapsulės (500-1000 mg) vienu metu, ne daugiau kaip 6 kapsulės (didžiausia paros dozė – 3000 mg) kas 24 valandas. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas paracetamolui, žemės riešutams, sojoms arba bet kuriai vaisto sudėtyje esančiai pagalbinei medžiagai. Sunkus kepenų nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai:** atsargiai reikia vartoti pacientams, kuriems nustatytas inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės stoka, piktnaudžiaujantiems alkoholiu, dehidratuotiems arba nuolat blogai besimatinantiems, sergantiems astma. Gydantis šio vaistinio preparato, alkoholio vartoti negalima. Ilgas ir dažnas vartojimas nerekomenduojamas. Jeigu per 3 dienas jūsų sąjaujta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Reklamų teksto parengimo data 2025-03-1.

„APAP“. IR TU VĖL SAVO VĖŽESE.

-25% 5⁰² €



AMEDIPLUS

Šildantis arklų balzamas, 250 ml
Šildantis arklų balzamas, 250 ml
KOSMETIKOS PRIEMONĖS

SĄNARIAMS

-20%



FLEXISEQ

JOINT WEAR & TEAR, gelis sąnariams, 50 g 27⁹⁹ 22³³ € -20 %
OSTEOARTHRITIS, gelis sąnariams, 50 g 36⁹⁹ 29⁴³ € -20 %

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Flexiseq Osteoarthritis“ – didelio veiksmo formulė, sukurta specialiai osteoartrito sukeltiems simptomams mažinti. Gelis pagamintas iš nanostruktūros mikrokapsulių „Sequessome™“, kurias sudaro natūralios, žmogaus organizme esančios molekulės, vadinamos fosfolipidais. Mikrokapsulės prasiskverbia į odą ir tiesiogiai jungiasi prie sąnario kremzlės paviršiaus, todėl padeda mažinti sąnarių paviršių trintį, skausmą ir gerina sąnario skysčio kokybę. Nesukelia širdies ir kraujagyslių rizikos. Jei esate aktyvus, sportuojate, bet jaučiate sąnarių skausmą ir sąstingį, sąnariams kasdien prižiūrėti rinkitės optimalaus veiksmingumo preparatą „Flexiseq Joint Wear & Tear“. „Flexiseq“ tinkamas reabilitacijai pooperaciniu laikotarpiu. Naudooti gelį visiškai saugu – jo sudėtyje nėra farmaciškai aktyvių sudedamųjų dalių, galinčių sąveikauti su kitais vartojamais vaistais. Gelį galima naudoti ir su receptiniais vaistais nuo uždegimo.

NANOTECHNOLOGIJOS ŠIANDIEN – JUDĖJIMO LAISVĖ RYTOJ!

AUSŲ SKAUSMUI MALŠINTI

-20% 8⁶³ €



FONIX® EAR PAIN, purškalas, 15 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

Pirmoji pagalba pasireiškus dažnoms ausų problemoms, tokioms kaip:

- skausmas
- susikupis
- susikaupusi siera
- dirginimas

„Fonix“ Ear Pain“ yra medicinos priemonė, kurios sudėtyje yra augalinių aliejų mišinio, skirtas ausiai apsaugoti nuo dažnų problemų ir jas palengvinti. Sudėtis: alyvuogių aliejus, indinių sezamų aliejus, gulsčių kompleksas, fitosterolio kompleksas, bisabololis, kvapiųjų murelių lapų aliejus, celiuliozinių cianorūgčių lapų aliejus, vinių rūgšties ekstraktas, mėlyni aliejus. Suaugusiems ir vyresniems kaip 3 metų vaikams. Vartojimas: purkšti po 1-2 įpurškimus į kiekvieną ausį 3 kartus per parą.



SKIEPAI NUO ERKINIO ENCEFALITO

SU
LOJALUMO
KORTELE

28⁹⁹ €

SKIEPO KAINA
BE KORTELĖS

31⁹⁹ €



Galima išankstinė registracija:

- internetu www.nvaistine.lt/skiepai
- telefonu **+370 800 10 008**



Nuolaidos taikomos
su PC Norfa kortele.
Akcijos „Laimės valandos“
nuolaidos netaikomos.

MEDICINOS PRIETAISAS

PĖDŲ IR ODOS GRYBELIŲ GYDYTI

NUO 7⁹⁵ €

EXODERIL

EXODERIL 10 mg/ml odos tirpalas, 10 ml 7⁹⁵ €
 EXODERIL 10 mg/ml odos tirpalas, 20 ml 12⁹⁵ €
 EXODERIL 10 mg/g kremas, 15 g 8⁹⁵ €
 EXODERIL 10 mg/g kremas, 30 g 11⁹⁵ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 g vaisto yra 10 mg natifino. **Terapinės indikacijos:** „Exoderil“ tirpalas naudojamas pėdų grybeliui gydyti. „Exoderil“ kremas naudojamas rankų, pėdų, odos grybeliams, įvairiaspalvei dedervinei bei uždegiminiams dermatomikozėms gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** pakeičia odą ir aplink ją esantį plotą tepi 1 kartą per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas natifinui arba pagalbiniams medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** saugoti, kad vaisto nepatektų į akis ir atvirus žaizdas. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08028 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. B52601069569. **Reklamos teksto parengimo data** 2026-01-06.

NUO GALVOS SVAIGIMO

NUO 6⁹⁹ €

VERTIGOHEEL, 50 tablečių

NERECEPTINIS HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tablete yra veikliųjų medžiagų: *Anamirta cocculus* D4 210 mg, *Conium maculatum* D3 30 mg, *Ambra grisea* D6 30 mg, *Petroleum rectificatum* D8 30 mg. **Terapinės indikacijos.** Dėl vėjų priežasčių atsiradęs galvos svaigimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Suaugusiems žmonėms, 12 m. ir vyresniems vaikams: paprastai reikia vartoti po 3 tabletes 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps). Ūmiai atsiradus galvos svaigimui ir pykinimui, padidėjo (pirmas 2 valandas) vartoti po 1 tabletę kas 15 min. „Vertigoheel“ saugumas ir veiksmingumas jaunesniems nei 12 m. vaikams neįvertinti. Duomenų nėra. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Sudėtyje yra laktazės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas relas paveldimas sutrikimas – lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Registratojas.** „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). **Registratojo adresas.** UAB „Farmahel“. **Teksto parengimo data** 2024-01-01.

-40%



AMBIO

LAKTO-BIFIDOBAKTERIJŲ KOMPLEKSAS, 20 kapsulių 44⁸⁸ 6⁸⁹ €
 BIFIDOBAKTERIJOS VAIKAMS, 16 krantomųjų šokolado skonio tablečių 7²⁸ 4³⁷ €

MAISTO PAPILDAI

-20%



AMEDIPUS

Vandeniui atsparūs pleistrai, 7 x 2 cm, 10 vnt. 4⁴⁵ 1¹⁶ €
 Vandeniui atsparūs pleistrai, 7 x 3,8 cm, 10 vnt. 2⁸⁹ 1⁶⁷ €
 Vandeniui atsparūs, permatomi pleistrai, 7 x 2 cm, 10 vnt. 4⁶⁸ 1³⁵ €
 Vandeniui atsparūs pleistrai, 2,5 cm, 10 vnt. 4¹⁹ 0⁹⁵ €
 Vandeniui atsparūs, karpomas pleistrai, 6 x 100 cm 2⁸⁹ 1⁶⁷ €
 Pleistrai su alavijų ekstraktu, 7 x 2 cm, 10 vnt. 4²⁹ 1⁴³ €
 Juodi aksominiai pleistrai, 7 x 2 cm, 10 vnt. 4²⁹ 1⁴³ €
 Vaikiški pleistrai, 6 x 2 cm, 10 vnt. 2²⁹ 1⁸³ €
 Pleistų rinkinys šeimai, 20 vnt. 4⁴⁵ 3⁵⁶ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

Pavasari pilvas maištauja dažniau: kada padės fermentai, o kada reikėtų išsitiirti

Pavasari daugelis ima valgyti lengviau, dažniau renkasi šviežias daržoves, kefyra ar kitus po žiemos rečiau vartojamus produktus. Tačiau toks pokytis virškinimo sistemai ne visada būna sklandus – daliai žmonių pasireiškia pilvo pūtimas, sunkumo jausmas, raugėjimas ar rūmuo. Tačiau ar tai visada tik laikina organizmo reakcija į pasikeitusį racioną?

„Keičiantis sezonams, keičiasi ir mitybos įpročiai. Nors šiais laikais įvairios daržovės pasiekiamos kone visais sezonais, šylant orams tikrai norisi daugiau šviežių daržovių ir lengvesnio maisto. Pasikeitus mitybai, pavyzdžiui, į racioną grįžtant šaltibarščiams, žarnyno geriosios bakterijos ne visada spėja adaptuotis prie kurį laiką neragauto maisto, todėl dažniau įjuntamas pilvo pūtimas ir sunkumas“, – aiškina vaistininkė Sigita Korbutaitė.

Pasak vaistininkės, tokių negalavimų nereikėtų priskirti vien pavasariui, nes panašiai organizmas reaguoja ir vėstant orams, kai mityboje padaugėja kaloringesnio maisto, o šviežias daržoves dažniau pakeičia rauginti ar marinuoti produktai.

Pavasari dalis žmonių susigundo įvairiomis detokso programomis, tačiau S. Korbutaitė sako, kad atskiro organizmo valymo virškinimo sistemai nereikia.

„Iš tiesų organizmo detoksikavimo procesą atlieka kepenys ir inkstai, todėl jokios atskiros detokso programos tikrai nereikia. Reikia kasdien sveikai maitintis, išgerti pakankamai skysčių ir užsiimti aktyvia fizine veikla. Visos detokso programos dažnu atveju neturi jokių pagrįstų įrodymų ir gali sukelti daugiau žalos nei naudos“, – pabrėžia ji.

Tylusis refliuksas

Vaistininkės praktikoje pasitaikė ir atvejais, kai virškinimo problema iš pradžių atrodė visai nesusijusi su skrandžiu.

„Vienas vyras vaistinėje skundėsi kartumu burnoje, balso užkimimu, ilgai trunkančiu neproduktyviu kosliu, gumulo gerklėje jausmu ir rytiui gerklys skausmu. Šie simptomai tęsėsi daugiau nei dvi savaites, o visos išbandytos priemonės nuo kosulio nepadarė. Nors jis neįsėmė padidėjusio rūgštingumo, kiti simptomai rodė tylią refliuksą. Pasiūlėme pabandyti alginatų preparatus ir rekomendavome juos vartoti po valgio bei prieš

miegą. Po kelių dienų jis grįžo padėkoti, nes jautėsi geriau“, – pasakoja S. Korbutaitė.

Rūgštingumui mažinti naudojamos įvairios priemonės: antacidai ir alginatai, kurie veikia greitai ir vartojami pagal poreikį, taip pat protonų siurblio inhibitoriai, mažinantys rūgšties gamybą ilgesniam laikui. Esant refliksui, ypač naudingos gali būti priemonės su alginatais.

„Jos sudaro plūduriuojantį apsauginį barjerą, tarsi plausta, skrandžio turinio viršuje ir taip sumažina rūgšties skrandžio turinio patekimą į stemplę. Be to, jos gali palengvinti ir gleivinės sudirgimą, kurį sukelė rūgšties skrandžio turinys“, – aiškina vaistininkė.

Kada fermentai padeda?

Anot S. Korbutaitės, virškinimo fermentai nėra universalios priemonės nuo visų virškinimo negalavimų. Jie skiriami esant fermentų trūkumui, kasos uždegimui ar kitoms kasos sutrikimams, o persivalgius ar po sunkesnio maisto dažniausiai suteikia tik laikiną palengvėjimą.

„Suvalgius daugiau sunkaus maisto ar jaučiant sunkumo jausmą po valgio, fermentai dažniausiai padeda tik trumpam. Tokiu atveju galima rinktis ne tik kasos miltelius, bet ir augalinius fermentus“, – sako vaistininkė.

Ji pažymi, kad augaliniai fermentai labiau tinka tiems, kurie pilnumą, maudimą, raugėjimą ar pilvo pūtimą po valgio jaučia gana retai – kartą per mėnesį ar dar rečiau. Juos vertėtų rinktis pagal tai, koks maistas sukelė diskomfortą.

„Maisto papildai su ananaso ir papajos ekstraktais – bromelainu ir papainu – padeda skaidyti baltymus, todėl tinka, kai apsunkina mėsa ar kiti daug baltymų turintys patiekalai. Taip pat naudojami grybų ekstraktai: Aspergillus oryzae yra amilazės šaltinis ir skaido angliavandenius, Trichoderma longibrachiatum – celiuliazės šaltinis, skaidantis celiuliozę, o Aspergillus niger

yra laktazės ir lipazės šaltinis, todėl padeda skaidyti laktazę ir riebalus“, – vardija ji.

Fermentų trūkumas ar jautrumas maistui?

Vaistininkė sako, kad simptomai gali nemažai pasifleuoti, kur slypi problema. Jei juntamas deginimas už krūtinkaulio, rūgštus skonis burnoje, o simptomai stiprėja atsigulus ar po sočios vakarienės, labiau tikėtinas padidėjęs rūgštingumas arba refliuksas.

„Pirmiausia reikėtų kreiptis į šeimos gydytoją, o jis nuspręs, ar pakaks įprasto gydymo, ar reikės gastroenterologų konsultacijos ir tiklesnių tyrimų, pavyzdžiui, gastrokopijos“, – teigia ji.

Tuo metu fermentų trūkumą ar kasos sutrikimus dažniau išduoda labai riebus, blizgios išmatos, stiprus pilvo pūtimas po riebaus maisto ir svorio kritimas.

„Esant šioms požymiams būtina kuo skubiau kreiptis į gydytoją. Iki vizito galima vartoti kasos miltelius“, – pažymi vaistininkė.

Jei negalavimai kyla po konkrečių produktų, pavyzdžiui, pieno, priežastis gali būti netoleravimas. Tokiu atveju pilvo pūtimas ar viduriavimas dažniausiai pasireiškia per 1–2 valandas po valgio.

„Dažniausiai pasitaiko laktazės netoleravimas. Vienas iš sprendimo būdų – laktazės fermentai, kuriuos reikėtų vartoti prieš pieno produktus. Savijauta dažniausiai pagerėja ir jų tiesiog atsikvėli. Laktazės netoleravimą galima išsitiirti atliekant laktazės kvėpavimo testą arba taikant eliminacinę dietą. Dėl šių tyrimų ar dietos rekomenduojama kreiptis į gydytoją dietologą“, – aiškina S. Korbutaitė.

Kuo skubiau į gydytoją reikėtų kreiptis pastebėjus nepaaiškinamą svorio kritimą, kraują išmatose, ilgai nei dvi savaites trunkantį viduriavimą ar vėmimą, aštrų pilvo skausmą, ypač jei jis pažadina naktį, rijimo sutrikimus ar mažakraujystę be aiškos priežasties.

-35%Perkant bent
DVI bet kurias
pakuotes**NEW NORDIC MULTIVITAMINAI****MAISTO PAPILDAI**

Skandinavų bendrovės „New Nordic“ multivitaminai – tai puikiai suderinti vitaminų, mineralų, mikroelementų ir augalinių ekstraktų kompleksai imunitetui ir gerai savijautai. „Multivitamin active woman“ – moterims, besirūpinančioms gera savijauta ir grožiu. „Multivitamin active woman 55+“ – vyresnių moterų organizmo poreikiams. „Multivitamin pregnant and breastfeeding woman“ – besilaukiančioms moterims ir žindydėms. „Multivitamin active man“ ir „Multivitamin active man energy boost“ – vyrams. Nepamiršime ir mažųjų – „Mineralai kaulams“, apelsinų arba miško uogų skonio kramtomosios tabletės – kalcio, magnio ir vitamino D šaltinis augančiam organizmui. „Multi vegan GUMMIES“ – gaivaus vaisių ir uogų skonio multivitaminai guminukai imunitetui. Tinka visai šeimai, taip pat vegetarams ir veganams. Sudėtyje esantys vitaminai A, C, D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

JAUSKITĖS PUIKIAI!**-30%****EMILI****MAISTO PAPILDAI**

„EMILI“ ŽOLELIŲ ARBATOS – DARBINGAI DIENAI IR JAUKIAM VAKARUI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtos prekės

-30%**BF-ESSE****MAISTO PAPILDAI**

„Stop Stress“ ir „Stop Stress“ Herbal“ sudėtyje esantis vitaminas B6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. „Stop Stress“ Night“ sudėtyje esantis pasiflorų ekstraktas padeda palaikyti normalų miegą. „Kardio Start“ sudėtyje esantis valgomųjų česnakų ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių funkciją. „Flex“ su gliukozaminu, chondroitinu, MSM ir vitaminu C, kuris padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų ir kremzlės funkcijai, susidarymą. „Immuneo“ sudėtyje esantis vitaminai A, D, B6, B12, cinkas ir selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. „Beautynol“ pasižymi tuo, kad sudėtyje turi tokių rečių augalų kaip peruvinių gvajavų ir vienažiedžių eugenijų vaisių ekstraktų. Vais padeda palaikyti normalią plaukų ir odos pigmentaciją, cinkas padeda palaikyti normalią plaukų, nagų ir odos būklę.

DIENAI BE STRESO, RAMIAM MIEGUI, IMUNITETUI, ŠIRDŽIAI, GROŽIUI IR SĄNARIAMS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtos prekės

-10%**2^{96€}****GINTARO RŪGŠTIS, 20 tablečių****MAISTO PAPILDAS**

Vartojimas: gerti po 1 tabletę 3 kartus per dieną valgant.
Rekomenduojamame suvartoti per parą kiekįje (3 tabletės) yra 0,3 g gintaro rūgšties.
Gamintojas: UAB „Medicata Filia“, Žarijų g.2B, Vilnius
Išskirtinis platintojas Lietuvoje: UAB „VERATRUM PHARMA“, Žarijų g. 2B, Vilnius

-30%**VIRIDIAN****MAISTO PAPILDAI**

„Viridian“ – tai natūralūs, aukštos kokybės vitaminai ir maisto papildai, sukurti remiantis mokslu, etiška gamyba ir gryna sudėtimi.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtos prekės

KOLAGENAS**IKI -30%****DIAS® FORTE**

granatų skonio milteliai, 30 paketėlių **44⁹⁹ 35⁹¹ € -20%**
greipfrutų skonio milteliai, 30 paketėlių **44⁹⁹ 31⁴⁹ € -30%**

MAISTO PAPILDAI

„Dias Forte“ – subalansuotas keturių kolagenų „Collagen Quattro Complex™“ ir kitų sinergiškai veikiančių medžiagų kompleksas sąnariams, kaulams, kremzlėms, odai, dantims ir dantenoms. Sudėtis papildyta hialurono rūgštimi, normaliam kolageno susidarymui reikalingu vitaminu C, kuris kartu su vitaminu E padeda apsaugoti ląsteles ir nuo oksidacinių pažeidimų.

Malonus granatų ar greipfrutų skonio.

1-ame paketėlyje – daugiau nei 10 000 mg kolageno!

BE GLITIMO, LAKTOZĖS IR PRIDĖTINIŲ CUKRŲ!**-10%****5^{93€}****ELEUTEROKOKŲ SKYSTASIS EKSTRAKTAS, 50 ml****MAISTO PAPILDAS**

Sudėsdamos dalys: eleuterokokų šaknų su šakniastiebiais (*Eleutherococcus rhizomata et radices*) etanolinė ištrauka 1:1 (etanolis, eleuterokokų šaknų su šakniastiebiais). Sudėtyje yra ne mažiau kaip 33 tonio % etanolio. Vartojimas: suaugusiems gerti po 10 lašų 2 kartus per dieną 30 min. prieš valgį. Prieš vartojimą suplakti. Rekomenduojamame suvartoti per parą kiekįje (20 lašų) yra apie 0,75 ml eleuterokokų skysto ekstrakto. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.
Gamintojas: „Ternofarm“, Ukraina. Išskirtinis importuotojas ir platintojas Lietuvoje: UAB „VERATRUM PHARMA“, Žarijų g. 2B, Vilnius.



GROŽIUI, JAI

CANESTEN®, 10 mg/g kremas, 20 g **5⁷⁵ €**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Canesten 10 mg/g kremas. Terapinės indikacijos. Canesten skirtas suaugusiems, paaugliams ir vaikams gydyti grybelinės odos infekcijos, pvz., sportininkų pėda, grybelis, grybelinis sausieji bėrimas ir grybelinis prakaitavimo sukeltas bėrimas; grybelių sukeltas šoninių moterų lyties organų arba varpos galų uždegimas. **Vartojimo būdas.** Vartoti ant odos. **Dozavimas.** Kremu plonai ir tolygiai tepkite pažeistas vietas 2-3 kartus per parą ir švelniai įtrinkite. Krema juosteles (0,5 cm ilgio) pakanka maždaug dešim dvydžio ploto gydyti. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Canesten. Kremas gali sumažinti laktakto gaminių, tokių kaip prezervatyvai ir diaphragmų, veiksmingumą ir saugumą, jeigu jis tepamas lytinių organų srityje (moterims: lytinės lūpos ir šrities apyvarės; vyrams: apyvarės ir varpos galvutė). Gydyimo metu naudokite alternatyvias apsaugos priemones. Venkite sąlyčio su akimis. Nedėti į buma, nerūryti. Vaikams (pausienės negu 12 metų) ir senyviems pacientams vartoti galima tik prižiūrint gydytoją. Venkite ilgalaikio gydymo didelėse odos plotuose, ypač kūdikiams ir vaikams. Vuvulio atveju pausienės kaip 16 metų paaugliams galima vartoti tik po gydytojo konsultacijos. Per pirmuosius tris nėštumo mėnesius prieš vartojant reikia pasitarti su gydytoju. Sudėtyje yra etoksierito alkoholio, benzilo alkoholio. **Kontraindikacijos.** Alergija klortrimazoliui arba bet kuriai pagalbine medžiagai. **Registracijos.** UAB „Bayer“, Sporto g. 18, LT-09238, Vilnius, Lietuva. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-08-27 GH-20250827-35

„CANESTEN“ KREMAS - GRYBELINĖS INFЕКЦИЈОS GYDYMU!

CANESTEN®, 500 mg makšties minkštąjį kapsulę **11⁵⁰ €**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Canesten 500 mg makšties minkštąjį kapsulę. Klortrimazolis. Terapinės indikacijos. Makšties ir šoninių moterų lyties organų infekcijų, sukeltų klortrimazoliu jautrių mikroorganizmų gydymui. **Vartojimo būdas.** Makšties minkštąjį kapsulę reikia įdėti kaip galima giliai į makštį, naudojant pateiktą aplikatorių, geriausia gulint, vakare prieš miegą. Jei bukatės, įdėkite makšties minkštąjį kapsulę į makštį pirštais. **Dozavimas.** Viena makšties minkštąjį kapsulę, įvesta giliai į makštį vakare (vienkartinė dozė). **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju, jeigu infekcija pasireiškia pirmą kartą; makšties infekcija pirmą nėštumo trimestrą metu, per pastaruosius šešis mėnesius infekcija pasikartoję daugiau nei du kartus; pasireiškia karščiavimas ($\geq 38^{\circ}\text{C}$); skauda apatinę pilvo dalį; nuolat atsiranda nemalonus kvapo išsiskyrimas iš makšties; pasireiškia pykinimas; pasireiškia kraujavimas iš makšties ir (arba) tuo pačiu metu pečių skausmas. Nerekomenduojama gydyti menstruacijų metu. Gydymas turi būti užbaigtas iki menstruacijų pradžios. Vartojant negalima naudoti tamponų, makšties ploviklių, spermicidinių ar kitokių į makštį vartojamų preparatų. Vartojant rekomenduojama vengti lytinių santykių, nes partneris gali užsikrėsti. Jei jūsų partnerius yra infekcijos simptomų, tai turi būti gydoma tuo pačiu metu. Tuo pačiu metu naudojant laktakto kontraceptinių priemonių, pvz., prezervatyvų ir diaphragmų, efektyvumas ir patikimumas gali sumažėti. Negalima nuryti. **Kontraindikacijos.** Alergija klortrimazoliui arba bet kuriai pagalbine medžiagai. **Registracijos.** UAB „Bayer“, Sporto g. 18, LT-09238, Vilnius, Lietuva. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-08-27 GH-20250827-35

„CANESTEN“ MAKŠTIES MINKŠTĄJĮ KAPSULĘ - 1-OS DIENOS MAKŠTIES GRYBELINĖS INFЕКЦИЈОS GYDYMAS!

Intymiai higienai

IKI **-30%**



VAGISAN

KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS

Priemonės „Vagisan“ su natūralia pieno rūgštimi skirtos tinkamai lytinių organų priežiūrai. Rūgštis aplinka – būtina sąlyga, kad laktobakterijos galėtų patos gaminti pieno rūgštį ir dauginis. Taip užtikrinama optimali natūrali apsauga nuo infekcijos. Intymiosios higienos prausiklis „Vagisan“ tinka kasdieniai intymiajai higienai. Drėkinamasis makšties kremas „Vagisan“ sumažina tokius simptomus kaip sausumas, niežulys, deginimo pojūtis ir skausmas. Ovulės su pieno rūgštimi, skirtos natūraliai makšties pH terpei palaikyti ir atkurti.

TAVO INTYMAIJI SVEIKATAI

*Akcia taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

Moters sveikatai



-25%

LOTAMILE

MEDICINOS PRIETAISAI, KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Lotamile“ ovulių sudėtyje yra polikarbofilo. Jis ilgiau išlaiko veikiąsias medžiagas makštyje ir taip palgina ovulės veikimą. Ovulės netepa, neišbėga, ilgai veikia! **„Lotamile Hialuronic“** makšties ovulės su hialuronu rūgštimi, naudojamos esant makšties sausumui, atrofiniam vaginitui. Ovulės mažina niežulį, skausmą lytinių santykių metu, drėkina, sutepti makštį, neleidžia išsausėti, saugo jos ekosistemą. **„Lotamile Borić“** makšties ovulės, naudojamos gydant ar norint išvengti makšties infekcijų, tinka esant niežėjimui, nemaloniui kvapiui, pakitusioms išskyroms. **„Lotamile Girls“** švelnūs intymiosios higienos prausiklis, sukurtas mergaitėms nuo 1 metų. Prausiklis patikrintas dermatologų, nedirgina gleivinės, švelnina bei ramina sudruską odą, turi drėkinamąjį poveikį, užtikrina natūralią apsauginę gleivinės funkciją, palaiko tinkamą mergaičių intymijų sritį terpe. Puikiai pakeičia muilą, dušo gelius, kurie gali būti per stiprūs ir dirginantys. **„Lotamile Soft“** intymiosios higienos prausiklis moterims idealiai tinka naudoti kasdien, turi šlapimo kvapą naikinantį, drėkinamąjį poveikį, užtikrina natūralią apsauginę gleivinės funkciją, palaiko intymijų sritį rūgštinę terpe, kurios pH 4. Ypač rekomenduojamas ginekologinio gydymo metu, menstruacijų, nėštumo metu, po gimdymo.

*Akcia taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

-25%



FEMARELLE®

MAISTO PAPILDAI

„Femarelle Rejuvenate“. Gerai nuotaikai, odai ir nuovargio mažinimui. Sudėtyje yra gauruotųjų sojų ir sėjamiųjų linų sėmenų ekstraktų, vitamino B2 ir biotino. **„Femarelle Recharge“.** Hormonų reguliavimui ir normaliai savijsautai menopauzės metu. Sudėtyje yra gauruotųjų sojų ir sėjamiųjų linų sėmenų ekstraktų, vitamino B6. **„Femarelle Unstoppable“.** Moterims po menopauzės normaliai kaulų būklei palaikyti. Sudėtyje yra gauruotųjų sojų ekstrakto, kalcio, biotino, vitamino D ir B2.

*Akcia taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis



-15%



GENTLE DAY®

HIGIENOS PRIEMONĖS

„Gentle Day“ – produktai – moterims, kurios myli save, saugo savo sveikatą ir rūpinasi aplinka. Ekologiškos „Gentle Day“ higienos prekės itin tinka moterims, kurių oda linkusi sudirgti ar alergijai. Lietuviškas prekės ženklas „Gentle Day“ garantuoja aukštą produktų kokybę, yra draugiškas Jums ir gamtai. Produktai yra sertifikuoti „Deko-lex“ 100%, „Made for Helathi“, VEGAN sertifikatais.

*Akcia taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

Menopauzės simptomams lengvinti



NUO **19⁹⁹ €**

CLIMOFEMIN

6,5 mg, 30 tablečių **19⁹⁹ €**

13 mg, 30 tablečių **22⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje tabletėje yra 6,5 mg arba 13 mg *Cimicifuga racemosa* (L) Nutt., rhizoma (blakėžučių šakniastiebių) sausio ekstrakto (4,5–8,5:1). **Terapinės indikacijos:** menopauzės simptomams, tokiems kaip karščio pylimas, gausus prakaitavimas, miego sutrikimai, nervingumas ir depresinės nuotaikos, lengvinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** įprastinė paros dozė yra viena 6,5 mg arba 13 mg tabletė. Tabletę reikia nuryti nekrantant, užsigeriant skysčiu. „Climofemin“ be gydytojo leidimo negalima vartoti ilgiau kaip 6 mėnesius. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Climofemin“ medžiagai, taip pat bet kuriam vėdrynių (*Ranunculaceae*) šeimos augalui. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pacientės, kurioms yra buvę kepenų sutrikimų, „Climofemin“ turėtų vartoti atsargiai. Joms turi būti atlikti kepenų funkcijos tyrimai. „Climofemin“ vartojimą reikia nedelsiant nutraukti ir kreiptis į gydytoją, jei atsiranda galimų kepenų pažeidimo požymių ar simptomų (pvz., nuovargis, apetito netekimas, odos ir akių pageltimas arba stiprus viršutinio pilvo dalies skausmas, lydimas pykinimo ir vėmimo arba šlapimo patamsėjimo). Jeigu atsiranda kraujavimas iš makšties arba kitokių neaiškių arba naujų simptomų, reikia kreiptis į gydytoją. „Climofemin“ be gydytojo leidimo negalima vartoti su vaistais, kurių sudėtyje yra estrogenų. Pacientėms, kurios buvo arba yra gydomos dėl krūties vėžio arba bet kokių kitokių su hormonais susijusių navikų, „Climofemin“ be gydytojo leidimo vartoti negalima. „Climofemin“ sudėtyje yra laktazės. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Jeigu vartojant vaistą simptomai pasunkėja, reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku. **Reklamos teksto parengimo data** 2024-11-20.

IKI **-30%**



CUMLAUDE LAB

GINEKOLOGINĖS KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS

Ispanijos ginekologų sukurti intymiosios higienos produktai, iš kurių kiekviena moteris išsirink sau tinkantį – nuo kasdienei higienai skirtų prausiklių iki priemonių lytinių organų nemaloniems simptomams ir uždegimams malšinti bei jų išvengti. Atskirkite intymiosios higienos ritualą su „Cumaude Lab“!

„CUMLAUDE LAB“ – NAUJAS POŽIŪRIS Į MOTERS LYTINĘ SVEIKATĄ

*Akcia taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

Makšties drėgmei ir mikroflorai atstatyti

-15%



FEMINELLA® PLUS, 10 ovulių **46³⁵ 14¹⁰ €**

BIOHYL® LACTO, 7 ovulės **44³⁵ 12⁷¹ €**

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Feminella“ Plus makšties ovulės yra naudojamos kaip profilaktinė ir gydymo priemonė esant nespecifiniam makšties sausumui bei atrofiniam makšties uždegimui. Jos gali būti naudojamos ir kaip papildoma priemonė esant makšties dirginimui, deginimui ir niežėjimui, kuriuos sukelia tiek makšties uždegiminės ligos, tiek infekcijos. Priemonė skirta vaisingo amžiaus moterims, taip pat moterims perimenopauzės ir menopauzės laikotarpiu. „Biohyl“ Lacto ovulės yra vartojamos siekiant atkurti normalią makšties mikroflorą, slopinti uždegimų procesus makštyje, apsaugoti makšties gleivinę ir skatinti jos regeneraciją.



-50%

**EPITOME**

BEAUTY MARINE COLLAGEN, 12.200 mg, milteliai, 30 paketėlių **59⁹⁹ 30⁰⁰ €**
 WOMAN'S FORMULA, 60 minkštųjų kapsulių **29⁹⁹ 15⁰⁰ €**

MAISTO PAPILDAI

-40%

**AMBIO**

SELENAS, 90 tablečių **14⁹⁹ 7¹⁹ €**
 GROŽIUI, 30 tablečių **15⁹⁹ 9⁵⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

-30%



AMEDIPLUS, rankų kremas su pantenoliu, 100 ml **6⁹⁹ 4⁶¹ €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

-35%

**HI GENIE!**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS, MEDICINOS PRIEMONĖS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra
pigesnė arba tokia pati
– NEMOKAMAI!

**DAILEE DISCREET PREMIUM**

HIGIENOS PRIEMONĖS

„DAILEE Discreet Premium“ įklotai – orui laidos, ploni, daug ir greitai sugeriantys, minkšti ir švelnūs. Lankstūs apsauginiai barjerai padeda užtikrinti dienos apsaugą. Pukiai prilimpa, įvairių dydžių. Supakuoti atskirai po vieną. Kvapo kontrolė iki 12 val.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!



MENOPACE, 30 tablečių **20⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

„Menopace“ – biologiška aktyvių medžiagų kompleksas su sojų izoflavonais, kurie pagal savo struktūrą ir poveikį panašūs į moters lytinį hormoną estrogeną. Menopauzės laikotarpiui subalansuotas derinys pasižymi kompleksiniu poveikiu: hormonų balansui (vitaminas B1), psichologinei būsenai (foliatas, biotinas, magnis), kaulų funkcijai (cinkas, magnis), nuovargio mažinimui (geležis, pantoteno rūgštis).

„MENOPACE“ – NELEISK MENOPAUZEI TAVĘS SUSTABDYTI!

Skubios pagalbos
kontraceptikas13⁹⁷ €**AVODELE**, 1,5 mg, 1 tabletė

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Avodele yra skubios pagalbos kontraceptikas, kurį galima pavartoti per 72 valandas (t. y. per tris paras) po lytinio akto, kurio metu kontraceptinės priemonės nebuvo naudotos arba naudota kontraceptinė priemonė nebuvo veiksminga. Avodele sudėtyje yra sintetinio hormono, veikliosios medžiagos, vadinamos levonorgestrelu. Suvarstus per 72 valandas po nesaugaus lytinio akto, jis 79 % atvejų apsaugo nuo nėštumo. Vartojamas šiais atvejais:

– Lytinio akto metu nebuvo naudota kontraceptinė priemonė.

– Jei kontraceptinė priemonė naudota netinkamai.

Kaip vartoti Avodele. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Po nesaugaus lytinio akto išgerkite vieną tabletę kuo greičiau, bet ne vėliau kaip po 72 valandų (3 parų). Tabletę geriausia išgerti per 12 valandų. Antrą tabletę išgerkite praėjus 12 val. (bet ne daugiau kaip 16 val.) po pirmosios tabletės išgerimo. Jei žinote arba manote, jog nesate nėščia, Avodele galite vartoti bet kurią ciklo dieną. Tabletę nurykite nekramtydami, užsigerkite vandeniu. Ji bus tuo veiksmingesnė, kuo greičiau ją išgersite. Avodele vartoti negalima. Jeigu yra alergija levonorgestrelui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos informacinio lapelio 6 skyriuje). Išpėjimai ir atsargumo priemonės. Prieš vartodama, pasitarkite su gydytoju, nes Avodele, kaip skubios pagalbos kontraceptinė priemonė, Jums gali netikti. Gydytojas gali Jums skirti kitokią skubios kontracepcijos priemonę. Kaip dažnai galima vartoti Avodele. Avodele vartotina tik neatidėliotinu atveju ir nėra reguliarios kontracepcijos metodas. Galimas šalutinis poveikis. Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Labai dažnas. Šleikštulys (pykinimas); Gali būti nereguliarus pakraujavimas iki prasidedant mėnesinėms; Gali skaudėti pilvo apačią; Nuovargis; Galvos skausmas. Dažni Vėmimas; Gali pakeisti mėnesinių ciklą; Išgėrus šio vaisto, gali atsirasti krotų jutrumas, viduriavimas, svajulio pojūtis. Labai retas Bėrimas, dilgėlinė, niežulys, vėdo patinimas, dubens sritys skausmas, skausmingos mėnesinės. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant informaciniam lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Ši informacija paskutinį kartą peržiūreta 2025-07-15.

-15%

**NOAGE**

MAISTO PAPILDAS

„NoAGE“ – prabangus 5 savačių ritualas moterims ir vyrams nuo 25-erių. Tai inovatyvi, mokslininkų sukurta epigenetinė linija, kurios produktų sudėtyje – daugiau kaip 38 vertingi, šimtmečius medicinoje naudojami augaliniai ekstraktai, vitaminai ir mineralai, veikiantys ląstelių lygmeniu. Sukurta Šveicarijoje. „NoAGE“ sukurta padėti išsaugoti jaunystę, energiją, žavesį, veržlumą bei polėkį gyventi. Laisvųjų radiolių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią nervų sistemos būklę ir pažinimo funkciją. Dygliuotųjų šaltalankių ekstraktas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Vitaminas B6 padeda palaikyti energijos apykaitą.

„NOAGE“ – AMŽIUS TIK SKAICIUS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-20 %**ORALFLUX****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

Reguliariai naudojamas „Oralflux“ gaivina burnos kvapą. **Be alkoholio.** Inovatyvus dozatorius užtikrina tikslią skalavimo skysčio dozę ir ekonomišką naudojimą. „Oralflux“ turėtų būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė valant dantis. Naudojimas: norėdami gauti 10 ml skysčio, švelniai paspauskite butelį, kol skystis atsiras virš purškimo prietaiso. Skalaukite burną skysčiu apie 1 min., išspauskite. Kad poveikis būtų geresnis, nevalgykite ir negerkite 2 val. po skalavimo. Buteliukas turi INOVATYVŲ DOZATORIŲ - TIKSLŲ IR EKONOMIŠKĄ!

STIPRESNI DANTYS. GAIVESNIS KVAPAS. PLATESNĖ ŠYPSENA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – **NEMOKAMA!**

**„ROYAL DENTA“ DANTŲ ŠEPETĖLIAI****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

Atraskite „Royal Denta“ dantų šepetėlių valymo galią ir mėgaugitės spindinčia šypsena ir gaiviu burnos kvapu.

„ROYAL DENTA“ DANTŲ ŠEPETĖLIAI VALO GERIAU! ĮSIGYKITE DABAR IR ĮSITIKINKITE!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-25 %**JORDAN****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

Platus dantų priežiūros priemonių asortimentas visai šeimai - nuo pirmo dantuko! Rinkitės dantų šepetėlius, pastas bei tarpdančių valymo priemones pagal savo individualius poreikius.

„JORDAN“ RŪPINASI ŠYPSENOMIS NUO 1927-ŲJŲ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-30 %**WOOM****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

Pasiruoškite naujam burnos higienos etapui su „Woom“! Priemonės su kruopščiai atrinktomis medžiagomis suteikia šypsenai gaivumo, svaros ir komforto pojūtį, padeda palaikyti dantų paviršiaus švarą ir natūralių jų baltumą. Elegantiškas dizainas ir modernios formulės užtikrina, kad kiekvienas produktas būtų ne tik praktiškas, bet ir malonus naudoti. „Woom“ paverčia burnos priežiūrą ritualu, kuriuo norisi mėgautis kasdien.

„WOOM“ – PRIEŽIŪRA ŠYPSENAI, KURI ĮKVEPIA KASDIENYBĘ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**

**SUNSTAR GUM ORIGINAL WHITE, dantų pasta, 75 ml 13⁷⁵ €****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖ**

Jau daugiau kaip 80 metų „Sunstar“ yra viena burnos etrmės higienos priemonių gamybos lyderių. Fluoridas padeda dantims greičiau įsisavinti mineralus ir saugo emalį nuo rūgščių poveikio. O sudėtyje esantis izomaltas padeda efektyviau įsisavinti fluoridą.

SVEIKOS DANTENOS, SVEIKESNIS GYVENIMAS.**-30 %****TEPE tarpdančių šepetėliai****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖ**

Tarpdančių šepetėliai padeda pasiropinti tinkama burnos higiena, užtikrinti ne tik dantų, bet ir tarpdančių švarą bei palaikyti normalią dantenų būklę. Visi „TePe“ tarpdančių šepetėliai yra su laikikliu, specialiai pritaikytas šereliais ir plastiku dengta vielute, todėl tarpdančiai išvalomi labai efektyviai.

„TEPE“ RŪPINASI SVEIKA ŠYPSENA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

DANTŲ PROTEZŲ KLIAJAI**-30 % 10^{12€}****BLEND-A-DENT**

COMPLETE STRONG HOLD, fiksuojamasis dantų protezų kremas, be skonio, 47 g, 2 vnt.
COMPLETE STRONG HOLD FRESH FLAVOR, fiksuojamasis dantų protezų kremas, 47 g, 2 vnt.

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Fiksuojamasis dantų protezų kremas „Blend-a-dent“ – puikus pasirinkimas, jei nenorite galvoti apie savo protezus. Nesvarbu, ką darote ar valgate, galite pasitikėti savimi, nes dantų protezai savo vietoje laikosi tvirtai ir patogiai. „Blend-a-dent“ suteikia stiprią fiksaciją visą dieną, užtikrina komfortą, sukurdamas pagalvėlę tarp dantenų bei dantų protezų, ir apsaugo nuo maisto dalelių patekimo po protezus. Galite atsipalaiduoti ir mėgautis gyvenimu nesivarždami.

-30 %**CURASEPT ADS****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

Curasept ADS priemonių išskirtinumas – vienintelė pasauliye patentuota ADS sistema – formulė, kuri patikrins, kad Jūsų natūralių dantų spalva ir burnos receptorių veikla chlorheksidino preparato naudojimo metu nepakistų. Curasept ADS chlorheksidinas pasižymi itin stipriomis antibakterinėmis savybėmis, efektyviai naikina pavojingas bakterijas, taip užkirsdamas kelią ir apnašų deimui. Curasept ADS produkcijos sudėtyje nėra alkoholio, SLS, tad išvengsite burnos etrmės sausėjimo, skilėjimo bei dirglumo pojūčių. Curasept ADS sukurta ir subalansuota gingivitui, periodontitui malšinti, kraujavimams dantenoms gydyti. Taip pat skatina burnos audinių gijimą prieš ir po intensyvių burnos higienos ar kitų sudėtingų stomatologinių intervencijų. Tikime, kad sveikas kūnas bei turiningas gyvenimas, pirmiausia prasideda nuo sveikos burnos bei spindinčios šypsenos. Mes ne tik kalbame apie unikalumą, mes jį jau sukūrėme. Tu to dar nežinai, bet tai geriausia, kas galėjo nutikti tavo dantims...

PIRMI, NES MUMS RŪPI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



IKI -50%

AMBIO KIDS

MULTIVITAMINAI VAIKAMS, 50 guminukų **46⁹⁹ 8⁵⁰ € -50 %**
GERKLEI SU ISLANDINE KERPEŲ, 6 braškių skonio ledinukai **5⁹⁸ 3²⁹ € -45 %**
HYDROLIT COMPLEX, 200 ml **6⁴⁹ 4²² € -35 %**

MAISTO PAPILDAI



-80%

AMBIO KIDS

VITAMINAS D3, geriamieji lašai, 10 ml **2⁴⁹ 0⁵⁰ €**

MAISTO PAPILDAS

Odos priežiūra ir apsaugai



-40%

SUDOCREM® MULTI-EXPERT

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Sudocrem“ Multi-Expert“ gydo odos sudirgimus ir pažeidimus. Apsaugo odą aplink žaizdas ir skruisčius. Švelniai gydo sauskelnių dermatitą. Subalansuotas sudėties kremas gydo odos uždegimus, apsaugo odą nuo išorinių dirgiklių suformuodamas apsauginį barjerą. Sudėtyje esantis natūralus emolientas lanolinas gerai sugeria drėgmę ir minkština odą. Kremas išsaugo odos drėgmę ir nepalieka riebių sluoksnių odos paviršiuje, kaip kiti kosmetiniai kremai. Tepti plonu sluoksniu. Naudoti atsiradus įvairių odos sudirgimų, įvairių kūno vietų išūtimų, profilaktiškai nuo pragulų ar odos apsaugai aplink žaizdų kraštus. Skirtas naudoti tik išorškai. SUD-LT-00102.

„SUDOCREM“ – NE TIK KŪDIKIAMS. KIEKVIENAM.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

Karščiavimui mažinti ir skausmui malšinti


NUO 4²⁵ €

IBUSTAR

20 mg/ml geriamoji suspensija vaikams, 100 ml **4²⁵ €**
40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams, 100 ml **7⁷⁵ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Viename geriamosios suspensijos ml yra 20 mg arba 40mg ibuprofeno. „Ibustar“ yra uždegimą slopinantis ir skausmą malšinantis vaistinis preparatas (nesteroidinis vaistas nuo uždegimo), turintis karščiavimą mažinančių savybių. „Ibustar“ vartojamas kaip trumpalaikio simptominio gydymo priemonė: silpnai ar vidutiniškai stipriam skausmui, karščiavimui malšinti. „Ibustar“ 20 mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams, svėrantiesiems 5–29 kg (ambus nuo 6 mėnesių iki 9 metų). „Ibustar“ 40 mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams, svėrantiesiems 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), paaugliams ir suaugusiems. Tinka vartoti tik per burną ir trumpai. Jeigu šio vaistinio preparato vaikams ir paaugliams reikia vartoti ilgiau kaip 3 dienas arba jeigu ligos požymiai blogėja, pasitarkite su gydytoju. Prieš vartojimą buteliuką supurtkite. „Ibustar“ vartoti negalima: jeigu yra alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu praėjusio laiko buvo bronchų spazmas, astma, nosies gleivinės paburkimas, angioedema ar odos reakcijos po acetalisalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių uždegimų malšinamųjų vaistų vartojimo; jeigu yra neatšikų kraujodaros sutrikimų; jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; jeigu yra ar buvo praėjusio laiko skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa arba kraujavimas; jeigu yra kraujavimas iš smegenų arba kitos kraujavimas; jeigu yra sunkus inkstų, kepenų funkcijos ar sunkus širdies nepakankamumas; netekus daug skysčių; jeigu yra paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir atspargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Ibustar“. Šaltinis: poveikis gali sumažėti vartojant mažesnę veiksmingą vaisto dozę trumpesnę laiką, būtina simptomų kontrolė. „Ibustar“ reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius. Jeigu Jūsų vaikai atsiranda skrandžio kraujavimas ar išopėjimas, nutraukite „Ibustar“ vartojimą. Nedelsdami informuokite gydytoją, jeigu atsiranda bet koks neįprastas simptomas pilve. Pastebėję bet kurį alerginės reakcijos į šį vaistą požymį ar sunkių odos reakcijų simptomų, nedelsdami nutraukite „Ibustar“ vartojimą ir kreipkitės į gydytoją arba greitosios medicinos pagalbos tarnybą. „Ibustar“ gali slopinti tokių infekcijų simptomus, kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl „Ibustar“ gali vėluoti tinkama infekcijos gydymą, todėl gali padidėti komplikacijų rizika. Jei vartojate šį vaistą sirgami infekcine liga ir simptomai išlieka arba blogėja, nedelsdami pasitarkite su gydytoju. Sergant virusine infekcija vengti vartoti „Ibustar“. LT_01_2024_VI_print UAB „Berlin Chemie Menarini Baltica“, J. Jasinskio g. 16A, LT-03165 Vilnius, tel. +370 5 269 1947, LT@berlin-chemie.com Reklaminiio teksto paruošimo data 2024-08.

GREIT IR VĖL KARALYUS!

GAMINAME VAISTUS PAGAL INDIVIDUALIUS RECEPTUS

- Atneškite gydytojo receptą iki 13 val.
- Atsiimkite pagamintą vaistą kitą darbo dieną.



VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS



LAIMĖS VALANDOS

I II III IV V VI

8-9 val.
ir
14-15 val.*

VII

14-15 val.*

Perkant **3*** ir daugiau prekių

-30%

Perkant **2*** prekes

-25%

Perkant **1** prekę

-20%

*Nuo 2023 m. spalio 23 d. NORFOS vaistinėje akcijos LAIMĖS VALANDOS metu perkant 1 prekę taikoma 20 % nuolaida, perkant 2 prekes – 25 % nuolaida, vaistams – 20 % nuolaida, o įsigyjant 3 ir daugiau prekių – 30 % nuolaida, nereceptiniams vaistams – 25 %, receptiniams – 20 % nuolaida.

Taikomos momentinės 20 % dydžio nuolaidos receptiniams vaistams, 20 ar 25 % nuolaidos nereceptiniams vaistams ir vaistiniams preparatams, o kitoms prekėms – 20, 25 arba 30 % nuolaidos, atsižvelgiant į atitinkamo pirkimo metu įsigyjamų prekių bendrą kiekį. Nuolaida taikoma perkant pilnas prekių pakuotes, kurių kiekvienos vertė arba priemoka ne mažesnė nei 1,50 euro. Prekės, perkamos su kompensuojamuoju receptu, įskaičiuojamos į įsigyjamų (perkamų) prekių krepšelį (kiek), tačiau joms nuolaida netaikoma.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaidos netaikomos perkant su kompensuojamuoju receptu, mokant už skiepus, taip pat pradinio maitinimo pieno mišiniams, kartiniams (gaminamiems vaistinėje) ir vardinams vaistams, įsigyjant dovanų kuponus, pakavimo maišelius. Nuolaidos netaikomos perkant www.gintarine.lt, net jei už prekes atsiskaitoma jas atsiimant vaistinėse. Nuolaidos netaikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Visos nuolaidos galioja tik su PC NORFA lojalumo kortele.

Informaciją apie kitu nei nurodyta laiku vykstančias LAIMĖS VALANDAS rasite www.nvaistine.lt. Informacija apie kitas akcijas ir prekes, kurioms netaikomos akcijos LAIMĖS VALANDOS nuolaidos, suteikiama kiekvienoje vaistinėje, el. paštu info@nvaistine.lt arba nemokamu tel. +370 800 10008.

NVAISTINĖ