

## TOP VASARIO PASIŪLYMAI




**-50%**



**AMBIO**  
KEPENIMS SU MARGAINIU FORTE, 30 kapsulių **9<sup>90</sup> 4<sup>60</sup> €**  
MAISTO PAPILDAS

**-50%**



**AMBIO**  
VITAMINAS D3 4000IU, 120 minkštųjų kapsulių **24<sup>98</sup> 12<sup>49</sup> €**  
MAISTO PAPILDAS

**1+1**

Dvi tokios pačios  
pakuotės už  
VIENOS KAINĄ!



**OLIDETRIM®**  
2000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių **10<sup>39</sup> €**  
2000 TV, 60 minkštųjų kapsulių **11<sup>49</sup> €**  
4000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių **14<sup>99</sup> €**

**MAISTO PAPILDAS**  
Imunitetui – vitaminas D 2000 ir 4000 TV.  
Širdžiai, smegenims – DHR+ EPR omega-3 rūgštys.  
Kaulams ir raumenims – vitaminai D ir K2.  
Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Omega-3 riebiųjų rūgščių DHR (dokozahekseno) ir EPR (eikozapentaeno) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą. Siekiant maksimaliai padidinti vitamino D papildymo naudą, juos naudinga vartoti kartu su vitaminu K2.  
**GERIAUSIA GYNYBA – STIPRUS IMUNITETAS.**

**-50%**



**NEUROMED**  
SLEEP, 15 išulpiamųjų tablečių **7<sup>99</sup> 4<sup>00</sup> €**  
RELAX, 15 minkštųjų kapsulių **8<sup>99</sup> 4<sup>25</sup> €**

**MAISTO PAPILDAS**  
„Neuromed Sleep“ – greita pagalba, kad pavyktų lengviau užmigti ir ramiai miegoti. Vartoti epizodiškai, neužmiegant, prabundant naktį.  
„Neuromed Relax“ – streso kontrolei ir nervų sistemai. Vartoti jaučiant laikiną nervinę įtampą ir stresą.  
**KARTU Į RAMYBĘ SU „NEUROMED“!**

**NUO 3<sup>99</sup> €**



**DECATYLEN™**  
0,25 mg/0,03 mg, 20 kietųjų pastilių **3<sup>99</sup> €**  
0,25 mg/0,03 mg, 40 kietųjų pastilių **7<sup>99</sup> €**

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**  
**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** 1 pastilėje yra 0,25 mg dekalinio chlorido, 0,03 mg cinchokaino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** burnos ir ryklės uždegimo (gingivito, opinio ir aftinio stomatito, faringito) vietinis gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams kas 2 val. lėtai sučiulpti po 1 pastilę, 4–12 m. vaikams kas 3 val. lėtai sučiulpti po 1 pastilę. Kai uždegimo simptomų sumažėja, vartoti po 1 pastilę kas 4 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai ar ketvirtiniams amonio dariniams (pvz., benzalkonio chloridui). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Decatilen“ sudėtyje yra sorbitolio. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurius laisvinantį poveikį. **Reikiamos teksto parengimo data** 2025-01-13. DCTL-LT-00019

**KAI REIKIA NE TIK MALŠINTI SIMPTOMUS, BET IR GYDYTI GERKLĖS SKAUSMĄ!**

**NUO 4<sup>99</sup> €**



**LIVOSIL**  
140 mg, 30 kapsulių **4<sup>99</sup> €**  
140 mg, 60 kapsulių **9<sup>99</sup> €**

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**  
**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** 1 kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino. **Indikacijos:** papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livasil“ dozė yra 280–420 mg per parą, Geri po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. „Livasil“ rekomenduojama vartoti ilgiau nei 3 mėnesius. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livasil“ medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemija), bei tuos, kurie vartoja preparatų, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. Teksto peržiūros data 2017-07-12.

**NATŪRALI KEPENŲ APSAUGA IR GYDYMAS!**



# Gamtos įkvėpti maisto papildai su Negyvosios jūros mineralais!



1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMAI!



-50 % pigiau




# LIVOL®

KVALITET FRA DANMARK, SIDEN 1959



## Gerøs savijautøs meistrai iš Danijøs



-50%

**NAUJA  
PAKUOTĖ**



-50%

### ACONITUM

SALDUS MIEGAS, 15 kapsulių ~~40<sup>99</sup> 5<sup>20</sup> €~~

SALDUS MIEGAS, eliksyras, 150 ml ~~44<sup>39</sup> 5<sup>70</sup> €~~

SALDUS MIEGAS MELATONINAS, 30 kietųjų kapsulių ~~44<sup>89</sup> 5<sup>95</sup> €~~

B COMPLEX, 40 kapsulių ~~14<sup>29</sup> 7<sup>15</sup> €~~

B TOTAL + MAGNE, 60 kapsulių ~~12<sup>89</sup> 6<sup>30</sup> €~~

### MAISTO PAPILDAI

Linija „Saldus miegas“ – dvejojo poveikio, skirta padėti greičiau užmigti ir atsikelti pailsėjus. „Saldus miegas“ padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę bei padeda palaikyti normalią miego kokybę. Sudėtyje esantys šimtmečius naudojami ramunėlių, valerijonų ekstraktai ir mokslo pagrįstos medžiagos – 5-hidroksitriptofanas ir melatoninas – bei B grupės vitaminai padės patiriantiems stresą ir jautiantiems nemigą. Tik 1 kapsulė prieš miegą! „Saldus miegas eliksyras“ malonaus karamėlių skonio, skystas maisto papildas miegui. „B total + magne“ sudėtyje praturtinta ir magniu, kuris padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją bei normalią raumenų funkciją ir padeda mažinti nuovargį. Pakuotėje yra 2 mėnesių kursas. „B complex“ – tai įvairių, gerai subalansuotų B grupės vitaminų derinys tiems, kurie jaučia nervinę įtampą bei nuovargį. Mažinti nuovargį, palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą padeda vitaminai B2, B6, B12. Normalią odos būklę padeda palaikyti vitaminai B2, biotinas ir niacinas, o normalią plaukų būklę – biotinas. Normalią proteinę veiklą padeda palaikyti pantoteno rūgštis.



-50%


**BIOCELL HAIR, 60 kapsulių 26<sup>99</sup> 13<sup>25</sup> €**

### MAISTO PAPILDAS

Kompleksas nepakeičiamų aminorūgščių, vitaminų ir mikroelementų, kurie padeda palaikyti normalią plaukų būklę, saugo juos nuo oksidacinių pažeidimų, palaiko plaukų pigmentaciją. Biotinas, selenas ir cinkas padeda palaikyti normalią plaukų būklę, varis padeda palaikyti normalią plaukų pigmentaciją, o vitaminas C padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinių pažeidimų.

## Kurios NatAspin formulės reikia šiandien?

**NatAspin®** – tai pažangūs daigafunkciniai sprendimai, kurių kiekvienas įkvėptas japonų ilgaamžiškumo filosofijos. Sudėtyje naudojami išskirtinai tik standartizuoti bioaktyvūs ekstraktai.



NAUJIENA


-50%



-50%



-50%



-50%

STANDARTIZUOTI  
BIOAKTYVŲS  
EKSTRAKTAI

**Apsaugokite  
širdį ir  
stiprinkite ją**

**Siekite asme-  
ninės gliukozės  
revoliucijos**

**Kontroliuokite  
cholesterolį  
teisingai**

**Padėkite  
kraujotakai**

Maisto papildai. Specialios med. paskirties produktas. Dažinės ciberžolės padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje, širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą, normalų kepenų lipidų kiekį. Vaistinės ožragės padeda palaikyti normalią gliukozės lygį kraujyje. Cetoniniai cinamonai padeda palaikyti normalų svorį, virškinimą bei organizmo gyvybingumą. Vitaminas K2 padeda palaikyti normalų kraujo krešėjimą. Tikrieji vynmedžiai padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinių pažeidimų. Plaukuotieji viršūnėliai padeda palaikyti normalią ląstelių senėjimą ir normalią energijos apykaitą, psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą.

Skausmo ir  
karščiavimo  
gydymas

2<sup>99</sup> €



### APAP EXPRESS, 500 mg, 10 minkštųjų kapsulių

#### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** vienoje „APAP express“ minkštąjoje kapsulėje yra 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos:** simptominio lengvo ar vidutinio skausmo ir (arba) karščiavimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir paaugliams, sveriantiems daugiau kaip 55 kg (nuo maždaug 15 m.): 1–2 minkštiosios kapsulės (500–1000 mg) vienu metu, ne daugiau kaip 6 kapsulės (didžiausia paros dozė – 3000 mg) kas 24 valandas. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas paracetamoliiui, žemės riešutams, sojos arba bet kuriai vaisto sudėtyje esančiai pagalbinei medžiagai. Sunkus kepenų nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai:** atsargiai reikia vartoti pacientams, kuriems nustatytas inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, gliukozės 6-fosfatidehidrogenazės stoka, piktnaudžiaujantiems alkoholiu, dehidratuotiems arba nuolat blogai besimatinantiems, sergantiems astma. Gydantis šiuo vaistiniu preparatu, alkoholio vartoti negalima. Ilgas ir dažnas vartojimas nerekomenduojamas. Jeigu per 3 dienas jūsų savijauta nepagerėja arba net pablogėja, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2025-03-31.

Esant viduriavimui

3<sup>99</sup> €



### LOPERAMIDUM WZF POLFA, 2 mg, 10 tablečių

#### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veiklioji medžiaga:** loperamido hidrochloridas. **Indikacijos:** simptominis suaugusių ir vyresnių negu 12 metų paauglių ūminio viduriavimo gydymas tokiu atveju, jei negalima pašalinti viduriavimą sukelusios priežasties. **Dozavimas:** pradžioje geriami 2 tabletės (4 mg), vėliau – po 1 tabletę (2 mg) po kiekvieno iššūdinimo nesuformuotomis išmatomis. Draudžiama per parą gerti daugiau kaip 6 tabletes (12 mg). **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas loperamidui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jaunesni negu 12 metų pacientai; paralyžinis žarnų nepraeinamumas; vidurių užkietėjimas; pilvo pūtimas; organizme per mažai skysčių; pseudomembraninis kolitas, kurį dažniausiai sukelia plataus poveikio antibiotikai; ūminė bakterinė dizenterija, bei kitoks bakterinis viduriavimas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** loperamido hidrochloridu gydomas pacientas turi vartoti pakankamai vandens bei mineralinių medžiagų. Šio vaistinio preparato reikia atsargiai vartoti ligoniams, kuriems yra kepenų nepakankamumas. Sergant Krono liga, loperamido hidrochloridu reikia vartoti atsargiai. Jeigu pasireiškia vidurių užkietėjimas, pilvo pūtimas ar atsiranda pirmųjų žarnyno obstrukcijos simptomų, šio vaistinio preparato vartojimą būtina nutraukti. Jeigu ligonis karščiuoja bei jo išmatose yra kraujo, prieš pradėdami vartoti loperamid hidrochloridą, būtina išsiaiškinti tokio viduriavimo priežastį. Vartojant loperamid hidrochloridą, gali pasunkėti šlapinimasis. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Reklamos teksto parengimo data 2025-01.

### ALMAGEL A, geriamoji suspensija, 170 ml

#### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

5 ml geriamosios suspensijos yra 340 mg aliuminio hidroksido (atitinka 218 mg aliuminio oksido), 109 mg magnio hidroksido (atitinka 75 mg magnio oksido) ir 109 mg benzokaino. **Terapinės indikacijos.** Virškinimo trakto sutrikimų, susijusių su skrandžio rūgšties pertekliumi, tokiu kaip rėmuo, rūgštis sukelti skrandžio nugalavimai, skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, simptominis gydymas 14 m. arba vyresniems paaugliams ir suaugusiems žmonėms. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems, atsivėligiant į ligos sunkumą, 3–4 kartus per dieną (30 min. prieš valgį ir vakare prieš miegą) gerti po 1–3 pilnus dozavimo šaukštelių (1 šaukštelis yra 5 ml). Jei yra dvylikapirštės žarnos opa ir kai kurių formų skrandžio opa (prievartio opa), „Almagel A“ galima gerti tarp valgių. Prieš vaistų, dirginančių virškinimo traktą, vartojimą profilaktikai reikia išgerti 1–2 pilnus dozavimo šaukštelių „Almagel A“. Vaistinio preparato rekomenduojama vartoti ne ilgiau kaip 12 parų. Jei inkstų funkcija sutrikusi, atsivėligiant į sutrikimo laipsnį, suspensijos reikėtų gerti rečiau arba mažesne doze. Prieš vartojimą buteliuką reikia stipriai pakratyti. Preparato skiesti nerekomenduojama. Išgėrus suspensijos, 30 min. negalima gerti skysčių. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosios arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Fruktozės netoleravimas (nes sudėtyje yra sorbitolio). Hipofosfatemija. Sunkus inkstų funkcijos nepakankamumas (kreatinino klirensas yra mažesnis kaip 30 ml/min.). Alzheimerio liga. Pacientas jaunesnis nei 14 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Almagel A“ nerekomenduojama vartoti, jei yra nuolatinis vidurių užkietėjimas, ūminis apendicito simptomas, metabolinė alkalozė, kepenų cirozė, sunkus stažinis širdies nepakankamumas, nėštumo toksikozė, opinis kolitas, divertikuliozė, kolostomija ar ileostomija, inkstų funkcijos sutrikimas, lėtinis viduriavimas. Vaistas gali sunkinti hemorojaus sukelus negalavimus. Pagyvenusiems pacientams gali pasunkėti kaulų ir sąnarių ligos bei Alzheimerio liga. Vaistinio preparato vartoti ilgiau negu 2 savaites galima tik prižiūrint gydytoją. Pacientai yra parahidrosidazės inhibitoriai, kurie gali sukelti alerginių reakcijų, įskaitant uždegstas alergines reakcijas. Sudėtyje yra etanolio, dėl kurio pacientams, sergantiems kepenų, smegenų ligomis, epilepsija ir alkoholizmu, bei nėščioms moterims ir jaunesniems nei 14 m. vaikams gali atsirasti padėdimų. „Almagel A“ nepatariama vartoti kartu su alkoholiu ir maistinėmis rūgštimis (citrina, acto ir kt.), nes jos neutralizuoja vaistinio preparato vietinį anestetinį poveikį. Taip, „Almagel A“ ir kitokių vaistų vartojimo reikia daryti ne trumpesnę kaip 1–2 val. pertrauką. Dėl sudėtyje esančio benzokaino vartoti ilgiau kaip 10–12 parų nepatariama. Vaikams benzokainas gali sukelti methemoglobinemiją. **Teksto peržiūros data.** 2025-04-05. **Reklamos teksto parengimo data.** 2025-11. OTC-LT-000102



4<sup>99</sup> €

Skausmui malšinti

2<sup>99</sup> €



### MIALDEX, 25 mg, 10 plėvele dengtų tablečių

#### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

„Mialdex“ yra vaistas skausmui malšinti, priklausantis nesteroidinių vaistų nuo uždegimo grupei (NVNU). „Mialdex“ veiklioji medžiaga yra deksketoprofenas (deksketoprofeno trometamolio pavidalu). „Mialdex“ vartojamas lengvo ir vidutinio stiprumo raumenų skausmui, skausmingų mėnesinių, dantų skausmui malšinti. **Vartojimas:** visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Įprastinė vaisto dozė yra pusė tabletės (12,5 mg) kas 4–6 valandas arba 1 tabletė (25 mg) kas 8 valandas, bet ne daugiau kaip 3 tabletes per parą (75 mg). **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) deksketoprofeno trometamoliiui arba bet kuriai pagalbinei „Mialdex“ medžiagai. Įspėjimai: jeigu sergate arba sirgote inkstų, kepenų ar širdies ligomis, širdies nepakankamumu, jeigu sergate kraujodaros sistemos ligomis; jeigu sergate sistetine raudonąja vilkige ar mišiomis jungiamojo audinio ligomis; jeigu sergate arba sirgote virškinimo trakto ligomis pasikonsultuokite su gydytoju. **Galimas šalutinis poveikis:** šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Reklamos teksto parengimo data: 2025 09 17



### ACEMIS, 600 mg, 10 tablečių

#### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

„Acemis“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos acetilcisteino. „Acemis“ vartojamas gleivėms skystinti sergant lėtinėmis bronchių bei plaučių ligomis, kurių metu būna sutrikusi gleivių gamyba bei šalinimas suaugusiems. Jeigu per 4–5 dienas Jūsų savijauta nepagerėja arba net pablogėja, kreipkitės į gydytoją. **Atidžiai perskaitykite visą pakuočės lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.** Visada vartokite šį vaistą tiksliai, kaip aprašyta lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. „Acemis“ vartoti draudžiama: • jeigu yra alergija acetilcisteinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos informacinio lapelio 6 skyriuje); • jeigu pacientas yra jaunesnis negu 18 metų amžiaus. **Nėštumas ir žindymo laikotarpis.** Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. **Kaip vartoti „Acemis“.** Jeigu gydytojo nepamirškite kitaip, rekomenduojamas toliau nurodytas dozavimas. Suaugusiems žmonėms reikia išgerti 1 disperguojamąją tabletę (600 mg) kartą per dieną. Neviršyti 600 mg dozės per parą. **Vartojimo metodas.** Vaistas vartojamas po valgio. Disperguojamąją tabletę reikia ištrinti stiklinėje šilto vandens ir gerai išmaišyti, kad būtų gautas bespalvis, drumstas geriamasis tirpalas, kurį rekomenduojama išgerti šilta. Gausus skysčių vartojimas stiprina „Acemis“ gleivių skystinamąjį poveikį. **Vartojimo trukmė.** Jeigu Jūsų simptomai sunkėja arba po 4–5 parų gydymo būklė nepagerėja, kreipkitės į gydytoją. **Tekstas pastarąjį kartą peržiūrėtas 2025-06-02.** Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje <http://www.vvkt.lt/>.

Nuo alergijos

4<sup>49</sup> €



### CETIRIZIN ACTAVIS

10 mg, 10 dengtųjų tablečių

#### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** suaugusiems žmonėms ir 6 m. amžiaus bei vyresniems vaikams cetirizinas vartojamas sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito simptomams (nosies ir akių) palengvinti bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės sukimams palengvinti. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** 6–12 m. vaikams: 5 mg (pusė tabletės) 2 kartus per parą; suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams: 10 mg (1 tabletė) 1 kartą per parą. Esant inkstų funkcijos sutrikimui, dozė reikia mažinti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, hidrokiziniui arba bet kuriam piperazino dariniui. Pacientams, sergantiems sunkia lėtine inkstų liga, kai reikalingos dializės. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju ar vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Cetirizin Actavis“ jeigu sergate inkstų nepakankamumu (jei būtina, Jums reikės vartoti mažesnę vaisto dozę. Reikalinga dozė nustatys gydytojas); jeigu turite šlapinimosi problemų (tokių kaip nugaros smegenų problemų arba prostatos ar šlapimo pūslės problemų); jei sergate epilepsija ar Jums gali būti traukulys. Kartu su „Cetirizin Actavis“ vartoti alkoholio nerekomenduojama, kaip ir su kitais antihistaminiais vaistais. Dėl sudėtyje esančios laktazės šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-01. OTC-LT-00089



NUO **2<sup>99</sup>** €



## HJERTEMAGNYL

150 mg, 30 plėvele dengtų tablečių **2<sup>99</sup>** €  
150 mg, 90 plėvele dengtų tablečių **6<sup>99</sup>** €  
150 mg, 100 plėvele dengtų tablečių **4<sup>99</sup>** €

### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veiklioji medžiaga:** 1 tabletėje yra 75 mg arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties. **Indikacijos:** trombozės profilaktika, sergant išemine širdies liga, po miokardo infarkto, išeminio smegenų insulto ar praeinančiojo smegenų išemijos (kraujotakos sutrikimo) priepuolio. Vaistas slopina trombocitų (kraujo plokštelių) agregaciją (sukibimą), todėl jo vartojama krešulių, susidariusių iš sukibusių kraujo plokštelių, atsiradimo rizikai mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną, užsigeriant stikline vandens; įprastinė dozė ilgalaikeiam vartojimui yra 75 – 150 mg vieną kartą per parą. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, padidėjęs jautrumas kitiems salicilatams; jei neseniai kraujavo į virškinamąjį traktą; yra polinkis į kraujavimą, ūminė pepsinė opa, sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, šlapime padidėję oksalatų, jeigu yra trys paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas; vaikams ir paaugliams, jaunesniems kaip 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai vartoti, jei pacientas serga bronchų astma, šienlige, nosies polipais ar kita lėtine kvėpavimo takų liga, gydymui atsparia hipertenzija, podagra, esant gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stokai, sutrikusiai kepenų ir (ar) inkstų arba virškinimo trakto funkcijai, likus 10 parų iki chirurginės operacijos, sėnų amžiaus pacientams nepatartina ilgai vartoti dėl galimos kraujavimo iš virškinamojo trakto rizikos, esant vaikų ir paauglių virusinėms infekcijoms. Teksto parengimo data: 2022-04-07. LT-HJERT-2200001

### DRĖKINAMIEJI AKIŲ LAŠAI

**-40%**



## STARAZOLIN

SAUSOMS IR SUDIRGUSIOMS AKIMS, Natrio hialuronatas / dekspantenolis, 10 ml (be konservantų) **14<sup>84</sup> 8<sup>90</sup>** €

HYDROBALANCE PPH, Natrio hialuronatas, 2 x 5 ml **12<sup>42</sup> 7<sup>48</sup>** €

HYDROFORTE, Natrio hialuronatas, 10 ml (be konservantų) **14<sup>84</sup> 8<sup>90</sup>** €

### MEDICINOS PRIEMONĖS

Drėkinamojo, raminamojo ir apsauginio poveikio lašai, palengvinantys akies paviršiaus regeneraciją. „Starazolin“ sausoms ir sudirgusioms akims“ akių lašai skirti padėti sumažinti simptomus, esant lengvam ar vidutinio sunkumo sausų akių sindromui ir (arba) sudirgintam akies paviršiui. **Lašai drėkina akį, stabilizuoja ašarų plėvelę ir regeneruoja akies paviršių.** „Starazolin HydroForte“ – intensyviai drėkinantys akių lašai, skirti vartoti esant sunkiam sausų akių sindromui, o „Starazolin Hydrobalance PPH“ suteikia veiksmingą ir ilgalaikį akių drėkinimą kiekvieną dieną. Drėkinamojo, raminamojo ir apsauginio poveikio lašai, palengvinantys akies paviršiaus regeneraciją. „Starazolin“ sausoms ir sudirgusioms akims“ akių lašai skirti padėti sumažinti simptomus, esant lengvam ar vidutinio sunkumo sausų akių sindromui ir (arba) sudirgintam akies paviršiui. **Lašai drėkina akį, stabilizuoja ašarų plėvelę ir regeneruoja akies paviršių.** „Starazolin HydroForte“ – intensyviai drėkinantys akių lašai, skirti vartoti esant sunkiam sausų akių sindromui, o „Starazolin Hydrobalance PPH“ suteikia veiksmingą ir ilgalaikį akių drėkinimą kiekvieną dieną.

Padidėjęs jautrumas aspirinui ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, įskaitant ir vartojamus per burną. Astma sergantys pacientai, kuriems aspirinas arba kiti nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, gali sukelti astmos priepuolį, niežėjimą, rinitą ar dilgėlinę. Nubrozindina, pažeista infekcijos ar uždegimo oda arba plotai be viršutinio odos sluoksnio. Kiti toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu lokaliai vartojami vaistiniai preparatai. Vartojimo vietoje esanti infekcija. Paskutinis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Deep Relief“ gelio sudėtyje yra propilenglikolio, kuris gali sukelti odos sudirginimą. Gelio netepti ant (arba) šalia gleivinės ir akių. Netinka tepti po sandarinamųjų tvarsių. Pirma kartą išbandyti ant mažo odos ploto. Vartoti tik ant odos. Registravojas ir gamintojas: The Mentholatum Company (Ireland) Limited, Airija.

„DEEP RELIEF“ – VĖSINANTIS IR GREITAI VEIKIANTIS TEPALAS NUO SKAUSMO!

**5<sup>99</sup>** €



## DEEP RELIEF

50 mg / 30 mg/g gelis, 50 g

### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 g gelio yra 50 mg ibuprofeno ir 30 mg levomentolio. **Terapinės indikacijos:** Lokalus sąnario aplinkos minkštųjų audinių uždegimo ir (ar) traumos (pvz., patempimo, išnirimio) sukeltą skausmą malšinimas. **Dozavimas:** Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: gelį vartoti iki 3 kartų per parą, bet ne dažniau kas 4 valandas. Tepti reikia apie 1–4 cm gelio iš 50 g pakutės. Viename centimetre gelio iš 50 g tūbelės yra vidutiniškai 50 mg ibuprofeno. 4 cm, iš 50 g tūbelės yra vidutiniškai 125 mg ibuprofeno. Neviršyti nurodytų dozių. Jeigu simptomai nepraeina per penkis dienas, kreiptis į gydytoją. Vaikų populiacija: Duomenų apie „Deep Relief“ saugumą ir veiksmingumą jaunesniems kaip 12 metų vaikams nėra. **Vartojimo metodas:** Plonu gelio sluoksniu tepti skaudamą vietą, švelniai masažuoti, kol susigers. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas aspirinui ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, įskaitant ir vartojamus per burną. Astma sergantys pacientai, kuriems aspirinas arba kiti nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, gali sukelti astmos priepuolį, niežėjimą, rinitą ar dilgėlinę. Nubrozindina, pažeista infekcijos ar uždegimo oda arba plotai be viršutinio odos sluoksnio. Kiti toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu lokaliai vartojami vaistiniai preparatai. Vartojimo vietoje esanti infekcija. Paskutinis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Deep Relief“ gelio sudėtyje yra propilenglikolio, kuris gali sukelti odos sudirginimą. Gelio netepti ant (arba) šalia gleivinės ir akių. Netinka tepti po sandarinamųjų tvarsių. Pirma kartą išbandyti ant mažo odos ploto. Vartoti tik ant odos. Registravojas ir gamintojas: The Mentholatum Company (Ireland) Limited, Airija.

„DEEP RELIEF“ – VĖSINANTIS IR GREITAI VEIKIANTIS TEPALAS NUO SKAUSMO!

NUO **1<sup>99</sup>** €



## IBUMETIN

200 mg, 10 plėvele dengtų tablečių **1<sup>99</sup>** €  
400 mg, 10 plėvele dengtų tablečių **2<sup>99</sup>** €  
400 mg, 20 plėvele dengtų tablečių **3<sup>99</sup>** €

### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veiklioji medžiaga:** 1 tabletėje yra 200 mg arba 400 mg ibuprofeno. **Indikacijos:** trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip galvos, dantų, raumenų, sąnarių ar sukeltos menstruacijų, malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams įprasta vienkartinė dozė yra 1-2 tabletės (s) IBUMETIN 200 mg arba 1 tabletė IBUMETIN 400 mg. Didžiausia paros dozė yra 1200 mg. Tablete reikia užsigeriti stikline vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, acetilsalicilo rūgščiai arba kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU). Ligos anksčiau sirgo acetilsalicilo rūgšties arba kitokių NVNU sukelta astma, angioneurozinė edema, dilgėlinė, rinitas ar kitokia padidėjusio jautrumo reakcija. Aktyvi arba buvusi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, opinis kolitas, kraujavimas iš virškinimo trakto ar kitoks kraujavimas, sunkus kepenų, širdies, inkstų funkcijos nepakankamumas, hemoraginė diatezė, paskutinių 3 nėštumo mėnesių ar žindymo laikotarpis. Vaikams ir paaugliams iki 12 m. vartoti negalima. **Specialūs įspėjimai:** specialiai atsargumo priemonių reikia, jei inkstų, kepenų arba širdies funkcija yra sutrikusi, yra buvę virškinimo trakto pažeidimų, sutrikęs kraujo krešėjimas arba vartojami antikoaguliantai, jei vartojama kitų NVNU ar vaistinių preparatų, galinčių padidinti skrandžio opos susidarymo arba kraujavimo pavojų, diuretikų ar nefrotoksinių poveikį turinčių vaistinių preparatų, sergama cukriniu diabetu, raudonoja virkšle ar kitomis kolagenozėmis, Krono liga, opiniu kolitu, hipertenzija, periferinių arterijų liga, galvos smegenų kraujagyslių liga, astma, šienlige, yra nosies polipų ar lėtinii infekcinii kvėpavimo takų ligų, sėnviems žmonėms. Prasidėjus kraujavimui, atsiradus opų ar odos reakcijų, vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir kuo skubiau kreiptis į gydytoją. Negalima vartoti, jei nustatytas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pirmuosius 6 nėštumo mėnesius vartoti negalima, nebent tai neabejotinai būtina ir taip pataria gydytojas. Teksto parengimo data: 2023-03-01.

### NUO SLOGOS

NUO **4<sup>99</sup>** €



## XYMELIN

1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml **4<sup>99</sup>** €

MENTHOL, 1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml **5<sup>49</sup>** €

### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Sudėtis:** 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. **Indikacijos:** susirusęs peršalimo ligomis, paburkus nosies gleivinei arba pasireiškus nosies ančių uždegimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 10 metų paaugliams (XYMELIN MENTHOL atveju – vyresniems kaip 12 metų paaugliams) 1 įpurškimas į kiekvieną nosies landą 2-3 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, uždarą kampo glaukoma, sausasis nosies gleivinės uždegimas, atrofinitis rinitas (XYMELIN MENTHOL atveju), jei hipofizės ar smegenų operacija atlikta pro nosį arba burną; XYMELIN MENTHOL: jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai:** Vartoti atsargiai, jei yra antinksčių navikas (feochromocitoma), sustiprėjusi skydlaukės veikla, sergate cukriniu diabetu ar sutrikęs šlapinimasis dėl padidėjusios prostatos. Sergant sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis ar ligomis, kurių metu susiaureja kraujagyslės, vartoti tik su gydytojo leidimu. Ilgiau kaip 7 paras šio vaisto vartoti draudžiama. Dažnai ir ilgai vartojant vaisto gali atsinaujinti nosies gleivinės paburkimas, susilpnėti jo slopinimas ir atsirasti nosies užgulimas. Gali sukelti miego sutrikimų, galvos svaigimą, tremorą, širdies ritmo sutrikimą, aukštą kraujospūdį. XYMELIN nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 10 metų vaikams. XYMELIN MENTHOL: Pasitarti su gydytoju arba vaistininku, jei vartojate arba per paskutines dvi savaites vartojote vaistų nuo depresijos, vadinamų monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI). Reklamos teksto parengimo data: 28.03.2024 LT-XYME-Z200004

NUO **2<sup>99</sup>** €



## BRONTEX

15 mg/5 ml, sirupas, 100 ml **4<sup>99</sup>** €

30 mg, 20 tablečių **2<sup>99</sup>** €

60 mg šnypščiosios tabletės, 10 tablečių **4<sup>99</sup>** €

7,5 mg/ml, geriamieji lašai, tirpalas, 100 ml **5<sup>99</sup>** €

### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 5 ml sirupo yra 15 mg, 1 tabletėje yra 30 mg, 1 ml tirpalo (14-oje lašų) yra 7,5 mg, 1 šnypščiojoje tabletėje yra 60 mg ambrosolio hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** kvėpavimo takų sekreto skystinimas pacientams, sergantiems ūmine arba lėtine bronchų ar plaučių liga, kurios metu sutrinka sekreto išsiskyrimas ir šalinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** 2-5 m. vaikams – 3 kartus per parą po 7,5 mg ambrosolio (1 ml lašų arba 2,5 ml sirupo), 6-12 m. vaikams – 2-3 kartus per parą po 15 mg (2 ml lašų arba 5 ml sirupo, arba po 5 tabletes), suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams – 2-3 kartus per parą po 30 mg (4 ml lašų arba 10 ml sirupo, 1 tabletė arba 6 šnypščiosios tabletės) arba inhaliuoti lašus 1-2 kartus per parą po 15-22,5 mg (po 2-3 ml lašų). Sergantiems sunkiu inkstų veiklos nepakankamumu, doze mažinti ir (arba) vartoti rečiau. Ambrosolio nepatartina vartoti ilgiau negu 4-5 paras. Jei simptomai negereja arba po 5 parų pablogėja, reikalinga gydytojo konsultacija. Šnypščiosios tabletės reikia išgerti stikline vandens. **Kontraindikacijos:** „Bronx“ (visų formų) negalima vartoti jaunesniems kaip 2 m. vaikams, tablečių – jaunesniems kaip 6 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** vartoti atsargiai, jei sutrikusi bronchų motorika ir padidėjus gleivių sekrecija, sutrikusi inkstų veikla, sergant sunkia kepenų liga, buvus pepsine opa, nustačius fruktozės netoleravimą, sergantiems cukriniu diabetu (vartojant sirupą). Pasireiškus odos išbėrimui (kartais susijusiam su pūslelėmis ar gleivinės pažeidimais), reikia nedelsiant nutraukti gydymą. „Bronx“ tablečių (dėl sudėtyje esančios laktazės) ir šnypščiosjų tablečių (dėl sudėtyje esančių laktazės ir maltodekstrino) negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. „Bronx“, 60 mg, šnypščiosjų tablečių sudėtyje esantis benzilo alkoholis gali sukelti alerginių reakcijų. Vartoti atsargiai nėščioms moterims ir žindymams. Dėl sudėtyje esančio sorbitolio šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas įgimtas fruktozės netoleravimas. **Teksto peržiūros data:** „Bronx“, 15 mg/5 ml sirupas – 2024-07-22, „Bronx“, 30 mg, tabletės, „Bronx“, 7,5 mg/ml, geriamieji lašai, tirpalas – 2021-08-02, „Bronx“, 60 mg, šnypščiosios tabletės – 2022-10-29. Reklamos teksto parengimo data 2025-07. BRO-LT-00001

5<sup>99</sup> €

## SEPTABENE

citrinų ir medaus skonio, 3 mg/1 mg, 16 kietųjų pastilių  
citrinų ir šeivamedžio skonio, 3 mg/1 mg, 16 kietųjų pastilių  
eukaliptų skonio, 3 mg/1 mg, 16 kietųjų pastilių  
kolos skonio, 3 mg/1 mg, 16 kietųjų pastilių

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Septabene“ dezinfekuoja burną ir ryklę bei lengvina ryklės uždegimo požymius: skausmą, paraudimą, patinimą, kartį ir funkcijos sutrikimą. Kietosios pastilės „Septabene“ vartojamos uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniams poveikiui sukelti: jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas; sergant dantenų uždegimu (gingivitu), ryklės uždegimu (faringitu). **Dozavimas:** suaugusiems rekomenduojama paros dozė yra 3-4 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia ištirpinti burnoje kas 3-6 valandas. **6-12 m. vaikams** rekomenduojama paros dozė yra 3 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia ištirpinti burnoje kas 3-6 valandas. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 m. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Septabene“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydymo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Sąveika su kitais vaistinėmis preparatais ir kitokia sąveika. „Septabene“ negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Kietųjų pastilių negalima vartoti kartu su pienu, nes jis silpnina cetilpiridinio chlorido antimikrobinį poveikį. Reklamos teksto parengimo data 2022 10 12.

TAVO GERKLĖ – TAVO JĖGA!

4<sup>99</sup> €

## SEPTANAZAL

SUAUGUSIESIEMS, 1 mg/50 mg/ml nosies purškalo (tirpalas), 10 ml  
VIAKAMS, 0,5 mg/50 mg/ml nosies purškalo (tirpalas), 10 ml

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Ksilotetazolino hidrochloridas / Dekspantenolis „Septanazal“ nuo 6 metų amžiaus vartojamas: - nosies gleivinės pažeidimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) bei gleivinės pažeidimo gijimui skatinti; - nealerginiam nosies gleivinės uždegimui (vazomotoriniam rinitui) lengvinti; - kvėpavimo pro nosį pasunkėjimui po nosies operacijos šalinimo. Rekomenduojama dozė 6 metų bei vyresniems vaikams yra po vieną purškimą į kiekvieną šnervę iki 3 kartų per parą. **Kontraindikacijos:** „Septanazal“ suaugusiems vartoti negalima, jeigu yra alergija ksilotetazolino hidrochloridui, dekspantenoliui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu Jums arba Jūsų vaikui yra sausasis nosies gleivinės uždegimas ir atsiranda šaušų (sausasis rinitas), jeigu Jums arba Jūsų vaikui buvo chirurginiu būdu pašalinta posmegeninė liauka arba buvo atlikta kita operacija, susijusi su smegenų dangalais. **Specialūs įspėjimai:** „Septanazal“ galima vartoti tik atidžiai įvertinus rizikos ir naudos santykį, jeigu: pacientas yra gydomas monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI) ar kitokiais kraujospūdį didinančiais vaistinėmis preparatais, yra padidėjęs akispūdis (ypač jei sergama uždarą kampo glaukoma), pacientas serga sunkia širdies ir kraujagyslių liga, yra feochromocitoma, yra metabolinių sutrikimų, yra porfirija, yra prostatos hiperplazija. **Teksto peržiūros data:** 2023 11 20.

ATKĖMŠA UŽGULUSIĄ NOSĮ IR ŠVELNIAI GYDO IŠSAUSĘJUSIĄ NOSIES GLEIVINĘ.

NUO 3<sup>99</sup> €

## NEUROMULTIVIT

20 pėvele dengtų tablečių 3<sup>99</sup> €  
100 pėvele dengtų tablečių 15<sup>99</sup> €

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Indikacijos:** „Neuromultivit“ yra vitaminai B1, vitamino B6 ir vitamino B12, kurie yra ypač svarbūs užtikrinant normalias nervų sistemos medžiagų apykaitos funkcijas, derinys. Vartojant nervų sistemos ligų gydymui B grupės vitaminai atstato jų stoką organizme ir skatina nervinio audinio natūralų gijimo procesą. **„Neuromultivit“** vartojamas esant B grupės vitaminų stokos sukeltiems negalavimams. Vitaminas B1 pasižymi skausmą malšinančiu poveikiu. **Vartojimas:** rekomenduojama dozė yra viena tabletė kartą per parą. Pavieniais atvejais paros dozė galima padidinti iki 3 tablečių. Tabletes reikia nuryti nesukramtytas po valgyimo ir užsigeri truputį skysčio. **Kontraindikacijos:** rečiau pasitaiko nespecifinių požymių – vėmimas, galvos skausmas ir sąvagus. Mažiau tikėtinas padidėjusio jautrumo reakcijos, kurios vartojant vitaminus B1 arba B12 dažniausiai reikšiami požymiais odoje. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Neuromultivit“ medžiagai. Negalima vartoti vaikams ir paaugliams (jaunesniems negu 18 metų) dėl per didelio veikliųjų medžiagų kiekio. Nėdiesiant pranešti gydytojui, jei yra kontraindikacijų vaisto vartojimui, atsirado šalutinių poveikių požymių ar pastojote. Reikėtų vengti vartoti dideles vaisto dozes ilgiau nei 4 savaites. Vitaminas B6 gali sumažinti kartų vartojamos L-dopos poveikį. **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:** G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. **Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį RTT atstovą:** UAB „GL Pharma Vilnius“, A. Jakšto g. 12, Vilnius, tel. (8 5) 261 0705, el. paštas: office@gl-pharma.lt; www.gl-pharma.lt **Reklamos teksto parengimo data:** 2026 01 15.

NUO 5<sup>99</sup> €

## GRIPEX THERMAL

1000/100/12,2 mg, milteliai geramajam tirpalui, 8 pakėteliai 6<sup>99</sup> €  
1000/100/12,2 mg, milteliai geramajam tirpalui, 12 pakėteliai 9<sup>99</sup> €  
300/20/5 mg, milteliai geramajam tirpalui 12 pakėteliai 8<sup>99</sup> €  
650/50/10 mg, milteliai geramajam tirpalui, 8 pakėteliai 5<sup>99</sup> €

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** (1 pakėtelėje): „Gripex Thermal 300/20/5 mg“: 300 mg paracetamolio, 20 mg askorbo rūgšties, 5 mg fenilefrino hidrochlorido; „Gripex Thermal 650/50/10 mg“: 650 mg paracetamolio, 50 mg askorbo rūgšties, 10 mg fenilefrino hidrochlorido; „Gripex Thermal 1000/100/12,2 mg“: 1000 mg paracetamolio, 100 mg askorbo rūgšties, 12,2 mg fenilefrino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. „Gripex Thermal 300/20/5 mg“: 6-12 m. vaikams: 1 pakėtelis kas 4-6 val., suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams: 1-2 pakėteliai kas 4-6 val. „Gripex Thermal 650/50/10 mg“ arba „Gripex Thermal 1000/100/12,2 mg“: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. vaikai: po 1 pakėtelį kas 4-6 val. Nepasitarsu su gydytoju, nevertokite ilgiau nei 7 d. Nevertokite didesnės nei rekomenduojama dozės. Pasakykite gydytojui, jei jūsų inkstai ar kepenų veikla sutrikusi ar nuolat vartojate alkoholi. **Kontraindikacijos:** alergija veikliosios arba pagalbinės medžiagos, taip pat vaistams, kurių sudėtyje yra simpatomimetinių aminių; širdies ligos, padidėjęs kraujospūdis; gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės arba metilhemoglobino reduktazės stoka; sunkus kepenų ar inkstų nepakankamumas; tirotoksikozė; šlapimo užšalimas arba feochromocitoma; židovudino, MAO inhibitorių vartojimas; nėštumas ar kūdikio žindymas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju, jei sergate kepenų arba inkstų nepakankamumu, bronchine astma, prostatos hiperplazija, Reimo sindromu (rankų ar kojų pirštų, ausies kraštų ir nosies galuko išblyškimas, dažnai sukelia šalčio arba emocijos streso), širdies liga, padidėjusiu kraujospūdžiu, cukriniu diabetu. Reklamos teksto parengimo data 2025-05-09.

„GRIPEX THERMAL“. VEIKIUI!

## PERŠALIMO IR GRIPO SIMPTOMAMS LENGVINTI

NUO 4<sup>99</sup> €

## GRIPEX

325/30/10 mg, 12 pėvele dengtų tablečių 4<sup>99</sup> €  
325/30/10 mg, 24 pėvele dengtos tabletės 8<sup>99</sup> €  
500/30/15 mg, 10 pėvele dengtų tablečių 5<sup>99</sup> €  
500/30/15 mg, 20 pėvele dengtų tablečių 9<sup>99</sup> €

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 tableteje „Gripex 500/30/15 mg“ yra 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrinio hidrochlorido, 15 mg deksketorfanono hidrochlorido. 1 tableteje „Gripex 325/30/10 mg“ yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrinio hidrochlorido, 10 mg deksketorfanono hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** peršalimo ir gripo simptomų (galvos, raumenų, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užsikimimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Gripex 500/30/15 mg“ suaugusiems po 1-2 tabletes 3-4 kartus per parą. „Gripex 325/30/10 mg“ suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams įprasta dozė yra 2 tabletes 3-4 kartus per parą, kas 4-6 val. tada, kada reikia. Neviršyti vienkartinės 2 tablečių dozės. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. **Kontraindikacijos:** negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šių vaistų sudedamajai medžiagai; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; smarkiai padidėjęs kraujospūdis; chroniški alkoholizmas. Negalima vartoti kartu su monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI) arba anksčiau negu 2 savaites baigus juos vartoti. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** esant sutrikusiai kepenų funkcijai, sergant alkoholizmu, sutrikus mitybai bei didesnis kepenų toksiinio pažeidimo pavojus. Gydantis šiais vaistais, nepartartina vartoti alkoholio. Jeigu per 3 dienas jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2025-03-31.

„GRIPEX“. VEIKIUI!

-50%



## IMUNITAL

## MAISTO PAPILAI

Imuninė sistema – tai žmogaus organizmo atsakas neigiamiems aplinkos veiksniams. Tam tikru metu laiką ar pasikeitus įprastoms gyvenimo sąlygoms (pvz., esant peršalimo ligų sezonui) gali prireikti stipresnio palaikymo imuninei sistemai. „Imunital“ – skirtingų vartojimo formų ir sudėčių produktai, skirti imuninei sistemai.

„Imunital SHOTS“ – itin stipri programa imunitetui su bičių pieniliu, priešpieno koncentratu, *reishi* (tikriniai blizgučiai) ir *shiitake* (valgomieji dantenai) grybų ekstraktais bei vitaminu B6. Tinka vaikams nuo 3 metų.

„Imunital FORTE“ – ypač didelės vitaminų D, C ir cinko dozės 1 kapsulėje su vertingais beta gliukanais ir augaliniais ekstraktais. Komponentai veikia kartu padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą, apsaugoti ląsteles nuo oksidacinių pažeidimų bei mažinti nuovargį.

„Imunital plus“ – su kininiais kordicepsais ir ežiūolių ekstraktu.

## MAGISKA! TVIRTAS IMUNITETAS!

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtiems prekėms



4<sup>99</sup> €



## VOLTAREN EMULGEL, 23,2 mg/g gelis, 50 g

### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Diklofenako dietilamino. **Terapinės indikacijos.** Suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: skausmo ir uždegimo mažinimas, kai yra minkštųjų audinių sužalojimas (sausgyslių, raiščių, raumenų ir sąnarių trauma, pavyzdžiui, patempimas, sumušimas); vietinis minkštųjų audinių uždegimas (nugaros skausmas, tendinitas, bursitas). Tik suaugusiems (18 m. ir vyresniems): sąnarių (pvz., kelių) degeneracinės ligos sukeltam skausmui malšinti. **Vartojimas.** Vartoti ant odos. Tepti 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje. **Kontraindikacijos.** Alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitoms vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo; paskutinis nėštumo trimestras; jaunesniems kaip 14 m. paaugliams. **Specialūs įspėjimai.** Nelepti ant pažeistos odos, atviros žaizdos, odos išbėrimo ar egzemos vietos, didelių odos plotų, saugoti, kad nepatektų į akis ir ant gleivinės, pvz., burnos, nenuryti. Jeigu pasireiškia bėrimas, gydymą nutraukti; nenaudoti su oro nepreleidžiančiais tvarsčiais. Sudėtyje yra propilenglikolio ir butilhidroksitolueno. Teksto parengimo data 2025-03. Prekių ženklai priklauso „Haleon“ arba „Haleon“ turi jų licenciją. ©2025 „Haleon“ arba licencijos turėtojas.

7<sup>99</sup> €



## SEPTABENE

1,5 mg/5 mg/1 ml burnos gleivinės purškalo, 30 ml

### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

„Septabene“ dezinfekuoja burną ir ryklę bei lengvina ryklės uždegimo požymius - skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. „Septabene“ vartojamas uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti - jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas; - sergant dantenų uždegimu (gingivitu), ryklės uždegimu (faringitu); - prieš dantų traukimą ir po jo. **Dozavimas suaugusiems.** Vienkartinė dozė yra suvartojama purkštuvu galvute paspaudus vieną arba du kartus. Tokią dozę kartotinai galima vartoti kas 2 valandas 3-5 kartus per parą. **6-12 metų vaikams.** Vienkartinė dozė yra suvartojama purkštuvu galvute paspaudus vieną kartą. Tokią dozę kartotinai galima vartoti kas 2 valandas 3-5 kartus per parą. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 metų vaikas. „Septabene“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydymo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. „Septabene“ negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Vaistinio preparato negalima įkvėpti. Teksto peržiūros data: 2023 08 09.

TAVO GERKLĖ – TAVO JĖGA!

### AKIŲ LAŠAI

NUO 9<sup>99</sup> €



## SYSTANE

BALANCE, 10 ml 11<sup>99</sup> €  
GEL DROPS, 10 ml 11<sup>99</sup> €  
HYDRATION MDPF, 10 ml 10<sup>99</sup> €  
ULTRA MDPF, 10 ml 9<sup>99</sup> €

### MEDICINOS PRIEMONĖS

„Systane“ Balance“ drėkinamieji akių lašai yra skirti laikinai palengvinti deginimo ir dirginimo pojūčius asmenims, kuriems pasireiškia akių sausumo simptomų. „Systane“ Balance“ drėkinamieji akių lašai padeda išlaikyti natūralią ašarų plėvelės sluoksnį ir ašarų plėvelės stabilumą. „Systane“ Ultra MDPF“ drėkinamieji akių lašai BE KONSERVANTŲ apsaugo akies paviršių, palengvina akių sausumo simptomus ir pagerina matomo vaizdo ryškumą, padeda palengvinti kontaktinių lęšių drėgnumą ir juos drėkina. GREITAS SAUSŲ AKIŲ SIMPTOMŲ LENGINIMAS. „Systane“ Hydration MDPF“ drėkinamieji akių lašai BE KONSERVANTŲ, su hialurono rūgštimi. „Systane“ Hydration MDPF“ drėkinamieji akių lašai apsaugo akių paviršių, pagerina matomo vaizdo ryškumą ir ašarų sulaikymą akies paviršiuje, drėkina, suteipa ir apsaugo kontaktinius lęšius. ILGALAIKIS SAUSŲ AKIŲ SIMPTOMŲ LENGINIMAS. „Systane“ Gel Drops“ drėkinamieji geliniai akių lašai suteipa akies paviršių, kad apsaugotų nuo pažeidimų, kuriuos sukelia sausų akių simptomai. INTENSIVUS akių sausumo simptomų lenkinimas.

5<sup>99</sup> €



## THERAFLU

ND, 1000 mg/60 mg/30 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 6 paketėliai  
NT, 1000 mg/60 mg/30 mg/4 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 6 paketėliai

### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Terapinės indikacijos.** „Theraflu ND“: persalimo sukeltų simptomų (skausmo, nosies gleivinės užburkimo, erzinančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. „Theraflu NT“: persalimo sukeltų simptomų (skausmo, nosies gleivinės užburkimo ir sekrecijos, čiaudulio, erzinančio kosulio, akių ašarojimo ir niežėjimo bei karščiavimo) lengvinimas. **Vartojimas.** Suaugusiems žmonėms bei 16 m. ir vyresniems paaugliams: gerti po 1 pak. kas 6 val. pagal poreikį. Negalima vartoti daugiau kaip 4 pak. per 24 val. Gydymo trukmė neturi viršyti 3 parų. 1 pak. turinį ištirpinti stiklinėje karšto, tačiau ne verdančio vandens (maždaug 250 ml). Vartoti per burną. **Kontraindikacijos.** Alergija veikliosios arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, jei vartojate ar per pastarąsias 2 sav. vartojote vaistų nuo depresijos arba Parkinsono ligos, vadinamųjų MAOI, vartojate kitų simpatomimetikų, yra uždaros kampo glaukoma (padidėjęs akispūdis), nėštumo laikotarpis. „Theraflu ND“: labai aukštas kraujospūdis, širdies kraujagyslių liga, sunkus inkstų veiklos sutrikimas, yra kvėpavimo nepakankamumas, plaučių liga ar astmos priepuolis, jei vartojate oksazolidinono klasės antibiotikų, žindymo laikotarpis. „Theraflu NT“: sunki širdies liga, kepenų ar inkstų veiklos sutrikimas. **Specialūs įspėjimai.** Nevartoti kitų vaistų, kuriuose yra paracetamolio. Nevartoti alkoholio. Pasitarti su gydytoju, jei yra inkstų ar kepenų liga, lėtinis alkoholizmas, gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės nepakankamumas, padidėjęs širdies ritmas, aukštas kraujospūdis, padidėjęs skydliaukės aktyvumas, cukrinis diabetas, padidėjusi prostata, psichikos liga, kosulys su dideliu kiekiu skreplių, lėtinis kosulys, aukšta temperatūra, išbėrimas, pastovus galvos skausmas, jei vartojate vaistų nuo depresijos ar psichozų, netekus kysčių ar badaujant. Pasireiškus karščiavimui ir išplūstiai raudonei su smulkiais pūlinėliais, staigiam pilvo skausmui, kraujavimui iš tiesiosios žarnos ar kitiems išeminio kolito simptomams, likus kelioms dienoms iki operacijos, būtina nutraukti vaisto vartojimą ir kreiptis į gydytoją. Gali sukelti priklausomybę. Sudėtyje yra aspartamo ir sacharozės. „Theraflu ND“: pasitarti su gydytoju, jeigu yra širdies liga ar antinksnių auglys, vyresniems nei 60 m. žmonėms. Pasireiškus stipriam galvos skausmui, pykinimui, vėmimui, regėjimo sutrikimams, būtina nutraukti vaisto vartojimą. „Theraflu NT“: pasitarti su gydytoju, jeigu yra kvėpavimo nepakankamumo pavojus, hemolizinė anemija. Daugiau informacijos pateikta šių vaistų pakuotės lapeliuose. Teksto parengimo data 2024 m. Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi jų licenciją. ©2024 HALEON arba licencijos turėtojas.

IKI -25 %



## TENA

### SAUSKELNĖS, IKLOTAI, PAKLOTAI IR KOSMETIKA

Patikimos, odos sveikatai užtikrinančios TENA sauskelnės, įklotai ir paklotai greitai sugeria šlapimą, apsaugo nuo pratekėjimo ir nemalonaus kvapo. Papildomai naudojamos TENA odos priežiūros priemonės padeda pasirūpinti odos švara, higiena ir pragulų profilaktika.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

3<sup>99</sup> €



## HEXORALETTEN N, 5 mg/1,5 mg, 16 kietųjų pastilių

### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 kietojoje pastilėje yra 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido ir 1,5 mg benzokaino. **Terapinės indikacijos:** lokals burnos ir ryklės infekcinių ligų: faringito, stomatito, gingivito, simptomų slopinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: jei nepaskirta kitaip, sušalinti po 1 kietąją pastilę keletą kartų per parą. Jei reikia, galima čiulpti po 1 kietąją pastilę kas 1-2 val., daugiausia 8 kietąsias pastiles per parą. 6-12 m. vaikams: jei nepaskirta kitaip, sušalinti po 1 kietąją pastilę keletą kartų per parą. Jei reikia, galima čiulpti po 1 kietąją pastilę kas 1-2 val., daugiausia 4 kietąsias pastiles per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, sumažėjęs plazmos cholinesterazės kiekis, burnoje ar gerklėje yra žaizdų ar opų; jaunesni kaip 6 m. vaikai. **Specialūs įspėjimai:** jeigu sergate sunkia infekcine liga, pasireiškiančia aukšta temperatūra, galvos skausmu, vėmimu, būtina gydytojo konsultacija, ypač jei savijauta nepagerėja per 3 dienas. Jei yra burnos gleivinės epitelio defektų ar gleivinė lupasi, šio vaisto vartoti nereikėtų. Benzokainas gali sukelti methemoglobinemiją (pasireiškia odos, lūpų ir nagų guolių blyškumu, pilkumu ar mėšvrumu, galvos skausmu, sąvaigiu, dusuliu, nuovargiu ir dažnu širdies plakimu). Kietosios pastilės gali sukelti užspringimo riziką. Šio vaisto reikia vartoti atsargiai, jeigu turite aspiracijos ir rijimo problemų. Vengti valgyti ar gerti iškart po pastilės vartojimo. „Hexoraletten N“ sudėtyje yra aspartamo ir izomalto. Reklamos teksto parengimo data 2025 08. LT-HXA-2025-21592

-40%



### „MÖLLER'S" ŽUVŲ TAUKAI IR OMEGA-3 KAPSULĖS MAISTO PAPILAI

„Möller's" – tai šimtmečiui puoselėjami žuvų taukai visai šeimai. „Möller's" žuvų taukų kapsulės išsiskiria kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyviu medžiagų deriniais. Tyri ir gerai išvalyti „Möller's" žuvų taukai puikiai tinka vartoti kasdien visą gyvenimą, ypač skonio kramtomosiose žuvelėse „Möller's Junior" yra omega-3 ir vitamino D – augančiam vaikui organizmui naudingų medžiagų.

**OMEGA-3 EKSPERTAI JAU DAUGIAU NEI 170 METŲ!**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

### BURNOS INFEKCIŲ LIGOMS GYDYTI

7<sup>99</sup> €

### JOX

85/1 mg/ml burnos gleivinės, gerklų ir ryklės purškalkas (tirpalas), 30 ml

#### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 ml tirpalo yra 85 mg jodo ir 1 mg alantoino. **Terapinės indikacijos:** papildomas lokalus lengvų burnos ir ryklės infekcinių ligų faringito, stomatito, gingivito gydymas; papildomas bakterijų sukeltų tonzilito gydymas kartu su antibiotikais; burnos ertmės infekcijos profilaktika ligoniams, kuriems atliekamos burnos ar ryklės operacijos. „Jox" purškalo gali vartoti suaugusieji ir vyresni kaip 8 m. vaikai. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 8 m. vaikams įprastinė dozė – puršksti 2-4 kartus per parą, bet jeigu būtina, galima vartoti ir dažniau (kas 4 val.). puršksti ne daugiau kaip 3 kartus į dešinę ir kairę burnos ertmės puses, bet ne daugiau kaip 6 kartus per parą. Pertrauka tarp atskirų purškinių turi būti ne mažesnis kaip 4 valandos. Vaistinio preparato negalima įkvėpti ar nurinti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; inkstų funkcijos sutrikimas; dekompenzuotas širdies nepakankamumas; nėštumo ir žindymo laikotarpis; 2 sav. prieš planuojamą tyrimą arba gydymą radioaktyviu jodu ir 2 sav. po to; nuolat vartoti ligoniams, kuriems diagnozuotas skydliaukės funkcijos sutrikimas; nuolat vartoti ligoniams, kurie kartu vartoja ličio vaistinių preparatų; jaunesniems kaip 8 m. vaikams (dėl farmacinės formos). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jeigu „Jox" atsitiktinai patenka į akis, jas reikia gerai nuplauti vandeniu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, „Jox" purškalo reikia vartoti atsargiai. Šiems pacientams preparatas gali sukelti kepenų transaminazių kiekio padidėjimą. Ligoniams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, „Jox" vartoti draudžiama. Vaistinio preparato vartoti ilgiau kaip 7 dienas negalima. Jeigu pasireiškia jautrumas arba nuolatinis lokalus dirginimas, vaistinio preparato vartojimą reikia nutraukti. Sergant laringitu, vaistinio preparato galima vartoti tik būtinu atveju. **Reklaminio teksto parengimo data** 2024-07. OTČ-LT-00080

„Jox" – VIENINTELIS TOKS!

-30% 11<sup>08€</sup> 15<sup>83</sup>

### OCHISAN, akių vokų tepalas, 15 g

#### MEDICINOS PRIEMONĖ

Akių vokų tepalas be konservantų. Padeda palengvinti tokius simptomus, kaip vokų odos niežulys, jų skausmingumas ir patinimas, susijusius, be kita ko, su šorinio miežio ir chalaziono atsiradimu. Veiklioji medžiaga šlūtinis seklųjų medus (manuka) MGO 400+, šlūtinis seklųjų aliejus (manuka).

NUO 4<sup>99</sup> €

### ACC

100 mg milteliai geriamajam tirpalui, 20 paketėlių 4<sup>99</sup> €

200 mg milteliai geriamajam tirpalui, 20 paketėlių 5<sup>49</sup> €

20 mg/ml, geriamasis tirpalas, 100 ml 6<sup>99</sup> €

200 mg, 20 šnypščiujų tablečių 5<sup>49</sup> €

LONG, 600 mg, 6 šnypščiosios tabletės 4<sup>99</sup> €

LONG, 600 mg, 10 šnypščiujų tablečių 7<sup>49</sup> €

#### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** ACC 100 mg milteliai geriamajam tirpalui, ACC 200 mg milteliai geriamajam tirpalui, ACC 20 mg/ml geriamasis tirpalas, ACC 200 mg šnypščiosios tabletės, acetilsisteinas. **Terapinės indikacijos:** gleivių skystinimas sergant ūminėmis ar lėtinėmis bronchų bei plaučių ligomis, kurių metu būna sutrikusi gleivių gamyba bei šalinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** 2-5 m. vaikams – 100 mg, 2 kartus per dieną; 6-14 m. vaikams – 200 mg, 2 kartus per dieną; vyresniems kaip 14 m. paaugliams – 600 mg acetilsisteino. Vartoti per burną. **Kontraindikacijos:** jaunesni nei 2 m. vaikai; „ACC Long" 600 mg šnypščiosios tabletės netinka jaunesniems nei 14 m. vaikams; padidėjęs jautrumas acetilsisteinui arba pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** bronchinė astma, skrandžio ar žarnų opa, padidėjęs jautrumas histaminui. „Sandoz Pharmaceuticals d.d." filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. B52610069660. Reklamos teksto parengimo data 2024-01-06.

„ACC" – PASIRŪPINSIME JŪSŲ KOSULIU.

NUO 3<sup>99</sup> €

### NOLPAZA

20 mg, 7 skrandyje neirios tabletės 3<sup>99</sup> €

20 mg, 14 skrandyje neiriu tablečių 5<sup>99</sup> €

#### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veiklioji medžiaga, stiprumas:** Kiekvienoje skrandyje neirioje tabletėje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidrato pavidalu). **Terapinės indikacijos:** Trumpalaikis suaugusių žmonių gastrozofaginio refliksų simptomų (pvz., rėmens, rūgšties regurgitacijos) gydymas. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** Rekomenduojama pantoprazolo paros dozė yra 20 mg (viena tabletė). Kad simptomai palengvėtų, tablečių gali reikėti gerti 2-3 dienas iš eilės. Kai simptomai visiškai išnyksta, gydymas turi būti nutrauktas. Nepasitarus su gydytoju, gydymas negali trukti ilgiau kaip 4 savaites. „Nolpaza" nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nepakanka. „Nolpaza" 20 mg skrandyje neiriu tablečių negalima kramtyti arba smulkinti, jas reikia nurinti nesmulkintas užgeriant skysčiu prieš valgį. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nerekomenduojama pantoprazolo vartoti kartu su ŽIV proteazės inhibitoriais, pvz., atazanaviru, nelfinaviru, nes reikšmingai sumažėja tokių vaistinių preparatų biologinis prieinamumas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Pacientui turi būti paaiškinta, kad toliau išvardyti atvejais jis privalo kreiptis į gydytoją: netikėtai mažėja kūno svoris, yra anemija, kraujavimas iš virškinimo trakto, disfgija, nuolatinis vėmimas ar vėmimas krauju. Tokie simptomai gali palengvėti, todėl sunki liga gali būti diagnozuojama vėliau. Tokiu atveju būtina paneigti vėžio susirgimo diagnozę; yra buvusi skrandžio opa arba operuotas virškinimo traktas; 4 savaites ar ilgiau nuolat vartojama nevirškinimo ar rėmens simptomus lengvinančių vaistinių preparatų; yra gelta, kepenų funkcijos sutrikimas arba kepenų liga; yra bet kokia kita sunki liga, bloginti bendrąją savijautą; pacientas vyresnis kaip 55 metų ir anksčiau simptomų nebuvo arba buvo simptomai pasikėitę. Simptomai gali pradėti lengvėti po maždaug vienos gydymo pantoprazoliu dienos, tačiau kad rėmus išnyktų visiškai, vaistinio preparato gali tekti vartoti 7 dienas. Pantoprazolo pacientai negali vartoti profilaktikai. Dėl padidėjusios chromogranino A (CgA) koncentracijos gali būti sunkiau atlikti neuroendokrininių navikų tyrimus. „Nolpaza" tabletės yra sorbitolis ir natrio. Geriamojo vaistinio preparato sudėtyje esantis sorbitolis gali kurti vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį prieinamumą. Šio vaistinio preparato tabletėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės. **Reklamos teksto parengimo data** 2025.04.07.

„NOLPAZA" UŽGESINA RĖMENĮ ILGAMI!

7<sup>99</sup> €

### TONZIRIN, 8,75 mg, 24 kietosios pastilės

#### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

TONZIRIN, 8,75 mg kietosios pastilės yra flurbiprofeno. Flurbiprofenas priklauso vaistų, kurie vadinami nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU), grupei. Šie vaistai pasižymi skausmą ir karščiavimą mažinančiu bei prieš uždegiminiu poveikiu. TONZIRIN kietosios pastilės yra vartojamos skaudaus gerklės simptomams palengvinti, tokiems kaip gerklės skausmas, skausmingumas ir patinimas, sunkumas nuryti, suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams. Jei po 3 dienų ligos požymiai išlieka ar pasunkėja, kreiptis į gydytoją. Prieš pradėdami vartoti TONZIRIN, turite atidžiai perskaityti informacinį lapelį. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti TONZIRIN. TONZIRIN vartoti draudžiama: - jeigu yra alergija, jeigu kada nors buvo pasireiškusi astma, netikėtas svoris, sloga, veido patinimas ar niežintis bėrimas (dilgėlinė) pavartojus aspirino ar kitų NVNU; - paskutiniuosius 3 mėnesius; - jeigu Jums yra ar kada nors buvo pasireiškę sunkių širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų. Vairavimas ir mechanizmo valdymas. Tyrimų poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus nebuvo atlikti. Tačiau saugaus ir regos sutrikimai yra galimi šalutiniai poveikiai pavartojus nesteroidinių vaistų nuo uždegimo. Jeigu tokių pasireišimų, nevairuokite ir nevaldykite mechanizmo. Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: viena kietąją pastilę išdėkite į burną ir lėtai išdulkite. Gulpiamo metu nuolat judinkite kietąją pastilę burnos ertmėje. Pastilių gydymas poveikis turėtų pasireikšti po 30 minučių. Jeigu reikia, vartokite po vieną pastilę kas 3-6 valandas. - Vartoti daugiau kaip 5 kietąsias pastiles per 24 valandas negalima. Jaunesniems kaip 12 metų vaikams vartoti negalima. **Nutraukite šio vaisto vartojimą ir nedelsiant susisieki su gydytoju, jeigu Jums pasireiškia:** alerginės reakcijos, veido, lūzvio ar gerklės patinimas, širdies ritmo padidėjimas ir kraujospūdžio sumažėjimas, sunkios odos reakcijos. **Textas paskutinį kartą peržiūrėtas 2025 08 08**



5<sup>99</sup> €**IBUMETIN EXPRESS, 400 mg, 20 minkštųjų kapsulių****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veiklioji medžiaga:** kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno. **Terapinės indikacijos:** suaugusiems ir paaugliams, sveriantiems ne mažiau kaip 40 kg (12 m. ir vyresniems): trumpalaikis lengvo ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip galvos, dantų, raumenų, sąnarių ar sukkelto menstruacijų, malšinimas. Karščiavimo, susijusio su peršalimu, malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** įprasta vienkartinė dozė yra 1 kapsulė. Didžiausia paros dozė yra 1 200 mg ibuprofeno (3 kapsulės). Kapsulę užgerti stikline vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Anksčiau buvo pasireiškus acetalicilio rūgšties arba kitokių nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) sukelta astma, dusulys, sloga, patinimas ar (neįtintis) šėberimas. Aktyvi arba buvusi psichomotorinė skrandžio opa arba kraujavimas iš skrandžio, su NVNU susijęs kraujavimas iš virškinimo trakto arba virškinimo trakto perforacija. Jei yra sunkus kepenų, širdies, inkstų funkcijos nepakankamumas, kraujavimas ir smegenis arba kitas aktyvus kraujavimas, pasireiškę kraujo krešėjimo sutrikimu arba kitų kraujavimo sutrikimų, sunkių skydliaukės (sukelta vėmimo, viduriavimo arba nepakankamo skysčių vartojimo), padidėjusi trys nėštumo mėnesiai. Netinka vaikams ir paaugliams iki 12 m. **Specialūs įspėjimai:** specialų atsargumo priemonių reikia, jei padidėjęs kraujospūdis, sergate širdies, inkstų ir kepenų liga, turite paveldimą kraujodaros sutrikimą (ūminė kranicidinė porfiriya), turite arba anksčiau esate turėję žarnyno problemų arba ligų (opinis kolitas, Krono liga), sergate astma, sistetine raudonąja vilkligė arba mišria jungiamojo audinio liga, jei jums neseniai buvo atlikta didelės apimties chirurginė operacija, sergate šienlige, turite nosies polipų arba lėtinį obstrukcinį kvėpavimo sutrikimą. Ilgai vartojant skausmą malšinančius vaistus nuo galvos skausmo, jis gali pasunkėti. Tai pajutė arba įtardami, turėtumėte nustoti vartoti šį vaistą ir kreiptis į gydytoją. Dažnas (kelių rūšių) skausmą malšinančių vaistų vartojimas gali sukelti ilgalaikį sunkių inkstų pažeidimą, ilgai vartojant šio vaisto, būtina reguliariai tirti kepenų ir inkstų veiklą bei atlikti bendrą kraujo tyrimą. Reikia vengti „Ibumetin Express“ vartoti sergant vėžėjais arba kartu su kitais NVNU. Vaistai nuo uždegimo ir (arba) skausmo, tokie kaip ibuprofenas, gali būti susiję su nedideliu širdies priepuolio ar insulto rizikos padidėjimu, ypač vartojant didesnes dozes. Neviršykite rekomenduojamos dozės ar gydymo trukmės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu jums pasireiškė širdies problemų, įskaitant širdies nepakankamumą, krūtinės anginą, arba jeigu jums buvo širdies priepuolis, atlikta širdies kraujagyslių jungčių suformavimo operacija, diagnozuota periferinių arterijų liga arba buvo išties bet kokios rūšies insultas, įskaitant miokardo infarktą, nustatytas didelis cholesterolio kiekis, buvo širdies liga sirgusių giminių arba giminių, kuriuos išliko insultas, arba jeigu rūkote. Jeigu vartojate šio vaisto sirgami infekcine liga ir įsų infekcijos simptomai nepaėna arba pasunkėja, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Būvo pranešta apie alergines reakcijas į šį vaistą požiūmis, įskaitant kvėpavimo sutrikimus, vėdo ir kaklo srities patinimą, krūtinės skausmą. Gydant ibuprofenu buvo pranešta apie sunkias odos reakcijas, įskaitant ekzfoliacinį dermatitą, daugiformę eritemą, Stenveno-Džonsono sindromą, toksinę epidermio nekrolizę, vaisto sukeltą reakciją su eozinofilija ir sistemine eritema, ūminę generalizuotą egzanteminę pustuliozė. Jei pastebėte bet kurį sunkių odos reakcijų ar alergijos simptomų, nutraukite „Ibumetin Express“ vartojimą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Vasto negalima vartoti, jei nustatys paveldimas sutrikimas – visiškas laktozės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pirmuosius 6 nėštumo mėnesius vartoti negalima, nebent tai neabejotinai būtina ir taip pataria gydytojas. Teksto parengimo data 2024-05-03.

**NORMALIZUOJA ŽARNYNO VEIKLĄ**NUO 6<sup>99</sup> €**LINEX**16 kietųjų kapsulių 6<sup>99</sup> €  
32 kietosios kapsulės 11<sup>99</sup> €**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veiklioji medžiaga, stiprumas:** 1 kapsulėje yra ne mažiau kaip 1,2 x 10<sup>7</sup> KSV liofilizuotų gyvybingų bakterijų (*Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium infantis*, *Enterococcus faecium*). **Terapinės indikacijos:** viduriavimui, pilvo pūtimui ar kitokiam virškinimo sutrikimui gydyti kaip pagalbinė priemonė. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** mažesniems kaip 2 m. vaikams gerti po 1 kapsulę 3 kartus per dieną, 2–12 m. vaikams – po 1–2 kapsules 3 kartus per dieną, o vyresniems nei 12 m. – po 2 kapsules 3 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pieno baltymams ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** specialų atsargumo priemonių reikia, jei išmatose yra kraujo ar gleivių. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Uptės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2601069673. Reklamos teksto parengimo data 2024-01-06.

**ESANT AKIŲ UŽDEGIMUI**-40% 14<sup>98€</sup> 24<sup>97</sup>**DESODROP®, akių lašai, 8 ml****MEDICINOS PRIEMONĖ**

Liposominis ozonotas tirpalas akims su „LipozoneEye“.

Ozonas – galintis natūralus antikūnis, turintis plataus spektro antibakterinį, antivirusinį, priešgrybelinį poveikį. Preparatas skirtas uždegimo simptomams gydyti, taip pat ir infekcinės kilmės (konjunktyvitui, keratitui, blefaritui ir pan.), sergantiesiems psichomotoriniams akių infekcijoms, infekcijų profilaktikai po chirurginių intervencijų, traumų. Apsaugo rageno epitelį, skatina gijimą, stabilizuoja ašarų plevėle. 2024-11-19

**OZONO TERAPIJA AKIES PAVIRŠIAUS LIGOMS**6<sup>99</sup> €**FURASOL, 100/900 mg, 5 paketėliai****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Kokybinė ir kiekybinė sudėtis.** Kiekviename miltelių paketėlyje yra 100 mg furagino kalio druskos ir 900 mg natrio chlorido. **Terapinės indikacijos.** Lokalus infekcijos sukeltos burnos ertmės ir ryklės uždegimo gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems žmogui ir vyresniems kaip 4 m. vaikams. Tirpalą reikia ruošti prieš pat vartojimą. Paketėlyje esančius miltelius reikia ištirpinti stiklinėje karšto virinto vandens ir šiltu tirpalu 2–3 kartus per dieną skalauti burną arba gargaliuoti. Tirpalą reikia suvartoti iš karto. Jo laikyti negalima. **Vartojimo būdas.** Sergant burnos ertmės ligomis skalauti, o sergant ryklės ligomis – gargaliuoti apie 20–30 sekundžių, po to tirpalą išspjauti. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas furaginui, nitrofurano grupės junginiams. Pacientas yra jaunesniems negu 4 m. vaikas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Tirpalą burnai ir ryklei skalauti reikia ruošti prieš pat vartojimą. Nesuvarotus vaisto likučius reikia išpilti. **Sąveika su kitais vaistais.** Jokių klinikai reikšmingų sąveikų nepastebėta. Naujausia pakuočių lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje <http://www.vvkt.lt>. Prašome įdėmiai perskaityti pakuočių lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaėna ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [nepageidaujama@vvkt.lt](mailto:nepageidaujama@vvkt.lt) arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje [www.vvkt.lt](http://www.vvkt.lt). Reklamos teksto parengimo data 2025-10-10. FUR10102025LT

**SKALAUK GERKLĘ VISU BALSU!****NUO SLOGOS**4<sup>99</sup> €**GALATHENAL**

1 mg/50 mg/ml, nosies purškimas, 10 ml

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veiklioji medžiaga, stiprumas:** 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido ir 50 mg deksantenolio. **Terapinės indikacijos:** „Galathenal“ skirtas suaugusiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) ir kaip pagalbinė priemonė odos bei gleivinės pažeidimams gydyti, nealerginės kilmės išslyrimo iš nosies (vazomotorinio rinitu) mažinti ir kvėpavimui per nosį palengvinti esant nosies užgulimui po nosies operacijos; nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu ir ūminiu prienosinių ančių uždegimu (sinusitu). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams – 1 purškalo tirpalo dozė į kiekvieną šnervę pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Dozavimas priklauso nuo individualaus paciento jautrumo ir klinikinio atsako. „Galathenal“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 paras, nebent gydytojas nurodė kitaip. Dėl vaikų gydymo trukmės reikia pasikonsultuoti su gydytoju. **Kontraindikacijos:** šio vaisto preparato vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliosioms ar pagalbinėms medžiagoms; jeigu yra sausasis nosies gleivinės uždegimas (rinitis sicca); po chirurginio posmegeninės liaukos pašalinimo per nosį (transfenoidalinės hipofizektomijos) arba po kitų chirurginių intervencijų, pažeidžiančių smegenų dangalą; kūdikiams ir jaunesniems kaip 6 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Galathenal“, jeigu esate gydymas monoamino oksidazės (MAO) inhibitoriais; jei yra padidėjęs akispūdis; jeigu sergate sunkia širdies ar kraujagyslių sistemos liga; jeigu yra antinksinių navikų; sergate cukriniu diabetu ar yra suaktyvėjusi skydliaukės veikla; jei yra padidėjusi prostata (prostato hiperplazija). Reklamos teksto parengimo data 2025-08.

**ATKĖMSA NOSĮ IR ATKURIA PAŽEISTĄ NOSIES GLEIVINĘ.**

NUO **4<sup>99</sup>** €**OLFEN**

1 % gelis, 50 g **4<sup>99</sup>** €  
 1 % gelis, 100 g **7<sup>99</sup>** €  
 23,2 mg/g gelis, 50 g **5<sup>99</sup>** €  
 23,2 mg/g gelis, 100 g **8<sup>99</sup>** €

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

1 g gėlio yra 10 mg diklofenako natrio druskos arba 23,2 mg diklofenako dietilamino, atitinkancio 20 mg diklofenako natrio druskos. **Terapinės indikacijos.** Suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams skirtas lokaliai skausmo simptomams malšinti, esant ūminiams (lėmpinams, patempinams ar sumušimams po bukus traumas; minkštųjų audinių uždegimui slopinti (esant tendinitui, bursitui), 14 m. ir vyresniems paaugliams vaistinis preparatas skirtas gydyti trumpą laiką.

**Dozavimas ir vartojimo metodas.** Atsižvelgiant į gydymo kūno dalies dydį, 2-4 (maždaug 1-2 pilnus antpirščius). Olfen 1% gėlio tepama 3-4 kartus per parą ir tolygiai paskirstoma (trinti nereikia). Neviršyti 16 g gėlio paros dozės. Gydymo trukmė priklauso nuo terapinių indikacijų bei vaistinio preparato poveikio. Nepasitarus su gydytoju, suaugusiems „Olfen 1%“ gėlio negalima tepti ilgiau kaip 14 parų, o paaugliams – ilgiau kaip 7 paras. Jeigu per 7 dienas simptomai išlieka arba būklė pasunkėja, reikia kreiptis į gydytoją. „Olfen 23,2 mg/g“ reikia vartoti ant odos 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Atsižvelgiant į gydymo pakeistos vietos dydį, reikia nuo vėšnios iki graikiško riešuto dydžio gėlio kiekio, atitinkancio 1-4 g gėlio, kuris atitinka 20-80 mg diklofenako natrio druskos. Didžiausia paros dozė yra 8 g gėlio, kuris atitinka 185,6 mg diklofenako dietilamino (atitinkancio 160 mg diklofenako natrio druskos). Vartojimo trukmė priklauso nuo simptomų bei pagrindinės ligos. Be gydytojo patarimo „Olfen“ negalima vartoti ilgiau kaip 1 savaitę. Jeigu per 3-5 dienas simptomai nepagerėja arba net pablogėja, būtina gydytojo konsultacija.

**Kontraindikacijos.** „Olfen“ vartoti negalima: jeigu yra alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu Jums kada nors ankščiau pavartojus aceticilicidinio rūgšties arba kitų NVNU (pvz., ibuprofeno) buvo sutrikęs kvėpavimas (astma, bronchų spazmas), dilgėlinė, sloga, vėdo arba liežuviio patinimas; esant odos arba gleivinių avirams žaizdoms, uždegimui arba infekcijai, taip pat sergant egzema; paskutini nštumo trimestras; jaunesniems kaip 14 m. vaikams ir paaugliams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės** reikalingi, jei sergate astma, šerlige, nosies gleivinės patinimu ar kėlinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis, kėlinėmis kvėpavimo takų infekcijoms arba padidėjęs jautrumas kitiems skausmo malšinantiems vaistams ir bet kuriems vaistams nuo reumato; taip pat pacientams, kurie yra alergiški kitiems medžiagoms ir kuriems būna odos reakcijų, niežulys arba dilgėlinė. Kai „Olfen“ vartojamas dideliu odos plotu ir ilgą gydyti, negalima paneigti galimo sisteminio šalutinio poveikio. „Olfen“ galima vartoti tik ant nepažeistos ir sveikos odos. Venkite patekimo į akis ir ant gleivinių. Nesinaudokite orni nepraadžiais vaistais. „Olfen“ vartojimą reikia nutraukti, jei atsiranda odos bėrimas. Vartodami šį vaistą venkite saulės spindulių, taip pat nesinaudokite soliariumu. Saugokitė, kad vaikai negalėtų paliesti šio vaisto gydymo odos vietų. „Olfen 1%“ vartokite atsargiai, jeigu inkstų, širdies ar kepenų funkcija sutrikusi, arba turite ar buvę ankščiau skrandžio opa, žarnyno uždegimas ar esate linkę į kraujavimą. **Reklamos medžiagos parengimo data 2025-01. OLF-1U-0047**

**AKIŲ DIRGINIMO, AŠAROJIMO, PERVERGIMO, VOKŲ KRAŠTŲ UŽDEGIMO LENGVINIMAS**NUO **9<sup>99</sup>** €**OCULOHEEL**

akių lašai (tirpalas), 3 pakėteliai po 5 vienadozės talpykles

**HOMEOPATINIS NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

1 talpykėlė (0,45 ml tirpalo) yra veikliųjų medžiagų: *Euphrasia* D5 110,7 mg, *Cochlearia officinalis* D5 110,7 mg, *Pilocarpus* D5 110,7 mg, *Echinacea* D5 110,7 mg.

**Terapinės indikacijos.** Akių dirginimo, ašarojimo, smėlio akys pojūtio, pervargimo, jautrumo šviesai ir vokų kraštų uždegimo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Vaikams nuo 6 m. ir suaugusiems žmonėms paprastai reikia lašinti į pažeistą akį po 1 lašą 3 kartus per dieną. Jei vartojama ir kitokių akių lašų, tarp jų ir „Oculoheel“ akių lašų vartojimo rekomenduojama daryti 15 minučių pertrauką. Kadangi šio vaistinio preparato sudėtyje yra ežiulės (*Echinacea*), prieš skiriant jį lgesiniam kaip 8 savaitę laikotarpį, rekomenduojamas individualus įvertinimas. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, arba astriinių (graizdažiedžių) šeimos augalams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** *Pagalbinės medžiagos.* Fosfatiniai buferiai. Kiekvienoje šio vaistinio preparato vienadozėje talpykėlėje yra 2,81 mg fosfatų, tai atitinka 6,25 mg/g. Kadangi šio vaistinio preparato sudėtyje yra ežiulės (*Echinacea*), prieš skiriant jį pacientams, turintiems imuninės sistemos funkcijos sutrikimų (pvz., progresuojančių sisteminių sutrikimų, autoimuninių ligų, imunodeficitu, onkologijos ir baltųjų kraujo ląstelių sistemos ligų atvejais), rekomenduojamas individualus įvertinimas. Talpyklės turinį galima vartoti tik 1 kartą, t. y. kartą išlašinti į kairiąją ir (arba) dešiniąją akį tiek, kiek reikia. Talpyklė reikia atidaryti tik prieš pat vaisto vartojimą. Naudojta talpyklė reikia išmesti, net jeigu joje yra vaistinio preparato likučių. **Registruotas.** „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). Registruotojo atstovas: UAB „Farmahelis“. **Reklamos teksto parengimo data 2025-06-16.**

NUO **4<sup>99</sup>** €**FLUDITEC**

20 mg/ml, sirupas, 125 ml  
 50 mg/ml, sirupas, 125 ml

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Karbocisteinas.

**„Fluditec“ 20 mg/ml sirupas** skiriamas bronchų sekrecijos sutrikimams gydyti vaikams nuo 2 m., ypač ūminio bronchito atveju: ūminis bronchitas ir ūminis lėtinis bronchopneumonijos krizė. **Dozavimas.** 1 dozavimo taurelėje (sugrudojote po 5 ml) yra 100 mg karbocisteino. Vyresni kaip 5 m. vaikai: 3 kartus per parą geriama po 100 mg (vieną iki 5 ml žymos pripildytą dozavimo taurelę), 2-5 m. vaikai: 2 kartus per parą geriama po 100 mg (vieną iki 5 ml žymos pripildytą dozavimo taurelę). **„Fluditec“ 50 mg/ml sirupas** skiriamas suaugusiems (nuo 15 m. ir vyresniems) kvėpavimo takų ligoms, susijusioms su apsunkintu skreplių išsiskyrimu (kai sunku pašalinti bronchų sekretą kosint), gydyti. **Dozavimas.** Rekomenduojama gerti po 1 dozavimo taurelę ryte, per pietus ir vakare, nevalgius, nevirsiantį 3 dozavimo taurelių per parą. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, sergant aktyvia pepsine opa, kėdikams ir jaunesniams kaip 2 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai.** Esant produktiviam kosuliui su pilingais skrepliais, karščiuojant ar sergant lėtine bronchų medžio ar plaučių liga, klinikinė situacija turi būti vertinama pakartotinai. Produktivūs kosulys yra esminė bronchų ir plaučių gynybos mechanizmo dalis, todėl neturi būti slopinamas. Neracionali bronchų gleivinės modifikatoriaus derinimas su vaistais nuo kosulio ir (arba) sekretų sausinamomis medžiagomis (cholinoblokatoriais, pvz., atropinu). Esant oro srauto bronchuose sutrikimui, pavojinga vartoti kosulį slopinančių ir (ar) gleivės skystinamųjų preparatų dėl bronchų užsikimšimo sekreto tikimybės. Mukolitikiniai vaistiniai preparatai kėdikams gali sukelti bronchų užsikimšimą. Kėdikių ir jaunesnių kaip 2 m. vaikų gebėjimas iškosėti bronchose išsiskiriančias gleives yra ribotas dėl jų fiziologinių kvėpavimo takų ypatybių. Juos draudžiama vartoti kėdikams ir jaunesniams kaip 2 m. vaikams. Jeigu simptomai ar liga išlieka arba pasunkėja, gydymo taktiką būtina įvertinti iš naujo. **Reklamos teksto parengimo data 2025-11.**

**NUO RĖMENS**NUO **2<sup>99</sup>** €**OMEPRAZOLE INTELI**

20 mg, 14 skrandyje neiurių kietųjų kapsulių

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

„Omeprazole Intelli“ sudėtyje yra aktyvios medžiagos omeprazolo. „Omeprazole Intelli“ mažina rūgšties kiekį Jūsų skrandyje. Vaistas vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refluksinio simptomų (rėmens ir rūgšties atpylimo) gydymui. „Omeprazole Intelli“ vartoti negalima jeigu Jūs esate alergiškas omeprazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (nurodyta informaciniame lapelyje); jeigu Jūs esate alergiškas kitiems vaistams, priklausantiems protonų siurblio inhibitorių grupei (pvz., pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, ezomeprazolui); jeigu Jūs vartojate vaisto, kurio sudėtyje yra nelfinavirio (vartojamo nuo ŽIV infekcijos). Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Omeprazole Intelli“. Ypač jei vartojate informaciniame lapelyje išvardytų vaistų. Neštumas ir žindymo laikotarpis. Prieš vartodama „Omeprazole Intelli“, pasakykite savo gydytoju, jog esate nėščia ar ketinate pastoti. Tokiu atveju gydymojo nuspręs, ar šiuo laiku Jums galima vartoti „Omeprazole Intelli“. Kaip vartoti „Omeprazole Intelli“. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Kreipkitės į savo gydytoją. Galimas šalutinis poveikis. Šis vaistas, kaip ir kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Nedelsdami nutraukite „Omeprazole Intelli“ vartojimą ir kreipkitės į gydytoją, jeigu pastebite kurį nors iš šio reito, bet sunkaus šalutinio poveikio atveju: staiga prasidėjęs svorėjimas, lūpų, liežuviio, gerklų ar kūno tinimas, išbėrimas, alpimas ar sutrūko rijimas (sunki alerginė reakcija); paraudo, tapo pūslėta ir lupasi oda. Taip pat gali atsirasti lūpų, akių, burnos ertmės, nosies, lytinių organų pūslėtumas ar kraujavimas (tai gali būti Stevens-Johnson sindromas arba toksinė epidermolizė); pagelto oda, patamsejo šlapimas ar atsirado nuovargis (šie simptomai gali rodyti sutrikusią kepenų funkciją). Ši informacija paskutini kartą peržiūreta 2024 04 29

**SKAUSMUI MALŠINTI, TEMPERATŪRAI MAŽINTI**NUO **1<sup>99</sup>** €**IBUGARD**

200 mg, 10 minkštųjų kapsulių

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** kiekvienoje kapsulėje yra 200 mg ibuprofeno. **Indikacijos:** trumpalaikis simptominis įvairios kilmės silpno ir vidutinio stiprumo skausmo gydymas; simptominis įvairios kilmės karščiavimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** nustatant ibuprofeno dozę, reikia atsižvelgti į paciento kūno svorį ir amžių. Paprastai vienkartinė ibuprofeno dozė yra 7-10 mg/kg kūno svorio, maksimali paros dozė yra 20-30 mg/kg kūno svorio. Minimalus laiko tarpas tarp dozių – 4-6 valandos. **Kontraindikacijos:** „Ibugard“ nevartoti, jeigu yra padidėjęs jautrumas vaisto sudedamosioms medžiagoms; paskutinis nštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai:** jeigu prasideda virškinamojo trakto kraujavimas arba išopėjimas, gydymą ibuprofenu reikia nedelsiant nutraukti. Sergant vėjarupiais reikia vengti vartoti ibuprofeno. Atsargiai skirti pacientams, kuriems praeityje yra buvę virškinamojo trakto ligų, buvusios hipertenzija arba širdies nepakankamumas, sutrikusi inkstų, kepenų funkcija, nustatyta sisteminė raudonoji vilkligė arba kita imuninio audinio liga, kai pacientas po sunkios chirurginės operacijos ar serga obstrukcine kvėpavimo takų liga, alerginėmis ligomis. Ibuprofenas laikinai gali slopinti trombocitų funkciją. Nevartoti pacientams, kuriems yra retas paveldimas fruktozės netoleravimas. Teksto paruošimo data 2025 02.

**ODAI****-30%** **5<sup>58€</sup>** ~~7<sup>78€</sup>~~**INO BIO HERBA BALM**

šildantis kūno balzamas su eteriniais aliejais, 40 ml

Kūno balzamas tepamas ant rėtinės, nugaros bei padų turi efektyvų poveikį odai. Jis švelniai maitina odą dėl jame esančių sviestmedžio aliejaus ir Vit E.



## NUO RĖMENS

NUO 2<sup>99</sup> €

## RANIGAST S-O-S

12 kramtomųjų tablečių 2<sup>99</sup> €  
24 kramtomosios tabletės 4<sup>99</sup> €

## MEDICINOS PRIEMONĖS

„Ranigast S-O-S“ yra skirtas gastroezofaginio refliksio simptomams (rėmeniui, skrandžio skausmui, dispepsijai) malšinti.

- Veikia akimirksniu – nuo to momento, kai tik sučiulpsite ar išgersite tabletę.
- Dėl ypatingos sudėties apsaugo skrandžio gleivinę ir sumažina rėmens epizodų skaičių.
- Tinka naudoti ir kaip papildoma priemonė sergantiems gastritu, peptine opa.
- Galima naudoti nėštumo ir žindymo metu, prieš tai pasitarus su gydytoju.

Suaugusiems ir vaikams nuo 12 metų: rekomenduojama pavalgius vartoti 2 tabletes. Vaikams (6–12 metų): rekomenduojama pavalgius vartoti 1 tabletę.

NUO 6<sup>99</sup> €

## TANTUM VERDE®

TANTUM VERDE®, 1,5 mg/ml, burnos gleivinės purškalo (tirpalas), 30 ml 9<sup>99</sup> €TANTUM VERDE®, 3 mg/ml, burnos gleivinės purškalo (tirpalas), 15 ml 9<sup>99</sup> €TANTUM VERDE®, 3 mg, 20 kietųjų pastilių 6<sup>99</sup> €TANTUM LEMON®, 3 mg, 20 kietųjų pastilių 6<sup>99</sup> €

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veiklioji medžiaga, stiprumas:** 1 ml burnos gleivinės purškalo yra 1,5 mg arba 3 mg benzidamino hidrochlorido. 1 pastilėje yra 3 mg benzidamino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** lokalus simptominis skausmingo burnos, ryklės bei dantenų uždegimo ir patinimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti į burną ir ryklę. **Purškalo:** reikia purkšti 2–6 kartus per parą. Suaugusiems: po 4–8 „Tantum Verde“ išpurškimus; 6–12 m. vaikams: po 4 „Tantum Verde“ išpurškimus; 3–5 m. vaikams: po 1 „Tantum Verde“ išpurškimą 4 kg kūno svorio (daugiausia 4 išpurškimus). Suaugusiems: po 2–4 „Tantum Verde“ forte“ išpurškimus; 6–12 m. vaikams: po 2 „Tantum Verde“ forte“ išpurškimus; 3–5 m. vaikams: po 1 „Tantum Verde“ forte“ išpurškimą 8 kg kūno svorio (daugiausia 2 išpurškimus). **Pastilės.** Suaugusiems: 1 kietoji pastilė 3–4 kartus per parą; 6–12 m. vaikams galima vartoti tik suaugusiam žmogui prižiūrint; jaunesniems negu 6 m. vaikams vartoti negalima. **Kontraindikacijos:** alergija benzidaminui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Alergija salicilo rūgščiai arba (ir) bet kuriam nesteroidiniam vaistui nuo uždegimo. **Specialūs įspėjimai:** per aspiriną pavartojus (pvz., vaikui) labai daug vaisto, būtina nedelsiant informuoti gydytoją. Pirmoji pagalbė gydymo priemone gali būti vėmimo sukėlimas. Jeigu trumpalaikis gydymas benzidaminu reikiamo poveikio nesukelia, būtina kreiptis į gydytoją. Reikia saugotis, kad vaistinio preparato nepatektų į akis. Ilgalaikis gydymas benzidaminu gali lemti jutrumo padidėjimą. Tokiu atveju vaistinio preparato vartojimą turite nutraukti ir kreiptis į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2025-04-03.

-30%



## NAVIVISION, NAVITAE, NAVI INFLA

NAVIVISION PLUS, pavargusioms akims, 15 ml 4<sup>22</sup> 9<sup>08</sup> €NAVIVISION PLUS, paraudusioms akims, 15 ml 4<sup>22</sup> 9<sup>08</sup> €NAVIVISION PLUS, sudirgusioms akims, 15 ml 4<sup>22</sup> 9<sup>08</sup> €NAVITAE PLUS PF, antioksidaciniai ir lubrikuojantys akių lašai, 10 ml 18<sup>22</sup> 13<sup>28</sup> €NAVI INFLA, akių lašai konjunktyvito simptomams lengvinti, 15 ml 4<sup>22</sup> 9<sup>08</sup> €

## MEDICINOS PREKĖS

**Navivision** akių lašai – stipriai drėkinantys natūralūs akių lašai su natrio hialuronatu 0,3 % pagrindinėms akių problemoms spresti. **Pavargusioms akims** – užtikrina greitą ir ilgalaikį palengvėjimą esant sausų ir pavargusių akių pojūčiui. **Sudirgusioms akims** – akių alergijos simptomams palengvinti bei pagrindinėms akių problemoms spresti. **Paraudusioms akims** – palengvina paraudusių ir pavargusių akių būklę, susijusią su konjunktyvitu (niežėjimas, ašarojimas, deginimas ir t.t.). **Navitae Plus PF** – antioksidaciniai poveikio ir tepamosiomis savybėmis pasižymintys akių lašai su vitaminais A + E. Palengvina sausų akių sindromą ir akių diskomfortą, kurį sukelia: keratitas, šaltinis poveikis po ragenos operacijos, trauminės opos, ragenos uždegimas. Be konservantų. **Naviflora** – antioksidaciniai drėkinamieji akių lašai su natūraliais augaliniais ekstraktais skirti naudoti esant ūmiams, lėtiniam ar alerginiam konjunktyvitui. Lengvina su konjunktyvitu susijusius simptomus: ašarojimą, paraudimą ir niežėjimą.

6<sup>99</sup> €

## BRONCHIPRET® TI geriamasis tirpalas, 100 ml

## NERECEPTINIS AUGALINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Terapinės indikacijos.** „Bronchipret“ TI® yra augalinis vaistas, skirtas ūminio bronchito sukeltą drėgną kosulio priepuoliams retinti ir atsikosėjimui gerinti. **Veikliosios medžiagos ir stiprumas:** 1 g tirpalo yra 150 mg vaistinių dobrielių žolės skystojo ekstrakto, 15 mg geberijų lapų skystojo ekstrakto. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Bronchipret“ TI® 1–5 m. amžiaus vaikams gerti po 3,2 ml, 6–11 m. amžiaus vaikams – po 4,3 ml, nuo 12 m. ir suaugusiems – po 5,4 ml 3 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas geberienoms, dobrieliams arba kitiems Lamiaceae (lūpažiedžių) ir Araliaceae šeimų augalams, beržams, paprastiesiems kiečiams, salierams arba arba kitoms preparato sudedamosioms dalims. **Specialūs įspėjimai:** jeigu simptomai išlieka ilgiau nei 1 savaitę arba jeigu prasideda dusulys, karščiavimas, o skrepliai tampa pūlingi arba juose atsiranda kraujo priemaišų, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Rekomenduojama imtis atsargumo priemonių pacientams, sergantiems gastritu arba skrandžio opa. „Bronchipret“ TI® negalima vartoti jaunesniems nei 1 m. amžiaus vaikams. Jeigu 1–4 m. vaikams pasireiškia nuolatinis arba pasikartojantis kosulys, reikia kreiptis į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-15.

## KOSULYS? BRONCHITAS? „BRONCHIPRET“!

## NUO SUMUŠIMŲ

9<sup>99</sup> €

## DOLOBENE™, gelis, 50 g

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 g gelio yra 500 TV heparino natrio druskos, 150 mg dimetilsulfoksido, 25 mg dekspantenolio. **Terapinės indikacijos:** patinimo, hematomos ir uždegimo po bukų raumenų, sausgyslių, sausgyslių makščių, raščių, sąnarių traumos gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tepti geliu pažeista vietą 1–2 kartus per parą. Nereikia įtrinti, tik švelniai užtepti ir paskiebt. Nenaudoti po oro nepažeidžiančias tvarščias. „Dolobene“ negalima tepti ant atvirus žaizdas, pažeistos odos ir gleivinės. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sergantiesiems raudonąja vilkige; astma; jaunesniems kaip 5 m. vaikams; esant sunkiems inkstų ir (arba) kepenų pažeidimams, kraujotakos sutrikimams; negalima vartoti kartu su sulindakais. **Specialūs įspėjimai:** nepatariama tepti ant pažeistos odos ir gleivinės. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024 m. balandis. DLBN-LT-00001

## NUO KARŠČIAVIMO IR SKAUSMO

7<sup>99</sup> €

## IBUPROM

40 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams, 100 ml

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 ml „Ibuprom“ 40 mg/ml geriamosios suspensijos yra 40 mg ibuprofeno. **Indikacijos:** trumpalaikis silpno ir vidutinio skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. „Ibuprom“ skirtas 3 mėn. ir vyresniems kūdikiams ir vaikams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. 3–6 mėn. kūdikiams (> 5 kg) gerti po 1,25 ml 3 k. per parą, 6–12 mėn. kūdikiams (8–10 kg) – po 1,25 ml 3–4 k. per parą, 1–3 m. vaikams (10–15 kg) – po 2,5 ml 3 k. per parą, 3–6 m. vaikams (15–20 kg) – 3,75 ml 3 k. per parą, 6–9 m. vaikams (20–30 kg) – po 5 ml 3 k. per parą, 9–12 m. vaikams (30–40 kg) – po 7,5 ml 3 k. per parą. Nurodytą vaisto dozę reikia skirti maždaug kas 6–8 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofenui, kitoms nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU) ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitų NVNU vartojimas, kraujo krešėjimo sutrikimai, paskutinis nėštumo trimestras, tromboticoponija, sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas, praėjusių buvusios padidėjusio jautrumo reakcijos (astma, rinitas, angioneurozinis patinimas, dilgėlinė) vartojant kitą NVNU, įskaitant ir acetilsalicilo rūgšties darinius, esama ar buvusi pepsinė opa / hemoragija, buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu, kraujavimas į smegenis, virškinimo trakto ar kitos kraujavimas, sisteminė raudonoji vilkigė. **Specialūs įspėjimai:** senyviems pacientams, pacientams, turintiems inkstų, kepenų, žarnyno, virškinimo trakto problemų, pacientams, kuriems anksčiau buvo virškinimo trakto opa ar infarktas, sergantiems diabetu, sisteminė raudonoji vilkigė, širdies nepakankamumu, virškinimo trakto opa, hipertenzija, bronchių astma, rūkantiems pacientams, taip pat pacientams, kuriems padidėjęs cholesterolio kiekis, yra įgimtas porfirino apykaltos sutrikimas, dehidracija, vartojantiems vaistus, galinčius padidinti opų ar kraujavimo pavojų, ibuprofeną reikia vartoti atsargiai. **Reklamos teksto parengimo data** 2024-11-29.

## RENKUOSI „IBUPROM“. RENKUOSI LAISVĖ.

## KOJŲ VENOMS

16<sup>99</sup> €

VELIOS. 1000 mg, 30 plėvelė dengtų tablečių

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veiklioji medžiaga, stiprumas:** kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 1000 mg mikronizuoto diosmino. **Terapinės indikacijos:** suaugusiųjų lėtinio veninės kraujotakos nepakankamumo simptomų gydymas, esant: apatinių galūnių venų varikozėi, venų opoms, telangiektazijoms ir retikuliniams varikozėms ar venoms, sunkumui, nuovargiui, diskomfortui ar neramių kojų pojūčiui, kojų skausmui ar deginimo pojūčiui, šaltų kojų pojūčiui, naktiniams kojų mėšlungiui, apatinių galūnių patinimui, niežuliui, parestzijai (odos dirglinėjimui, badymui ar niežėjimui), odos eritemai ar cianozėi. Suaugusiųjų patinėjusio hemorojaus simptomų gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** lėtinio venų nepakankamumo simptomais gydymas: 1 tabletė per parą valgio metu, vartoti bent kelias savaites. Ūminio hemorojaus simptomais gydymas: pirmąsias 4 dienas gerti 3 tabletes per parą, 3 kitas dienas – po 2 tabletes per parą, gydymas turi būti trumpalaikis. Vartoti per burną. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija diosminui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** patinęs hemorojaus simptomams, reikia prisiminti, kad „Velios“ veikia tik simptomus ir turi būti vartojamas trumpai. Jei simptomai nepaieina, reikia atlikti tiesiosios žarnos tyrimą ir parinkti tinkamą gydymą. „Velios“ nėra veiksmingas gydant su stažiniu širdies nepakankamumu susijusią edemą. „Velios“ plėvelė dengtų tablečių turi nevartoti pacientai, kuriems yra širdies nepakankamumas. Kai sutrinkusi kojų veninė kraujotaka, „Velios“ gydymai poveikį gali sustiprinti saulės bei ilgalaikio stovėjimo vengimas, tinkamo kūno svorio palaikymas, specialių kojinių nešiojimas. Kai apatinės kojos dalys patinusios dėl širdies, inkstų arba kepenų ligos, šis vaistas nepažada. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „Velios“ sudėtyje yra saulelydyžio gellonojo dažalo (E110), kuris gali sukelti alerginių reakcijų. **Reklamos teksto parengimo data** 2024-11-18.

PAJUSK KOJŲ LENGVUMĄ.

11<sup>99</sup> €

VOLTINEX. 140 mg, 5 vaistiniai pleistrai

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Diklofenako natrio druska. **Terapinės indikacijos:** Vietinis, simptominis, trumpalaikis (ne ilgiau kaip 7 paras) skausmo malšinimas po ūminio patempimų, įplyšimų ar sumušimų, atsiradusių dėl rankų ir kojų traumų, 16 m. ir vyresniems paaugliams bei suaugusiems. **Vartojimas.** 1 vaistinis pleistras turi būti užklijuojamas ant skausmingo ploto 1 kartą per parą. Didžiausia paros dozė yra 1 vaistinis pleistras, net jei yra daugiau nei viena pažeista vieta, kurią reikia gydyti. Tik vienas skausmingas plotas gali būti gydomas vienu metu. Vartoti ant odos. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai ar kitiems nesteroidiniams vaistiniams preparatams nuo uždegimo. Pacientams, kuriems dėl acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistinių preparatų nuo uždegimo vartojimo buvo pasireiškęs astmos priepuolis, dilgėlinė ar ūminis rinitas. Pacientams, kuriems yra aktyvi pepsinė opa. Negalima pleistro naudoti ant pažeistos odos, kad ir koks būtų pažeidimo pobūdis; trečiojo nėštumo trimestro metu. Vaikams ir jaunesniems kaip 16 m. paaugliams. **Specialūs įspėjimai.** Vaistinis pleistras neturi būti klijuojamas ar kaip nors kontaktuoti su akimis ar gleivine. Senyvi pacientai „Voltinex“ turi naudoti atsargiai dėl didesnės šalutinio poveikio pasireiškimo tikimybės. Pasitarkite su gydytoju, jeigu sergate ar sirgote bronchine astma arba alergija, turite inkstų, širdies ar kepenų sutrikimų, anksčiau turėjote skrandžio ar žarnyno opą, žarnyno uždegimą arba turite padidėjusį polinkį kraujuoti. Jei pastebite odos išsėrimą, kuris atsirado naudojant pleistrą, nedelsdami nuimkite vaistinį pleistrą ir sustabdykite gydymą. Nuklijavę pleistrą venkite gydytos vietos kontakto su saulės ar soliariumo spinduliais. „Voltinex“ naudojimo metu nevartokite jokių kitų vaistų su diklofenaku ar kitų nesteroidinių skausmą malšinančių ar prieš uždegiminių vaistų, kad ir kaip jie būtų vartojami – šoriskai ar per burną. Reklamos teksto parengimo data 2025-09. Prekių ženklai priklauso „Haleon“ arba „Haleon“ turi jų licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turetojas.

## PERSALIMUI

NUO 4<sup>99</sup> €

## COLDREX MAXGRIP

LEMON, 1000 mg/10 mg/40 mg milteliai geriamajam tirpalui, 5 pakeliai 4<sup>99</sup> €LEMON, 1000 mg/10 mg/40 mg milteliai geriamajam tirpalui, 10 pakelių 8<sup>99</sup> €MENTHOL & BERRIES, 1000 mg/10 mg/70 mg milteliai geriamajam tirpalui, 10 pakelių 8<sup>99</sup> €

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Terapinės indikacijos.** Trumpalaikis persalimo ir gripo simptomų (karščiavimo, slogos ir skausmo) lengvinimas. **Vartojimo būdas.** Vartoti per burną. Suberti vieno pakelio turinį į stiklinę, pripilti karšto vandens (maždaug 125 ml), gerai išmaišyti, kol milteliai išsirs. Pagal poreikį pripilti šalto vandens. **Dozavimas.** Suaugusiems (skaitant senyvo amžiaus) ir 16 metų bei vyresniems paaugliams, kurių svoris didesnis nei 54 kg. Rekomenduojama dozė yra 1 pakelis kas 4–6 valandas, jei reikia. Nevartokite daugiau kaip 4 pakelių per 24 valandas. Nevartokite dažniau nei kas 4 valandas. Negalima viršyti nurodytos dozės. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti vaistą, jeigu: padidėjusi prostata arba Jums sunku šlapintis; sergate kraujagyslių liga, vadinama Raynaud fenomenu; sergate inkstų liga; yra lėtinis mitybos nepakankamumas; reguliariai vartojate alkoholį; sergate Žilberto sindromu; vartojate kitų vaistų, kurie veikia kepenų funkciją; Jums trūksta fermento gliukozės 6-fosfato; sergate hemolizine anemija; yra dehidratacija; esate senyvo amžiaus, suaugęs ar paauglys, kurio kūno svoris mažesnis nei 54 kg; yra šlapimo susilaikymas ar šlapimo takų akmenys (negalima vartoti daugiau kaip 1 g vitamino C per parą); sergate astma arba Jums yra padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, pasireiškiantis bronchų spazmu; sergate sunkia infekcine liga, nes gali padidėti metabolinės acidozės rizika. Nevartokite kartu jokių kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio, ar vaistų nuo kosulio ar persalimo, gripo ir nosies gleivinės paburkimo ar užgulios nosies. Per didelės paracetamolio dozės gali sukelti sunkių kepenų pažeidimą. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu padidėjęs kraujospaudimas; jeigu padidėjęs skydlaukės aktyvumas; jeigu sergate cukriniu diabetu; jeigu sergate širdies liga; jeigu sergate uždaro kampo glaukoma; jeigu sergate feochromocitoma; jeigu sergate kepenų ar sunkia inkstų liga; jeigu esate nėščia ar žindote kūdikį; jeigu vartojate vaistų, mažinančių nosies paburkimą, slopinančių apetitą, vaistų nuo persalimo ar apėtą didinančių vaistų; jeigu vartojate tokius vaistus depresijai gydyti kaip trichilius antidepresantus, beta blokatorius arba monoamino oksidazės inhibitorius (MAOI) bei dvi savaites po MAOI vartojimo; jaunesniems kaip 16 metų vaikams ir paaugliams. **Reklamos teksto parengimo data:** 2022-08-01

-40 %



## AMBIO

VITAMINAS C SU CITRUSINIŲ VAISIŲ BIOFLAVONOIDAIS, 30 tablečių 9<sup>99</sup> 5<sup>99</sup> €LIPOSOMINIS VITAMINAS C SU KVERCETINU, 30 kapsulių 16<sup>99</sup> 10<sup>19</sup> €GERKLEI SU ISLANDINE KERPE, purškalas, 20 ml 7<sup>99</sup> 4<sup>79</sup> €GERKLEI SU ISLANDINE KERPE, sirupas, 150 ml 8<sup>99</sup> 5<sup>99</sup> €

## MAISTO PAPILDAI

-40 %



## EPITOME

JOINTS BOVINE COLLAGEN, 12.000 mg, milteliai, 30 paketėlių 49<sup>99</sup> 29<sup>99</sup> €COENZYME Q10, 200 mg, 30 minkštųjų kapsulių 24<sup>99</sup> 14<sup>99</sup> €CARE DETOX FORMULA, milteliai, 240 g 25<sup>99</sup> 15<sup>99</sup> €

## MAISTO PAPILDAI

4<sup>99</sup> €

## MILGAMMA® N, 20 minkštųjų kapsulių

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 40 mg benfotamino (riebaluose tirpus vitamino B<sub>2</sub> darinio), 90 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B<sub>6</sub>) ir 250 µg cianokobalamino (vitamino B<sub>12</sub>). **Terapinės indikacijos.** Vitaminų B<sub>2</sub>, B<sub>6</sub>, B<sub>12</sub> trūkumo šalinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems: po 1 kapsulę 3–4 kartus per parą. Kai liga lengva ir jei vaistinis preparatas padeda, per parą pakanka 1–2 kapsulių. Vartoti per burną. Kapsulę reikia praryti po valgio nesukramtyta, užsigerti trupučiu skysčio. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms, žemės riešutams, sojoms arba bet kuriai vaistinio preparato pagalbinei medžiagai. Asmenims, kuriems trūksta vitamino B<sub>12</sub>, ir kuriems gresia Leberio regos atrofija. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vartojama ilgiau negu 6 mėn. „Milgamma N“ gali sukelti neuropatiją. Reikia atsargiai vartoti kartu vartojamų vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra sorbitolio (ar fruktozės), ir su maistu vartojamo sorbitolio (ar fruktozės) poveikį. Geriamojo vaistinio preparato sudėtyje esantis sorbitolis gali paveikti kitų kartu vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį priimanumą. Jeigu yra alergija žemės riešutams arba sojoms, šio vaistinio preparato vartoti negalima. **Registratojas.** „Worwag Pharma GmbH & Co. KG“, Vokietija. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-12.

GYVYBIŠKAI BŪTINAS GERAI SAVIJAUTAI!





JAMIESON turi ilgametę patirtį - savo produkciją eksportuoja po visą pasaulį jau nuo 1922 metų. JAMIESON naudoja išskirtinę „360 Pure“ technologiją, kuri apima net 360 gamybos proceso kontrolės etapų.

**-40%**

„JAMIESON“ MAISTO PAPILDAMS




Pagaminta Kanadoje

IKI -50 %

**AMBIO**

OMEGA 3-6-9, 60 kapsulių **45<sup>99</sup> 7<sup>99</sup> € -50 %**  
 VALERIJONAS PLUS, 50 tablečių **5<sup>99</sup> 2<sup>99</sup> € -50 %**  
 ŠIRDŽIAI, 30 tablečių **40<sup>99</sup> 6<sup>99</sup> € -40 %**  
 ŠIRDŽIAI, mikstūra, 100 ml **4<sup>99</sup> 2<sup>99</sup> € -40 %**

**MAISTO PAPILAI**-40 % 22<sup>19</sup>€  
~~36<sup>99</sup>~~**EPITOME**

CARDIOVASCULAR FORMULA, 90 kapsulių

**MAISTO PAPILDAI**

- Augalinės sudėties produktas.
- Didelės išskirtinių aktyviųjų medžiagų dozės 1 kapsulėje:
- Fermentuotų sojų ekstrakto, kuriame yra 2000 FU (fibrino vienetai) natokinazės
- Fermentuotų ryžių ekstrakto, kuriame yra 2,9 mg monakolino K
- Bergaminių citrinmedžių vaisių sulčių ekstrakto, kuriame yra 50 mg polifenolių
- Dažinių ciberžolių šaknų ekstrakto kuriame yra 20 mg kurkumino ir 20 mg polikosanolio
- Sudėtyje esantis dažinių ciberžolių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje bei normalią širdies ir kraujagyslių sistemos funkciją.

IKI -40 %

**MICROLIFE**

BP B2 BASIC, automatinis kraujospūdžio matuoklis **70<sup>99</sup> 46<sup>14</sup> € -35 %**  
 BP B3 COMFORT PC, automatinis kraujospūdžio matuoklis **89<sup>99</sup> 58<sup>49</sup> € -35 %**  
 BP B6 CONNECT, automatinis kraujospūdžio matuoklis **99<sup>99</sup> 59<sup>99</sup> € -40 %**  
 NEB 200, inhaliatorius **72<sup>99</sup> 43<sup>43</sup> € -40 %**  
 NEB 400, inhaliatorius, meščiukas **79<sup>99</sup> 51<sup>99</sup> € -35 %**  
 OXY 300, pulsoksimetras **49<sup>99</sup> 32<sup>49</sup> € -35 %**  
 NC 200, skaitmeninis bekontaktis termometras **47<sup>99</sup> 31<sup>19</sup> € -35 %**

**MEDICINOS PRIETAISAI****„MICROLIFE“ INOVATYVIOS TECHNOLOGIJOS**

-20 %



**BIO-GLUCOSAMINE™**, 500 mg, 150 tablečių **33<sup>99</sup> 26<sup>71</sup> €**  
**BIO-GLUCOSAMINE™ MEGA**, 60 tablečių **22<sup>99</sup> 18<sup>23</sup> €**

**MAISTO PAPILDAI**

- Aukštos kokybės gliukozamino sulfatas, išgautas iš giliavandenių vėžiagyvių.
- Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų ir kremzlės funkcijai, susidarymą.
- „Bio-Glucosamine“ MEGA® tabletes papildomai yra chondroitino sulfato.
- Maisto papildai yra geras būdas papildyti organizmą gliukozaminu, nes jo negalime pakankamai gauti su maistu.

**ATMINČIAI IR DĖMESIO KONCENTRACIJAI PAGERINTI**NUO 10<sup>99</sup> €**GINGIUM**

120 mg, 30 plėvele dengtų tablečių **10<sup>99</sup> €**  
 120 mg, 60 plėvele dengtų tablečių **18<sup>99</sup> €**

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** vienoje tableteje yra 120 mg dviskiaudo ginkmedžio lapų ekstrakto. **Terapinės indikacijos:** vyresnio amžiaus žmonių lengvo ir vidutinio sunkumo smegenų kraujotakos nepakankamumo, protarpinio šlubavimo, galvos svaigimo simptomams mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** 1 tabletė 1–2 k/d. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai ar pagalbinėms medžiagoms, nėštumas. **Specialūs įspėjimai:** neskirtas vartoti jaunesniems nei 18 metų žmonėms. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El.paštas: info.lithuania@sandoz.com. BS2601069670. Reklamos teksto parengimo data: 2026 01 06.

NUO 6<sup>99</sup> €**TROXEVASIN**

2 %, 40 g gels **6<sup>99</sup> €**  
 2 %, 100 g gels **9<sup>99</sup> €**

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**


**Veiklioji medžiaga, stiprumas:** 1 g gelio yra 20 mg trokserutino. **Indikacijos:** lėtinio venų nepakankamumo simptomų, pavyzdžiui, kojų skausmo, sunkumo, pabrinkimo lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems pacientams iš ryto ir vakare ligos pažeista vietą reikia patepti nedideliu kiekiu gelio ir švelniai masažuoti tol, kol vaistinis preparatas visiškai įsigers į odą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** vartoti tik ant nepažeistos odos. Geliu negalima tepti atvirų žaizdų bei gleivinės, pvz., akių. Geliu sudėtyje yra benzalkonio chlorido. Vartojant lokaliai gali dirginti, sukelti odos reakcijų. Nėštumo metu gėlį reikia vartoti atsargiai. Nepastebėta, kad „Troxevasin“ sukeltų nepageidaujamą poveikį žindomam kūdikiui. Reklamos teksto parengimo data 2024-04. TROX-LT-00027

**KAD KOJOS BŪTŲ LENGVOS! MEGAUKITĖS TYRINĖDAMI PASAULĮ BE LĖTINIO VENŲ NEPAKANKAMUMO SUKELTŲ SIMPTOMŲ!**



# Epitome

GERAI JAUSTIS YRA KELIONĖ





# 2 UŽ 1 KAINĄ



## 1+1

Dvi tokios pačios  
pakuotės už  
VIENOS KAINĄ!

### DETRICAL

2000 IU, 60 pėvele dengtų tablečių **8<sup>59</sup> €**  
4000 IU, 60 pėvele dengtų tablečių **11<sup>49</sup> €**

#### MAISTO PAPILDAI

Didelė vitamino D dozė tablečių imunitetui, kaulams ir dantims. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų bei raumenų funkciją ir dantų būklę. 1 tabletė per dieną. Užgerti stikline vandens.



## 1+1

Dvi tokios pačios  
pakuotės už  
VIENOS KAINĄ!

### FJØRD STRONG OMEGA-3 CARDIO

60 kapsulių **32<sup>89</sup> €**

#### MAISTO PAPILDAI

Rinkitės galingus žuvis taukus.

„FJØRD STRONG OMEGA-3 Cardio“ – tai biologškai aktyvių junginių – išskirtinai didelio kiekio polifenolių (net 200 mg) ir riebiųjų rūgščių EPR ir DHR – kombinacija jūsų širdies sveikatai ir stiprybei. Omega-3 riebiųjų rūgščių EPR ir DHR padeda palaikyti normalią širdies veiklą, teigiamai poveikis pasireiškia per parą suvartojant >50 mg EPR ir DHR.

„FJØRD STRONG OMEGA-3“ – GALI DAUGIAU NEI TIKIESI.

Gerklėi

## 1+1

Dvi tokios pačios  
pakuotės už  
VIENOS KAINĄ!



### HERBITASSIN®

#### MAISTO PAPILDAI, MAISTO PRODUKTAI, MEDICINOS PRIEMONĖ

„Herbitassin“ – įvairių skonių pastilės bei ledinukai su augaliniais ekstraktais ir vitaminu C – gerklėi ir imunitetui. Islandinės kerpenos padeda palaikyti normalią gerklės ir balso stygų funkciją, mentolis padeda palaikyti normalų kvėpavimą, o vitaminas C – normalią imuninės sistemos veiklą. „Herbitassin“ Iceland moss HYDRO“ pastilės su hialuronu drėkina gerklės gleivinę, ramina gerklės skausmo jausmą, mažina sauso kosulio ir užkimo simptomus. „Herbitassin“ INTENSE“ – intensyvaus mentolio ir eukalipto skonio pastilės gerklėi ir kvėpavimui.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis



## 1+1

Perkant vieną  
pakuotę, antra  
pigesnė arba tokia pati  
– NEMOKAMAI!

### BIOVITAMIN C + ZINC, milteliai, 14 pakelių **5<sup>89</sup> €**

### BIOVITAMINAS D3, milteliai, 20 pakelių **7<sup>39</sup> €**

### BIOCINKAS, milteliai geriamajam tirpalui, 20 pakelių **10<sup>99</sup> €**

### POWER C, milteliai, 10 pakelių **4<sup>49</sup> €**

#### MAISTO PAPILDAI

STIPRUS IMUNITETAS – tai energijos, geros savijautos ir kasdienės sveikatos balanso PAGRINDAS.

Stiprinkite jį su „Biofarmacijos“ atrinktais maisto papildais!

„BioVitamin C + Zn“ – padeda palaikyti normalią imuninės sistemos funkciją, energijos apykaitą ir apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo

„BioVitamin D3“ – svarbus imuninei sistemai, kaulams, dantims ir raumenims.

„BioCINKAS 30 mg“ – didelės dozės cinkas, padedantis palaikyti imunitetą, odos, plaukų ir nagų būklę, baltymų ir DNR sintezę, apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

„Power C 1000 mg“ – vitaminas C, palaikantis normalią imuninės sistemos veiklą.

## 1+1

Perkant vieną  
pakuotę, antra  
pigesnė arba tokia pati  
– NEMOKAMAI!



### „EMILI“ ŽOLELIŲ ARBATOS

Atraskite natūralią kasdienės ramybės ir geros savijautos šaltinį – „Emil“ žolelių arbatas iš kruopščiai atrinktų augalų.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

## 1+1

Perkant vieną  
pakuotę, antra  
pigesnė arba tokia pati  
– NEMOKAMAI!



### ORALFLUX

#### BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Reguliariai naudojamas „Oralflux“ gaivina burnos kvapą. Be alkoholio. Inovatyvus dozatorius užtikrina tikslią skalavimo skysčio dozės ir ekonomišką naudojimą. „Oralflux“ turėtų būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė valant dantis. Naudojimas: norėdami gauti 10 ml skysčio, švelniai paspauskite butelį, kol skystis atsiras virš pusrūkimo prietaiso. Skalaukite burną skysčiu apie 1 min., išspjaukite. Kad poveikis būtų geresnis, nevalykite ir negerkite 2 val. po skalavimo. Buteliukas turi INOVATYVIŲ DOZATORIŲ – TIKSLŲ IR EKONOMIŠKĄ!

### STIPRESNI DANTYS. GAIVESNIS KVAPAS. PLATESNĖ ŠYPSENA!

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

### VITABIOTICS

#### MAISTO PAPILDAI

Jungtinės Karalystės kompanija „Vitabiotics“ kuria ir gamina inovatyvius, naujais moksliniais tyrimais paremtus, itin aukštos kokybės maisto papildus. Nuoseklus ir kruopštus darbo metų sukurti ypatingi produktai, daug pasiekta, tyrinėjant maistingųjų medžiagų įtaką žmogaus sveikatai. „Vitabiotics“ produktų išskirtinumas yra tai, kad juose sukaupias labai didelis reikalingų maistingųjų elementų spektras, optimalūs kiekiai bei specialios deriniai konkrečiai organizmo funkcijai palaikyti.

#### MENAS GYVENTI SVEIKIAU!

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis



## 1+1

Perkant vieną  
pakuotę, antra  
pigesnė arba tokia pati  
– NEMOKAMAI!



**-40 %****VIRONOX****MAISTO PAPILDAI**

Maisto papildų linija „Vironox“ – epigenetinė linija, sukurta bendradarbiaujant su Šveicarijos mokslininkais. „Stiprus imunitetas“ – tik 7 dienos organizmo apsaugai ir imunitetui. 1 paketyje yra net 10,4 g aktyviųjų medžiagų. Sudėtyje esantis vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. „Jėgoms atstatyti“ – maisto papildas tiems, kurie siekia greičiau atgauti jėgas. Kitių ženšenų šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalų organizmo gyvybingumą, vitaminai B6 ir B12 – normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą ir mažinti nuovargį. „Smegenų rūkas“ – protinei veiklai. Rausvųjų rodiolių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją. Niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą. Balzamo „Veiksminga apsauga“ sudėtyje esantis interferonas, hidrolizuotas kolagenas, lizozimas ir eteriniai aliejai veikia sinergiškai ir padeda suformuoti apsauginį barjerą.

**„VIRONOX“ – NELEISK TAVĘS SUSTABDYTI!**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

**GERKLĖS PERŠTĖJIMUI IR UŽKIMIMUI LENGVINTI****IKI -35 %****ISLA®****MEDICINOS PRIEMONĖS**

„Isla“ pastilių su islandinėmis kepenomis sudedamosios dalys padengia gleivines, gerklę ir ryklę kaip balzamas. Tokiu būdu sudirgusi gleivinė apsaugoma nuo tolesnio dirginimo ir greičiau atsigauja dėl malonaus pastilių poveikio, ypač esant užkimimui ir perštinčiai gerklei.

**Isla® Ginger, Mint:** suaugusieji ir vyresni kaip 4 metų vaikai turi lėtai čiulpti 1–2 pastiles keletą kartų per dieną pagal poreikį.

**Isla® Junior:** vyresniems kaip 4 metų amžiaus vaikams pagal poreikį galima duoti lėtai sučiulpti iki 6 pastilių per dieną. Reikia įsitikinti, kad vaikai jau sugeba kontroliuojamai čiulpti pastiles.

**Isla® medic:** suaugusiems ir vyresniems kaip 6 metų vaikams pagal poreikį galima sučiulpti iki 6 pastilių per dieną. Reklamos teksto parengimo data 2024-10-22. PM-LT-2024-10-6135

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

**KVĖPAVIMO TAKAMS IR IMUNITETUI****-30 %****SINULAN FORTE**

15 tablečių **8<sup>99</sup> 5<sup>94</sup> €**

DUO, 15 tablečių **8<sup>99</sup> 5<sup>94</sup> €**

JUNIOR, sirupas, 120 ml **7<sup>99</sup> 5<sup>99</sup> €**

**MAISTO PAPILDAS**

„Sinulan Forte“: skėstaškių kamrų lapų, juoduogių šėivamedžių žiedų ir vaistinių verbenų antžeminės augalo dalies ekstraktai padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų būklę ir imuninės sistemos veiklą. Tik 1 tabletė per dieną.

„Sinulan Forte DUO“: didžiažiedžių tibių žiedų ir vaistinių verbenų antžeminės augalo dalies ekstraktai padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų būklę. Juoduogių šėivamedžių žiedų ekstraktas padeda palaikyti normalią viršutinį ir apatinių kvėpavimo takų būklę ir normalią imuninės sistemos veiklą. Tik 1 tabletė per dieną.

„Sinulan Forte Junior“ sirupas: skėstaškių kamrų lapų, juoduogių šėivamedžių vaisių, mažalapų liepų žiedų, vaistinių svilarožių šaknų ir vaistinių verbenų antžeminės augalo dalies ekstraktai padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų būklę. Skėstaškių kamrų lapų, juoduogių šėivamedžių vaisių ekstraktai ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Biotinas padeda palaikyti normalią gleivinių būklę.

**NOSIES UŽGULIMUI MAŽINTI IR KASDIENEI PRIEŽIŪRAI****-5 %****QUIXX®****MEDICINOS PRIEMONĖS**

„Quixx“ efektyviai mažina peršalimo, gripo ar alergijos sukeltą nosies ir sinusų užsikimšimą. Dozavimas. Kūdikams (nuo 6 mėn.) ir vaikams: 1–2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2–3 kartus per dieną. Suaugusiems: 1–3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2–3 kartus per dieną. „Quixx Acute“ padeda mažinti dėl peršalimo, gripo, alergijų ar alerginio rinito sudirgusių nosies ląsčių užsikimšimą. Vaikams nuo 3 m. ir suaugusiems. Vartokite iki 5 kartų per parą, kol vargina užsikimšusi nosis ar sausi nosies takai. „Quixx Extra“ su eukaliptų aliejumi, mažina nosies ir sinusų užsikimšimą peršalus ir sergant gripu, stimuliuoja nosies ertmių išvalymą, suteikia stiprų gaivumo pojūtį. Dozavimas. Vaikams nuo 6 m.: 1–2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2–3 kartus per dieną. Suaugusiems ir paaugliams: 1–3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2–3 kartus per dieną. „Quixx Soft“ su alavijų ekstraktu – natūrali priemonė, drėkinanti jautrias nosies sienelės ir apsauganti nuo peršalimo sukeliamą nosyje jaučiamų simptomų. Dozavimas. Kūdikams (nuo 6 mėn.) ir vaikams iki 5 m.: 1 įpurškimas į kiekvieną šnervę iki 4 kartų per dieną. Kūdikams ir vaikams nuo 6 mėn. bei suaugusiems: prireikus 1–3 įpurškimai į kiekvieną šnervę kelis kartus per dieną. „Quixx Daily“ kruopščiai praskalauja nosį ir mažina bakterijų, virusų, alergenų bei žiedadulkių, kietųjų dalelių, dulkių kiekį. Vaikams nuo 2 m. ir suaugusiems. Vartokite iki 5 kartų per parą, kol vargina sausa ar sudirgusi nosies ertmė. „Quixx baby“ – mažųjų nosies priežiūra ir higienai nuo pirmosios gyvenimo dienos. Dozavimas. 1–3 lašai į kiekvieną nosies šnervę 2–6 kartus per dieną ar dažniau, jei reikia. Naujagimiams ir kūdikiams iki 3 mėn. rekomenduojama vartoti netiesiogiai, užlašinus ant vatų tamponėlio. Natūralios priemonės. Be konservantų LT\_Qui\_24\_2024\_V1, pharma Reklama paruošta 2024 m. spalio mėn. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius

**KVĖPUOK LENGVAI!**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

**1+1**

Dvi tokios pačios  
pakuotės už  
VIENOS KAINĄ!

**MIRAMILE KIDS, burnos ir gerklės sirupas, 100 ml 8<sup>99</sup> €****MEDICINOS PRIEMONĖ**

„Miramile Kids“ – burnos ir gerklės sirupas malšina vaikams gerklės skausmą, palengvina kosulį. Sudėtyje yra gerklėi ir varginant kosuliui naudingų augalų ekstraktų: čiobrelių, sausųjų šėivamedžių, svilarožių, juoduųjų serbentų. Tinka vartoti vaikams nuo 1 metų.

**1+1**

Dvi tokios pačios  
pakuotės už  
VIENOS KAINĄ!

**APOVIT® VITAMINAS C**

200 mg, 70 apelsinų skonio kramtomųjų tablečių **5<sup>99</sup> €**

**MAISTO PAPILDAS**

Vitaminas C padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių, kaulų, kremzlių, dantenų, dantų ir odos funkcijai, susidarymą. Vitaminas C padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir normalią psichologinę funkciją. **Sudėtis:** 1 tablete yra 200 mg vitamino C – 250 % RMV\*. **Vartojimas:** suaugusiems ir vaikams po 1 tabletę per parą. Nerekomenduojama vartoti vaikams iki 3 metų. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas negali būti vartojamas kaip maisto pakeikalas. Vartojant dideliais kiekiais, gali sukelti viduriavimą. **Reklamos teksto parengimo data** 2022-05-25. \*Referencinė maistinė vertė.

**-30 %****5<sup>17€</sup>****AMEDIPLUS**

Skaitmeninis termometras kietu galiuku, 1 vnt.

**MEDICINOS PRIETAISAS****GERKLĖS DIRGINIMUI, UŽKIMIMUI IR SAUSAM KOSULIUI MALŠINTI****-30 %****HERBISLAND**

16 kietųjų pastilių **8<sup>99</sup> 6<sup>29</sup> €**

sirupas, 150 ml **8<sup>99</sup> 5<sup>90</sup> €**

**MEDICINOS PRIEMONĖS**

Be cukraus. Apelsinų skonio. Kiekvienoje kietojejoje pastilėje yra 3 mg islandinių kepenų sausosio ekstrakto (Cetraria islandica (L.) Acharius s.l., thallus), atitinkancio 90–120 mg islandinių kepenų. Tai yra tradicinis augalinis preparatas, rekomenduojamas ryklės ir burnos gleivinės dirginimui ir su tuo susijusiam sausam kosuliui palengvinti. „Herbisland“ mažina kosulio receptorių dirginimą ir drėkina sausa ryklės gleivinę. Pastilių dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams po 1 kietąją pastilę 8 kartus per dieną. Sirupo dozavimas: 1–4 m. vaikams – 2,5 ml (1/2 matavimo šaukšto) 4 kartus per dieną; 4–10 m. vaikams – 5 ml (1 matavimo šaukštas) 4 kartus per dieną; 10–16 m. vaikams – 10 ml (2 matavimo šaukštai) 4 kartus per dieną; 16 m. ir vyresniems žmonėms – 15 ml (3 matavimo šaukštai) 4 kartus per dieną.

**PASAKYK „STOP“ SAUSAM KOSULIUI!**





9<sup>99</sup> €

## TONSILGON® N

50 dengtų tablečių  
geriamieji lašai (tirpalas), 50 ml

### NERECEPTINIAI AUGALINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Terapinės indikacijos.** Tradicinis augalinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas dažnai pasikartojantiems viršutinių kvėpavimo takų uždegimams, ypač tonzilių uždegimui gydyti. **Veiklosios medžiagos ir stiprumas.** 1 dengtoje tablete yra šių veikliųjų medžiagų mišinys: 8 mg svilariozų šaknų, 4 mg ažuolų žievės, 6 mg ramunėlių žiedų, 4 mg kiaušieninių žolės, 10 mg asiūklių žolės, 4 mg kraujažolių žolės, 12 mg rėšutmedžių lapų, 1 g tirpalo yra 290 mg skystojo ekstrakto, pagaminto iš: 4 mg svilariozų šaknų, 3 ramunėlių žiedų, 5 mg asiūklių žolės, 4 mg rėšutmedžių lapų, 4 mg kraujažolių žolės, 2 mg ažuolų žievės. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Vartoti per burną. Ūminis ligos simptomai: suaugusiems ir paaugliams nuo 12 metų – po 25 lašus arba po 2 tabletes 5-6 kartus per dieną. Vaikams 6-11 metų – po 15 lašų arba po 1 tabletę 5-6 kartus per dieną, 2-5 metų – po 10 lašų 5-6 kartus per dieną. Ūmiems ligos simptomams sumažėjus: suaugusiems ir paaugliams nuo 12 metų – po 25 lašus arba 2 tabletes 3 kartus per dieną. Vaikams 6-11 metų – po 15 lašų arba 1 tabletę 3 kartus per dieną, 2-5 metų – po 10 lašų 3 kartus per dieną. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba kitoms preparato sudedamosioms dalims. Jei žinoma, kad alergija gali sukelti graižaidžių, šeimos augalai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Geriamuosiuose lašuose yra 19 tūrio procentų alkoholio, todėl žalinga alkoholizmu sergantiems žmonėms. Sąveika su kitais vaistais: preparatas šiuo metu nėra žinoma. Šalutinis poveikis. Skrandžio ir žarnyno sutrikimai yra nedidži. Teksto parengimo data 2024 04 17



NUO 11<sup>99</sup> €

## DICLAC

5 % gelis, 100 g 11<sup>99</sup> €  
5 % gelis, 150 g 15<sup>99</sup> €

### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** 1 g „Diclac“ 5 % gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos. **Terapinės indikacijos:** lokaliai skausmui malšinti, uždegimui slopinti ir patiniminiui mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** ploną „Diclac“ 5 % gelio sluoksnį tepti 2 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** jautrumas diklofenakui ar pagalbinėms medžiagoms, jaunesni kaip 14 m. vaikai, 3 paskutiniai nėštumo mėnesiai. **Specialūs įspėjimai:** negalima tepti burnos, nuryti. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2601069663. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

### STIPRUS ATKIRTIS SKAUSMUI!



### SKAUSMUI MALŠINTI

3<sup>99</sup> €



NEOASKOFENAS, 200 mg/200 mg/40 mg, 20 tablečių

### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** 1 tablete yra 200 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg paracetamolio ir 40 mg kofeino. **Terapinės indikacijos:** vaistas vartojamas silpno ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių ir menstruacinio skausmui malšinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Tabletes reikia vartoti nekrantant, užgeriant ne mažiau kaip 250 ml vandens. Atsivėligiant į ligos sunkumą, vartoti po 1 tabletę 1-4 kartus per dieną. Didžiausia paros dozė – 4 tabletės. Negalima vartoti gerti dažniau kaip kas 6 valandas. Skausmui malšinti vaisto galima vartoti ne ilgiau kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veiklosioms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, esanti ar buvusi virškinimo trakto opa ir (arba) kraujavimas iš virškinimo trakto, buvusi bronchų astma, kurią sukėlė salicilai ar kitokie nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, pacientas jaunesnis negu 12 metų, trys paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas, ligos, kurių metu yra padidėjęs kraujavimo pavojus, kraujo krešėjimo sutrikimas, vartojama 15 mg ar didesnė metotretoksato savaitės dozė, sunkūs širdies, kepenų, inkstų nepakankamumas, labai sunki padidėjusio kraujo spaudimo liga, kamuoja nemiga, padidėjęs nervingumas, dirglumas, nerimas, baimė, sąjaudivimas ar kiti panašūs simptomai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pastarite su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergama podagra, bronchų astma, kolagenozėmis ar kraujodaros sistemos ligomis, sutrūpsėjusi skydliaukės veikla ar sergama cukriniu diabetu, yra virškinimo trakto, inkstų, kepenų ar širdies funkcijos sutrikimų, yra buvusi alergija kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, planuojama chirurginė operacija, pacientas jaunesnis kaip 16 metų ir serga virusinėmis ligomis, pacientas yra senyvas, planuojama pastoti, atsiranda šlapimo pakitimų, pasireiškia pabrinkimų ar skausmas juosmens srityje, pagelsta oda ar akys, pasireiškia bendras silpnumas, yra nerimo sutrikimas, nemiga. Sudėtyje esantis kofeinas gali sukelti drebulį, dažną širdies plakimą, viduriavimą, susijaudinimą, stiprų širdies plakimą, nemigą, galvos skausmą, raumenų trūkčiojimą ir šlapimo išsiskyrimo padidėjimą. Reklamos teksto parengimo data 2024-11-12.

-20 %



## PULSAAR ACTIVE

### MEDICINOS PRIEMONĖS. I KLAŠE

„Pulsaar Active“ gaminiai sukurti sąnarių ir raumenų funkcijai palaikyti tiek užsimant įprastomis veiklomis, tiek fizinio aktyvumo metu. Ergonomiškas dizainas ir pažangi kūno šilumą atspindinti „InfraReflect“ technologija gali padėti aktyvinti vietinę mikrocirkuliaciją ir palaikyti šiluminį komfortą. Tinka tiek aktyviai sportuojantiems, tiek ieškantiems komforto po fizinio krūvio ar traumos žmoniems. Medicinos priemonė priskiriama I klasei.

\*Klasė taikoma geltona etiketė pažymėtomis prekėmis

### AUSŲ SKAUSMUI MALŠINTI

-20 % 8<sup>63€</sup> 10<sup>99</sup>



## FONIX® EAR PAIN, purškalas, 15 ml

### MEDICINOS PRIEMONĖ

Pirmoji pagalba pasireiškia dažnoms ausų problemoms, tokioms kaip:

- skausmas
- susikauptusi siera
- dirginimas

„Fonix“ Ear Pain“ yra medicinos priemonė, kurios sudėtyje yra augalinių aliejų mišinio, skirto ausiai apsaugoti nuo dažnų problemų ir jas palengvinti. Sudėtis: alyvuogių aliejus, indinių sezamų aliejus, gulsčių sėmenų ekstraktas, fitosterolių kompleksas, bisabololis, kvapiųjų mūrėjų lapų aliejus, celiuliozinių cianurinių lapų aliejus, vinių rūgšties ekstraktas, metų aliejus. Suaugusiems ir vyresniems kaip 3 metų vaikams. Vartojimas: purkšti po 1-2 įpurškimus į kiekvieną ausį 3 kartus per parą.

### KOSULIUI LENGVINTI

7<sup>47</sup> €



STODAL, sirupas, 200 ml

### HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** Antimonium tartaricum 6CH, 59,375 mg, Bryonia 3CH, 59,375 mg, Coccus cacti 3CH, 59,375 mg, Drosera TM, 59,375 mg, Ipeca 3CH, 59,375 mg, Myocard 6CH, 59,375 mg, Rumex crispus 6CH, 59,375 mg, Spongia tosta 3CH, 59,375 mg, Sclita pulmonaria 3CH, 59,375 mg. **Indikacijos:** kosulio lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms ir paaugliams nuo 15 metų: 3-5 kartus per parą; vaikams (2-12 m.) po 5 ml mažavimo laurelė 3-5 kartus per parą. Vaistinio preparato sudėtyje yra etanolio, todėl vaikams iki 12 m. vartoti negalima. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veiklosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** šio vaistinio preparato sudėtyje yra 1,74 tūrio % etanolio (alkoholio). Vienoje 5 ml dozėje yra 0,069 g etanolio ir vienoje 15 ml dozėje yra 0,206 g etanolio. Kenksminga sergantiems alkoholizmu. Būtina atsivėligti nėščiosioms, žindymams, vaikams ir didelės rizikos grupės (pvz., sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija) pacientams. Negalima ilgai kaip savaitę vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams, nes sudėtyje yra etanolio. Vienoje 5 ml dozėje yra 3,75 g sacharozės ir vienoje 15 ml dozėje yra 12,5 g sacharozės. Į tai reikia atsivėligti gydant sergančius cukriniu diabetu. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas reizis paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Teksto parengimo data 2018-11.

### PRASIDEDA KOSULYS? VARTOK „STODAL“ IR JIS IŠNYSK!

### NUO SKAUSMO

4<sup>49</sup> €



METAFENEX, 200 mg/500 mg, 10 plėvelė dengtų tablečių

### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Kokybinė ir kiekybinė sudėtis.** Kiekvienoje plėvelė dengtoje tablete yra 200 mg ibuprofeno ir 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos.** „Metafenex“ skirtas trumpalaikiam lengvo ar vidutinio stiprumo skausmui, siejamam su migrena, galvos skausmu, nugaros skausmu, mėnesinių skausmu, dantų skausmu, reumatinio bei raumenų skausmu, nestipriū artritui skausmu, peršalimo ir gripo simptomais, gerklės (ryklės) skausmu bei karščiavimu, malšinti. Šis vaistinis preparatas ypač tinka skausmui, kuriam reikia stipresnės analgezijos nei vartojant vien ibuprofeną ar paracetamolį. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems gerti po 1 tabletę ne dažniau kaip 3 kartus per parą valgio metu užgeriant vandeniu. Tarp dozių išlaikyti ne mažiau kaip 6 valandų tarpą. Jei, vartojant po 1 tabletę, simptomai neišnyksta, daugiausia galima vartoti po 2 tabletes ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių per bet kurį 24 valandų laikotarpį. „Metafenex“ negalima vartoti ilgiau kaip 3 dienas. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų asmenims. **Kontraindikacijos.** Šio vaistinio preparato vartoti negalima pacientams, kuriems yra padidėjęs jautrumas ibuprofenui, paracetamolui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti kartu su kitais vaistais: preparatais, kurių sudėtyje yra paracetamolio ar kitų NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius ir didesnes kaip 75 mg acetilsalicilo rūgšties paros dozes; jei anksčiau buvo padidėjusio jautrumo reakcija, susijusi su acetilsalicilo rūgštimi arba kitais nesteroidiniais vaistais: preparatais nuo uždegimo; jeigu anksčiau buvo aktyvi arba buvusi pasikartojanti peptinė opa; buvo ar yra virškinimo trakto išėjimas ir (arba) ar jo prakiurimas ar kraujavimas, susijęs su ankstesniu gydymu NVNU. Pacientams, kuriems yra kraujo krešėjimo sutrikimų; kuriems yra sunkūs kepenų, inkstų arba širdies nepakankamumas. Negalima vartoti paskutinio nėštumo trimestro metu. **Specialūs įspėjimai ir dozavimas.** Būtinas ypatingas atsargumas: jei pacientas serga infekcine liga, pacientas yra senyvo amžiaus; serga ar anksčiau sirgo astma; yra inkstų, širdies, kepenų arba žarnyno sutrikimas; serga sisteminė raudonoji vilkligė; yra virškinimo trakto sutrikimai arba lėtinė uždegiminė žarnyno liga; pacientė nešioja pirmuosius 6 nėštumo mėnesius arba žindo. Reklamos teksto parengimo data 2025-01.

### SKAUSMĄ KEISK Į „METAFENEX“!

### NUO GERKLĖS SKAUSMO

9<sup>99</sup> €



OCTENIDINE KLOSTERFRAU, 2,6 mg, 20 kietųjų pastilių

### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga yra oktenidino dihidrochloridas. Kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg oktenidino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos.** „Octenidine Klosterfrau“ sudėtyje yra oktenidino dihidrochlorido veiklosios medžiagos. Tai antiseptinė priemonė, kuri veiksmingai kovoja su patogenais, naikindama jų ląstelių funkciją. „Octenidine Klosterfrau“ vartojamas trumpą laiką kaip papildoma burnos ir gerklės (ryklės) gleivinės uždegimo gydymo priemonė, kai uždegimas pasireiškia šiais simptomais: skausmu, paraudimu, patinimu. „Octenidine Klosterfrau“ skirtas suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams. Jeigu per 4 dienas šiuo savijauta nepagerėja arba net pablogėja, kreiptis į gydytoją. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Jeigu nenurodyta kitaip, suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai lėtai tūsti po 1 kietąją pastilę kas 2-3 valandas. Didžiausia paros dozė yra 6 kietosios pastilės. Kietąją pastilę turite aktyviai ir nuolat čiulpti burnoje. Kietąją pastilę turi būti judinama burnoje, kol visiškai išsirs. Be gydytojo rekomendacijos „Octenidine Klosterfrau“ negalima vartoti ilgiau kaip 4 dienas. Nepageidaujamas poveikis gali būti sumažintas vartojant mažiausią veiksmingą dozę trumpiausią laiką, reikalingą simptomams kontroliuoti. **Kontraindikacijos.** Jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai.** Pastarite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Octenidine Klosterfrau“. Skirta vartoti tik trumpą laiką. Šio vaisto negalima vartoti ilgiau kaip 4 dienas. Reklamos teksto parengimo data 2025-12-10.

-35% 12<sup>99€</sup>  
19<sup>99€</sup>

**EPITOME**  
RESVERATROL, 200 mg, 30 kapsulių  
MAISTO PAPILDAS

-30%



**VITADAY**  
VALIDOLIS, 10 tablečių 4<sup>48</sup> 104 €  
KORVALOLIS, 25 ml 4<sup>38</sup> 349 €  
MAISTO PAPILDAS

-40%



**KALICORD 850 FORTE**, 30 kapsulių 4<sup>23</sup> 755 €  
**KRIOMEGA+**, 30 minkštųjų kapsulių 20<sup>23</sup> 1247 €  
**MAGNIS + B6 SUPERIOR**, 30 kapsulių 4<sup>33</sup> 839 €

**MAISTO PAPILDAS**  
Norintiems papildyti kalcio atsargas organizme, rekomenduojama vartoti „Kalicord“, kurio sudėtyje yra net 307 mg kalcio. Padeda palaikyti normalią kraujospūdį ir palaiko normalią raumenų veiklą. Žuvų taukai „KriOmega+“ yra iš krilių. Kriliai yra laikomi vienu geriausių, veiksmingiausių ir prieinamiausių omega-3 riebalų rūgščių šaltinių. Sudėtyje esantis omega-3 fosfolipidai, gaunami iš vėžiagyvių – krilių – ekstraktas, greičiau patenka į audinių ląsteles ir tolygiau pasiskirsto nei omega-3 trigliceridai, randami žuvų taukuose. O „Magnis + B6 superior“ naudojama ypatinga magnio forma – dvi magnio druskos (magnio oksidas ir magnio citratas), kurios organizme išsilekia lėgiau, nes suvra skirtingu metu. Abiejų preparatų sudėtis papildyta ir vitaminu B6. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų ir nervų sistemos veiklą. Magnis ir vitaminas B6 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją bei mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

-30% 1<sup>04€</sup>  
14<sup>99€</sup>

**VALIDOL-LUBNYPHARM**, 10 poliežuvininių tablečių  
MAISTO PAPILDAS

Grynasis kiekis: 12,23 g. Sudedamosios dalys: cukrus, mentolio tirpalas izovalerionų rūgšties mentilo esteryje, kalcio stearatas. 2-ose tabletėse yra 0,12 g mentolio tirpalo izovalerionų rūgšties mentilo esteryje ir 4-ose tabletėse yra 0,24 g mentolio tirpalo izovalerionų rūgšties mentilo esteryje. Vartojimas: VALIDOL-Lubnypharm tablete reikia laikyti po liežuviu tol, kol ji visiškai ištirpsta. Vartojama po 1 tabletę 2-4 kartus per dieną. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, gamintojo pakuotėje, kad produktas būtų apsaugotas nuo drėgmės. Tinkamumo laikui pasibaigus vartoti negalima. Geriausias iki (pabaigos): žr. ant pakuotės. Gamintojas: AAB „Lubnypharm“, Lubnai 57500, Petrovskogo g.16, Ukraina. Išskirtinis atstovas Lietuvoje UAB „FD group“.

## LENGVAM NERIMUI MALŠINTI IR MIEGUI PALENGVINTI

NUO 6<sup>75€</sup>

**LILANDOR**  
80 mg, 14 minkštųjų kapsulių 6<sup>75</sup> €  
80 mg, 28 minkštosios kapsulės 11<sup>75</sup> €

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

*Lavandula angustifolia* Miller eterinis aliejus

„Lilandor“ yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jeigu simptomai pablogėja šio vaisto vartojimo metu, pasitarkite su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, vartoti nerekomenduojama, nes lavandų aliejus sudėties medžiagos daugiausia šalinamos iš organizmo perdirbant jas kepenyse. Kiekvienoje šio vaisto minkštosios kapsulėje yra apytikriai 12 mg sorbitolio. Dozavimas ir vartojimo metodas. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta pakuotės lapelyje arba kaip nurodė gydytojas ar vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: 1 minkštosios kapsulė 1 kartą per parą. Minkštosios kapsulės reikia nuryti nesukramtytą užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio (geriausia stikline vandens). Jeigu simptomai išlieka po vaisto vartojimo dvi savaites, reikia kreiptis į gydytoją arba kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą. LT-LIL-10-2025\_MFLOW\_2025/12

## ATGAUK RAMYBĘ IR RAMŲ MIEGĄ

-35% 5<sup>19€</sup>  
7<sup>99€</sup>

**RAMEVAL®**  
15 kapsulių  
MAISTO PAPILDAS

„RAMEVAL“ – ramybės augalų puokštė sukurta iš valerionų, melisų, pipirinių mėtų, ramunėlių ir apynių, kuri padeda:  
- palaikyti normalią nervų sistemos būklę (vaistiniai valerionai),  
- atsipalaiduoti (vaistinės melisos, pipirinės mėtės, vaistinės ramunės),  
- palengvinti užmigimą ir palaikyti miego kokybę (vaistinės melisos, paprastieji apyniai)

## IEŠKAI RAMYBĖS? ATRASK JĄ SU „RAMEVAL“

-40%



**MEMORIL FORTE**, 30 kapsulių 4<sup>43</sup> 899 €  
**TRIPTAN FORTE**, 30 kapsulių 4<sup>73</sup> 1061 €

## MAISTO PAPILDAS

„Memoril forte“ – subalansuotas, 11 sudedamųjų dalių kompleksas atminčiai bei kraujotakai. Tinka tiems, kuriems sunku susikaupti bei nuolat ką nors pamirštantiesiems. Vienoje kapsulėje yra 80 mg ginkmedžių ekstrakto, kuris padeda palaikyti normalią atminties funkciją ir kraujotaką. Taip pat sudėtyje yra magnio, vitamino B, C, E, seleno ir folio rūgšties, kuri padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną. „Triptan forte“ sudėtyje esantis 5-hidroksitriptofanas (5-HTP) yra natūrali medžiaga, gaunama iš Afrikoje augančių augalų – Griffonia simplicifolia – sėklų, kuri kartu su vitaminu B6 reikalinga serotonino – geros nuotaikos hormono – gamybai. Serotonino išsiskyrimas suteikia gerą nuotaiką ir energiją. Tai pat sudėtyje esantys vitaminai B1 ir B6 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą. Vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

-20%



## MULTI-B STRONG

## MAISTO PAPILDAS

Visi būtini vitaminai 1 tabletėje!

Skatina normalią nervų sistemos veiklą, padeda mažinti nuovargį. Ypač rekomenduojamas žmonėms, patiriantiems didelį psichologinį ar fizinį stresą. 1-2 tabletės per dieną. Be cukraus, laktozės ir mielių. Suomiska kokybė.

## VITA B12

## MAISTO PAPILDAS

Prisimink svarbiausias akimirkas!

Stiprios koncentracijos, metų skonio vitamino B12 čiulpiamosios pastilės normaliai protinei ir fizinei veiklai palaikyti. Tik 1 tabletė per dieną. Gaivaus mėto skonio. Be laktozės. Be gliutimo. Be cukraus. Tinka veganams.

\*Akcija taikoma geltona etiketė pažymėtomis prekmis



VIRŠKINIMO SISTEMAI

NUO 5<sup>99</sup> €

GUTTALAX

7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 15 ml 5<sup>99</sup> €  
7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml 9<sup>99</sup> €

NERECIPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 ml tirpalo (15 lašų) yra 75 mg natrio pikosulfato. **Indikacijos.** „Guttalax“ vartojamas, jei pacientas yra varginamas vidurių užkietėjimo; yra būklė, kai reikia palengvinti tuštinimąsi. **Dovavimas ir vartojimo metodas.** „Guttalax“ geriamas vakare. Suaugusiesiems ir vyresniems nei 10 m. vaikams: 10–20 lašų per parą. 4–10 m. vaikams: 5–10 lašų per parą. Vartoti per burną. Rekomenduojama gydymą pradėti nuo mažiausios dozės. Didžiausios rekomenduojamos paros dozės viršyti negalima. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; žarnų nepažeidimas ar obstrukcija; stiprus pilvo skausmas ir (arba) karščiavimas dėl ūminės pilvo būklės (pvz., apendicito), galimai susijęs su pykinimu, vėmimu; ūminė uždegiminė žarnų liga; sunki dehidracija; jaunesni kaip 4 m. vaikai; retos paveldimos būklės, kurios gali būti nesuderinamos su preparato pagalbine medžiaga. **Specialūs įspėjimai.** Nenustačius vidurių užkietėjimo priežasties, negalima vartoti nepertraukiamai kasdien ar ilgai. „Guttalax“ pavartojusiais žmonėms buvo galvos svaigimo ir (arba) sinkopės atvejų. Vaikams be gydytojo nurodymo „Guttalax“ vartoti negalima. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas fruktozės netoleravimas. Nevartokite šio vaisto norėdami numesti svorio. Teksto peržiūros data 2024-12.

UŽKIETĖJUS VIDURIAMS VEIKIA PATIKIMAI IR NIEKAM NEPASTEIBINT.

NUO PILVO PŪTIMO

-20 %



SIMETIGAST FORTE

MEDICINOS PRIEMONĖS

„SIMETIGAST FORTE“ 240 mg kapsulės (simetikonas) skirtos vartoti vyresniems nei 12 m. pacientams, esant pilvo pūtimui, pilnumo jausmui pilve, raugėjimui. Taip pat galima naudoti prieš pilvo ertmės diagnostines procedūras, nes tai pagerina vaizdų kokybę. Vartoti: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. amžiaus jaunuoliai – po 1 kapsulę 2–3 kartus per parą. Prieš diagnostines procedūras: 1 kapsulę vakare dieną prieš tyrimą ir 1 kapsulę ryte tyrimo dieną. „SIMETIGAST FORTE BABY“ geriamieji lašai (simetikonas) skirti kūdikiams nuo 28-os gyvenimo dienos ir vaikams iki 12 metų. Vartoti: kūdikiams (nuo 28-os gyvenimo dienos) ir vaikams iki 2 metų 3 lašai per dieną, per ar po kiekvieno valgio. Negalima vartoti daugiau kaip 18 lašų per dieną.

GREITOJI PAGALBA IŠPŪSTAM PILVUI.

\*Kai kuriose pakuotėse yra geltona etiketė pažymėjusi prekęs

NUO 6<sup>99</sup> €



SMECTA

3 g. milteliai geriamajai suspensijai, 10 paketėlių 6<sup>99</sup> €  
3 g. milteliai geriamajai suspensijai, 30 paketėlių 12<sup>99</sup> €

NERECIPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Sudėtis.** Kiekviename paketėlyje yra 3 g diosmektilo. **Terapinės indikacijos.** Vaikų nuo 2 m. ir suaugusiųjų ūminiam viduriavimui gydyti, vartojant kartu su geriamaisiais rehidracijos tirpalais, taip pat suaugusiųjų lėtiniam viduriavimui gydyti. Simptominiam suaugusiųjų skausmui, susijusiam su funkciniais žarnyno sutrikimais, gydyti. **Dovavimas.** Ūminio viduriavimo gydymas. **Vaikams nuo 2 m.: 6 g (2 paketėliai)** per parą. Ūminio viduriavimo pradžioje (pirmąsias 3 dienas) šį dozę gali būti 2 kartus didesnė. **Suaugusiesiems:** 9 g (3 paketėliai) per parą. Ūminio viduriavimo pradžioje šį dozę gali būti 2 kartus didesnė. Ūminio viduriavimo epizodas paprastai trunka ne ilgiau kaip 7 dienas. Kitų ligų gydymas. **Suaugusiesiems:** vidutiniškai 9 g (3 paketėliai) per parą. Vartojimo metodas. Vartoti per burną. Paketėlio turinį reikia išstiprinti prieš pat vartojimą. **Vaikams:** paketėlio turinį reikia išstiprinti 10 ml vandens arba sumaišyti su pusiau skystu maistu (pvz., daržovių koše, sriuba, kompotu). **Suaugusiesiems:** paketėlio turinį reikia išstiprinti pusę stiklinės vandens. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Smecta“ nesklaidas vartoti kūdikiams ir vaikams iki 2 m. amžiaus. Gydyti ūminį viduriavimą slopinęs pacientams ir vaikams nuo 2 m. amžiaus, siekiant išvengti dehidracijos, karti būtina skirti geriamąsias rehidracijos druskas (GRD). **Suaugusiesiems** taip pat turi būti taikoma rehidracija, jei ji reikalinga. GRD arba intraveninė rehidracija turi būti skiriama atsivėlgiant į viduriavimo intensyvumą, paciento amžių ir klinikinę situaciją. Reikia apsaugyti tolesnį „Smecta“ vartojimą: jei po 3 ūminio viduriavimo dienų sutrikimas nepašalinamas, jei kartu su karščiavimu ir vėmimu jaučiamas skausmas. Reikia atsisakyti skirti diosmektilą pacientams, kuriems praėjusio laiko buvo sunkių lėtinų vidurių užkietėjimo atvejų. Reikia vengti „Smecta“ vartoti ilgą laiką. „Smecta“ sudėtyje yra gliukozės ir sacharozės. Būtina atsivėlginti cukriniu diabetu sergantiems pacientams. Jeigu gydytojas jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Šio vaisto sudėtyje yra mažas etanolio kiekis (mažiau kaip 100 mg paros dozeje). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas diosmektilui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Praneškite apie šalutinį poveikį registroduotojo vietiniam atstovui „Mayoly Biallis“, UAB, el. paštu vigilance.BAL@mayoly.com. **Teksto peržiūros data 2025-11-13. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-02. SME-1F-2026-0022**

NUO 6<sup>49</sup> €



MICROLAX

625 mg/90 mg/9 mg/ml, tiesiosios žarnos tirpalas, 4 x 5 ml 6<sup>49</sup> €  
625 mg/90 mg/9 mg/ml, tiesiosios žarnos tirpalas, 12 x 5 ml 15<sup>99</sup> €

NERECIPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veiklosios medžiagos, stiprumas.** 1 ml tirpalo yra 625 mg sorbitolio, 90 mg natrio citrato ir 9 mg natrio laurilsulfato. **Terapinės indikacijos.** Trumpalaikis vidurių užkietėjimo ar būklės, kai reikia palengvinti ištuštinimą, gydymas. Žarnų ištuštinimas prieš diagnostines ar gydymąsias procedūras galinę žarnyno dalį. **Dovavimas ir vartojimo metodas.** „Microlax“ ir vyresni kaip 3 metų vaikai. „Microlax“ 1 tubetelis turinys suleidžiamas į tiesiąją žarną. Jaunesni kaip 3 metų vaikai. „Microlax“ 1 tubetelis turinys suleidžiamas į tiesiąją žarną, įkišus į ją pusę antgalio. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai. Pacientams, sergantiems hemoroidais, norint išvengti sužeidimų, vaistą reikia vartoti atsargiai. Vengti ilgalaikio vartojimo. Gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą). Reklamos teksto parengimo data 2025-10. LT-MCX-2025-241052.

NUO 3<sup>49</sup> €



MEZYM

10000V, 10 skrandyje neiurių tablečių 3<sup>49</sup> €  
20000V, 20 skrandyje neiurių tablečių 7<sup>49</sup> €

NERECIPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 skrandyje neiurio „Mezym 10000V“ tabletyje yra 80–11111 mg kaulių kamos miltelių, kurių aktyvumas atitinka ne mažiau kaip 10000 lipazės vienetų, 7500 amilazės vienetų, 375 proteazės vienetų pagal Europos farmakopiją. 1 skrandyje neiurio „Mezym 20000V“ tabletyje yra 160–22222 mg kamos miltelių (6 kaulių kamos pagaminto pankreatino), kurių minimalus aktyvumas atitinka 20000 lipazės vienetų, 12000 amilazės vienetų, 900 proteazės vienetų pagal Europos farmakopiją „Mezym“ vartojamas tuomet, kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentų ir tai sukelia virškinimo sutrikimų. „Mezym“ vartoti negalima: jeigu yra alergija kamos milteliams, kaulių baltymams arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; šio vaisto negalima vartoti, jeigu jis sergate ūminiu kamos uždegimu (pankreatitu) arba jums paūmėjo lėtinis kamos uždegimas, kai ligos požymiai yra stipriai išreikšti. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pastaraitė su gydytoju ir vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Mezym“. Cistinė fibrozė kartais gali komplikuotis žarnyno nepažeidimu. Esant simptomų, panašų į žarnyno nepažeidimo požymius, reikia apsaugyti žarnyno susaurejimo galimybių. Jeigu pajutote neįprastą diskomfortą skrandyje ar žarnyne, pasikeitė nuskaudimų pobūdį, būtinai kreipkitės į gydytoją, kuris jus apžiūrės, kad atmetu žarnų pažeidimo galimybę. „Mezym“ sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „Mezym“ reikia būtina nurinti nekrakams. „Mezym 10000V“ sudėtyje esantis dažiklis azorubinas (E122) gali sukelti alerginių reakcijų. **Dovavimas.** „Mezym“ visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. „Mezym“ dozės priklauso nuo virškinimo sutrikimų laipsnio, optimali dozė nustatoma individualiai. Jeigu nerandytų kitaip, valgant išgeriamas 2–4 plevėle dengtos „Mezym 10000V“ tabletes arba 1–2 plevėle dengtos „Mezym 20000V“ tabletes. Dienos dozė 15000–20000 lipazės vienetų kilogramui kūno svorio neturėtų būti viršijama. Dozės vaikams turi pasikirti gydytojas. Atsivėlgiant į maistą ar virškinimo sutrikimo sunkumą, rekomenduojama dozę gali būti padidinti. Plevėle dengtos tabletes nuryjamas nekramtant ir užgėrinti dideliu kiekiu skysto. Gydyti ilgą laiką, vartojimo trukmę nustato gydytojas. Vartojimo trukmės vaikams taip pat nustato gydytojas. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, LT-0365 Vilnius, tel. +370 5 269 1947, lito@berlin-chemie.com, LT-MEZ-3-2025, MEZ10V, 2025/12

\*„MEZYM“ PADEDA PAGERINTI SUTRUKUSI VIRŠKINIMĄ!

\*Kai kasa išskiria nepakankamai virškinimo fermentų.

NUO 6<sup>99</sup> €



DUPHALAC

FRUIT, 667 mg/ml, geriamasis tirpalas, 500 ml 12<sup>99</sup> €  
FRUIT, 667 mg/ml, geriamasis tirpalas, 20 x 15 ml 10<sup>99</sup> €  
667 mg/ml, geriamasis tirpalas, 200 ml / 500 ml / 1000 ml 6<sup>99</sup> € | 12<sup>99</sup> € | 18<sup>99</sup> €

NERECIPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 ml geriamojo tirpalo yra 667 mg laktozės (skystosios laktozės 667 g/l pavidalo). **Terapinės indikacijos.** „Duphalac“ ir „Duphalac Fruit“ vartojami vidurių užkietėjimui (reti žarnų judesiai, kietos ir sausos išmatos) gydyti, pvz., sergant hemoroidais, po storosios žarnos ar žarnų operacijos. „Duphalac“ vartojamas kepenų encefalopatijai (kepenų liga, sukelianti sumišimą, tremorą, sumažėjusį samoninumo lygį, įskaitant komą) gydyti. **Vartojimo būdai ir dozavimas.** Vartoti per burną. „Duphalac“ ir „Duphalac Fruit“ geriamuosius tirpalus galima vartoti truputį atskiestus ar neatskiestus. 1 dozė reikia nuryti visą škart, ilgai nelaikant burnoje. 1 kartą per parą vartojama dozė reikia išgerti nuo pačiu dienos metu, pvz., per pusryčius. Vartojant „Duphalac“ ir „Duphalac Fruit“, teikiama būklė, kuri gali būti naudojama medžiagai laurėti. **Suaugusiesiems:** pradinė paros dozė yra 15–45 ml, palaikomoji paros dozė – 15–30 ml. 3–4 m. vaikams pradinė paros dozė – 15 ml, palaikomoji paros dozė – 10–15 ml. 1–6 m. vaikams pradinė paros dozė – 5–10 ml, palaikomoji paros dozė – 5–10 ml. Kūdikams iki 1 m. pradinė paros dozė – iki 5 ml, palaikomoji paros dozė – iki 5 ml. **Nenurodius** gydytojų ir atidžiai nepribūrint, vaikams (iki 14 m. amžiaus) „Duphalac“ ir „Duphalac Fruit“ vartoti negalima. „Duphalac“ dozavimas, esant kepenų encefalopatijai: suaugusiesiems pradinė dozė yra 30–45 ml geriamojo tirpalo 3–4 kartus per parą. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Galaktozemija. Virškinimo trakto nepažeidimas, virškinimo trakto prakiurimas ar prakiurimo rizika, uždegiminė žarnyno liga. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pastaraitė su gydytoju, prieš pradėdami vartoti „Duphalac“ ar „Duphalac Fruit“, jei jums skauda pilvą dėl nepažeidimų priežasties, jei negalite suvalkinti pieno cukraus (laktozės), jei sergate cukriniu diabetu. Pastaraitė su gydytoju prieš pradėdami vartoti „Duphalac Fruit“, jei jums yra virškinimo trakto ir širdies sutrikimas arba širdies ir širdies sutrikimas. Kai vartojama daug didesnė dozė kepenų encefalopatijai gydyti, būtina atsivėlginti į tai, kad pacientas serga diabetu. Ilgą laiką vartojant neįprastai didesnę ir netinkamą vartojamą dozę, gali pasireikšti viduriavimo ir elektrolitų pusiausvyros sutrikimai. Reikia atsivėlginti į tai, kad gydymo metu gali sutrikti tulžinio refleksas. „Duphalac“ ir „Duphalac Fruit“ sudėtyje yra laktozės, galaktozės, fruktozės. „Duphalac“ sudėtyje yra sulfitų. „Duphalac“ vartoti negalima, jei yra galaktozės arba fruktozės netoleravimas, visiškas laktozės trūkumas, gliukozės-galaktozės malabsorbcija. „Duphalac Fruit“ vartoti negalima, jei yra galaktozės arba fruktozės netoleravimas. Lėpų laktozės trūkumas, gliukozės-galaktozės malabsorbcija. Pacientai, netoleruojantys laktozės, laktozė turi vartoti atsargiai. **Reklamos teksto parengimo data 2025-09-23.**

-20 % 19<sup>19€</sup> 23<sup>99</sup>



SYMBIOSYS® ALFLOREX+™, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Virškinimui subalansuoti!

*Bifidobacterium longum* 35624\* padėrėms bakterijos!

Kalci padeda palaikyti normalų virškinimo fermentų veikimą.

Tai 1 kapsulė per dieną užteigiant stiklinę vandens mažiausiai 4 savaites. Vartoti neatsivėlgiant į valymą bet kurio paros metu. Reklamos teksto parengimo data: 2025-01-15. ID e8aaceeb

SUKURTA KARTU SU MOKSLININKAIS.

-25 %



LINEX®

MAISTO PAPILAI

Vienoje „Linex“ „Complex“ kapsulėje yra 10 mlrd. geriausiai iki šiol pasaulyje moksliskai ištyrty gyvų *Lactobacillus rhamnosus* GG bakterijų, taip pat – vitaminų B1, B2, B6 ir cinko. Vienoje „Linex“ „Forte“ kapsulėje yra 2 mlrd. gerai žinomų ir moksliskai ištyrty gyvų *Lactobacillus acidophilus*, DSM 13241 ir *Bifidobacterium animalis* subsp. lactis, DSM 15954 bakterijų. Viena „Linex“ „Kids“ paketėlyje arba 6-uoose „Linex“ „Baby“ lašuose yra 1 mlrd. *Bifidobacterium animalis* subsp. lactis, DSM 15954 bakterijų. **Vartojimas.** „Linex“ „Complex“ suaugusiesiems ir vyresniems nei 6 m. vaikams gerti po 1–2 kapsules per dieną. „Linex“ „Forte“ suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams gerti po 1 kapsulę 1–3 kartus per dieną; 3–12 m. vaikams – po 1 kapsulę 1–2 kartus per dieną. „Linex“ „Kids“ kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – po 1 paketėlį 1 kartą per dieną. „Linex“ „Baby“ naujagimiams, kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – po 6 lašus 1 kartą per dieną. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 623 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2610169672. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

KOKYBĖ, KURIA GALIMA PASITIKĖTI!

\*Kai kuriose pakuotėse yra geltona etiketė pažymėjusi prekęs

IKI -50 %

**AMBIO**PATIRIANTIEMS ĮTAMPĄ, 15 kramtomųjų tablečių 6<sup>29</sup> 3<sup>50</sup> € -50 %PATIRIANTIEMS ĮTAMPĄ, 100 ml 7<sup>28</sup> 4<sup>79</sup> € -40 %PATIRIANTIEMS ĮTAMPĄ, 20 kapsulių 7<sup>28</sup> 5<sup>19</sup> € -35 %

MAISTO PAPILDAI

5<sup>25</sup> €**OPEXA**

20 mg, 10 burnoje disperguojamų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Blizgias

„Opexa“<sup>™</sup> vartojamas šienligės (kuriai būdingi simptomai yra čiaudulys, niežulys, sloga, užgulta nosis, paraudusios ir ašarojančios akys) ir kitų alerginio rinito formų simptomams slopinti. Jis taip pat gali būti vartojamas niežtinčioms odos išbėrimams (pūkliams arba dilgelinei) gydyti. Rekomenduojama paros dozė yra viena „Opexa“ 20 mg burnoje disperguojama tabletė. Tabletę reikia išgerti 1 valandą prieš valgymą arba praėjus 2 valandoms po valgymo arba sulčių gėrimo. Burnoje disperguojama tabletė reikia įdėti į burną; sėlėse ji greitai disperguojasi ir tampa lengvai nuryjama. Kitaip burnoje disperguojamos tabletės prieš vartojimą gali būti išslopintos vandenyje. „Opexa“ vartoti draudžiama, jeigu Jums yra alergija bilastinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš pradėdami vartoti „Opexa“, jei Jums nustatytas vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų veiklos sutrikimas, mažas kalio, magnio, kalcio kiekis kraujyje, jeigu Jums pasireiškia arba pasireiškė širdies ritmo sutrikimų arba Jūsų širdys susitraukimų dažnis yra labai mažas, jeigu vartojate vaistų, galinčių paveikti širdies ritmą, jeigu Jums yra arba buvo tam tikrų širdies ritmo sutrikimų (vadinamasis QTc intervalo pailgėjimas elektrokardiogramoje), kurie gali pasireikšti sergant kai kuriomis širdies ligų formomis, ir Jūs vartojate kitų vaistų. Neduoškite šio vaisto jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Neviršykite rekomenduojamos dozės. Nevartokite „Opexa“ ilgiau nei 10 dienų nepasitarsu su gydytoju. Jeigu per 3 dienas Jūs savijautą nepagerėję arba net pablogėję, kreipkitės į gydytoją. **Nustatyta, kad bilastino 20 mg dozė nesutrikdo suaugusiųjų gebėjimo vairuoti.** Tačiau kiekvieno paciento reakcija į vaistą gali būti skirtinga. Todėl prieš vairuodami ar valdydami mechanizmus turite patikrinti, kaip šis vaistas Jus veikia. Reklamos teksto parengimo data 2026-01. LT-OPE-1-2026\_MFLOW. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, LT-05163 Vilnius, Lietuva.

SUTRAMDYK ALERGIJĄ!

## SKUBIOS PAGALBOS KONTRACEPTIKAS

13<sup>97</sup> €**AVODELE**, 1,5 mg, 1 tabletė

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Avodele yra skubios pagalbos kontraceptikas, kuri galima pavartoti per 72 valandas (t. y. per tris paras) po lytinio akto, kurio metu kontraceptinės priemonės nebuvo naudotos arba naudota kontraceptinė priemonė nebuvo veiksminga. Avodele sudėtyje yra sintetinio hormono, veikliosios levonorgestrelės, vadinamos levonorgestrelu. Suvartas per 72 valandas po nesaugaus lytinio akto, jis 79 % atvejų apsaugo nuo nėštumo. Vartojimas šiais atvejais: - lytinio akto metu nebuvo naudota kontraceptinė priemonė.

- Jei kontraceptinė priemonė naudota netinkamai.

Kaip vartoti Avodele: Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Po nesaugaus lytinio akto išgerkite vieną tabletę kuo greičiau, bet ne vėliau kaip po 72 valandų (3 parų). Tabletę geriausia išgerti per 12 valandų. Antrą tabletę išgerkite praėjus 12 val. (bet ne daugiau kaip 16 val.) po pirmosios tabletės išgėrimo. Jei žinote arba manote, jog nesate nėščia, Avodele galite vartoti bet kurią ciklo dieną. Tabletę nurykite nekratydami, užsigerkite vandeniu. Ji bus tuo veiksmingesnė, kuo greičiau ją išgersite. Avodele vartoti negalima: Jeigu yra alergija levonorgestrelui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos informacinio lapelio 6 skyriuje). Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Prieš vartojimą, pasitarkite su gydytoju, nes Avodele, kaip skubios kontracepcijos priemonė, Jums gali netikti. Gydytojas gali Jums skirti kitokią skubios kontracepcijos priemonę. Kaip dažnai galima vartoti Avodele. Avodele vartojama tik neatidėliotinu atveju ir nėra reguliaros kontracepcijos metodas. Galimas šalutinis poveikis. Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Labai dažnas. Šiekštulys (pykinimas); Gali būti nereguliarus pakraujavimas iki prasidedant mėnesinei; Gali skaudėti pilvo apačią; Nuvargis; Galvos skausmas. Dažni Vėmimas; Gali pakeisti mėnesinį ciklą; Irgesio šio vaisto, gali atsirasti krūtų jautrumas, viduriavimas, svoriojo pokytis. Labai retas: Bėrimas, dilgėlinė, niežulys, vėdo patinimas, dubens sritys skausmas, skausmingas mėnesinė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Ši informacija paskutinį kartą peržiūrėta 2025/07/15.

Pasiūlymai galioja 2026 02 01 – 2026 02 28.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Nuolaidos taikomos prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą. Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį/informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje [www.vvkt.lt](http://www.vvkt.lt).

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Daugiau informacijos NORFOS vaistinėje, tel. +370 800 10008, [www.nvaistine.lt](http://www.nvaistine.lt) MAŽYLIUI IR MAMAI skirtas prekes ypatingomis kainomis greičiau ir patogiau užsisakykite internetinėje vaistinėje [www.nvaistine.lt](http://www.nvaistine.lt). Užsisakius prekių (išskyrus vaistinius preparatus) už 29 € ir daugiau – pristatymas NEMOKAMAI! Reklaminio teksto parengimo data – 2026 01 19.

-35 %

**AMBIO**LAKTO-BIFIDOBAKTERIJOS SU S. BOULARDI, 20 kapsulių 44<sup>48</sup> 9<sup>41</sup> €SPANGUOLIŲ EKSTRAKTAS SU LAKTO-BIFIDO BAKTERIJOMIS, 20 kapsulių 40<sup>48</sup> 7<sup>14</sup> €

MAISTO PAPILDAI

-30 %

**BF-ESSE**

MAISTO PAPILDAI

„Stop Stress“<sup>™</sup> ir „Stop Stress“ Herbal“ sudėtyje esantis vitaminas B6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. „Stop Stress“ Night“ sudėtyje esantis pasiflorų ekstraktas padeda palaikyti normalų miegą. „Kardio Start“<sup>™</sup> sudėtyje esantis valgomųjų česnakų ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių funkciją. „Flex“<sup>™</sup> su gliukozaminu, chondroitinu, MSM ir vitaminu C, kuris padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų ir kremzlės funkcijai, susidarymą.

**DIENAI BE STRESO, RAMIAM MIEGUI, ŠIRDŽIAI IR ŠANARIAMS.**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtos prekės

**Procto-Glyvenol**  
tribenzoidas / lidokainas

**PROCTO-GLYVENOL** žvakutės, N10;  
**PROCTO-GLYVENOL** tiesiosios žarnos kremas, 30 g

RE-UT\_PG\_2024\_428

Nereceptiniai vaistai

**PROCTO-GLYVENOL** skirtas lokaliai simptominiams vidinio ir išorinio hemorojaus gydymui. Vartoti 1 tiesiąją žarną, po 1 žvakutę du kartus per parą arba kremu galima tepinėti išangės srity du kartus per parą, ryte ir vakare tol, kol išimtinai ligos požymiai išnyks, paprastai 7-10 dienų. Po to dozė galima sumažinti ir vartoti vieną kartą per parą ne ilgiau kaip 3 savaites, jei reikia. Vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei PROCTO-GLYVENOL medžiagai. Atsargiai vartoti pacientams, sergantiems sunkia kepenų liga. Saugotis, kad nepatektų į akis, negalima nuryti. Nerekomenduojama vartoti vaikams. Reklamos teksto parengimo data – 2026/01.

RECORDATI





**-40 %****LIUBERIN**

LIUBERIN SUPERIOR, 35 mg, 30 kapsulių **24<sup>99</sup> 13<sup>13</sup> €**  
 LIUBERIN + LUTEIN, 30 kapsulių **22<sup>99</sup> 13<sup>79</sup> €**

**MAISTO PAPILDAI**

Linija „Liuberin“ skirta padėti išsaugoti normalų regėjimą bei palaikyti akies kraujotaką. „Liuberin superior“ net 18 aktyviųjų medžiagų kompleksas sausoms, pavargusioms, daug į skaitmeninių įrenginių ekranus žiūrinčioms akims. Sudėtis praturtinta ginkmedžiu, kuris padeda palaikyti akies kraujotaką. O „Liuberin + LUTEIN 35 mg“ – naujausia formulė akims! Šio preparato sudėtis praturtinta karotenoidais: net 35 mg luteino ir 3 mg zeaksantino, kurių su amžiumi koncentracija akyse mažėja. Gausi sudėtis išsiskiria ir mėlynių uogų ekstraktu, kuris padeda palaikyti normalią akių funkciją, vaizdo aiškumą ir kraujotaką. Normalų regėjimą padeda išsaugoti vitaminas A ir cinkas. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

**RYŠKIOMS GYVENIMO SPALVOMS!****-40 %****ECOSH**

ŽARNYNO DETOX, 260 g **32<sup>99</sup> 19<sup>79</sup> €**

VITAMINAS D3 4000IU su kokosų aliejumi, 10 ml **18<sup>99</sup> 11<sup>39</sup> €**

BIOAKTYVI GELEŽIS, 90 kapsulių **24<sup>99</sup> 14<sup>99</sup> €**

BIOAKTYVUS CINKAS, 90 kapsulių **19<sup>99</sup> 11<sup>99</sup> €**

**MAISTO PAPILDAI**

„Ecosh“ – Estijos maisto papildų gamintojas, siekiantis gaminti kuo natūralesnius, kokybiškus ir efektyvius maisto papildus. Naudojamos veganinės, augalinės kilmės kapsulės, maisto papildai yra be konservantų, dauguma tinkami vegetarams ir veganams.

**-40 %**

PROSTOSAN FORTE, 30 kapsulių **45<sup>99</sup> 9<sup>54</sup> €**

POTENZINE SUPERIOR, 30 tablečių **20<sup>99</sup> 12<sup>59</sup> €**

TOTALPOWER MAN, 30 tablečių **20<sup>99</sup> 12<sup>59</sup> €**

**MAISTO PAPILDAI**

„Prostosan forte“ – pagalba vyresnio amžiaus vyrų prostatai. Sudėtyje esantis sabalpalmių ir rugių žiedaulių ekstraktai padeda palaikyti normalią prostatos funkciją, o afrikinų pigių ekstraktas – normalią šlapimo pūslės funkciją. Kininio ženšenio ekstraktas padeda išlaikyti energingumą. Šio preparato sudėtis taip pat praturtinta vitaminu D3 ir cinku. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 2 kartus per dieną, valgio metu.

„Potenzine superior“ – subalansuotas derinys potencijai. Šio maisto papildu sudėtyje esantis ženšenio šaknų ekstraktas padeda palaikyti lytinę funkciją, išvengti erekcijos silpnėjimo ir seksualinį pajėgumą padeda palaikyti gulsiosios ragūžės vaisių ekstraktas, o normalų vaisingumą ir testosterono koncentraciją kraujyje – cinkas. Sudėtyje taip pat yra L-arginino. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną, valgio metu.

„TotalPower man“ – galingi multivitaminai aktyviam vyrui su 23 aktyviomis medžiagomis. Šis maisto papildas puikiai tinka intensyviai gyvenantiems vyrams. Jo sudėtyje esantis jodas eleuterokokas padeda palaikyti normalią prostatinę veiklą ir energiją; magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, o vitaminai B6 ir B12 – palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną.

**-40 %****19<sup>77€</sup>  
32<sup>99</sup>****4<sup>99</sup> €****LORATIN EXPRESS, 10 mg, 10 tablečių****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 10 mg loratadino. **Terapinės indikacijos:** simptominei alerginei slogos ir lėtinės idiopatinės dilgėlinės gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems negu 2 m. vaikams gerti po 1 tabletę per dieną. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas loratadinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nevartoti jaunesniems nei 2 m. arba svėrantiesiems mažiau kaip 30 kg vaikams. **Specialūs įspėjimai:** vaista atsargiai reikia vartoti pacientams, kuriems yra sunkus kepenų veiklos sutrikimas. „Sanofi Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sanofi.com. BS2601069675. Reklamų teksto parengimo data 2026-01-06.

**MEFLOVAN FORTE, 60 kapsulių****MAISTO PAPILDAS**

„Meflovan forte“ – trijų augalinių medžiagų derinys, skirtas moterims, siekiantiems maksimalaus komforto ir geros savijautos menopauzės metu. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną.

**-20 %****1+1**

Dvi tokios pačios  
pakuotės už  
VIENOS KAINĄ!

**TENA**

WET WIPES PROTECTION, drėgnosios servetėlės, 80 vnt. **6<sup>69</sup> €**

WET WIPES, drėgnosios servetėlės, 48 vnt. **8<sup>39</sup> €**

**HIGIENOS PRIEMONĖS**

Drėgnosios servetėlės TENA: iš anksto specialiai odos priežiūrai skirtų skysčių sudrekinamos minkštos servetėlės yra švelni alternatyva muiliui ir vandeniui. Skirtos kasdieniui šlapimo nelaikantiųjų tarpvietės odos ar viso kūno priežiūrai. Jos gerai išvalina vala net ir glėžną odą. Praktiškos ir patogios naudoti, nereikia papildomai nuplauti vandeniui. Patikrintos dermatologų.

**AMEDIPUS**

Pleistrai su alavijų ekstraktu, 7 x 2 cm, 10 vnt. **4<sup>29</sup> 1<sup>43</sup> €**

Juodi aksominiai pleistrai, 7 x 2 cm, 10 vnt. **4<sup>29</sup> 1<sup>43</sup> €**

Pleistrai pūslelėms, 6,9 x 4,4 cm, 5 vnt. **5<sup>19</sup> 4<sup>15</sup> €**

Pleistrai pūslelėms, 2 x 6 cm, 5 vnt. **4<sup>39</sup> 3<sup>99</sup> €**

Pleistry rinkinys šeimai, 20 vnt. **4<sup>45</sup> 3<sup>56</sup> €**

**MEDICINOS PRIEMONĖS**

**-20%**



**HÜBNER ORIGINAL SILICEA**

## MAISTO PAPILDAL MEDICINOS PRIEMONĖS

SILICEA gali padėti aprūpinti jūsų organizmą svarbiais elementais ir palaikyti Jūsų grožį. Silicis yra antras po deguonies labiausiai žemėje paplitęs elementas. Silicis – natūrali gamtinė medžiaga. Biotinas padeda palaikyti normalią odos ir plaukų būklę.

SILICEA LIP HERPES GEL, gelis nuo lūpy pūselinės, 5 g

**SILICEA GASTROINTESTINAL GEL DIRECT 15 ml gelio, 15 paketėlių**

Didesnės silicio koncentracijos med. prekės (CE0297) padeda palengvinti virškinamojo trakto ir skrandžio Periodiškas HUBNER ORIGINAL SILICEA produktų vartojimas gali padėti rūpinantis jūsų grožiu ir sveikata

**„SILICEA“ – IR GROŽIUI, IR SVEIKATAI!**

\*Akcijs taikoma dzeltenā etiķete pažymētiem produktiem

**-20%**



**100**  
METU

  
**Doppel  
herz**

rūpināmās lūsu sveikata

**DOPPELHERZ**

**MAISTO PAPILDAI**

Maisto papildus „Doppelherz“ gamina viena farmacinių produktų gamintojų lyderių Vokietijoje „Queisser Pharma“, todėl produktai kuriami pasitelkiant naujausias technologijas ir gamybos laimėjimus bei laikantis tarptautinių kokybės standartų. Maisto papildai „Doppelherz“ yra vieni perkamiausių Lietuvoje ir jau daugiau kaip 20 metų garantuoja savo klientams gerą savijautą.

**„DOPPELHERZ“ – DVIEJU ŠIRDŽIU JĖGA!**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

## ■ ŽARNYNO MIKROFLORAI

**-20%**



## COMPLIFLORA

**MAISTO PAPILDAI**

„Compliflora Family“ ir „Compliflora Family+“ – formulė „keturi viename“. Bakterijos, kolonizuojančios ir plonąjį, ir storąjį žarnyną. Didelė KSV (kolonijas sudaranti vienetų) dozė. Gamybos metodas: bakterijos atsparios skrandžio rūgštims, todėl gali saugiai pasiekti žarnyną ir ten kolonizuotis. Vartojimas: 1 kapsulė arba 1 pakelėlis per dieną.

„Compliflora Baby Drops” – formulė „du mėnuo“. *Bifidobacterium lactis* BSO1 ir *Lactobacillus rhamnosus* GG ATCC 5301 aliejinės formos kompleksas. Augalinis kilmės medžiagos suteikia malonų skonį, be to, nereikia specialių laikymo sąlygų. Vartojimas: kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – 5 lašai per dieną.

„Compliflora Femina” – formulė „keturi mėnesiai“, ją sudaro 4 specialiai atrinktos *Lactobacillus* genties bakterijų šlapimo, būdingos natūraliai, sveikai moteriai ir lyties organų sistemos mikroflorai.

„Compliflor Immuno“ yra kompleksinis produktas, sukurtas siekiant palaikyti gerą imuninę organizmo būklę. 1 kapsulėje yra 4 milijardai mikrokapsuliuotų pieno rūgšties bakterijų, cinko bei vitamino D. Vartojimas: 1 kapsulė per dieną.

„Compliflora Kids Gummy Bears” – guminukai, kurių sudėtyje yra lindalizotų pieno rūgšties bakterijų, natūraliai aptinkamų žmogaus virškinimo trakte, taip pat naudingo vitamino B6, niacino ir pantoteno rūgšties. Rekomenduojama paros dozė: vyresniems nei 3 m. vaikams ir suaugusiems – 2 guminukai.

\*Akcija tiekoma peltona etikete pažymētiem prekēm



**-20%**

**SAMBUCUS KIDS**  
sirupas, 120 ml ~~45<sup>99</sup>~~ **12<sup>39</sup> €**  
60 guminukų ~~17<sup>99</sup>~~ **14<sup>31</sup> €**

**MAISTO PAPILDAS, MAISTO PRODUKTAS**

Juoduogiai šėvamedžiai, čiobreliai, šalavijai padeda palaikyti kvėpavimo sistemos funkciją. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

**PASTILĖS GERKLEI****-20%****VOCAL****MAISTO PAPILDAS SU SALKIKLIAIS**

Pastilių „Vocal“ sudėtyje yra islandinių kerpenų, vitamino C ir cinko. Islandinės kerpenos padeda palaikyti kvėpavimo takų – gerklės, ryklės gleivinės bei balsų stygų – funkcijas. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Cinkas atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese. Rekomenduojamas vartojimas: 1 pastilė 4 kartus per dieną. Vyresniems nei 4 m. žmonėms.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

**NUO SAUSO IR ŠLAPIO (PRODUKTYVAUS) KOSULIO****-20%****IVEX**

100 ml + 5 ml matavimo indelis ~~8<sup>99</sup>~~ **7<sup>16</sup> €**  
200 ml + 5 ml matavimo indelis ~~45<sup>99</sup>~~ **12<sup>39</sup> €**

**MEDICINOS PRIEMONĖ**

Sudėtyje esantys natūralūs ekstraktai (gebenių (Hedera Helix) ekstraktas (DER 1-2:1), poliflorinis medus, vaistinių svilvorių (Althaea officinalis) ekstraktas (1%), vaistinių čiobrelų (Thymus vulgaris) ekstraktas (0,3 %), kurių veiksmingumas įrodytas, suformuoja prie gleivinės prilipnandį plevelę, kuri ramina kosulį, apsaugo nuo dirginimo bei pagerina viršutinių kvėpavimo takų funkciją. Tai ypač aktualu žiemą arba kai reikia gydyti išorinių veiksnių (šaltio, smogo, dulkių ir dūmų) sukeltą sudirginimą. Naudinga esant sausam ir šlapiam (produktyviam) kosuliui, ramina dirginimą, saugo gleivinę ir lengvina gleivių šalinimą. Tinka vaikams nuo 1 m. amžiaus.

**-20%** **7<sup>11</sup> €** ~~8<sup>99</sup>~~**VOCAL HOT DRINK**

juodųjų serbentų skonio, milteliai karštam gėrimui ruošti, 10 paketėlių  
medaus ir citrinų skonio, milteliai karštam gėrimui ruošti, 10 paketėlių

**MAISTO PAPILDAS**

„Vocal“ miltelių pakeluose karštam gėrimui ruošti sudėtyje yra islandinių kerpenų gniūžulių, mažalapų liepų žiedų, tikrųjų imbiero šakniastiebių, smulkiąžiedžių tūbių žiedų, juoduogių šėvamedžių žiedų ekstraktų bei vitamino C. Islandinės kerpenos ir liepų žiedai padeda palaikyti kvėpavimo takų (gerklės, ryklės gleivinės bei balsų stygų) funkcijas. Islandinės kerpenos, imbierai, juoduogiai šėvamedžiai ir liepų žiedai padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. Paruošimo būdas: paketėlio turinį (miltelius) ištirpinkite 200 ml karšto vandens (ne verdančio, apie 60 °C) ir gerkite. Maisto papildas su saldikliais.

**AUSŲ SIERAI SUMINKŠTINTI IR IŠVALYTI****-15%** **10<sup>19</sup> €** ~~11<sup>99</sup>~~

**VAXOL**, ausų purškalas 10 ml

**MEDICINOS PRIEMONĖ**

„Vaxol“ – tai saugus ir veiksmingas būdas suminkštinti ir natūraliai išvalyti ausų sierą: sušvelnina, drėkina ir natūraliai šalina ausų sierą. Tinka vaikams nuo 1 metų, greitai ir lengvai naudojamas. Sumažina ausies praplovimo švirkštu poreikį. Ypač patinama naudoti užsimintams vandens sportui, dažnai naudojamiems ausinukams, klausos aparatams, taip pat vyresnio amžiaus žmonėms.

**AUSŲ PURŠKALAS SU ALYVUOGIŲ ALIEJUMI**

**VAIKAMS NUO PIRMŲJŲ GYVENIMO METŲ****-20%** **8<sup>87</sup> €** ~~11<sup>09</sup>~~

**HUSTAGIL**, balzamas, 30 ml

**KOSMETIKOS PRIEMONĖ**

„Hustagil“ balzamas su čiobreliais, eukaliptu ir levandų eteriniais aliejais kvėpavimui palengvinti. Balzamas yra švelnios konsistencijos, lengvai paskirstomas ir įtrinamas į odą. „Hustagil“ švelniai veikia jautrią odą dėl jame esančio migdolų aliejaus, pantenolio ir vitamino E. Naudojimas: balzamu kelis kartus švelniai įtrinkite krūtine ir nugarą. Malonus eterinių aliejų kvapas atpalaiduoja kvėpavimą.

**KVĖPAVIMUI PALENGVINTI!**

IKI -50 %

**OCUTEIN****MAISTO PAPILDAI, MEDICINOS PRIEMONĖS**

„Ocutein Kristal“ – kristolo tyrimo rezultatai!

„Ocutein Brilliant“ – brillantinė apsauga pavargusioms, daug dirbančioms akims.

Vartojimas: 1 kapsulė per parą.

„Ocutein Sensitive Plus“ – drėkinamieji akių lašai su hialuronu ir mėlynų ekstraktu jautrioms, daug dirbančioms akims.

„Ocutein Ribo-Hyal“ – regeneracijai kiekviename laše!

„OCUTEIN“ – DAUG DIRBANČIŲ AKIŲ APSAUGA!

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-30 %

**WALMARK BIORYTHM****MAISTO PAPILDAI**

Inovatyvios formos maisto papildų linija su lėto atpalaidavimo mikrogranulėmis, kurios išskiria maistingąsias medžiagas iki 8 valandų per dieną. Palyginti su įprastomis tabletėmis ar kapsulėmis, šiems papildams būdingas didesnis biologinis prieinamumas – medžiagos pasisavinamos palaipsniui žarnyne. BIORYTHM maisto papildų linija sudaro 6 produktai – „Ashvaganda“ (migdamosios vitanijos), „Cinkas 15 mg“, „Geležis 28 mg“, „Vitaminas B12 Max“, „Selenas 100 µg“ ir „Magnis su vitaminu B6“.

„BIORYTHM“ – INOVATYVI PRAILGINTO VEIKIMO LINIJA!

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-25 %

**SMARTHIT IV****EFEKTYVAUS PASISAVINIMO MAISTO PAPILDAI**

Miccol technologijos dėka pagaminami produktai, kurie pasisavinami itin gerai. Be to, mikrokapsulės sumažina šalutinių poveikių riziką. Efektyvaus pasisavinimo maisto papildų SMARTHIT IV<sup>®</sup> liniją sudaro:

**SMARTHIT IV<sup>®</sup> Lactoferrin.** Laktoferrinas – tai geležį surišantis baltymas, dalyvaujantis geležies pasisavinimo procese. Galima vartoti kartu su **SMARTHIT IV<sup>®</sup> Ferrum** kapsulėmis arba **SMARTHIT IV<sup>®</sup> Ferrum Liquid** skysta geležies forma, tinkančia suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų. Geležis padeda palaikyti normalų hemoglobino ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą.

**SMARTHIT IV<sup>®</sup> Ferrum Strong** – tai išmanus ir kompleksinis sprendimas, padedantis efektyviai palaikyti geležies atsargas organizme. 2 kapsulės – 40 mg mikrokapsuliuotos geležies versija su bioaktyvia folio rūgštimi bei aminorūgštimi L-histidinu.

**SMARTHIT IV<sup>®</sup> Vitamin D3** – kaulams, dantims, raumenims. **SMARTHIT IV<sup>®</sup> Vitamin D3+K2** – sinerginis, vitaminų D3 ir K2 poveikis kaulams ir kraujotakai;

**SMARTHIT IV<sup>®</sup> Vitamin B12** – normaliai kraujodarai bei psichologinei funkcijai palaikyti ypač daug dirbančioms ir besimokančioms;

**SMARTHIT IV<sup>®</sup> Polifen** – polifenolių šaltinis gerai savijautai.

**SMARTHIT IV<sup>®</sup> Curcumin** – mikrokapsuluota kurkumino forma imuninei sistemai, kepenų funkcijai, normaliam cholesterolio lygiui kraujyje palaikyti.

**SMARTHIT IV<sup>®</sup> Curcumin+Beta-glucans** – mikrokapsuluotas kurkuminas su beta gliukanais nuo šiol ir kapsulėmis imuninei sistemai, cholesterolio ir gliukozės kontrolei. Išbandykite!

„SMARTHIT IV“ – MENAS VEIKTI!

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-30 %

**GREENIFY BOOSTER****MAISTO PAPILDAI**

Atraskite GREENIFY BOOSTERS – smūginės dienos dozės energijai, imuninei sistemai palaikyti, ar lengvesniam atsigavimui po vakarėlio.

- Smūginė augalinė formulė
- Stiprios koncentracijos
- Greitesnio pasisavinimo
- Be pridėtinio cukraus, dažiklių ir saldiklių

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-30 %

**DR. PAKALNS****MAISTO PAPILDAI**

Prekių ženklas „Dr. Pakalns“ – tai pagarba mokslui, gamtai ir žmogui. Įkvėptas vaistinio ir biologijos mokslų daktaro Dailonio Pakalno palikimo, jis jungia tradicijas, mokslą ir rūpestį žmogui.

**Produktai:**

• **BETA IMMUNE balzamas** – su beta gliukanais ir šėvamedžių uogomis. Šėvamedžių vaisių ekstraktas, vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Sudėtyje – itin grynai beta gliukanai. Tinka vaikams nuo 3 metų. **Be glitimo. Be GMO. Be alkoholio. Kokybė patvirtinta GMP standartu.**

• **GTSLIŲ BALZAMAS** – su siauralapių gysločių ekstraktu, padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų funkciją ir gerklės komfortą. Tinka vaikams nuo 3 metų. **Be glitimo. Be GMO. Be alkoholio. Kokybė patvirtinta GMP standartu.**

• **PINI PLUS sirupas** – su pušų pumpurais ir diobreliais, tradiciškai vartojamais kvėpavimo takų funkcijai palaikyti, padeda išlaikyti gerklės komfortą ir natūralią atsikosėjimo procesą. Tinka vaikams nuo 4 metų. **Be glitimo. Be GMO. Kokybė patvirtinta GMP standartu.**

• **ISLANDINIŲ KERPENŲ sirupas** – su pipirmėčių tinktūra. Padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų funkciją ir gerklės komfortą. Tinka vaikams nuo 12 metų. **Be glitimo. Be GMO. Kokybė patvirtinta GMP standartu.**

„DR. PAKALNS“ – GAMTOS GALIA.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-10 %

5<sup>93€</sup>**ELEUTEROKOKŲ SKYSTASIS EKSTRAKTAS. 50 ml****MAISTO PAPILDAS**

Sudedamosios dalys: eleuterokokų šaknų su šakniastiebiais (*Eleutherococcus rhizomata et radices*) etanolinė išstraika 1:1 (etanolis, eleuterokokų šaknys su šakniastiebiais). Sudėtyje yra ne mažiau kaip 33 tūrio % etanolio. Vartojimas: suaugusiems gerti po 10 lašų 2 kartus per dieną 30 min. prieš valgį. Prieš vartojimą suplakyti. Rekomenduojamame suvartoti per parą kiekyje (20 lašų) yra apie 0,75 ml eleuterokokų skystojo ekstrakto. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.

Gamintojas: „Ternofarm“, Ukraina. Išskirtinis importuotojas ir platintojas Lietuvoje: UAB „VERATRUM PHARMA“, Žarijų g. 2B, Vilnius.

-30 %

**SILVANOLS****MEDICINOS PRIEMONĖS, MAISTO PAPILDAI**

„Faringo“ – natūralios sudėties gerklės ir burnos gleivinių priežiūros priemonių linija, skirta naudoti kasdien, visai šeimai. „Faringo“ produktai suderina gamtos įkvėptas sudedamąsias dalis – šaltalankių aliejų, medelkų, hialurono rūgštį ir vitaminus, kad padėtų palaikyti gleivinių būklę bei normalią imuninės sistemos veiklą. Asortimente rasite pūrkšalą (medicinos priemonė), čulpiamus ledinukus ir minkštąsias pastiles (maisto papildai), pritaikytus tiek vaikams, tiek suaugusiems. Produktai yra švarios sudėties: be dirbtinių dažiklių, be konservantų, kai kurie produktai taip pat yra be cukraus, be laktozės, be GMO.

„Faringo“ – natūralus, švelnus ir patikimas kasdienės gerklės bei burnos gleivinės priežiūros pasirinkimas.

„Atmosil“ kapsulės: pluoštinų bosvelijų ekstraktas ir paprastųjų pušų žievės ekstraktas padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų funkciją ir bendrą savijautą.

„Silvadep“ kapsulės: natūralios sudėties produktas su augalų ekstraktais emociškai pusiausvyrai palaikyti. Sudėtyje esančios medžiagos prisideda prie nervų sistemos veiklos ir geros savijautos.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



IKI -40 %

**OILESEN**VITAMINAS D3 1000, 80 kapsulių 9<sup>99</sup> 5<sup>99</sup> € -40 %VITAMINAS D3 400, geriamieji lašai, 10 ml 3<sup>99</sup> 2<sup>77</sup> € -25 %**MAISTO PAPILDAI**

„Oileesen D3“ – grynas vitaminas D dėl geresnio pasisavinimo ištirpintas natūraliuose aliejuose lašukais arba kapsulėmis. Be konservantų, paprasta vartoti.  
 „Oileesen D3 400“ – 1 laše yra 400 TV vitamino D, ištirpinto extra virgin alyvuogių aliejuje. Tinka kūdikiams nuo pirmos gimimo dienos. Paprasta dozuoti pipete.  
 „Oileesen D3 1000“ – 1 kapsulėje yra 1000 TV vitamino D, ištirpinto extra virgin alyvuogių aliejuje. Tinka vartoti vaikams nuo 3 metų.

**NUO ALERGIJOS**5<sup>99</sup> €**TAVEGYL**, 1 mg, 20 tablečių**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veiklioji medžiaga, stiprumas:** kiekvienoje tabletėje yra 1 mg klemastino fumarato, kuris atitinka 1 mg klemastino. **Indikacijos:** „Tavegyl“ lengvina alerginę slogą (šienligę, asarojimą, čiaudulį, nosies varvėjimą); alerginę odos reakciją (paraudimą, spuogelius, niežėjimą, patinimą); vabzdžių įgėlimo ir įkandimo sukelktą reakciją. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: iš ryto ir vakare gerti po 1 tabletę, 6–12 m. vaikams: gerti prieš pusryčius ir vakare prieš miegą po 0,5 arba 1 tabletę, 3–6 m. vaikams: gerti prieš pusryčius ir vakare prieš miegą po 0,5 tabletės. Tabletes gerti prieš valgį užsigeriant vandeniu. **Kontraindikacijos:** alergija klemastinui, kitokiems antihistamininiams vaistams ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Porfirija.** Jaunesniems nei 3 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** atsargiai turi vartoti pacientai, sergantys: uždarą kampo glaukoma; senosios sukeliančia peptine opa; dvylikapirštės žarnos obstrukcija; prostatos hipertrofija, dėl kurios susilaukia šlapimas; bei šlapimo pūslės kaklelio obstrukcija. Reikia atsargiai skirti epilepsijai sergantiems arba praėjusieji traukulius patyrusiems pacientams. Sudėtyje yra laktozės. Reklamos teksto parengimo data 2024-07.

-10 %

2<sup>96</sup> €**GINTARO RŪGŠTIS**, 20 tablečių**MAISTO PAPILDAS**

Vartojimas: gerti po 1 tabletę 3 kartus per dieną valgant.  
 Rekomenduojamame suvartoti per parą kiekyje (3 tabletės) yra 0,3 g gintaro rūgšties.  
 Gamintojas: UAB „Medicata Filia“, Žarijų g. 2B, Vilnius  
 Išskirtinis platintojas Lietuvoje: UAB „VERATRUM PHARMA“, Žarijų g. 2B, Vilnius

-30 %

**NEW NORDIC MULTIVITAMINAI****MAISTO PAPILDAI**

Skandinavų bendrovės „New Nordic“ multivitaminai – tai puikiai suderinti vitaminų, mineralų, mikroelementų ir augalinių ekstraktų kompleksai imunitetui ir gerai savijautai. „Multivitamin active woman“ – moterims, besirūpinančioms gera savijauta ir grožiu. „Multivitamin active woman 55+“ – vyresnių moterų organizmo poreikiams. „Multivitamin pregnant and breastfeeding woman“ – besilaukiančioms moterims ir žindydėms. „Multivitamin active man“ ir „Multivitamin active man energy boost“ – vyrams. Nepamiršome ir mažųjų – „Mineralai kaulams“ – apelsinų arba miško uogų skonio kramtomosios tabletės – kalcio, magnio ir vitamino D šaltinis augančiam organizmui. „Multi vegan GUMMIES“ – gaivaus vaisių ir uogų skonio multivitaminai guminukai imunitetui. Tinka visai šeimai, taip pat vegetarams ir veganams. Sudėtyje esantys vitaminai A, C, D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

**JAUSKITE PUIKIAI!**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

**ŠLAPIMO TAKŲ SISTEMAI**

-30 %

**URINAL****MAISTO PAPILDAI**

„Urinal“ – šlapimo takų sistemos. Unikalus spanguolių ekstrakto, paprastųjų rykštenių ir vitamino D derinys.  
 „Urinal Akut“ – didelė koncentracijos spanguolių ekstrakto „ExoCyan“, paprastųjų rykštenių ekstrakto ir vitamino D derinys.  
 „Urinal sirupas“ – tinkama vaikams nuo 1 metų.  
 2601\_SB\_Urinal\_V01\_LT

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-30 %

**VIRIDIAN****MAISTO PAPILDAI**

„Viridian“ – tai natūralūs, aukštos kokybės vitaminai ir maisto papildai, sukurti remiantis mokslu, etiška gamyba ir gryna sudėtimi.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-15 %

**NUTRIDRINK, CUBITAN, FORTINI****SPECIALIOS MEDICININĖS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAI**


Turi būti vartojami prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



# KOSMETIKAI „ŽIEDĖ“

iki **-40%**





IKI **-25%****EUCERIN HYALURON-FILLER****KOSMETIKOS PRIEMONĖS**

Bėgant laikui mūsų oda gamina vis mažiau hialurono rūgšties, todėl ji netenka drėgmės, atsiranda smulkii raukšlelių ir raukšlės. „Eucerin Hyaluron-Filler“ – veido odos priežiūros priemonės su hialurono rūgštimi ir glicino saponinu. Šios veikliosios medžiagos turi drėkinamųjų savybių ir gali padėti mažinti raukšlės matomumą.

„Eucerin Hyaluron-Filler Epigenetic“ serumas – lengvos, greitai įsigeriančios tekstūros serumas su veiklią medžiaga „Epicellin“<sup>SM</sup>, hialurono rūgštimi ir glicino saponinu. Iki 78 % mažiau pastebimos raukšlės.

\*Klinikinis tyrimas, kuriame dalyvavo 45 savanoriai, priemonę naudojo 2 kartus per dieną. Instrumentinis matavimas po 4 savaitių, 2023.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtos prekės

IKI **-25%****Intymiai higienai****VAGISAN****KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS**

Priemonės „Vagisan“ su natūraliu pieno rūgštimi skirtos tinkamai lytinių organų priežiūrai. Rūgšti aplinka – būtina sąlyga, kad laktobakterijos galėtų pačios gaminti pieno rūgštį ir daugintis. Taip užtikrinama optimali natūrali apsauga nuo infekcijos. Intymiosios higienos prausiklis „Vagisan“ tinka kasdieni intymiai higienai. Drėkinamasis makšties kremas „Vagisan“ sumažina tokius simptomus kaip sausumas, niežulys, deginimo pojūtis ir skausmas. Ovulės su pieno rūgštimi, skirtos natūraliai makšties pH terpei palaikyti ir atkurti.

**TAVO INTYMIAM SVIEKATAM**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtos prekės

IKI **-35%****CUMAUDE LAB****GINEKOLOGINĖS KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS**

Ispanijos ginekologų sukurti intymios higienos produktai, iš kurių kiekviena moteris išsirinkti sau tinkantį – nuo kasdienės higienai skirtų prausiklių iki priemonių lytinių organų nemaloniems simptomams ir uždegimams malšinti bei jų išvengti.

Atraskite intymios higienos ritualą su „Cumaude Lab“!

**„CUMAUDE LAB“ – NAUJAS POŽIŪRIS Į MOTERS LYTINĘ SVIEKATĄ**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtos prekės

IKI **-30%****HI GENIE!**

MENOPAUSE COMFORT, intymios higienos prausiklis, 200 ml **40<sup>95</sup> 7<sup>69</sup> €**

SPECIFIC PROTECT, intymios higienos prausiklis, 200 ml **40<sup>95</sup> 7<sup>69</sup> €**

**HIGIENOS PRIEMONĖS**UŽ **1 CT**

Perkant pakuotę Gentle Day, vienkartinės nosinais – **TIK UŽ 1 CT!**

**GENTLE DAY®****HIGIENOS PRIEMONĖS**

„Gentle Day“® produktai – moterims, kurios myli save, saugo savo sveikatą ir rūpinasi aplinka. Ekologiškos „Gentle Day“ higienos prekės itin tinka moterims, kurių oda linkusi sudirgti ar alergiška. Lietuviškas prekės ženklas „Gentle Day“ garantuoja aukštą produktų kokybę, yra draugiškas Jums ir gamtai. Produktai yra sertifikuoti „Oeko-Tex“ 100<sup>®</sup>, „Made for Helath“<sup>SM</sup>, VEGAN sertifikatais.

NUO **5<sup>75</sup> €**

**CANESTEN®**, 10 mg/g kremas, 20 g **5<sup>75</sup> €**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Canesten 10 mg/g kremas. Klotrimazolas. **Terapinės indikacijos.** Canesten skirtas saugausiems, paaujami ir vaikams gydyti grybelinės odos infekcijos, pvz., sportininko pėda, grybelis, grybelinis sausėjimo berms ir grybelinis prakaitavimo sukeltas berms, grybelis sukeltas donorų moters lyties organų arba varpos galo uždegimas. **Varėjimo būdas.** Vartoti ant odos. **Dovavimas.** Kremu plonai ir tolygiai tepkite paveiktas vietas 2-3 kartus per parą ir švelniai įtrinkite. Kremas įsotės (0,5 cm ilgio) pakanka maždaug dešio dydžio pluta gydyti. **Specialūs įspėjimai.** Pastarite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Canesten. Kremas gali sumažinti laktos gaminių, tokiu kaip prezervatyvai ir diafragmos, veiksmingumą ir saugumą, jeigu jis tepamas lytinių organų srityje (moterims: lyties lūpos ir šlėis apie vulvą; vyrams: apvarpė ir varpos galvutė). Gydymo metu naudokite alternatyvias apsaugos priemones. Vengti sąlyčio su akimis. Nedėti į burną, nenuryti. Vaikams (jaunesniems negu 12 metų) ir senyviems pacientams vartoti galima tik prižiūrint gydytoją. Vengti ilgalaikio gydymo dideliose odos plotuose, ypač kūdikiams ir vaikams. Vulvito atveju jaunesniems kaip 16 metų paaugliams galima vartoti tik po gydytojo konsultacijos. Per pirmuosius tris nštumo mėnesius prieš vartojant reikia pasitarti su gydytoju. Sudėtyje yra cetosteirilo alkoholio, benzilo alkoholio. **Kontraindikacijos.** Alergija klotrimazoliui arba bet kuriai pagalbine medžiaga. **Registravimas.** UAB „Bayer“, Sporto g. 18, LT-09238, Vilnius, Lietuva. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-08-27 04-20250827-35

„CANESTEN“<sup>SM</sup> KREMAS - GRYBELINĖS INFEKCIJOS GYDYMU!

**CANESTEN®**, 500 mg makšties minkštoji kapsulė **11<sup>50</sup> €**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Canesten 500 mg makšties minkštoji kapsulė. Klotrimazolas. **Terapinės indikacijos.** Makšties ir išorinių moters lyties organų infekcijų, sukeltų klotrimazoliu jautrių mikroorganizmų gydymui. **Varėjimo būdas.** Makšties minkštoji kapsulė reikia įdėti kaip galima giliau į makštį, naudojant pateiktą aplikatorių, gausiausia gulint, vakare prieš miegą. Jei laukiate, įdėkite makšties minkštoji kapsulę į makštį prieš tai. **Dovavimas.** Viena makšties minkštoji kapsulė, įvesta giliai į makštį vakare (vienkartinė dozė). **Specialūs įspėjimai.** Pastarite su gydytoju, jeigu: infekcija pasireiškia pirmą kartą; makšties infekcija pirmą nštumo trimestrą; per pastaruosius šešis mėnesius infekcija pasikartojė daugiau nei du kartus; pasireiškia karščiavimas ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ); skauda apatinę pilvo dalį, nugara; atsiranda nemalonus kvapo iškyrų iš makšties; pasireiškia pykinimas; pasireiškia kraujavimas iš makšties ir (arba) tuo pačiu metu pedu skausmas. Nerekomenduojama gydyti menstruacijų metu. Gydymas turi būti užbaigtas iki menstruacijų pradžios. Vartojant negalima naudoti tamponų, makšties ploviklių, spermicidinių ar kitokių į makštį vartojamų preparatų. Vartojant rekomenduojama vengti lytinių santykių, nes partneris gali užsikėsti. Jei Jūsų partneriui yra infekcijos simptomai, tai turi būti gydoma tuo pačiu metu. Tuo pačiu metu naudojami laktos klotrimazoliu priemonių, pvz., prezervatyvų ir diafragmų, efektyvumas ir patikimumas gali sumažėti. Negalima nuryti. **Kontraindikacijos.** Alergija klotrimazoliui arba bet kuriai pagalbine medžiaga. **Registravimas.** UAB „Bayer“, Sporto g. 18, LT-09238, Vilnius, Lietuva. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-08-27 04-20250827-35

„CANESTEN“<sup>SM</sup> MAKŠTIES MINKŠTOJI KAPSLULĖ - 1-OS DIENOS MAKŠTIES GRYBELINĖS INFEKCIJOS GYDYMAS!

**Moterų intymiai higienai**IKI **-20%****MULTI-GYN****KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS**

Mūsų produktai suteikia tinkamą intymią higieną ir padeda sumažinti nemalonių pojūčių toje srityje: nepageidaujamą kvapą, niežulį ar deginimo pojūtį.

„Multi-Gyn“ puikiai suprantą moterų poreikius, kai atsiranda nepatogumų intymioje zonoje ir kaip tai paveikia jūsų gyvenimą. Todėl mes siūlome produktus, kurie gydo šiuos negalavimus natūraliu būdu, be žinomo šalutinio poveikio („Actigel 2 in 1“, „LiquiGel“, „Flora Plus“). Visų produktų sudėtyje esantis unikalus ZOR<sup>®</sup> kompleksas atkuria ir normalizuoja natūralią makšties mikroflorą.

\* ZOR kompleksas – patentuoti biologiški aktyvūs polisacharidai, gaunami iš sudedamųjų alavijų (Barbados Miller) medžiagų. [www.ZOR.com](http://www.ZOR.com)

**JEI NORI BŪTI TIKRA DĖL SAVO SVEIKOS MAKŠTIES!**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtos prekės

## ODOS IR LŪPŲ PŪSLELINEI GYDYTI

5<sup>99</sup> €



**ACIC**, 5 % kremas, 2 g

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** 1 g kremo yra 50 mg acikloviro. **Terapinės indikacijos:** odos ir lūpų pūslelinė, kurią sukelia *Herpes simplex* virusas, gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** pažeistą odos vietą tepti plonu sluoksniu 5 kartus per parą kas 4 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas aciklovirui, valaciklovirui, propilenglikoliui arba bet kurioms pagalbinėms medžiagoms. Netepi ant gleivinės (burnos, akių, makšties). **Specialūs įspėjimai:** vaisto draudžiama nuryti. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2601069662. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

**UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSLELINĘ SU „ACIC“!**

7<sup>97</sup> €



**TERBINAFIN-RATIOPHARM**, 10 mg/g kremo, 15 g

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** 1 g kremo yra 10 mg terbinafino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** odos infekcija, sukelia dermatofitų, tokių kaip *Trichophyton*, *Microsporum canis* ir *Epidermophyton floccosum*, mieliagrybių, daugiausia *Candida* genties, įvairiaspalvę dedervinę, sukelia *Pityrosporum orbiculare* (*Malassezia furfur*). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusieji ir paaugliai (>12 m.): pėdos grybelis, blauzdos grybelis ir liemens grybelis: 1 kartą per parą, savaitę; odos kandidozė: 1 kartą per parą, 1–2 savaites; įvairiaspalvę dedervinė: 1–2 kartus per parą, 2 savaites. Tepti ant sausos ir švarios odos. „Terbinafin-ratiopharm“ 10 mg/g kremas turi būti tepamas ant pažeistos ir aplinkinės odos plonu sluoksniu ir tada švelniai įtrinamas. Jei infekcija yra raukšlėse (po krotimi, tarpupirščiuose, sėdmenų raukšlėje arba kirkšnyje), po kremo užtepimo odą galima uždengti steriliu marles gabalėliu, ypač naktį. Simptomai palengvėja dažniausiai per kelias paras. Nereguliarus vaisto vartojimas arba ankstyvas nutraukimas padidina simptomų pasikartojimo riziką. Jei per 2 sav. nespėjama pagerėjimo, diagnozė turi būti svarstoma iš naujo. „Terbinafin-ratiopharm“ 10 mg/g kremo nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams, nes duomenų apie saugumą nepakanka. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** „Terbinafin-ratiopharm“ 10 mg/g kremas yra skirtas tik naudoti išorškai. Vengti patekimo į akis. Gali atsirasti akių dirginimo požymių. Atsiktinkamai patekus į akis, gerai plaukinti jas tekančiu vandeniu. „Terbinafin-ratiopharm“ 10 mg/g kremą reikia laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Sudėtyje esantis cetosteirilo alkoholis ir ceto alkoholis gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą). Benzilo alkoholis gali sukelti alerginių reakcijų ir nesunkų vietinį sudirginimą. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-01. OT-CT-00090

-30% 4<sup>61€</sup>



**AMEDIPLUS**, Rankų kremas su pantenoliu, 100 ml  
KOSMETIKOS PRIEMONĖ

-40% 9<sup>89€</sup>



**AMEDIPLUS**, pleistras nuo lūpų pūslelinės, 15 vnt.  
MEDICINOS PRIEMONĖ

1+1

Dvi tokios pačios  
pakuotės už  
VIENOS KAINĄ!



**ODONTE**

**BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

ODONTE – tai patikimumas ir dėmesys detalėms, užtikrinantis nepriekiaingą burnos priežiūrą kiekvieną dieną.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-25%



**JORDAN**

**BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

Platus dantų priežiūros priemonių asortimentas visai šeimai - nuo pirmo dantuko! Rinkitės dantų šepetėlius, pastas bei tarpdančių valymo priemones pagal savo individualius poreikius.

„JORDAN“ RŪPINASI ŠYPSENOMIS NUO 1927-ŪJŲ!

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-30%



**LISTERINE**

**BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

Burnos skalavimo skysčiai LISTERINE padeda saugoti dantis nuo apnašų, palaiko gaivų burnos kvapą. Pasiekia vietas, kurių dantų šepetėlis negali pasiekti.

**SU ŠEPETĖLIU TIK PUSĖ DARBO - NAUDOK IR „LISTERINE“**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

## TOBULAI BURNOS HIGIENAI

-20%



**CURAPROX**

**BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

„Curaprox“ – tai aukščiausios kokybės šveicariškos burnos higienos priemonės: platus spektras dantų šepetėlių, tarpdančių šepetėlių, dantų pastų. Taip pat kitiems ir vaikams skirtos priemonės. „Curaprox“ dantų šepetėlių šereliai gaminami ne iš nailono, o iš patentuotos „Curen“ medžiagos, todėl šie šepetėliai efektyviai pašalina apnašas, netraumuodami dantenu. Tarpdančių šepetėliai gaminami iš labai plonos, tačiau tvirtos „Cural“ patentuotos medicininės vielutės, todėl tarpdančius išvalysite kruopščiai ir be skausmo. Dantų pastos profilaktikai įvairaus amžiaus grupėms ir antibakterinė „Perio Plus“ linija.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms





Karščiavimui  
mažinti ir skausmui  
mažinti

NUO 4<sup>50</sup> €

### IBUSTAR

20 mg/ml geriamoji suspensija vaikams, 100 ml 4<sup>50</sup> €  
40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams, 100 ml 7<sup>50</sup> €

#### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Vienas geriamosios suspensijos ml yra 20 mg arba 40 mg ibuprofeno. „Ibustar“ yra uždegimą slopinantis ir skausmą mažinantis vaistinis preparatas (nesteroidinis vaistas nuo uždegimo), turintis karščiavimą mažinančių savybių. „Ibustar“ vartojamas kaip trumpalaikio simptominio gydymo priemonė: silpno ar vidutinio stiprumo skausmui, karščiavimui mažinti. „Ibustar 20 mg/ml“ geriamoji suspensija tinka vaikams, sveriantiems 5–29 kg (amžius nuo 6 mėnesių iki 9 metų). „Ibustar 40 mg/ml“ geriamoji suspensija tinka vaikams, sveriantiems 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), paaugliams ir suaugusiems. Tinka vartoti tik per burną ir trumpai. Jeigu šio vaistinio preparato vaikams ir paaugliams reikia vartoti ilgiau kaip 5 dienas arba jeigu ligos požymiai blogėja, pasitarkite su gydytoju. Prieš vartojimą būtina išsiaiškinti, ar vaikas neturi alergijos ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu praėjusio laiko buvo bronchų spazmas, astma, nosies gleivinės paturkimas, angioedema ir odos reakcijos po acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių uždegimų mažinančių vaistų vartojimo; jeigu yra neaiškių kraujodaros sutrikimų; jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakurimas, susijęs su anksčiau NVNU vartojimu; jeigu yra ar buvo praėjusio laiko skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa arba kraujavimas; jeigu yra kraujavimas iš smegenis arba kitos kraujavimas; jeigu yra sunkus inkstų, kepenų funkcijos ar sunkus širdies nepakankamumas; netekus daug skysčių; jeigu yra paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Ibustar“. Šalutinis poveikis gali sumažėti vartojant mažesnę veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką, būtiną simptomų kontrolei. „Ibustar“ reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, skaitant COX-2 inhibitorius. Jeigu šio vaisto atsitinka skrandžio kraujavimas ar išopėjimas, nutraukite „Ibustar“ vartojimą. Nedelsdami informuokite gydytoją, jeigu atsiranda bet koks nepageidaujamas simptomas. Pasitarkite su gydytoju, jei vartojate šį vaistą ilgą laiką ar sunkiu odos reakcijų simptomu, nedelsdami nutraukite „Ibustar“ vartojimą ir kreipkitės į gydytoją arba greitosios medicinos pagalbos tarnybą. „Ibustar“ gali slopinti tokias infekcijos simptomus, kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl „Ibustar“ gali vėlinti tinkamą infekcijos gydymą, todėl gali padidėti komplikacijų rizika. Jei vartojate šį vaistą ilgą laiką, infekcinė liga ir simptomai išlieka arba blogėja, nedelsdami pasitarkite su gydytoju. Sergant vėjaraupiu reikia vengti vartoti „Ibustar“. LT\_18\_01\_2024\_V1\_print UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 1947, LT@berlin-chemie.com Reklaminiu tekstu paruošimo data 2024-08.

GREIT IR VĖL KARALIUS!

Odos priežiūra ir  
apsauga

-35%



### SUDOCREM® MULTI-EXPERT

#### MEDICINOS PRIEMONĖS

„Sudocrem“ Multi-Expert“ gydo odos sudirgimus ir pažeidimus. Apsaugo odą aplink žaizdas ir skausmą. Švelniai gydo sauskelnių dermatitą. Subalansuotas sudėties kremas gydo odos uždegimus, apsaugo odą nuo išorinių dirgiklių suformuodamas apsauginį barjerą. Sudėtyje esantis natūralus emolientas lanolinas gerai sugeria drėgmę ir minkština odą. Kremas išsaugo odos drėgmę ir nepalieka riebių sluoksnio odos paviršiuje, kaip kiti kosmetiniai kremai. Tepti plonu sluoksniu. Naudoti atsiradus įvairių odos sudirgimų, įvairių kūno vietų išūtimų, profilaktškai nuo pragulų ar odos apsaugai aplink žaizdų kraštus. Skirtas naudoti tik išorškai. SUD-LT-00102.

„SUDOCREM“ – NE TIK KŪDIKIAMS. KIEKVIENAM.

\*Kąta laikoma geltona etikete pažymėtos prekės

Žarnyno mikroflorai

1+1

Dvi tokios pačios  
pakuotės už  
VIENOS KAINĄ!



### ACIDOLAC® JUNIOR

20 meškiuko formos tablečių 10<sup>19</sup> €  
braškių skonio, 20 meškiuko formos tablečių 10<sup>19</sup> €

#### MAISTO PAPILDAI

ACIDOLAC® JUNIOR meškiuko formos tablečių sudėtyje yra gerųjų žarnyno bakterijų *Lactobacillus acidophilus* La-14TM ir *Bifidobacterium lactis* BI-04TM, inulino ir vitamino B6, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vartojimas: vyresniems kaip 3 m. vaikams ir suaugusiems vartoti po 1 meškiuko formos tabletę 2 kartus per parą. Be sacharozės ir gliutinio.

## GAMINAME VAISTUS PAGAL INDIVIDUALIUS RECEPTUS

- Atneškite gydytojo receptą iki 13 val.
- Atsiimkite pagamintą vaistą kitą darbo dieną.



VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS





# LAIMĖS VALANDOS

Darbo dienomis ir šeštadieniais  
**8-9 val. ir 14-15 val.\***

Sekmadieniais  
**14-15 val.\***



**-30%**

Perkant 3\*\*  
ir daugiau  
prekių

**-25%**

Perkant  
2\* prekes

**-20%**

Perkant  
1 prekę

\*\*nereceptiniams vaistams -25%  
receptiniams vaistams -20%

\* vaistams -20%

Nuo 2023 m. spalio 23 d. NORFOS vaistinėje akcijos LAIMĖS VALANDOS metu perkant 1 prekę taikoma 20 % nuolaida, perkant 2 prekes – 25 % nuolaida, vaistams – 20 % nuolaida, o įsigyjant 3 ir daugiau prekių – 30 % nuolaida, nereceptiniams vaistams – 25 %, receptiniams – 20 % nuolaida.

Taikomos momentinės 20 % dydžio nuolaidos receptiniams vaistams, 20 ar 25 % nuolaidos nereceptiniams vaistams ir vaistiniams preparatams, o kitoms prekėms – 20, 25 arba 30 % nuolaidos, atsižvelgiant į atitinkamo pirkimo metu įsigyjamų prekių bendrą kiekį. Nuolaida taikoma perkant pilnas prekių pakuotes, kurių kiekvienos vertė arba priemoka ne mažesnė nei 1,50 euro. Prekės, perkamos su kompensuojamuoju receptu, įskaičiuojamos į įsigyjamų (perkamų) prekių krepšelį (kiekį), tačiau joms nuolaida netaikoma.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaidos netaikomos perkant su kompensuojamuoju receptu, mokant už skiepus, taip pat pradinio maitinimo pieno mišiniams, kartinams (gaminamiems vaistinėje) ir vardiniais vaistams, įsigyjant dovanų kuponus, pakavimo maišelius. Nuolaidos netaikomos perkant [www.gintarine.lt](http://www.gintarine.lt), net jei už prekes atsiskaitoma jais atsiimant vaistinėse. Nuolaidos netaikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Visos nuolaidos galioja tik su PC NORFA lojalumo kortele.

Informaciją apie kitu nei nurodyta laiku vykstančias LAIMĖS VALANDAS rasite [www.nvaistine.lt](http://www.nvaistine.lt). Informacija apie kitas akcijas ir prekes, kurioms netaikomos akcijos LAIMĖS VALANDOS nuolaidos, suteikiama kiekvienoje vaistinėje, el. paštu [info@nvaistine.lt](mailto:info@nvaistine.lt) arba nemokamu tel. 8 800 10008.

**NVAISTINĖ**  
VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS