VAISTINĖ

TOP SPALIO PASIŪLYMAI

-60%



AMBIO
VITAMINAS D3 4000IU, 120 minkštųjų kapsulių ~~26,98~~ **10,79 €**
MAISTO PAPILDAS

-60%

EPITOME
BEAUTY MARINE COLLAGEN, 12.200 mg, milteliai, 30 paketėlių ~~59,99~~ **24,00 €**
MAISTO PAPILDAS

-50%

B COMPLEX, 40 kapsulių ~~15,69~~ 7,85 €
MAISTO PAPILDAS
„B complex“ – tai įvairių, gerai subalansuotų B grupės vitaminų derinys tiems, kurie jaučia nervinę įtampą bei nuovargį. Mažinti nuovargį, palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą padeda vitaminai B2, B6, B12. Normalią odos būklę padeda palaikyti vitaminai B2, biotinas ir niacinas, o normalią plaukų būklę – biotinas. Normalią protinę veiklą padeda palaikyti pantoteno rūgštis.

-50%

VERSAN SHOTS, 20 geriamų dozių po 10 ml ~~32,89~~ 16,45 €
MAISTO PAPILDAS
„Versan Shots“ – geriamos skystos dienos dozės sąnariams, sklandžiam jų darbui. Vienas buteliukas per dieną aprūpina sąnarius reikalingomis medžiagomis: kolagenu, hialurono rūgštimi, gliukozaminu, chondroitinu, vitaminais C ir D3.
„VERSAN“ – PROFESIONALI PAGALBA JŪSŲ SĄNARIAMS!

NUO **4,99 €**

GRIPEX THERMAL
1000/100/12,2 mg, milteliai geremąjam tirpalui, 8 paketėliai **6,99 €**
1000/100/12,2 mg, milteliai geremąjam tirpalui, 12 paketėlių **8,99 €**
650/50/10 mg, milteliai geremąjam tirpalui, 8 paketėliai **4,99 €**
300/20/5 mg, milteliai geremąjam tirpalui 12 paketėlių **8,99 €**
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: (1 paketėlyje): „Gripex Thermal 300/20/5 mg“: 300 mg paracetamolio, 20 mg askorbo rūgšties, 5 mg fenilefrino hidrochlorido; „Gripex Thermal 650/50/10 mg“: 650 mg paracetamolio, 50 mg askorbo rūgšties, 10 mg fenilefrino hidrochlorido; „Gripex Thermal 1000/100/12,2 mg“: 1000 mg paracetamolio, 100 mg askorbo rūgšties, 12,2 mg fenilefrino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. „Gripex Thermal 300/20/5 mg“: 6–12 m. vaikams: 1 paketėlis kas 4–6 val.; suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams: 1–2 paketėliai kas 4–6 val. „Gripex Thermal 650/50/10 mg“ arba „Gripex Thermal 1000/100/12,2 mg“: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. vaikai: po 1 paketėlį kas 4–6 val. Nepasitarę su gydytoju, nevartokite ilgiau nei 7 d. Nevartokite didesnės nei rekomenduojama dozės. Pasakykite gydytojui, jei jūsų inkstų ar kepenų veikla sutrikusi ar nuolat vartojate alkoholį. **Kontraindikacijos:** alergija veikliosiems arba pagalbinėms medžiagoms, taip pat vaistams, kurių sudėtyje yra simpatomimetinių aminų; širdies ligos, padidėjęs kraujospūdis; gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės arba methemoglobino reduktazės stoka; sunkus kepenų ar inkstų nepakankamumas; tirotoksikozė; šlapimo užsilaikymas arba feochromocitoma; zidovudino, MAO inhibitorių vartojimas; nėštumas ar kūdikio žindymas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju, jei sergate kepenų arba inkstų nepakankamumu, bronchine astma, prostatos hiperplazija, Reino sindromu (rankų ar kojų pirštų, ausies kraštų ir nosies galiuko išblyškimas, dažnai sukeltas šalčio arba emocinio streso), širdies liga, padidėjusiu kraujospūdžiu, cukriniu diabetu. Reklamos teksto parengimo data 2025-11-04.
„GRIPEX THERMAL“. VEIKIU!

4,99 €

SEPTABENE
3mg/1mg, (eukaliptų/citrinų ir medaus/citrinų ir šeivamedžio/kolos skonio/citrinų ir imbiero skonio), 16 kietųjų pastilių
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
„Septabene“ dezinfekuoja burną ir ryklę bei lengvina ryklės uždegimo požymius: skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. Kietosios pastilės „Septabene“ vartojamos uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti: jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas; sergant dantenų uždegimu (gingivitu), ryklės uždegimu (faringitu). **Dozavimas**: suaugusiesiems rekomenduojama paros dozė yra 3–4 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3–6 valandas. 6–12 m. vaikams rekomenduojama paros dozė yra 3 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3–6 valandas. **Kontraindikacijos**: padidėjęs jautrumas veikliosiems medžiagoms. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 m. vaikas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės**: „Septabene“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydomojo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. „Septabene“ negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Kietųjų pastilių negalima vartoti kartu su pienu, nes jis silpnina cetilpiridinio chlorido antimikrobinį poveikį. Reklamos teksto parengimo data 2022 10 12.
TAVO GERKLĖ – TAVO JĖGA!

-50 % pigiau

IKI -65%

RAMI ŠIRDIS

MAISTO PAPILDAI

„Rami Širdis“ – dvejopo poveikio maisto papildai, pripažinti Lietuvos vartotojų. Šios linijos preparatams būdinga puikiai suderinta sudėtis, kuri, be vitaminų ir mineralų, papildyta natūraliais augaliniais ekstraktais, šimtmečius naudojamais medicinoje. „Rami Širdis“ maisto papildai padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir psichologinę funkciją, taip pat padeda mažinti nuovargį.

RAMIAME KŪNE - RAMI ŠIRDIS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

Žarnyno mikroflorai

-50%

BIFOVAL®

FORTE, 15 kietųjų kapsulių ~~10,79~~ 5,40 €
BABE, 25 kramtomosios tabletės ~~10,49~~ 5,25 €

MAISTO PAPILDAI

Specialiai parinktos sudėties maisto papildai kiekvieno ryto ritualui 15-30 min prieš kiekvienus pusryčius.
„Bifoval® Forte“ – 5 milijardai lacto- ir bifidobakterijų. Sudėtyje 3 bakterijų padermės. Visai šeimai (vaikams nuo 5 metų).
„Bifoval® Babe“ – braškių skonio kramtomos tabletės, kurių sudėtyje yra 4 rūšių Lacto ir Bifido bakterijų kompleksas (3,15 mlrd. 1 tabletėje). Vaikams nuo 3 metų.
Vartojant antibiotikus gerti 1 val. prieš arba po antibiotikų vartojimo.

-50%



ECOSH, ASHWAGANDHA, 90 kapsulių ~~32,99~~ 16,50 €

MAISTO PAPILDAS

„Ecosh“ – Estijos maisto papildų gamintojas, siekiantis gaminti kuo natūralesnius, kokybiškus ir efektyvius maisto papildus. Naudojamos veganinės, augalinės kilmės kapsulės, maisto papildai yra be konservantų, dauguma tinkami vegetarams ir veganams.

-50%

NATASPIN®

CONTROL PRO, 30 kapsulių ~~19,99~~ 10,00 €
GLUCOSE, 30 kapsulių ~~16,49~~ 8,25 €

MAISTO PAPILDAI

Širdies stiprybei ir apsaugai rinkitės **„NatAspin CARDIO PROTECT“** su stipriais antioksidantais ir **kofermentu Q10** (net 80 mg 1-noje kapsulėje).
Teisingai cholesterolio kontrolei išbandykite 30 dienų kursą **„NatAspin CONTROL PRO“**.
Esant kraujotakos sutrikimų ir trombų susidarymo rizikai vartokite **„NatAspin H“**su natokinaze ir hidroksitirozoliu iš alyvuogių.
Visų „NatAspin“ formulių sudėtyje naudojami išskirtinai tik standartizuoti bioaktyvūs ekstraktai, kurie užtikrina fiksuotą veikliųjų medžiagų kiekį ir patikimumą.

„NATASPIN“ – TEISINGI SPRENDIMAI ŠIRDŽIAI, KRAUJOTAKAI, GLIUKOZĖS IR CHOLESTEROLIO KONTROLEI.

-50%

RAMEVAL®, 15 kapsulių ~~7,99~~ 4,00 €

MAISTO PAPILDAS

„RAMEVAL®“ – ramybės augalų puokštė sukurta iš valerijonų, melisų, pipirinių mėtų, ramunių ir apynių, kuri padeda:
- palaikyti normalią nervų sistemos būklę (vaistiniai valerijonai),
- atsipalaiduoti (vaistinės melisos, pipirinės mėtos, vaistinės ramunės),
- palengvinti užmigimą ir palaikyti miego kokybę (vaistinės melisos, paprastieji apyniai)

IEŠKAI RAMYBĖS? ATRASK JĄ SU „RAMEVAL“

-50%

LIUBERIN SUPERIOR, 35 mg, 30 kapsulių ~~21,99~~ 11,00 €
LIUBERIN + LUTEIN, 30 kapsulių ~~23,99~~ 12,00 €

MAISTO PAPILDAI

Linija **„Liuberin“** skirta padėti išsaugoti normalų regėjimą bei palaikyti akies kraujotaką. **„Liuberin superior“** net 18 aktyviųjų medžiagų kompleksas sausoms, pavargusioms, daug į skaitmeninių įrenginių ekranus žiūrinčioms akims. Sudėtis praturtinta ginkmedžiu, kuris padeda palaikyti akies kraujotaką. O **„Liuberin +LUTEIN 35 mg“** – naujausia formulė akims! Šio preparato sudėtis praturtinta karotenoidais: net 35 mg liuteino ir 3 mg zeaksantino, kurių su amžiumi koncentracija akyse mažėja. Gausi sudėtis išsiskiria ir mėlynių uogų ekstraktu, kuris padeda palaikyti normalią akių funkciją, vaizdo aiškumą ir kraujotaką. Normalų regėjimą padeda išsaugoti vitaminas A ir cinkas. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

RYŠKIOMS GYVENIMO SPALVOMS!

Širdžiai, raumenims, nervų sistemai ir nuovargiui mažinti

-50%

BIOKALIS, milteliai geriamajam tirpalui, 30 pakelių ~~10,69~~ 5,35 €
BIOKALIS FORTE, milteliai geriamajam tirpalui, 30 pakelių ~~12,69~~ 6,35 €
BIOMAGNESIUM FORTE, 500 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 20 pakelių ~~14,79~~ 7,40 €
BIOMAGNESIUM, 300 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 30 pakelių ~~14,39~~ 7,20 €
BIOMAGNIS + BIOKALIS, milteliai geriamajam tirpalui, 30 pakelių ~~14,99~~ 7,50 €

MAISTO PAPILDAI

Klasika tapę ir vieni perkamiausių „Biofarmacijos“ magnio ir kalio papildų Lietuvoje (2019–2025).* Maisto papildai milteliais, kurių sudėtyje – tik organinės kilmės mineralai iš Negyvosios jūros, išsiskiriantys geru įsisavinimu, be pridėto cukraus, su sertifikuota kokybe. Magnis padeda mažinti nuovargį ir palaikyti sklandžią nervų sistemos bei raumenų funkciją, palaikyti normalią energijos apykaitą. Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį. * Pagal UAB „Sofident“ duomenis.

AUKŠTOS KOKYBĖS NEGYVOSIOS JŪROS MINERALAI, PAPRASTOS FORMULĖS IR JOKIŲ NEREIKALINGŲ PRIEDŲ.

2,49 €

PARACETAMOL ACTAVIS
500 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tabletėje yra 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos.** Trumpalaikis karščiavimo mažinimas. Lengvo ir vidutinio stiprumo skausmo (pvz., galvos, dantų, sąnarių, raumenų, mėnesinių) malšinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiesiems: įprastinė dozė yra 500–1000 mg kas 4–6 val. pagal poreikį. Didžiausia paros dozė yra 3 g, didžiausia vienkartinė - 1000 mg. „Paracetamol Actavis" saugumas ir veiksmingumas vaikams, sveriantiems iki 50 kg, neištirti. Pacientams, kurie nuolat vartoja alkoholį, intervalas tarp dozių vartojimo turi būti bent 8 val. Jiems negalima viršyti 2 g paros dozės. Jeigu praėjus daugiau kaip 3 paroms nuo gydymo pradžios didelis karščiavimas ar infekcijos požymiai išlieka arba jeigu praėjus daugiau kaip 5 paroms nuo gydymo pradžios skausmas išlieka, pacientą reikia ištirti dėl simptomus sukelusios priežasties. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Ilgalaikis arba dažnas vartojimas nerekomenduojamas, negalima vartoti kartu kitokių paracetamolio turinčių vaistinių preparatų. Visą paros dozę vartojant vienu metu ar perdozavimo atveju, gali pasireikšti sunki kepenų pažaida. Tokiu atveju sąmonės pacientas nepraranda, tačiau jis turi nedelsiant kreiptis į gydytoją. Pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų nepakankamumas, lengvas arba vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumas (įskaitant Gilbert sindromą), sunkus kepenų nepakankamumas ar ūminis hepatitas, vartojantiems kepenų funkcija veikiančių vaistinių preparatų, taip pat tiems, kuriems yra gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės trūkumas, hemolizinė anemija ar dehidratacija, sergantiems astma, piktnaudžiautiems alkoholiu arba nuolat blogai besimaitinantiems, paracetamolio patariama vartoti atsargiai. Po ilgalaikio (> 3 mėn.) gydymo, kurio metu paracetamolio buvo vartota kas antrą parą arba dažniau, gali pasireikšti arba sustiprėti galvos skausmas. Pacientams, kuriems nustatytas mažas glutationo kiekis, paracetamolio vartojimas gali didinti metabolinės acidozės riziką. Dėl sudėtyje esančios laktozės šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. „Paracetamol Actavis" sudėtyje yra kviečių krakmolo. Tinka sergantiesiems celiakija. Šio vaistinio preparato negalima vartoti kviečiams alergiškiems pacientams (ši liga skiriasi nuo celiakijos). **Teksto peržiūros data** 2025-01-02. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-04-04. OTC-LT-00094

Moderni kapsulė nuo rėmens

3,99 €

ESCADRA
20 mg, 7 skrandyje neirios kietosios kapsulės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ezomeprazolas, 20 mg. **Terapinės indikacijos**: vaistas skirtas suaugusiųjų gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens ir skrandžio rūgšties regurgitacijos) trumpalaikiam gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas**: rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 kapsulė) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, kapsules gali prireikti vartoti 2–3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Simptomams visiškai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Jeigu per 2 savaičių nepertraukiamą gydymą simptomai neišnyksta, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Nėra tinkamų „Escadra" vartojimo rekomendacijų jaunesnių kaip 18 metų vaikų populiacijoje indikacijai „trumpalaikis gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens ir rūgšties regurgitacijos) gydymas". Kapsulių negalima kramtyti ar smulkinti. Kapsules galima atidaryti ir granules išmaišyti pusėje stiklinės negazuoto vandens. **Kontraindikacijos**: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pakeistiems benzimidazolams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Ezomeprazolo negalima vartoti kartu su nelfinaviru. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės**: pacientus reikia informuoti, kad kreiptųsi į gydytoją, jeigu jie patiria didelį kūno svorio mažėjimą dėl nežinomų priežasčių, pasikartojantį vėmimą, disfagiją, vėmimą krauju ar meleną, arba jeigu įtariama ar diagnozuojama skrandžio opa, būtina ištirti, ar nėra piktybinės ligos, nes gydymas ezomeprazolu gali palengvinti jos simptomus ir uždelsti diagnozės nustatymą; jeigu jie anksčiau sirgo skrandžio opa arba patyrė virškinimo trakto operaciją; jeigu jiems 4 savaites arba ilgiau buvo taikomas nepertraukiamas simptominis nevirškinimo arba rėmens gydymas; jeigu jie serga gelta arba sunkia kepenų liga; jeigu jie yra vyresni kaip 55 metų ir turi naujų arba neseniai pakitusių simptomų. Pacientai, kurių pasikartojantys nevirškinimo ar rėmens simptomai ilgalaikiai, turi reguliariais intervalais lankytis pas savo gydytoją. Kaip ilgalaikio profilaktinio vaistinio preparato „Escadra" pacientai neturi vartoti. Pacientai, kuriems reikia atlikti endoskopiją ar ureazės kvėpavimo testą, turi pasitarti su savo gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistinį preparatą. Ezomeprazolo skirti kartu su atazanaviru nerekomenduojama. Ezomeprazolo derinimas su klopidogreliu nepatartinas. Kitų PSI arba H2 receptorių blokatorių kartu su ezomeprazolu pacientams vartoti negalima. „Escadra" sudėtyje yra sacharozės. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems yra fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2025.04.07.

4,99 €

ALMAGEL A, geriamoji suspensija, 170 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

5 ml geriamosios suspensijos yra 340 mg aliuminio hidroksido (atitinka 218 mg aliuminio oksido), 109 mg magnio hidroksido (atitinka 75 mg magnio oksido) ir 109 mg benzokaino. **Terapinės indikacijos.** Virškinimo trakto sutrikimų, susijusių su skrandžio rūgšties perteklium, tokių kaip rėmuo, rūgšties sukelti skrandžio negalavimai, skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, simptominis gydymas 14 m. arba vyresniems paaugliams ir suaugusiems žmonėms. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiesiems, atsižvelgiant į ligos sunkumą, 3–4 kartus per dieną (30 min. prieš valgį ir vakare prieš miegą) gerti po 1–3 pilnus dozavimo šaukštelius (1 šaukštelyje yra 5 ml). Jei yra dvylikapirštės žarnos opa ir kai kurių formų skrandžio opa (prievarčio opa), „Almagel A" galima gerti tarp valgymų. Prieš vaistų, dirginančių virškinimo traktą, vartojimą profilaktikai reikia išgerti 1–2 pilnus dozavimo šaukštelius „Almagel A". Vaistinio preparato rekomenduojama vartoti ne ilgiau kaip 12 parų. Jei inkstų funkcija sutrikusi, atsižvelgiant į sutrikimo laipsnį, suspensijos reikėtų gerti rečiau arba mažesnę dozę. Prieš vartojimą buteliuką reikia stipriai pakratyti. Preparato skiesti nerekomenduojama. Išgėrus suspensijos, 30 min. negalima gerti skysčių. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Fruktozės netoleravimas (nes sudėtyje yra sorbitolio). Hipofosfatemija. Sunkus inkstų funkcijos nepakankamumas (kreatinino klirensas yra mažesnis kaip 30 ml/min.). Alzheimerio liga. Pacientas jaunesnis nei 14 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Almagel A" nerekomenduojama vartoti, jei yra nuolatinis vidurių užkietėjimas, ūminio apendicito simptomų, metabolinė alkalozė, kepenų cirozė, sunkus stazinis širdies nepakankamumas, nėštumo toksikozė, opinis kolitas, divertikuliozė, kolostomija ar ileostomija, inkstų funkcijos sutrikimas, lėtinis viduriavimas. Vaistas gali sunkinti hemorojaus sukeltus negalavimus. Pagyvenusiems pacientams gali pasunkėti kaulų ir sąnarių ligos bei Alzheimerio liga. Vaistinio preparato vartoti ilgiau negu 2 savaites galima tik prižiūrint gydytojui. Sudėtyje yra parahidroksibenzoato darinių, kurie gali sukelti alerginių reakcijų, įskaitant uždelstas alergines reakcijas. Sudėtyje yra etanolio, dėl kurio pacientams, sergantiems kepenų, smegenų ligomis, epilepsija ir alkoholizmu, bei nėščioms moterims ir jaunesniems nei 14 m. vaikams gali atsirasti pažeidimų. „Almagel A" nepatariama vartoti kartu su alkoholiu ir maistinėmis rūgštimis (citrinų, acto ir kt.), nes jos neutralizuoja vaistinio preparato vietinį anestezinį poveikį. Tarp „Almagel A" ir kitokių vaistų vartojimo reikia daryti ne trumpesnę kaip 1–2 val. pertrauką. Dėl sudėtyje esančio benzokaino vartoti ilgiau kaip 10–12 parų nepatariama. Vaikams benzokainas gali sukelti methemoglobinemiją. **Teksto peržiūros data.** 2023-04-03. **Reklamos teksto parengimo data.** 2025-11. OTC-LT-00102

4,99 €

HEXORALETTEN N, 5 mg/1,5 mg, 16 kietųjų pastilių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje pastilėje yra 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido ir 1,5 mg benzokaino. **Terapinės indikacijos:** lokalus burnos ir ryklės infekcinių ligų, tokių kaip faringitas, stomatitas, gingivitas, simptomų slopinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: jei nepaskirta kitaip, sučiulpti po 1 kietąją pastilę keletą kartų per parą. Jei reikia, galima čiulpti po 1 kietąją pastilę kas 1–2 val., daugiausia 8 kietąsias pastiles per parą. 6–12 m. vaikams: jei nepaskirta kitaip, sučiulpti po 1 kietąją pastilę keletą kartų per parą. Jei reikia, galima čiulpti po 1 kietąją pastilę kas 1–2 val., daugiausia 4 kietąsias pastiles per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; sumažėjęs plazmos cholinesterazės kiekis; burnoje ar gerklėje yra žaizdų ar opų; jaunesni kaip 6 m. vaikai. **Specialūs įspėjimai:** jeigu sergate sunkia infekcine liga, pasireiškiančia aukšta temperatūra, galvos skausmu, vėmimu, būtina gydytojo konsultacija, ypač jei savijauta nepagerėja per 3 dienas. Jei yra burnos gleivinės epitelio defektų ar gleivinė lupasi, šio vaisto vartoti nereikėtų. Gali atsirasti dėmių ant burnos gleivinės ir dantų paviršiaus. Benzokainas gali sukelti methemoglobinemiją (pasireiškia odos, lūpų ir nagų guolių blyškumu, pilkumu ar melsvumu, galvos skausmu, svaiguliu, dusuliu, nuovargiu ir dažnu širdies plakimu). Kietosios pastilės gali sukelti užspringimo riziką. Šio vaisto reikia vartoti atsargiai, jeigu turite aspiracijos ir rijimo problemų. Vengti valgyti ar gerti iškart po pastilės vartojimo. „Hexoraletten N" sudėtyje yra aspartamo ir izomalto. Teksto parengimo data 2026-09. LT-HXA-2026-356628.

4,99 €

LORATIN EXPRESS, 10 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 10 mg loratadino. **Terapinės indikacijos:** simptominis alerginės slogos ir lėtinės idiopatinės dilgėlinės gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiesiems ir vyresniems negu 2 m. vaikams gerti po 1 tabletę per dieną. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas loratadinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nevartoti jaunesniems nei 2 m. arba sveriantiems mažiau kaip 30 kg vaikams. **Specialūs įspėjimai:** vaistą atsargiai reikia vartoti pacientams, kuriems yra sunkus kepenų veiklos sutrikimas. „Sandoz Pharmaceuticals d.d." filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2601069675. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

Sloguojant

3,75 €

GALAZOLIN
0,05 % nosies lašai, tirpalas, 10 ml
0,1 % nosies lašai, tirpalas, 10 ml

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliojoi medžiaga: ksilometazolino hidrochloridas. Indikacijos: nosies gleivinės paburkimo mažinimas peršalus ar susirgus alergine sloga, nosiaryklės gleivinės paburkimo mažinimas, gydant vidurinės ausies uždegimą. Dozavimas: 2–6 metų vaikams į kiekvieną nosies landą lašinti po 1–2 lašus 0,05 % koncentracijos tirpalo kas 8 val. Vyresniems negu 7 metų pacientams į kiekvieną nosies landą lašinti po 2–3 lašus 0,1% koncentracijos tirpalo kas 8–10 val. „Galazolin" vartoti ilgiau kaip 5–7 dienas negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, sausasis rinitas, uždaro kampo glaukoma. Specialūs įspėjimai: preparato negalima vartoti sergantiems lėtine ar vazomotorine sloga, jei jos gydymas užtrunka ilgiau negu dvi savaites. Atsargiai vartoti pacientams, kuriems negalima vartoti simpatikomimetikų. Nevartoti kartu su MAO inhibitoriais bei tricikliais antidepresantais.NB! Informacija vartotojui yra sutrumpinta. Reklamos teksto parengimo data: 2026 04 mėn.

IŠLAISVINS TAVO NOSĮ!

NUO 4,99 €

ACC

100 mg milteliai geriamajam tirpalui, 20 paketėlių **4,99 €**
20 mg/ml, geriamasis tirpalas, 100 ml **6,99 €**
200 mg, 20 šnypščiųjų tablečių **5,49 €**
200 mg milteliai geriamajam tirpalui, 20 paketėlių **5,49 €**
LONG, 600 mg, 6 šnypščiosios tabletės **4,99 €**
LONG, 600 mg, 10 šnypščiųjų tablečių **6,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ACC 100 mg milteliai geriamajam tirpalui, ACC 200 mg milteliai geriamajam tirpalui, ACC 20 mg/ml geriamasis tirpalas, ACC 200 mg šnypščiosios tabletės, ACC 600 mg šnypščiosios tabletės, acetilcisteinas. **Terapinės indikacijos:** gleivių skystinimas sergant ūminėmis ar lėtinėmis bronchų bei plaučių ligomis, kurių metu būna sutrikusi gleivių gamyba bei šalinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** 2–5 m. vaikams – 100 mg, 2 kartus per dieną; 6–14 m. vaikams – 200 mg, 2 kartus per dieną; vyresniems kaip 14 m. paaugliams – 600 mg acetilcisteino. Vartoti per burną. **Kontraindikacijos:** jaunesni nei 2 m. vaikai; „ACC Long" 600 mg šnypščiosios tabletės netinka jaunesniems nei 14 m. vaikams; padidėjęs jautrumas acetilcisteinui arba pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** bronchinė astma, skrandžio ar žarnų opaligė, padidėjęs jautrumas histaminui. „Sandoz Pharmaceuticals d.d." filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS26010169660. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

„ACC". PASIRŪPINSIME JŪSŲ KOSULIU.

5,99 €

IBUMETIN EXPRESS, 400 mg, 20 minkštųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga: kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno. **Terapinės indikacijos:** suaugusiesiems ir paaugliams, sveriantiems ne mažiau kaip 40 kg (12 m. ir vyresniems): trumpalaikis lengvo ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip galvos, dantų, raumenų, sąnarių ar sukelto menstruacijų, malšinimas. Karščiavimo, susijusio su peršalimu, malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** įprasta vienkartinė dozė yra 1 kapsulė. Didžiausia paros dozė yra 1 200 mg ibuprofeno (3 kapsulės). Kapsulę reikia užsigerti stikline vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Anksčiau buvo pasireiškiusi acetilsalicilo rūgšties arba kitokių nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) sukelta astma, dusulys, sloga, patinimas ar (nieztintis) išberimas. Aktyvi arba buvusi pasikartojanti skrandžio opa arba kraujavimas iš skrandžio, su NVNU susijęs kraujavimas iš virškinimo trakto arba virškinimo trakto perforacija. Jei yra sunkus kepenų, širdies, inkstų funkcijos nepakankamumas, kraujavimas į smegenis arba kitas aktyvus kraujavimas, pasireiškia kraujo krešėjimo sutrikimų arba kitų kraujavimo sutrikimų, sunki skysčių stoka (sukelta vėmimo, viduriavimo arba nepakankamo skysčių vartojimo), paskutiniai trys nėštumo mėnesiai. Netinka vaikams ir paaugliams iki 12 m. **Specialūs įspėjimai:** specialių atsargumo priemonių reikia, jei padidėjęs kraujospūdis, sergate širdies, inkstų and kepenų liga, turite paveldimą kraujodaros sutrikimą (ūminę kintančią porfiriją), turite arba anksčiau esate turėję žarnyno problemų arba ligų (opinis kolitas, Krono liga), sergate astma, sistemine raudonąja vilklige arba mišria jungiamojo audinio liga, jei jums neseniai buvo atlikta didelės apimties chirurginė operacija, sergate šienlige, turite nosies polipų arba lėtinių obstrukcinių kvėpavimo sutrikimų. Ilgai vartojant skausmą malšinančius vaistus nuo galvos skausmo, jis gali pasunkėti. Tai pajutę arba įtardami, turėtumėte nustoti vartoti šį vaistą ir kreiptis į gydytoją. Dažnas (kelių rūšių) skausmą malšinančių vaistų vartojimas gali sukelti ilgalaikį sunkų inkstų pažeidimą. Ilgai vartojant šio vaisto, būtina reguliariai tirti kepenų ir inkstų veiklą bei atlikti bendrą kraujo tyrimą. Reikia vengti „Ibumetin Express" vartoti sergant vėjaraupiais ar kartu su kitais NVNU. Vaistai nuo uždegimo ir (arba) skausmo, tokie kaip ibuprofenas, gali būti susije su nedideliu širdies priepuolio ar insulto rizikos padidėjimu, ypač vartojant dideles dozes. Neviršykite rekomenduojamos dozės ar gydymo trukmės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu jums pasireiškia širdies problemų, įskaitant širdies nepakankamumą, krūtinės anginą, arba jeigu jums buvo širdies priepuolis, atlikta širdies kraujagyslių jungčių suformavimo operacija, diagnozuota periferinių arterijų liga arba buvo ištikęs bet kokios rūšies insultas; jūsų kraujospūdis yra padidėjęs, sergate cukriniu diabetu, nustatytas didelis cholesteroliu kiekis, buvo širdies liga sirgusių giminaičių arba giminaičių, kuriuos ištiko insultas, arba jeigu rūkote. Jeigu vartojate šio vaisto sirgdami infekcine liga ir jūsų infekcijos simptomai nepraeina arba pasunkėja, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Buvo pranešta apie alerginės reakcijos į šį vaistą požymius, įskaitant kvėpavimo sutrikimus, veido ir kaklo srities patinimą, krūtinės skausmą. Gydant ibuprofenu buvo pranešta apie sunkias odos reakcijas, įskaitant eksfoliacinį dermatitą, daugiaformę eritemą, Stivenso-Džonsono sindromą, toksinę epidermio nekrolizę, vaisto sukeltą reakciją su eozinofilija ir sisteminiais simptomais, ūminę generalizuotą egzantemine pustuliozę. Jei pastebėjote bet kurį sunkių odos reakcijų ar alergijos simptomų, nutraukite „Ibumetin Express" vartojimą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Vaisto negalima vartoti, jei nustatytas paveldimas sutrikimas – visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pirmuosius 6 nėštumo mėnesius vartoti negalima, nebent tai neabejotinai būtina ir taip pataria gydytojas. Teksto parengimo data 2025-06-03.

DRĖKINAMIEJI AKIŲ LAŠAI

-40 %

STARAZOLIN

MEDICINOS PRIEMONĖS

Drėkinamojo, raminamojo ir apsauginio poveikio akių lašai.

„Starazolin sausoms ir sudirgusioms akims" (be konservantų) – akių lašai, skirti padėti sumažinti simptomus, esant lengvam ar vidutinio sunkumo sausų akių sindromui ir (arba) sudirgintam akies paviršiui. Jie greitai palengvina nemalonius pojūčius, tokius kaip sausumas, smėlio pojūtis, niežėjimas, ašarojimas ar akių nuovargis, kuriuos sukelia darbas kompiuteriu, vėjas, saulė ar kontaktinių lęšių nešiojimas. **„Starazolin HydroForte"** (be konservantų) – intensyviai drėkinantys akių lašai, skirti vartoti esant sunkiam sausų akių sindromui, kai jaučiamas stiprus sausumas, aštrus dirginimas ar diskomfortas po chirurginių intervencijų, ilgai dirbant kompiuteriu ar esant sausam orui. **„Starazolin Lipid Multi Balance"** (be konservantų) – drėkinamieji akių lašai, skirti visų tipų sausų akių simptomams palengvinti. Jie atkuria ir stabilizuoja lipidinį ir kitus ašarų plėvelės sluoksnius, optimaliai drėkina akies paviršių. Ypač tinka, kai yra rytinis akių traiškanojimas, vokų sulipimas. **„Starazolin BlueLight Protect"** (be konservantų) – akių lašai, drėkinantys ir saugantys akis nuo UV spindulių ir mėlynosios ekranų šviesos poveikio. Tinka daug laiko praleidžiant prie ekranų arba lauke. **„Starazolin Protect Ectoine"** (be konservantų) – akių lašai, saugantys nuo akių alergijos.

„Starazolin sausoms ir sudirgusioms akims"; „Starazolin Lipid Multi Balance"; „Starazolin Hydrobalance PPH"; „Starazolin BlueLight Protect" ir „Starazolin Protect Ectoine" **gali vartoti žmonės, naudojantys visų tipų kontaktinius lęšius.** Prieš vartojant „Starazolin HydroForte" reikia išsiimti kontaktinius lęšius. Įprasta dozė: 1–2 lašai 3 kartus per parą į kiekvienos akies junginės maišelį.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

NUO GERKLĖS SKAUSMO IR UŽDEGIMO

NUO 4,99 €

DECATYLEN™

0,25 mg/0,03 mg, 20 kietųjų pastilių **4,99 €**
0,25 mg/0,03 mg, 40 kietųjų pastilių **9,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 pastilėje yra 0,25 mg dekvalinio chlorido, 0,03 mg cinchokaino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos**: burnos ir ryklės uždegimo (gingivito, opinio ir aftinio stomatito, faringito) vietinis gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas**: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams kas 2 val. lėtai sučiulpti po 1 pastilę, 4–12 m. vaikams kas 3 val. lėtai sučiulpti po 1 pastilę. Kai uždegimo simptomų sumažėja, vartoti po 1 pastilę kas 4 val. **Kontraindikacijos**: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai ar ketvirtiniams amonio dariniams (pvz., benzalkonio chloridui). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės**: „Decatylen" sudėtyje yra sorbitolio. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurius laisvinantį poveikį. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-01-13. DCTL-LT-00019

KAI REIKIA NE TIK MALŠINTI SIMPTOMUS, BET IR GYDYTI GERKLĖS SKAUSMĄ!

NUO SLOGOS

NUO 4,99 €

XYMELIN

1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml **4,99 €**
MENTHOL, 1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml **5,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Sudėtis: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. **Indikacijos**: susirgus peršalimo ligomis, paburkus nosies gleivinei arba pasireiškus nosies ančių uždegimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas**: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 10 metų paaugliams (XYMELIN MENTHOL atveju – vyresniems kaip 12 metų paaugliams) 1 įpurškimas į kiekvieną nosies landą 2–3 kartus per parą. **Kontraindikacijos**: alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, uždaro kampo glaukoma, sausasis nosies gleivinės uždegimas, atrofinis rinitas (XYMELIN MENTHOL atveju), jei hipofizės ar smegenų operacija atlikta pro nosį arba burną; XYMELIN MENTHOL: jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai**: Vartoti atsargiai, jei yra antinkščių navikas (feochromocitoma), sustiprėjusi skydliaukės veikla, sergate cukriniu diabetu ar sutrikęs šlapinimasis dėl padidėjusios prostatos. Sergant sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis ar ligomis, kurių metu susiaurėja kraujagyslės, vartoti tik su gydytojo leidimu. Ilgiau kaip 7 paras šio vaisto vartoti draudžiama. Dažnai ir ilgai vartojant vaisto gali atsinaujinti nosies gleivinės paburkimas, susilpnėti jo slopinimas ir atsirasti nosies užgulimas. Gali sukelti miego sutrikimų, galvos svaigimą, tremorą, širdies ritmo sutrikimą, aukštą kraujospūdį. XYMELIN nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 10 metų vaikams. XYMELIN MENTHOL: Pasitarti su gydytoju arba vaistininku, jei vartojate arba per paskutines dvi savaites vartojote vaistų nuo depresijos, vadinamų monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI). Reklamos teksto parengimo data: 28.03.2024 LT-XYME-2200004

NUGAROS, SĄNARIŲ SKAUSMAMS IR RADIKULITUI GYDYTI

5,99 €

KAPSIKAM®, vaistinis šildomasis tepalas, 50 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo yra 50 mg dimetilsulfoksido, 30 mg raceminio kamparo, 30 mg terpentino eterinio aliejaus, 20 mg benzilnikotinato, 2 mg nonivamido. **Terapinės indikacijos:** vietinis raumenų ir sąnarių skausmo malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** ant skaudamos vietos, naudojant aplikatorių, užtepama 1–3 g tepalo 2–3 kartus per parą, atsižvelgiant į skausmo intensyvumą. Norint ilgiau išlaikyti šildantį tepalo poveikį, ant skaudamos vietos reikia uždėti tvarstį. Didžiausia vienkartinė dozė – 3 g. Didžiausia paros dozė – 9 g. Po kiekvienos procedūros reikia nusiplauti rankas šaltu vandeniu su muilu. Vartoti ant odos. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Odos opos, žaizdos bei ligos, kai yra pažeistas odos paviršius. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Nerekomenduojama naudoti karštų procedūrų (pirties, vonios ir kt.) prieš ar iš karto po Kapsikam pavartojimo. Kapsikam tepalo negalima tepti ant pažeistos odos, atvirų žaizdų, egzemos pažeistų vietų. **Vietinis rinkodaros teisės turėtojo atstovas:** Grindeks Kalceks Lietuva UAB, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius. **Reklamos teksto parengimo data**2026-03-12.

MANO JĖGA JUDĖJIME!

NUO 2,99 €

HJERTEMAGNYL

150 mg, 30 plėvele dengtų tablečių **2,99 €**
150 mg, 90 plėvele dengtų tablečių **4,99 €**
75 mg, 100 plėvele dengtų tablečių **3,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: 1 tabletėje yra 75 mg arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties. **Indikacijos**: trombozės profilaktika, sergant išemine širdies liga, po miokardo infarkto, išeminio smegenų insulto ar praeinančiojo smegenų išemijos (kraujotakos sutrikimo) priepuolio. Vaistas slopina trombocitų (kraujo plokštelių) agregaciją (sukibimą), todėl jo vartojama krešulių, susidariusių iš sukibusių kraujo plokštelių, atsiradimo rizikai mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas**: vartoti per burną, užsigeriant stikline vandens; įprastinė dozė ilgalaikiam vartojimui yra 75 – 150 mg vieną kartą per parą. **Kontraindikacijos**: jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, padidėjęs jautrumas kitiems salicilatams; jei neseniai kraujavo į virškinamąjį traktą; yra polinkis į kraujavimą, ūminė pepsinė opa, sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, šlapime padaugėjo oksalatų, jeigu yra trys paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas; vaikams ir paaugliams, jaunesniems kaip 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės**: atsargiai vartoti, jei pacientas serga bronchų astma, šienlige, nosies polipais ar kita lėtine kvėpavimo takų liga, gydymui atsparia hipertenzija, podagra, esant gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stokai, sutrikusiai kepenų ir (ar) inkstų arba virškinimo trakto funkcijai, likus 10 parų iki chirurginės operacijos, senyvo amžiaus pacientams nepatartina ilgai vartoti dėl galimos kraujavimo iš virškinamojo trakto rizikos, esant vaikų ir paauglių virusinėms infekcijoms. Teksto parengimo data: 2022-04-07. LT-HJERT-2200001

NUO 4,99 €

STREPSILS INTENSIVE

8,75 mg, 16 kietųjų pastilių **4,99 €**
8,75 mg, 24 kietosios pastilės **9,99 €**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg flurbiprofeno. **Terapinės indikacijos**: trumpalaikis simptominis gerklės skausmo gydymas suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. amžiaus vaikams. **Vartojimo būdas ir dozavimas**: *suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams*: kas 3–6 val. (kai reikia) lėtai sučiulpti (leisti ištirpti burnoje, čiulpiant reikia judinti burnoje, kad būtų išvengta lokalaus dirginimo) po 1 kietąją pastilę. Per 24 val. galima suvartoti ne daugiau kaip 5 kietąsias pastiles. **Kontraindikacijos**: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; anksčiau buvusios acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) sukeltos padidėjusio jautrumo reakcijos (pvz., astma, bronchų spazmas, rinitas, angioneurozinė edema ar dilgėlinė); yra ar anksčiau buvo pepsinė opa ar kraujavimas iš opos (nustatyti du ar daugiau nesusijusių opaligės epizodų) bei žarnyno opos; anksčiau buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo perforacija, sunkus kolitas, kraujavimo ar kraujodaros sutrikimai, susiję su ankstesniu NVNU vartojimu; paskutinis nėštumo trimestras; sunkus širdies, inkstų, kepenų nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai**: reikia atsargiai vartoti pacientams, kurie serga sistemine raudonaja vilklige ir mišria jungiamojo audinio liga, serga tonzilitu (tonzilių uždegimu) ar mano, kad serga bakterijų sukelta gerklės infekcine liga, turi širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų, sirgo virškinimo trakto ligomis (pvz., opiniu kolitu, Krono liga), jei pasireiškia pirmosios odos reakcijos (išbėrimas, lupimasis, pūslių atsiradimas) arba kitokie alerginės reakcijos požymiai; nėščiosioms pirmuosius 6 mėnesius ar žindyvėms bei senyviems pacientams. Tokie vaistai gali būti susiję su nedideliu širdies priepuolio (miokardo infarkto) ar insulto rizikos padidėjimu. Vaisto sudėtyje yra gliukozės ir sacharozės (cukraus), j tai turėtų būti atsižvelgta sergant cukriniu diabetu. Jeigu pacientas yra alergiškas (alergiška) kviečiams (ši liga skiriasi nuo celiakijos), šio vaisto vartoti negalima. Sudėtyje esantys citralis, citronelolis, d-limonenas, farnezolis, geraniolis ir linalolis gali sukelti alerginių reakcijų, sieros dioksidas gali sukelti sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų ir bronchų spazmą, butilhidroksianizolas gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivinę. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2026-09-10.

IKI -40 %

MICROLIFE

BP B2 BASIC, automatinis kraujospūdžio matuoklis ~~79,99~~ **42,59 € -40 %**
BP B3 COMFORT PC, automatinis kraujospūdžio matuoklis ~~89,99~~ **53,99 € -40 %**
BP B6 CONNECT, automatinis kraujospūdžio matuoklis ~~99,99~~ **59,99 € -40 %**
NEB 200, inhaliatorius ~~72,39~~ **43,43 € -40 %**
NEB 400, inhaliatorius, meškiukas ~~79,99~~ **47,99 € -40 %**
OXY 300, pulsoksimetras ~~49,99~~ **32,49 € -35 %**
NC 200, skaitmeninis bekontaktis termometras ~~47,99~~ **28,79 € -40 %**

MEDICINOS PRIETAISAI
„MICROLIFE“ INOVATYVIOS TECHNOLOGIJOS

NUO 2,99 €

BRONTEX

15 mg/5 ml, sirupas, 100 ml **4,49 €**
30 mg, 20 tablečių **2,99 €**
60 mg šnypščiosios tabletės, 10 tablečių **4,99 €**
7,5 mg/ml, geriamieji lašai, tirpalas, 100 ml **5,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 5 ml sirupo yra 15 mg, 1 tabletėje yra 30 mg, 1 ml tirpalo (14-oje lašų) yra 7,5 mg, 1 šnypščiojoje tabletėje yra 60 mg ambroksolio hidrochlorido. **Terapinės indikacijos**: kvėpavimo takų sekreto skystinimas pacientams, sergantiems ūmine arba lėtine bronchų ar plaučių liga, kurios metu sutrinka sekreto išskyrimas ir šalinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas**: 2–5 m. vaikams – 3 kartus per parą po 7,5 mg ambroksolio (1 ml lašų arba 2,5 ml sirupo); 6–12 m. vaikams – 2–3 kartus per parą po 15 mg (2 ml lašų arba 5 ml sirupo, arba po ½ tabletės); suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams – 2–3 kartus per parą po 30 mg (4 ml lašų arba 10 ml sirupo, 1 tabletę arba ½ šnypščiosios tabletės) arba inhaliuoti lašus 1–2 kartus per parą po 15–22,5 mg (po 2–3 ml lašų). Sergantiesiems sunkiu inkstų veiklos nepakankamumu, dozę mažinti ir (arba) vartoti rečiau. Ambroksolio nepatariama vartoti ilgiau negu 4–5 paras. Jei simptomai negeręja arba po 5 parų pablogėja, reikalinga gydytojo konsultacija. Šnypščiąsias tabletes reikia ištirpinti stiklinėje vandens. **Kontraindikacijos**: „Brontex“ (visų formų) negalima vartoti jaunesniems kaip 2 m. vaikams, tablečių – jaunesniems kaip 6 m. vaikams, šnypščiųjų tablečių – jaunesniems kaip 12 m. vaikams. „Brontex“ negalima vartoti, jei padidėjęs jautrumas ambroksoliui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės**: vartoti atsargiai, jei sutrikusi bronchų motorika ir padidėjusi gleivių sekrecija, sutrikusi inkstų veikla, sergant sunkia kepenų liga, buvus pepsinei opai, nustačius fruktozės netoleravimą, sergantiesiems cukriniu diabetu (vartojant siropą). Pasireiškus odos išbėrimui (kartais susijusiam su pūslelėmis ar gleivinės pažeidimais), reikia nedelsiant nutraukti gydymą. „Brontex“ tablečių (dėl sudėtyje esančios laktozės) ir šnypščiųjų tablečių (dėl sudėtyje esančių laktozės ir maltodekstrino) negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. „Brontex“, 60 mg, šnypščiųjų tablečių sudėtyje esantis benzilo alkoholis gali sukelti alerginių reakcijų. Vartoti atsargiai nėščioms moterims ir žindyvėms. Dėl sudėtyje esančio sorbitolio šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas įgimtas fruktozės netoleravimas. **Tekstų peržiūros data**: „Brontex“, 15 mg/5 ml, sirupas – 2024-07-22; „Brontex“, 30 mg, tablečės, ir „Brontex“, 7,5 mg/ml, geriamieji lašai, tirpalas – 2021-08-02; „Brontex“, 60 mg, šnypščiosios tabletės – 2022-10-29. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-07. BRO-LT-00061

LĖTINIAM HEPATITUI, KEPENŲ CIROZEI IR TOKSINIAM KEPENŲ PAŽEIDIMUI PAPILDOMAI GYDYTI

7,99 €

CARSIL

110 mg, 30 kietųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARTAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: veiklioji medžiaga – silimarinas. 1 kietojoje kapsulėje yra 200–275 mg margainių vaisių (*Silybum marianum (L.) Gaertn., fructus*) rafinuoto ir standartizuoto sausojo ekstrakto (35–50:1), atitinkančio 110 mg silimarino, išreikšto silibininu. Ekstrakcijos tirpiklis – 98 % (V/V) metanolis. **Indikacijos:** papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms, sergantiems lengva arba vidutinio sunkumo kepenų liga, rekomenduojama vartoti po 1 kietąją kapsulę 2–3 kartus per parą. Gydymo kurso trukmė turėtų būti ne trumpesnė kaip 3 mėnesiai. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. **Kontraindikacijos:** preparato „Carsil“ vartoti negalima, jeigu yra alergija silimarinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, taip pat astrinių ar graižažiedžių (*Asteraceae* / *Compositae*) šeimos augalams. **Specialūs įspėjimai:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Carsil“. Jeigu sergate diabetu ar yra sumažėjusi gliukozės koncentracija kraujyje, vartojant „Carsil“ gali sumažėti gliukozės koncentracija kraujyje. Vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems nei 18 metų paaugliams, nes duomenų apie šio preparato saugumą ir veiksmingumą nepakanka. Kitų vaistų vartojimas: duomenų apie „Carsil“ sąveiką su kitais preparatais nėra. „Carsil“ vartojimas su maistu ir gėrimais: duomenų nėra. Nėštumas ir žindymo laikotarpis: jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Klinikinių duomenų apie silimarino vartojimą nėštumo metu nėra, taip pat nežinoma, ar silimarino patenka į motinos pieną.

KAD JŪSŲ KEPENYS BŪTŲ SVEIKOS!

VITAMINO D3 ŠALTINIS

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**

OLIDETRIM®

2000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių **10,39 €**
4000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių **14,99 €**
2000 TV, 60 minkštųjų kapsulių **11,49 €**

MAISTO PAPILDAI

Imunitetui – vitaminas D 2000 ir 4000 TV.
Širdžiai, smegenims – DHR+ EPR omega-3 rūgštys.
Kaulams ir raumenims- vitaminai D ir K2.
Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Omega-3 riebalų rūgštys DHR (dokozaheksaeno) ir EPR (eikozapentaeno) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą. Siekiant maksimliai padidinti vitamino D papildo naudą, juos naudinga vartoti kartu su vitaminu K2.

GERIAUSIA GYNYBA – STIPRUS IMUNITETAS.

NUO 1,99 €

NUROFEN, 200 mg, 12 tablečių **1,99 €**
NUROFEN FORTE, 400 mg, 12 tablečių **2,99 €**
NUROFEN FORTE EXPRESS, 400 mg, 12 tablečių **3,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

NUROFEN dengtoje tabletėje yra 200 mg ibuprofeno. **NUROFEN FORTE** ir **NUROFEN FORTE EXPRESS** dengtoje tabletėje yra 400 mg ibuprofeno. **Terapinės indikacijos.** Trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių, mėnesinių sukelto skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. **NUROFEN dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams pradinė dozė yra 2 tabletės, užgeriant vandeniu. Po to, jei reikia, gerti po 1-2 tabletes kas 4 valandas. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 6 tabletes (1200 mg). **NUROFEN FORTE** ir **NUROFEN FORTE EXPRESS dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams pradinė dozė yra 1 tabletė, užgeriant vandeniu. Po to, jei reikia, gerti po vieną tabletę kas 8 valandas. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 3 tabletes (1200 mg). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai; jei praeityje yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijų (astma, rinitas, angioneurozinis pabrinkimas, dilgėlinė); sunkus kepenų, inkstų, širdies nepakankamumas; paskutinis trijų nėštumo mėnesių laikotarpis; esama ar buvusi pepsinė opa (du ar daugiau atskirų įrodytų išopėjimo ar kraujavimo epizodų); buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; kraujavimas į smegenis, virškinimo traktą arba kitoks kraujavimas; jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai.** Reikia atsargiai vartoti pacientams, kuriems yra sisteminė raudonoji vilkligė; anksčiau buvo padidėjęs kraujospūdis ir (arba) širdies nepakankamumas; jei yra nesunkus inkstų pakenkimas ar inkstų funkcijos pablogėjimas; jei yra nesunkūs kepenų funkcijos sutrikimai; pacientams, kurie sirgo opiniu kolitu, Krono liga; pacientams, kurie vartoja kraują skystinančių vaistinių preparatų bei vaistų, galinčių padidinti išopėjimo ar kraujavimo pavojų. Gydant ibuprofenu buvo pranešta apie sunkias odos reakcijas, įskaitant eksfoliacinį dermatitą, daugiaformę eritemą, Stivenso-Džonsono sindromą, toksinę epidermio nekrolizę, vaisto sukeltą reakciją su eozinofilija ir sisteminiais simptomais (VRESS), ūminę generalizuotą egzantemine pustuliozę (ŪGEP), kuri gali būti pavojinga gyvybei arba mirtina. Jei atsiranda šių reakcijų požymių ir simptomų, ibuprofeno vartojimą reikia nedelsiant nutraukti. Šie vaistai gali būti susiję su nedideliu širdies priepuolio ("miokardo infarkto") ar insulto pavojaus padidėjimu. Šie vaistiniai preparatai gali maskuoti infekcijos simptomus, dėl to gali būti vėluojama pradėti tinkamą gydymą, o tai gali pabloginti infekcijos gydymo rezultatus. Šių vaistų negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Kiekvienoje tabletėje yra natrio, būtina atsižvelgti, jei kontroliuojamas natrio kiekis maiste. Reklamos tekstas parengtas 2026-09-10.

NUO 5,99 €

DUPHALAC
FRUIT, 667 mg/ml, geriamasis tirpalas, 500 ml **11,99 €**
FRUIT, 667 mg/ml, geriamasis tirpalas, 20 x 15 ml **9,99 €**
667 mg/ml, geriamasis tirpalas, 200 ml / 500 ml / 1000 ml **5,99 / 11,99 / 19,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 ml geriamojo tirpalo yra 667 mg laktuliozės (skystosios laktuliozės 667 g/l pavidalu). **Terapinės indikacijos.** „Duphalac" ir „Duphalac Fruit" vartojamividurių užkietėjimui (reti žarnų judesiai, kietos ir sausos išmatos) gydyti, pvz., sergant hemorojumi, po storosios žarnos ar išangės operacijos. „Duphalac" vartojamas kepenų encefalopatijai (kepenų liga, sukelianti sumišimą, tremorą, sumažėjusįsąmoningumo lygį, įskaitant komą) gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Vartoti per burną. „Duphalac" ir „Duphalac Fruit" geriamuosius tirpalus galima vartoti truputį atskiestus ar neatskiestus. 1 dozę reikia nuryti visą iškart, ilgai nelaikant burnoje. 1 kartą per parą vartojamą dozę reikia išgerti tuo pačiu dienos metu, pvz., per pusryčius.Vartojant „Duphalac" ir „Duphalac Fruit", tiekiamus buteliukuose, gali būti naudojama matavimo taurelė. Suaugusiems žmonėms ir paaugliams pradinė paros dozė yra 15–45 ml, palaikomoji paros dozė – 15–30 ml. 7–14 m. vaikams pradinė paros dozė – 15 ml, palaikomoji paros dozė – 10–15 ml. 1–6 m. vaikams pradinė paros dozė – 5–10 ml, palaikomoji paros dozė – 5–10 ml. Kūdikiams iki 1 m. pradinė paros dozė – iki 5 ml, palaikomoji paros dozė – iki 5 ml. Nenurodžius gydytojui ir atidžiai neprižiūrint, vaikams (iki 14 m. amžiaus) „Duphalac" ir „Duphalac Fruit" vartoti negalima. „Duphalac" dozavimas, esant kepenų encefalopatijai: suaugusiesiemspradinė dozė yra 30–45 ml geriamojo tirpalo 3–4 kartus per parą. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Galaktozemija. Virškinimo trakto nepreainamumas, virškinimo trakto prakiurimas ar prakiurimo rizika, uždeginimė žarnyno liga. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti „Duphalac" ar „Duphalac Fruit", jei Jums skauda pilvą dėl nepaaiškinamų priežasčių, jei negalite suviršinkti pieno cukraus (laktozės), jei sergate cukriniu diabetu. Pasitarkite su gydytoju prieš pradėdami vartoti „Duphalac Fruit", jei Jums yra virškinimo trakto ir širdies sindromas arba *Roemheld* sindromas. Kai vartojama daug didesnė dozė kepenų encefalopatijai gydyti, būtina atsižvelgti į tai, kad pacientas serga diabetu. Ilgą laiką vartojant nepritaikytomis dozėmis ir netinkamai vartojant vaisto, gali pasireikšti viduriavimas ir elektrolitų pusiausvyros sutrikimai. Reikia atsižvelgti į tai, kad gydymo metu gali sutrikti tuštinimosi refleksas. „Duphalac" ir „Duphalac Fruit" sudėtyje yra laktozės, galaktozės, fruktozės, „Duphalac" sudėtyje yra sulfitų. „Duphalac" vartoti negalima, jei yra: galaktozės arba fruktozės netoleravimas, visiškas laktazės trūkumas, gliukozės-galaktozės malabsorbcija. „Duphalac Fruit" vartoti negalima, jei yra: galaktozės arba fruktozės netoleravimas, *Lapp* laktazės trūkumas, gliukozės-galaktozės malabsorbcija. Pacientai, netoleruojantys laktozės, laktuliozę turi vartoti atsargiai. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-09-23.

-40 %

MAGNIS + B6 COMPLEX, 30 kapsulių ~~14,99~~ **8,99 €**
MAGNIS + B6 SUPERIOR, 30 kapsulių ~~13,99~~ **8,39 €**

MAISTO PAPILDAI

„Magnis + B6 complex" sudėtyje magnis yra magnio oksido pavidalu. **„Magnis + B6 superior"** naudojama ypatinga magnio forma – dvi magnio druskos (magnio oksidas ir magnio citratas), kurios organizme išlieka ilgiau, nes suyra skirtingu metu. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų ir nervų sistemos veiklą. Magnis ir vitaminas B6 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją bei mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

NUO 6,99 €

BRONCHIPRET®, 20 tablečių **6,99 €**
BRONCHIPRET® TI, geriamasis tirpalas, 100 ml **7,99 €**
BRONCHIPRET® TI INTENSE, geriamasis tirpalas, 50 ml **8,99 €**

NERECEPTINIAI AUGALINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Terapinės indikacijos. „Bronchipret® TI" yra augalinis vaistas, skirtas ūminio bronchito sukelto drėgno kosulio priepuoliams retinti ir atsikosėjimui gerinti. **„Bronchipret® TI intens"** –augalinis vaistas, skirtas atsikosėjimui lengvinti drėgno kosulio atveju, suaugusiesiems ir paaugliams nuo 12 metų. **„Bronchipret®"** tabletės yra augalinis vaistas, skirtas vartoti esant drėgnam kosuliui, siekiant palengvinti klampių gleivių atkosėjimą. **Veikliosios medžiagos ir stiprumas:** 1 g(atitinka 0,89 ml),„Bronchipret˙TI" tirpalo yra 150 mg vaistinių čiobrelių žolės skystojo ekstrakto (1:2–2,5), 15 mg gebenių lapų skystojo ekstrakto (1:1); 1 ml (atitinka 1,09 g) „Bronchipret˙TI intens" geriamojo tirpalo yra 490 mg čiobrelių žolės skystojo ekstrakto (1:2–2,5), 49 mg gebenių lapų skystojo ekstrakto (1:1); vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 60 mg raktažolių šaknų sausojo ekstrakto ir 160 mg vaistinių čiobrelių žolės sausojo ekstrakto. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Bronchipret˙ TI" 1–5 m. amžiaus vaikams gerti po 3,2 ml, 6–11 m. amžiaus vaikams – po 4,3 ml, nuo 12 m. ir suaugusiesiems – po 5,4 ml 3 kartus per parą. „Bronchipret˙TI intens"suaugusiesiems ir paaugliams nuo 12 m. gerti po 1,85 ml 3 kartus per parą; „Bronchipret˙" tabletes suaugusiesiems gerti po 1 tabletę 3 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas gebenėms, raktažolėms, čiobreliams ar kitiems notrelinių (lūpažiedžių) *Lamiaceae (Labiatae)* ar aralijinių *(Araliaceae)* šeimos augalams, beržams, kiečiams, salierams arba kitoms preparato sudedamosioms dalims. „Bronchipret˙TI intens" geriamojo tirpalo draudžiama vartoti jaunesniems kaip 2 m. vaikams.**Specialūs įspėjimai:** jeigu simptomai išlieka ilgiau nei 1 savaitę ar vaisto vartojimo metu pasunkėja arba jeigu prasideda dusulys, karščiavimas, o skrepliai tampa pūlingi arba juose atsiranda kraujo priemaišų, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Rekomenduojama imtis atsargumo priemonių pacientams, sergantiems gastritu arba skrandžio opa. „Bronchipret˙TI" negalima vartoti jaunesniems nei 1 m. amžiaus vaikams. Jeigu 1–4 m. vaikams pasireiškia nuolatinis arba pasikartojantis kosulys, reikia kreiptis į gydytoją. „Bronchipret˙" tabletės neskirtos vaikams ir jaunesniems nei 18 m. paaugliams, nes jų veiksmingumas dar neištirtas. „Bronchipret˙ TI intens" geriamasis tirpalas nėra skirtas 2–12 m. vaikams, nes kitos farmacinės formos gali būti tinkamesnės šiai populiacijai. Tekto parengimo data 2026-08-07.

„BRONCHIPRET®" – KOSULĮ MALŠINANTI JĖGA!

-30 %

NEOBIANACID

MEDICINOS PRIEMONĖS

Malšina refliuksą, rėmenį, skrandžio skausmą, virškinimo sutrikimus.
„NeoBianacid Pediatric" – vaikams nuo 1 metų amžiaus.
„NeoBianacid" tabletės (mėtų arba citrinų aromato) – vaikams nuo 6 metų ir suaugusiesiems.
Tinka vartoti nėštumo, žindymo metu.
100 % natūralus ir biologiškai skaidus produktas, kurio sudedamosios dalys yra iš ekologinių ūkių.
Gamintojas: „Aboca S.p.A. Società Agricola", Italija

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

NUO 9,99 €

NICORETTE
COOLMINT, 1 mg/išpurškime burnos gleivinės purškalas (tirpalas), 150 išpurškimų **22,99 €**
FRESHFRUIT, 2 mg (4 mg) vaistinė kramtomoji guma, 30 vienetų **9,99 €**
FRESHMINT, 2 mg (4 mg) vaistinė kramtomoji guma, 30 vienetų **9,99 €**
INVISIPATCH, 10 mg/16 h (15 mg/16 h; 25 mg/16 h) transderminis pleistras, 7 transderminiai pleistrai **24,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje gumoje yra 2 mg (4 mg) nikotino (rezinato pavidalu); viename pleistre yra 15,75 mg (23,62 mg; 39,37 mg) nikotino; kiekviename išpurškime (0,07 ml tirpalo) yra 1 mg nikotino. 1 ml tirpalo yra 13,6 mg nikotino. **Indikacijos:** vaistinė kramtomoji guma, transderminiai pleistrai: priklausomybei nuo tabako gydyti, lengvinant nutraukimo simptomus, kad būtų lengviau laikinai susilaikyti nuo rūkymo, o apsisprendus - mesti rūkyti; purškalas: priklausomybės nuo tabako gydymas, sumažinant potraukį nikotinui ir palengvinant nutraukimo simptomus, kurie atsiranda metant rūkyti staiga ar palaipsniui. Tikslas yra visam laikui nutraukti tabako vartojimą. „nicorette coolmint" geriausia vartoti kartu su elgesio palaikymo programa. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** paprastai pakanka kramtyti 8–12 tam tikro stiprumo vaistinių kramtomųjų gumų per dieną. Pleistrą reikia priklijuoti ant odos ryte, o vakare jį nuimti. Purškalo reikia įsipurkšti 1–2 vaisto dozes tuo laiku, kai paprastai rūkoma, arba jeigu jaučiamas poreikis rūkyti. Galima vartoti iki 4 ipurškimų per valandą. Negalima purkšti daugiau kaip 2 išpurškimus iš karto, per 24 valandas neviršyti 64 ipurškimų (4 purškimai per valandą, 16 valandų periode). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas nikotinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Gumos negalima kramtyti vaikams iki 12 metų. Purškalo negalima vartoti jaunesniems kaip 18 m. pacientams, nerūkantiems pacientams. **Specialūs įspėjimai:** prieš vartodami „nicorette", pasitarkite su gydytoju, jeigu turėjote širdies infarktą, insultą, sergate nestabilia arba progresuojančia krūtinės anginą, sunkiomis širdies aritmijomis, yra nekontroliuojama hipertenzija. Pacientai, sergantys cukriniu diabetu, pradėję naudoti nikotino pakeičiamąją terapiją, turi atidžiau sekti savo cukraus kiekį kraujyje. Galima rizika ir laukiama gydymo nauda turi būti apsvarstyta gydytojo, jeigu pacientai serga inkstų ir kepenų nepakankamumu, feochromocitoma ir nekontroliuojama hipertiroze, virškinimo trakto ligomis. Jeigu sergate žvyneline, lėtiniu dermatitu ar dilgėline, neklijuokite „nicorette" pleistro ant pažeistos odos. Norint išvengti nudegimų rizikos, pleistrą reikia nuimti prieš atliekant magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą. Kramtomoji guma gali prilipti prie dantų protezo ir jį sugadinti. Kramtomųjų gumų ir purškalo sudėtyje yra butilhidroksitolueno, kuris gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivinę. Kramtomųjų gumų sudėtyje yra ksilitolio, kuris gali laisvinti vidurius. Reklamos teksto parengimo data: 2025 04. LT-NIC-2025-153229

PERŠALIMO IR GRIPO SIMPTOMAMS LENGVINTI

NUO 5,99 €

GRIPEX

325/30/10 mg, 12 plėvele dengtų tablečių **5,99 €**
325/30/10 mg, 24 plėvele dengtos tabletės **8,99 €**
500/30/15 mg, 10 plėvele dengtų tablečių **6,99 €**
500/30/15 mg, 20 plėvele dengtų tablečių **9,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje „Gripex 500/30/15 mg" yra 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido, 15 mg dekstrometorfano hidrobromido. 1 tabletėje „Gripex 325/30/10 mg" yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido, 10 mg dekstrometorfano hidrobromido. **Terapinės indikacijos:** peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.**„Gripex 500/30/15 mg" suaugusiesiems po 1–2 tabletes 3–4 kartus per parą. „Gripex 325/30/10 mg" suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams įprasta dozė yra 2 tabletės 3–4 kartus per parą, kas 4–6 val. tada, kada reikia. Neviršyti vienkartinės 2 tablečių dozės. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. **Kontraindikacijos:** negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šių vaistų sudedamajai medžiagai; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; smarkiai padidėjęs kraujospūdis; chroniniš alkoholizmas. Negalima vartoti kartu su monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI) arba anksčiau negu 2 savaites baigus juos vartoti. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** esant sutrikusiai kepenų funkcijai, sergant alkoholizmu, sutrikus mitybai yra didesnis kepenų toksinio pažeidimo pavojus. Gydantis šiais vaistais, nepatartina vartoti alkoholio. Jeigu per 3 dienas jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Reklamos tekste parengimo data 2025-03-31.

„GRIPEX". VEIKIU!

NUO NUO

NUO 1,99 €

IBUMETIN

200 mg, 10 plėvele dengtų tablečių **1,99 €**
400 mg, 10 plėvele dengtų tablečių **2,99 €**
400 mg, 20 plėvele dengtų tablečių **3,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliojoi medžiaga: 1 tabletėje yra 200 mg arba 400 mg ibuprofeno. **Indikacijos**: trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip galvos, dantų, raumenų, sąnarių ar sukelto menstruacijų, malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas**: suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams įprasta vienkartinė dozė yra 1-2 tablete(s) IBUMETIN 200 mg arba 1 tabletė IBUMETIN 400 mg. Didžiausia paros dozė yra 1200 mg. Tabletę reikia užsigerti stikline vandens. **Kontraindikacijos**: padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, acetilsalicilo rūgščiai arba kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU). Ligonis anksčiau sirgo acetilsalicilo rūgšties arba kitokių NVNU sukelta astma, angioneurozine edema, dilgėline, rinitu ar kitokia padidėjusio jautrumo reakcija. Aktyvi arba buvusi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, opinis kolitas, kraujavimas iš virškinimo trakto ar kitoks kraujavimas, sunkus kepenų, širdies, inkstų funkcijos nepakankamumas, hemoraginė diatezė, paskutinių 3 nėštumo mėnesių ar žindymo laikotarpis. Vaikams ir paaugliams iki 12 m. vartoti negalima. **Specialūs įspėjimai**: specialių atsargumo priemonių reikia, jei inkstų, kepenų arba širdies funkcija yra sutrikusi, yra buvę virškinimo trakto pažeidimų, sutrikęs kraujo krešėjimas arba vartojami antikoaguliantai, jei vartojama kitų NVNU ar vaistinių preparatų, galinčių padidinti skrandžio opos susidarymo arba kraujavimo pavojų, diuretikų ar nefrotoksinį poveikį turinčių vaistinių preparatų, sergama cukriniu diabetu, raudonaja vilklige ar kitomis kolagenozėmis, Krono liga, opiniu kolitu, hipertenzija, periferiniu arterijų liga, galvos smegenų kraujagyslių liga, astma, šienlige, yra nosies polipų ar lėtinių infekcinių kvėpavimo takų ligų, senyviems žmonėms. Prasidėjus kraujavimui, atsiradus opų ar odos reakcijų, vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir kuo skubiau kreiptis į gydytoją. Negalima vartoti, jei nustatytas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pirmuosius 6 nėštumo mėnesius vartoti negalima, nebent tai neabejotinai būtina ir taip pataria gydytojas. Tekste parengimo data: 2023-03-01.

ŪMINIO BRONCHITO SIMPTOMAMS MAŽINTI, ATSIKOSĖJIMUI LENGVINTI

9,99 €

UMCKALOR®

geriamieji lašai (tirpalas), 20 ml
20 mg, 15 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIAI AUGALINIAI VAISTAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas. Lašai. 1 g (= 0,975 ml) tirpalo yra 800 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto (1:8-10). Ekstrakcijos tirpiklis: 11 % (m/m) etanolis. Tabletės. 1 plėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg Pelargonium sidoides DC., radix (pelargonijų šaknų) skystojo ekstrakto, džiovinto (1 : 8 - 10). Ekstrakcijos tirpiklis: 11% (m/m) etanolis. **Indikacijos:** „Umckalor" yra augalinis vaistas, skirtas ūminio bronchito simptomams mažinti, atsikosėjimui lengvinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Lašai. Jei gydytojas nepaskyrė kitaip, įprasta dozė yra: a) suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 metų amžiaus paaugliams gerti po 30 lašų 3 kartus per dieną, b) vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus gerti po 20 lašų 3 kartus per dieną, c) mažiems vaikams nuo 1 iki 5 metų gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną. Lašus gerti su nedideliu vandens kiekiu ryte, dieną ir vakare. Tabletės. Suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 metų amžiaus paaugliams vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Vartoti nekramtant, užgeriant nedideliu kiekiu vandens. **Kontraindikacijos.** Alergija Pelargonium sidoides ekstraktui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. (Papildomai lašams) jeigu sergate sunkiomis kepenų ligomis, kadangi nėra pakankamai patirties. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Umckalor": jeigu turite bet kokio pobūdžio kepenų veiklos sutrikimų. Jeigu Jūsų būklė nepagerėja per 7 dienas, temperatūra laikosi kelias dienas, pasireiškia bet kokio pobūdžio kepenų veiklos sutrikimas, vargina dusulys arba atkostite skrepliu su krauju, kreipkitės į gydytoją. (Papildomai tabletems) Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Reklamos teksto parengimo data** 2025.01.31

KRAUJOTAKAI IR ATMINČIAI

11,99 €

GINKOBIL, 120 mg, 40 kietųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 120 mg rafinuoto ir kiekybiškai įvertinto ginkmedžių lapų sausojo ekstrakto. **Indikacijos:** lengvo ir vidutinio smegenų kraujotakos nepakankamumo, pasireiškiančio susilpnėjusia atmintimi ir dėmesio koncentracija, spengimu ar ūžimu ausyse, svaiguliu ar galvos skausmu, simptominiam gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** gerti po 1 kapsulę 2–3 kartus per dieną (atitinka 160–240 mg dienos dozę). **Kontraindikacijos:** vartoti negalima, jei yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Ginkobil" medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** kadangi dviskiaučių ginkmedžių lapų ekstrakto poveikis depresinei nuotaikai ir galvos skausmui, nesusijusiems su silpnaprotystės sindromu, kol kas nėra pakankamai ištirtas, medikamentu gydyti šiuos simptomus galima tik laikantis visų būtinų atsargumo priemonių. Tekste peržiūros data 2017-05-22

VEIKSMINGAI GERINA SUTRIKUSIĄ KRAUJOTAKĄ!

NUO SLOGOS

5,99 €

GALATHENAL

1 mg/50 mg/ml, nosies purškalas, 10 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARTAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido ir 50 mg dekspantenolio. **Terapinės indikacijos:** „Galathenal" skirtas suaugusiesiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) ir kaip pagalbinė priemonė odos bei gleivinės pažeidimams gydyti, nealerginės kilmės išskyroms iš nosies (vazomotoriniam rinitui) mažinti ir kvėpavimui per nosį palengvinti esant nosies užgulimui po nosies operacijos; nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu ir ūminiu prienosinių ančių uždegimu (rinosinusitu). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams – 1 purškalo tirpalo dozė į kiekvieną šnervę pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Dozavimas priklauso nuo individualaus paciento jautrumo ir klinikinio atsako. „Galathenal" negalima vartoti ilgiau kaip 7 paras, nebent gydytojas nurodė kitaip. Dėl vaikų gydymo trukmės reikia pasikonsultuoti su gydytoju. **Kontraindikacijos:** šio vaistinio preparato vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliosioms ar pagalbinėms medžiagoms; jeigu yra sausasis nosies gleivinės uždegimas (rhinitis sicca); po chirurginio posmegeninės liaukos pašalinimo per nosį (transsfenoidalinės hipofizektomijos) arba po kitų chirurginių intervencijų, pažeidžiančių smegenų dangalą; kūdikiams ir jaunesniems kaip 6 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Galathenal", jeigu esate gydomas monoaminooksidazės (MAO) inhibitoriais; jei yra padidėjęs akispūdis; jeigu sergate sunkia širdies ar kraujagyslių sistemos liga; jeigu yra antinkščių navikas; sergate cukriniu diabetu ar yra suaktyvėjusi skydliaukės veikla; jei yra padidėjusi prostata (prostatos hiperplazija). Reklamos teksto parengimo data 2026-02.

ATKEMŠA NOSĮ IR ATKURIA PAŽEISTĄ NOSIES GLEIVINĘ.

PAGALBA NUO RĖMENS

4,99 €

NEXMEZOL

20 mg, 14 skrandyje neirių tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje tabletėjeyra 20 mg ezomeprazolo. **Terapinės indikacijos:** vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refliukso simptomų gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti po 1 tabletę per parą bet kuriuo paros laiku, valgio metu arba nevalgius. Tablečių nekramtyti ir netraiškyti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ezomeprazolui (taip pat pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, omeprazolui) ar pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** sudėtyje yra sacharozės. „Sandoz Pharmaceuticals d.d." filialas, Upės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El.paštas: info.lithuania@sandoz.com. BS2601079720. Reklamos teksto parengimo data: 2026 01 07.

KOJŲ VENOMS

17,99 €

VELIOS, 1000 mg, 30 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliojo medžiaga, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra **1000 mg** mikronizuoto diosmino. **Terapinės indikacijos:** suaugusiųjų lėtinio veninės kraujotakos nepakankamumo simptomų gydymas, esant: apatinių galūnių venų varikozei, venų opoms, telangiektazijoms ir retikulinėms varikozėms ar venoms, sunkumui, nuovargiui, diskomfortui ar neramių kojų pojūčiui, kojų skausmui ar deginimo pojūčiui, šaltų kojų pojūčiui, naktiniam kojų mėšlungiui, apatinių galūnių patinimui, niežuliui, parestezijai (odos dilgčiojimui, badymui ar niežėjimui), odos eritemai ar cianozei. Suaugusiųjų paūmėjusio hemorojaus simptomų gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** lėtinio venų nepakankamumo simptominis gydymas:**1 tabletė per parą** valgio metu, vartoti bent kelias savaites. Ūminio hemorojaus simptominis gydymas: pirmąsias 4 dienas gerti 3 tabletes per parą, 3 vėlesnes dienas – po 2 tabletes per parą, gydymas turi būti trumpalaikis. Vartoti per burną. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija diosminui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** paūmėjus hemorojaus simptomams, reikia prisiminti, kad „Velios“ veikia tik simptomus ir turi būti vartojamas trumpai. Jei simptomai nepraeina, reikia atlikti tiesiosios žarnos tyrimą ir parinkti tinkamą gydymą. „Velios“ nėra veiksmingas gydant su staziniu širdies nepakankamumu susijusią edemą. „Velios“ plėvele dengtų tablečių turi nevartoti pacientai, kuriems yra širdies nepakankamumas. Kai sutrikusi kojų veninė kraujotaka, „Velios“ gydomąjį poveikį gali sustiprinti saulės bei ilgalaikio stovėjimo vengimas, tinkamo kūno svorio palaikymas, specialių kojinių nešiojimas. Kai apatinės kojų dalys patinusios dėl širdies, inkstų arba kepenų ligos, šis vaistas nepadeda. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „Velios“ sudėtyje yra saulėlydžio geltonojo dažalo (E110), kuris gali sukelti alerginių reakcijų. **Reklamos teksto parengimo data** 2026-03-23.

PAJUSK KOJŲ LENGVUMĄ.

NORMALIZUOJA ŽARNYNO VEIKLĄ

NUO 6,99 €

LINEX
16 kietųjų kapsulių **6,99 €**
32 kietosios kapsulės **11,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje yra ne mažiau kaip 1,2 x 107 KSV liofilizuotų gyvybingų bakterijų (*Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium infantis*, *Enterococcus faecium*). **Terapinės indikacijos:** viduriavimui, pilvo pūtimui ar kitokiam virškinimo sutrikimui gydyti kaip pagalbinė priemonė. *Vartojimo būdas ir dozavimas:* mažesniems kaip 2 m. vaikams gerti po 1 kapsulę 3 kartus per dieną, 2–12 m. vaikams – po 1–2 kapsules 3 kartus per dieną, o vyresniems nei 12 m. – po 2 kapsules 3 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pieno baltymams ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** specialių atsargumo priemonių reikia, jei išmatose yra kraujo ar gleivių. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2601069673. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

6,99 €

FURASOL, 100/900 mg, 5 paketėliai

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARTAS

Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Kiekviename miltelių paketėlyje yra 100 mg furagino kalio druskos ir 900 mg natrio chlorido. **Terapinės indikacijos.** Lokalus infekcijos sukelto burnos ertmės ir ryklės uždegimo gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 4 m. vaikams.Tirpalą reikia ruošti prieš pat vartojimą. Paketėlyje esančius miltelius reikia ištirpinti stiklinėje karšto virinto vandens ir šiltu tirpalu 2–3 kartus per dieną skalauti burną arba gargaliuoti. Tirpalą reikia suvartoti iš karto. Jo laikyti negalima. **Vartojimo būdas.** Sergant burnos ertmės ligomis skalauti, o sergant ryklės ligomis – gargaliuoti apie 20–30 sekundžių, po to tirpalą išspjauti. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas furaginui, nitrofurano grupės junginiams. Pacientas yra jaunesniems negu 4 m. vaikas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.**Tirpalą burnai ir ryklei skalauti reikia ruošti prieš pat vartojimą. Nesuvartotus vaisto likučius reikia išpilti. **Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika.**Jokios klinikai reikšmingos sąveikos nepastebėta.Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinės poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujamaš@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lrv.lt. Reklamos teksto parengimo data 2026.09.09 FURS09092026LT

SKALAUK GERKLĘ VISU BALSU!

5,99 €

MILGAMMA® N, 20 minkštųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 40 mg benfotiamino (riebaluose tirpaus vitamino B_1 darinio), 90 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B_6) ir 250 µg cianokobalamino (vitamino B_{12}). **Terapinės indikacijos.** Vitaminų B_1, B_6, B_{12} trūkumo šalinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** *Suaugusiesiems*: po 1 kapsulę 3–4 kartus per parą. Kai liga lengva ir jei vaistinis preparatas padėda, per parą pakanka 1–2 kapsulių. Vartoti per burną. Kapsulę reikia praryti po valgio nesukramtytą, užsigerti trupučiu skysčio. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms, žemės riešutams, sojoms arba bet kuriai vaistinio preparato pagalbinei medžiagai. Asmenims, kuriems trūksta vitamino B_{12} ir kuriems gresia Leberio regos atrofija. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vartojama ilgiau negu 6 mėn. „Milgamma N“ gali sukelti neuropatiją. Reikia atsižvelgti į adityvų kartu vartojamų vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra sorbitolio (ar fruktozės), ir su maistu vartojamo sorbitolio (ar fruktozės) poveikį. Geriamojo vaistinio preparato sudėtyje esantis sorbitolis gali paveikti kitų kartu vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį prieinamumą. Jeigu yra alergija žemės riešutams arba sojoms, šio vaistinio preparato vartoti negalima. **Registruotojas.** „Wörwag Pharma GmbH & Co. KG“, Vokietija. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-12.

GYVYBIŠKAI BŪTINAS GERAI SAVIJAUTAI!

PERŠALIMO, YPAČ SUSIJUSIO SU VIRUSINE INFEKCIJA, GYDYMAS

8,99 €

ENGYSTOL, 50 tablečių

HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS, NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Vincetoxicum hirundinaria D6 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D10 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D30 75 mg, Sulfur D4 37,5 mg, Sulfur D10 37,5 mg. **Indikacijos. Peršalimo, ypač susijusio su virusine infekcija, gydymas.** Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: paprastai reikia vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps), ūminiais atvejais – po 1 tabletę kas 0,5–1 val. (iki 12 kartų per dieną). 6–11 metų vaikams: paprastai reikia vartoti po 1 tabletę 2 kartus per dieną, ūminiais atvejais – po 1 tabletę kas 0,5–1 val. (iki 8 kartų per dieną). 1–5 metų vaikams: pasitarus su gydytoju, vartoti po 0,5 tabletės 3 kartus per dieną, ūminiais atvejais – po 0,5 tabletės kas 0,5–1 val. (iki 12 kartų per dieną). Tabletę lėtai ištirpinti burnoje. Ją reikia vartoti ne valgio metu. Vaikams tabletę galima susmulkinti ir ištirpinti nedideliame kiekyje vandens. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosiems medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – *Lapp* laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Registruotojas.** „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). **Registruotojo atstovas.** UAB „Farmahelis“, www.heel.lt **Teksto parengimo data** 2025-12-10.

KOVOJA SU VIRUSAIS NUO PIRMŲJŲ PERŠALIMO POŽYMIŲ. TINKA IR VAIKAMS NUO 1 METŲ.

NUO SLOGOS, SINUSŲ SKAUSMO, KARŠČIAVIMO

6,99 €

TONUFEN, 200 mg/30 mg, 12 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: „Tonufen“ 1 dengtoje tabletėje yra 200 mg ibuprofeno ir 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikiu simptominis nosies ir ančių užsikimšimo, susijusio su peršalimo, gripo ar alerginio rinito simptomais, pavyzdžiui, galvos skausmu, rinosinusitu, karščiavimu, ryklės skausmu, raumenų maudimu ir skausmu, gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: 1 arba 2 tabletės per burną kas 4 val. Per 24 val. laikotarpį negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai ar pagalbinėms medžiagoms, praeityje pasireiškusios alerginės reakcijos acetilsalicilo rūgščiai ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo. Esant virškinimo trakto sutrikimų, kepenų, inkstų nepakankamumui, hemograninei diatezei, sunkiam širdies nepakankamumui, hipertenzijai, nėštumui, žindymo laikotarpiui, vartojant kitus nosies užsikimšimą mažinančius vaistus, sergant širdies kraujagyslių ligomis, hipertireoze, cukriniu diabetu, uždaro kampo glaukoma, vartojantiesiems MAO inhibitorius, esant diagnozuotai feochromocitomai. **Specialūs įspėjimai:** atsargiau reikia vartoti pacientams, kuriems nustatytas inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, praeityje sirgusiems astma ar alergine liga, sergant raudonaja vilklige, sirgusiems virškinimo trakto ligomis, hipertenzija, širdies nepakankamumu, senyviems pacientams. Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Teksto parengimo data 2025-09-17.

NUO 9,99 €

PANANGIN

158 mg/140 mg, 60 plėvele dengtų tablečių, **9,99 €**
316 mg/280 mg, 30 plėvele dengtų tablečių, **11,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 158 mg kalio aspartato ir 140 mg magnio aspartato arba 316 mg kalio aspartato ir 280 mg magnio aspartato. **Terapinės indikacijos:** „Panangin“ tabletės vartojamos magnio ir kalio trūkumo profilaktikai tuo atveju, jei šių jonų pasisavinama per mažai arba pernelyg daug netenkama, pvz., ilgai vartojant diuretikų. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Panangin 158 mg/140 mg“: paprastai skiriama po 2–3 tabletes 3 kartus per parą. „Panangin 316 mg/280 mg“: paprastai skiriama po 1 tabletę 3 kartus per parą. Vartojama per burną. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, ūminis ir lėtinis inkstų nepakankamumas, Adisono liga, hiperkalemija, kalį sulaikančių diuretikų vartojimas, atrioventrikulinė III laipsnio blokada, kardiogeninis šokas (kraujospūdis mažesnis negu 90 mm Hg). **Specialūs įspėjimai:** pacientams, sergantiems ligomis, dėl kurių kraujyje padidėja kalio kiekis, vaistinio preparato būtina vartoti atsargiai ir reguliariai kontroliuoti kalio kiekį kraujyje. **Rinkodaros teisės turėtojas:** „Gedeon Richter Plc.“, Vengrija. **Atstovas Lietuvoje:** „Gedeon Richter“ atstovybė, Maironio g. 23-3, LT-01125 Vilnius, tel. +370 5 268 5392. **Teksto peržiūros data** 2023-05-03 („Panangin 158 mg/140 mg“); 2022-07-07 („Panangin 316 mg/280 mg“). **Reklaminio teksto paruošimo data** 2026-03-02.

NUO RĖMENS

2,99 €

OMEPRAZOLE INTELI

20 mg, 14 skrandyje neirių kietųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

„Omeprazole Inteli“ sudėtyje yra aktyvios medžiagos omeprazolo. „Omeprazole Inteli“ mažina rūgšties kiekį Jūsų skrandyje. Vaistas vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refliukso simptomų (rėmens ir rūgšties atpylimo) gydymui. „Omeprazole Inteli“ vartoti negalima jeigu Jūs esate alergiškas omeprazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (nurodyta informaciniame lapelyje); jeigu Jūs esate alergiškas kitiems vaistams, priklausantiems protonų siurblio inhibitorių grupei (pvz., pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, ezomeprazolui); jeigu Jūs vartojate vaisto, kurio sudėtyje yra nelfinaviro (vartojamo nuo ŽIV infekcijos). Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Omeprazole Inteli“. Ypač jei vartojate informaciniame lapelyje išvardytų vaistų. Nėštumas ir žindymo laikotarpis. Prieš vartodama „Omeprazole Inteli“, pasakykite savo gydytojui, jog esate nėščia ar ketinate pastoti. Tokiu atveju gydytojas nuspręs, ar šiuo laiku Jums galima vartoti „Omeprazole Inteli“. Kaip vartoti „Omeprazole Inteli“. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Rekomenduojama dozė yra viena 20 mg kapsulė vieną kartą per parą kol išnyksta simptomai, bet ne ilgiau kaip 14 parų. Kad sumažėtų simptomai, gali tekti kapsulių vartoti 2–3 paras iš eilės. Jei po 14 parų laikotarpio simptomai neišnyksta, kreipkitės į savo gydytoją. Galimas šalutinis poveikis. Šis vaistas, kaip ir kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Nedelsdami nutraukite „Omeprazole Inteli“ vartojimą ir kreipkitės į gydytoją, jeigu pastebite kurį nors iš šio reto, bet sunkaus šalutinio poveikio atveju: staiga prasidėjo švokštimas, lūpų, liežuvio, gerklų ar kūno tinimas, išbėrimas, alpimas ar sutriko rijimas (sunki alerginė reakcija); paraudo, tapo pūslėta ir lupasi oda. Taip pat gali atsirasti lūpų, akių, burnos ertmės, nosies, lytinių organų pūslėtumas ar kraujavimas (tai gali būti Stevens-Johnson sindromas arba toksinė epidermolizė); pagelto oda, patamsėjo šlapimas ir atsirado nuovargis (šie simptomai gali rodyti sutrikusią kepenų funkciją). Ši informacija paskutinį kartą peržiūrėta 2024.04.29.

SKAUDANČIAI GERKLEI

8,99 €



POLOVOX

8,75 mg/dozėje burnos gleivinės purškalas (tirpalas), 15 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: Vienoje dozėje (3 išpurškimuose) yra 8,75 mg flurbiprofeno. Indikacijos: skaudančios gerklės simptomų, tokių kaip gerklės skausmas, skausmingumas, sunkumas nuryti ir patinimas, trumpalaikiam malšinimui 18 metų ir vyresniems suaugusiesiems. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusieji nuo 18 metų ir vyresni: viena dozė (3 išpurškimai) į gerklę kas 3-6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 dozių per 24 valandas. Per įpurškimą neįkvėpti. „PoloVox“ skirtas vartoti tik trumpą laiką. Kontraindikacijos. „PoloVox“ vartoti negalima pacientams, kuriems: yra alergija (padidėjęs jautrumas) flurbiprofenui, ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aspirinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; anksčiau buvo pasireiškę alerginės reakcijos, pavartojus nesteroidinių vaistų nuo uždegimo ar aspirino; yra arba buvo du ar daugiau skrandžio opos arba kraujavimo arba žarnų opos atvejų; anksčiau po nesteroidinių vaistų nuo uždegimo vartojimo pasireiškė kraujo krešėjimo arba kraujavimo sutrikimų; jeigu yra sunkių širdies, inkstų ar kepenų sutrikimų; paskutiniai 3 nėštumo mėnesiai. Šio vaisto negalima vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paugliams. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Vartojant mažiausią veiksmingą vaistinio preparato dozę trumpiausią simptomų kontrolei būtiną laiką, galima sumažinti nepageidaujamus poveikius. Pasitarti su gydytoju arba vaistininku, prieš pradedant vartoti „PoloVox“: jeigu jau yra vartojamas bet kuris kitas nesteroidinis vaistas nuo uždegimo ar aspirinas; jei yra bakterinis tonzilių uždegimas; jeigu pacientas senyvo amžiaus; jeigu pacientas serga arba sirgo astma; sistemine raudonąja vilklige ar mišria jungiamojo audinio liga; hipertenzija; žarnyno ligomis (opinis kolitas, Krono liga); jeigu yra širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų; pacientė nėščia pirmuosius 6 mėnesius arba maitina krūtimi. Reklamos teksto parengimo data - 2026 05.

BURNOS INFEKCINĖMS LIGOMS GYDYTI

7,99 €

JOX

85/1 mg/ml burnos gleivinės, gerklų ir ryklės purškalas (tirpalas), 30 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 ml tirpalo yra 85 mg joduoto povidono ir 1 mg alantoino. **Indikacijos:**papildomas lokalus lengvų burnos ir ryklės infekcinių ligų faringito**,** stomatito, gingivito gydymas; papildomas bakterijų sukelto tonzilito gydymas kartu su antibiotikais; burnos ertmės infekcijos profilaktika ligoniams, kuriems atliekamos burnos ar ryklės operacijos. „Jox“ purškalo gali vartoti suaugusieji ir vyresni kaip 8 m. vaikai. **Dozavimas ir vartojimo metodas:**suaugusiesiems ir vyresniems kaip 8 m. vaikams įprastinė dozė – purkšti 2–4 kartus per parą, bet jeigu būtina, galima vartoti ir dažniau (kas 4 val.), purkšti ne daugiau kaip 3 kartus į dešinę ir kairę burnos ertmės puses, bet ne daugiau kaip 6 kartus per parą. Pertrauka tarp atskirų įpurškimų turi būti ne mažesnė kaip 4 val. Vaistinio preparato negalima įkvėpti ar nuryti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; inkstų funkcijos sutrikimas; dekompensuotas širdies nepakankamumas; nėštumo ir žindymo laikotarpis; 2 sav. prieš planuojamą tyrimą arba gydymą radioaktyviuoju jodu ir 2 sav. po to; nuolat vartoti ligoniams, kuriems diagnozuotas skydliaukės funkcijos sutrikimas; nuolat vartoti ligoniams, kurie kartu vartoja ličio vaistinių preparatų; jaunesniems kaip 8 m. vaikams (dėl farmacinės formos). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jeigu „Jox“ atsitiktinai patenka į akis, jas reikia gerai plauti vandeniu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi,„Jox“purškalą reikia vartoti atsargiai. Šiems pacientams preparatas gali sukelti kepenų transaminazių kiekio padidėjimą. Ligoniams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, „Jox“ vartoti draudžiama. Vaistinio preparato vartoti ilgiau kaip 7 dienas negalima. Jeigu pasireiškia jautrumas arba nuolatinis lokalus dirginimas, vaistinio preparato vartojimą reikia nutraukti. Sergant laringitu, vaistinio preparato galima vartoti tik būtinu atveju. OTC-LT-00114. **Teksto peržiūros data**2026-04-01. **Reklaminės medžiagos parengimo data** 2026-04.

„JOX“ – VIENINTELIS TOKS!

SKAUSMUI MALŠINTI

2,99 €

MIALDEX, 25 mg, 10 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

„mialdex“ yra vaistas skausmui malšinti, priklausantis nesteroidinių vaistų nuo uždegimo grupei (NVNU). **„mialdex“** veikliojį medžiaga yra deksketoprofenas (deksketoprofeno trometamolio pavidalu). **„mialdex“** vartojamas lengvo ir vidutinio stiprumo raumenų skausmui, skausmingų mėnesinių, dantų skausmui malšinti. **Vartojimas**: visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Įprastinė vaisto dozė yra pusė tabletės (12,5 mg) kas 4–6 valandas arba 1 tabletė (25 mg) kas 8 valandos, bet ne daugiau kaip 3 tabletes per parą (75 mg). **Kontraindikacijos**: jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) deksketoprofeno trometamoliui arba bet kuriai pagalbinei **„mialdex“** medžiagai. Įspėjimai: jeigu sergate arba sirgote inkstų, kepenų ar širdies ligomis, širdies nepakankamumu, jeigu sergate kraujodaros sistemos ligomis; jeigu sergate sistemine raudonąja vilklige ar mišriomis jungiamojo audinio ligomis; jeigu sergate arba sirgote virškinimo trakto ligomis pasikonsultuokite su gydytoju. **Galimas šalutinis poveikis**: šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Reklamos teksto parengimo data: 2025.09.17

ODOS IR LŪPŲ PŪSLELINEI GYDYTI

13,99 €

ACIC, 200 mg, 25 tabletės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 200 mg acikloviro. **Terapinės indikacijos:** anksčiau gydytojo diagnozuotos pasikartojančios lūpų pūslelinės gydymas suaugusiems žmonėms. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** gerti po 1 tabletę 5 kartus per parą kas 4 val. Gydymo trukmė – 5 paros. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas acikloviruui, valacikloviruui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** palietus viruso pažeistą vietą, reikia tuoj pat nusiplauti rankas. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2601069662. **Reklamos teksto parengimo data** 2026-01-06.

UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSLELINĘ IŠ VIDAUS!

NUO RĖMENS

2,99 €

PANZILAN®, 20 mg, 14 skrandyje neirių tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Pantoprazolas. Vienoje tabletėje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidrato pavidalu). **Indikacijos.** „Panzilan" sudėtyje yra veikliosios medžiagos pantoprazolo, kuri blokuoja skrandžio rūgštį gaminantį „siurblį", todėl skrandyje sumažėja rūgšties kiekis. „Panzilan" vartojamas trumpalaikiam gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens, rūgščių atpylimo) suaugusiems pacientams gydymui. Refliuksas yra rūgščių iš skrandžio atgalinis patekimas į stemplę, kurioje gali prasidėti uždegimas ir sukelti skausmą. Dėl to gali atsirasti tokių simptomų, kaip skausmingas deginimo pojūtis krūtinėje kylantis iki ryklės (rėmuo) ir rūgštus skonis burnoje (rūgšties atpylimas). **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Gerti po 1 tabletę per parą prieš valgį tuo pačiu paros laiku 2-3 dienas iš eilės, užsigeriant vandeniu. Tabletes reikia nuryti, negalima kramtyti ar laužyti. Neviršykite rekomenduojamos 20 mg pantoprazolo dozės per parą. Nutraukite „Panzilan" vartojimą, kai visai pranyks ligos simptomai. Nepasitarus su gydytoju vartoti „Panzilan" ilgiau kaip 4 savaites negalima. **Kontraindikacijos.** Jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) pantoprazolui, sojų lecitinui arba bet kuriai pagalbinei „Panzilan" medžiagai; kartu vartojami vaistai, kurių sudėtyje yra atazanaviro; amžius iki 18 metų; nėštumas arba kūdikio žindymas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu dėl rėmens arba virškinimo sutrikimo gydotės ilgiau kaip 4 savaites; esate vyresnis kaip 55 metai ir kasdien vartojate nereceptinius vaistus dėl sutrikusio virškinimo; atsirado naujų simptomų arba simptomai neseniai pasikeitė; anksčiau sirgote skrandžio opalige arba buvo atlikta skrandžio operacija; sutrikusi kepenų veikla arba atsirado gelta; numatoma atlikti endoskopiją arba C-šlapalo mėginį. Jeigu numatyta atlikti kraujo mėginį, pasakykite gydytojui, kad vartojate šį vaistą. Atsirūgimo ir rėmens simptomai gali palengvėti pavartojus „Panzilan" vos vieną dieną, tačiau šis vaistas neturi sukelti pagerėjimo nedelsiant. Jo negalima vartoti profilaktikai. Jei Jums gydytojas sakė, kad netoleruojate kai kurių angliavandenių, prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su gydytoju. „Panzilan" sudėtyje yra sojų lecitino. Jei esate alergiškas žemės riešutams ar sojai, vaisto vartoti negalima. **Teksto peržiūros data.**2025 09 25. **Reklamos parengimo data.** 2026 06 17.

UŽGESINK GAISRĄ SKRANDYJE!

4,99 €



FLUDITEC

20 mg/ml, sirupas, 125 ml
50 mg/ml, sirupas, 125 ml

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Karbocisteinas.

„Fluditec" 20 mg/ml sirupas skiriamas bronchų sekrecijos sutrikimams gydyti vaikams nuo 2 m., ypač ūminio bronchito atveju: ūminis bronchitas ir ūminė lėtinės bronchopneumonijos krizė. **Dozavimas.** 1 dozavimo taurelėje (sugraduotoje po 5 ml) yra 100 mg karbocisteino. Vyresni kaip 5 m. vaikai: 3 kartus per parą geriama po 100 mg (vieną iki 5 ml žymos pripildytą dozavimo taurelę). 2–5 m. vaikai: 2 kartus per parą geriama po 100 mg (vieną iki 5 ml žymos pripildytą dozavimo taurelę). **„Fluditec" 50 mg/ml sirupas** skiriamas suaugusiesiems (nuo 15 m. ir vyresniems) kvėpavimo takų ligoms, susijusiems su apsunkintu skreplių išsiskyrimu (kai sunku pašalinti bronchų sekretą kosint), gydyti. **Dozavimas.** Rekomenduojama gerti po 1 dozavimo taurelę ryte, per pietus ir vakare, nevalgius, neviršijant 3 dozavimo taurelių per parą. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, sergant aktyvia pepsine opa, kūdikiams ir jaunesniems kaip 2 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai.** Esant produktyviam kosuliui su pūlingais skrepliais, karščiuojant ar sergant lėtine bronchų medžio ar plaučių liga, klinikinė situacija turi būti vertinama pakartotinai. Produktyvus kosulys yra esminė bronchų ir plaučių gynybos mechanizmo dalis, todėl neturi būti slopinamas. Neracionalu bronchų gleivinės modifikatorius derinti su vaistais nuo kosulio ir (arba) sekretą sausinančiomis medžiagomis (cholinoblokatoriais, pvz., atropinu). Esant oro srauto bronchuose sutrikimui, pavojinga vartoti kosulį slopinančių ir (ar) gleives skystinančių preparatų dėl bronchų užsikimšimo sekretu tikimybės. Mukoliziniai vaistiniai preparatai kūdikiams gali sukelti bronchų užsikimšimą. Kūdikių ir jaunesnių kaip 2 m. vaikų gebėjimas iškosėti bronchuose išsiskiriančias gleives yra ribotas dėl jų fiziologinių kvėpavimo takų ypatybių. Juos draudžiama vartoti kūdikiams ir jaunesniems kaip 2 m. vaikams. Jeigu simptomai ar liga išlieka arba pasunkėja, gydymo taktiką būtina įvertinti iš naujo. Reklamos teksto parengimo data 2025-11.

RYŠKESNIAM MATYMUI

-30% 14,68€ ~~20,97€~~

CALIMEL® CLEAR

akių lašai be konservantų, 10 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Calimel®" lašų sudėtyje yra natrio hialuronato ir kalio jodido. Lokaliai naudojamas kalio jodidas veikia kaip stiprus antioksidantas, sulaikantis laisvuosius radikalus akies paviršiuje. Jis mažina oksidacinę pažeidą ir slopina akies lęšiuko bei stiklakūnio drumstumą. „Calimel®" lašai naudojami akies paviršiui sudrėkinti ir užkirsti kelią akies lęšiuko bei stiklakūnio drumstumui. Produkto tinkamumo naudoti laikas yra 3 mėnesiai nuo pirmo pakuotės atidarymo dienos. Produkto negalima naudoti ilgiau kaip 1 mėnesį nepertraukiamai ir ne ilgiau kaip 3 mėnesius, lašinant kartkartėmis (su kelių dienų pertraukomis).

8,99 €

LARYXIN MENTHOL

2 mg/0,5 mg/ml, burnos gleivinės purškalas (tirpalas), 30 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: 1 išpurškime yra 0,17 mg chlorheksidino digliukonato ir 0,043 mg lidokaino hidrochlorido monohidrato. **Terapinės indikacijos:** gerklės skausmo simptomų malšinimas suaugusiesiems ir 12 m. bei vyresniems paaugliams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti ant burnos gleivinės. Suaugusiesiems – po 3–5 išpurškimus į galinę gerklės dalį kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 10 kartų per parą. 12–18 m. paaugliams – po 2–3 išpurškimus į galinę gerklės dalį kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 5 kartus per parą. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 5 dienas iš eilės. **Kontraindikacijos:** alergija chlorheksidinui, lidokainui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jaunesniems kaip 12 m. vaikams ir paaugliams. **Specialūs įspėjimai:** vaistą vartokite tik trumpam laikui skausmui ir dirginimui malšinti. Kreipkitės į gydytoją, jei per 3–4 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba karščiuojate, skauda galvą, pykina, vemiate ar atsiranda odos išbėrimas. Jeigu esate alergiški kitiems vietiniams amidų grupės anestetikams, pavyzdžiui, lidokainui, turite laikytis saugumo priemonių. Vartojant didesnes nei rekomenduojama dozes, gali sumažėti rijimo reflekso valdymas. Dėl to gali padidėti skysčių ir maisto dalelių įkvėpimo rizika. Nevartokite tuo pačiu metu, prieš pat ar iš karto po kitų burnos ir (arba) gerklės dezinfekavimo priemonių vartojimo. „Laryxin Menthol" burnos gleivinės purškalo sudėtyje yra etanolio (96 %) ir levomentolio (duodant vartoti mažiems vaikams, kuriems ankščiau yra buvę traukulių, reikia laikytis saugumo priemonių). Mažas alkoholio (etanolio) kiekis, esantis šio vaisto sudėtyje, nesukelia pastebimo poveikio. Reklamos teksto parengimo data 2025-01.

-30% 11,08€ ~~15,83€~~

OCHISAN

akių vokų tepalas, 15 g

MEDICINOS PRIEMONĖ

Akių vokų tepalas be konservantų. Padeda palengvinti tokius simptomus, kaip vokų odos niežulys, jų skausmingumas ir patinimas, susijusius, be kita ko, su išorinio miežio ir chalaziono atsiradimu. Veiklioji medžiaga šluotinių sėklučių medus (manuka) MGO 400+, šluotinių sėklučių aliejus (manuka).

5,99 €

DR. THEISS EUCALIPIN, tepalas, 50 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 g tepalo yra 75 mg eukaliptų eterinio aliejaus, 75 mg paprastųjų pušų eterinio aliejaus ir 50 mg raceminio kamparo. **Indikacijos:** Peršalimo (pvz., slogos, kosulio, užkimimo) simptomų lengvinimui. **Vartojimas:** tepalą vartojant ant odos jis keletą kartų per dieną ir prieš miegą tepamas krūtinės srityje ir ant nugaros, po to pacientui reikia šiltai apsirengti. **Inhaliacijai:** žirnio dydžio tepalo kiekis ištirpinamas karštame vandenyje. Garais kvėpuoti 5–10 minučių.Jei simptomai išlieka 3–5 dienas, jei atsiranda dusulys, galvos skausmas, prasideda karščiavimas, atsiranda pūlingų ar su krauju skreplių ar išskyrų iš nosies, pacientui rekomenduojama skubiai pasikonsultuoti su gydytoju. „Dr. Theiss Eucalipin" nerekomenduojama vartoti inhaliacijoms jaunesniems nei 6 metų vaikams, o jaunesniems nei 2 metų vaikams jo vartoti draudžiama. Informacinis lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2020.11.30.

NAUJA LINIJA

bio farmacija

CAPS

-25%

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

Ta pati kokybė. Dabar ir kapsulėse.

Yra maisto papildų, kurie tiesiog papildo. Ir yra maisto papildai, kurie turi kilmę, istoriją ir mokslinį pagrindą. „Biofarmacija“ jau 15 metų kuria produktus, paremtus viena aiškia idėja – organizmui suteikti tik tai, ko jam iš tiesų reikia, be jokių perteklinių priedų, be kompromisų dėl kokybės.

Pristatome naują liniją – „Biofarmacija CAPS“, maisto papildus kapsulių forma, sukurtus tiems, kurie nori patogumo, bet neketina atsisakyti grynumo.

Naujos linijos asortimente – septyni produktai, iš kurių galite išsirinkti sau tinkamą: **nervų sistemai ir psichologinei funkcijai** (magnio bisglicinatas); **streso suvaldymui, emocinei pusiausvyrai ir miego kokybei** (patentuotas grynas ašvagandų šaknų ekstraktas, rodiolės ir valerijono ekstraktai); **imunitetui** (cinkas, liposominis vitaminas D, vitaminas C iš erškėtuogių ekstrakto).

Mineralai iš Negyvosios jūros

Biofarmacija CAPS išskirtinumai

- Be užpildų, rišiklių, konservantų, dažiklių ir saldiklių.
- Tik aktyviosios medžiagos ir augalinės kilmės kapsulės apvalkalas.
- Maksimaliai švari ir atsakingai sukurta sudėtis.
- Patogi vartoti forma kasdienai ir kelionėms.
- Premium lizdinė pakuotė papildomai apsaugai ir higienai.

-40 %

KALICORD 850 FORTE, 30 kapsulių ~~13,85~~ 8,31 €
KRIOMEGA+, 30 minkštųjų kapsulių ~~23,99~~ 14,39 €

MAISTO PAPILDAI

Norintiems papildyti kalio atsargas organizme, rekomenduojama vartoti **„Kalicord 850 "** sudėtyje yra 850 mg kalio citrato, kuris papildo organizmą trūkstamu kalio kiekiu. Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį ir normalią raumenų veiklą. Žuvų taukai **„KriOmega+"** yra iš krilių. Kriliai yra laikomi vienu geriausių, veiksmingiausių ir prieinamiausių omega-3 riebalų rūgščių šaltinių. Sudėtyje esantys omega-3 fosfolipidai, gaunami iš vėžiagyvių – krilių – ekstrakto, greičiau patenka į audinių ląsteles ir tolygiau pasiskirsto nei omega-3 trigliceridai, randami žuvų taukuose.

-40 %

MEMORIL FORTE, 30 kapsulių ~~15,99~~ 9,59 €
TRIPTAN FORTE, 30 kapsulių ~~18,99~~ 11,39 €

MAISTO PAPILDAI

„Memoril forte" – subalansuotas, 11 sudedamųjų dalių kompleksas atminčiai bei kraujotakai. Tinka tiems, kuriems sunku susikaupti bei nuolat ką nors pamirštantiems. Vienoje kapsulėje yra 80 mg ginkmedžių ekstrakto, kuris padeda palaikyti normalią atminties funkciją ir kraujotaką. Taip pat sudėtyje yra magnio, vitaminų B, C, E, seleno ir folio rūgšties, kuri padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną. **„Triptan forte"** sudėtyje esantis 5-hidroksitriptofanas (5-HTP) yra natūrali medžiaga, gaunama iš Afrikoje augančių augalų – Griffonia simplicifolia – sėklų, kuri kartu su vitaminu B6 reikalinga serotonino – geros nuotaikos hormono – gamybai. Serotonino išsiskyrimas suteikia gerą nuotaiką ir energiją. Tai pat sudėtyje esantys vitaminai B1 ir B6 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą. Vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

-50 %

ARTHROSTOP PROENZI

MAISTO PAPILDAI

„Arthrostop Proenzi Collagen Shots" – unikali dviejų tipų kolageno, vitaminų ir mineralų kombinacija sąnariams. Net 11 000 mg hidrolizuoto ir 20 mg nedenatūruoto II tipo kolageno viename buteliuke! Naujiena – juodųjų serbentų skonio.
„Arthrostop Proenzi Intensive" tabletės – sąnariams su gliukozaminu, chondroitinu, bosvelijų žievės ekstraktu ir II tipo kolagenu. Tik 1 tabletė per dieną!
„Arthrostop Proenzi Rapid" tabletės – kompleksas su gliukozaminu, chondroitinu, bosvelijų žievės ekstraktu sąnariams.
„Arthrostop Proenzi PLUS" tabletės – sąnariams su MSM, gliukozaminu ir bosvelijų žievės ekstraktu, kuris padeda palaikyti sąnarių lankstumą bei bendrą sąnarių funkciją. 2603_SB_Proenzi_V01_LT

JUDĖK LAISVAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

IKI -25 %

COREGA

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

COREGA – visapusiška dantų protezų priežiūra. Tvirtinimo priemonės užtikrina saugų laikymą ir komfortą visą dieną, o valymo tabletės efektyviai pašalina dėmes, naikina bakterijas ir padeda palaikyti gaivą.

ŠVARA IR PASITIKĖJIMAS – KIEKVIENAI ŠYPSENAI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

NUO 21,99 €

VIVITON

1000 mg, 30 plėvele dengtų tablečių **21,99 €**
1000 mg, 60 plėvele dengtų tablečių **37,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Mikronizuotas diosminas. **Terapinės indikacijos.** „Viviton" gydomi suaugusieji toliau išvardytais atvejais: su lėtine apatinių galūnių venų liga susijusių simptomų, pvz., tempimo ir sunkumo jausmo kojose, blauzdų edemos, skausmo ir mėšlungio naktį, palengvinimas; su ūmine hemorojaus liga susijusių simptomų, pvz., skausmo, kraujavimo ir patinimo išangės srityje, gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Lėtinė apatinių galūnių venų liga: 1 plėvele dengta tabletė per parą, kurią reikia išgerti ryte valgio metu (trumpiausia rekomenduojama gydymo trukmė – mažiausiai 4–5 savaitės); ūminė hemorojaus liga: po 1 plėvele dengtą tabletę 3 kartus per parą pirmąsias 4 dienas, po to – po 1 plėvele dengtą tabletę 2 kartus per parą kitas 3 dienas. Vėliau reikia vartoti palaikomąją dozę – po 1 plėvele dengtą tabletę per parą. Tabletes reikia išgerti valgio metu. **Kontraindikacijos.** „Viviton" vartoti draudžiama: jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) diosminui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Viviton". Jeigu jūsų kepenų arba inkstų funkcija yra sutrikusi, prieš pradėdami vartoti „Viviton", pasitarkite su savo gydytoju. Vaistas nėra veiksmingas mažinant kojų patinimą, pasireiškusį dėl širdies, inkstų ar kepenų ligos. Ūminės hemorojaus ligos gydymas šiuo vaistu nepakeičia specifinio kitų išangės sutrikimų gydymo. **Alstovas Lietuvoje.** UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic", J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, Lietuva. El. paštas LT@berlin-chemie.com
Reklama paruošta 2026-04.
LT-VIV-2-2026_MFLOW

VISAPUSIŠKA PAGALBA JŪSŲ VENOMS

NUO 6,99 €

TROXEVASIN

2 %, 40 g gelis **6,99 €**
2 %, 100 g gelis **9,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 g gelio yra 20 mg trokserutino. **Terapinės indikacijos:** lėtinio venų nepakankamumo simptomų (kojų skausmo, sunkumo, patinimo) lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems pacientams iš ryto ir vakare ligos pažeistą vietą reikia patepti nedideliu kiekiu gelio ir švelniai masažuoti, kol vaistinis preparatas visiškai įsigers į odą. Gydymo geliu veiksmingumas daugiausia priklauso nuo vaistinio preparato dozės, vartojimo reguliarumo ir trukmės (patariama vartoti ilgai). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** vartoti tik ant nepažeistos odos, negalima tepti atvirų žaizdų bei gleivinės, pvz., akių. Gelio sudėtyje yra benzalkonio chlorido, kuris gali sudirginti odą. Nesitikima, kad vartojimas nėštumo ir žindymo laikotarpiu gali būti susijęs su žalingu poveikiu motinai, nes benzalkonio chlorido absorbcija per odą yra minimali. TROX-LT-00034. **Teksto peržiūros data** 2024-11-13. **Reklaminės medžiagos parengimo data** 2026-03.

KAD KOJOS BŪTŲ LENGVOS! MĖGAUKITĖS TYRINĖDAMI PASAULĮ BE LĖTINIO VENŲ NEPAKANKAMUMO SUKELTŲ SIMPTOMŲ!

LAIMĖS VALANDOS

I -VI **iki 9 val.** ir **14-15 val.***

VII **14-15 val.***

Perkant **3*** ir daugiau prekių **-30%**

Perkant **2*** prekes **-25%**

Perkant **1** prekę **-20%**

NVAISTINĖ

*Nuo 2026 m. gegužės 1 d. NORFOS vaistinėje akcijos LAIMĖS VALANDOS metu perkant 1 prekę taikoma 20 % nuolaida, perkant 2 prekes – 25 % nuolaida, vaistams – 20 % nuolaida, o įsigyjant 3 ir daugiau prekių – 30 % nuolaida, nereceptiniams vaistams –25 %, receptiniams – 20 % nuolaida.

Taikomos momentinės 20 % dydžio nuolaidos receptiniams vaistams, 20 ar 25 % nuolaidos nereceptiniams vaistams, o kitoms prekėms – 20, 25 arba 30 % nuolaidos, atsižvelgiant į atitinkamo pirkimo metu įsigyjamų prekių bendrą kiekį.

Nuolaida taikoma perkant pilnas prekių pakuotes, kurių kiekvienos vertė arba priemoka ne mažesnė nei 1,50 euro. Prekės, perkamos su kompensuojamuoju receptu, įskaičiuojamos į įsigyjamų (perkamų) prekių krepšelį (kiekį), tačiau joms nuolaida netaikoma.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms (pvz., mėnesinio leidinio nuolaidos; prekėms, vaistinėse pažymėtoms geltonais kainoženkliais; akcinėms prekėms, kai nuolaida taikoma įsigyjant ne mažiau kaip 2 nurodytus produktus, ir kt.). Momentinės nuolaidos netaikomos perkant prekes su kompensuojamuoju receptu, mokant už skiepus, taip pat pradinio maitinimo pieno mišiniams, kartiniams (gaminamiems vaistinėje) ir vardiniams vaistams, įsigyjant dovanų kuponus, prekių pakavimo maišelius. Momentinės nuolaidos netaikomos perkant www.gintarine.lt, net jei už prekes atsiskaitoma jas atsiimant vaistinėse. Nuolaidos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Informacija apie akcijas ir prekes, kurioms taikomos LAIMĖS VALANDŲ nuolaidos, teikiama kiekvienoje vaistinėje, el. paštu info@nvaistine.lt arba nemokamu tel. +370 800 10008. Visos nuolaidos galioja tik su PC NORFA lojalumo kortele.

Rytinės LAIMĖS VALANDOS vyksta nuo vaistinės atidarymo iki 9 val. ryto. Jei vaistinė pradeda dirbti 9 val. ar vėliau, rytinės LAIMĖS VALANDOS joje nevyksta.

-40 % PREKIŲ ŽENKLAMS

IKI -50%

„MÖLLER'S" ŽUVŲ TAUKAI IR OMEGA-3 KAPSULĖS

MAISTO PAPILDAI

„Möller's" – tai šimtmečiais puoselėjami žuvų taukai visai šeimai. „Möller's" žuvų taukų kapsulės išsiskiria kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyvių medžiagų deriniais. Tyri ir gerai išvalyti „Möller's" žuvų taukai puikiai tinka vartoti kasdien visą gyvenimą. Įvairaus skonio kramtomosiose žuvelėse „Möller's Junior" yra omega-3 ir vitamino D – augančiam vaikų organizmui naudingų medžiagų.

OMEGA-3 EKSPERTAI JAU DAUGIAU NEI 170 METŲ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

IKI -50%

SALDUS MIEGAS

15 kapsulių ~~11,49~~ 5,75 -50 %
30 kietųjų kapsulių ~~13,49~~ 8,09 € -40 %
eliksyras, 150 ml ~~12,49~~ 7,49 € -40 %

MAISTO PAPILDAI

Linija „**Saldus miegas**"- viena iš populiariausių maisto papildų linijų miegui Lietuvoje. Greitesniam užmigimui ir kokybiškam poilsiui, su fitomelatoninu (augaliniu melatoninu). **„Saldus miegas" - net 7 aktyviųjų** medžiagų kompleksas, kurio sudėtyje vaistinių ramunių žiedų ekstraktas, padedantis palaikyti normalią miego kokybę „**Saldus miegas fitoMELATONINAS**" preparate yra 1 mg fitomelatonino. „**Saldus miegas eliksyras**" karamelės skonio, skystas maisto papildas. Sudėtyje yra GASR (Gama-amino sviesto rūgštis), 5-hidroksitriptofano (5- HTP) ir 1 mg fitomelatonino, kuris padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti).

GERAM POILSIUI - „SALDUS MIEGAS"!

Plaukams

-40%

HAIR VOLUME

MAISTO PAPILDAI

Netenkina plaukų būklė? Jie atrodo ploni ir nušiurę? Maisto papildai plaukams „Hair Volume™" gali būti tai, ko reikia, norint turėti veršlius, žvilgančius ir sveikai atrodančius plaukus! „Hair Volume™" tabletės ir guminukai suteikia mitybinių medžiagų galvos odai ir plaukų folikulams, kur ir formuojasi plaukai. Sudėtyje yra biotino, cinko, kurie padeda palaikyti normalią plaukų būklę. Taip pat ypatingo „Annurca" veislės obuolių ekstrakto, kuriame randama biologiškai aktyvios medžiagos procianidino B-2. Tik 1 tabletė ar 2 gardūs obuolių skonio guminukai per dieną padės puoselėti jūsų plaukus.

PASTEBIMAI VEŠLESNI, STORESNI IR LABIAU ŽVILGANTYS PLAUKAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-45%

NAUJIENA

NIZORAL

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

NAUJIENA! „Nizoral® Care Kerato PSO" šampūnas su įkapsuliuota salicilo rūgštimi suteikia švelnų, bet veiksmingą papildomą palaikomąjį poveikį galvos odai, ant kurios gali pasireikšti psoriazė.
„Nizoral® Care" šampūnas sausai ir jautriai galvos odai. Labai sausai, pleiskanojančiai, jautriai ir į egzemą linkusiai galvos odai.
„Nizoral® Care" šampūnas riebiai galvos odai ir plaukams. Valo galvos odą, Šalina pleiskanas, mažina niežėjimą.
„Nizoral® Care" galvos odos ir plaukų kondicionierius. Maitina plaukus, ramina galvos odą.
„Nizoral® Care" galvos tonikas. Greitai ramina nieztinčią ir pleiskanojančią galvos odą.
2609_SB_Nizoral_V01_LT

„NIZORAL" KOSMETIKOS PRIEMONĖS NUO PLEISKANŲ KASDIENEI JŪSŲ GALVOS ODOS PRIEŽIŪRAI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-40%

VIRONOX

MAISTO PAPILDAI

Maisto papildų linija „Vironox" – epigenetinė linija, sukurta bendradarbiaujant su Šveicarijos mokslininkais. **„Stiprus imunitetas"** – tik 7 dienos organizmo apsaugai ir imunitetui. 1 paketėlyje yra net 10,4 g aktyviųjų medžiagų. Sudėtyje esantys vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. **„Jėgoms atstatyti+"** – maisto papildas tiems, kurie siekia greičiau atgauti jėgas. Kininių ženšenių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalų organizmo gyvybingumą, vitaminai B6 ir B12 – normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą ir mažinti nuovargį. **„Smegenų rūkas"** – protinei veiklai. Rausvųjų rodiolių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją. Niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą. Balzamo **„Veiksminga apsauga"** sudėtyje esantis interferonas, hidrolizuotas kolagenas, lizocimas ir eteriniai aliejai veikia sinergiškai ir padeda suformuoti apsauginį barjerą.

„VIRONOX" – NELEISK TAVĘS SUSTABDYTI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-40%



VISIONACE

ORIGINAL, 30 tablečių ~~25,19~~ 15,11
PLUS, 28 tabletės / 28 kapsulės ~~32,99~~ 19,79 €

MAISTO PAPILDAI

VISIONACE – subalansuotas liuteino, mėlynių ekstrakto, antioksidantų kompleksas. Sudėtyje esančios medžiagos padeda išsaugoti normalų regėjimą (cinkas, vitaminai A, B2), o antioksidantai – manganas, selenas palaiko ląstelių apsaugą nuo oksidacinės pažaidos. VISIONACE tinka daug laiko praleidžiantiems prie kompiuterių ar TV ekranų,dirbantiems akims reiklų darbą, dažnai jaučiantiems akių nuovargį, vyresnio amžiaus žmonėms, dėvintiems kontaktinius lęšius. VISIONACE PLUS sudėtis praturtinta omega-3 rūgštimis ir 12 mg liuteino.

„VISIONACE" – REGĖJIMO JĖGA!

-40%

PROSTOSAN FORTE 30 kapsulių ~~17,49~~ 10,49 €
POTENZINE SUPERIOR 30 tablečių ~~26,99~~ 16,19 €
TOTALPOWER MAN 30 tablečių ~~22,99~~ 13,79 €

MAISTO PAPILDAI

„Prostosan forte" – pagalba vyresnio amžiaus vyrų prostatai. Sudėtyje esantys sabalpalmių ir rugių žiedadulkių ekstraktai padeda palaikyti normalią prostatos funkciją, o afrikinių pigių ekstraktas – normalią šlapimo pūslės funkciją. Kininio ženšenio ekstraktas padeda išlaikyti energingumą. Šio preparato sudėtis taip pat praturtinta vitaminu D3 ir cinku. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 2 kartus per dieną, valgio metu.
„Potenzine superior" – subalansuotas derinys potencijai. Šio maisto papildo sudėtyje esantis ženšenio šaknų ekstraktas padeda palaikyti lytinę funkciją, ištvermę ir energingumą. Normalų lytinį potraukį ir seksualinį pajėgumą padeda palaikyti gulščiosios ragūžės vaisių ekstraktas, o normalų vaisingumą ir testosterono koncentraciją kraujyje – cinkas. Sudėtyje taip pat yra L-arginino. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną, valgio metu.
„TotalPOWER man" – galingi multivitaminai aktyviam vyrui su 23 aktyviosiomis medžiagomis. Šis maisto papildas puikiai tinka intensyviai gyvenantiems vyrams. Jo sudėtyje esantis juodasis eleuterokokas padeda palaikyti normalią protinę veiklą ir energiją; magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, o vitaminai B6 ir B12 – palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną.

Jamieson™

NATURAL SOURCES | SINCE 1922

JAMIESON turi ilgametę patirtį - savo produkciją eksportuoja po visą pasaulį jau nuo 1922 metų. JAMIESON naudoja išskirtinę „360 Pure“ technologiją, kuri apima net 360 gamybos proceso kontrolės etapų.

IKI -50%

„JAMIESON“ MAISTO PAPILDAMS

Pagaminta Kanadoje

2 UŽ 1 KAINĄ

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMAI!

„LIVOL“ VITAMINAI

MAISTO PAPILDAI

Kviečiame Jus atrasti iš naujo „Livol“ vitaminų prekių ženklą – dabar naujose pakuotėse. Atnaujintas „Livol“ įkvėptas Danijos vertybių, šiaurietiškos estetikos ir Hygge balanso, kuris atspindi harmoningą požiūrį į kasdienę gerą savijautą. Danų kultūroje gyvenimo pusiausvyra gimsta iš paprastų, bet prasmingų kasdienybės akimirkų – judėjimo, ramybės, artumo, šypsenų bei sąmoningo rūpeščio savimi. Šia filosofija vadovaujasi ir „Livol“ vitaminai, sukurti Danijoje, naudojant pažangias, subalansuotas formules ir efektyvią gamybos technologiją, kuri užtikrina maksimalų pasisavinimą.

„LIVOL“ – GEROS SAVIJAUTOS MEISTRAI IŠ DANIJOS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

Šlapimo takų sistemai

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMAI!

URINAL

MAISTO PAPILDAI

NAUJIENA! „Urinal Cranberry Gummies“ guminukai – sudėtyje yra proantocianidinų: 18 mg PAC viename guminuke. Tinka visai šeimai. Nuo 3 metų.

„Urinal Akut“ tabletės – unikalus spanguolių ekstrakto, paprastųjų rykštenių ir vitamino D derinys normaliai šlapimo takų funkcijai palaikyti. Paprastosios rykštenės padeda palaikyti normalią šlapimo takų funkciją.

„Urinal“ kapsulės – sudarytos iš unikalios maistinių medžiagų kombinacijos: džiovintų spanguolių (*Vaccinium macrocarpon*) sulčių koncentrato, didelės koncentracijos spanguolių (*Vaccinium macrocarpon*) sulčių ekstrakto „ExoCyanTM“, paprastųjų rykštenių (*Solidago virgaurea*) ekstrakto ir vitamino D. 2603_SB_Urinal_V01_LT

DEGINIMO POJŪTIS? NELAUKITE IR VEIKITE IŠKART!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

URINAL

D-MANNOSE, 2000 mg, 14 šnypščiųjų tablečių

20⁷⁹ €

MEDICINOS PRIEMONĖ

NAUJIENA! „Urinal D-Mannose“, 2000 mg, medicinos priemonė. Padeda išvengti pasikartojančių šlapimo takų infekcijų, cistito, kuriuos sukelia bakterija E. coli. Pagalbinė priemonė gydant šlapimo takų infekcijas.

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMAI!

BIOCELL

MAISTO PAPILDAI

BIOCELL puoseléja gamtos sukurtą grožį ir sąmoningą gyvenimo būdą, vertina natūralumo estetiką ir skatina moterį pamilti save tokią, kokia ji yra – tobulą. Geriamieji BIOCELL grožio eliksyrai „shots“ su kolagenu ar keratinu, grožio kapsulės, hidrolizuotas kolagenas miltelių forma ir skaidulos puoseléja odos, plaukų bei nagų grožį iš vidaus.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

Akims

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

OCUVAL

30 tablečių **16⁵⁹ €**

HYDRO MAX, 30 kapsulių **21⁹⁹ €**

STRONG PLUS, 30 kapsulių **22⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

Akių drėgmei palaikyti išbandykite „Ocuval Hydro Max“ – ypač jautrioms, pavargusioms ir didelį krūvį patiriančioms akims.
Kai norisi stipresnės pagalbos normaliam regėjimui išsaugoti, akių sveikatai palaikyti ir ryškiam matymui puoselėti, rinkitės „Ocuval Strong“.
Normaliai akių būklei palaikyti – daug dirbant ar mokantis – atraskite „Ocuval“ tabletes. Tinka ir vaikams.

„OCUVAL“ – MATYK, KAI LABIAUSIAI REIKIA!

Nervų sistemai, psichinei sveikatai bei miegui

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMAI!

ZAN™

MAISTO PAPILDAI

„HypnoZAN Express“ čiulpiamosios tabletės su melatonino ir fitoterapinių medžiagų deriniu leidžia greičiau užmigti, o čiulpiama preparato forma užtikrina geresnį veikimą. **„ValeroZAN Drops“** geriamasis tirpalas – augalinių ekstraktų derinys su valerijonais nervų sistemos veiklai, psichinei sveikatai ir atsipalaidavimui, skysta preparato forma užtikrina greitesnį veikimą. **„HypnoZAN“** kapsulės su melatoninu ir melisomis padeda greičiau užmigti, palaikyti normalų miegą bei psichinę sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. **„ValeroZAN“** tabletėse esantis vaistinių valerijonų, vaistinių melisų ir paprastųjų apynių bei sukatžolių derinys padeda: atsipalaiduoti, palaikyti normalią nervų sistemos būklę, palengvinti užmigimą ir palaikyti miego kokybę.

„ZAN™“ – ĮKVĖPK... IŠKVĖPK.

Raiščiams, sausgyslėms, fascijoms

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMAI!

CIGNON, 30 minkštų kapsulių **19⁵⁹ €**

CIGNON SHOTS, 20 geriamų dozių po 10 ml **35⁷⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

Raiščiai, sausgyslės, fascijos yra judėjimui būtini jungiamojo audinio dariniai: sausgyslėmis raumenys jungiasi prie kaulų. Joms susitraukiant pritraukiami kaulai ir taip įvyksta judesys. Raiščiai lyg virvės suriša sąnariuose esančius kaulų galus ir garantuoja judesio tikslumą. Fascijos lyg tinklas apsupa ir sujungia kaulus, raumenis, sąnarius, raiščius, sausgysles į visumą, padeda raumenims sąveikauti tarpusavyje atliekant judesius. Nuolat pasikartojantys arba netikėti, staigūs judesiai, didesnės, intensyvesnės raumenų apkrovos, pertempimai gali pakenkti raiščių, sausgyslių, fascijų sveikatai. Rūpinantis jų sveikata svarbu sureguliuoti darbo, poilsio režimą, taikyti optimalius fizinius krūvius ir aprūpinti raiščius, sausgysles, fascijas reikiamomis maisto medžiagomis: mukopolisacharidais, hidrolizuotu kolagenu, variu, padedančiu palaikyti jungiamojo audinio būklę, energijos apykaitą, cinku, padedančiu palaikyti baltymų sintezę, rūgštinę ir bazinę bei angliavandenių, maistinių makromedžiagų apykaitas, kurkuminu, apsaugančiu ląsteles nuo oksidacinės pažeidos.

„Cignon“ – vienintelis maisto papildas Lietuvoje, specialiai sukurtas raiščiams, sausgyslėms, fascijoms.

„Cignon Shots“ – geriamos dienos dozės papildo mitybą raiščiams, sausgyslėms, fascijoms reikiamomis medžiagomis, siekiant užtikrinti harmoningą judėjimą, puikią raiščių, sausgyslių, fascijų sveikatą bei sklandų jų darbą.

NELĖTINK TEMPO SU „CIGNON“!

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

ODÒNTE

balinamoji dantų pasta jautriems dantims, 75 ml **7⁹⁹ €**

balinamoji ir gaivų burnos kvapą suteikianti dantų pasta, 75 ml **7⁹⁹ €**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

ODÒNTE – tai patikimumas ir dėmesys detalėms, užtikrinantis nepriekaištingą burnos priežiūrą kiekvieną dieną.

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMAI!

ORALFLUX

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Reguliariai naudojamas „Oralflux“ gaivina burnos kvapą. **Be alkoholio.** Inovatyvus dozatorius užtikrina tikslią skalavimo skysčio dozę ir ekonomišką naudojimą. „Oralflux“ turėtų būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė valant dantis. Naudojimas: norėdami gauti 10 ml skysčio, šveliniai paspauskite butelį, kol skystis atsiras virš purškimo prietaiso. Skalaukite burną skysčiu apie 1 min., išspjaukite. Kad poveikis būtų geresnis, nevalgykite ir negerkite 2 val. po skalavimo. Buteliukas turi INOVATYVŲ DOZATORIŲ - TIKSLU IR EKONOMIŠKA!

STIPRESNI DANTYS. GAIVESNIS KVAPAS. PLATESNĖ ŠYPSENA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**

FJØRD STRONG OMEGA-3
SMART GUMMIES, 45 guminukai **24⁴⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

Štai kodėl verta rinktis „FJØRD STRONG OMEGA-3 Smart gummies“:
Norvegijos mokslininkų sukurta, kramtoma Omega-3 forma, kuri pasižymi geresniu pasisavinimu.
Ypač stiprios koncentracijos omega-3 su dideliu DHR kiekiu ir vitaminu D visos šeimos sveikatai.
Omega-3 išgaunamos iš tyro laukinių, riebių, mažų žuvų šaltinio, tvarios žvejybos būdu.
Be cukraus, be glitimo, natūralaus pasifloros skonio.

„FJØRD STRONG OMEGA-3“ – GALI DAUGIAU NEI TIKIESI.

-30 %

FEROGLOBIN, FEROGLOBIN PLUS

MAISTO PAPILDAI

„Feroglobin“ – geležies, vitaminų ir mineralų kompleksas normaliai kraujodarai (foliatai), raudonųjų kraujo kūnelių gamybai (vitaminai B6, B12, geležis), hemoglobino susidarymui (geležis) palaikyti. „Feroglobin“ puikiai papildo mitybą nėštumo ir laktacijos laikotarpiu, vaikystėje ir paauglystėje, sveikstant po ligos ar operacijos.
„Feroglobin Plus“ ne tik papildo geležies atsargas, bet ir padeda mažinti pavargimo jausmą (vitaminai B6 ir B12), palaiko fizinę ir protinę energiją (sibirinis ženšenis).

GELEŽIS, KURIAI NĖRA LYGIŲ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

IKI -40 %

CARDIOACE, 30 tablečių ~~24⁹⁹~~ 14⁹⁹ € -40 %
CARDIOACE PLUS, 60 kapsulių ~~41¹⁹~~ 30⁸⁹ € -25 %

MAISTO PAPILDAI

CARDIOACE – sinerginio veikimo kompleksas, kuriame derinamos naudingosios česnakų ekstrakto savybės su vitaminais, mineralais bei antioksidantais. Sudėtyje yra medžiagų normaliai širdies veiklai (vitaminas B1, EPR, DHR), kraujotakai (česnakai), ląstelių apsaugai nuo oksidacinio pažeidimo (varis, selenas, vitaminai C,E).

„CARDIOACE“ – KIEKVIENAM ŠIRDIES DŪŽIUI!

IKI -30 %

NATASPIN
CONTROL PRO, 90 kietųjų kapsulių ~~43⁹⁹~~ 30⁷⁹ € -30 %
CARDIO PROTECT, 30 kapsulių ~~20⁹⁹~~ 14⁶⁹ € -30 %
H, 30 kapsulių ~~17⁹⁹~~ 14³⁹ € -20 %

MAISTO PAPILDAI

Teisingai cholesterolio kontrolei rinkitės 90 dienų kursą - „NatAspin Control Pro“. Tai pažangi, daugiafunkcinė formulė, kuri sukurta ilgalaikei cholesterolio kontrolei, padeda palaikyti širdies ir kraujagyslių sistemos bei kepenų veiklą.

„NATASPIN CONTROL PRO“ – TEISINGAI CHOLESTEROLIO KONTROLEI.

LENGVAM NERIMUI MALŠINTI IR MIEGUI PALENGVINTI

NUO 6⁹⁹ €

LILANDOR
80 mg, 14 minkštųjų kapsulių **6⁹⁹ €**
80 mg, 28 minkštosios kapsulės **11⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Lavandula angustifolia Miller eterinis aliejus
„Lilandor“ yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jeigu simptomai pablogėja šio vaisto vartojimo metu, pasitarkite su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, vartoti nerekomenduojama, nes levandų aliejaus sudėties medžiagos daugiausia šalinamos iš organizmo perdirbant jas kepenyse. Kiekvienoje šio vaisto minkštojoje kapsulėje yra apytikriai 12 mg sorbitolio. Dozavimas ir vartojimo metodas. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta pakuotės lapelyje arba kaip nurodė gydytojas ar vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: 1 minkštoji kapsulė 1 kartą per parą. Minkštąją kapsulę reikia nuryti nesukramtytą užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio (geriausia stikline vandens). Jeigu simptomai išlieka po vaisto vartojimo dvi savaites, reikia kreiptis į gydytoją arba kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą.
LT-LIL-10-2025_MFLOW, 2025/12

ATGAUK RAMYBĘ IR RAMŲ MIEGĄ

ATMINČIAI IR PROTINEI VEIKLAI

-50 %

CLEAR BRAIN™, 60 tablečių ~~29²⁹~~ 14⁶⁵ €
CLEAR BRAIN™ MEGA, 30 tablečių ~~29⁹⁹~~ 15⁰⁰ €

MAISTO PAPILDAI

Rūkas galvoje? Sunku susikaupti? Pamirštate žmonių vardus? Smegenims reikia įvairių mitybinių medžiagų. „Clear Brain™“ tabletės gaminamos iš augalinių ekstraktų, B grupės vitaminų, jodo ir yra skirtos normaliai pažinimo funkcijai, protinei ir nervų sistemos veiklai palaikyti. Tai aktualu mokantis, norint per trumpą laiką įsiminti kiek galima daugiau informacijos ar tiesiog palaikyti normalią atminį ir smegenų veiklą. Tinka tiek jauniems, tiek vyresnio amžiaus žmonėms. Jodas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją ir nervų sistemos veiklą. Pantoteno rūgštis padeda palaikyti normalią protinę veiklą. Taip pat svarbu įvairi, subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

ŠVEDIŠKI VITAMINAI SMEGENIMS!

NERVINIAM NERAMUMUI LENGVINTI

NUO 5⁹⁹ €

SEDATIF PC
40 tablečių **5⁹⁹ €**
90 tablečių **9⁹⁹ €**

HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: Abrus precatorius 6 CH, 0,5 mg, Aconitum napellus 6 CH, 0,5 mg, Belladonna 6 CH, 0,5 mg, Calendula officinalis 6 CH, 0,5 mg, Chelidonium majus 6 CH, 0,5 mg, Viburnum opulus 6 CH, 0,5 mg. **Indikacijos:** nervinio neramumo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiesiems ir vaikams nuo 6 metų vartoti po 2 tabletes 3 kartus per parą. „Sedatif PC“ veiksmingumas ir saugumas vaikams iki 6 metų netirtas. Duomenų nėra, todėl vartoti nerekomenduojama. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** šio vaistinio preparato vaikams iki 6 metų vartoti nerekomenduojama. Negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharozės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2019-08.

ĮVEIK STRESĄ, KOL STRESAS NĖJVEIKĖ TAVĘS. „SEDATIF PC“

NUOVARGIO SUKELTŲ NERVINIŲ NEGALAVIMŲ LENGVINIMAS

8⁹⁹ €

NERVOHEEL N, 50 tablečių

HOMEOPATINIS NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų:*Acidum phosphoricum* D4 60 mg, *Strychnos ignatii* D4 60 mg, *Sepia officinalis* D4 60 mg, *Kalium bromatum* D4 30 mg, *Zincum isovalerianicum* D4 30 mg. **Terapinės indikacijos.** Nuovargio sukeltų nervinių negalavimų lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Dozavimas ir vartojimo metodas.**Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 m.:vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. 6–11 m. vaikams:vartoti po 1 tabletę 2 kartus per dieną. 2–5 m. vaikams:vartoti po 1 tabletę 1–2 kartus per dieną. Jaunesniems kaip 2 m. vaikams: vartoti po 1 tabletę 1 kartą per dieną. Tabletę lėtai ištirpinti burnoje. Ją reikia vartoti ne valgio metu. Vaikams tabletę galima susmulkinti ir ištirpinti nedideliame kiekyje vandens. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – *Lapp* laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.
Registruotojas. „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija).
Registruotojo atstovas. UAB „Farmahelis“.www.heel.lt.
Reklamos teksto parengimo data 2026-03-18.

7,99 €

STREPSILS
HONEY & LEMON, 1,2 mg/0,6 mg, 24 kietosios pastilės
MENTHOL & EUCALYPTUS, 1,2 mg/0,6 mg/8 mg, 24 kietosios pastilės
VITAMIN C, 1,2 mg/0,6 mg/100 mg, 24 kietosios pastilės

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 1,2 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio, 0,6 mg amilmetakrezolio, 100 mg askorbo rūgšties („Strepsils Vitamin C“) ir 8 mg levomentolio („Strepsils Menthol & Eucalyptus“). **Terapinės indikacijos**: lokalus simptominis ryklės uždegimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas**: „Strepsils Honey & Lemon“ ir „Strepsils Vitamin C“: *suaugusiesiems ir vyresniems nei 6 m. amžiaus vaikams bei paaugliams*: 1 kietoji pastilė kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 8 kietosios pastilės per 24 val. „Strepsils Menthol & Eucalyptus“: *suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. amžiaus vaikams bei paaugliams*: 1 kietoji pastilė kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 8 kietosios pastilės per 24 val. Vartoti į burną ir rykle. Kietajai pastilei leisti lėtai ištirpti burnoje. **Kontraindikacijos**: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šių vaistų medžiagai; jaunesniems nei 12 m. vaikams („Strepsils Menthol & Eucalyptus“); jaunesniems nei 6 m. vaikams („Strepsils Honey & Lemon“ ir „Strepsils Vitamin C“). **Specialūs įspėjimai**: dėl užspringimo pavojaus nerekomenduojama vartoti mažiems vaikams. Šių vaistų negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. „Strepsils Vitamin C“ sudėtyje yra azodažiklių – Ponso 4R (E124) ir saulėlydžio geltonojo (E110), kurie gali sukelti alerginių reakcijų. Jeigu pacientas yra alergiškas kviečiams (ši liga skiriasi nuo celiakijos), tuomet šių vaistų vartoti negalima. „Strepsils Honey & Lemon“ ir „Strepsils Vitamin C“ kvapiosios medžiagos sudėtyje yra citralio, citronelolio („Strepsils Vitamin C“ sudėtyje), d-limoneno, geraniolio ir linalolio. Citralis, d-limonenas, geraniolis ir linalolis gali sukelti alerginių reakcijų. „Strepsils Menthol & Eucalyptus“ kvapiosios medžiagos sudėtyje yra d-limoneno. D-limonenas gali sukelti alerginių reakcijų. Šių vaistų sudėtyje yra sieros dioksido (E220). Retais atvejais gali sukelti sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų ir bronchų spazmą. Reklamos tekto parengimo data 2026-09-10.

IMUNITETO ATSPARUMUI

IKI -50 %

BIOCINKAS, milteliai geriamajam tirpalui, 20 pakelių ~~10,99~~ **5,50 € -50 %**
BIOVITAMINAS D3, milteliai, 20 pakelių ~~7,39~~ **4,43 € -40 %**
IMMUNOHOT, milteliai karštam gėrimui, 6 pakeliai ~~8,39~~ **5,03 € -40 %**

MAISTO PAPILDAI
„Biofarmacijos“ lengvai pasisavinami miltelių formos papildai, sukurti kasdieniam imuniteto palaikymui ir organizmo atsparumui. Visi produktai gaminami iš aukštos kokybės žaliavų, be nereikalingų priedų, todėl puikiai tirpsta ir yra švelnūs skrandžiui.
„bioCinkas 30 mg“ – gryna cinko citrato forma imunitetui, odai ir ląstelių apsaugai. **„ImmunoHOT“** – augalinių ekstraktų ir mikroelementų kompleksas karštam gėrimui, skirtas šaltajam sezonui ir esant pirmiesiems peršalimo požymiams. **„bioVitaminas D3“** – lengvai pasisavinamas vitaminas D kaulams, imunitetui ir energijos balansui.
KURIAME TIK TAI, KO ORGANIZMUI IŠ TIESŲ TRŪKSTA.

GERKLĖS DIRGINIMUI, UŽKIMIMUI IR SAUSAM KOSULIUI MALŠINTI

-20 %

HERBISLAND
16 kietųjų pastilių ~~8,99~~ **7,19 €**
sirupas, 150 ml ~~8,29~~ **6,63 €**

MEDICINOS PRIEMONĖS
Be cukraus. Apelsinų skonio. Kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 3 mg islandinių kerpenų sausojo ekstrakto (Cetraria islandica (L.) Acharius s.l., thallus), atitinkančio 90–120 mg islandinių kerpenų. Tai yra tradicinis augalinis preparatas, rekomenduojamas ryklės ir burnos gleivinės dirginimui ir su tuo susijusiam sausam kosuliui palengvinti. „Herbisland“ mažina kosulio receptorių dirginimą ir drėkina sausą ryklės gleivinę. Pastilių dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams po 1 kietąją pastilę 8 kartus per dieną. Sirupo dozavimas: 1–4 m. vaikams – 2,5 ml (1/2 matavimo šaukšto) 4 kartus per dieną; 4–10 m. vaikams – 5 ml (1 matavimo šaukštas) 4 kartus per dieną; 10–16 m. vaikams – 10 ml (2 matavimo šaukštai) 4 kartus per dieną; 16 m. ir vyresniems žmonėms – 15 ml (3 matavimo šaukštai) 4 kartus per dieną.
PASAKYK „STOP“ SAUSAM KOSULIUI!

-30 %

AIDWISE
Skaitmeninis termometras kietu galiuku ~~7,39~~ **5,17 €**
Termometras be gyvsidabrio ~~5,39~~ **3,77 €**
MEDICINOS PRIETAISAI

GERKLEI

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**

HERBITASSIN®
MAISTO PAPILDAI, MEDICINOS PRIEMONĖ, MAISTAS
„Herbitassin®“ pastilės bei ledinukai su augaliniais ekstraktais ir vitaminu C – gerklei ir imunitetui. Islandinės kerpenos padeda palaikyti normalią gerklės ir balso stygų funkciją, vitaminas C – normalią imuninės sistemos veiklą. **„Herbitassin® Iceland moss HYDRO“** pastilės su hialuronu drėkina gerklės gleivinę, ramina gerklės skausmo jausmą, mažina sauso kosulio ir užkimimo simptomus.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

KOSULIUI LENGVINTI

7,99 €

STODAL, sirupas, 200 ml
HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: *Antimonium tartaricum* 6CH, 59,375 mg, *Bryonia* 3CH, 59,375 mg, *Coccuc cacti* 3CH, 59,375 mg, *Drosera* TM, 59,375 mg, *Ipeca* 3CH, 59,375 mg, *Myocarde* 6CH, 59,375 mg, *Pulsatilla* 6CH, 59,375 mg, *Rumex crispus* 6CH, 59,375 mg, *Spongia tosta* 3CH, 59,375 mg, *Sticta pulmonaria* 3CH, 59,375 mg. **Indikacijos:** kosulio lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms ir paaugliams po 15 ml matavimo taurelę 3–5 kartus per parą; vaikams (2–12 m.) po 5 ml matavimo taurelę 3–5 kartus per parą. Vaistinio preparato sudėtyje yra etanolio, todėl vaikams iki 2 m. vartoti negalima. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosiems arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** Šio vaistinio preparato sudėtyje yra 1,74 tūrio % etanolio (alkoholio). Vienoje 5 ml dozėje yra 0,069 g etanolio ir vienoje 15 ml dozėje yra 0,206 g etanolio. Kenksminga sergantiesiems alkoholizmu. Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir didelės rizikos grupės (pvz., sergantiesiems kepenų ligomis ar epilepsija) pacientams. Negalima ilgiau kaip savaitę vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams, nes sudėtyje yra etanolio. Vienoje 5 ml dozėje yra 3,75 g sacharozės ir vienoje 15 ml dozėje yra 11,25 g sacharozės. | tai reikia atsižvelgti gydant sergančiuosius cukriniu diabetu. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Teksto parengimo data 2018-11.
PRASIDEDA KOSULYS? VARTOK „STODAL“ IR JIS IŠNYKS!

VIRUSINIŲ PERŠALIMO LIGŲ SIMPTOMAMS LENGVINTI

NUO 8,99 €

OSCILLOCOCCINUM
vienadozės talpyklės, 6 piliulės **8,99 €**
vienadozės talpyklės, 30 piliulių **28,99 €**

HOMEOPATINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 dozėje (1 g) yra 0,01 ml laukinių ančių (Anas Barbariae) kepenų ir širdies ekstrakto 200K potencijos. **Indikacijos:** virusinių peršalimo ligų simptomų lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Jei ligos eiga sunkesnė, jai gydyti reikia naudoti klinikiniais tyrimais patikrintas priemones. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** dozė priklauso nuo ligos stadijos. Inkubacijos laikotarpiu ir kai tik atsiranda simptomų – 1 dozė. Kartoti 2 ar 3 kartus kas 6 valandas. Sergant – 1 dozė 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare) 1–3 paras. 1 dozės turinį suberti po liežuviu ir leisti ištirpti. Vartojimas vaikams: prieš vartojimą piliules ištirpinti vandenyje. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Taip pat tiems, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Teksto parengimo data 2018-11.
NELEISK PERŠALIMUI TAVĘS ĮVEIKTI! „OSCILLOCOCCINUM“!

NOSIES UŽGULIMUI MAŽINTI IR KASDIENEI PRIEŽIŪRAI

- 5 %

QUIXX®
MEDICINOS PRIEMONĖS
„Quixx®“ efektyviai mažina peršalimo, gripo ar alergijos sukeltą nosies ir sinusų užsikimšimą. Dozavimas. Kūdikiams (nuo 6 mėn.) ir vaikams: 1–2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2–3 kartus per dieną. Suaugusiesiems: 1–3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2–3 kartus per dieną. **„Quixx® Acute“** padeda mažinti dėl peršalimo, gripo, alergijų ar alerginio rinito sudirgusių nosies landų užsikimšimą. Vaikams nuo 3 m. ir suaugusiesiems. Vartokite iki 5 kartų per parą, kol vargina užsikimšusi nosis ar sausi nosies takai. **„Quixx® Extra“** su eukaliptų aliejumi, mažina nosies ir sinusų užsikimšimą peršalus ir sergant gripu, stimuliuoja nosies ertmių išsivalymą, suteikia stiprų gaivumo pojūtį. Dozavimas. Vaikams nuo 6 m.: 1–2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2–3 kartus per dieną. Suaugusiesiems ir paaugliams: 1–3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2–3 kartus per dieną. **„Quixx® Soft“** su alavijų ekstraktu – natūrali priemonė, drėkinanti jautrias nosies sieneles ir apsauganti nuo peršalimo sukeliamų nosyje jaučiamų simptomų. Dozavimas. Kūdikiams (nuo 6 mėn.) ir vaikams iki 5 m.: 1 įpurškimas į kiekvieną šnervę iki 4 kartų per dieną. Kūdikiams ir vaikams nuo 6 mėn. bei suaugusiesiems: prireikus 1–3 įpurškimai į kiekvieną šnervę kelis kartus per dieną. **„Quixx® Daily“** kruopščiai praskalauja nosį ir mažina bakterijų, virusų, alergenų bei žiedadulkių, kietųjų dalelių, dulkių kiekį. Vaikams nuo 2 m. ir suaugusiesiems. Vartokite iki 5 kartų per parą, kol vargina sausa ar sudirgusi nosies ertmė. **„Quixx® baby“** – mažylių nosies priežiūrai ir higienai nuo pirmosios gyvenimo dienos. Dozavimas. 1–3 lašai į kiekvieną nosies šnervę 2–6 kartus per dieną ar dažniau, jei reikia. Naujagimiams ir kūdikiams iki 3 mėn. rekomenduojama vartoti netiesiogiai, užlašinus ant vatos tamponėlio. Natūralios priemonės. Be konservantų LT_Qui_24_2024_V1_ pharma Reklama paruošta 2024 m. spalio mėn. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius
KVĖPUOK LENGVAI!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

PERŠALIMUI

NUO 5,99 €

COLDREX MAXGRIP

LEMON, 1000 mg/10 mg/40 mg milteliai geriamajam tirpalui, 5 pakeliai **5,99 €**
LEMON, 1000 mg/10 mg/40 mg milteliai geriamajam tirpalui, 10 pakelių **8,99 €**
MENTHOL & BERRIES, 1000 mg/10 mg/70 mg milteliai geriamajam tirpalui, 10 pakelių **8,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Terapinės indikacijos: trumpalaikis peršalimo ir gripo simptomų (karščiavimo, slogos ir skausmo) lengvinimas. **Vartojimo būdas:** suberti 1 paketėlio turinį į stiklinę, pripilti karšto vandens (maždaug 125 ml), gerai išmaišyti, kol milteliai ištirps. Pagal poreikį pripilti šalto vandens. **Dozavimas:** suaugusiesiems (įskaitant senyvo amžiaus) ir 16 m. bei vyresniems paaugliams, kurių svoris didesnis nei 54 kg: po 1 paketėlį kas 4–6 val., jei reikia. Didžiausia paros dozė – 4 paketėliai per 24 val. **Specialūs įspėjimai:** nevartokite kartu jokių kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio, taip pat vaistų nuo kosulio arba peršalimo, gripo ir nosies gleivinės paburkimo ar užgulusios nosies. Per didelės paracetamolio dozės gali sukelti sunkų kepenų pažeidimą. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti, jei: padidėjusi prostata arba Jums sunku šlapintis; sergate kraujagyslių liga, vadiname Reino (Raynaud) sindromu; sergate inkstų liga; yra letinis mitybos nepakankamumas; reguliariai vartojate alkoholį; sergate Žilbero (Gilbert) sindromu; vartojate kitų vaistų, kurie veikia kepenų funkciją; Jums trūksta fermento gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės; sergate hemolizine anemija; yra dehidratacija; esate senyvo amžiaus, suaugęs ar paauglys, kurio kūno svoris mažesnis nei 54 kg; yra šlapimo susilaikymas ar šlapimo takų akmenų; sergate astma arba Jums yra padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, pasireiškiantis bronchų spazmu; sergate sunkia infekcine liga, nes gali padidėti metabolinės acidozės rizika. Vartojant negalima gerti alkoholinių gėrimų dėl galimo kepenų pažeidimo.Nėštumo metu ir žindymo laikotarpiu vartoti negalima. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliosiems arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; padidėjęs kraujo spaudimas; padidėjęs skydliaukės aktyvumas; sergate cukriniu diabetu; sergate širdies liga; sergate uždaro kampo glaukoma; sergate feochromocitoma; sergate kepenų ar sunkia inkstų liga; esate nėščia ar žindote kūdikį; vartojate vaistų, mažinančių nosies paburkimą, slopinančių apetitą, vaistų nuo peršalimo ar apetitą didinančių vaistų; vartojate tokius vaistus depresijai gydyti kaip triciklius antidepresantus, betablokatorius arba monoaminooksidazės inhibitorius (MAOI) bei dvi savaites po MAOI vartojimo; jaunesniems kaip 16 m. vaikams ir paaugliams. **Reklamos teksto parengimo data** 2026-04-01.

IKI -50 %

VITAMIN C PROLONG, 40 kapsulių ~~12,99~~ 6,50 € -50 %
RUTIN FORTE + C, 30 kapsulių ~~12,99~~ 7,79 € -40 %

MAISTO PAPILDAI

„Vitamin C prolong“ kapsulėse yra prailginto veikimo patentuotas vitaminas Ester-C®. Moksliniai tyrimai rodo, kad patentuota Ester-C forma organizme išlieka iki 24 valandų, nedirgina skrandžio, nėra toksiška kepenims, lėčiau pasišalina iš organizmo. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, taip pat apsaugoti organizmą nuo oksidacinės pažaidos bei sumažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: **„Vitamin C prolong“** gerti po 1 kapsulę per dieną, užgeriant stikline vandens. **„Rutin forte+C“** sudėtyje yra rutozido, vitamino C, cinko ir seleno. Normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių funkcijai, susidarymą padeda palaikyti vitaminas C. Normalią imuninės sistemos veiklą padeda palaikyti vitaminas C, cinkas ir selenas. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną.

9,99 €



ACTIFED®, 60 mg/2,5 mg, 12 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tabletėje yra 60 mg pseudoefedrino hidrochlorido ir 2,5 mg triprolidino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** nosies ir viršutinių kvėpavimo takų gleivinės užburkimo mažinimas; nosies tekėjimo ir čiaudulio slopinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: po 1 tabletę kas 4–6 val., iki 4 kartų per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; pacientai, kurie per pastarąsias 14 dienų vartojo monoaminooksidazės inhibitorių; širdies ir kraujagyslių ligos; sunki hipertenzija arba jeigu hipertenzija nesureguliuota skiriant vaistų; sunki ūminė ar lėtinė inkstų liga arba inkstų nepakankamumas; cukrinis diabetas; feochromocitoma; hipertirozė; uždaro kampo glaukoma; kitų simpatomimetinių gleivinės paburkimą mažinančių vaistų ir beta blokatorių vartojimas; vaikai iki 12 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Actifed“ gali sukelti mieguistumą. Nevartoti kartu alkoholio. „Actifed“ vartojimą reikia nutraukti, jei pasireiškia šie sutrikimai: haliucinacijos, neramumas, miego sutrikimai, karščiavimas ir išplitusi raudonė su smulkiais pūlinėliais, staigus regos netekimas arba regos aštrumo sumažėjimas, staigus pilvo skausmas, kraujavimas iš išangės ar kiti išeminio kolito simptomai. Nedelsdami nutraukite „Actifed“ vartojimą ir kreipkitės skubios medicinos pagalbos, jeigu pasireikštų stiprus, staiga prasidėjęs galvos skausmas, pykinimas, vėmimas, sumišimas, traukuliai, pakitusi rega. Ligoniai, sergantys kepenų liga, vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimu, „Actifed“ turėtų vartoti atsargiai. Vaistas negali būtų vartojamas vaikams raminti. „Actifed“ tablečių sudėtyje yra laktozės. Reklamos teksto parengimo data 2026-03-12. LT-ACF-2026-309012.

5,99 €

LARYXIN

LEMON, 5 mg/1 mg, 24 suslėgtosios pastilės
MENTHOL, 5 mg/1 mg, 24 suslėgtosios pastilės
STRAWBERRY, 5 mg/1 mg, 24 suslėgtosios pastilės

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Sudėtis: 1 suslėgtojoje pastilėje yra 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido ir 1 mg lidokaino hidrochlorido monohidrato. **Terapinės indikacijos:** gerklės skausmo simptomų malšinimas suaugusiesiems ir 12 m. bei vyresniems paaugliams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** leiskite pastilei lėtai ištirpti burnoje. Suaugusiesiems – po 1 pastilę kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 10 pastilių per dieną. 12–18 m. paaugliams – po 1 pastilę kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 5 pastiles per dieną. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 5 dienas iš eilės. **Kontraindikacijos:** alergija chlorheksidinui, lidokainui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jaunesniems kaip 12 m. vaikams ir paaugliams. **Specialūs įspėjimai:** vaistą vartokite tik trumpą laiką skausmui ir dirginimui malšinti. Kreipkitės į gydytoją, jei per 3–4 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba karščiuojate, skauda galvą, pykina, vemiate ar atsiranda odos išbėrimas. Jeigu esate alergiški kitiems vieteniams amidų grupės anestetikams, pavyzdžiui, lidokainui, turite laikytis saugumo priemonių. Vartojant didesnes nei rekomenduojama dozes, gali sumažėti rijimo reflekso valdymas. Dėl to gali padidėti skysčių ir maisto dalelių įkvėpimo rizika. Nevartokite tuo pačiu metu, prieš pat ar iš karto po kitų burnos ir (arba) gerklės dezinfekavimo priemonių. „Laryxin Lemon“ suslėgtųjų pastilių sudėtyje yra sorbitolio (fruktozės šaltinis, taip pat gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurius laisvinantį poveikį), aspartamo (fenilalanino šaltinis, gali būti kenksmingas sergantiesiems fenilketonurija), benzilo alkoholio (gali sukelti alerginių reakcijų), maltodekstrino (jis skaidomas į gliukozę) ir natrio (dėl mažo kiekio jis beveik neturi reikšmės). „Laryxin Menthol“ suslėgtųjų pastilių sudėtyje yra sorbitolio ir levomentolio (duodant vartoti mažiems vaikams, kuriems ankščiau yra buvę traukulių, reikia laikytis saugumo priemonių). „Laryxin Strawberry“ suslėgtųjų pastilių sudėtyje yra sorbitolio, maltodekstrino, levomentolio ir natrio (dėl mažo kiekio jis beveik neturi reikšmės).

4,99 €

DR.THEISS HUSTICUM, sirupas, 1 g/ 50 mg, 100 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: 1 g (0,8 ml) sirupo yra 50 mg veikliosios medžiagos – gysločių ekstrakto (1:1). **Indikacijos:** tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas burnos ar ryklės dirginimui ir sausam kosuliui lengvinti. **Vartojimas:** 3-6 metų amžiaus vaikams po 2,5 ml 4–6 kartus per dieną vienodais intervalais.6–12 metų amžiaus vaikams po 5 ml 4–6 kartus per dieną vienodais intervalais. 12–18 metų paaugliams, suaugusiesiems ir senyviems žmonės gerti po 15 ml 4–6 kartus per parą vienodais intervalais. **Poveikis:** Gyslotyje esantys glikozidai aukubinas ir katalpolis slopina uždegimą. Dėl specifinio tiesioginio poveikio gleivinėms labai tinka nuo gerklės dirginimo ir sauso kosulio peršalus. Gyslotis padeda stiprinti imunitetą ir suaktyvinti organizmą – tinka peršalus kaip pirmas vaistas. Esant sausam kosuliui, ryklės dirginimui – lengvina atsikosėjimą, slopina uždegimą. Esant drėgnam kosuliui – skystina tirštą sekretą. Gyslotyje yra bakterijų dauginimąsi slopinančių junginių – padeda gydyti bronchitą. Informacinis lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2019.02.15

NUO PERŠALIMO

NUO 4,99 €

DALERON COLD3

12 plėvele dengtų tablečių **4,99 €**
24 plėvele dengtos tabletės **8,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido ir 15 mg dekstrometorfano hidrobromido. **Terapinės indikacijos.** Peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, sąnarių, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Įprasta dozė suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vaikams yra 2 tabletės. Tokią dozę galima gerti daugiausia 4 kartus per parą. Tarp dozių vartojimo turi būti praėjusios mažiausiai 4 valandos. Didžiausia paros dozė yra 8 tabletės. **Kontraindikacijos, specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Sunki hipertenzija ar išeminė širdies liga. Vartojama MAO inhibitorių, guanetidino arba jo darinių, beta blokatorių arba vartojama kitų vaistinių preparatų, kuriuose yra paracetamolio. Sunkus kepenų arba inkstų funkcijos sutrikimas. Kartu vartojama kitų kraujagysles sutraukiančių vaistinių preparatų nosies gleivinės paburkimui mažinti, įskaitant vartojamus per burną ar į nosį. Ankščiau persirgtas miokardo infarktas, buvęs insultas arba šiuo metu esantys insulto rizikos faktoriai. Sergama lėtiniu alkoholizmu, glaukoma, feochromocitoma, sistemine raudonąja vilklige, cukriniu diabetu, hipertiroidizmu ar badaujama. Esant prostatos padidėjimui ar ankščiau buvę traukuliai. Reklamos teksto parengimo data: 2023 10 17.

PRADĖDA VEIKTI JAU PER 20 MINUČŲ!

-30 %

SILVANOLS

MAISTO PAPILDAI

„Atmosil“ – kvėpavimo takų komfortui: pušų, gebenių ir bosvelijų ekstraktai padeda palaikyti normalią bronchų bei kvėpavimo takų funkciją, o produkto sudėtis papildyta vertingais flavonoidais bei augalinės kilmės medžiagomis – kvercetinu, resveratroliu, likopenu ir astaksantinu.
„Silvadep“ kapsulės – augalinės kilmės maisto papildas suaugusiesiems, skirtas emocinei pusiausvyrai ir bendrai savijautai palaikyti.
„Faringospray KIDS“ – **NAUJIENA!** Gerklės purškalas vaikams su čiobreliais ir liepžiedžiais. Čiobreliai ir liepžiedžiai padeda palaikyti normalią gerklės, ryklės ir burnos ertmės būklę. Vaikams nuo 4 metų. Be etanolio. Be konservantų. Be dirbtinių dažiklių.
„Faringospray“ ir „Faringospray Orange“ – gerklės purškalas su šaltalankiais ir medetkomis normaliai kvėpavimo takų veiklai. Klasikinio arba apelsinų skonio. Nuo 12 metų. Be etanolio. Be konservantų. Be dirbtinių dažiklių.
„Faringo Lollipops“ – šaltalankių ledinukai su vitaminu C. Šaltalankiai padeda palaikyti normalią gleivinių būklę. Vitaminas C palaiko tinkamą imuninės sistemos veiklą. Be konservantų. Be dirbtinių dažiklių.
„Faringo SOFT“ – minkštosios gerklės pastilės su šaltalankių aliejumi, hialurono rūgštimi, vaistinėmis sviražolėmis, vitaminais B2, C ir biotinu. Vaikams nuo 4 metų ir suaugusiesiems. Be cukraus. Be laktozės.
„Laringospray“ – gerklės purškalas su propoliu ir medetkų žiedų tinktūra. Nuo 12 metų. Be dirbtinių dažiklių.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

Dovana sveikatai

VAISTINĖ

Daugiau informacijos bei vaistinių, kuriose negalima įsigyti dovanų kuponų ir jais atsiskaityti, sąrašą rasite
www.nvaistine.lt

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**

AMBIO
VIRŠKINIMO FERMENTAI, 12 kramtomųjų tablečių **4⁹⁹ €**
MAISTO PAPILDAS

IKI **-40%**

LINEX®
MAISTO PAPILDAI
Vienoje **„Linex® Complex“** kapsulėje yra 10 mlrd. geriausiai iki šiol pasaulyje moksliškai ištirtų gyvų *Lactobacillus rhamnosus GG* bakterijų, taip pat – vitaminų B1, B2, B6 ir cinko. Vienoje **„Linex® Forte“** kapsulėje yra 2 mlrd. gerai žinomų ir moksliškai ištirtų gyvų *Lactobacillus acidophilus*, DSM 13241 ir *Bifidobacterium animalis* subsp. lactis, DSM 15954 bakterijų. Viename **„Linex® Kids“** paketėlyje arba 6-iuose **„Linex® Baby“** lašuose yra 1 mlrd. *Bifidobacterium animalis* subsp. lactis, DSM 15954 bakterijų. **Vartojimas: „Linex® Complex“** suaugusiesiems ir vyresniems nei 6 m. vaikams gerti po 1–2 kapsules per dieną. **„Linex® Forte“** suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams gerti po 1 kapsulę 1–3 kartus per dieną; 3–12 m. vaikams – po 1 kapsulę 1–2 kartus per dieną. **„Linex® Kids“** kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – po 1 paketėlį 1 kartą per dieną. **„Linex® Baby“** naujagimiams, kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – po 6 lašus 1 kartą per dieną. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS260101069672. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.
KOKYBĖ, KURIA GALIMA PASITIKĖTI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

NUO PILVO PŪTIMO

-20%

SIMETIGAST FORTE, SIMETIGAST FORTE BABY
MEDICINOS PRIEMONĖS
„SIMETIGAST FORTE“ 240 mg kapsulės (simetikonas) skirtos vartoti vyresniems nei 12 m. pacientams, esant pilvo pūtimui, pilnumo jausmui pilve, raugėjimui. Taip pat galima naudoti prieš pilvo ertmės diagnostines procedūras, nes tai pagerina vaizdų kokybę. Vartoti: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. amžiaus jaunuoliai – po 1 kapsulę 2–3 kartus per parą. Prieš diagnostines procedūras: 1 kapsulė vakare dieną prieš tyrimą ir 1 kapsulė ryte tyrimo dieną. „SIMETIGAST FORTE BABY“ geriamieji lašai (simetikonas) skirti kūdikiams nuo 28-os gyvenimo dienos ir vaikams iki 12 metų. Vartoti: kūdikiams (nuo 28-os gyvenimo dienos) ir vaikams iki 2 metų 3 lašai prieš, per ar po kiekvieno valgio. Negalima vartoti daugiau kaip 18 lašų per dieną.
GREITOJI PAGALBA IŠPŪSTAM PILVUI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-20%

IBESAN, 60 kietųjų kapsulių ~~23⁹⁹~~ 19¹⁹ €
MEDICINOS PRIEMONĖ
Dirgliosios žarnos sindromui mažinti.
Kapsulės nuo dirgliosios žarnos sindromo palengvina simptomus, atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi pilve. Malšina skausmingus žarnyno spazmus ir pilvo pūtimą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos. Sumažina pilvo skausmą pacientams, sergantiems dirgliosios žarnos sindromu, esant viduriavimui. Normalizuoja peristaltiką, mažina skausmą, padeda išvengti žarnyno nepraeinamumo. Rekomenduojama vaikams nuo 12 m. ir suaugusiesiems.

IBESAN FORTE, 60 kapsulių ~~19⁹⁹~~ 15⁹⁹ €
SPECIALIOSIOS MEDICININĖS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAS
Sviesto rūgšties turintis specialiosios medicininės paskirties maisto produktas.
2 kapsulėse yra 600 mg natrio butirato.
Tik mitybai reguliuoti, esant:
- funkciniams viršikinimo trakto sutrikimams: pilvo skausmams ir pūtimui, viduriavimui, vidurių užkietėjimui, funkcinei dispepsijai;
- dirgliosios žarnos sindromui (IBS);
- žarnyno floros sutrikimams po antibiotikų terapijos;
- divertikulinei storosios žarnos ligai;
- būklėms po viršikinimo trakte atliktų diagnostinių ir chirurginių procedūrų.

Rekomenduojama vaikams nuo 7 m. ir suaugusiesiems.

NUO SPAZMINIO SKAUSMO

NUO **6⁹⁹ €**

NO-SPA
40 mg, 24 tabletės **6⁹⁹ €**
40 mg, 24 plėvele dengtos tabletės **7⁴⁹ €**
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje ir plėvele dengtoje yra 40 mg drotaverino hidrochlorido. **Indikacijos:** Lygiųjų raumenų spazmams, susijusiems su tulžies latakų ligomis (tulžies pūslės ir (arba) latakų akmenligė, tulžies pūslės ir (arba) šalia jos esančių audinių, tulžies latakų ar didžiojo dvylikapirštės žarnos spenelio uždegimas), šalinti. Inkstų ir (arba) šlapimtakių akmenligės, inkstų geldelių ar šlapimo pūslės uždegimo sukelto šlapimo takų lygiųjų raumenų spazmams šalinti, mėšlungiškam norui šlapintis slopinti. Kaip pagalbinis gydymas šalinant skrandžio ir žarnyno lygiųjų raumenų spazmus, jei yra skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa, skrandžio, plonosios ar storosios žarnos uždegimas, įskrandžio ir prievarčio spazmas bei esant skausmingoms mėnesinėms. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** reikia vartoti po 1–2 tabletes 1–3 kartus per parą. Įprastinė suaugusio žmogaus paros dozė yra 3–6 tabletės. **Kontraindikacijos:** alergija drotaverinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Sunkus kepenų, inkstų ir širdies nepakankamumas. Negalima vartoti jauneseniems kaip 1 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** vaikams ir paaugliams iki 18 m. vartoti NO-SPA nerekomenduojama. Jei kraujospūdis mažas, vaistą reikia vartoti labai atsargiai. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Drotaverino vartojant su levodopa, mažėja pastarojo vaisto poveikis parkinsonizmui, todėl stiprėja drebulys ir raumenų stingulys. Teksto parengimo data 2025-06. 2602_SB_No-spa_V01_LT
PILVO SKAUSMAS? GYDYKITE JĮ TINKAMAI SU „NO-SPA“

VIRŠKINIMO SISTEMAI

NUO **6⁹⁹ €**

GUTTALAX
7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 15 ml **6⁹⁹ €**
7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml **10⁹⁹ €**
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
1 ml tirpalo (15 lašų) yra 7,5 mg natrio pikosulfato. **Indikacijos.** „GuttaLax“ vartojamas, jei pacientas yra varginamas vidurių užkietėjimo; yra būklė, kai reikia palengvinti tuštiniąsi. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** „GuttaLax“ geriamas vakare. Suaugusiesiems ir vyresniems nei 10 m. vaikams: 10–20 lašų per parą. 4–10 m. vaikams: 5–10 lašų per parą. Vartoti per burną. Rekomenduojama gydymą pradėti nuo mažiausios dozės. Didžiausios rekomenduojamos paros dozės viršyti negalima. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; žarnų nepraeinamumas ar obstrukcija; stiprus pilvo skausmas ir (arba) karščiavimas dėl ūminės pilvo būklės (pvz., apendicito), galimai susijęs su pykinimu, vėmimu; ūminė uždegiminė žarnų liga; sunki dehidratacija; jaunesni kaip 4 m. vaikai; retos paveldimos būklės, kurios gali būti nesuderinamos su preparato pagalbine medžiaga. **Specialūs įspėjimai.** Nenustačius vidurių užkietėjimo priežasties, negalima vartoti nepertraukiamai kasdien ar ilgai. „GuttaLax“ pavartojusiems žmonėms buvo galvos svaigimo ir (arba) sinkopės atvejų. Vaikams be gydytojo nurodymo „GuttaLax“ vartoti negalima. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas fruktozės netoleravimas. Nevartokite šio vaisto norėdami numesti svorio. Teksto peržiūros data 2024-12. 2603_SB_Guttalax_V01_LT.
UŽKIETĖJUS VIDURIAMS VEIKIA PATIKIMAI IR NIEKAM NEPASTEBINT.

1+1 Perkant vieną pakuotę, antrą pigesnė arba tokia pati — **NEMOKAMAI!**

GASTROVAL
MAISTO PAPILDAI
NAUJIENA: **GASTROVAL MAX** – 4 kartus stipresnė augalinė formulė!
„Gastroval MAX“ – augalinių fermentų, ekstraktų ir prebiotiko kompleksas, padedantis palaikyti:
sklandų virškinimą;
lengvumo pojūtį po valgio;
žarnyno mikrofloros balansą;
normalų virškinimą tiems, kurie patiria stresą.
GASTROVAL FLUXUS padeda palaikyti skrandžio rūgštingumo pusiausvyrą dėl sudėtyje esančių: augalų sėklų ir šaknų ekstraktų, magnio, virškinimo fermentų, bifido- bei lakto bakterijų, inulino.
GASTROVAL HEPAR FORMULA – tik 1 kapsulė per dieną! Geresnio pasisavinimo augalinė formulė – rimtesnė kepenų apsauga nuo oksidacinės pažaidos, kepenų ląstelių regeneracija, organizmo valymo funkcija, normalaus cholesterolio lygio palaikymas. „Gastroval“ supranta, ko reikia virškinimui, skrandžio rūgštingumui, kepenų veiklai.
GASTROVAL FORTE – stiprus net 7 augalinės kilmės fermentų ir augalinių ekstraktų derinys virškinimui. Sudėtyje yra didesnis kiekis fermentų – kai reikia stipresnės pagalbos.
GASTROVAL sudėtyje – augalinių fermentų ir ekstraktų derinys, kurio naudą lengva pajusti.
GASTROVAL supranta, ko reikia virškinimui, kepenų veiklai, skrandžio rūgštingumui.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-15%

SYMBIOSYS® ALFLOREX™, 30 kapsulių ~~26⁹⁵~~ 22⁹¹ €
SYMBIOSYS® ALFLOREX+™, 30 kapsulių ~~25⁵⁹~~ 21⁷⁵ €
MAISTO PAPILDAI
Virškinimui subalansuoti.[1]
Bifidobacterium longum 35624® padermės bakterijos
[1]Kalcis padeda palaikyti normalų virškinimo fermentų veikimą.
Tik 1 kapsulė per dieną užgeriant stikline vandens mažiausiai 4 savaites. **Vartoti neatsižvelgiant į valgymą bet kuriuo paros metu.**
Reklamos teksto parengimo data: 2025-01-15. ID e8aceeeb
SUKURTA KARTU SU MOKSLININKAIS.

NUO 4,29 €

DOLMEN

25 mg, 10 plėvės dengtų tablečių **4,29 €**
25 mg, granulės geriamajam tirpalui, 10 paketėlių **4,79 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliojo medžiaga. Dekseketoprofeno trometamolis (dexketoprofenum). Vienoje plėvės dengtoje tabletėje, granulių geriamajam tirpalui paketėlyje arba geriamojo tirpalo paketėlyje yra 25 mg dekseketoprofeno. **Vaisto forma.** Plėvės dengtos tabletės, granulės geriamajam tirpalui arba geriamasis tirpalas paketėlyje. **Pakuotė.** Po 10 tablečių, po 10 paketėlių granulių arba po 10 geriamojo tirpalo paketėlių. **Indikacijos.** „Dolmen" vartojamas trumpaalikiam simptominiam lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų, sąnarių ir kaulų skausmui, skausmingoms mėnesinėms (dismenorėjai), dantų skausmui malšinti. **Dozavimas.** Atsižvelgiant į skausmo priežastis ir intensyvumą, rekomenduojama gerti: po 1 tabletę arba paketėlį 1–3 kartus per parą kas 8 valandas. Didžiausia paros dozė neturi būti didesnė kaip 3 tabletės arba paketėliai. Jei esate senyvo amžiaus ar sergate inkstų, kepenų ligomis, pradėkite vartoti ne daugiau kaip 2 tabletes arba paketėlius per parą. Reikia vartoti mažiausią veiksmingą dozę ir ją vartoti kuo trumpiau, kiek tai būtina simptomams palengvinti. Jeigu sergate infekcine liga ir jums pasireiškiantys simptomai (pvz., karščiavimas ir skausmas) neišnyksta arba sunkėja, nedelsdami pasitarkite su gydytoju. **Vartojimo būdas.** Jei vartojate granules, visą paketėlio turinį ištirpinkite stiklinėje vandens ir išmaišykite. Išgerikite iš karto. Geriamasis tirpalas paketėlyje gali būti geriamas tiesiai iš paketėlio. Jeigu jaučiate intensyvų skausmą ir reikia ji greičiau nuslopinti, vaistą vartokite prieš valgymą (ne vėliau kaip prieš 15–30 min.). Poveikis prasideda praėjus 30 min. po vaisto pavartojimo. Skausmą malšinantis poveikis trunka 4–6 valandas. Šio vaisto neturėtų vartoti vaikai ir jaunesni kaip 18 m. paaugliai. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas dekseketoprofenui, kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aspirinui; vartojant ketoprofeno ar fibratų buvę fotoalerginės ar fototoksinės reakcijos; pepsinė opa, buves kraujavimas iš virškinamojo trakto, letiniai virškinimo sutrikimai bei letinės virškinamojo trakto ligos; sunkus širdies nepakankamumas, vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų funkcijos, sunkus kepenų veiklos sutrikimas; esant sunkiai dehidratacijai; nėštumas bei žindymo laikotarpis. **Įspėjimai.** Vaistą atsargiai turi vartoti vyresnio amžiaus ligoniai, sergantys alergija, astma, širdies, inkstų, kepenų ligomis, hipertenzija, sistemine raudonoja vilkėlige, cukriniu diabetu, įvairiomis jungiamojo audinio ligomis, sutrikus kraujodarai; vartojant šlapimo išsiskyrimą skatinančios vaistus ar netekus daug skysčių. Pasitarkite su gydytoju, jei vartojate kitų vaistų; geriamąjį stemdinį, nuo depresijos, apsaugančių nuo kraujo krešumo. „Dolmen" geriamojo tirpalo paketėlyje ir granulių geriamajam tirpalui paketėlyje yra sacharozės, todėl, jeigu gydytojas jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti „Dolmen" granules geriamajam tirpalui ar geriamąjį tirpalą paketėlyje. | Tai turėtų atsižvelgti pacientai, sergantys cukriniu diabetu. Dekseketoprofenas gali paslėpti tokius infekcijų požymius kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl vartojant šį vaistą gali būti veluojama pradėti tinkamą gydymą, o dėl to gali padidėti komplikacijų rizika. Tokių atvejų nustatyta gydant bakterijų sukeltą pneumoniją ir su vėjaraupiais susijusias bakterines odos infekcijas. Jeigu vartojate šį vaistą sirgdami infekcine liga ir jums pasireiškiantys infekcijos simptomai neišnyksta arba sunkėja, nedelsdami pasitarkite su gydytoju. Sergant vėjaraupiais, šio vaisto patartina vengti.

NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO

NUO 2,49 €

APAP

500 mg, 12 plėvės dengtų tablečių **2,49 €**
500 mg, 24 plėvės dengtos tabletės **4,49 €**
250 mg granulės paketėlyje, vaikams, 10 paketėlių **6,99 €**
EXPRESS, 500 mg, 10 minkštųjų kapsulių **2,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 plėvės dengtoje tabletėje „APAP, 500 mg" yra 500 mg paracetamolio. 1 minkštojoje kapsulėje „APAP express, 500 mg" yra 500 mg paracetamolio. 1 paketėlyje „APAP 250 mg , vaikams" yra 250 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos:** lengvo ar vidutinio skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** „Apap express, 500 mg" minkštosios kapsulės: suaugusiesiems ir paaugliams, sveriantiems daugiau kaip 55 kg (nuo maždaug 15 metų) 1–2 minkštosios kapsulės (500–1 000 mg) vienu metu, ne daugiau kaip 6 kapsulės (didžiausia paros dozė– 3 000 mg) kas 24 val. „Apap, 500 mg" plėvėle dengtos tabletės: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1–2 tabletes kas 4–6 val., ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. „Apap, 250 mg, vaikms" granulių paketėliuose vienkartinė dozė yra 10–15 mg/kg kūno svorio vyresniems nei 4 m. vaikams, ją vartoti ne dažniau kaip kas 4 val. (didžiausia paros dozė – 4 paketėliai). Granules supilti tiesiai į burną ant liežuvio ir praryti neužgėrus vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas paracetamoliui, žemės riešutams ar sojai, arba bet kuriai vaisto sudėtyje esančiai pagalbinei medžiagai. Sunkus inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai:** prieš vartojima pasitarti su gydytoju ar vaistininku, jeigu: yra inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka; piktnaudžiaujantiems alkoholiu; dehidratuotiems arba nuolat blogai besimaitinantiems; sergantiems astma; vartojami kai kurie kiti vaistai; nėštumo ir žindymo laikotarpis; hemolizinė anemija. Gydantis šiais vaistiniais preparatais alkoholio vartoti negalima. Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. **Teksto parengimo data:** 2025-03-31.

„APAP" – IR TU VĖL SAVO VĖŽĖSE.

5,99 €

VOLTAREN AKTI

25 mg, 10 minkštųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga: diklofenako kalio druska. **Terapinės indikacijos**: trumpalaikis nesunkaus ir vidutinio sunkumo skausmo (pvz., galvos, dantų, mėnesinių, nugaros, sąnarių ir raumenų), peršalimo ir gripo simptomų, įskaitant karščiavimą, malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas**: suaugusiesiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: pradinė dozė – 1 kapsulė, vėliau vartoti po 1 kapsulę kas 4–6 val., jeigu reikia. Nevartokite daugiau kaip 3 kapsulių per 24 val. Vartoti ne ilgiau kaip 5 paras skausmui malšinti ir ne ilgiau kaip 3 paras karščiavimui mažinti. **Kontraindikacijos**: alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitiems vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo, širdies ligos, galvos smegenų kraujagyslių liga, sutrikusi kraujotaka, skrandžio ar žarnyno opa, sunkus inkstų ar kepenų nepakankamumas, kraujavimas iš virškinimo trakto arba jo prakiurimas, paskutinis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai**: šalutinį poveikį galima sumažinti, vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką. Pasitarkite su gydytoju, jeigu kada nors turėjote virškinimo trakto sutrikimų, sergate ar sirgote žarnyno ligomis, yra pasireiškęs nemalonus pojūtis skrandyje ar rėmuo, neseniai atlikta arba bus atliekama skrandžio arba žarnyno operacija, vartojate kitų vaistų nuo skausmo ar uždegimo, sergate bronchų astma arba šienlige, kepenų ar inkstų ligomis, sergate arba sirgote širdies liga arba yra padidėjęs kraujospūdis, brinksta pėdos, esate netekę daug skysčių, yra kraujavimo sutrikimų ar kitų kraujo sutrikimų, rūkote, sergate diabetu, yra padidėjęs cholesterolio ar trigliceridų kiekis. Senyviems pacientams labai svarbu skubiai pranešti gydytojui apie pastebėtus šalutinius poveikius. Tabletėje sudėtyje yra laktozės ir natrio, kapsulių sudėtyje yra sorbitolio ir manitolio. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-03. Prekių ženklai priklauso „Haleon" arba „Haleon" turi jų licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas.

SKAUSMUI MALŠINTI

3,99 €

NEOASKOFENAS, 200 mg/200 mg/40 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 200 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg paracetamolio ir 40 mg kofeino. **Terapinės indikacijos:** vaistas vartojamas silpno ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių ir menstruaciniam skausmui malšinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Tabletes reikia vartoti nekramtant, užgeriant ne mažiau kaip 250 ml vandens. Atsižvelgiant į ligos sunkumą, vartoti po 1 tabletę 1–4 kartus per dieną. Didžiausia paros dozė – 4 tabletės. Negalima vaisto gerti dažniau kaip kas 6 valandas. Skausmui malšinti vaisto galima vartoti ne ilgiau kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, esanti ar buvusi virškinimo trakto opa ir (arba) kraujavimas iš virškinimo trakto, buvusi bronchų astma, kurią sukėlė salicilatai ar kitokie nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, pacientas jaunesnis negu 12 metų, trys paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas, ligos, kurių metu yra padidėjęs kraujavimo pavojus, kraujo krešėjimo sutrikimas, vartojama 15 mg ar didesnė metotreksato savaitės dozė, sunkus širdies, kepenų, inkstų nepakankamumas, labai sunki padidėjusio kraujo spaudimo liga, kamuoja nemiga, padidėjęs nervingumas, dirglumas, nerimas, baimė, sujaudinimas ar kiti panašūs simptomai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergama podagra, bronchų astma, kolagenozėmis ar kraujodaros sistemos ligomis, sustiprėjusi skydliaukės veikla ar sergama cukriniu diabetu, yra virškinimo trakto, inkstų, kepenų ar širdies funkcijos sutrikimų, yra buvusi alergija kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, planuojama chirurginė operacija, pacientas jaunesnis kaip 16 metų ir serga virusinėmis ligomis, pacientas yra senyvas, planuojama pastoti, atsiranda šlapimo pakitimų, pasireiškia pabrinkimų ar skausmas juosmens srityje, pagelsta oda ar akys, pasireiškia bendras silpnumas, yra nerimo sutrikimas, nemiga. Sudėtyje esantis kofeinas gali sukelti drebulį, dažną širdies plakimą, viduriavimą, susijaudinimą, stiprų širdies plakimą, nemigą, galvos skausmą, raumenų trūkčiojimą ir šlapimo išsiskyrimo padidėjimą. **Reklamos teksto parengimo data** 2026.09.08.

SKAUSMUI IR KARŠČIAVIMUI MAŽINTI

5,99 €

EFFERALGAN

30 mg/ml, geriamasis tirpalas (žemuogių skonio), 90 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: 1 ml geriamojo tirpalo yra 30 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos.** Trumpalaikis karščiavimo mažinimas, lengvo ir vidutinio stiprumo skausmo malšinimas. **Vartojimo metodas ir dozavimas...** *Efferalgan", 30 mg/ml, geriamasis tirpalas vaikams:* vartoti per burną. Galima gerti atskirai arba atskiesto trupučiu skysčio. Šis geriamasis tirpalas tinka tik 3–32 kg svorio (maždaug nuo gimimo iki 12 metų amžiaus) vaikams. Vaikams paracetamolio dozuojamas pagal kūno svorį. Leidžiama maksimali paracetamolio paros dozė yra 60 mg/kg. Ji išgeriama per 4–6 kartus lygiais intervalais (t. y. po 15 mg/kg kas 6 val. arba po 10 mg/kg kas 4 val.). Vaikui jo reikia vartoti lygiais intervalais dieną ir naktį. Pakuotėje yra geriamasis dozavimo švirkštas su skale, kuri yra sugraduota pagal vaiko svorį kilogramais (dozuojant švirkštu paracetamolio dozė yra 15 mg/kg). 3-16 kg vaikams – pripilti geriamąjį matavimo švirkštą iki jo kūno svorį atitinkančios ar artimiausios žymos. 16–32 kg vaikams pripilde geriamąjį švirkštą vieną kartą (maksimali švirkšto riba – 16 kg), ištraukite tuikstamą kiekį, vaikui duokite gerti visa per abu kartus ištraukta dozę. Prireikus kartoti dozę po 6 val. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliojai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Sunkus kepenų nepakankamumas ir dekompensuotos aktyvios kepenų ligos. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Patikrinkite, ar pacientas nevartoja kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio. Atsargumo priemonių reikia pacientams, sergantiems lengvu ar vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumu, įskaitant Žilberto sindromą; pacientams, sergantiems sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu; pacientams, kai yra ilgalaikė bloga mityba, anoreksija, kacheksija, bulimija, badavimas; kai yra gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės stoka; kai yra dehidratacija, hipovolemija. Ilga laiką (> 3 mėnesius), kas dvi dienas ar dažniau, vartojant skausmą malšinančių vaistų pacientams, sergantiems letiniu galvos skausmu, gali atsirasti arba paūmėti galvos skausmas, kuris neturi būti gydomas didinant dozę. Paracetamolis gali sukelti sunkių odos reakcijų, kurios gali būti mirtinos. Įtariant piroglutamato acidozės sukeltą PATMA, rekomenduojama nedelsiant nutraukti paracetamolio vartojimą ir atidžiai stebėti. *Tik „Efferalgan", 30 mg/ml, geriamasis tirpalas vaikams:* vartojant didesnę nei rekomenduojamą paracetamolio dozę, kyla labai rimto kepenų pažeidimo pavojus. Sudėtyje yra sacharozės. Būtina atsižvelgti sergantiems cukriniu diabetu arba besilaikantiems dietos, kurioje yra mažai angliavandenių. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Sudėtyje yra propilenglikolio. Vartojimas su bet kokiu alkoholdehidrogenazės substratu, pavyzdžiui, etanoliu, naujagimiams gali sukelti sunkų nepageidaujamą poveikį. Reklamos teksto parengimo data 2026-09.

AUSŲ SKAUSMUI MALŠINTI

-20% 8,63 € ~~10,79~~

FONIX® EAR PAIN, purškalas, 15 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

Pirmoji pagalba pasireiškus dažnoms ausų problemoms, tokioms kaip:
- skausmas
- infekcijos
- susikaupusi siera
- dirginimas

„Fonix® Ear Pain" yra medicinos priemonė, kurios sudėtyje yra augalinių aliejų mišinio, skirto ausiai apsaugoti nuo dažnų problemų ir jas palengvinti. Sudėtis: alyvuogių aliejus, indinių sezamų aliejus, gulsčiųjų serenojų ekstraktas, fitosterolių kompleksas, bisabololis, kvapijų murėjų lapų aliejus, ceilioninių cinamonų lapų aliejus, vingrūnių ekstraktas, mėtų aliejus. Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 3 metų vaikams. Vartojimas: purkšti po 1–2 ipurškimus į kiekvieną ausį 3 kartus per parą.

13,99 €

VOLTINEX, 140 mg, 5 vaistiniai pleistrai

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARTAS

Diklofenako natrio druska. **Terapinėsindikacijos.** Vietinis, simptominis, trumpalaikis (ne ilgiau kaip 7 paras) skausmo malšinimas po ūminių patempimų, įplyšimų ar sumušimų, atsiradusių dėl rankų ir kojų traumų, 16 m. ir vyresniems paaugliams bei suaugusiesiems. **Vartojimas.** 1 vaistinis pleistras turi būti užklijuojamas ant skausmingo ploto 1 kartą per parą. Dėjiausia paros dozė yra 1 vaistinis pleistras, net jei yra daugiau nei viena pažeista vieta, kurią reikia gydyti. Tik vienas skausmingas plotas gali būti gydomas vienu metu. Vartoti ant odos. **Kontraindikacijos**. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai ar kitiems nesteroidiniams vaistiniams preparatams nuo uždegimo. Pacientams, kuriems dėl acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistinių preparatų nuo uždegimo vartojimo buvo pasireiškęs astmos priepuolis, dilgėlinė ar ūminis rinitas. Pacientams, kuriems yra aktyvi pepsinė opa. Negalima pleistro naudoti ant pažeistos odos, kad ir koks būtų pažeidimo pobūdis; trečiojo nėštumo trimestro metu. Vaikams ir jaunesniems kaip 16 m. paaugliams. **Specialūs įspėjimai.** Vaistinis pleistras neturi būti klijuojamas ar kaip nors kontaktuoti su akimis ar gleivine. Senyvi pacientai „Voltinex" turi naudoti atsargiai dėl didesnės šalutinio poveikio pasireiškimo tikimybės. Pasitarkite su gydytoju, jeigu sergate ar sirgote bronchine astma arba alergija, turite inkstų, širdies ar kepenų sutrikimų, anksčiau turėjote skrandžio ar žarnyno opą, žarnyno uždegimą arba turite padidėjusį polinkį kraujuoti. Jei pastebite odos išbėrimą, kuris atsirado naudojant pleistrą, nedelsdami nuimkite vaistinį pleistrą ir sustabdykite gydymą. Nuklijuvę pleistrą venkite gydytos vietos kontakto su saulės ar soliariumo spinduliais. „Voltinex" naudojimo metu nevartokite jokių kitų vaistų su diklofenaku ar kitų nesteroidinių skausmą malšinančių ar priešuždeginiųjų vaistų, kad ir kaip jie būtų vartojami – išoriškai ar per burną. Reklamos teksto parengimo data 2025-09. Prekių ženklai priklauso „Haleon" arba „Haleon" turi jų licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas.

-20% 19,19 € ~~23,99~~

AMEDIPLUS

Šildomojo poveikio pleistras, 9x14 cm, 10 vnt.

MEDICINOS PRIEMONĖ

7,99 €

VISINE, 0,5 mg/ml akių lašai (tirpalas), 15 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliojі medžiaga, stiprumas: kiekviename akių lašų mililitre yra 0,5 mg tetrizolino hidrochlorido (t. y. 21 µg laše). **Terapinės indikacijos:** „Visine" skirtas akių paraudimui, kurį sukėlė nedidelis neinfekcinis akių sudirginimas, pvz., dūmai, dulkės, vėjas, chloruotas vanduo, šviesa ar alergija, trumpam laikui gydyti suaugusiesiems, paaugliams ir 2 m. bei vyresniems vaikams. Vaikams nuo 2 iki 6 m. amžiaus „Visine" galima vartoti tik su sveikatos priežiūros specialisto rekomendacija. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti ant akių. Vaikams nuo 6 m. amžiaus, paaugliams ir suaugusiesiems: jei gydytojas nenurodė kitaip, lašinti po 1–2 lašus ant pažeistos akies (-ių) 2–3 kartus per parą. Vaikams nuo 2 iki 6 m. „Visine" galima vartoti tik su sveikatos priežiūros specialisto rekomendacija. Jei nenurodyta kitaip, rekomenduojama dozė yra 1 lašas ant pažeistos akies (-ių) 2–3 kartus per parą. Vaikams iki 12 m. šį vaistą įsilašinti galima tik su suaugusiųjų pagalba. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija tetrizolino hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, sergate uždarojo kampo glaukoma, jaunesniems kaip 2 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** pasitarkite su gydytoju, jeigu sergate sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis (pvz., koronarine širdies liga, padidėjusiu kraujospūdžiu, feochromocitoma), gerybine prostatos hiperplazija, medžiagų apykaitos sutrikimais (pvz., hipertiroze, cukriniu diabetu, raudonojo kraujo pigmento susidarymo sutrikimu), sausuoju rinitu (priekinės nosies dalies lėtiniu uždegimu), sausuoju keratokonjunktyvitu (jungiminės ir ragenos sausumu), glaukoma (akių būkle, kai pažeidžiamas regos nervas, jungiantis akį su smegenimis). Jei per 48 valandas simptomai nepagerėja arba jeigu akių dirginimas ar paraudimas išlieka arba didėja, jeigu pastebite regėjimo pokyčių ar akių skausmą, vaisto vartojimą nutraukite ir kreipkitės į gydytoją. Jeigu pasireiškia galvos skausmas, regėjimo praradimas, regos sutrikimai (pvz., judančios dėmelės regėjimo lauke ar dvejinimasis akyse), stiprus ūminis ar tik vienos akies paraudimas, arba šviesa sukelia skausmą, vaisto vartojimą nutraukite ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Nenaudokite šio vaisto daugiau ir ilgiau nei 3–5 dienas iš eilės, nes tai gali pabloginti akių paraudimą ar nosies simptomus. Vartojant šį vaistą, Jūsų vyzdžiai gali laikinai išsiplėsti. Paprastai kontaktinių lęšių negalima nešioti sergant akių ligomis. Jei nešiojate kontaktinius lęšius, prieš vartodami vaistą juos išsiimkite ir vėl įsidėkite atgal ne mažiau kaip po 15 minučių. „Visine" sudėtyje yra fosfatų. Jeigu Jums yra akies priekinę dalį gaubiančio skaidraus sluoksnio (ragenos) sunkių pažeidimų, labai retais atvejais fosfatai gali sukelti drumzlinus ragenos plotelius dėl gydymo metu susiformavusių kalcio nuosėdų. Reklamos teksto parengimo data 2026 02. LT-VSN-2026-296736.

-20 %

„UNIMED PHARMA" AKIŲ LAŠAI

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Unimed Pharma" – medicinos priemonių linija, skirta pagrindinėms akių problemoms spręsti. **„OCUflash"** – pirmoji pagalba sudirgusioms akims. Idealiai tinka kaip plaunamasis tirpalas dirginančioms dalelėms ir chemikalams iš akių išplauti. **„SeptoZINC"** sudėtyje esantis cinko gliukonatas turi dezinfekuojamąjį (antibakterinį ir antivirusinį) poveikį. **„Potassium-U"** drėkinamasis izotoninis akių tirpalas su kalio jodidu. Naudojamas akims drėkinti, skatinant tam tikrus rezorbcijos procesus akyje (ypač esant eksudato, stiklakūnio kraujavimui ar įvairių priežasčių sukeltai kataraktai). **„Hypromeloza-P"** drėkinamojo ir apsauginio poveikio priemonė, naudojama ašarų gamybos trūkumui kompensuoti. **„OCUhyl C"** turi drėkinamąjį, raminamąjį ir tepamąjį poveikį. Akių lašuose esantis medetkų ekstraktas apsaugo akių epitelį, slopina jo uždegimą ir skatina regeneraciją.

SVEIKAS ŽVILGSNIS | PASAULĮ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-25 %

AKINIAI SKAITYMUI

Vis daugiau skaitotome ne spausdintą tekstą, o iš ekranų. Pristatome naujieną – skaitymo akiniai su Blue Control lęšiais. Jų privalumai:
- Apsaugo akis nuo kenksmingų mėlynos šviesos spindulių, kurią skleidžia skaitmeniniai prietaisai (išmanusis telefonas; kompiuteris; planšetinis kompiuteris; televizorius; LED apšvietimas)
- Panaikina atspindžius tiek iš išorės, tiek iš vidinės lęšio pusės.
- Mažina akių nuovargį.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-20 % 12,78 € ~~15,97~~

CATIONORM®, akių lašai, 10 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Cationorm" veikia kaip tikros ašaros. Sukuria unikalią apsauginę drėkinamąją ir gydomąją terpę akies paviršiuje – unikali nanoemulsija. Dėl teigiamo elektrostatino krūvio ilgai išlaikoma drėgmė akies paviršiuje. Atstato visus 3 ašarų sluoksnius. Ypač efektyviai mažina sausų akių simptomus, kurie pasireiškia tiek rytę, tiek vakare, taip pat kai ašaroja akys.
1. Apsaugo – atkuria pažeistą ašarų lipidų sluoksnį, sumažina ašarų išgaravimą, palaiko drėgmę.
2. Drėkina – aprūpina medžiagomis visus 3 ašarų plėvelės sluoksnius iki optimalaus ašarų kiekio ir balanso.
3. Skatina gijimą.
Tinka naudoti su visų rūšių kontaktiniais lęšiais, 3 mėnesius nuo atidarymo.

BE KONSERVANTŲ!

IKI -50 %

DAILEE

HIGIENOS PRIEMONĖS

„DAILEE" – PATIKIMAS PASIRINKIMAS ARTIMOJO SLAUGAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

NUO ALERGIJOS

6,99 €

TAVEGYL, 1 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliojі medžiaga, stiprumas: kiekvienoje tabletėje yra 1 mg klemastino fumarato, kuris atitinka 1 mg klemastino. **Indikacijos:** „Tavegyl" lengvina alerginę slogą (sienligę, ašarojimą, čiaudulį, nosies varvėjimą); alerginę odos reakciją (paraudimą, spuogelius, niežėjimą, patinimą); vabzdžių įgėlimo ir įkandimo sukeltą reakciją. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: iš ryto ir vakare gerti po 1 tabletę. 6–12 m. vaikams: gerti prieš pusryčius ir vakare prieš miegą po 0,5 arba 1 tabletę. 3–6 m. vaikams: gerti prieš pusryčius ir vakare prieš miegą po 0,5 tabletės. Tabletes gerti prieš valgį užsigeriant vandeniu. **Kontraindikacijos:** alergija klemastinui, kitokiems antihistamininiams vaistams ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Porfirija. Jaunesniems nei 3 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** atsargiai turi vartoti pacientai, sergantys: uždaro kampo glaukoma; stenozę sukeliančia peptine opa; dvylikapirštės žarnos obstrukcija; prostatos hipertrofija, dėl kurios susilaiko šlapimas, bei šlapimo pūslės kaklelio obstrukcija. Reikia atsargiai skirti epilepsija sergantiems arba praeityje traukulius patyrusiems pacientams. Sudėtyje yra laktozės. Reklamos teksto parengimo data 2024-07. 2603_SB_Tavegyl_V01_LT

PATIKIMA PAGALBA NUO ALERGIJOS VISAI ŠEIMAI!

-20 %

AMEDIPLUS

Vandeniui atsparūs pleistrai, 7 x 2 cm, 10 vnt. ~~1,69~~ **1,35 €**
Vandeniui atsparūs pleistrai, 7 x 3,8 cm, 10 vnt. ~~2,09~~ **1,67 €**
Vandeniui atsparūs, permatomi pleistrai, 7 x 2 cm, 10 vnt. ~~1,79~~ **1,43 €**
Vandeniui atsparūs pleistrai, 2,5 cm, 10 vnt. ~~1,29~~ **1,03 €**
Vandeniui atsparus, karpomas pleistras, 6 x 100 cm ~~2,19~~ **1,75 €**
Pleistrai su alavijų ekstraktu, 7 x 2 cm, 10 vnt. ~~1,85~~ **1,48 €**
Juodi aksominiai pleistrai, 7 x 2 cm, 10 vnt. ~~1,79~~ **1,43 €**

MEDICINOS PRIEMONĖS

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**

AMEDIPLUS

ULTRA SENSITIVE pleistrai, 10 vnt. **3,49 €**

MEDICINOS PRIEMONĖ

-40 %

ECOSH

BIOAKTYVUS SELENAS, 90 kapsulių ~~21,79~~ 13,07 €
BIOAKTYVUS MAGNIO BISGLICINATAS, 90 kapsulių ~~29,99~~ 17,99 €
VITAMINAS D3 4000IU, su pluoštinių kanapių sėklų milteliais, 90 kapsulių ~~20,99~~ 12,59 €
ŽARNYNO DETOX, 260 g ~~32,99~~ 19,79 €

MAISTO PAPILDAI

„Ecosh" – Estijos maisto papildų gamintojas, siekiantis gaminti kuo natūralesnius, kokybiškus ir efektyvius maisto papildus. Naudojamos veganinės, augalinės kilmės kapsulės, maisto papildai yra be konservantų, dauguma tinkami vegetarams ir veganams.

-30 %

VIRIDIAN

MAISTO PAPILDAI

„Viridian" – tai natūralūs, aukštos kokybės vitaminai ir maisto papildai, sukurti remiantis mokslu, etiška gamyba ir gryna sudėtimi.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-35 %

SVEIKAŽOLIŲ ARBATA

„Sveikažolių arbatos" asortimente garuoja kruopščiai atrinkti vaistažolių mišiniai bei pavienių žolelių arbatos, svaiginančios gardžiu skoniu ir šildančios iš vidaus.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

KOLAGENAS

IKI -40 %

DIAS® FORTE

greipfrutų skonio milteliai, 30 paketėlių ~~44,99~~ 26,99 € -40 %
granatų skonio milteliai, 30 paketėlių ~~44,89~~ 33,67 € -25 %

MAISTO PAPILDAI

„Dias® Forte" – subalansuotas keturių kolagenų **„Collagen Quattro ComplexTM"** ir kitų sinergiškai veikiančių medžiagų kompleksas sąnariams, kaulams, kremzlėms, odai, dantims ir danteno ms. Sudėtis papildyta hialurono rūgštimi, normaliam kolageno susidarymui reikalingu vitaminu C, kuris kartu su vitaminu E padeda apsaugoti ląsteles ir nuo oksidacinės pažaidos.
Malonaus granatų ar greipfrutų skonio.
1-ame paketėlyje – daugiau nei 10 000 mg kolageno!

BE GLITIMO, LAKTOZĖS IR PRIDĖTINIŲ CUKRŲ!

INKSTAMS IR ŠLAPIMO TAKAMS

-50 % 6,25 € ~~12,49~~

FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Fitolizyna Nefrocaps PLUS" yra unikalus 7 koncentruotų augalinių ekstraktų mišinys, kuris: – padeda palaikyti normalią inkstų ir šlapimo takų veiklą (petražolių šaknys, dirvinių asiūklių žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, karpotųjų beržų lapai, vaistinių gelsvių šaknys, paprastųjų rykštenių žolė); – padeda palaikyti normalų vandens pašalinimą iš organizmo, todėl skatinamas nepageidaujamų metabolizmo produktų šalinimas su šlapimu (dirvinių asiūklių žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, vaistinių gelsvių šaknys, paprastųjų rykštenių žolė). **Rekomenduojamas vartojimas:** 1 kapsulė 2 kartus per parą prieš valgį, užgeriant dideliu kiekiu vandens (ne mažiau kaip ½ stiklinės).

ŠIRDŽIAI IR KRAUJAGYSLĖMS, MOTERIMS MENOPAUZĖS METU

-25 %

EVELOR®, 50 mg, 90 kapsulių ~~30,49~~ 22,87 €
EVELOR® H, 200 mg, 30 tabletčių ~~21,99~~ 16,49 €

MAISTO PAPILDAI

Augaliniai antioksidantai, kurie priklauso polifenolių grupei. „Evelor®" ir „Evelor® H" sudėtyje esantis trans resveratrolis yra mikronizuotas ir išgautas iš didžiausią šios medžiagos kiekį kaupiančių augalų – plačialapių rūgčių (lot. *Polygonum cuspidatum*) – šaknų. Mikronizacijos procesas (medžiagos susmulkinimas iki labai mažų dalelių) padidina resveratrolio biologinį prieinamumą ir veiksmingumą. Resveratrolis padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą. Dėl panašios cheminės struktūros į hormoną estradiolį jis taip pat padeda palaikyti normalią moters savijautą menopauzės metu. Vartojimas. Gerti po 1 kapsulę arba tabletę rytinio valgio metu, užgeriant vandeniu.

-30 %

AMEDIPLUS

Propolio aliejus, 15 ml 5,99 4,19 €
Propolio - medetkų kremas, 40 g 6,99 4,89 €

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

NUO ALERGIJOS

4,49 €

CETIRIZIN ACTAVIS

10 mg, 10 dengtųjų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** suaugusiems žmonėms ir 6 m. amžiaus bei vyresniems vaikams cetirizinas vartojamas sezoniniu ir nuolatiniu alerginio rinito simptomams (nosies ir akių) palengvinti bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės simptomams palengvinti. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** 6–12 m. vaikams: 5 mg (pusė tabletės) 2 kartus per parą; suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams:10 mg (1 tabletė) 1 kartą per parą. Esant inkstų funkcijos sutrikimui, dozę reikia mažinti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, hidroksizinui arba bet kuriam piperazino dariniui. Pacientams, sergantiems sunkia lėtine inkstų liga, kai reikalingos dializės. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju ar vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Cetirizin Actavis": jeigu sergate inkstų nepakankamumu (jei būtina, Jums reikės vartoti mažesnę vaisto dozę. Reikalingą dozę nustatys gydytojas); jeigu turite šlapinimosi problemų (tokių kaip nugaros smegenų problemų arba prostatos ar šlapimo pūslės problemų); jei sergate epilepsija ar Jums gali būti traukulių. Kartu su „Cetirizin Actavis" vartoti alkoholio nerekomenduojama, kaip ir su kitais antihistamininiais vaistais. Dėl sudėtyje esančios laktozės šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-01. OTC-LT-00089

-30%

SMARTHIT IV

EFEKTYVAUS PASISAVINIMO MAISTO PAPILDAI

Miosol technologijos dėka pagaminami produktai, kurie pasisavinami itin gerai. Be to, mikrokapsulės sumažina šalutinių poveikių riziką. Efektyvaus pasisavinimo maisto papildų **SMARTHIT IV**® liniją sudaro:

SMARTHIT IV® Lactoferrin. Laktoferinas – tai geležį surišantis baltymas, dalyvaujantis geležies pasisavinimo procese. Galima vartoti kartu su **SMARTHIT IV® Ferrum** kapsulėmis arba **SMARTHIT IV® Ferrum Liquid** skysta geležies forma, tinkančia suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų. Geležis padeda palaikyti normalų hemoglobino ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą. **SMARTHIT IV®Ferrum Strong** – tai išmanus ir kompleksinis sprendimas, padedantis efektyviai palaikyti geležies atsargas organizme. 2 kapsulėse – 40 mg mikrokapsuliuotos geležies versija su bioaktyvia folio rūgštimi bei aminorūgštimi L-histidinu.

SMARTHIT IV® Vitamin D3 – kaulams, dantims, raumenims; **SMARTHIT IV® Vitamins D3+K2** – sinerginis, vitaminų D3 ir K2 poveikis kaulams ir kraujotakai;

SMARTHIT IV® Vitamin B12 – normaliai kraujodarai bei psichologinei funkcijai palaikyti vpač daug dirbantiems ir besimokantiems;

SMARTHIT IV® Polifen – polifenolių šaltinis gerai savijautai.

SMARTHIT IV® Curcumin – mikrokapsuliuota kurkumino forma imuninei sistemai, kepenų funkcijai, normaliam cholesterolio lygiui kraujyje palaikyti.

SMARTHIT® Curcumin+Beta-glucans – mikrokapsuliuotas kurkuminas su beta gliukanais nuo šiol ir kapsulėmis imuninei sistemai, cholesterolio ir gliukozės kontrolei. Išbandykite!

„SMARTHIT IV®“ – MENAS VEIKTI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-35%

WALMARK BIORYTHM

MAISTO PAPILDAI

Inovatyvios formos maisto papildų linija su lėto atpalaidavimo mikrogranulėmis, kurios išskiria maistingąsias medžiagas iki 8 valandų per dieną. Palyginti su įprastomis tabletėmis ar kapsulėmis, šiems papildams būdingas didesnis biologinis prieinamumas – medžiagos pasisavinamos palaipsniui žarnyne. BIORYTHM maisto papildų linija sudaro 6 produktai – „Ašvaganda“ (migdomosios vitanijos), „Cinkas 15 mg“, „Geležis 28 mg“, „Vitaminas B12 Max“, „Selenas 100 µg“ ir „Magnis su vitaminu B6“. 2605_SB_Biorythm_V01_LT.

„BIORYTHM“ – INOVATYVI PRAILGINTO VEIKIMO LINIJA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

DARBINGUMUI, EMOCINEI PUSIAUSVYRAI IR GERAM MIEGUI

-35%

LABANAKT, 14 pakelių ~~6,99~~ **4,54 €**
ASHWA PRO 400, milteliai geriamajam tirpalui, 28 pakeliai ~~18,39~~ **11,95 €**
ASHWA ADAXON, milteliai geriamajam tirpalui, 28 pakeliai ~~26,99~~ **17,54 €**

MAISTO PAPILDAI

„Biofarmacijos“ „ASHWA PRO 400“ – aukštos kokybės GRYNAS ašvagandų (migdomųjų vitanijų) KSM-66® šaknų ekstraktas (5 % vitanolidų), papildytas inulinu iš cikorijų šaknų. „ASHWA ADAXON“ papildytas *Hericium erinaceus* rūšies grybais (liūto karčiais) ir rausvųjų rodiolių ekstraktu. Naudingi, kai siekiate geresnio protinio darbingumo, norite išlaikyti emocinę pusiausvyrą, rūpinatės nervų sistemos veikla, patiriate stresą, jūsų mityboje trūksta skaidulų.

„LABANAKT“ – vakaro rutinai sukurtas miltelių mišinys saldžiam ir kokybiškam miegui. Sudėtyje esantis melatoninas padeda sutrumpinti laiką, per kurį užmiegama, valerijonas palaiko miego kokybę ir nervų sistemos veiklą, o magnis mažina nuovargį ir padeda atsipalaiduoti. Švari sudėtis be užpildų – tik aktyviosios medžiagos.

REKOMENDUOJAME VARTOTI TIK TAI, KO IŠ TIESŲ TRŪKSTA.

NORMALIAI GLIUKOZĖS KONCENTRACIJAI

-30%

SUGAR CUT BERBERINE, 60 tablečių ~~26,99~~ **18,89 €**
MULBERRY, 60 tablečių ~~28,59~~ **20,01 €**

MAISTO PAPILDAI

Nėra gerai, kai cukraus kiekis kraujyje yra nuolat padidėjęs, todėl svarbu, kad jo kiekis būtų normalus. Deja, daug žmonių nežino, ar jų gliukozės kiekis kraujyje yra normalus.

„Mulberry™“ ir **„Sugar Cut™ Berberine“** sudėtyse esančios medžiagos padeda palaikyti normalią angliavandenių apykaitą ir gliukozės koncentraciją kraujyje. Šilkmedžių lapų ekstraktas padeda palaikyti normalią angliavandenių apykaitą organizme, o chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Taip pat svarbu įvairi, subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

PALAIKYKITE NORMALIĄ GLIUKOZĖS KONCENTRACIJĄ KRAUJYJE!

-25%

MAGNESIUM DIASPORAL

MAISTO PAPILDAI

„Magnesium-Diasporal® Pro“ linijos produktuose didelės magnio dozės derinamos su kitomis gyvybiškai svarbiomis maistinėmis medžiagomis – visiems, kurie nori gyventi aktyvų gyvenimą. Ar jau žinote apie mūsų produktus, skirtus raumenims ir nervams (1), raumenims ir kaulams (2) bei miegui (3)?

1. **„Magnesium-Diasporal® Pro“ raumenims ir nervams:** magnis palaiko normalią raumenų funkciją. Vitaminai B_1, B_2, B_6 ir B_{12} prisideda prie normalios nervų sistemos veiklos ir energijos apykaitos. Todėl „Magnesium-Diasporal® Pro“ raumenims ir nervams aprūpina jūsų organizmą didele magnio ir B grupės vitaminų doze –praktiškas, tiesiai į burną vartojamų granulių paketėlis.
2. **„Magnesium-Diasporal® Pro“ raumenims ir kaulams:** magnis palaiko normalią raumenų funkciją. Vitaminas D palaiko normalią imuninės sistemos veiklą. Puikios sąlygos savarankiškam ir aktyviam gyvenimui užtikrinti. „Magnesium-Diasporal® Pro“ raumenims ir kaulamsyra didelės dozės magnio, vitamino D_3 ir K_2 derinys –praktiškas, tiesiai į burną vartojamų granulių paketėlis.
3. **„Magnesiumi-Diasporal® Pro“ miegui:** magnis, kaip ir vitaminai B_1 ir B_6, dalyvauja normalios raumenų funkcijos procesuose, padeda raumenims atsipalaiduoti ir prisideda prie normalios nervų sistemos veiklos. Miego hormonas melatoninas savo ruožtu paruošia tavo kūną ir protą miegui. „Magnesium-Diasporal® Pro“ mieguiyra kruopščiai suderintas magnio, melatonino, vitamino B_2 ir B_6 derinys – praktiškas, tiesiai į burną vartojamas granulių paketėlis.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

REGĖJIMUI IŠSAUGOTI

-40% **13,79 €** ~~22,99~~

NUTROF® TOTAL, 30 minkštųjų kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Maisto papildas akims „Nutrof Total“ siūlo „viskas viename“ formulę. „Nutrof Total“ buvo sukurtas specialiai tam, kad padėtų užtikrinti akių aprūpinimą reikalingomis medžiagomis ir akių sveikatos palaikymą, ypač vyresnio amžiaus pacientams ir rūkantiems žmonėms. Įrodyta, kad visos „Nutrof Total“ sudedamosios dalys padeda palaikyti akių funkciją: liuteinas ir zeaksantinas yra būtini tinklainės geltonosios dėmės apsaugai nuo oksidacinės pažaidos ir senėjimo požymių, taip pat gali padidinti regėjimo gebėjimus; omega-3 riebalų rūgštys palaiko tinklainės sveikatą; vitaminai C, D ir E, cinkas ir varis padeda apsaugoti ląstelių sudedamąsias dalis nuo oksidacinės pažaidos; cinkas padeda palaikyti normalų regėjimą; selenas yra pagrindinis antioksidantas, taip pat palaiko vitamino E ir cinko poveikį; resveratrolis turi stiprų uždegimų malšinamąjį ir antioksidacinį poveikį, saugo tinklainės ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. „Nutrof Total“ medžiagų derinys – sukurtas išlaikyti sveikas akis ir normalų regėjimą. Sudėtyje nėra konservantų. Reikalinga vartoti tik 1 kapsulę per dieną.

-10% **6,29 €** ~~6,99~~

ELEUTEROKOKŲ SKYSTASIS EKSTRAKTAS, 50 ml

MAISTO PAPILDAS

Sudedamosios dalys: eleuterokokų šaknų su šakniastiebiais (*Eleutherococci rhizomata et radices*) etanolinė ištrauka 1:1 (etanolis, eleuterokokų šaknys su šakniastiebiais). Sudėtyje yra ne mažiau kaip 33 tūrio % etanolio. Vartojimas: suaugusiesiems gerti po 10 lašų 2 kartus per dieną 30 min. prieš valgį. Prieš vartojimą suplakti. Rekomenduojamame suvartoti per parą kiekyje (20 lašų) yra apie 0,75 ml eleuterokokų skystojo ekstrakto. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.
Gamintojas: „Ternofarm“, Ukraina. Išskirtinis importuotojas ir platintojas Lietuvoje: UAB „VERATRUM PHARMA“, Žarijų g. 2B, Vilnius.

-10% **2,96 €** ~~3,29~~

GINTARO RŪGŠTIS, 20 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Vartojimas: gerti po 1 tabletę 3 kartus per dieną valgant.
Rekomenduojamame suvartoti per parą kiekyje (3 tabletėse) yra 0,3 g gintaro rūgšties.
Gamintojas: UAB „Medicata Filia“, Žarijų g.2B, Vilnius
Išskirtinis platintojas Lietuvoje: UAB „VERATRUM PHARMA“, Žarijų g. 2B, Vilnius

Jautriai, brandžiai veido odai

-40%

AVENE HYALURON ACTIVE B3

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Intensyvi veido odos priežiūros linija su hialurono rūgštimi ir niacinamidu, kurie puoselėja, drėkina, vizualiai stangrina ir skaistina brandžią veido odą.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-40%

ŽIEDĖ

stangrinamasis dieninis veido kremas su dumbliais, 50 ml ~~19,99~~ **11,99 €**
stangrinamasis naktinis veido kremas su dumbliais, 50 ml ~~19,99~~ **11,99 €**
stangrinamasis veido serumas su dumbliais, 30 ml ~~19,99~~ **11,99 €**
paakių serumas su dumbliais, 20 ml ~~18,99~~ **11,39 €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

-40%

ŽIEDĖ

drėkinamoji veido kaukė su hialuronatu, 15 ml ~~4,98~~ **2,99 €**
veido kaukė brandžiai odai su rožių vandeniu ir hialuronatu, 15 ml ~~5,98~~ **3,59 €**
veido kaukė su dumbliais ir jūriniu kolagenu, 15 ml ~~5,98~~ **3,59 €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Plaukams, odai, nagams

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

BEOTEBAL® PLUS, 30 + 10 tablečių **31,99 €**

MAISTO PAPILDAS

„Beotebal® PLUS plaukams, odai, nagams“ rekomenduojamas kasdienei plaukų, odos ir nagų būklės bei išvaizdos priežiūrai. Ypač tinkamas laikotarpiu, kai plaukus, odą ir nagus veikia aplinkos veiksniai (saulė, vanduo, vėjas, šaltis, sniegas, lietus) ar po intensyvių kirpyklos procedūrų (pvz.: dažymo, tiesinimo, džiovinimo) ir kosmetinių nagų procedūrų. Sudėtyje yra originalus koncentruotas „NutriAminoBiotinum“ kompleksas, kuriame yra daug aminorūgščių, mineralų ir vitaminų – įskaitant biotiną ir natūralų silicį, turintį naudingą poveikį plaukams, odai ir nagams. Gaminyje nėra glitimo ir laktozės. Tinka vegetarams ir veganams.

GROŽIO FORMULĖ TAVO PLAUKAMS, ODAI IR NAGAMS!

Intymios higienos prausikliai ir makšties ovulės

-35%

HI GENIE!

KOSMETIKOS PRIEMONĖS, MEDICINOS PRIEMONĖS

„Hi Genie!“ – tai visapusis intymiai priežiūrai skirtų produktų asortimentas, sukurtas moterims ir jų gerai savijautai kiekviename gyvenimo etape: nuo vaikystės iki brandos ir menopauzės.
Dermatologiškai patikrinti produktai su kruopščiai atrinktomis medžiagomis turi švelnų valomąjį poveikį ir padeda palaikyti natūralų intymios srities balansą.
„Hi Genie!“ sprendimai ne tik atliepia skirtingus poreikius – kasdienio gaivumo, specifinės priežiūros ar priežiūros menopauzės laikotarpiu, bet ir kuriami skiriant ypatingą dėmesį kokybei, saugumui bei švelnumui.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

Skubios pagalbos kontraceptikas

13,97 €

AVODELE, 1,5 mg, 1 tabletė

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Avodele yra skubios pagalbos kontraceptikas, kurį galima pavartoti per 72 valandas (t. y. per tris paras) po lytinio akto, kurio metu kontraceptinės priemonės nebuvo naudotos arba naudota kontraceptinė priemonė nebuvo veiksminga. Avodele sudėtyje yra sintetinio hormono, veikliosios medžiagos, vadinamos levonorgestreliu. Suvartotas per 72 valandas po nesaugaus lytinio akto, jis 79 % atvejų apsaugo nuo nėštumo. Vartotinas šiais atvejais:
– Lytinio akto metu nebuvo naudota kontraceptinė priemonė.
– Jei kontraceptinė priemonė naudota netinkamai.
Kaip vartoti Avodele.Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Po nesaugaus lytinio akto išgerkite vieną tabletę kuo greičiau, bet ne vėliau kaip po 72 valandų (3 parų). Tabletę geriausia išgerti per 12 valandų. Antrą tabletę išgerkite praėjus 12 val. (bet ne daugiau kaip 16 val.) po pirmosios tabletės išgėrimo. Jei žinote arba manote, jog nesate nėščia, Avodele galite vartoti bet kurią ciklo dieną. Tabletę nurykite nekramtytą, užsigerkite vandeniu. Ji bus tuo veiksmingesnė, kuo greičiau ją išgersite. Avodele vartoti negalima: Jeigu yra alergija levonorgestreliui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos informacinio lapelio 6 skyriuje). Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Prieš vartodamą, pasitarkite su gydytoju, nes Avodele, kaip skubios kontracepcijos priemonė, Jums gali netikti. Gydytojas gali Jums skirti kitokią skubios kontracepcijos priemonę. Kaip dažnai galima vartoti Avodele. Avodele vartotina tik neatidėliotinu atveju ir nėra reguliarios kontracepcijos metodas. Galimas šalutinis poveikis. Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Labai dažnas. Šleikštulys (pykinimas); Gali būti nereguliarus pakraujavimas iki prasidedant mėnesinėms; Gali skaudėti pilvo apačią; Nuovargis; Galvos skausmas. Dažni Vėmimas; Gali pakisti mėnesinių ciklas; Išgėrus šio vaisto, gali atsirasti krūtų jautrumas, viduriavimas, svaigulio pojūtis. Labai retas Bėrimas, dilgėlinė, niežulys, veido patinimas, dubens srities skausmas, skausmingos mėnesinės. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant informaciniame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Ši informacija paskutinį kartą peržiūrėta 2025-07-15.

-10%

ESTROMINERAL SERENA PLUS, 30 tablečių ~~20,99~~ **18,89 €**

MAISTO PAPILDAS

„Estromineral Serena Plus“ – maisto papildas su sojų izoflavonais, pieno rūgšties bakterijomis, magnolijomis, tikraisiais skaistminais, kalciu, magniu ir vitaminu D_3, skirtas menopauzės amžiaus moterims. Tikrieji skaistminai padeda palaikyti normalią būklę menopauzės metu. Kalcis, magnis ir vitaminas D_3 padeda palaikyti normalią kaulų būklę. **Vartojimo metodas:** 1 tabletė per dieną. **Atsargumo priemonės:** neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Laikykite vaikams neprieinamoje vietoje. Nevartokite nėštumo ir žindymo laikotarpiu.

Odos priežiūrai

-25%

BIODERMA

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Prancūzijos dermatologijos laboratorija „Bioderma“ vadovaujasi požiūriu, kad odos priežiūros priemonės turi padėti atkurti natūralius biologinius procesus, veikdamos pusiausvyros sutrikimų priežastis, o ne vien simptomus. Kuriant produktų sudėtis kruopščiai atrenkamos sudedamosios dalys, o į rinką produktai patenka tik po 18 mėnesių trukusių bandymų.

„NAOS“ EKOBIOLOGIJA – DERMATOLOGIJOS ESMĖ.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

IKI -30%

EUCERIN® HYALURON-FILLER + LONGEVITY EPIGENETIC

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Aplinkos ir gyvenimo būdo veiksniai gali paveikti odos epigenetinius modelius ir paspartinti odos senėjimo procesus. Po 17 metų epigenetinių tyrimų „Eucerin“ atrado unikalią veikliąją medžiagą „Epicelline®“, kuri turi jaunatviškesnę odos išvaizdą palaikančių savybių.
Priemonė su „Epicelline®“ ir hialurono rūgštimi – iki 78 % mažiau pastebimos raukšlės*!
* Klinikinis tyrimas, kuriame dalyvavo 43 savanoriai, produktą naudoję du kartus per dieną. Instrumentiniai matavimai atlikti po 4 savaičių. Individualūs rezultatai gali skirtis.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

IKI -30%

SVR

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„SVR“ - Prancūzijos dermokosmetikos laboratorija nuo 1962 m. Veiksmingi dermatologiniai sprendimai visų tipų odai, net ir pačiai jautriausiai. Padeda gerai jaustis savo odoje kiekvieną dieną.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

IKI -30%

BABÉ

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Laboratorios BABÉ“ – tai farmacijos tradicijas puoselėjanti dermokosmetikos laboratorija iš Ispanijos, kurianti saugius, veiksmingus ir prieinamus odos priežiūros produktus, pritaikytus visiems odos tipams, įskaitant jautrią odą. Daugiau nei 30 metų patirtį turintis gamintojas siūlo platų priemonių asortimentą kiekvienam odos poreikiui.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

CANESTEN®

10 mg/g kremas, 20 g **5,99 €**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Canesten 10 mg/g kremas. Klotrimazolas. **Terapinės indikacijos.** Canesten skirtas suaugusiesiems, paaugliams ir vaikams gydyti: grybelinės odos infekcijos, pvz., sportininko pėda, grybelis, grybelinis sauskelnių bėrimas ir grybelinis prakaitavimo sukeltas bėrimas; grybelių sukeltas išorinių moters lyties organų arba varpos galo uždegimas. **Vartojimo būdas.** Vartoti ant odos. **Dozavimas.** Kremu plonai ir tolygiai tepkite pažeistas vietas 2-3 kartus per parą ir švelniai įtrinkite. Kremo juostelės (0,5 cm ilgio) pakanka maždaug delno dydžio plotui gydyti. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Canesten. Kremas gali sumažinti latekso gaminių, tokių kaip prezervatyvai ir diafragmos, veiksmingumą ir saugumą, jeigu jis tepamas lytinių organų srityje (moterims: lytinės lūpos ir sritis apie vulvą; vyrams: apyvarpė ir varpos galvutė). Gydymo metu naudokite alternatyvias apsaugos priemones. Vengti sąlyčio su akimis. Nedėti į burną, nenuryti. Vaikams (jaunesniems negu 12 metų) ir senyviems pacientams vartoti galima tik prižiūrint gydytojui. Vengti ilgalaikio gydymo dideliuose odos plotuose, ypač kūdikiams ir vaikams. Vulvito atveju jaunesnėms kaip 16 metų paauglėms galima vartoti tik po gydytojo konsultacijos. Per pirmuosius tris nėštumo mėnesius priešvartojant reikia pasitarti su gydytoju. Sudėtyje yra cetostearilo alkoholio, benzilo alkoholio. **Kontraindikacijos.** Alergija klotrimazolui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Registruotojas.** UAB „Bayer“, Sporto g. 18, LT-09238, Vilnius, Lietuva. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-08-27 CH-20250827-35

„CANESTEN®“ KREMAS - GRYBELINĖS INFEKCIJOS GYDYMUI!

CANESTEN®

500 mg makšties minkštoji kapsulė **11,49 €**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Canesten 500 mg makšties minkštoji kapsulė. Klotrimazolas. **Terapinės indikacijos.** Makšties ir išorinių moters lyties organų infekcijų, sukeltų klotrimazoliui jautrių mikroorganizmų gydymui. **Vartojimo būdas.** Makšties minkštąją kapsulę reikia įdėti kaip galima giliau į makštį, naudojant pateiktą aplikatorių, geriausia gulint, vakare prieš miegą. Jei laukiatės, įdėkite makšties minkštąją kapsulę į makštį pirštais. **Dozavimas.** Viena makšties minkštoji kapsulė, įvesta giliai į makštį vakare (vienkartinė dozė). **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju, jeigu: infekcija pasireiškia pirmą kartą; makšties infekcija pirmojo nėštumo trimestro metu; per pastaruosius šešis mėnesius infekcija pasikartojo daugiau nei du kartus; pasireiškia karščiavimas (≥ 38 °C); skauda apatinę pilvo dalį, nugarą; atsiranda nemalonaus kvapo iškynų iš makšties; pasireiškia pykinimas; pasireiškia kraujavimas iš makšties ir (arba) tuo pačiu metu pečių skausmas. Nerekomenduojama gydyti menstruacijų metu. Gydymas turi būti užbaigtas iki menstruacijų pradžios. Vartojant negalima naudoti tamponų, makšties ploviklių, spermicidinių ar kitokių į makštį vartojamų preparatų. Vartojant rekomenduojama vengti lytinių santykių, nes partneris gali užsikrėsti. Jei Jūsų partneriui yra infekcijos simptomų, tai turi būti gydoma tuo pačiu metu. Tuo pačiu metu naudojamų lateksio kontraceptinių priemonių, pvz., prezervatyvų ir diafragmų, efektyvumas ir patikimumas gali sumažėti. Negalima nuryti. **Kontraindikacijos.** Alergija klotrimazoliui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Registruotojas.** UAB „Bayer“, Sporto g. 18, LT-09238, Vilnius, Lietuva. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-08-27 CH-20250827-35

„CANESTEN®“ MAKŠTIES MINKŠTOJI KAPSULĖ - 1-OS DIENOS MAKŠTIES GRYBELINĖS INFEKCIJOS GYDYMAS!

Moters sveikatai

-20%

LOTAMILE

MEDICINOS PRIETAISAI, KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Lotamile“ ovulių sudėtyje yra polikarbofilo. Jis ilgiau išlaiko veikliąsias medžiagas makštyje ir taip pailgina ovulės veikimą. Ovulės netepa, neišbėga, ilgiau veikia!
„Lotamile Hialuronic“ makšties ovulės su hialurono rūgštimi, naudojamos esant makšties sausumui, atrofiniam vaginitui. Ovulės mažina niežulį, skausmą lytinių santykių metu, drėkina, sutepa makštį, neleidžia išsausėti, saugo jos ekosistemą.
„Lotamile Boric“ makšties ovulės, naudojamos gydant ar norint išvengti makšties infekcijų, tinka esant niežėjimui, nemaloniam kvapui, pakitusioms iškyroms.
„Lotamile Girls“ švelnus intymios higienos prausiklis, sukurtas mergaitėms nuo 1 metų. Prausiklis patikrintas dermatologų, nedirgina gleivinės, švelnina bei ramina sudirgusią odelę, turi drėkinamąjį poveikį, užtikrina natūralią apsauginę gleivinės funkciją, palaiko tinkamą mergaičių intymių sričių terpę. Puikiai pakeičia muilą, dušo gelius, kurie gali būti per stiprūs ir dirginantys.
„Lotamile Soft“ intymios higienos prausiklis moterims idealiai tinka naudoti kasdien, turi šlapimo kvapą naikinantį, drėkinamąjį poveikį, užtikrina natūralią apsauginę gleivinės funkciją, palaiko intymių sričių rūgštinę terpę, kurios pH 4. Ypač rekomenduojamas ginekologinio gydymo metu, menstruacijų, nėštumo metu, po gimdymo.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

Makšties drėgmei ir mikroflorai atstatyti

-20%

FEMINELLA® PLUS, 10 ovulių ~~17,75~~ **14,20 €**
BIOHYL® LACTO, 7 ovulės ~~15,25~~ **12,20 €**

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Feminella® Plus“ makšties ovulės yra naudojamos kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė esant nespecifiniam makšties sausumui bei atrofiniam makšties uždegimui. Jos gali būti naudojamos ir kaip papildoma priemonė esant makšties dirginimui, deginimui ir niežėjimui, kuriuos sukelia tiek makšties uždeginimės ligos, tiek infekcijos. Priemonė skirta vaisingo amžiaus moterims, taip pat moterims perimenopauzės ir menopauzės laikotarpiu. „Biohyl® lacto“ ovulės yra vartojamos siekiant: atkurti normalią makšties mikroflorą; slopinti uždegimų procesus makštyje; apsaugoti makšties gleivinę ir skatinti jos regeneraciją.

-40%

MEFLOVAN FORTE, 60 kapsulių ~~34,99~~ 20,99 €

MAISTO PAPILDAS

„Meflovan forte“ – trijų augalinių medžiagų derinys, skirtas moterims, siekiančioms maksimalaus komforto ir geros savijautos menopauzės metu. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną.

-30 %

„ROYAL DENTA“ DANTŲ PASTOS

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Royal Denta“ burnos priežiūros priemonės sukurtos remiantis mokslu ir odontologijos srities atradimais. Auksu ir sidabru praturtintų dantų pastų savybės ir jų poveikis patvirtintas nepriklausomoje sertifikuotoje laboratorijoje. Kartą išbandę, klientai ir vėl pasirenka „Royal Denta“. Rekomenduoja odontologai.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-25 %

JORDAN

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Platus dantų priežiūros priemonių asortimentas visai šeimai - nuo pirmo dantuko! Rinkitės dantų šepetėlius, pastas bei tarpdančių valymo priemones pagal savo individualius poreikius.

„JORDAN“ RŪPINASI ŠYPSENOMIS NUO 1927-ŲJŲ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-20 %

SUNSTAR GUM

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖ

Jau daugiau kaip 80 metų „Sunstar“ yra viena burnos ertmės higienos priemonių gamybos lyderių.

Fluoridas padeda dantims greičiau įsisavinti mineralus ir saugo emalį nuo rūgščių poveikio. O sudėtyje esantis izomaltas padeda efektyviau įsisavinti fluoridą.

SVEIKOS DANTENOS, SVEIKESNIS GYVENIMAS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-25 %

CURASEPT ADS

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Curasept ADS priemonių išskirtinumas – vienintelė pasaulyje patentuota ADS sistema – formulė, kuri patikrins, kad Jūsų natūralių dantų spalva ir burnos receptorių veikla chlorheksidino preparato naudojimo metu nepakistų.

Curasept ADS chlorheksidinas pasižymi itin stipriomis antibakterinėmis savybėmis, efektyviai naikina pavojingas bakterijas, taip užkirsdamas kelią ir apnašų dėjimuisi. Curasept ADS produkcijos sudėtyje nėra alkoholio, SLS , tad išvengsite burnos ertmės sausėjimo, skilinėjimo bei dirglumo pojūčių. Curasept ADS sukurta ir subalansuota gingivitui, periodontitui malšinti, kraujuojančioms dantenoms gydyti.Taip pat skatina burnos audinių gijimą prieš ir po intensyvios burnos higienos ar kitų sudėtingų stomatologinių intervencijų. Tikime, kad sveikas kūnas bei turiningas gyvyvenimas, pirmiausia prasideda nuo sveikos burnos bei spindinčios šypsenos. Mes ne tik kalbame apie unikalumą, mes jį jau sukūrėme. Tu to dar nežinai, bet tai geriausia, kas galėjo nutikti Tavo dantims....

PIRMI, NES MUMS RŪPI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

IKI -40 %

NAUJIENA

ODÒNTE

Labai minkštas dantų šepetėlis, 1 vnt. ~~3,99~~ **2,39 € -40 %**

Tarpdančių siūlas su laikikliu, 50 vnt. ~~3,39~~ **2,03 € -40 %**

Gaivų burnos kvapą suteikiantis burnos skalavimo skystis, 500 ml ~~8,79~~ **5,27 € -40 %**

Regeneruojamasis burnos skalavimo skystis, 250 ml ~~9,59~~ **6,71 € -30 %**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

TOBULAI BURNOS HIGIENAI

IKI -25 %

CURAPROX

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Curaprox“ – tai aukščiausios kokybės šveicariškos burnos higienos priemonės: platus spektras dantų šepetėlių, tarpdančių šepetėlių, dantų pastų. Taip pat kūdikiams ir vaikams skirtos priemonės. „Curaprox“ dantų šepetėlių šereliai gaminami ne iš nailono, o iš patentuotos „Curen“ medžiagos, todėl šie šepetėliai efektyviai pašalina apnašas, netraumuodami dantenų. Tarpdančių šepetėliai gaminami iš labai plonos, tačiau tvirtos „Cural“ patentuotos medicininės vielutės, todėl tarpdančius išvalysite kruopščiai ir be skausmo. Dantų pastos profilaktikai įvairaus amžiaus grupėms ir antibakterinė „Perio Plus“ linija.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

IKI -40 %

TEPE

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„TePe“ dantų ir tarpdančių šepetėliai yra kasdienės dantų higienos pagrindas. „TePe“ siūlo didelį dantų ir tarpdančių šepetėlių pasirinkimą kasdienei dantų priežiūrai ir turintiems specialiųjų poreikių. „TePe“ dantų pastos yra švelnios, su fluoru, neputojančios arba mažai putojančios. Skirtos kūdikiams nuo pirmo dantuko, vaikų pieniniams dantims, suaugusiesiems kasdienai ar turintiems sausą burnos gleivinę.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

DANTŲ PROTEZŲ KLIJAI

-30 % 10,12 € ~~14,47~~

BLEND-A-DENT

COMPLETE STRONG HOLD, fiksuojamasis dantų protezų kremas, be skonio, 47 g, 2 vnt.

COMPLETE STRONG HOLD FRESH FLAVOR, fiksuojamasis dantų protezų kremas, 47 g, 2 vnt.

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Fiksuojamasis dantų protezų kremas „Blend-a-dent“ – puikus pasirinkimas, jei nenorite galvoti apie savo protezus. Nesvarbu, ką darote ar valgote, galite pasitikėti savimi, nes dantų protezai savo vietoje laikosi tvirtai ir patogiai. „Blend-a-dent“ suteikia stiprią fiksaciją visą dieną, užtikrina komfortą, sukurdamas pagalvėlę tarp dantenų bei dantų protezų, ir apsaugo nuo maisto dalelių patekimo po protezais. Galite atsipalaiduoti ir mėgautis gyvenimu nesivaržydami.

JAUTRIŲ DANTŲ PRIEŽIŪRAI

-20 %

SENSODYNE

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

SENSODYNE – jautrių dantų priežiūros ekspertas. Mūsų dantų pastos kliniškai įrodytai mažina dantų jautrumą ir kasdien saugo jūsų šypseną. Jei jaučiate dantų jautrumą, rinkitės prekės ženklą, kuriuo pasitiki milijonai visame pasaulyje – mėgaukitės komfortu ir sveika šypsena kasdien.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

1+1 Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati — **NEMOKAMAI!**

VELYM

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Velym pH neutro" – klinikiniais tyrimais patikrintas balinamasis dantų kremas. Kasdienė apsauga. Sudėtyje – natūralios kilmės medžiagos ir 1450 ppM fluoro. Skirtas suaugusiesiems.

„Velym Mineral O3" sudėtyje – ozono prisotintas alyvuogių aliejus. Daugiau dėmesio dantenoms. Aukštas apnašų valymo koeficientas (angl. Pellicle Cleaning Ratio, PCR).

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-30 %

FITTYDENT

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Fittydent" – stiprus, ilgai laikantis fiksuojamasis kremas, neleidžiantis protezams slysti ir slankioti. Netirpus vandenyje ir atsparus rūgščiai, todėl nenuplaunamas skysčių ar seilių. „Fittydent" dantų protezų fiksuojamasis kremas garantuoja stiprų dantų protezų ir dantenų sukibimą.

NAUJAS PAKUOTĖS DIZAINAS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

SUAUGUSIŲJŲ IR VAIKŲ DANTŲ PRIEŽIŪRAI

IKI **-30 %**

ELGYDIUM

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„ELGYDIUM" dantų pastos skirtos skirtingiems suaugusiųjų ir vaikų burnos priežiūros poreikiams: dantenų priežiūrai, dantų baltumui palaikyti, jautrių dantų priežiūrai, apnašų kontrolei ir apsaugai nuo ėduonies.

„ELGYDIUM" - TOBULAI JŪSŲ ŠYPSENAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-30 %

ELMEX

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Elmex" produktai padeda kasdien jaustis komfortiškiau – nuo kliniškai patvirtintos kasdienės apsaugos iki specializuotos priežiūros jautriems dantims.

RINKITĖS PATIKIMUMĄ, RINKITĖS „ELMEX".

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

BURNOS SKALAVIMO SKYSČIAI

IKI **-30 %**

ELUDRIL

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„ELUDRIL Extra" (0,2 % CHX, | Be alkoholio)

Trumpalaikei intensyviai burnos higienai, rekomenduojamai po odontologinių procedūrų.

„ELUDRIL Classic" (0,1 % CHX + chlorobutanolis)

Trumpalaikei burnos higienai, rekomenduojamai po odontologinių procedūrų ar esant padidėjusiam burnos higienos poreikiui.

„ELUDRIL Care" (0,05 % CHX + 0,05 % CPC | Be alkoholio)

Kasdienei sustiprintai burnos higienai. Ypač tinka po odontologinių procedūrų, nešiojant ortodontinius aparatus ar prižiūrint implantus.

„ELUDRIL" BURNOS SKALAVIMO SKYSČIAI - SPRENDIMAI SKIRTINGIEMS BURNOS HIGIENOS POREIKIAMS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

Pasiūlymai galioja **2026 10 01 – 2026 10 31.**

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Nuolaidos taikomos prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė" administracijos patvirtintą prekių sąrašą, kurio galite teirautis kiekvienoje vaistinėje, el. paštu evaistine@nvaistine.lt arba nemokamu tel. +370 800 10008. Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį/informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvktu.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Daugiau informacijos NORFOS vaistinėje, el. paštu evaistine@nvaistine.lt arba tel. +370 800 10008. Reklaminio teksto parengimo data – 2026 09 21.

ODOS IR LŪPŲ PŪSLELINEI GYDYTI

5,99 €

ACIC, 5 % kremas, 2 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g kremo yra 50 mg aciklovir o. **Terapinės indikacijos:**odos ir lūpų pūslelinei, kurią sukelia *Herpes simplex* virusas, gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** pažeistą odos vietą tepti plonu sluoksniu 5 kartus per parą kas 4 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas aciklovirui, valaciklovirui, propilenglikoliui arba bet kurioms pagalbinėms medžiagoms. Netepti ant gleivinės (burnos, akių, makšties). **Specialūs įspėjimai:** vaisto draudžiama nuryti. „Sandoz Pharmaceuticals d.d." filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS26010169662. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSLELINĘ SU „ACIC"!

NIEŽULIUI MALŠINTI

5,99 €

GRIVIX, 1 mg/g gelis, 30 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: kiekviename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato. Pagalbinės medžiagos: benzalkonio chloridas ir propilenglikolis. **Terapinės indikacijos:** dermatozės, dilgėlinės, vabzdžių įkandimo, nudegimo saulėje arba paviršutinio odos nudegimo (pirmojo laipsnio) sukelto niežėjimo trumpalaikis malšinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** vaikams, suaugusiesiems ir senyviems pacientams: ant pažeistos ir nieztinčios odos GRIVIX reikia tepti plonu sluoksniu 2–4 kartus per parą. Kūdikiams ir mažiems vaikams (jaunesniems nei 2 metų amžiaus) reikia vengti vartoti ant didelių odos plotų. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Antrojo ir trečiojo laipsnio nudegimai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jei GRIVIX gydomas didelis odos plotas, reikia vengti ilgalaikio šių paviršių saulės apšvietimo. Kūdikiams ir mažiems vaikams (jaunesniems nei 2 metų amžiaus) didelio odos ploto, ypač pažeisto ar apimto uždegimo, geliu tepti reikia vengti. Vaistinio preparato sudėtyje yra benzalkonio chlorido, kuris dirgina, gali sukelti odos reakciją, ir propilenglikolio, kuris gali sudirginti odą. Reklamos teksto parengimo data: 2026 02.

NURAMINK SUDIRGINTĄ IR NIEŽTINČIĄ ODĄ!

ŽAIZDŲ GIJIMUI SKATINTI

-20 %

HELP4SKIN

WOUND HEALING, gelis, 20 g ~~6,99~~ **5,59 €**

WOUND HEALING, gelis, 50 g ~~12,97~~ **10,38 €**

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Help4Skin Wound Healing" yra hidrokoloidinis gelis be parabenų, skirtas lokaliai sausų ir šlapių žaizdų priežiūrai bei jų gijimui skatinti. Greitina ūminių ar lėtinių žaizdų gijimą, pavyzdžiui: žaizdų (įskaitant chirurgines), įpjovimų, įbrėžimų, odos nubrozdinimų ir įtrūkimų, paviršinių nudegimų (I ir IIA laipsnio). Greitai malšina skausmą, mažina randų susidarymo riziką, greitina gijimą, padeda išvengti infekcijos. Galima naudoti vyresniems nei 2 m. vaikams.

PAPRASTA IR EFEKTYVU.

-40 % 12,89 € ~~21,49~~

boderm

OLIPROX

nagų lakas grybeliui (gelis vandens pagrindu), 12 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Oliprox™" nagų lakas (gelis vandens pagrindu) – veiksminga priemonė, padedanti užkirsti kelią grybelinei infekcijai bei pagalbinė priemonė gydant onichomikozę (nagų grybelį).

ODOS PRIEŽIŪRAI

-20 %

BEPANTHEN® ANTI-EXEM

kremas, 50 g ~~14,97~~ **11,98 €**

MEDICINOS PRIEMONĖ

Kliniškai patikrintas kremas be hormonų slopina atopinės egzemos (atopinio dermatito), odos išsausėjimo sukeltą niežėjimą ir paraudimą, atstato apsauginį odos barjerą. Numalšina odos niežėjimą vos per 30 minučių, poveikis išlieka mažiausiai 7 valandas. Kremą galima vartoti tiek gydymo hormoniniais preparatais, tiek pertraukų tarp hormoninio gydymo metu. Tinka kūdikiams, vaikams ir suaugusiesiems. Galima vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu, odai apie akis.

BEPANTHEN SENSICONTROL®

prausimosi gelis, 400 ml ~~17,99~~ **14,39 €**

kremas, 200 ml ~~17,99~~ **14,39 €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Bepanthen SensiControl™" – kasdienis prausimosi gelis jautriai ir į egzemą linkusiai odai. Nuramina, drėkina odą, prisitaiko prie jūsų odos pH, saugo natūralų odos barjerą ir mikrobiomą. Sudėtyje yra provitamino B5 ir prebiotikų. Tinka visai šeimai.

„Bepanthen SensiControl™" – kremas, skirtas jautriai, atopinei, į egzemą linkusiai odai. Kliniškai patikrinta „Dermo-Defense" formulė, papildyta prebiotikų, suteikia kasdienę odos apsaugą: palaiko odos apsauginę mikroflorą, stiprina odos barjerinę funkciją, užtikrina ilgalaikį, iki 24 val. trunkantį, drėkinimą ir padeda raminti sausą, niežtinčią odą. Greitai įsigeriantis kremas tinka kūnui, veidui ir akių vokams. Tinka visai šeimai.

Reklamos teksto parengimo data 2026-02. CH-20260203-57

„BEPANTHEN®" PRODUKTŲ LINIJA Į EGZEMĄ LINKUSIOS ODOS SVEIKATAI!

NUO PLEISKANOJIMO

14,99 €

KETOCONAZOL-RATIOPHARM

20 mg/ml, šampūnas, 120 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Terapinės indikacijos. Galvos seborėjos ir pleiskanojimo (*Pityriasis capitis*) gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** „Ketoconazol-ratiopharm" šampūnas skirtas paaugliams ir suaugusiems pacientams. Plaunant galvą plaukai įtrinami „Ketoconazol-ratiopharm" šampūnu ir paliekama veikti 3–5 min., po to nuplaunama vandeniu. Gydymas. Šampūnas naudojamas 2 kartus per savaitę. Gydymo kurso trukmė – 2–4 savaitės. Profilaktika. Norint išvengti simptomų pasikartojimo, plaukai ir galvos oda šiuo šampūnu turi būti plaunami kartą per savaitę arba kas antrą savaitę. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Reikia saugotis, kad šampūno nepatektų į akis. Patekus į akis, jas reikia gerai praplauti vandeniu. Pleiskanojimas ir seborėjinis dermatitas dažnai būna susiję su plaukų slinkimu, tai, nors ir retai, tačiau taip pat pasitaiko naudojant „Ketoconazol-ratiopharm" šampūną. Pacientams, ilgai vartojantiems vienoje odos vietoje vietiniam gydymui kortikosteroidus, rekomenduojama tokį gydymą palengva per 2–3 savaites užbaigti, kad naudojant „Ketoconazol-ratiopharm" šampūną būtų išvengta ligos pasikartojimo. Šio vaistinio preparato kvapiosios medžiagos sudėtyje yraa-izometiljonono, benzilo alkoholio, benzilbenzoato, citralio, bergaminių citrinmedžių (*Citrus aurantium bergamia*) žievelių eterinio aliejaus, karčiavaisių citrinmedžių žievelių eterinio aliejaus, tikrųjų citrinmedžių (*Citrus limon*) žievelių eterinio aliejaus, kumarino, heksametilindanopirano / galaksolido, heksilcinamaldehido, limoneno, linalolio, linalilo acetato, pineno, terpentino, kurie gali sukelti alerginių reakcijų. Kiekviename šio vaistinio preparato mililitre yra 100 mg natrio laurilsulfato, kuris gali sukelti vietinių odos reakcijų (gėlimo arba deginimo pojūtį) arba sustiprinti odos reakcijas, kurias sukėlė toje pačioje vietoje pavartoti kiti preparatai.**Tekto peržiūros data** 2026-03-19. **Reklaminės medžiagos parengimo data** 2026-05. OTC-LT-00117

-30 % 4,61 € ~~6,59~~

AMEDIPLUS

Rankų kremas su pantenoliu, 100 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

-20 % 8,79 € ~~10,99~~

NAUJIENA

AMEDIPLUS

šampūnas nuo utėlių, 100 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

Temperatūrai mažinti ir skausmui malšinti

NUO **4,50 €**

IBUGARD

100 mg/5 ml geriamoji suspensija, 120 ml **4,50 €**
200 mg/5 ml geriamoji suspensija, 100 ml **8,50 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 5 ml IBUGARD 100 mg/5 ml geriamosios suspensijos yra 100 mg ibuprofeno. 5 ml IBUGARD 200 mg/5 ml geriamosios suspensijos yra 200 mg ibuprofeno. **Terapinės indikacijos.** Įvairios kilmės karščiavimo, įvairios kilmės silpno ir vidutinio stiprumo skausmo, tokio, kaip virusinės ar kitokios infekcijos sukelto galvos, gerklės ir raumenų skausmo; sąnarių ir kaulų skausmo; pooperacinio skausmo; danties skausmo, galvos skausmo; ausies skausmo, esant vidurinės ausies uždegimui, mažinimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** nustatant ibuprofeno dozę, reikia atsižvelgti į paciento kūno svorį ir amžių. Paprastai vienkartinė ibuprofeno dozė yra 7–10 mg/kg kūno svorio, maksimali paros dozė yra 20–30 mg/kg kūno svorio. Dozę galima kartoti kas 6–8 valandas, tarp dozių turi būti ne mažesnis nei 4 valandų intervalas. Tik trumpalaikiam vartojimui. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas ibuprofenui, aspirinui ar kitam nesteroidiniam vaistui nuo uždegimo (NVNU), arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei sergate ar sirgote skrandžio ir (arba) dvylikapirštės žarnos opa ar kraujavimu iš virškinamojo trakto; sergate sunkiu kepenų, širdies ar inkstų funkcijos sutrikimu. Yra polinkis į kraujavimą. **Specialūs įspėjimai:** specialių atsargumo priemonių reikia, jei inkstų, kepenų ar širdies funkcija yra sutrikusi, sutrikęs kraujo krešėjimas arba vartojami antikoaguliantai, sergama cukriniu diabetu, raudonaja vilklige, krono liga, opiniu kolitu, hipertenzija, astma, šienlige, yra nosies polipų ar lėtinių infekcinių kvėpavimo takų ligų. **Teksto paruošimo data** 2026 04 mėn.

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

MIRAMILE® KIDS, burnos ir gerklės sirupas vaikams, 100 ml **8,69 €**

MEDICINOS PRIEMONĖ

Padeda numalšinti gerklės skausmą ir palengvina kosulį.

Svilarožių ekstraktas, glicerolis bei ksantano lipai sukuria apsauginę plėvelę, kuri padengia ir saugo sudirgusią gleivinę bei padeda atkurti natūralias jos funkcijas.

Sudėtyje taip pat yra čiobrelių, šeivamedžių ir juodųjų serbentų ekstraktų.

Tinka vaikams nuo 1 metų.

Žarnyno mikroflorai

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

ACIDOLAC® JUNIOR

20 meškiuko formos tablečių **10,49 €**
braškių skonio, 20 meškiuko formos tablečių **10,49 €**

MAISTO PAPILDAI

ACIDOLAC® JUNIOR meškiuko formos tablečių sudėtyje yra gerųjų žarnyno bakterijų **Lactobacillus acidophilus La-14TM ir Bifidobacterium lactis BI-04TM**, inulino ir vitamino B6, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vartojimas: vyresniems kaip 3 m. vaikams ir suaugusiesiems vartoti po 1 meškučio formos tabletę 2 kartus per parą. Be sacharozės ir glitimo.

12,97 €

NAVIVISION PLUS KIDS, akių lašai sudirgusioms akims, vaikams nuo 6 m., 15 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

Veiksmingai mažina akių sudirginimą, neatsižvelgiant į tai, ar jis atsirado dėl kasdienio aplinkos poveikio, ar dėl padidėjusio jautrumo. Gerai toleruojama formulė greitai suteikia komforto pojūtį ir padeda atkurti natūralų gaivumo jausmą pavargusioms ar nežtinčioms akims.

Pasiūlymai galioja **2026 10 01 - 2026 10 31.** Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą. Prekių kiekis ribotas. UAB „Norfos vaistinė“ pasilieka teisę bet kada keisti akcijos sąlygas. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.