

## TOP GEGUŽĖS PASIŪLYMAI



**-50%**



**AMBIO**  
GELEŽIS LIPOSOMOSE, 30 kapsulių **20<sup>99</sup> 10<sup>45</sup> €**  
MAISTO PAPILDAS

**-45%**



**AMBIO**  
MAGNIS SU B6 FORTE, 30 tablečių **12<sup>99</sup> 7<sup>14</sup> €**  
MAISTO PAPILDAS

**-50%**

**NAUJIENA**



**FJORD STRONG OMEGA-3**  
GENIUS DROPS, žuvų taukų lašai, 50ml **18<sup>99</sup> 9<sup>10</sup> €**  
SMART GUMMIES, 45 guminukai **24<sup>99</sup> 12<sup>25</sup> €**  
CARDIO, 60 kapsulių **27<sup>99</sup> 14<sup>00</sup> €**  
IMMUNITY, 60 kapsulių **31<sup>99</sup> 16<sup>00</sup> €**

**MAISTO PAPILDAS**

Rinkitės galingus žuvų taukus „FJORD STRONG OMEGA“:

- Išskirtiniai stiprios EPR ir DHR koncentracijos, ypač gerai pasisavinamos formos.
- Sertifikuota aukščiausios kokybės žaliava, atitinka 5\* tarptautinio žuvų taukų standarto įvertinimo kriterijus.
- Iš tyro, laukinių, riebių, smulkių žuvų šaltinio.

**Išbandykite naujieną – „FJORD STRONG OMEGA-3 Immunity“** – tai stiprios koncentracijos omega-3 (EPR ir DHR), vitamino D ir ypač gryno alyvuogių aliejaus derinys jūsų stipriam imunitetui.

**„FJORD STRONG OMEGA-3“ – GALI DAUGIAU, NEI TIKIESI.**

**-50%**



**OCUVAL STRONG**, 30 minkštųjų kapsulių **22<sup>99</sup> 11<sup>40</sup> €**  
MAISTO PAPILDAS

Rūpinkitės savo akimis kasdien su „Ocualv Strong“!

Sudėtyje – net 30 mg liuteino, taip pat vitaminas A, riboflavinas (vitaminas B2) ir cinkas, kurie padeda išsaugoti normalų regėjimą ir palaikyti akių funkciją.

**„OCUVAL“ – MATYK, KAI LABIAUSIAI REIKIA!**

**NUO 2<sup>99</sup> €**



**IBUPROM EXPRESS**

400 mg, 10 minkštųjų kapsulių **2<sup>99</sup> €**  
400 mg, 20 minkštųjų kapsulių **4<sup>99</sup> €**

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** ibuprofenas, 400 mg. **Indikacijos:** skausmo (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimo mažinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems pacientams ir vyresniems nei 12 m. vaikams kaip trumpalaikis pagalbinis gydymas kas 4 val. geriama 1 kapsulė (negerti daugiau kaip 3 kapsulių per parą). Kapsulių negalima kramtyti. Kapsulių reikia užsigerti stikline vandens. **Kontraindikacijos:** alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, praeityje buvusios padidėjusio jautrumo reakcijos vartojant kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo, sunkus kepenų, inkstų ar širdies funkcijos nepakankamumas, esama (ar praeityje buvus) pepsinė opa, buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakurimas, kraujavimas į smegenis, virškinimo traktą arba kitoks kraujavimas, sisteminė raudonoji vilkligė, paskutinis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai:** specialiai atsargumo priemonių reikia, jeigu sutrikusi inkstų, kepenų, širdies ir virškinimo trakto veikla, vartojama kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo, sergama bronchine astma, alerginėmis ligomis ar sisteminė raudonoji vilkligė; senyviems žmonėms. Reklamos teksto parengimo data 2024.11.29.

**RENKUOSI „IBUPROM“. RENKUOSI LAISVĖ.**

**NUO 5<sup>99</sup> €**



**LIVOSIL**

140 mg, 30 kapsulių **5<sup>99</sup> €**  
140 mg, 60 kapsulių **10<sup>99</sup> €**

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 kietjoje kapsulėje yra 140 mg silimarino. **Indikacijos:** papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livosil“ dozė yra 280–420 mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. „Livosil“ rekomenduojama vartoti ilgiau nei 3 mėnesius. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livosil“ medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemija), bei tuos, kurie vartoja preparatų, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. Teksto peržiūros data 2017-07-12.

**NATŪRALI KEPENŲ APSAUGA IR GYDYMAS!**

 -50 % pigiau



-50%

**NATASPIN**

CONTROL PRO, 90 kietųjų kapsulių **43<sup>99</sup> 22<sup>00</sup> €**  
 GLUCOSE, 30 kapsulių **16<sup>99</sup> 8<sup>25</sup> €**

**MAISTO PAPILDAS**

Teisingai cholesterolio kontrolei rinkitės 90 dienų kursą „NatAspin CONTROL PRO“  
 Gliukozės balansui, energijai, ląstelių apsaugai nuo oksidacinės pažeidimo išbandykite „NatAspin GLUCOSE“.  
 Visų „NatAspin“ formulių sudėtyje naudojami išskirtinai tik standartizuoti bioaktyvūs ekstraktai, kurie užtikrina fiksuotą veikliųjų medžiagų kiekį ir patikimumą.

„NATASPIN“ – TEISINGI SPRENDIMAI ŠIRDŽIAI, KRAUJOTAKAI, GLIUKOZĖS IR CHOLESTEROLIO KONTROLEI.



-50%



**ATLANT**, milteliai geriamajam tirpalui, 28 pakeliai **55<sup>99</sup> 28<sup>00</sup> €**  
**ATLANT ŠIRDIS**, milteliai geriamajam tirpalui, 28 pakeliai **26<sup>99</sup> 13<sup>50</sup> €**  
**ATLANT MAXIMUS**, milteliai geriamajam tirpalui, 28 pakeliai **79<sup>99</sup> 40<sup>00</sup> €**  
**BIOMAGNESIUM**, 300 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 30 pakelių **13<sup>99</sup> 6<sup>75</sup> €**

**MAISTO PAPILDAS**

„Atlant“ – perkamiausias maisto papildas sąnariams 2025 m. Lietuvoje. \* Didelės koncentracijos kompleksas sąnariams, kaulams ir raumenims: 12 200 mg kolageno, 1 500 mg gliukozamino, 120 mg kalcio ir 12 mg vitamino C. „Atlant Širdis“ – išskirtinis širdies ir kraujotakos kompleksas su itin dideliu polifenolių kiekiu: 260 mg resveratrolio ir 13 mg likopeno. Papildytas kofeino, niacino, mineralais (K, Mg, Fe), vitaminu B1 ir augaliniams ekstraktams kasdieninei širdies funkcijai palaikyti. „Atlant Maximus“ – susiprinta formulė aktyviam gyvenimo būdui: net 15 000 mg kolageno, papildyta 500 mg hialurono rūgšties, 500 mg ciberžolių ir 100 mg bosveljių ekstraktas. Vienas stipriausių pasirinkimų intensyvesnei sąnarių, odos ir kaulų priežiūrai. „bioMagnesium 300 mg“ – perkamiausias magnio maisto papildas Lietuvoje 2019–2025 metais! Papildykite savo organizmą magniu, kuris padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Šiame maisto papildyje yra organinės kilmės magnio, išgaunamo iš Negyvosios jūros vandens. Grynos formules – tik aktyviosios biologiška veiklios medžiagos, be nereikalingų priedų. \* Nustatyta pagal 2025 m. UAB „Softient“ didmeninės prekybos pardavimų duomenis.

**JUDĖJIMUI, ŠIRDŽIAI, ENERGIJAI – STIPRINKITE ORGANIZMĄ.**

-50%



**AIMX**

**KOSMETIKOS PRIEMONĖS**

AIMX bioceliuliozines laktinės veido kaukės – giliai drėkinančios, prisotintos hialuronu, peptidų ir augalinių ekstraktų. Priglundamos tarsi antra oda, nevaržo judesius.

Kurtos bendradarbiaujant su vienu iš Pietų Korėjos kosmetikos gamintojų lyderių ir pasaulyje žinomomis docentėmis, į kūrybos procesą įtraukiant savo sričių profesionalus. Gausiai papildytos aktyviosiomis medžiagomis kaukės užtikrina efektyvų ir tikslingą poveikį.

\* Akcija taikoma geltona etikete pažymėtos prekės

-50%



**BIOMAGNESIUM FORTE**, 500 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 20 pakelių **44<sup>99</sup> 7<sup>40</sup> €**  
**COLLAGENA BEAUTY**, 10 000 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 20 pakelių **12<sup>99</sup> 6<sup>15</sup> €**

**MAISTO PAPILDAS**

Maisto papildas „bioMagnesium Forte 500 mg“ – Nr. 1 magnio maisto papildas 2025 m. Lietuvoje! Kai reikia daugiau! Papildykite savo organizmą magniu, kuris padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Šiame maisto papildyje yra organinės kilmės magnio, išgaunamo iš Negyvosios jūros vandens. **NAUJENAI!** Specialiai sukurta formulė Jūsų grožiui iš vidaus. „Collagena BEAUTY 10 000 mg“ – tai aukštos kokybės, itin mažos molekulinės masės (800–3000 Da) hidrolizuotas kolagenas, kuris yra gerai toleruojamas organizmo. Sudėtyje – didelė koncentracija itin mažos molekulinės masės (800–1500 Da) hialurono rūgšties bei vitaminas C. Produktų sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, stabilizatorių, kvapiųjų medžiagų. Kokybė patvirtinta „Kosferiniu“ ir „Halal“ sertifikatais. Pagaminta Izraelyje. \* Nustatyta pagal 2025 m. UAB „Softient“ didmeninės prekybos pardavimų duomenis.

-50%

**FOMAN®**

30 kapsulių **45<sup>99</sup> 8<sup>00</sup> €**

**MAISTO PAPILDAS**

„Foman“ – maisto papildas, skirtas 3 pagrindinėms vyriškosios funkcijoms: **prostatas, šlapimo sistemos, reprodukcinėi**. Išskirtinėje „Foman“ sudėtyje yra 4 kompleksiški veikiantys elementai: gulsčiųjų serenojų vaisių ekstraktas padeda palaikyti šlapimo ir reprodukcinę funkcijas; didžiųjų dilgėlių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią prostatos funkciją; fermentas proteazė padidina vyro mitybą; organinė seleno forma, padeda palaikyti normalią spermatogenezę. Rekomenduojama suaugusiems gerti po 1–2 tabletes per dieną ne valgio metu.

„FOMAN“ – TEIŠNISKAI TVARKINGAM VYRUI.

**FOMAN® UP SHOTS**

14 x 25 ml **40<sup>99</sup> 20<sup>45</sup> €**

**MAISTO PAPILDAS**

„Foman UP Shots“ – skirtas seksualiai aktyviems VYRAMS. Viename buteliuke yra koncentruotų veikliųjų medžiagų dozė pritaikyta vyrų: lytiniam potraukiui, erekcijai, pajėgumui ir energijai. Natūralų seksualinį aktyvumą ir energiją padeda palaikyti Peruvinė pipirinė (maca). Lytinį potraukį ir pajėgumą padeda palaikyti Gulsčioji raguzė. Ženšenis padeda palaikyti normalią erekcijos funkciją. Pantoteno rūgštis (vitaminas B5) padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei padeda palaikyti normalią protinę veiklą bei normalią energijos apykaitą. Sudėtyje taurinas (natūrali aminos rūgštis).

**VIRŠYK GALIMYBES SU „FOMAN UP SHOTS“**



Nuo skausmo ir karščiavimo

NUO 2<sup>99</sup> €



**IBUPROM**  
200 mg, 10 dengtųjų tablečių 2<sup>99</sup> €  
200 mg, 20 dengtųjų tablečių 4<sup>49</sup> €  
400 mg, 10 dengtųjų tablečių 3<sup>49</sup> €  
400 mg, 20 dengtųjų tablečių 4<sup>99</sup> €

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** ibuprofenas, 400 mg ir 200 mg. **Terapinės indikacijos:** skausmo (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimo malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Ibuprom, 400 mg“: suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 1 tablete 3 kartus per parą. „Ibuprom, 200 mg“: 6–9 m. vaikams (kūno svoris 20–29 kg) gerti po 1 tablete kas 6–8 val. (negerti daugiau nei 3 tablečių per parą); 10–12 m. vaikams gerti po 1 tablete kas 6 val. (negerti daugiau nei 4 tablečių per parą); suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams pradinė dozė yra 2 tabletes, po to galima gerti po 1–2 tabletes kas 4 val. (negerti daugiau nei 6 tablečių per parą). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, tachinis kraujavimas, ūminis skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligės stadija; anksčiau buvusi alergija acililsalicilo rūgščiai ir kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; sergant sunkia širdies nepakankamumu; esant trečiam nėštumo trimestriui. **Specialūs įspėjimai:** vartoti nepatartina, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu, bronchių astma. Reklamos teksto parengimo data 2024.11.29.

**RENKUOSI „IBUPROM“. RENKUOSI LAISVĖ.**

4<sup>99</sup> €



**ACETERIN EXPRESS, 10 mg, 10 tablečių**

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** 1 tablete yra 10 mg cetirizino dihydrochlorido. **Terapinės indikacijos:** sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės simptomams palengvinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vyresniems kaip 12 metų asmenims – po 1 tablete per dieną, 6–12 metų vaikams – po pusės tabletes 2 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pagalbini medžiagai, hidroksizinui arba bet kuriam piperazino dariniui. Pacientai, kuriems smarkiai sutrikusi inkstų funkcija. **Specialūs įspėjimai:** atsargiai vartoti sergantiesiems epilepsija ir pacientams, kuriems yra traukulių pavojus. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2610169661. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

Moderni kapsulė nuo rėms

3<sup>99</sup> €



**ESCADRA**

20 mg, 7 skrandyje neiros kietosios kapsulės

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** ezomeprazolas, 20 mg. **Terapinės indikacijos:** vaistas skirtas suaugusiųjų gastroezofaginio refliksų simptomų (pvz., rėms ir skrandžio rūgšties regurgitacijos) trumpalaikiam gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 kapsulė) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, kapsules gali prireikti vartoti 2–3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Simptomams visiškai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Jeigu per 2 savaites nepašalinama gydymą simptomai neišnyksta, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Nėra tinkamu, „Escadra“ vartojimo rekomendacijoje jaunesniui kaip 18 metų vaikų populiacijoje indikacijai „trumpalaikis gastroezofaginio refliksų simptomų (pvz., rėms ir rūgšties regurgitacijos) gydymas“. Kapsulių negalima kramtyti ar smulkinti. Kapsules galima atidaryti ir granules išmaityti pusėje stiklinės negazuoto vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pakeistiems benzimidazolams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Ezomeprazolo negalima vartoti kartu su neflinaviru. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pacientus reikia informuoti, kad kreiptis į gydytoją, jeigu jie patiria didelį kūno svorio mažėjimą dėl nežinomo priežastį, pasikartojanti vėmima, disfagija, vėmimų krauju ar mėlena, arba jeigu įtariama ar diagnozuojama skrandžio opa, būtina iširti, ar nėra piktybinės ligos, nes gydymas ezomeprazolu gali palengvinti jos simptomus ir uždelsti diagnozės nustatymą; jeigu jie anksčiau sirgo skrandžio opa arba patyrė virškinimo trakto operaciją; jeigu jiems 4 savaites arba ilgiau buvo taikomas nepatraukiamas simptominis nevirškinimo arba rėms gydymas; jeigu jie serga gelta arba sunkia kepenų liga; jeigu jie yra vyresni kaip 55 metų ir turi naują arba neseniai pakitusių simptomų. Pacientai, kurių pasikartojantis nevirškinimo ar rėms simptomai ilgalaikiai, turi reguliariais intervalais lankytis pas savo gydytoją. Kaip ilgalaikio profilaktinio vaistinio preparato „Escadra“ pacientai neturi vartoti. Pacientai, kuriems atlikti endoskopija ar ureazės kvėpavimo testą, turi pasitarti su savo gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistinį preparatą. Ezomeprazolo skirti kartu su atazanaviru nerekomenduojama. Ezomeprazolo derinimas su klopidoogreliu nepatartinas. Kitų PPI arba H<sub>2</sub> receptorių blokatorių kartu su ezomeprazolu pacientams vartoti negalima. „Escadra“ sudėtyje yra sacharozės. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems yra fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2025.04.07.

Sloguojant

3<sup>75</sup> €



**GALAZOLIN**

0,05 % nosies lašai, tirpalas, 10 ml  
0,1 % nosies lašai, tirpalas, 10 ml

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Veiklioji medžiaga: ksilometazolino hidrochloridas. Indikacijos: nosies gleivinės paburkimo mažinimas pašalus ar susirgus alergine sloga, nosiaryklės gleivinės paburkimo mažinimas, gydant vidurinės ausies uždegimą. Dozavimas: 2–6 metų vaikams i kiekvieną nosies landą lašinti po 1–2 lašus 0,05 % koncentracijos tirpalo kas 8 val. Vyresniems negu 7 metų pacientams i kiekvieną nosies landą lašinti po 2–3 lašus 0,1% koncentracijos tirpalo kas 8–10 val. „Galazolin“ vartoti ilgiau kaip 5–7 dienas negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, sausasis rinitas, uždarą kampo gliaukoma. Specialūs įspėjimai: preparato negalima vartoti sergantiems lėtine ar vazomotorine sloga, jei jos gydymas užtrunka ilgiau negu dvi savaites. Atsargiai vartoti pacientams, kuriems negalima vartoti simpatikomikų. Nevartoti kartu su MAO inhibitoriais bei tricikliais anti-depresantais. NB! Informacija vartotojui yra sutrumpinta. Reklamos teksto parengimo data: 2025.01.

**ISLAISVINS TAVO NOSI!**

Nuo alergijos

4<sup>99</sup> €



**LORATADINE ACTAVIS, 10 mg, 10 tablečių**

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Kiekvienoje tablete yra 10 mg loratadino. **Terapinės indikacijos:** Simptominis alerginio rinito ir lėtinės idiopatinės dilgėlinės gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** **Suaugusiems:** 10 mg tablete 1 kartą per parą, 6 m. ir vyresniems vaikams ir paauguliams, sveriantiems daugiau negu 30 kg: 10 mg tablete 1 kartą per parą. Jaunesniems kaip 6 m. vaikams arba sveriantiems mažiau negu 30 kg žmonėms vartoti 10 mg tablečių nerekomenduojama. Loratadino saugumas ir veiksmingumas jaunesniems kaip 2 m. vaikams nenustatyti. Pacientams, sergantiems sunkiu kepenų funkcijos nepakankamumu, skiriama pradinė 10 mg dozė kas antra diena. **Kontraindikacijos:** Loratadino tablečių vartoti draudžiama, jeigu padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Loratadine Actavis“, jeigu sergate kepenų liga; Jums numatoma atlikti kokių nors odos mėginių dėl alergijos. Nevartokite „Loratadine Actavis“ 2 dienas iki numatomų alerginių odos mėginių. To reikia, nes šis vaistas gali paveikti šio tyrimo rezultatus. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktozės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. OTC-LT-00107. **Teksto peržiūros data 2024-07-11. Reklamines medžiagas parengimo data 2026-02.**

Nuo rėms ir padidėjusio rūgštingumo

4<sup>49</sup> €



**RENNIE**

680 mg/80mg, 24 kramtomosios tabletes  
ORANGE, 680 mg/80 mg, 24 kramtomosios tabletes

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** 1 kramtomosioje tablete yra 680 mg kalcio karbonato ir 80 mg sunkiojo magnio subkarbonato. **Terapinės indikacijos:** „Rennie“ veiklosios medžiagos – kalcio karbonatas ir sunkusis magnio subkarbonatas – neutralizuoja skrandžio rūgštį ir mažina rūgštinės dispepsijos sukeltamą negalavimą – rėmenį, skrandžio pilnumo arba sunkumo jausmą, virškinimo sutrikimą, rūgštaus skystico atpylimą į burnos ertmę, pilvo pūtimą, skrandžio skausmą. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: sučiulpti arba sukrantyti 1–2 kramtomąsias tabletes, praėjus 1 val. po kiekvieno valgio, prieš miegą ir kai pasireiškia rėmus ar skausmas. Negalima vartoti daugiau kaip 11 kramtomųjų tablečių per 24 valandas. Negalima nepatraukiamai vartoti ilgiau kaip 2 savaites. **Specialūs įspėjimai:** vaistinį preparatą reikia vengti vartoti ilgai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. „Rennie“ nešutimo ir žindymo laikotarpiu vartoti laikantis rekomendacijų galima, bet reikia vengti vartoti ilga laiką. Vaistas neturi būti vartojamas su dideliu kiekiu pieno ar jo produktais. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veiklosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jeigu yra sunkus inkstų nepakankamumas arba inkstų akmenligė; jeigu yra padidėjęs kalcio kiekis kraujyje arba sumažėjęs fosfatų kiekis kraujyje. Reklamos teksto parengimo data 2024-10 CH-20241030-74.

NUO 9<sup>99</sup> €



**HESIO**  
500 mg, 30 plėvele dengtų tablečių 9<sup>99</sup> €  
500 mg, 60 plėvele dengtų tablečių 18<sup>99</sup> €  
500 mg, 120 plėvele dengtų tablečių 35<sup>99</sup> €  
1000 mg, 30 plėvele dengtų tablečių 18<sup>99</sup> €

**NERECIPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Kiekvienoje „Hesio“ 500 mg tablečiųje yra 500 mg mikronizuotų flavonoidų (atitinka 450 mg diosmino ir 50 mg kitų flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną). Kiekvienoje „Hesio“ 1000 mg tablečiųje yra 1000 mg mikronizuotų flavonoidų (atitinka 900 mg diosmino ir 100 mg kitų flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną). **Terapinės indikacijos.** „Hesio“ skirtas suaugusiųjų: lėtinio kojų venų nepakankamumo simptomams (kojų sunkumui, kojų patinimui, skausmui, naktiniam kojų mėšlungiui) lengvinti; paūmėjusio hemorojus simptomams (skausmui, kraujavimui ir patinimui išangės srityje) lengvinti. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** „Hesio“ 500 mg tabletes: lėtinis venų nepakankamumas: rekomenduojama dozė suaugusiems yra 2 tabletes per parą 2 mėnesius: 1 tablete vidurdienį ir 1 tablete vakare valgio metu. Jei simptomai išlieka, gydymas gali būti tęsiamas dar 2 mėnesius; hemorojus paūmėjimas: pirmas 4 gydymo dienas rekomenduojama dozė suaugusiems yra 3 tabletes 2 kartus per parą (6 tabletes per parą); 2 tabletes per parą 2 mėnesius; 1 tablete vakare valgio metu. „Hesio“ 1000 mg tabletes: lėtinis venų nepakankamumas: rekomenduojama dozė suaugusiems yra 1 tablete per parą 2 mėnesius valgio metu. Jei simptomai išlieka, gydymas gali būti tęsiamas dar 2 mėnesius; hemorojus paūmėjimas: pirmas 4 gydymo dienas rekomenduojama dozė suaugusiems yra 3 tabletes per parą (1 tablete 3 kartus per parą arba 1 tablete pirmą kartą ir 2 tabletes antrą kartą per parą). Kitas 3 dienas – 1 tablete 2 kartus per parą (2 tabletes). Tabletes vartokite valgio metu. **Kontraindikacijos.** „Hesio“ vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vaikams ir paaugliams „Hesio“ vartoti nerekomenduojama. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025 m. vasario mėn. ID:000829964

NUO 5<sup>99</sup> €



**STREPSILS INTENSIVE**  
8,75 mg, 16 kietųjų pastilių 5<sup>99</sup> €  
8,75 mg, 24 kietosios pastilės 10<sup>99</sup> €

**NERECIPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg flurbiprofeno. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikis simptominis gerklės skausmo gydymas suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. amžiaus vaikams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: kas 3–6 val. (kai reikia) lėtai sušlaptinti (leisti ištirpti burnoje, lupiant reikia judinti burnoje, kad būtų išvengta lokalaus dirginimo) po 1 kietąją pastilę. Per 24 val. galima suvartoti ne daugiau kaip 5 kietąsias pastiles. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; anksčiau buvusios aceticilsalicylo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) sukeltos padidėjusio jautrumo reakcijos (kitas, astma, bronchų spazmas, rinitas, angioneurozinė edema ar dilgėlinė); yra ar anksčiau buvo pepsinė opa ar kraujavimas iš opos (nustatyti du ar daugiau nesujusių opaligės epizodų) bei žarnyno opos; anksčiau buvo kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo perforacija, sunkus kolitas, kraujavimas ar kraujodaros sutrikimai, susiję su ankstesniu NVNU vartojimu; paskutinis nėštumo trimestras; sunkus širdies, inkstų, kepenų nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai:** reikia atsargiai vartoti pacientams, kurie serga sisteme raudonąja vilkligė ir mšria jungiamojo audinio liga, serga tonzilitu (tonzilių uždegimu) ar mano, kad serga bakterijų sukelta gerklės infekcine liga, turi širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų, sirgo virškinimo trakto ligomis (pvz., opiniu kolitu, Krono liga), jei pasireiškia pirmosios odos reakcijos (šbėrimas, lupimasis, pūslių atsiradimas) arba kitokie alerginės reakcijos požymiai; nėščiosios pirmuosius 6 mėnesius ar žindyvėms bei senyviems pacientams. Tokie vaistai gali būti susiję su nedideliu širdies priepuolio (miokardo infarkto) ar insulto rizikos padidėjimu. Vaisto sudėtyje yra gliukozės ir sacharozės (cukraus), ji turi turėti būti atsiveigta sergant cukriniu diabetu. Jeigu pacientas yra alergiškas (alergiška) kviečiams (ši liga skiriasi nuo celiakijos), šio vaisto vartoti negalima. Sudėtyje esantys citralis, citronelis, d-limonenas, farnesolis, geraniolis ir linalolis gali sukelti alerginių reakcijų, sieraos dioksidas gali sukelti sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų ir bronchų spazmą, butilhidroksianizolis gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivinę. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. **Reklamos teksto parengimo data** 2026-04-16.

**– SLENKA PLAUKAI? PASITIKĖK VAISTO GYDOMĄJA GALIA!**

NUO 9<sup>99</sup> €



**BEOTEBAL**  
10 mg, 30 tablečių 9<sup>99</sup> €  
10 mg, 60 tablečių 19<sup>99</sup> €

**NERECIPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**BEOTEBAL 10 mg tabletes.** **Kokybinė ir kiekybinė sudėtis.** Kiekvienoje tablečiųje yra 10 mg biotino. **Terapinės indikacijos.** „BEOTEBAL“ priklauso B vitaminių preparatų grupei ir vartojamas biotino trūkumo gydymui suaugusiems. Biotino trūkumas gali sukelti plaukų retėjimą, plaukų slinkimą, nagų ir plaukų augimo sutrikimus bei padidėjusį trapumą, dermatitą (odos uždegimą, kuriam paprastai būdingas niežulys ir paraudimas) aplink akis, nosį, burną, ausis ir kirkšnį, konjunktyvitą (akies junginės uždegimą, dėl kurio akys atrodo paraudusios), nuovargio, parastezijos (nenormalios odos pojūčio, pasireiškiančio tokiais simptomais kaip dilgčiojimas, peršėjimas, salimas, deginimas, tirpimas) simptomus. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems, įskaitant senyvus pacientus, vartoti 10 mg biotino, ly. 1 tablete „BEOTEBAL“ per parą. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu yra numatoma atlikti laboratorinius tyrimus, turite pasakyti savo gydytojui arba laboratorijos darbuotojui, kad vartojate arba neseniai vartojote „BEOTEBAL“, nes biotinas gali turėti įtakos tokių tyrimų rezultatams. Atsiveiginti j tai, koks tyrimas atliekamas, dėl biotino poveikio tyrimų rezultatai gali būti klaidingai didesni ar mažesni. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-02. **\*Slenkantis, silpnas, trapūs plaukai yra viena iš biotino trūkumo išraiškų. „Beotebal“ yra nereceptinis vaistas skirtas biotino trūkumo gydymui.**

NUO 3<sup>99</sup> €



**NALGESIN S**  
Natrio naproksenas, 10 dengtųjų tablečių 3<sup>99</sup> €  
Natrio naproksenas, 20 dengtųjų tablečių 5<sup>99</sup> €

**NERECIPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** natrio naproksenas – 275 mg. **Indikacijos:** galvos, dantų, mėnesinių, sąnarių, raumenų, potrauminiams, pooperaciniams skausmams malšinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 18 metų vaikams (prastinė paros dozė skausmui malšinti – 500–1000 mg, iš pradžių vartojama 500 mg, vėliau – po 275 mg kas 6–8 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bet kuriai sušedamajai preparato medžiagai, buvusi alerginė reakcija, kurią sukėlė nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, aktyvi ar atsinaujinanti skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, kraujavimas iš virškinamojo trakto, sunkus širdies nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai:** naprokseno gydymą pacientai, sergantys epilepsija ar porfirija, kuriam buvo ar yra virškinamojo trakto sutrikimų, ypač opinis kolitas ar Krono liga, privalo stebėti gydytojas. Naprokseno draudžiama vartoti, jei yra sunki nesena žaizda arba iki didelės operacijos liko mažiau kaip 48 valandos. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024 07 12.

**MALŠINA SKAUSMĄ IR UŽDEGIMĄ.**

NUO 8<sup>99</sup> €



**SINUPRET®**  
geriamieji lašai (tirpalas), 100 ml 10<sup>99</sup> €  
vyšnių skonio sirupas, 100 ml 10<sup>99</sup> €  
FORTE, 20 dengtųjų tablečių 8<sup>99</sup> €  
INTENS, 160 mg, 20 dengtųjų tablečių 12<sup>99</sup> €

**NERECIPTINIAI AUGALINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Terapinės indikacijos.** „Sinupret“ (geriamieji lašai, „Forte“, vyšnių skonio sirupas) – augaliniai vaistai, skirti tirštam sekretui skystinti ir simptomams lengvinti sergant ūminiu ar paūmėjusiu lėtiniu prienosinių ančių uždegimu (sinusitu). „Sinupret Intens“ – augalinis vaistas, skirtas suaugusiųjų ūminiam nekomplikuotam prienosinių ančių uždegimui gydyti, jei pasireiškia tokiu simptomu kaip nosies bėgimas, nosies užgulimas, galvos skausmas, veido skausmas arba spaudimas. **Veikliosios medžiagos ir stiprumas:** 1 g „Sinupret“ geriamųjų lašų yra 290 mg skyksto ekstrakto (T1), pagaminto iš gencionų šaknų, raktaziolių žiedų, rūgštynių žolės, juoduogių šėvamėdžių žiedų, verbenų žolės (T33333). „Sinupret Intens“ veiklioji medžiaga yra gamtinis sausasis ekstraktas (3–6:1) iš gencionų šaknų, raktaziolių žiedų, rūgštynių žolės, juoduogių šėvamėdžių žiedų, verbenų žolės (T33333). Kiekvienoje dengtoje tablečiųje yra 160 mg gamtinio sausos ekstrakto. „Sinupret Forte“ 1 dengtoje tablečiųje yra 36 mg verbenų žolės miltelių, 12 mg gencionų šaknų miltelių, 36 mg rūgštynių žolės miltelių, 36 mg juoduogių šėvamėdžių žiedų miltelių, 36 mg raktaziolių žiedų miltelių, 1 ml (atitinka 1,2 g) „Sinupret“ vyšnių skonio sirupo yra 0,05 ml skyksto ekstrakto, pagaminto iš 11 mg gencionų šaknų, verbenų žolės, paprastųjų rūgštynių žolės, juoduogių šėvamėdžių žiedų, raktaziolių žiedų su taurėlėmis mišinio (T33333). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** 2–5 metų vaikams gerti 15 „Sinupret“ geriamųjų lašų 3 kartus per dieną, 6–11 metų vaikams – 25 geriamuosius lašus 3 kartus per dieną, suaugusiems ir paaugliams nuo 12 metų – po 50 geriamųjų lašų 3 kartus per dieną. Suaugusiems vartoti po 1 dengtąją tablete „Sinupret Intens“ 3 kartus per dieną (daugiausia 3 dengtas tabletes per parą). „Sinupret Forte“ suaugusiųjų ir paauglių nuo 12 metų turėtų vartoti po 1 tablete 3 kartus per parą. „Sinupret“ vyšnių skonio sirupo 2–5 metų vaikams gerti po 21 ml 3 kartus per parą, 6–11 metų vaikams – po 3,5 ml 3 kartus per parą, suaugusiems ir paaugliams nuo 12 metų – po 7 ml 3 kartus per parą. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. „Sinupret Intens“ vartoti negalima, jeigu turite ar turite peptinę opą. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju ar vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Sinupret“ vyšnių skonio sirupą bei geriamuosius lašus. Jei simptomai tęsiasi ilgiau nei 7–14 dienas, pasunkėja, pradedami kartojasi arba atsiranda dusulys, karščiavimas, pilingi skrepliai ar nosies išskyros, kraujavimas iš nosies, stiprus skausmas, regėjimo sutrikimas, akių bei veido asimetrija ar tirpimas, būtina kreiptis į gydytoją. „Sinupret“ vyšnių skonio sirupas ir geriamieji lašai – nerekomenduojami vaikams iki 2 metų. „Sinupret Intens“ – netinka jaunesniems nei 18 m. paaugliams. „Sinupret Forte“ – nerekomenduojamas vaikams iki 12 m. dėl duomenų trūkumo. Jeigu nustatytas gastritas ir jei paciento skrandis jautrus „Sinupret Intens“, vyšnių skonio sirupą ir geriamuosius lašus reikia vartoti ypač atsargiai. Geriausia vartoti po valgio, užgeriant stikline vandens. Teksto parengimo data 2026-04-15.

**„SINUPRET“ – RINOSINUSITO SIMPTOMAMS LENGVINTI!**

6<sup>99</sup> €



**LAMISIL**  
10 mg/g, kremas, 15 g  
DERMIGEL, 10 mg/g, gelis, 15 g

**NERECIPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Indikacijos:** grybelių sukeltos ligos. „Lamisil DermGel“: Dermatocetozė pvz., trichofitonų (*Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton violaceum*), *Microporum canis* ar *Epidermophyton floccosum* sukeltų dermatomikozė, pvz., pedų, kirkšnių, kūno (lygiosios odos) gydymas. Įvairiaspalvės dedervinės (*Tinea versicolor*), sukeltos *Pityrosporum orbiculare* (dar vadinamų *Malassezia furfur*) grybelių, gydymas. „Lamisil“ kremas: Dermatofitų, pvz., trichofitonų (*Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton violaceum*), *Microporum canis* ar *Epidermophyton floccosum* sukeltų dermatomikozė, pvz., pedų, kirkšnių, kūno (lygiosios odos) gydymas. Mieliaigrybių, t. y. baltšvagrėbių (*Candida*) genties grybelių, pvz., *Candida albicans*, sukeltos dermatomikozės gydymas. Įvairiaspalvės dedervinės (*Tinea versicolor*), sukeltos *Pityrosporum orbiculare* (dar vadinamų *Malassezia furfur*) grybelių, gydymas. **Dozavimas:** „Lamisil“ kremas: Suaugusiems ir 12 metų bei vyresniems paaugliams „Lamisil“ gali būti vartojamas 1 ar 2 kartus per parą, priklausomai nuo indikacijos. „Lamisil DermGel“: Suaugusiems ir 12 metų bei vyresniems paaugliams „Lamisil“ vartoti negalima (abiejų nurodytų indikacijų atveju) geliu reikia tepti 1 kartą per parą. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Lamisil“ kremas tepant ant veido reikia saugoti, kad nepatektų į akis. Patekęs į akis, jis gali dirginti. Jeigu vaistinio preparato atsitiktinai į akis patenka, jis reikia gerai nuplauti tekančiu vandeniu. Negalima vartoti ant burnos gleivinės. Jeigu yra odos pažeidimas, kuri alkoholis gali dirginti (pažeidžiamą, po nudegimo saulėje ar esant stipriam odos lupimuisi), „Lamisil DermGel“ geliu reikia gydyti atsargiai. Negalima vartoti ant veido odos ir ant burnos gleivinės. Patekęs į akis, jis gali dirginti. Jeigu geliu į akis patenka, reikia jas praplauti tekančiu vandeniu. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

7<sup>99</sup> €



**MAGNE B6**  
geriamasis tirpalas, 10 ampulių  
470 mg/5 mg, 60 dengtų tablečių

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 tableteje yra 470 mg magnio laktato dihidrato bei 5 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6); Vienoje 10 ml ampulėje yra 186 mg magnio laktato dihidrato, 936 mg magnio pidolato, 10 mg piridoksino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** MAGNE B6<sup>®</sup> skirtas magnio trūkumo sukeltiems simptomams gydyti. Magnio trūkumas gali sukelti tam tikrus simptomus ar jų derinius: nervingumą, irzlumą, nedidelį nerimą, trumpalaikį nuovargį, nedidelius miego sutrikimus, mėšlungį, dilgčiojimo pojūtį. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tabletes reikia nuryti užgeriant stikline vandens. Suaugusiems paros dozė yra 6–8 tabletės, kurias reikia išgerti per 2–3 kartus valgant. Vaikams paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno svorio. Geriamąjį tirpalą ampulės turinys ištirpinamas pusėje stiklinės vandens. Suaugusiems paros dozė yra 3–4 ampulės, kurias reikia išgerti per 2–3 kartus tarp valgyimų. Vaikams ir kūdikiams, sveriantiems daugiau kaip 10 kg, paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno svorio arba 1–4 ampulės per 2–3 kartus tarp valgyimų. **Kontraindikacijos:** preparato vartoti negalima, jeigu: yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei MAGNE B6<sup>®</sup> medžiagai; sergate tam tikra inkstų liga; vartojama levodopos. **Specialūs įspėjimai:** nėštumo ir žindymo laikotarpiu vaistą galima vartoti tik tada, jei nurodo gydytojas. MAGNE B6<sup>®</sup> dengtosios tabletės skirtos suaugusiems žmonėms ir vyresniems nei 6 metų vaikams. MAGNE B6<sup>®</sup> geriamąjį tirpalą negalima duoti mažiau kaip 10 kg sveriantiems (iki 1 metų) kūdikiams. Jeigu sergate inkstu, širdies ir kraujagyslių liga, prieš pradėdami vartoti MAGNE B6<sup>®</sup> preparatus, reikia pasitarti su gydytoju. Piktinaudžiant vitaminu B6, pakenkiami julininiai periferiniai nervai: atsiranda tirpimas ir padėties jūmio pablogėjimas, drebulys galinėse ir koordinacijos sutrimai. Nustojus vartoti vaistą, pažeidimai paprastai išnyksta. Reklamos teksto parengimo data 2022-08. 2604\_Magne\_B6\_V01\_LT

„MAGNE B6“ PADĖS ĮVEIKTI MAGNIO TRŪKŪMĄ!

4<sup>99</sup> €



**NEUROMULTIVIT**  
20 pėvele dengtų tablečių

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Indikacijos:** „Neuromultivit“ yra vitamino B1, vitamino B6 ir vitamino B12, kurie yra ypač svarbūs užtikrinant normalias nervų sistemos medžiagų apykaitos funkcijas, derinys. Vartojant nervų sistemos ligų gydymui B grupės vitaminai atstato jų stoką organizme ir skatina nervinio audinio natūralų gijimo procesą. „Neuromultivit“ vartojamas esant B grupės vitaminų stokos sukeltiems negalavimams. Vitaminas B1 pasižymi skausmą malšinančiu poveikiu. **Vartojimas:** rekomenduojama dozė yra viena tabletė kartą per parą. Pavieniais atvejais paros dozė galima padidinti iki 3 tablečių. Tabletes reikia nuryti nesukramtyti po valgyimo ir užsigeriant truputį skysčio. **Kontraindikacijos:** retai pasitaiko nespecifinių požymių – vėmimas, galvos skausmas ir svaiugutys. Mažiau tikėtinos padidėjusio jautrumo reakcijos, kurios vartojant vitaminus B1 arba B12 dažniausiai reiškiasi požymiais odoje. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Neuromultivit“ vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas vitaminui B1, vitaminui B6, vitaminui B12 arba bet kuriai pagalbinei „Neuromultivit“ medžiagai. Negalima vartoti vaikams ir paaugliams (jaunesniems negu 18 metų) dėl per didelio veikliųjų medžiagų kiekio. Nedelsiant pranešti gydytojui, jei yra kontraindikacijų vaisto vartojimui, atsirado šalutinio poveikio požymių ar pastojote. Reikėtų vengti vartoti didesnę vaisto dozę ilgiau nei 4 savaites. Vitaminas B6 gali sumažinti kartu vartojamos L-dopos poveikį. **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:** G.L. Pharma GmbH, Schloßplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. **Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį RTT atstovą:** UAB „GL Pharma Vilnius“, A. Jankšto g. 12, Vilnius, tel. (85) 261 0705, el. paštas: office@gl-pharma.lt; www.gl-pharma.lt. Reklamos teksto parengimo data: 2026 04 15.

**SKAUSMUI, TINIMUI IR UŽDEGIMUI MAŽINTI**

9<sup>99</sup> €



**DIFORTAN**, 100 mg/g, gels, 100 g

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** kiekviename „Difortan“ gelio grame yra 100 mg etofenamato. **Terapinės indikacijos:** lengvų arba vidutinio stiprumo raumenų skausmų, kraujosruvų, potrauminio skausmo, lengvo arba vidutinio stiprumo raumenų skausmo (osteoartrozės / osteoartrito), lengvo arba vidutinio stiprumo sąnarių skausmo, sinovito, (neinfekcinio) artrito, bursito, tendinito, vidutinio sunkumo su raumenų ir skeleto sistema susijusio uždegimo, L. y. potrauminės ar reumatinės kilmės, lokalaus gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems kasdien 3–4 kartus per parą, 14 parų, dozės kiekis atitinka nuo 2,5 iki 5 cm išpausto gelio. **Kontraindikacijos:** vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai ar ant egzemos pažeistų paviršių, atvirų žaizdų, vietų su opomis ar pažeidimais. **Specialūs įspėjimai:** „Difortan“ negalima tepti ant gleivinių arba ant akių. Galimas padidėjęs jautrumas dėl kryžinės reakcijos su kitais uždegimus malšinančiais vaistinėmis preparatais rizikos. Kontaktinės fotoalergijos rizika, todėl saugoti nuo saulės spindulių. Negalima atmeti sisteminio poveikio reiškinį galimybės, todėl pacientams, kuriems yra inkstų ar kepenų nepakankamumas, šį vaistinį preparatą reikia vartoti atsargiai. Pasitarti su gydytoju, jeigu būklė nepagerėja arba jei po 7 parų būklė pablogėja. Reklamos teksto parengimo data 2025-05-19.

**EFEKTYVUS IR PATOGUS NAGŲ GRYBELIO GYDYMAS**

NUO 19<sup>99</sup> €



**POSAMYK**

78,22 mg/ml, vaistinis nagų lakas, 3,3 ml 19<sup>99</sup> €

78,22 mg/ml, vaistinis nagų lakas, 6,6 ml 29<sup>99</sup> €

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 ml vaisto yra 78,22 mg terbinafino. **Terapinės indikacijos:** suaugusiųjų, sergančių lengva ar vidutinio sunkumo nagų grybeline infekcija, gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** per pirmąsias 4 gydymo savaites „Posamyk“ ant pakenktų nagų reikia tepti 1 kartą per parą, vėliau – 1 kartą per savaitę. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas terbinafinui arba pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** vartoti tik išorškai. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ Filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. B52601079178. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-07.

**INOVACIJA! EFEKTYVUS IR PATOGUS NAGŲ GRYBELIO GYDYMAS**

**ALERGIJOS SIMPTOMAMS LENGVINTI**

3<sup>99</sup> €



**BILASTINE STADA**, 20 mg, 10 tablečių

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** kiekvienoje tableteje yra 20 mg bilastino. **Terapinės indikacijos:** vartojamas šienligės (kuriai būdingi simptomai yra čiaudulys, niežulys, sloga, užgulta nosis, paraudusios ir ašarojančios akys) ir kitų alerginės slogos formų simptomams lengvinti. Taip pat gali būti vartojamas niežtinčioms odos bėrimams (pūkslės, dilgėlinė) gydyti. Skirtas suaugusiems ir 12 m. bei vyresniems paaugliams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** rekomenduojama dozė yra 1 tabletė per parą. Tablete reikia nuryti nevalgius, 1 val. prieš valgį arba sulčių gerimą, arba praėjus 2 val. po valgyimo arba sulčių gerimo. Nuryti tablete užsigeriant stikline vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** esant vidutinio sunkumo arba sunkiam inkstų funkcijos sutrikimui, jei vartojami kiti vaistai (pvz., ketokonazolas, eritromicinas, diltiazemas, ciklosporinas, ritonaviras, rifampicinas), reikia vengti vartoti kartu su bilastinu. Reklamos teksto parengimo data 2024-12. 2604\_Bilastine\_V01\_LT

**PALENGVINKITE ALERGIJĄ IR MĖGAUKITĖS GYVENIMU!**

**AKIŲ LAŠAI**

-40%



**SYSTANE**

**MEDICINOS PRIEMONĖS**

„Systane“ Balance“ drėkinamieji akių lašai yra skirti laikinai palengvinti deginimo ir dirginimo pojūčius asmenims, kuriems pasireiškia akių sausumo simptomai. „Systane“ Balance“ drėkinamieji akių lašai padeda išlaikyti riebalinį ašarų plėvelės sluoksnį ir ašarų plėvelės stabilumą. „Systane“ Ultra MDPF“ drėkinamieji akių lašai BE KONSERVANTŲ apsaugo akies paviršių, palengvina akių sausumo simptomus ir pagerina matomo vaizdo ryškumą, padeda palaikyti kontaktinių lęšių drėgmumą ir juos drėkina. GREITAS SAUSŲ AKIŲ SIMPTOMŲ LENGVINIMAS. „Systane“ Hydration MDPF“ drėkinamieji akių lašai BE KONSERVANTŲ, su hialuronu rūštinimi. „Systane“ Hydration MDPF“ drėkinamieji akių lašai apsaugo akių paviršių, pagerina matomo vaizdo ryškumą ir ašarų sulaikymą akies paviršiuje, drėkina, sutepia ir apsaugo kontaktinius lęšius. ILGALAIKIS SAUSŲ AKIŲ SIMPTOMŲ LENGVINIMAS. „Systane“ Gel Drops“ drėkinamieji geliniai akių lašai sutepia akies paviršių, kad apsaugotų nuo pažeidimų, kuriuos sukelia sausų akių simptomai. INTENSIVUS akių sausumo simptomų lengvinimas.

\*Akių laika ma geltona etiketė pažymėtomis priemonėmis

## NUO RAUMENŲ IR SĄNARIŲ SKAUSMO

NUO 5<sup>99</sup> €

**VIPROSAL B®**  
tepalas, 50 g 5<sup>99</sup> €  
tepalas, 75 g 7<sup>99</sup> €

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo yra 0,05 V gvažžių nuodų, 10 mg salicilo rūgšties, 30 mg racemino kamparo ir 30 mg terpentino eterinio aliejaus. Indikacijos: sąnarių ir raumenų skausmų malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: nedidelis „Viprosal B“ kiekis (5–10 g, t. y. 1 ar 2 arbatiniai šaukšteliai, atsižvelgiant į pažeistos vietos plotą) užtepamas ant skaudamos vietos ir trinamas į odą 1 arba 2 kartus per parą. Tepi ant odos. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, odos opa ar kitos odos ligos. Specialūs įspėjimai: „Viprosal B“ negalima tepėti ant pažeistos odos. Saugotis, kad tepalo nepatektų ant gleivinės ar į akis. Vietinis rinkodaros teisės turėtojas atstovas: UAB Grindex Kalkės Lietuva, Kėvalarių g. 300, LT-08318 Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2026-04-14

IŠMINTINGAS SPRENDIMAS NUO SKAUSMO!

4<sup>99</sup> €

**TOT'HEMA**, geriamasis tirpalas ampulėmis, 20 x 10 ml

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos: 50 mg geležies, 1,33 mg mangano, 0,7 mg vario. Terapinės indikacijos: geležies trūkumo šalinimas ir profilaktika, ypač nėštumo metu. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugę žmonės, įskaitant senyvus: gerti 2–3 ampules per parą (kaip vienkartinę ar kelias dozes). Vyresni kaip 1 mėn. kūdikiai ir vaikai: sugirdyti doze, atitinkančia 5 mg/kg kūno svorio geležies per parą, neviršijant 60 mg. Profilaktika: pacientams, kuriems yra geležies stokos rizika, ir moterims nuo ketvirtuo nėštumo mėnesio gerti 1 ampulę per parą. Prieš vartojimą ampulę pakratyti. Skiesti vandeniui ar kitu nealkoholiniu gėrimu. Geriausia gerti prieš valgį. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; geležies perteklius organizme; ne geležies stokos anemija; Wilsono liga. Specialūs įspėjimai: neskirti jaunesniems nei 1 mėn. kūdikiams. Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Kai kurių vaistų kartu su „tot'hema“ vartoti negalima, kai kurių vartojimą reikia koreguoti. Pavartojus „Tot'hema“ prieš valgant ir geriant reikia daryti pertrauką. Sudėtyje yra gliukozės, sacharozės, etanolio, natrio ir natrio benzoato. Netinkamai vartojant, geriamasis tirpalas gali patekti į kvėpavimo takus ir sukelti sunkių uždegimų (nektroze, bronchų uždegimą, susiaurėjimą). Simptomai gali pasireikšti net po kelių dienų ar mėnesių: nuolatinis kosulys, kraujavimas iš nosies, dusulys. Kvėpimo atveju nedelsdami kreipkitės į gydytoją ar greitąją pagalbą. „Tot'hema“ draudžiama leisti į vėną. Reklamos teksto parengimo data 2025-08.

3<sup>99</sup> €

**FREST®**, 1 mg/g gėlis, 30 g

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 g gėlio yra 1 mg dimetindeno maleato. Terapinės indikacijos. Frest vartojamas niežėjimo, susijusio su dermatozėmis, dilgeline, vabzdžių įkandimais, nudegimais nuo saulės spindulių ir paviršinių odos nudegimais (pirmojo laipsnio) trumpalaikiam malšinimui suaugusiems, paaugliams ir 1 mėnesio bei vyresniams vaikams. Dozavimas ir vartojimo būdas. Suaugusiems, paaugliams ir vaikams Frest gėlių reikia tepti plonu sluoksniu ant pažeistos ir niežtinčios odos vietos iki 3 kartų per parą. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Frest negalima vartoti jaunesniems nei 1 mėnesio vaikams, ypač neišnešiotiems. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jeigu pasireiškė labai sunkus niežėjimas arba oda labai pažeista, kartu su lokaliais vartojimu dimetindeno maleatu rekomenduojama skirti gydymą sisteminiu poveikiu geriamaisiais vaistais preparatais. Vietinis rinkodaros teisės turėtojas atstovas UAB „Grindex Kalkės Lietuva“. Reklamos teksto parengimo data 2026-04-14

NUO 2<sup>99</sup> €

## THROMBO ASS

50 mg, 100 skrandyje neieri tablečių 2<sup>99</sup> €  
75 mg, 100 skrandyje neieri tablečių 3<sup>99</sup> €  
100 mg, 100 skrandyje neieri tablečių 4<sup>99</sup> €

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veiklioji medžiaga:** acetilsalicilo rūgštis. **Terapinės indikacijos:** miokardo infarkto rizikos mažinimas sergantiems krūtinės angina. Antrinė miokardo infarkto profilaktika. Trombozės profilaktika po vainikinių arterijų nuosrovio operacijos. Antrinė praeinančio smegenų išemijos priepuolio (PSIP) ar insulto profilaktika. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti po 1 tablete 1 kartą per dieną (patariama vakare). Skrandyje neieri tablete reikia nuryti nesukramtyta, užsigeriant pakankamu skysčio kiekiu valgio metu arba tarp valgių tu tu pačiu paros metu. Įprastinė paros dozė ilgalaikiam vartojimui yra 50–150 mg. Dalyti į dalis. „Thrombo ASS“ skrandyje neierios tabletes negalima, nes bus pažeista skrandyje neieri plėvelė. Norint, kad tikti individualiam vartojimui, reikia rinktis atitinkamo stiprumo preparatą (50 mg, 75 mg ir 100 mg). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei salicilatams ir kitiems NVNU; bronchų spazmas; ūminė pepsinė opa; polinkis į kraujavimą, hemofilija; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; sunkus, nepakankamai kontroliuojamas širdies nepakankamumas; nėštumas; vaikai ir paaugliai iki 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Atsargumo reikiai laikytis šiais atvejais: sergant bronchine astma, šienlige, esant nosies gleivinės paburkimui ir esant kito pobūdžio alergijai; vartojant kartu su vaistais, mažinančiais kraujo krešumą; sergant hemolizine anemija; esant skrandžio ir žarnų sutrikimams, esant anamnezėje duomenims apie opaligę ar kraujavimą iš virškinimo trakto; esant inkstų ligoms ir (arba) kepenų funkcijos sutrikimui; turintiems polinkį podagrai. Prieš numatytą operaciją 10 dienų acetilsalicilo rūgštis nevertoti. Šio vaisto sudėtyje yra laktozės monohidrato, todėl vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Pakuotė: 50 mg, 75 mg arba 100 mg, 100 skrandyje neieri tablečių. Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:** G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026 04 15.

## SAUSOMS AKIMS ARTELAC®

-30%



## ARTELAC®

## MEDICINIS PRIEMONĖS

„Artelac“ Splash“ – vienas populiariausių mūsų produktų su hialuronu, skirtas sausoms akims nedelsiant nuraminti ir sudrėkinti. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius. „Artelac“ Rebalance“ užtikrina stiprų drėkinamąjį poveikį ir palengvėjimą, esant nuolat pasikartojančiam akių sausumui. Drėkina akis ir apsaugo jų paviršių, papildoma ašarų plėvele puoselėjančiais joniais, vitaminu B12, sureguliuoja osmosinį akių paviršiaus balansą ir taip padeda ilgam sustabdyti sauso akių simptomų pasireiškimą. „Artelac“ TripleAction“ pažangus tirpalas, sukurtas taip, kad išliktų ant akių paviršiaus, ir intensyviai drėkinamas greitai ir ilgam numalšinti sauso akių simptomus. Sudėtyje esantys komponentai (hialuronas, glicerolis, karbomeris, lipidiniai komponentai) atkuria visus tris ašarų plėveles sluoksnius. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius. „Artelac“ Nighttime Gel“ atkuria ašarų plėvelę nakties metu. Produktas suteikia papildomą apsaugą tiems, kam pasireiškia didesnis ir nuolatinis akių sausumas. 2024-11-11

\*\*ARTELAC™ – PAŽANGŪS SPRENDIMAI SAUSOMS AKIMS.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

NUO 2<sup>49</sup> €

## IBUPROFEN LANNACHER

400 mg, 10 plėvele dengtų tablečių 2<sup>49</sup> €  
400 mg, 20 plėvele dengtų tablečių 3<sup>99</sup> €

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Vienoje plėvele dengtoje tabletyje yra 400 mg ibuprofeno. **Indikacijos:** „Ibuprofen Lannacher“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos ibuprofeno. Ibuprofenas malšina uždegimo sukeltą skausmą, patinimą ir karščiavimą, vartojamas trumpą laiką silpno ar vidutinio stiprumo skausmui, tokiame kaip mėnesinių, galvos, dantų, raumenų, sąnarių, malšinimas. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** tabletes reikia nuryti valgio metu arba pavalgis, užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: 0,5–1 plėvele dengta tablete 3 kartus per parą. Negalima viršyti didžiausios paros dozės 1200 mg ibuprofeno (3 plėvele dengtų tablečių). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijų, vartojant kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo, acetilsalicilo rūgšties darinius. Sunkus kepenų, inkstų ar širdies funkcijos nepakankamumas. Paskutinių trijų mėnesių laikotarpis. Pepsinė opa. Kraujavimas į smegenis, virškinimo trakto ar kt. Sistemineis sindromais ypač kraujavyslių ligomis, cukriniu diabetu ir jungiamojo audinio ligomis, senyviems pacientams. Pacientams, sergantiems bronchine astma ar alergineis ligomis, gali išsivystyti bronchų spazmas. Virškinimo trakto sutrikimai ir lėtinės uždegiminės žarnyno ligos gali palėmti. Atsitraudus virškinimo trakto kraujavimui ar išopėjimui, gydymas turi būti nedelsiant nutrauktas. Vartojamas kaip mažinti moters vaisingumą. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas lėtas paveldimas sutrikimas – lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Pakuotė:** 10 ir 20 plėvele dengtų tablečių. **Farmakoterapinė grupė:** nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo. **ATC kodas:** M01AE01. **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:** „G.L. Pharma GmbH“, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. **Paskutinė teksto peržiūros data:** 2024-10-18. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026 04 15.

NUSIMESK SKAUSMO KAUKĘ!

2<sup>49</sup> €



**PARACETAMOL ZENTIVA**, 500 mg, 20 tablečių

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Kiekvienoje tableteje yra 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos.** Trumpalaikis simptominis lengvo ar vidutinio stiprumo skausmo ir (arba) karščiavimo malšinimas. „Paracetamol Zentiva“ 500 mg tabletes skirtas suaugusiems, paaugliams ir 6 metų bei vyresniems vaikams, sveriantiems daugiau kaip 21 kg. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Reikia vartoti mažiausią veiksmingą dozę kiek galima trumpesni laiką. Didžiausios paros dozės viršyti negalima. Paracetamolis dozuojamas atsivėlgiant į kūno svorį ir amžių, paprastai skiriant vienkartinę 10-15 mg/kg kūno svorio dozę, neviršijant didžiausios paros dozės – 60 mg/kg kūno svorio. Tabletes reikia nuryti užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio, vartoti valgio metu arba nevalgius. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas. Ūminis hepatitas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Paracetamol Zentiva“ nevartokite kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio. Vartojant dienesnes nei rekomenduojama vaisto dozes, padidėja sunkus kepenų pažeidimo pasireiškimo rizika.Vartodami šį vaistą negerkite alkoholinių gėrimų. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025. rugsejis mėn. ID:000785499

NUO 3<sup>99</sup> €



**OTRIVIN**

0,5 mg/ml nosies lašai (tirpalas), 10 ml **3<sup>99</sup> €**  
 1 mg/ml nosies lašai (tirpalas), 10 ml **3<sup>99</sup> €**  
 1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml **5<sup>99</sup> €**  
 MENTHOL, 1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml **5<sup>99</sup> €**

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Ksilometazolino hidrochloridas. **Terapinės indikacijos.** Nosies gleivinės paburkimo mažinimas peršalus, sergant sinusitu, sienlige ar kitokia alergine sloga. Nosiarūklės gleivinės paburkimo mažinimas, gydatant vidurines ausies uždegimą. Nosies ertmės apžiūros atlikimo lengvinimas. **Vartojimas.** „Otrivin“ 0,5 mg/ml nosies lašai. 2-5 m. vaikai: po 1-2 lašus į kiekvieną nosies landą 1-2 kartus per parą (kas 8-10 val.). 6-11 m. vaikai ir paaugliai: po 2-3 lašus į kiekvieną nosies landą 2-3 kartus per parą, kai reikia. „Otrivin“ 1 mg/ml nosies lašai. Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: po 2-3 lašus į kiekvieną nosies landą, kai reikia. „Otrivin Menthol“ 1 mg/ml nosies purškalas ir „Otrivin“ 1 mg/ml nosies purškalas. Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: po 1 įpurškimą į kiekvieną nosies landą, kai reikia. Negalima lašinti / purkšti daugiau kaip 5 dozių per parą į kiekvieną nosies landą. **Kontraindikacijos.** Alergija ksilometazolui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, pacientams, kuriems neseniai buvo atlikta operacija per nosį, sergantiems uždaru kampe glaukoma (padidėjęs spaudimas akyje), lėtiniu nosies uždegimu (sausuoju arba atrofiniu rinitu). **Specialūs įspėjimai.** Negalima vartoti ilgiau kaip 7 d. iš eilės. Negalima viršyti rekomenduojamos dozės, ypač vaikams ir pagybeniusiems žmonėms. **Atsargiai vartoti,** jeigu yra padidėjęs kraujospūdis, širdies liga (pvz., pailgėjęs QT intervalo sindromas), cukrinis diabetas, padidėjęs skydliaukės aktyvumas, padidėjęs prostata, Parkinsono ligos, vadinamųjų MAOI. Labai jautriems pacientams gali sukelti miego sutrikimą, galvos svaigimą, tremorą. Sudėtyje yra benzalkonio chlorido.  **Teksto parengimo data** 2025-02. Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi jų licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas.

**ODOS IR LŪPŲ PŪSELINĖS GYDYMI**

5<sup>99</sup> €



**ACYCLOVIR STADA**, 50 mg/g, kremas, 5 g

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** acikloviras, 1 g kremo yra 50 mg acikloviro. Pagalbinės medžiagos yra dimetikonas, stearilmakrogolijiceridai, celtio alkoholis, skystas parafinas, propilenglikolis, minkštasis baltas parafinas, išgrynintas vanduo. **Terapinės indikacijos:** odos ir lūpų pūselinė gyditi. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems, senyvo amžiaus pacientams ir vaikams pažeistą odos vietą tepti plonu sluoksniu 5 kartus per parą kas 4 val., naktį daroma pertrauka. Kad gydymas būtų kiek galima efektyvesnis, „Acyclovir STADA“ kremo reikia tepi tuoj pat, kai tik atsiranda pirmieji paprastosios pūselinės viruso sukelti pažeidimo simptomai (peršėlimas, niežėjimas, tempimo pojūtis, paraudimas). Gydymo trukmė nustato gydytojas. Dažniausiai gydoma 5 dienas. Pavieniais atvejais gydyti reikia tol, kol pūselės sudžius ir apštrauks šašas arba užgis. Vaisto vartoti ilgiau negu 10 dienų nerekomenduojama. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Ant gleivinės (pvz., burnos, akių arba lyties organų), nes vaistas gali sukelti lokali uždegimą. **Specialūs įspėjimai:** jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Jeigu organizmo atsparumas ligoms yra labai sumažėjęs, prieš gydymą apie tai būtina informuoti gydytoją. Visada vartokite šį vaistą tiksliai taip, kaip aprašyta informaciniame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. **Informacinis lapelis pastarąjį kartą peržiūrėtas 2018-06-06.** 2604\_Acyclovir\_V01\_L1

6<sup>99</sup> €



**VOLTAREN EMULGEL**, 23,2 mg/g gelis, 50 g

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Diklofenako dietilaminas. **Terapinės indikacijos.** Suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: skausmo ir uždegimo mažinimas, kai yra minkštųjų audinių sužalojimas (sausgyslių, raiščių, raumenų ir sąnarių trauma, pavyzdžiui, patempimas, sumušimas); vietinis minkštųjų audinių uždegimas (nugaros skausmas, tendinitas, bursitas). Tik suaugusiems (18 m. ir vyresniems): sąnarių (pvz., kelių) degeneracinės ligos sukeltam skausmui malšinti. **Vartojimas.** Vartoti ant odos. Tepi 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Daugiau informacijos žr. pakutes lapelyje. **Kontraindikacijos.** Alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitoms vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo, paskutinis nėštumo trimestras; jaunesniems kaip 14 m. paaugliams. **Specialūs įspėjimai.** Netepti ant pažeistos odos, atviros žaizdos, odos išbėrimo ar egzemos vietos, didelių odos plotų, saugoti, kad nepatektų į akis ir ant gleivinės, pvz., burnos, nenuryti. Jeigu pasireiškia bėrimas, gydymą nutraukti; nenaudoti su oro nepraleidžiančiais tvarštais. Sudėtyje yra propilenglikolio ir butilhidroksitolueno.  **Teksto parengimo data** 2025-03. Prekių ženklai priklauso „Haleon“ arba „Haleon“ turi jų licenciją. ©2025 „Haleon“ arba licencijos turėtojas.

4<sup>99</sup> €



**VOLTAREN AKTI**

25 mg, 10 minkštųjų kapsulių

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veiklioji medžiaga:** diklofenako kalio druska. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikis nesunkus ir vidutinio sunkumo skausmo (pvz., galvos, dantų, mėnesinių, nugaros, sąnarių ir raumenų), peršalimo ir gripo simptomų, įskaitant karščiavimą, malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: pradinė dozė – 1 kapsulė, veltuoti po 1 kapsulę kas 4-6 val., jeigu reikia. Nevartokite daugiau kaip 5 kapsulių per 24 val. Vartoti ne ilgiau kaip 5 paras skausmui malšinti ir ne ilgiau kaip 3 paras karščiavimui mažinti. **Kontraindikacijos:** alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, raišiams vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo, širdies ligos, galvos smegenų kraujagyslių liga, sutrikusi kraujotaka, skrandžio ar žarnyno opa, sunkus inkstų ar kepenų nepakankamumas, kraujavimas iš virškinimo trakto arba jo prakiurimas, paskutinis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai:** šalutinį poveikį galima sumažinti, vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką. Pasitarkite su gydytoju, jeigu kada nors turėjote virškinimo trakto sutrikimų, sergate ar sirgote žarnyno ligomis, yra pasireiškęs nemalonus pojūtis skrandyje ar remio, neseniai atlikta arba bus atliekama skrandžio arba žarnyno operacija, vartojate kitų vaistų nuo skausmo ar uždegimo, sergate bronchų astma arba šienlige, kepenų ar inkstų ligomis, sergate arba sirgote širdies liga arba yra padidėjęs kraujospūdis, brinksna pedos, esate netekę daug skysčių, yra kraujavimo sutrikimų ar kitų kraujo sutrikimų, rūkote, sergate diabetu, yra padidėjęs cholesterolio ar trigliceridų kiekis. Senyviems pacientams labai svarbu skubiai pranešti gydytoju apie pastebėtus šalutinius poveikius. Tablečių sudėtyje yra laktozės ir natrio, kapsulių sudėtyje yra sorbitolio ir manitolio. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-03. Prekių ženklai priklauso „Haleon“ arba „Haleon“ turi jų licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas.

11<sup>99</sup> €



**VOLTINEX**, 140 mg, 5 vaistiniai pleistrai

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Diklofenako natrio druska. **Terapinės indikacijos.** Vietinis, simptominis, trumpalaikis (ne ilgiau kaip 7 paras) skausmo malšinimas po ūminių patempimų, įplyšimų ar sumušimų, atsiradusių dėl rankų ir kojų traumų, 16 m. ir vyresniems paaugliams bei suaugusiems. **Vartojimas.** 1 vaistinis pleistras turi būti užklijuojamas ant skausmingo ploto 1 kartą per parą. Didžiausia paros dozė yra 1 vaistinis pleistras, net jei yra daugiau nei viena pažeista vieta, kurią reikia gydyti. Tik vienas skausmingas plotas gali būti gydomas vienu metu. Vartoti ant odos. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai ar kitoms nesteroidiniams vaistiniams preparatams nuo uždegimo. Pacientams, kuriems dėl acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistinių preparatų nuo uždegimo vartojimo buvo pasireiškęs astmos priepuolis, dilgėlinė ar ūminis rinitas. Pacientams, kuriems yra aktyvi pepsinė opa. Negalima pleistro naudoti ant pažeistos odos, kad ir koks būtų pažeidimo pobūdis, trečiojo nėštumo trimestro metu. Vaikams ir jaunesniems kaip 16 m. paaugliams. **Specialūs įspėjimai.** Vaistinis pleistras neturi būti klijuojamas ar kaip nors kontaktuoti su akimis ar gleivine. Senyvi pacientai „Voltinex“ turi naudoti atsargiai dėl didesnio šalutinio poveikio pasireiškimo tikimybės. Pasitarkite su gydytoju, jeigu sergate ar sirgote bronchine astma arba alergija, turite inkstų, širdies ar kepenų sutrikimų, anksčiau turėjote skrandžio ar žarnyno opa, žarnyno uždegimą arba turite padidėjusį polinkį kraujuoti. Jei pastebite odos išbėrimą, kuris atsirado naudojant pleistrą, nedelsdami nuimkite vaistinį pleistrą ir sustabdykite gydymą. Nuklijavę pleistrą venkite gydytos vietos kontakto su saulės ar soliariumo spinduliais. „Voltinex“ naudojimo metu nevartokite jokių kitų vaistų su diklofenaku ar kitų nesteroidinių skausmą malšinančių ar priešūždegiminių vaistų, kad ir kaip jie būtų vartojami – išorškai ar per burną.  **Reklamos teksto** parengimo data 2025-09. Prekių ženklai priklauso „Haleon“ arba „Haleon“ turi jų licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas.

## NUO RĖMENS

2<sup>99</sup> €

## OMEPRAZOLE INTELI

20 mg, 14 skrandyje neirių kietųjų kapsulių

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

„Omeprazole Inteli“ sudėtyje yra aktyvios medžiagos omeprazole. „Omeprazole Inteli“ mažina rūgšties kiekį Jūsų skrandyje. Vaistas vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refluksinio simptomų (rėmens ir rūgšties atpylimo) gydymui. „Omeprazole Inteli“ vartoti negalima jeigu Jūs esate alergiškas omeprazolei arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (nurodyta informaciniame lapelyje); jeigu Jūs esate alergiškas kitiems vaistams, priklausantiems protonų siurblio inhibitorių grupei (pvz., pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, ezomeprazolui); jeigu Jūs vartojate vaisto, kurio sudėtyje yra nelfinaviro (vartojamo nuo ŽIV infekcijos), įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Omeprazole Inteli“. Ypač jei vartojate informaciniame lapelyje išvardytų vaistų. Neštumas ir žindymo laikotarpis. Prieš vartodama „Omeprazole Inteli“, pasakykite savo gydytojui, jog esate nėščia ar ketinate pastoti. Tokiu atveju gydytojais nuspręsta, ar šiuo laiku Jums galima vartoti „Omeprazole Inteli“. Kaip vartoti „Omeprazole Inteli“. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į savo gydytoją. Galimas šalutinis poveikis. Šis vaistas, kaip ir kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Nedelsdami nutraukite „Omeprazole Inteli“ vartojimą ir kreipkitės į gydytoją, jeigu pastebite kurį nors iš šio roto, bet sunkaus šalutinio poveikio atveju: staiga prasidėjo švokštimas, lūpu, liežuviu, gerklų ar kūno tinimas, išbėrimas, alpimas ar sutrikio rijimas (sunki alerginė reakcija); paraudo, tapo pūslėta ir lupasi oda. Taip pat gali atsirasti lūpu, akių, burnos ertmės, nosies, lytinių organų pūslėtas ar kraujavimas (tai gali būti Stevens-Johnson sindromas arba toksinė epidermolizė); pagelto oda, patamsejo šlapimas ar atsirado nuovargis (šis simptomas gali rodyti sutrikusią kepenų funkciją). Ši informacija paskutinią kartą peržiūrėta 2024.04.29.

3<sup>49</sup> €

## NEOCITRAMONAS

240 mg / 200 mg / 30 mg, 20 tablečių

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 tabletyje yra 240 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg paracetamolio ir 30 mg kofeino. **Terapinės indikacijos:** vaistas vartojamas trumpalaikiam lengvo ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių ir menstruaciam skausmui malšinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tabletes reikia vartoti nekrantant, užgeriant ne mažiau kaip 250 ml vandens. Atsivėlgiant į ligos sunkumą, vartoti po 1 tablete 1–4 kartus per dieną. Didžiausia paros dozė – 4 tabletės. Negalima vaisto vartoti dažniau kaip kas 6 val. ir ilgiau kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, esanti ar buvusi virškinimo trakto opa ir (arba) kraujavimas iš virškinimo trakto, buvusi bronchų astma, kurią sukėlė salicilatai ar kitokie nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, pacientas jaunesnis negu 12 m., trys paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas, ligos, kurių metu yra padidėjęs kraujavimo pavojus, kraujo krešėjimo sutrikimas, vartojama 15 mg ar didesnė metotreksato savaitės dozė, sunkūs širdies, kepenų, inkstų nepakankamumas, labai sunki aukšto kraujo spaudimo liga, kamuoja nemiga, padidėjęs nervingumas, dirglumas, nerimas, baimė, sujaudinimas ar panašios simptomai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pastartite su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergama podagra, bronchų astma, kolagenozėmis ar kraujodaros sistemos ligomis, yra sustiprėjusi skydliaukės veikla ar sergama cukriniu diabetu, yra virškinimo trakto, inkstų, kepenų ar širdies funkcijos sutrikimų, yra buvusi alergija kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, planuojama chirurginė operacija, pacientas yra jaunesnis kaip 16 m. ir serga virusinėmis ligomis, pacientas yra senyvas, planuojama pastoti, pakinta šlapimo kiekis, pasireiškia pabrinkimų ar skausmas juosmens srityje, pagelsta oda ar akys, patamsejo šlapimas, atsiranda bendras silpnumas, yra nerimo sutrikimas, panikos sutrikimas ar nemiga. Sudėtyje esantis kofeinas gali sukelti drebulį, dažną širdies plakimą, viduriavimą, sujaudinimą, stiprų širdies plakimą, nemigą, galvos skausmą, raumenų trūkčiojimą ir šlapimo išsiskyrimo padidėjimą. **Reklamos teksto parengimo data 2024-11-14.**

## NUO SUMUŠIMŲ

9<sup>99</sup> €

## DOLOBENE™ gelis, 50 g

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 g gelio yra 500 TV heparino natrio druskos, 150 mg dimetilsulfoksido, 25 mg deksantenolio. **Terapinės indikacijos:** patinimo, hematomos ir uždegimo po bukus raumenų, sausgyslių, sausgyslių mąščių, raiščių, sąnarių traumos gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tepti geliu pažeistą vietą 1–2 kartus per parą. Nereikia įtrinti, tik švelniai užtepti ir paskleisti. Nenaudoti po oro neparaudžiančiais tvarščiais. „Dolobene“ negalima tepiti ant atviras žaizdas, pažeistos odos ir gleivinės. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sergantiesiems raudonąja vilkige; astma; jaunesniems kaip 5 m. vaikams; esant sunkių inkstų ir (arba) kepenų paeidimų, kraujotakos sutrikimų; negalima vartoti kartu su sulindaku. **Specialūs įspėjimai:** nepatariama tepiti ant pažeistos odos ir gleivinės. Sudėtyje esantis makroglicerolio hidroksistearatas gali sukelti odos reakciją. DLBN-LI-00002.  **Teksto peržiūros data 2024-02-01. Reklamos teksto parengimo data 2026-03.**

6<sup>99</sup> €

## LARYXIN

LEMON, 5 mg/1 mg, 24 suslėgtosios pastilės

MENTHOL, 5 mg/1 mg, 24 suslėgtosios pastilės

STRAWBERRY, 5 mg/1 mg, 24 suslėgtosios pastilės

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Sudėtis:** 1 suslėgtojoje pastilyje yra 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido ir 1 mg lidokaino hidrochlorido monohidratai. **Terapinės indikacijos:** gerklės skausmo simptomų malšinimas suaugusiems ir 12 m. bei vyresniems paaugliams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** leiskite pastilėlei ištirpti burnoje. Suaugusiems – po 1 pastilę kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 10 pastilių per dieną. 12–18 m. paaugliams – po 1 pastilę kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 5 pastiles per dieną. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 5 dienas iš eilės. **Kontraindikacijos:** alergija chlorheksidinum, lidokainui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jaunesniems kaip 12 m. vaikams ir paaugliams. **Specialūs įspėjimai:** vaista vartokite tik trumpą laiką skausmui ir dirginimui malšinti. Kreipkitės į gydytoją, jei per 3–4 dienas Jūsų saviujauta nepagerėjo arba karščiuojate, skauda galvą, pykina, vemiate ar atsiranda odos išbėrimas. Jeigu esate alergiški kitiems vietiniams amidių grupės anestetikams, pavyzdžiui, lidokainui, turite laikytis saugumo priemonių. Vartojant didesnes nei rekomenduojama dozes, gali sumažėti rijimo refleksio valdymas. Dėl to gali padidėti skyščių ir maisto dalelių įkvėpimo rizika. Nevartokite tuo pačiu metu, prieš pat ar iš karto po kitų burnos ir (arba) gerklės dezinfekavimo priemonių. „Laryxin Lemon“ suslėgtųjų pastilių sudėtyje yra sorbitolio (fruktozės šaltinis, taip pat gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir žarnyno vidurius laisvinantį poveikį), aspartamo (fenilalanino šaltinis, gali būti kenksmingas sergantiesiems fenilketonurija), benzilo alkoholio (gali sukelti alerginių reakcijų), maltodekstrino (jis skaidomas į gliukozę) ir natrto (dėl mažo kiekio jis beveik neturi reikšmės). „Laryxin Menthol“ suslėgtųjų pastilių sudėtyje yra sorbitolio ir levomentolio (duodant vartoti mažiems vaikams, kuriems anksčiau yra buvę traukulii, reikia laikytis saugumo priemonių). „Laryxin Strawberry“ suslėgtųjų pastilių sudėtyje yra sorbitolio, maltodekstrino, levomentolio ir natrto (dėl mažo kiekio jis beveik neturi reikšmės).

## TEMPERATŪRAI MAŽINTI IR SKAUSMUI MALŠINTI

NUO 3<sup>99</sup> €

## IBUGARD

100 mg/5 ml geriamoji suspensija, 100 ml 3<sup>99</sup> €200 mg/5 ml geriamoji suspensija, 100 ml 7<sup>99</sup> €

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 5 ml IBUGARD 100 mg/5 ml geriamosios suspensijos yra 100 mg ibuprofeno. 5 ml IBUGARD 200 mg/5 ml geriamosios suspensijos yra 200 mg ibuprofeno. **Terapinės indikacijos:** Ivaiznis kilmės karščiavimas, Ivaiznis kilmės silpno ir vidutinio stiprumo skausmo, tokio, kaip virusinės ar kitokios infekcijos sukeltas galvos, gerklės ir raumenų skausmas; sąnarių ir kaulų skausmas; pooperacinis skausmas; danties skausmas, galvos skausmas; ausies skausmas, esant vidurinės ausies uždegimui, mažinimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** nustatant ibuprofeno dozę, reikia atsižvelgti į paciento kūno svorį ir amžių. Paprastai vienkartinė ibuprofeno dozė yra 7–10 mg/kg kūno svorio, maksimali paros dozė yra 20–30 mg/kg kūno svorio. Dozė galima kartoti kas 6–8 valandas, tarp dozių turi būti ne mažesnis nei 4 valandų intervalas. Tik trumpalaikiam vartojimui. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas ibuprofenui, aspirinui ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NNU), arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei sergate ar sirgote skrandžio ir (arba) dvylikapirštės žarnos opa ar kraujavimu iš virškinamojo trakto; sergate sunkiu kepenų, širdies ar inkstų funkcijos sutrikimu. Yra polinkis į kraujavimą. **Specialūs įspėjimai:** specialių atsargumo priemonių reikia, jei inkstų, kepenų ar širdies funkcija yra sutrikusi, sutrikęs kraujo krešėjimas arba vartojami antikoaguliantai, sergama cukriniu diabetu, raudonąja vilkige, krono liga, opiniu kolitu, hipertenzija, astma, šienlige, yra nosies polipai ar lėtinė infekcinė kvėpavimo takų liga.  **Teksto paruošimo data 2025-02-02.**

8<sup>99</sup> €

## LARYXIN MENTHOL

2 mg/0,5 mg/ml, 30 ml

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Sudėtis:** 1 išpurškime yra 0,17 mg chlorheksidino diglikonato ir 0,045 mg lidokaino hidrochlorido monohidratai. **Terapinės indikacijos:** gerklės skausmo simptomų malšinimas suaugusiems ir 12 m. bei vyresniems paaugliams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti ant burnos gleivinės. Suaugusiems – po 3–5 išpurškimus į galinę gerklės dalį kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 10 kartų per parą. 12–18 m. paaugliams – po 2–3 išpurškimus į galinę gerklės dalį kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 5 kartus per parą. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 5 dienas iš eilės. **Kontraindikacijos:** alergija chlorheksidinum, lidokainui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jaunesniems kaip 12 m. vaikams ir paaugliams. **Specialūs įspėjimai:** vaista vartokite tik trumpam laikui skausmui ir dirginimui malšinti. Kreipkitės į gydytoją, jei per 3–4 dienas Jūsų saviujauta nepagerėjo arba karščiuojate, skauda galvą, pykina, vemiate ar atsiranda odos išbėrimas. Jeigu esate alergiški kitiems vietiniams amidių grupės anestetikams, pavyzdžiui, lidokainui, turite laikytis saugumo priemonių. Vartojant didesnes nei rekomenduojama dozes, gali sumažėti rijimo refleksio valdymas. Dėl to gali padidėti skyščių ir maisto dalelių įkvėpimo rizika. Nevartokite tuo pačiu metu, prieš pat ar iš karto po kitų burnos ir (arba) gerklės dezinfekavimo priemonių vartojimo. „Laryxin Menthol“ burnos gleivinės purškalo sudėtyje yra etanolio (96 %) ir levomentolio (duodant vartoti mažiems vaikams, kuriems anksčiau yra buvę traukulii, reikia laikytis saugumo priemonių). Mažas alkoholio (etanolio) kiekis, esantis šio vaisto sudėtyje, nesukelia pastebimo poveikio. Reklamos teksto parengimo data 2025-01.

NUO 5<sup>99</sup> €



**SOLPADEINE**  
12 tablečių 5<sup>99</sup> €  
12 tirpinamųjų tablečių 6<sup>99</sup> €

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veiklioji medžiaga, stiprumas:** kiekvienoje tableteje ir kiekvienoje tirpinamojoje tableteje yra 500 mg paracetamolio, 8 mg kodeino fosfato hemihidrata ir 30 mg kofeino. **Terapinės indikacijos:** silpno ir vidutinio stiprumo skausmo (šnarių, nugaros, galvos ir migreninio, menstruacinio, neuralginio bei dantų) malšinimas. Peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems: „Solpadeine“ tirpinamosios tabletės: po 2 tabletes iškart po mažiau kaip pusę stiklinės vandens ir gerti ne dažniau kaip 4 kartus per parą (pagal poreikį); „Solpadeine“ tabletės: po 2 tabletes, jei reikia, 3–4 kartus per parą. Nevartoti dažniau nei kas 4 val. ir ne daugiau kaip 8 tabletes per bet kurias 24 val. 12–15 metų paaugliams: po 1 tabletę kas 6 val. Neviršyti maksimalios paros dozės – 4 tablečių per parą, 16–17 metų paaugliams: po 1–2 tabletes kas 6 val. Neviršyti maksimalios paros dozės – 8 tablečių per parą. **Specialūs įspėjimai:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš pradėdami vartoti šį vaistą, jeigu: Jūs sergate sunkia inkstų ar kepenų liga; sutrikusi žarnyno veikla, įskaitant žarnyno veiklos sustojimą; Jums operacijos metu buvo pašalinta tulžies pūsle; vartojate vaistų nuo depresijos arba kvėpavimo sutrikimų; valgotė maistą, kuriame yra mažai natrio (kiekvienoje tableteje yra 427 mg natrio); vartojate vaistų nuo pykinimo, vėmimo arba padidėjusio cholesterolio kiekio kraujyje; jeigu esate arba kada nors buvotė priklausomas (-a) nuo opioidų, alkoholio, narkotikų, receptinių vaistų arba neįsėdusių cheminių medžiagų. Reguliariai ir ilgą laiką vartojant kodeiną (šio vaisto veiklioji medžiaga), gali išsivystyti priklausomybė nuo šio vaisto ir Jūs galite pradėti netinkamai jį vartoti. Nevartokite šio vaisto ilgiau nei reikia. Neduokite šio vaisto niekam kitam. Nevartokite per daug produktų, kuriuose yra kofeino. Kartu su šiuo vaistu nevartokite kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio ar kodeino. Kiekvienoje „Solpadeine“ tirpinamojoje tableteje yra 427 mg natrio. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliosios medžiagos (paracetamolio, kodeino fosfato hemihidratai, kofeinui, skausmą malšinantiesiems opioidams) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio; jeigu Jums yra lėtinis vidurių užkietėjimas; jeigu Jums yra kvėpavimo funkcijos nepakankamumas; jeigu Jums buvo galvos trauma; jeigu Jums yra padidėjęs intrakranijinis spaudimas; jeigu Jums buvo atlikta tulžies latakų operacija; vaikams, jaunesniams kaip 12 metų; mašinti skausmo vaikams ir paaugliams (0-18 metų) po gerklės ir ryklės migdolyų pašalinimo dėl obstrukcinės miego apnėjos sindromo operacijos; jeigu yra žinoma, kad Jūsų organizme kodeinas labai greitai metabolizuojamas į morfina; jeigu esate nėščia arba žindote kūdikį. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026-04-20.

**NUO SLOGOS**

NUO 3<sup>99</sup> €



**OLYNTH®**  
1 mg/ml, nosies lašai (tirpalas), 10 ml 3<sup>99</sup> €  
1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 5<sup>49</sup> €  
HA, 0,5 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 5<sup>99</sup> €  
HA, 1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 5<sup>99</sup> €

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 ml tirpalo yra 0,5 mg arba 1 mg ksilometazolino hidroklorido. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikis simptominis nosies gleivinės paburkimo lengvinimas, sergant rinitu ar sinusitu. „Olynth“ HA, 1 mg/ml ir „Olynth“, 1 mg/ml skiriamas vartoti suaugusiems, 12 m ir vyresniems vaikams. „Olynth“ HA, 0,5 mg/ml skiriamas vartoti 2–12 m. vaikams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** purški po 1 įpuškimą arba lašinti po 1 lašą į kiekvieną nosies landą ne daugiau kaip 3 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; padidėjęs akispūdis, ypač padidėjęs, ypač padidėjęs; nosies gleivinės uždegimas; sausasis arba vazomotorinis nosies gleivinės uždegimas; pacientai, kuriems atlikta transfenoidalinė hipofizektomija; monoaminooksidazės inhibitorių vartojimas šiuo metu arba per pastarąsias 2 savaites; vaistų, galinčių padidinti kraujospūdį, vartojimas; pacientai, sergantys atrofiniu arba vazomotoriniu rinitu. **Specialūs įspėjimai:** jei gydytojo nepadėjęs rinitas, negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Atsargiai vartoti pacientams, kurie jautriai reaguoja į simpatomimetikus, serga širdies ir kraujagyslių ligomis, hipertenzija, hiperteroze, cukriniu diabetu, esant prostatos hipertrofijai ar sergant feochromocitoma. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-02. LT-OLV-2025-106030

**GREITAS PALENGVĖJIMAS NOSIAI IR SINUSAMS.**

**SVORIO MAŽINIMUI**

33<sup>99</sup> €



**ORLISTAT POLPHARMA**, 60 mg, 42 kietosios kapsulės


**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Vienoje kietosioje kapsulėje yra 60 mg orlistato. **Indikacijos:** „Orlistat Polpharma“ yra skirtas antsvorio turintiems (kūno masės indeksas KMI  $\geq 28$  kg/m<sup>2</sup>) suaugusiems žmonėms svorio mažinti. Vartojant šį vaistinį preparatą reikia laikytis šiek tiek sumažinto kaloriningumo ir sumažinto riebalų kiekio dietos. **Dozavimas:** rekomenduojama „Orlistat Polpharma“ dozė yra viena 60 mg kapsulė tris kartus per parą. Per 24 valandas galima išgerti ne daugiau kaip tris 60 mg kapsules. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; kartu taikomas gydymas ciklosporinu; lėtinis malabsorbcijos sindromas; cholestazė; nėštumas; žindymas; kartu taikomas gydymas varfarinu arba kitais geriamaisiais antikoaguliantais. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pacientai turi tvirtai laikytis rekomenduotos dietos. Jei orlistatas vartojamas kiekvieno maitinimosi metu arba valgomą riebus maistas, gali dažniau pasireikšti virškinimo trakto simptomų tikimybė. Gydymas orlistatu gali sutrikdyti riebaluose tirpių vitaminų (A, D, E ir K) absorbciją. Todėl reikia gerti polivitaminų papildą. Cukrinii diabetu sergantys asmenys, prieš pradėdami gydymą „Orlistat Polpharma“ turi pasitarti su gydytoju. Pacientai, vartojantys „Orlistat Polpharma“ kartu su vaistais preparatais hipertenzijai arba hipercholesterolemijai gydyti, turi pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Amiodaroną, levotiroksiną vartojantys pacientai, prieš pradėdami gydymą „Orlistat Polpharma“, turi pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Pranešta apie kraujavimo iš tiesiosios žarnos atvejus pacientams, vartojantiems orlistatą. Jeigu taip nutinka, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Jeigu prasideda stiprus viduriavimas, geriamieji kontraceptikai gali nesukelti pagėdijamo poveikio, todėl rekomenduojama naudoti papildomas kontracepcijos priemones. Pacientai, sergantys inkstų ligomis, epilepsija prieš pradėdami gydymą „Orlistat Polpharma“, turi pasitarti su gydytoju. **Teksto paruošimo data:** 2025.03.

**SUMAŽINK SVORĮ SAUGIAI.**

**NUO RĖMENS**

3<sup>99</sup> €



**PANZILAN®**, 20 mg, 14 skrandyje neišsiskiriančių tablečių

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Pantoprazolas. Vienoje tableteje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidratao pavidalu). **Indikacijos:** „Panzilan“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos pantoprazolo, kuri blokuoja skrandžio rūgšties gaminti, „stūribi“, todėl skrandyje sumažėja rūgšties kiekis. „Panzilan“ vartojamas trumpalaikiam gastroezofaginio refliksų simptomų (pvz., rėmens, rūgščių atpylimo) suaugusiems pacientams gydymui. Refliuksas yra rūgščių iš skrandžio atgalinis patekimas į stemplę, kurioje gali prasidėti uždegimas ir sukelti skausmą. Dėl to gali atsirasti tokių simptomų, kaip skausmingas deginimo pojūtis krūtineje kylantis iki ryklės (rėmuo) ir rūgštus skonis burnoje (rūgštis atpylimas). **Dozavimas ir vartojimo būdas:** Gerti po 1 tabletę per parą prieš valgį tuo pačiu paros laiku 2-3 dienas iš eilės, užsigeriant vandeniu. Tabletes reikia nuryti, negalima kramtyti ar laužyti. Neviršykite rekomenduojamos 20 mg pantoprazolo dozės per parą. **Nutraukite „Panzilan“ vartojimą, kai visai pranykęs ligos simptomai.** Nepasitarus su gydytoju vartoti „Panzilan“ ilgiau kaip 4 savaites negalima. **Kontraindikacijos:** Jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) pantoprazoliui, sojų lecitinui arba bet kuriai pagalbinei „Panzilan“ medžiagai; kartu vartojami vaistai, kurių sudėtyje yra alazanarivo; amžius iki 18 metų, nėštumas arba kūdikio žindymas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Jeigu dėl rėmens arba virškinimo sutrikimo gydotes ilgiau kaip 4 savaites, esate vyresnis kaip 55 metai ir kasdien vartojate nereceptinius vaistus dėl sutrikusio virškinimo, atsirado naujų simptomų arba simptomai neseniai pasikėlė, anksčiau sirgote skrandžio opalige arba buvo atlikta skrandžio operacija; sutrikusi kepenų veikla arba atsirado gelta; numatoma atlikti endoskopiją arba C-šlapalo mėginį. Jeigu numatyta atlikti kraujo mėginį, pasakykite gydytoju, kad vartojate šį vaistą. Atsargumo ir rėmens simptomai gali palengvėti pavartojus „Panzilan“ vos viena diena, tačiau šis vaistas neturi sukelti pagerejimo nedelsiant. Ne galima vartoti profilaktikai. Jei Jums gydytojas sakė, kad netoleruojate kalčių angliavandenių, prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su gydytoju. „Panzilan“ sudėtyje yra sojų lecitino. Jei esate alergiškas žemės riešutams ar sojai, vaisto vartoti negalima. **Teksto paruošimo data:** 2024-11-21. **Reklamos parengimo data:** 2026 04 15.

**UŽGESINK GAISRĄ SKRANDYJE!**

NUO 10<sup>99</sup> €



**NIZORAL**  
20 mg/g šampūnas, 60 ml 10<sup>99</sup> €  
20 mg/g šampūnas, 100 ml 15<sup>99</sup> €

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veiklioji medžiaga, stiprumas:** 1 g šampūno yra 20 mg ketokonazolo. **Terapinės indikacijos:** „Nizoral“ šampūnas yra vaistas, vartojamas infekcinėms odos ligoms, kurias sukelia grybeliai, gydyti: sėleniniam galvos odos pleiskanajumiui (*Pityriasis capitis*); seborėjiniam dermatitui (rausvai rudos dėmės, padengtos geltonomis arba baltomis pleiskanomis); įvairiaspalvei dedervinei (*Pityriasis versicolor*) (ant liemens esančios mažos rudos ar baltos spalvos, nelygiais kraštais dėmės). „Nizoral“ šampūnas tinka *Pityriasis capitis* ir seborėjinio dermatito profilaktikai. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Nizoral“ šampūnas skirtas vartoti paaugliams ir suaugusiems. Pažeista oda reikia sudrėkinti. „Nizoral“ šampūno ir palaikyti 3–5 minutes, kad išsiregtų (paprastai 1 kartą užtenka 1 saujos šampūno). Po to oda ir plaukus reikia gerai nuplauti vandeniu. Odos drėkinimo šampūno dažnis priklauso nuo grybelių rūšies ir nuo to, ar vaistas vartojamas ligai gydyti, ar jos profilaktikai. Gydant galvos odos seborėjinį dermatitą ir pleiskaną: „Nizoral“ šampūno reikia plauti 2 kartus per savaitę 2–4 savaites, profilaktikai, kad ligos neatsinaujotų, – 1 kartą per savaitę arba kas 2 savaites. Gydant įvairiaspalvę dedervinę: oda „Nizoral“ šampūno reikia plauti 1 kartą per dieną 1 dieną. **Kontraindikacijos:** „Nizoral“ šampūno vartoti negalima, jeigu yra alergija ketokonazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (suderinti šampūno oda parausta, pradeda niežėti). **Specialūs įspėjimai:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Nizoral“. Reikia saugotis, kad „Nizoral“, kaip ir kitokio šampūno, nepatektų į akis. Jeigu taip atsitinka, jas reikia plauti vandeniu. **Reklamos teksto parengimo data:** 2022-11. 2601\_SB\_NIZORAL\_V01\_LT

**NUGALĖK PLEISKANAS SU „NIZORAL“!**

5<sup>99</sup> €



**MILGAMMA® N**, 20 minkštųjų kapsulių

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 40 mg bentofiamino (riebaluose tirpus vitamino B<sub>12</sub> darinio), 90 mg piridoksino hidroklorido (vitamino B<sub>6</sub>) ir 250 µg cianokobalmino (vitamino B<sub>12</sub>). **Terapinės indikacijos:** Vitaminų B<sub>6</sub>, B<sub>12</sub> ir trūkumo šalinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** **Suaugusiems:** po 1 kapsulę 3–4 kartus per parą. Kai liga lengva ir jei vaistinis preparatas padeda, per parą pakanka 1–2 kapsulių. Vartoti per burną. Kapsulę reikia praryti po valgio nesukramtyta, užsigeriant truputį skysčio. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos, žemės riešutams, sojoms arba bet kuriai pagalbinei vartojimo pagalbinei medžiagai. Asmenims, kuriems trūksta vitamino B<sub>12</sub>, ir kuriems gresia Leberio rodos atrofia. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Vartojama ilgiau negu 6 mėn. „Milgamma N“ gali sukelti neuropatiją. Reikia atsargiai ir atidytų kartų vartojamų vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra sorbitolio (ar fruktozės), ir su maistu vartojamo sorbitolio (ar fruktozės) poveikio. Geriamoji vaistinio preparato sudėtyje esantis sorbitolis gali paveikti kitų kartų vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį prieinamumą. Jeigu yra alergija žemės riešutams arba sojoms, šio vaistinio preparato vartoti negalima. **Registruotojas:** „Worwag Pharma GmbH & Co. KG“, Vokietija. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026-01-12.

**GYVYBIŠKAI BŪTINAS GERAI SAVIJAUTAI!**

-40%

**SALDUS MIEGAS**15 kapsulių ~~40<sup>99</sup> 6<sup>23</sup> €~~eliksyras, 150 ml ~~44<sup>99</sup> 6<sup>83</sup> €~~MELATONINAS, 30 kietųjų kapsulių ~~44<sup>99</sup> 7<sup>13</sup> €~~**MAISTO PAPILDAI**

Linija „Saldus miegas“ – viena iš populiariausių maisto papildų linijų miegui Lietuvoje. Greitesniam užmigimui ir kokybiškam poilsui, su fitomelatoninu (augaliniu melatoninu). „Saldus miegas“ – net 7 aktyviųjų medžiagų kompleksas, kurio sudėtyje vaistiniu ramunių žiedų ekstraktas, padedantis palaikyti normalią miego kokybę. „Saldus miegas fitoMELATONINAS“ preparate yra 1 mg fitomelatonino. „Saldus miegas eliksyras“ karamėlis skonio, skystas maisto papildas. Sudėtyje yra GAsR (Gamma-amino sviesto rūgštis), 5-hidroksitriptofano (5- HTP) ir 1 mg fitomelatonino, kuris padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę (teigiama poveikis pasirodė suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti).

**GERAM POILSIUI – „SALDUS MIEGAS“!**5<sup>99</sup> €**WINTROZEN**

600 mg, 10 šnypščiujų tablečių

**NERCEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Kiekvienoje šnypščioje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino.

**Terapinės indikacijos.** „Wintroxen“ skirtas gleivėms skystinti ir atsikoveigo lengvinti sergant peršalimo sukeltu bronchitu, suaugusiems ir vyresniams kaip 14 metų paaugliams. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems ir vyresniams kaip 14 metų paaugliams: rekomenduojama dozė yra 1 tabletė (600 mg) 1 kartą per parą, vakare. Jūsų gydytojas gali pakeisti vartojimo dažnį ir dozę, neviršydamas 600 mg didžiausios paros dozės. „Wintroxen“ negali būti vartojamas ilgiau nei 5 dienas. **Vartojimo metodas.** 1 šnypščiąją tabletę ištirpinti stiklinėje vandens. Paruštą tirpalą reikia išgerti per kelias minutes. Rekomenduojama nemašyti „Wintroxen“ su kitais vaistais. **Kontraindikacijos.** „Wintroxen“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija acetilcisteinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Del didelio veikliosios medžiagos kiekio, „Wintroxen“ negalima vartoti vaikams ir jaunesniams kaip 14 metų paaugliams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Wintroxen“, jeigu: atsiranda naujų odos ir gleivinės pokyčių. Labai retai gauta pranešimų apie sunkių odos reakcijų, sergate uždegimine bronchų liga, netoleruojate histamino, yra ar anksčiau buvo skrandžio ar žarnyno problemų, vadinamųjų skrandžio ar dvilikapirštės žarnos opomis, ypač kai kartu su „Wintroxen“ vartojami kiti skrandžio gleivinę dirginantys vaistai. Jeigu jaučiate sieros kvapą, nesijaudinkite, nes tai yra acetilcisteino savybė ir nereiškia, kad vaistas pakito. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025 m. gegužės mėn. ID:000729217

**AKIŲ DIRGINIMO, AŠAROJIMO, PERVERGIMO, VOKŲ KRAŠTŲ UŽDEGIMO LENGINIMAS**9<sup>99</sup> €**OCULOHEEL**

akių lašai (tirpalas), 3 paketėliai po 5 vienodoses talpykles

**HOMEOPATINIS NERCEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

1 talpyklyje (0,45 ml tirpalo) yra veikliųjų medžiagų: *Euphrasia* D5 110,7 mg, *Cochlearia officinalis* D5 110,7 mg, *Pilocarpus* D5 110,7 mg, *Echinacea* D5 110,7 mg. **Terapinės indikacijos.** Akių dirginimo, ašarojimo, smėlio akyse pojūčio, pervargimo, jautrumo svietai ir vokų kraštų uždegimo lengvinimas. Indikacijos paūgįstos tik homeopatijos principais. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Vaikams nuo 6 m. ir suaugusiems žmonėms paprastai reikia lašinti į pažeistą akį po 1 lašą 3 kartus per dieną. Jei vartojama ir kitokių akių lašų, tarp jų ir „Oculoheel“ akių lašų vartojimo rekomenduojama daryti 15 minučių pertrauką. Kadangi šio vaistinio preparato sudėtyje yra ežiūolės (*Echinacea*), prieš skiriant jį ilgėsimam kaip 8 savaitių laikotarpiui, rekomenduojamas individualus įvertinimas. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, arba astriinių (graizažiedžių) šeimos augalams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** *Pagalbinės medžiagos.* Fosfatiniai buferiai. Kiekvienoje šio vaistinio preparato vieno dozėje talpyklyje yra 2,81 mg fosfatų, tai atitinka 6,25 mg/g. Kadangi šio vaistinio preparato sudėtyje yra ežiūolės (*Echinacea*), prieš skiriant jį pacientams, turintiems imuninės sistemos funkcijos sutrikimų (pvz., progresuojančių sisteminių sutrikimų, autoimuninių ligų, imunodeficitų, imunosupresijos ir baltųjų kraujo ląstelių sistemos ligų atvejais), rekomenduojamas individualus įvertinimas. Talpyklės turinį galima vartoti tik 1 kartą, t. y. kartą įlašinti į kairiąją ir (arba) dešiniąją akį tiek, kiek reikia. Talpyklė reikia atidaryti tik prieš pat vaisto vartojimą. Naudojant talpyklę reikia išmesti, net jeigu joje yra vaistinio preparato likučių. **Registruotojas.** „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). **Registruotojo adresas.** UAB „Farmalėms“. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-06-16.

-40%

**ACONITUM**B TOTAL + MAGNE, 60 kapsulių ~~42<sup>99</sup> 7<sup>55</sup> €~~MAGNIS + B6 SUPERIOR, 30 kapsulių ~~43<sup>99</sup> 8<sup>39</sup> €~~**MAISTO PAPILDAI**

„B total + magne“ sudėtis praturtinta ir magniu, kuris padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją bei normalią raumenų funkciją ir padeda mažinti nuovargį. Pakuotėje yra 2 mėnesių kursas. O „Magnis + B6 superior“ naudojama ypatinga magnio forma – dvi magnio druskos (magnio oksidas ir magnio citratas), kurios organizme išlieka ilgiau, nes suvra skirtingu metu. Abiejų preparatų sudėtis papildyta ir vitaminu B6. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų ir nervų sistemos veiklą. Magnis ir vitaminas B6 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją bei mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

**NERVINĖS ĮTAMPOS MAŽINIMAS IR UŽMIGIMO LENGINIMAS**5<sup>99</sup> €**PERSEN**40 dengtų tablečių  
FORTE, 20 kietųjų kapsulių**NERCEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas.** PERSEN tablečiųje yra 35 mg valerijonų šakni sausio alkoholinio ekstrakto, 175 mg melisų lapų sausio ekstrakto, 175 mg pipirmėčių lapų sausio ekstrakto. PERSEN FORTE kapsulėje yra 875 mg valerijonų šakni sausio alkoholinio ekstrakto, 175 mg melisų lapų sausio ekstrakto, 175 mg pipirmėčių lapų sausio ekstrakto. **Indikacijos.** Vartoti laikinos nedidelės nervinės įtampos mažinimui, pasunkėjusio užmigimo lengvinimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** PERSEN: Nervinės įtampos atvejui reikia gerti po 3-4 PERSEN tab. 3 kartus per parą. Pasunkėjusio užmigimo atvejui reikia gerti 3-4 PERSEN tab. 1 kartą per parą 1 val. prieš miegą. Tabletės reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai nuo valgyimo laiko. PERSEN FORTE: Nervinės įtampos mažinimui reikia gerti po 2 PERSEN FORTE kaps. 2 kartus per parą. Pasunkėjusio užmigimo atvejui reikia gerti 2 PERSEN FORTE kaps. 1 kartą per parą 1 val. prieš miegą. Kapsules reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai nuo valgyimo laiko. PERSEN ir PERSEN FORTE pradedama veikti palaipsniui, kad gydymo veiksmingumas būtų optimalus, vaisto rekomenduojama gerti mažiausiai 14 dienų. Gydymo trukmė neribojama. PERSEN ir PERSEN FORTE nėra skirtas jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** PERSEN tablečiųje sudėtyje yra laktozės ir sacharozės. PERSEN FORTE kapsulių sudėtyje yra laktozės. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025 m. gegužės mėn. ID:000746625

„PERSEN“ – NURAMINK SAVO RŪPESČIUS!

8<sup>99</sup> €**CAGYNOL**, 300 mg, ovulė, 1 vnt.**NERCEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Ovulė vietiniam makšties kandidozės gydymui. Kiekvienoje ovulėje yra 300 mg sertakonazolo nitrato. **Terapinės indikacijos.** Vietiniam makšties grybelinės Candida infekcijos gydymui. „Cagynol“ skirtas suaugusiems. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Dozavimas. Viena ovulė vakare prieš miegą, vienkartiniame vartojimui, įterpiama giliai. Gydymo trukmė – vienkartinė dozė. Didžiausia vienkartinė dozė yra viena ovulė (300 mg sertakonazolo). Jei klinikiniai požymiai išlieka, antroji ovulė vartojama 7 dienių intervalu. Vartojimo metodas. Vartoti j makštį. Vartojant šį vaistinį preparatą negalima naudoti tamponų ir intravaginalinių dušų. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas priešgrybeliniams imidazole klasės vaistiniams preparatams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Lateksio prezeravatyvi arba diafragmą naudojimas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei kandidozė patvirtinta, reikia atidžiai išeikoti ekologinių veiksnių, kurie sudaro sąlygas ir skatina grybelinės infekcijos vystymąsi. Norint išvengti atkryčių, labai svarbu nustatyti ir eradiuoti infekciją bei atsizvelgti į ją skatinančius veiksnius. Patartina vietu gydyti visą grybelinės infekcijos židinį, pripažintą suklejėja, partneri. Nėštumas. Tyrimais su gyvūnais teraloginiais poveikis nenustatytas. Sertakonazolo vartojimas nėštumo metu turėtų būti svarstomas tik esant būtinumui. Teksto peržiūros data: 2022 m. gegužės 30 d. Reklamos parengimo data: 2025.08.11.

**VIENOS OVULĖS SĖKMĖS ISTORIJA**

6<sup>99</sup> €



**INOVOX**

HONEY LEMON, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, 24 kietosios pastilės  
 MENTHOL, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, 24 kietosios pastilės  
 ORANGE, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, 24 kietosios pastilės

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 kietojoje pastilėje yra 2 mg lidokaino hidroklorido, 0,6 mg amilmetakrezolio ir 12 mg 2,4-dichlorobenzilio alkoholio.  
**Indikacijos:** gerklės skausmo malšinimas, vietinis antiseptinis gerklės ir burnos ertmės uždegiminių būklių (pvz., parudimio, patinimo) gydymas.  
**Vartojimo būdas ir dozavimas:** po 1 kietąją pastilę kas 2-3 val. ir kai reikia, bet ne daugiau kaip 8 kietąsias pastiles per parą (vaikams – ne daugiau kaip 4 pastiles). Vartoti ant burnos gleivinės. Kietąją pastilę reikia lėtai suculpti laikant burnoje, bet ne už skruosto. Vaisto nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 5 paras.  
**Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams.  
**Specialūs įspėjimai:** jei simptomai neišnyksta ilgiau kaip 2 paras, sunkėja, arba atsiranda naujų simptomų, reikia įvertinti paciento klinikinę būklę. Atsargiai vartoti ūminė liga sergantiems, nusilpusiems pacientams. Nevartoti esant ūmioms burnos ir gerklės žaizdoms, įvertinti paciento atsigimant. Astma sergantys pacientai turi būti prižiūrimi gydytoju. Sudėtyje yra levomentolio terpenų, gliukozės, sacharozės, saulėlydiežio getonėjo ir košenilio raudonojo. **Reklamos teksto parengimo data** 2022-06-09.

„INOVOX“. EFEKTAS – JAU PO 1 MINUTĖS!

6<sup>99</sup> €



**NASOMETIN**

50 mikrogramų/dozėje nosies purškalas, 60 dozių

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** kiekvienoje išpuškiamoje dozėje yra 50 mikrogramų mometazono furoato. **Terapinės indikacijos:** vaistas skirtas anksčiau gydytojo diagnozuoto suaugusiųjų sezoninio alerginio rinito simptomams gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** 2 įpuskimai į kiekvieną nosies landą 1 kartą per parą, vėliau - po 1 įpuskimą į kiekvieną nosies landą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, neišgydyta vietinė nosies gleivinės infekcija ar nebužijusi žaizda po nosies operacijos ar traumas. **Specialūs įspėjimai:** kvėpavimo takų tuberkuliozė arba kita infekcija. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Ūpės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El.paštas: info.lithuania@sandoz.com. BS2601079716. Reklamos teksto parengimo data: 2026 01 07.

KANKINA ALERGINĖ SLOGA? METAS TAI PAKEISTI!

**SAŅARIAMS**

11<sup>99</sup> €



**GLUCOSAMIN-RATIOPHARM**

1,5 g, milteliai geriamajam tirpalui, 20 paketėlių

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 paketėlyje yra 1,5 g gliukozamino sulfato, tai atitinka 1,884 g gliukozamino sulfato natrio chlorido arba 1,178 g gliukozamino. **Terapinės indikacijos:** lengvo ar vidutinio sunkumo kelio osteoartrito sukeltų simptomų lengvinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** paketėlio turinį išširpinti stiklinėje vandens ir gerti 1 kartą per parą. Gliukozaminas netinka vartoti ūminio skausmo simptomams slopinti. Simptomų palengvėjimas (ypač skausmo) gali pasireikšti vartojant kelias savaites, kartais ir dar ilgiau. Jei simptomai nepalengvėja po 2-3 mėnesių vartojimo, reikia iš naujo spręsti, ar gydyma gliukozaminu tedi toliau. Miltelius galima vartoti tiek valgio metu, tiek nevalgant. Gliukozaminas negalima vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas gliukozaminui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. „Glucosamin-ratiopharm“ negalima skirti ligoniams, alergiškiems kiaušialuostiems vėžiagyviams, nes iš jų išgaunama preparato veiklioji medžiaga. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jei pacientui yra sutrikęs gliukozės toleravimas, prieš skiriant gydymą ir vėliau periodiškai rekomenduojama stebėti gliukozės kiekį kraujyje ir, jei reikia, insulino poreikį. Jei pacientai turi širdies ir kraujagyslių ligų rizikos faktorių, rekomenduojama stebėti lipidų kraujyje, nes vartojantiems gliukozaminą ligoniams buvo nustatyti keli hipercholesterolemijos atvejai. Buvo aprašytas atvejis, kai pradėjus gliukozamino terapiją, pablogėjo astmos simptomai. Gliukozaminas negalima vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams, nes neištyrus vartojimo saugumas ir veiksmingumas. Atsargumas reikalingas, jei pacientui yra fenilketonurija. Šio vaistinio preparato paketėlyje yra 151 mg natrio, tai atitinka 8 % didžiausios PSO rekomenduojamos paros normos suaugusiems, kuri yra 2 g natrio. Dėl sudėtyje esančio sorbitolio šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems yra įgimtas fruktozės netoleravimas. Taip pat sorbitolis gali paveikti kitų kartu vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį prieinamumą. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-01-22. GLR-LT-00006

JUDĖJIMUI BE SKAUSMO!

IKI -50%



**SALUTIL®**

**MAISTO PAPILDAI**

„Salutil Hydra“ – elektrolitų ir gliukozės mišinys, papildytas vitaminais, mineralinėmis medžiagomis ir cholinu. Tinka vartoti po įtemptos veiklos ir jauciant nuovargį.  
 „Salutil Shots“ – gyvybingosios bakterijos, prebiotikai ir vitaminai miltelių pavidalu viename pakelyje. Vaikams nuo 3 metų.  
 „Salutil Forte“ – kiekvienoje kapsulėje yra 5 milijardai gyvybingųjų bakterijų.  
 „Salutil Premium 9“ – sudėtyje yra 9 mikroorganizmų padarnių ir vitamino D.  
 2601\_SB\_Salutil\_V01\_LT

„SALUTIL“ – PROBIOTIKAI IR ELEKTROLITAI JŪSŲ ŠEIMAI!

\*Akiąja taikoma geltona etiketė pažymėtomis prekėms

**RYŠKESNIAM MATYMU!**

-30% 13<sup>98€</sup> ~~19<sup>97</sup>~~



**CALIMEL® CLEAR**

akių lašai be konservantų, 10 ml

**MEDICINOS PRIEMONĖ**

„Calimel“ lašų sudėtyje yra natrio hidroluronato ir kalio jodido. Lokaliai naudojamas kalio jodidas veikia kaip stiprus antioksidantas, sulaukantis laisvuosius radikalus akies paviršiuje. Jis mažina oksidacinę pažeidimą ir slopina akies lęšuko bei stiklakūnio drumstumą. „Calimel“ lašai naudojami akies paviršiuje sudrekinimui ir užkirsti kelią akies lęšuko bei stiklakūnio drumstumui. Produkto tinkamumo naudoti laikas yra 3 mėnesiai nuo pirmo pakuotės atidarymo dienos. Produkto negalima naudoti ilgiau kaip 1 mėnesį neperturkiamai ir ne ilgiau kaip 3 mėnesius, išlašinant kartkartėmis (su kelių dienų pertraukomis).

-40%



**ODŪNTE**

burnos skalavimo skystis jautriems dantims, 500 ml 8<sup>99</sup> € 5<sup>39</sup> € tarpdančių siūlas su laikikliu, 50 vnt. 3<sup>99</sup> € 2<sup>03</sup> €

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

IKI -50%



**AMBIO**  
NERVŲ SISTEMAI, mikstūra, 100 ml 7<sup>99</sup> 4<sup>00</sup> € -50 %  
VALERIJONAS PLUSUS, 50 tablečių 6<sup>99</sup> 4<sup>54</sup> € -35 %  
MAISTO PAPILDAI

IKI -45%



**VITADAY**  
KOMPLEKSAS ŠANARIAMS SU GLIUKOZAMINU, 60 tablečių 9<sup>98</sup> 5<sup>49</sup> € -45 %  
VALERIJONŲ EKSTRAKTAS, 50 tablečių 2<sup>48</sup> 1<sup>98</sup> € -20 %  
MAISTO PAPILDAI

IKI -35%



**OMRON**  
MEDICINOS PRIETAISAI  
Japonų prekės ženklui „Omron“ medicinos prietaisai tiksliai išmatuos kraujospūdį, kūno temperatūrą, inhalatoriai palengvins kvėpavimą.  
**„OMRON“ – PATIKIMAS SVEIKATOS PARTNERIS!**  
\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtais prekėmis

-40%



**KALICORD 850 FORTE**, 30 kapsulių 12<sup>99</sup> 7<sup>55</sup> €  
**KRIOOMEGA+**, 30 minkštųjų kapsulių 24<sup>99</sup> 13<sup>07</sup> €  
MAISTO PAPILDAI  
Norintiems papildyti kalcio atsargas organizme, rekomenduojama vartoti „Kalicord“ sudėtyje yra 850 mg kalcio citrato, kuris papildoma organizmą trūkstamu kalcio kiekiu. Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį ir normalią raumenų veiklą. Žuvų taukai „KriOmega+“ yra iš kriūlių. Kriūliai yra laikomi vienu geriausių, veiksmingiausių ir prieinamiausių omega-3 riebalų rūgščių šaltinių. Sudėtyje esantys omega-3 fosfolipidai, gaunami iš vežiagyvių – kriūlių – ekstraktas, greičiau patenka į audinių ląsteles ir tolygiau pasiskirsto nei omega-3 trigliceridai, randami žuvų taukuose.

-30%



**VERSAN STRONG SHOTS**  
14 geriamųjų dienos dozių po 25 ml 55<sup>99</sup> 38<sup>91</sup> €  
MAISTO PAPILDAS  
Vienas buteliukas per dieną – viskas, ko reikia tavo šanariams, kaulams, raumenims, sausgyslėms ir raiščiams. Moksliškai subalansuota formulė su kolagenu, gliukozaminu, MSM, vitaminais C, D, K2 ir augaliniais ekstraktais padeda išlaikyti stiprų judėjimo aparatą.  
**VERSAN COLLAGEN COMPLEX**  
25 porcijos, 435 g 69<sup>99</sup> 48<sup>99</sup> €  
MAISTO PAPILDAS  
Tai aukščiausios kokybės bioaktyvi formulė, skirta palaikyti šanarių, kremzlių ir jungiamojo audinio sveikatą. Vienoje porcijoje – 15 000 mg I ir III tipo hidrolizuoto kolageno, II tipo nedenastruotas kolagenas, gliukozaminas, chondroitinas, hialurono rūgštis ir natūralios kilmės vitaminas C, padedantis formuoti kolagenui bei apsaugoti ląsteles nuo oksidacinių pažeidimų. Be pridėtinio cukraus, gliitimo, laktozės ir konservantų. Neutralus skonis, puikiai tirpstantys milteliai  
**„VERSAN“ – JUDĖJIMO SVEIKATOS EKSPERTAS!**

-40% 8<sup>99</sup>€ 14<sup>99</sup>€

**MEMORIL FORTE**, 30 kapsulių  
MAISTO PAPILDAS  
„Memoril forte“ – subalansuotas, 11 sudedamųjų dalių kompleksas atminčiai bei kraujotakai. Tinka tiems, kuriems sunku susikaupti bei nuolat ką nors pamiršantiems. Vienoje kapsulėje yra 80 mg ginkmedžių ekstrakto, kuris padeda palaikyti normalią atminties funkciją ir kraujotaką. Taip pat sudėtyje yra magnio, vitaminų B, C, E, seleno ir folio rūgšties, kuri padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną.

# AMBIO<sup>®</sup>

Vaistininų atrinkti  
maisto papildai  
geresnei tavo versijai



Maisto papildai

# 2 UŽ 1 KAINĄ



**ŽIEDĖ**  
dėkinamoji veido kaukė su hialuronatu, 15 ml **4<sup>99</sup> €**  
veido kaukė brandžiai odai su rožių vandeniu ir hialuronatu, 15 ml **5<sup>98</sup> €**  
veido kaukė su dumblais ir jūriniu kolagenu, 15 ml **5<sup>98</sup> €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

**1+1**

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMAI!



**ODONTE**  
dantų šepetėlis su sidabru, minkštas, 1 vnt. **4<sup>99</sup> €**  
dantų šepetėlis su auksu, minkštas, 1 vnt. **4<sup>99</sup> €**  
balinamoji ir dantenų sauganti dantų pasta, 75 ml **7<sup>99</sup> €**  
balinamoji dantų pasta jautriems dantims, 75 ml **7<sup>99</sup> €**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

**1+1**

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



**HI GENIE!**  
DAILY FRESH, intymios higienos prausiklis, 200 ml **10<sup>99</sup> €**  
GENTLE FOR GIRLS, intymios higienos prausiklis, 200 ml **10<sup>99</sup> €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

**1+1**

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



**SVEIKAŽOLIŲ ARBATA**  
RAMIOS DIENOS, žolelių arbata, 1,5 g, 20 vnt. **3<sup>49</sup> €**  
RAMIOS DIENOS SU KANAPĖMIS, žolelių arbata, 1,5g, 20 vnt. **3<sup>59</sup> €**

**1+1**

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



**JAMIESON**  
VITAMINAS D3, kramtomasis, 1000 IU, 100 tablečių **9<sup>19</sup> €**  
BABY-D3, 400 TV, lašai kūdikiams, 11,4 ml **16<sup>49</sup> €**

MAISTO PAPILDAS

**1+1**

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



**JAMIESON**  
STRESS PLEX, 90 tablečių **17<sup>39</sup> €**

MAISTO PAPILDAS

**1+1**

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



**JAMIESON**  
COLLAGEN, 60 tablečių **22<sup>79</sup> €**

MAISTO PAPILDAS

**1+1**

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



**JAMIESON**  
CINKAS SU ĖŽIUOLE IR VITAMINAIŠ C IR D, 30 pastilių **11<sup>29</sup> €**

MAISTO PAPILDAS

**1+1**

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMA!



**„LIVOL“ VITAMINAI**

**MAISTO PAPILDAI**

Kviečiame Jus atrasti iš naujo „Livol“ vitaminų prekių ženklą – dabar naujose pakuotėse. Atnaujintas „Livol“ ikvėpas Danijos vertybių, siaurietiškos estetikos ir Hygge balanso, kuris atspindi harmoningą požiūrį į kasdienę gerą savijautą. Danų kultūroje gyvenimo pusiausvyrą gimsta iš paprastų, bet prasmingų kasdienybės akimirkų – judėjimo, ramybės, artumo, šypsenų bei sėmimo rūpestio savimi. Šia filosofija vadovaujasi ir „Livol“ vitaminai, sukurti Danijoje, naudojant pažangias, subalansuotas formules ir efektyvią gamybos technologiją, kuri užtikrina maksimalų pasisavinimą.

„LIVOL“ – GEROS SAVIJAUTOS MEISTRAI IŠ DANIJOS.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMA!



**„MÖLLER'S“ ŽUVŲ TAUKAI IR OMEGA-3 KAPSULĖS**

**MAISTO PAPILDAI**

„Möller's“ – tai šimtmečiškas puoselėjami žuvų taukai visai šeimai. „Möller's“ žuvų taukų kapsulės išsiskiria kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyviu medžiagų deriniais. Tyri ir gerai išvalyti „Möller's“ žuvų taukai puikiai tinka vartoti kasdien visą gyvenimą. Ypač skonio kramtomosiose žuvelėse „Möller's Junior“ yra omega-3 ir vitamino D – augančiam vaikų organizmui naudingų medžiagų.

**OMEGA-3 EKSPERTAI JAU DAUGIAU NEI 170 METŲ!**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMA!



**BIOCELL**

STRONG HAIR, 60 guminukų **29<sup>99</sup> €**  
COLLAGEN BIOTIC, 222 g **48<sup>99</sup> €**  
SLIM DETOX FIBER, 129 g **32<sup>99</sup> €**

**MAISTO PAPILDAI**

„BIOCELL Strong Hair“ – vitaminų ir mineralų kompleksas Tavo plaukų grožiui.  
„BIOCELL Collagen Biotic“ – 10 000 mg hidrolizuoto kolageno su bioktyviu kompleksu iš 35 fermentuotų augalų, hialurono rūgštimi, niacinu, biotinu, vitaminu C.  
„BIOCELL Slim Detox Fiber“ – skaidulinis medžiagų šaltinis žarnynui, virškinimui, svorio kontrolei

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMA!



**SILVANOLS**

**MEDICINOS PRIEMONĖS, MAISTO PAPILDAI**

„Faringospray KIDS“ – NAUJIENA! Pūrkšalas gerklei vaikams su čiobreliais ir liepžiedžiais. Čiobreliai ir liepžiedžiai padeda palaikyti normalią gerklės, ryklės ir burnos ertmės būklę. Vaikams nuo 4 metų amžiaus. Be etanolio. Be konservantų. Be dirbtinių dažiklių.

„Faringospray“ ir „Faringospray Orange“ – pūrkšalas gerklei su šaltalankiais ir medetkomis. Medetkos padeda palaikyti normalią gerklės, ryklės ir burnos ertmės būklę bei normalią kvėpavimo takų veiklą. Šaltalankiai padeda palaikyti normalią gleivinių būklę. Galima rinktis klasikinį arba apelsinų skonio. Nuo 12 metų. Be etanolio. Be konservantų. Be dirbtinių dažiklių.

„Laringospray“ – pūrkšalas gerklei su propoliu ir medetkų žiedų tinktura. Propolis padeda palaikyti burnos ir gerklės gleivinės apsaugą. Medetkų žiedai tradiciškai vartojami normaliai gerklės ir burnos ertmės funkcijai palaikyti. Glicerolis užtikrina malonią konsistenciją ir padeda išlaikyti gleivinės drėgmę. Nuo 12 metų. Be dirbtinių dažiklių.


„Faringo“ minkštosios pastilės su hialurono rūgštimi, šaltalankių aliejumi, svilvaržėmis, vitaminais B ir C. Minkštosios pastilės švelnios burnos ertmės gleivinei, o kruopščiai atrinktos sudedamosios dalys gali padėti palaikyti normalią gleivinių funkciją. Nuo 4 metų. Be GMO. Be cukrų. Be laktozės.

„Faringo“ ledinukai su šaltalankiais ir vitaminu C – šaltalankiai padeda palaikyti normalią gleivinių būklę. Vitaminas C palaiko tinkamą imuninės sistemos veiklą. Be konservantų. Be dirbtinių dažiklių.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



**AIMX**

HYDRATE ME, greito poveikio giliai drėkinanti veido kaukė su peptidais, 1 vnt. **8<sup>99</sup> €**

**KOSMETIKOS PRIEMONĖ**

AIMX bioceluliozinės lakštinės veido kaukės – giliai drėkinančios, prisotintos hialurono, peptidų ir augalinių ekstraktų. Priglundu tarsi antra oda, nevaržo judesius.

Kurios bendradarbiaujant su vienu iš Pietų Korėjos kosmetikos gamintojų lyderių ir pasaulyje žinomomis docentėmis, į kūrybos procesą įtraukiant savo sričių profesionalus. Gausiai papildytos aktyviomis medžiagomis kaukės užtikrina efektyvų ir tikslingą poveikį.

Plaukams, odai, nagams

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



**BEOTEBAL® PLUS, 30 + 10 tablečių 33<sup>99</sup> €**

**MAISTO PAPILDAS**

„Beotebal“ PLUS plaukams, odai, nagams“ rekomenduojamas kasdieniui plaukų, odos ir nagų būklės bei išvaizdos priežiūrai. Ypač tinkamas laikotarpiu, kai plaukus, odą ir nagus veikia aplinkos veiksniai (saulė, vanduo, vėjas, šaltis, sniegas, lietus) ar po intensyvių kūrybos procedūrų (pvz.: dažymo, tiesinimo, džiovimo) ir kosmetinių nagų procedūrų. Sudėtyje yra originalus koncentruotas „NutriAminoBiotinum“ kompleksas, kuriame yra daug aminorūgščių, mineralų ir vitaminų – įskaitant biotiną ir natūralų silicį, turintį naudingą poveikį plaukams, odai ir nagams. Gaminyje nėra glitimo ir laktozės. Tinka vegetarams ir veganams.

**GROŽIO FORMULĖ TAVO PLOUKAMS, ODAI IR NAGAMS!**

Atminčiai ir protinei veiklai

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



**CLEAR BRAIN™, 60 tablečių 29<sup>29</sup> €**

**MAISTO PAPILDAS**

Kompleksas atminčiai ir protinei veiklai palaikyti. „Clear Brain“ gaminamas iš graikinių riešutų, pajūrinio pušų žievės ekstraktų, B grupės vitaminų ir jodo. Jodas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją ir nervų sistemos veiklą. Pantoteno rūgštis padeda palaikyti normalią protinę veiklą. Taip pat svarbų įvairi, subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

**ŠVEDIŠKI VITAMINAI SMEGENIMS!**

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMA!



**TENA**

WET WIPES, drėgnosios servetėlės, 48 vnt. **8<sup>99</sup> €**  
WET WIPES, drėgnosios servetėlės, 80 vnt. **6<sup>99</sup> €**

**HIGIENOS PRIEMONĖS**

Drėgnosios servetėlės TENA: iš anksto specialiu odos priežiūrai skirtu skysčiu sudrėkintos minkštos servetėlės yra švelni alternatyva muiliui ir vandeniui. Skirtos kasdieniui šlapimo nelaikančiųjų tarpvietės odos ar viso kūno priežiūrai. Jos gerai ir švelniai valo net ir gležną odą. Praktiškos ir patogios naudoti, nereikia papildomai nuplauti vandeniui. Patikrintos dermatologų.

-35%

**AMBIO**

ŠIRDŽIAI, 30 kramtomųjų tablečių **9<sup>99</sup> 6<sup>49</sup> €**  
 ŠIRDŽIAI FORTE, 30 tablečių **17<sup>98</sup> 11<sup>09</sup> €**

KALIS IR MAGNIS, miltelių geriamajam tirpalui, 30 paketėlių **13<sup>99</sup> 9<sup>09</sup> €**

MAISTO PAPILDAI

**PIC MATUOKLIAI / INHALIATORIAI / TERMOMETRAI**

IKI -45%

**PIC SOLUTION****MEDICINOS PRIETAISAI**

„PIC Solution“ jau daugiau nei 50 metų yra vienas žinomiausių Italijos medicinos priemonių prekių ženklų. Kiekvienas PIC sprendimas yra daugiau nei kraujospūdžio matuoklis, inhaliatorius ar termometras. Tai paprastas būdas parodyti rūpestį ir paklausti „Kaip jautiesi?“. Savo laboratorijose kuriamo pažangūs prietaisai, skirtus inhaliacijai, širdies darbui ar temperatūrai stebėti.

Visi prietaisai turi 5 metų garantiją\* ir jų tikslumas patvirtintas klinikiniais tyrimais\*\*.

\* Išskyrus termometrus, matuoklį „LiteRapid“, inhaliatorių „AirCube“.

\*\* Taikoma kraujospūdžio matuokliams

**KIEKVIENA ŠIRDIS TURI SAVO RITMĄ!**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtais prekėmis

IKI -40%

NAUJIENA

**FJØRD STRONG OMEGA-3**

80 kapsulių **28<sup>99</sup> 17<sup>21</sup> € -40 %**  
 žuvų taukai, 100 ml **22<sup>99</sup> 18<sup>07</sup> € -20 %**  
 SPORT, 60 kapsulių **36<sup>99</sup> 25<sup>99</sup> € -30 %**

**MAISTO PAPILDAI**

Rinkitės galingus žuvų taukus „FJØRD STRONG OMEGA-3“:

- Išskirtinai stiprios EPR ir DHR koncentracijos, ypač gerai pasisavinamos formos.
- Sertifikuota aukščiausios kokybės žaliava, atitinka 5\* tarptautinio žuvų taukų standarto įvertinimo kriterijus.
- Iš tyro, laukinių, riebių, smulkių žuvų šaltinio.

**Išbandykite naujieną – „FJØRD STRONG OMEGA-3 SPORT“** – tai stipriausios koncentracijos žuvų taukai iš visų FJØRD, su didžiausiu EPR ir DHR kiekiu – išvermei, fiziniam pajėgumui, nuovargio mažinimui.

„FJØRD STRONG OMEGA-3“ – GALI DAUGIAU NEI TIKIESI.

IKI -30%

**NATASPIN**

CONTROL PRO, 30 kapsulių **49<sup>99</sup> 13<sup>99</sup> € -30 %**  
 CARDIO PROTECT, 30 kapsulių **20<sup>99</sup> 14<sup>99</sup> € -30 %**  
 H, 30 kapsulių **17<sup>99</sup> 14<sup>99</sup> € -20 %**

**MAISTO PAPILDAI, SPECIALIOS MEDICININĖS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAS**

Širdies stiprybei ir apsaugai rinkitės „NatAspin CARDIO PROTECT“ su stipriais antioksidantais ir kofermentu Q10 (net 80 mg i-voje kapsulėje).

Teisingai cholesterolio kontrolei išbandykite 30 dienų kursą „NatAspin CONTROL PRO“.

Esant kraujotakos sutrikimų ir trombozės rizikai vartokite „NatAspin H“ su natokinaze ir hidroksitirozoliu iš alyvuogių.

Visų „NatAspin“ formulių sudėtyje naudojami išskirtinai tik standartizuoti bioaktyvūs ekstraktai, kurie užtikrina fiksuotą veikliųjų medžiagų kiekį patikimumą.

„NATASPIN“ – TEISINGI SPRENDIMAI ŠIRDŽIAI, KRAUJOTAKAI, GLIUKOZĖS IR CHOLESTEROLIO KONTROLEI.

**NERVINIAM NERAMUMUI LENGVINTI**NUO 6<sup>99</sup> €**SEDATIF PC**

40 tablečių **6<sup>99</sup> €**  
 90 tablečių **9<sup>99</sup> €**

**HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** Abrus precatorius 6 CH, 0,5 mg, Aconitum napellus 6 CH, 0,5 mg, Belladonna 6 CH, 0,5 mg, Calendula officinalis 6 CH, 0,5 mg, Chelidonium majus 6 CH, 0,5 mg, Viburnum opulus 6 CH, 0,5 mg. **Indikacijos:** nervinio neramumo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vaikams nuo 6 metų vartoti po 2 tabletes 3 kartus per parą. „Sedatif PC“ veiksmingumas ir saugumas vaikams iki 6 metų neįvertintas. Duomenų nėra, todėl vartoti nerekomenduojama. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliąjam arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** šio vaistinio preparato vaikams iki 6 metų vartoti nerekomenduojama. Negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharozės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2019-08.

**ĮVEIK STRESĄ, KOL STRESAS NEĮVEIKĖ TAVĘS. „SEDATIF PC“**

-40% 10<sup>61</sup> €**TRIPTAN FORTE, 30 kapsulių****MAISTO PAPILDAS**

„Triptan forte“ sudėtyje esantis 5-hidroksitriptofanas (5-HTP) yra natūrali medžiaga, gaunama iš Afrikos augančių augalų – Griffonia simplicifolia – sėklų, kuri kartu su vitaminu B6 reikalinga serotonino – geros nuotaikos hormono – gamybai. Serotonino išsiskyrimas suteikia gerą nuotaiką ir energiją. Tai pat sudėtyje esantys vitaminai B1 ir B6 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą. Vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojamas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

IKI -50%

**NEUROZAN, 30 tablečių 34<sup>99</sup> 15<sup>75</sup> € -50 %****NEUROZAN PLUS, 28 kapsulės + 28 tabletės 50<sup>99</sup> 38<sup>24</sup> € -25 %****MAISTO PAPILDAS**

NEUROZAN – platus ir subalansuotas kompleksas normaliai proteinei (pantoteno rūgštis) ir nervų sistemos (jodas, magnis, ir kt.) veiklai palaikyti. Vitaminai B1, B3 ir kt. palaiko normalią psichologinę būklę, o geležis ir cinkas – pažinimo funkciją. Sudėtis papildyta ginkmedžių ekstraktu ir kofermentu Q10.

**PROTEINEI VEIKLAI, PAŽINIMO FUNKCIJAI**-20% 18<sup>39</sup> €**DEMATSYT® CHOLINE, 30 kapsulių****MAISTO PAPILDAS**

Trigubo poveikio formulė su cholino bitartratu, dviskaidžių ginkmedžių ir juoduju pipirų ekstraktais jūsų smegenų veiklai. Padeda palaikyti normalią homocisteino bei lipidų apykaitą, kuri svarbi pažinimo funkcijai, smegenų kraujotakai ir nerviniam signalams perduoti.

**PALAIKYMO KOMANDA JŪSŲ SMEGENIMS.**

NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO

NUO 2<sup>49</sup> €



APAP

500 mg, 12 plėvele dengtų tablečių 2<sup>49</sup> €  
500 mg, 24 plėvele dengtos tabletės 4<sup>49</sup> €  
250 mg granulės paketėlyje, vaikams, 10 paketėlių 6<sup>99</sup> €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 paketėlyje „APAP, 250 mg“ yra 250 mg paracetamolio; 1 plėvele dengtoje tableteje „APAP, 500 mg“ yra 500 mg paracetamolio. Indikacijos: silpno ir vidutinio stiprumo skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Apap, 500 mg“ plėvele dengtos tabletės: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1–2 tabletes kas 4–6 valandas, ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. „Apap, 250 mg“ granuliu paketėliuose, skirtų vaikams, vienkartinė dozė yra nuo 10 iki 15 mg/kg kūno svorio vyresniems nei 4 m. vaikams, ją vartoti ne dažniau kaip kas 4 valandas (didžiausia paros dozė – 4 paketėliai). Granulės supilti tiesiai į burną ant liežuvio ir praryti neužgerus vandens. Kontraindikacijos: vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: prieš vartojant būtina pasitarti su gydytoju, jei yra: pažeistos kepenys ar inkstai, astma, gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka, hemolizinė anemija, vartojami kai kurie kiti vaistai, skysčių netekimas, mitybos nepakankamumas, vartojamas alkoholis bei neštumo ir žindymo laikotarpiai. Didesnės nei rekomenduojamos dozės sukelia vidaus organų pažeidimus. Reklamos teksto parengimo data 2025-03-31.

„APAP“ – IR TU VĒL SAVO VĒŽESE.

NUO SKAUSMO

NUO 6<sup>99</sup> €



DITEL

23,2 mg/g, gelis, 50 g 6<sup>99</sup> €  
23,2 mg/g, gelis, 100 g 9<sup>99</sup> €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga, stiprumas: diklofenako dietilaminas, 23,2 mg/g. Terapinės indikacijos: skirtas suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: vietinis skausmo malšinimas, esant ūminiams patempimams ar sumušimams po bukos traumos. Vartojimo būdas ir dozavimas: reikia vartoti 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Reikia nuo vėsnios iki graikišk-rožinio dydžio kiekio, atitinkančio 1–4 g gelio. Didžiausia paros dozė – 8 g gelio. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Anksčiau pasireiškusių padidėjusio jautrumo reakcijos, pavartojus acetylsalicilo rūgšties ar nesteroidinių vaistinių preparatų nuo uždegimo (NVNU). Vartojimas ant viršaus žaizdų, gleivinių, jei yra odos uždegimas arba infekcija bei egzema. Vartojimas paskutinį neštumo trimestrą. Vartojimas vaikams ir paaugliams iki 14 metų. Specialūs įspėjimai ir atsargumų priemonės: atsargiai vartoti pacientams, kurių inkstų, širdies ar kepenų funkcija sutrikusi, taip pat pacientams, kuriems yra aktyvi skrandžio ir dvylikapirštės žarnos peptinė opa. Vartoti tik ant nepažeistos ir sveikos odos. Vengti, kad nepatektų į akis, ir kontakto su gleivinėmis. Nenaudoti orui nepalaidžiu tvarsčiu. Jei yra tiesioginių saulės spindulių arba dirbtinės saulės poveikis, kyla odos reakcijų pavojus. Gydytoju metu ir dvi savaites po gydymo reikia vengti saulės spindulių ar dirbtinės saulės. Reklamos teksto parengimo data 2024-04. 2604\_04\_Ditel\_V01\_LT

„DITEL“ – NUOSPRENDIS SKAUSMUI!

NUO SLOGOS, SINUSŲ SKAUSMO, KARŠČIAVIMO

7<sup>97</sup> €



TONUFEN, 200 mg/30 mg, 12 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: „Tonufen“ 1 dengtoje tableteje yra 200 mg ibuprofeno ir 30 mg pseudoefedrinio hidrochlorido. Terapinės indikacijos: trumpalaikis simptomis nosies ir ančių užsikimšimo, susijusio su peršalimo, gripo ar alerginio rinito simptomais, pavyzdžiui, galvos skausmu, rinosinitu, karščiavimu, ryklės skausmu, raumenų maudimu ir skausmu, gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: 1 arba 2 tabletes per burną kas 4 val. Per 24 val. laikotarpį negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai ar pagalbinei medžiagai, praėjusio pasireiškusių alerginės reakcijos acetilsalicilo rūgščiai ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo. Esant virškinimo trakto sutrikimui, kepenų, inkstų nepakankamumui, hemoraginei diatezei, sunkiam širdies nepakankamumui, hipertenzijai, neštumui, žindymo laikotarpiui, vartojant kitus nosies užsikimšimą mažinančius vaistus, sergant širdies kraujagyslių ligomis, hipertenzija, cukriniu diabetu, uždaru kampe glaukoma, vartojantiems MAO inhibitorius, esant diagnozuotai feochromocitomai. Specialūs įspėjimai: atsargiai reikia vartoti pacientams, kuriems nustatytas inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, praėjusio pasireiškusių astma ar alergine liga, sergant raudonąja vilkige, sirgusiu virškinimo trakto ligomis, hipertenzija, širdies nepakankamumu, senyviams pacientams. Jeigu per 3 dienas Jūsų sąvija netaip pagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Teksto parengimo data 2025-09-17.

ABRAKADABRA – IR AUSŲ SKAUSMO KAIP NEBŪTA!

5<sup>75</sup> €




OTIPAX®, 40 mg/10 mg/1 g, ausų lašai (tirpalas), 16 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: veikliosios medžiagos yra fenazonas ir lidokaino hidrochloridas. 1 g ausų lašų yra 40 mg fenazono ir 10 mg lidokaino hidrochlorido. Farmacinė forma: ausų lašai (tirpalas). Terapinės indikacijos: ūminio neperforuoto (kai ausies būgnelis nėra įtrūkęs) vidurinės ausies uždegimo, pūslinio virusinio ausies uždegimo ir slėgio pokyčių metu atsiradusios traumos sukeltos ausies uždegimo gydymas, turi skausmo malšinamą poveikį. Vartojimo būdas ir dozavimas: lašinti po 4 ausų lašus 2–3 kartus per dieną į šoninę ausies landą. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Otixax“. Prieš vartojant „Otixax“ ausų lašus, Jūsų gydytojas turi patikrinti, ar nėra pažeistas ausies būgnelis. Šio vaisto negalima nuryti ar įkvėpti. Saugokitės, kad jo nepatektų į akis ar ant gleivinių. Kontraindikacijos: „Otixax“ vartoti draudžiama, jei yra ausies būgnelio įtrūkimai, atsiradę dėl traumos ar infekcinių ligų; įteju yra alergija fenazonui, lidokaino hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės vietini registruotojo atstovų „Biocodex Oy“ Lietuvos filialas, Savanorių pr. 345, LT-51480 Kaunas, tel. +370 37 408 681, el. paštas info@biocodex.lt. ID dab89672. Reklamos parengimo data 2025-03-14.

ABRAKADABRA – IR AUSŲ SKAUSMO KAIP NEBŪTA!

-20% 15<sup>19€</sup> 18<sup>99€</sup>



AMEDIPLUS, skausmą malšinantis pleistras, 9 x 14 cm, 10 vnt.

MEDICINOS PRIEMONĖ

-30% 7<sup>69€</sup> 10<sup>99€</sup>



AMEDIPLUS ACTIVE GEL

šaldomasis-šildomasis kūno gelis, 100 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Pasiūlymai galioja 2026 05 01 – 2026 05 31.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Nuolaidos taikomos prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą. Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį/informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [NepageidaujamaR@vvtkt.lt](mailto:NepageidaujamaR@vvtkt.lt) arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje [www.vvtkt.lt](http://www.vvtkt.lt).

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Daugiau informacijos NORFOS vaistinėje, tel. +370 800 10008, [www.nvaistine.lt](http://www.nvaistine.lt) MAŽYLIUI IR MAMAI skirtas prekes ypatingomis kainomis greičiau ir patogiau užsisakykite internetinėje vaistinėje [www.nvaistine.lt](http://www.nvaistine.lt). Užsisakius prekių (išskyrus vaistinius preparatus) už 29 € ir daugiau – pristatymas NEMOKAMAS! Reklaminio teksto parengimo data – 2026 04 19.



**NUO PILVO PŪTIMO**

**NUO 2<sup>99</sup> €**



**ESPUMISAN**

40 mg, 25 minkštiosios kapsulės **2<sup>99</sup> €**  
 40 mg, 50 minkštųjų kapsulių **4<sup>99</sup> €**

**NERCEPTINAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Veiklioji medžiaga: 1 minkštjoje kapsulyje yra 40 mg simetikono. „Espumisan“ vartojamas ligų, kurių metu virškinimo trakte kaupiasi dujos (meteorizmas), būna pilvo pūtimas, pilnumo pojūtis, simptomams gydyti; prieš pilvo ertmės organų tyrimus, pvz.: rentgeną, ultragarso. „Espumisan“ skirtas vaikams nuo 6 m., paaugliams ir suaugusiems. „Espumisan“ vartoti draudžiama: jeigu yra alergija veikliajai medžiagai, dažikliai saulėlydžio geltaujanam FCF (E110), konservantui metilo parahidroksibenzoatui (E218) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Espumisan“. Jei šių virškinimo veiklos sutrikimų atsiranda ar jie trunka ilgai, reikia pasitarti su gydytoju. Jis nustatys, ar nėra kitų ligų, kurias reikia gydyti kitai. Dozavimas: kai dėl susikaususių dujų sutrinka virškinimo trakte veikla; paaugliams, suaugusiems ir 6–14 m. amžiaus vaikams rekomenduojama skirti vartoti po dvi „Espumisan“ 40 mg minkštiasias kapsules 3–4 kartus per parą. „Espumisan“ 40 mg minkštiasias kapsules galima gerti valgomą arba po valgio, prireikus – ir prieš miegą. Vartojimo trukmė priklauso nuo ligos eigos. Prireikus „Espumisan“ 40 mg minkštiasias kapsules galima vartoti ilgai. Rengiant pacientus tyrimams, rekomenduojama skirti po dvi „Espumisan“ 40 mg minkštiasias kapsules 3 kartus per parą vieną dieną prieš tyrimus ir dvi „Espumisan“ 40 mg minkštiasias kapsules tyrimo dienos rytė. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com. LT-ESP-8-2025\_MFLOW\_2025/12

**JEI PILVE URAGANAS – JUMS PADĖS „ESPUMISANAS“!**

**NUO 6<sup>99</sup> €**



**SMECTA**

3 g, milteliai geriamajai suspensijai, 10 paketėlių **6<sup>99</sup> €**  
 3 g, milteliai geriamajai suspensijai, 30 paketėlių **14<sup>99</sup> €**

**NERCEPTINAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Sudėtis. Kiekviename paketėlyje yra 3 g diosmektilo. **Terapinės indikacijos.** Vaikų nuo 2 m. ir suaugusiųjų ūminiam viduriavimui gydyti, vartojant kartu su geriamaisiais rehidratuojančiais tirpalais, taip pat suaugusiųjų lėtiniam viduriavimui skausmui, susijusiam su funkciais žarnyno sutrikimais, gydyti. **Dozavimas.** Ūminio viduriavimo gydymas. **Vaikams nuo 2 m.:** 6 g (2 paketėliai) per parą. Ūminio viduriavimo pradžioje (pirmąsias 3 dienas) ši dozė gali būti 2 kartus didesnė. **Suaugusiems:** 9 g (3 paketėliai) per parą. Ūminio viduriavimo pradžioje ši dozė gali būti 2 kartus didesnė. Ūminio viduriavimo epizodas paprastai trunka ne ilgiau kaip 7 dienas. Kitų ligų gydymas. **Suaugusiems:** vidutiniskai 9 g (3 paketėliai) per parą. Vartojimo metodas. Vartoti per burną. **Paketėlio turinį reikia ištrinti prieš pat vartojimą. Vaikams:** paketėlio turinį reikia ištrinti 50 ml vandens arba sumaišyti su pusiau skystu maistu (pvz., dušoniu, kofe, sriuba, kompotu). **Suaugusiems:** paketėlio turinį reikia ištrinti į puodelį stiklinės vandens. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Smecta“ nesktas vartoti kūdikiams ir vaikams iki 2 m. amžiaus. Gydyti ūminį viduriavimą slėpimus pacientams ir vaikams nuo 2 m. amžiaus, siekiant išvengti dehidratacijos, kartu būtina skirti geriamąsias rehidratuojančias druskas (GRO). Suaugusiems taip pat turi būti taikoma rehidratacija, jei ji reikalinga. GRO arba intraveninė rehidratacija turi būti skiriama atsivėligiant į viduriavimo intensyvumą, paciento amžių ir klinikinę situaciją. Reikia apsaugyti tolesnį „Smecta“ vartojimą, jei po 3 ūminio viduriavimo dienų sutrikimas nepaėnėja; jei kartu su karščiavimu ir vėmimu jaučiamas skausmas. Reikia atsargiai skirti diosmektilą pacientams, kuriems paaišyta yra buvę sunkių lėtinų vidurių užkeltimo atvejų. Reikia vengti „Smecta“ vartoti ilgą laiką. „Smecta“ sudėtyje yra gliukozės ir sacharozės. Būtina atsivėligti cikliniu dabetu sergantiems pacientams. Jeigu gydytojas jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Šio vaisto sudėtyje yra mažas etanolio kiekis (mažiau kaip 100 mg paros dozėje). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas diosmektilui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Praneškite apie šalutinį poveikį registruotoji vietiniam atstovui „Mayday Baltics“ - UAB, el. paštu vigilance.BAL@mayvol.com. **Teksto patvirtimo data 2025-11-13. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-02. SME-LT-2026-0022**

**-30%**



**GASTROVAL**

**MAISTO PAPILDAI**

**GASTROVAL MAX** – 4 kartus stipresnė augalinė formulė! „GASTROVAL MAX“ – augalinių fermentų, ekstraktų ir prebiotiko kompleksas, padedantis palaikyti: skrandį virškinimą; lengvumo pojūtį po valgio; žarnyno mikrofloros balansą; normalų virškinimo ritmą, kurį paūrina stressa. **GASTROVAL FLUXUS** padeda palaikyti skrandžio rūgštingumo pusiausvyrą dėl sudėtyje esančių: augalų sėklų ir šaknų ekstraktų, magnio, virškinimo fermentų, bifido- bei lakto bakterijų, inulino. **GASTROVAL HEPAR FORMULA** – tik 1 kapsulė per dieną! Geresnio pasisavinimo augalinė formulė – riteminė kepenų apsauga nuo oksidacinės pažeidimo, kepenų ląstelių regeneracija, organizmo valymo funkcija, normalaus cholesterolio lygio palaikymas. „Gastroval“ suprantu, ko reikia virškinimui, skrandžio rūgštingumui, kepenų veiklai. **GASTROVAL FORTE** – stiprus net 7 augalines kilmės fermentų ir augalinių ekstraktų derinys virškinimui. Sudėtyje yra didesnis kiekis fermentų – kai reikia stipresnės pagalbos. **GASTROVAL** sudėtyje – augalinių fermentų ir ekstraktų derinys, kurio naudą lengva pastebėti. **GASTROVAL suprantu, ko reikia virškinimui, kepenų veiklai, skrandžio rūgštingumui.**

\*Akcija taikoma geltona etiketė pažymėtoems prekėms

**ŽARNYNO MIKROFLORA**

**-25%**



**BIFOVAL®**

**FORTE**, 15 kietųjų kapsulių **10<sup>29</sup> 8<sup>09</sup> €**  
**BABE**, 25 kramtomosios tabletės **10<sup>49</sup> 7<sup>87</sup> €**

**MAISTO PAPILDAI**

Specialiai parinktos sudėties maisto papildai kiekvieno ryto ritualui 15-30 min prieš kiekvieną pusryčius. „Bifoval Forte“ – 5 milijardai laktio- ir bifidobakterijų. Sudėtyje 3 bakterijų padėmės. Visai šeimai (vaikams nuo 5 metų). „Bifoval Babe“ – braškių skonio kramtomosios tabletės, kurių sudėtyje yra 4 rūšių Lactio ir Bifido bakterijų kompleksas (3,15 mlrd. l. tabletėje). Vaikams nuo 3 metų. Vartojant antibiotikus gerti 1 val. prieš arba po antibiotikų vartojimo.

**7<sup>99</sup> €**



**STREPSILS**

**HONEY & LEMON**, 1,2 mg/0,6 mg, 24 kietosios pastilės  
**MENTHOL & EUCALYPTUS**, 1,2 mg/0,6 mg/8 mg, 24 kietosios pastilės  
**VITAMIN C**, 1,2 mg/0,6 mg/100 mg, 24 kietosios pastilės

**NERCEPTINAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** Kiekvienoje kietojioje pastilyje yra 1,2 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio, 0,6 mg amidmetakrezolio, 100 mg askorbo rūgšties (. Strepsils Vitamin C) ir 8 mg leventolio („Strepsils Menthol & Eucalyptus“). **Terapinės indikacijos.** lokalus simptominis ryklės uždegimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** „Strepsils Honey & Lemon“ ir „Strepsils Vitamin C“: **suaugusiems ir vyresniams nei 12 m. amžiaus vaikams** bet paaugliams: 1 kietoji pastilė kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 8 kietosios pastilės per 24 val. „Strepsils Menthol & Eucalyptus“: **suaugusiems ir vyresniams nei 12 m. amžiaus vaikams bet paaugliams.** 1 kietoji pastilė kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 8 kietosios pastilės per 24 val. Vartoti į burną ir ryklę. Kietą pastilę lengviau lėsti ištrinti burnoje. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jaunesniems nei 12 m. vaikams („Strepsils Menthol & Eucalyptus“); jaunesniems nei 6 m. vaikams („Strepsils Honey & Lemon“ ir „Strepsils Vitamin C“). **Specialūs įspėjimai:** dėl užspringimo pavojaus nerekomenduojama vartoti mažesniams vaikams. Šių vaistų negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktazės malabsorbcija arba sacharozės ir izomaltazės stygius. „Strepsils Vitamin C“ sudėtyje yra azodiazolio – „Ponso 4R (E124) ir saulėlydžio geltaujanam (E110), kurie gali sukelti alerginių reakcijų. Jeigu pacientas yra alergiškas kviečiams (šį ligą skleidžia nuo celiakijos), tuomet šių vaistų vartoti negalima. „Strepsils Honey & Lemon“ ir „Strepsils Vitamin C“ kvapiosios medžiagos sudėtyje yra citralo, citronelio („Strepsils Vitamin C“ sudėtyje), d-limoneno, geraniolio ir linalolio. Citralas, d-limonenas, geraniolis ir linalolis gali sukelti alerginių reakcijų. „Strepsils Menthol & Eucalyptus“ kvapiosios medžiagos sudėtyje yra d-limoneno. D-limonenas gali sukelti alerginių reakcijų. Šių vaistų sudėtyje yra sieros dioksido (E220). Retais atvejais gali sukelti sunkių užduojimo (autumo reakcijų ir bronchių spazmų. Reklamos teksto parengimo data 2026-04-16.

**7<sup>49</sup> €**



**THERAFLU**

**ND**, 1000 mg/60 mg/30 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 6 paketėliai  
**NT**, 1000 mg/60 mg/30 mg/4 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 6 paketėliai

**NERCEPTINAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Terapinės indikacijos.** „Theraflu ND“: peršalimo sukeltų simptomų (skausmo, nosies gleivinės užburkimo, erzinančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. „Theraflu NT“: peršalimo sukeltų simptomų (skausmo, nosies gleivinės užburkimo ir sekrecijos, čiaudulio, erzinančio kosulio, akių ašarojimo ir niežėjimo bei karščiavimo) lengvinimas. **Vartojimas.** Suaugusiems žmonėms bet 10 m. ir vyresniems paaugliams: gerti po 1 pak. kas 6 val. pagal poreikį. Negalima vartoti daugiau kaip 4 pak. per 24 val. Gydymo trukmė neturi viršyti 3 parų. 1 pak. turinį ištrinti stiklineje karoš, tačiau ne verdančiu vandeniu (maždaug 250 ml). Vartoti per burną. **Kontraindikacijos.** Alergija veikliosios arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, jei vartojate ar per pastarąsias 2 sav. vartojote vaistų nuo depresijos arba Parkinsono ligos, vadinamųjų MAOI, vartojate kitų simpatomimetikų, yra užtaro kampo glaukoma (padidėjęs akišpūdis), nėštumo laikotarpis. „Theraflu ND“: labai aukštas kraujospūdis, širdies kraujagyslių liga, sunkus inkstų veiklos sutrikimas, yra kvėpavimo nepakankamumas, plaučių liga ar astmos priepuolis, jei vartojate oksacizolinono klases antibiotikus, žindymo laikotarpis. „Theraflu NT“: sunki širdies liga, kepenų ar inkstų veiklos sutrikimas. **Specialūs įspėjimai.** Nevertoti kitų vaistų, kuriuose yra paracetamolio, Nevertoti alkoholio. Pasitarti su gydytoju, jei yra inkstų ar kepenų liga, lėtinis alkoholis, gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės nepakankamumas, padidėjęs širdies ritmas, aukštas kraujospūdis, padidėjęs širdies ritmas, aukštas cukrinis diabetas, padidėjęs prostata, psichikos liga, kosulys su dideliu kiekiu skrepliu, lėtinis kosulys, aukšta temperatūra, išbrėimas, pastovus galvos skausmas, jei vartojate vaistus nuo psichikos, lėtinis skystis ar bėdaujančią. Pasitarkite karščiavimui ir išplitusiai raudonei su smulkiais pūlinėliais, staigiam pilvo skausmui, kraujavimui iš tiesiosios žarnos ar kitems išeminio kolkito simptomams. Ikius keloms dienas iki operacijos, būtina nutraukti vaisto vartojimą ir kreiptis į gydytoją. Gali sukelti priklausomybę. Sudėtyje yra aspartamo ir sacharozės. „Theraflu ND“: pasitarti su gydytoju, jeigu yra širdies liga ar antinksnių auglys, vyresniems nei 60 m. žmonėms. Pasitarkite stipram galvos skausmui, pykinimui, vėmimui, regėjimo sutrikimams, būtina nutraukti vaisto vartojimą. „Theraflu NT“: pasitarti su gydytoju, jeigu yra kvėpavimo nepakankamumo pavojus, hemolizė anemija. Daugiau informacijos pateikiama šių vaistų pakuočių lapeliuose. Teksto parengimo data 2024 m. Prieš ženkli priklauso HALEON arba HALEON Juri licencija. ©2024 HALEON arba licencijos turėtojas.

**NUO KOSULIO**

**NUO 4<sup>99</sup> €**



**HADELIX**

**S.A.** 40 mg/ml geriamieji lašai, tirpalas, 50 ml **4<sup>99</sup> €**  
**8 mg/ml sirupas, 100 ml 7<sup>99</sup> €**

**NERCEPTINAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Gebeinių lapų tirštasis ekstraktas. Vartojamas atšoksėjimui lengvinti, sergant peršalimo ligomis ar lėtiniu bronchitu. „Hedelix“ sirupo vartojimas: suaugusiems ir vyresniems nei 10 m. vaikams: 5 ml sirupo 3 kartus per parą; 4–10 m. amžiaus vaikams: 2,5 ml sirupo 4 kartus per parą; 1–4 m. amžiaus vaikams: 2,5 ml sirupo 3 kartus per parą; vaikams iki 1 metų: 2,5 ml sirupo 1 kartą per parą. Vartojimo būdas: vaistas vartojamas per burną. Sirupo nesieskite, bet užgerkite dideliu kiekiu skysčiu. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija gebeinių lapams arba bet kuriai pagalbinei „Hedelix“ medžiagai; jeigu yra argininsukcinatintetazės trūkumas (metabolinė šlapalo ciklo liga). **Specialūs įspėjimai:** „Hedelix“ sudėtyje yra sorbitolio, propilenglikolio ir makroglicerolio hidroksistearato. Makroglicerolio hidroksistearatas ir sorbitolis gali sukelti skrandžio sutrikimų ir viduriavimą. „Hedelix s.a.“ geriamųjų lašų vartojimas: suaugusiems ir vyresniems nei 10 m. vaikams: po 15 lašų 3 kartus per parą; 4–10 m. amžiaus vaikams: po 21 lašų 3 kartus per parą; 2–4 m. amžiaus vaikams: po 16 lašų 3 kartus per parą. Vartojimo būdas: vaistas vartojamas per burną. „Hedelix s.a.“ reikia vartoti su pakankamu kiekiu vandens. Rekomenduojama, kad maži vaikai „Hedelix s.a.“ suvartotų įmąšytą į arba ar vasių sulčių. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija gebeinių lapų ekstraktui arba bet kuriai pagalbinei „Hedelix“ medžiagai; jeigu yra argininsukcinatintetazės trūkumas (metabolinė šlapalo ciklo liga); kūdikiams ir vaikams iki 2 m. amžiaus didėję laringospazmo pavojus; jeigu Jūs sergate bronchine astma ar kita kvėpavimo takų liga, dėl kurios yra padidėjęs kvėpavimo takų jautrumas. **Specialūs įspėjimai:** šio vaisto 1 ml (3 laše) yra 837 mg propilenglikolio. Reklamos teksto parengimo data 2024-09.

**JEI VARGINA KOSULYS, GAMTA JUMS PATARIA: „HADELIX“.**

**SKAUDANČIAI GERKLEI**

**9<sup>99</sup> €**



**POLOVOX**

8,75 mg/dozėje burnos gleivinės purškalkas (tirpalas), 15 ml

**NERCEPTINAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Sudėtis: Vienoje dozėje (3 išpuškimuose) yra 8,75 mg flurbiprofeno. Indikacijos: skaudančios gerkles simptomų, tokių kaip gerkles skausmas, skausmingumas, sunkumas nuryti ir palpinamas, trumpalaikiam malšinimui 18 metų ir vyresniems suaugusiems. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusieji nuo 18 metų ir vyresni: viena dozė (3 išpuškimai) į gerkles kas 3–6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 dozės per 24 valandas. Per pusryčių neįkvėpti. „Polovox“ skirtas vartoti tik trumpą laiką. **Kontraindikacijos.** „Polovox“ vartoti negalima pacientams, kuriems yra alergija (padidėjęs jautrumas) flurbiprofenui, ar kitems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aspirinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; anksčiau buvo pasireiškę alerginės reakcijos, pavartojus nesteroidinių vaistų nuo uždegimo ar aspirino; yra arba buvo du ar daugiau skrandžio opos arba kraujavimo arba žarnų opos atvejų; anksčiau po nesteroidinių vaistų nuo uždegimo vartojimo pasireiškė kraujo krešėjimo arba kraujavimo sutrikimų; jeigu yra sunki širdies, inkstų ar kepenų sutrikimų; paskutiniai 3 mėnesiai. Šio vaisto negalima vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Vartojant mažiausią veiksmingą vaistinio preparato dozė trumpiausią simptomų kontrolėi būtina laiką, galima sumažinti nepadėjusiam poveikiui. Pasitarti su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Polovox“; jeigu jau yra vartojamas bet kuris kitas nesteroidinis vaistas nuo uždegimo ar aspirinas; jei yra bakterinis tonzilių uždegimas; jeigu pacientas senyvo amžiaus; jeigu pacientas serga ar yra sunki astma; sisteminė raudonajai vilkigė ar mišrią jungiamojo audinio ligą; hipertenziją; žarnyno ligimas (opinis kolitas, Krono liga); jeigu yra širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimai; pacientė nešči pirmuosius 6 mėnesius arba maitina krūtimi. Reklamos teksto parengimo data – 2025.01.

SAUSOMS, PAVARGUSIOMS, SUDIRGUSIOMS AKIMS BEI LĒTIAM AKIŲ SAUSUMUI

NUO 13<sup>47</sup> €

**BEPANTHEN® EYE**  
 akių lašai, 20 x 0,5 ml 13<sup>47</sup> €  
 akių lašai, 10 ml 15<sup>47</sup> €  
 INTENSIVE, akių lašai, 10 ml 16<sup>97</sup> €



**MEDICINOS PRIEMONĖS**  
 „Bepanthen® Eye“ akių lašų sudėtyje yra natūrali hialuronato ir deksapanterolio, „Bepanthen® Eye Intensive“ akių lašų sudėtyje yra ne tik natūrali hialuronato ir deksapanterolio, bet ir vitamino A ir E bei fosfolipidų. Natūrali hialuronatas sudaroma tolygia, stabiliai ir ilgalaikiai apsaugoję plėvelę ant akies paviršiaus. Dekspanterolis geba prisijungti dideli vandens kieki, drėkina ir apsaugo akis. Vitaminai A ir E veikia kaip antioksidantai, neutralizuodami laisvuosius radikalus (pvz., UV šviesa). Fosfolipidai palengvina ašarų plėvelės lipidinio sluoksnio regeneraciją. „Bepanthen® Eye“ akių lašai skirti labai sausoms, sudirgintoms akims ir lėtiniam akių sausumui. Drėkina, saugo, regeneruoja ir gydo. Tinka ne tik esant mechaniniams stresui, stresui dėl aplinkos poveikio arba intensyvaus žiūrėjimo, bet ir esant smėlio pojūčiui akyse, sumažėjus ašarų gamybai, esant diskomfortui dėl tam tikrų vaistų vartojimo ar išorinių alergenų. Visi lašai tinka nešiojantiems kontaktinius lęšius. Lašinti kontaktinių lęšių išimti nereikia. Sudėtyje nėra konservantų, todėl lašai labai gerai toleruojami net vartojant ilgą laiką. Lašinti po 1 lašą į akies junginę mašeliu iki 3-5 kartų per parą. „Bepanthen® Eye“ vienodozės akių lašų talpyklės skirtos tik vienkartiniam vartojimui. „Bepanthen® Eye“ buteliuką galima vartoti net 12 mėnesių po jo atidarymo. „Bepanthen® Eye Intensive“ buteliuką galima vartoti 2 mėnesius po jo atidarymo. Jei norite sužinoti daugiau, skaitykite visas vartojimo instrukcijas. Reklamos teksto parengimo data 2025-02, CH-20250227-72.

PAŠALINKITE SAUSŲ AKIŲ SIMPTOMUS IŠ KARTO!

-20%



**OCUSYST**  
 kontaktinių lęšių tirpalas, 100 ml 5<sup>28</sup> 4<sup>23</sup> €  
 kontaktinių lęšių tirpalas, 360 ml 8<sup>14</sup> 6<sup>55</sup> €  
**MEDICINOS PRIEMONĖS**

-25%



**AKINIAI SKAITYMOI**  
 Vis daugiau skaitotome ne spausdintą tekstą, o iš ekranų. Pristatome naują – skaitymo akiniai su Blue Control lęšiais. Jų privalumai:  
 • Apsaugo akis nuo kenksmingų mėlynos šviesos spindulių, kurią skleidžia skaitmeniniai prietaisai (išmanusis telefonas; kompiuteris; planšetinis kompiuteris; televizorius; LED apšvietimas)  
 • Panaikina atspindžius tiek iš išorės, tiek iš vidinės lęšio pusės.  
 • Mažina akių nuovargį.

\*Akinija laikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

AKIŲ VOKŲ HIGIENAI

-20%



**BLEPHACLEAN**, drėgnos servetėlės akių srities ir akių vokų valymui, 20 vnt. 4<sup>72</sup> 14<sup>38</sup> €  
**BLEPHAGEL**, gelis akių vokų ir blakstienų higienai, 30 g 24<sup>22</sup> 17<sup>58</sup> €  
**BLEPHA EYEBAG**, daugkartinė šildomoji akių kaukė, 1 vnt. 4<sup>72</sup> 38<sup>38</sup> €

**MEDICINOS PRIEMONĖS, KOSMETIKOS PRIEMONĖS**  
 „Blephaclean“ – švelni ir veiksmingi akių vokų priežiūra, sergant blefaritu, sausų akių sindromu ar po akių operacijų. Taip pat esant akių alergijai ar infekcijai. Tinka kūdikiams nuo 3 mėn., vaikams, suaugusiems ir vyresnio amžiaus žmonėms! Be konservantų! „Blepha Eyebag“ daugkartinė šildomoji kaukė gydo Meibomo liaukų funkcijų sutrikimą (MGD) ir blefaritą, lengvina sausų akių simptomus, susijusius su MGD ar kitomis panašiomis akių būklėmis, tokioms kaip miežis ar chalazionas (šaltasis miežis). „Blephagel“ yra hipoalerginis sterilus gelis, skirtas kasdieniui akių vokų ir blakstienų higienai, sergant blefaritu, kai akys sausos dėl Meibomo liaukų funkcijos sutrikimo, kai akis ir akies vokas pažeisti rožinės aknės ar seborėjinio dermatito. Be konservantų!

KOMPLEKSINĖ AKIŲ VOKŲ PRIEŽIŪRA BE KONSERVANTŲ!

PAVIRŠINIŲ ODOS ŽAIZDŲ GYJIMO GERINIMUI

NUO 5<sup>99</sup> €



**BEPANTHEN**  
 50 mg/g kremas, 30 g 5<sup>99</sup> €  
 50 mg/g tepalas, 30 g 5<sup>99</sup> €

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**  
 Terapinės indikacijos: įvairios kilmės paviršinių odos ir gleivinių pažeidimų pagalinis gydymas, drėkinant odą ir atkuriant epidermio barjerą, paliekant epitelizaciją su atitinkamu priežiūriniam ir niežėjimui mažinančiu poveikiu, pavyzdžiui, nedidelių pažeidimų (nedidelių nudegimų ar uždegimų), odos sudirginimų, išbrėžimų nuo sausybės, skausmingų ir įtrūkusiu spenelių gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** patęsta oda tepti plonu sluoksniu preparato viena ar daugiau kartų per dieną, kai reikia. Skausmingus ir įtrūkusius spenelius tepti po kiekvieno maistinio, prieš žindant nuplauti. Tepti kiekvieną kartą keičiant sauskelnes, prieš tai odą reikia kruopščiai nuvalyti. Gydymo trukmė priklauso nuo ligos pobūdžio ir eigos. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jei sergate kita liga, esate alergiškas arba vartojate kitus vaistus, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Naudojant tepalą ar kremą reikia vengti kontakto su akimis. Reklamos teksto parengimo data 2024-10, CH-2024030-71

**BEPANTHEN PLUS**  
 50 mg/5 mg/g kremas, 30 g 6<sup>99</sup> €

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**  
 1 g kremas yra 50 mg deksapanterolio ir 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido. Terapinės indikacijos: lokalus įvairių paviršinių žaizdų, pvz., nubrozdinimų, įpjūvimų, įbrėžimų, odos trintų, nudegimų gydymas, kai yra infekcijos pavojus. Vartojimo būdas ir dozavimas: kūdikiams nuo 1 mėn., vaikams, paauguliams ir suaugusiems išvalyti žaizdą arba pažeistą odą vieta reikia tepti plonu kremu sluoksniu viena arba kelis kartus per dieną, kol žaizda užgis. Venkite tepti didelius odos plotus. **Kontraindikacijos:** alergija veikliosios ar bet kuriai pagalbinei medžiagai; gilios arba stipriai uždegtos žaizdos; jei trūksta ausies būgnelis, negalima tepti ausies sritį. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** saugokitės, kad kremas nepatektų į akis, ausis ir ant gleivinių. Negalima tepti ant sudirgintos, bet neriekuotos odos. Negalima vartoti kartu su kitomis antiseptinėmis medžiagomis, muilu. Jei pasireiškia sunkios alerginės reakcijos simptomai, vartojimą nedelsdami nutraukite ir pasitarkite su gydytoju. Reklamos teksto parengimo data 2024-10, CH-2024030-71

LAIMEI, YRA „BEPANTHEN“ GYDO IR APSAUGO ODA

PAVIRŠINĖMS ŽAIZDOMS IR ODOS DEZINFEKCIJAI PRIEŠ NECHIRURGINES PROCEDŪRAS

7<sup>99</sup> €



**DUOSEPTIC**, 1 mg/20 mg/ml odos purškalkas (tirpalas), 50 ml

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**  
 Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml „Duoseptic“ odos purškalo (tirpalo) yra 1 mg oktenidino dihidrochlorido, 20 mg fenoksietanolio. **Terapinės indikacijos:** mažų paviršinių žaizdų antiseptinis gydymas ir odos dezinfekcija prieš nechirurgines procedūras; kartotinis trumpalaikis gleivinių ir gretimų audinių antiseptinis gydymas prieš diagnostines išangės ir lyties organų sritį, įskaitant makštį, moteris išorinius lyties organus ir varpos galvutę, taip pat prieš šlapimo pūslės kateterizaciją; laikinas ribotas pagalbinis antiseptinis tarpširdinis mikozės (grybelinės infekcijos tarp rankų ar kojų pirštų) gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti ant odos. Ant gydymo srities užpurškite 1 kartą per dieną taip, kad jos visiškai sudrektų. Kitu atveju galite užpurškiti ant tampono ir gydomą vietą patrinti (ne mažiau nei dviem „Duoseptic“ supurkštais tamponais), kad visiškai sudrektų. Tinkamiausias būdas – naudojant tamponus. Palaukite, kol „Duoseptic“ visiškai išdžius, prieš aprišdami ar užklijuodami žaizdą. Naudojant grybelinei infekcijai gydyti – purškite rylė ir vakare. **Kontraindikacijos:** nenaudokite, jei padidėjęs jautrumas oktenidino dihidrochloridui, fenoksietanolii ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. „Duoseptic“ neturėtų būti naudojamas pilvo ertmei (pvz., atliekant operaciją), šlapimo pūslėi ar ausies membranai skalauti. **Specialūs įspėjimai:** nenurykite, ypač didelio kiekio, ir neleiskite patekti į kraujotakos sistemą, pvz., dėl atsitiktinio įšvirkstimo. Naujagimiams, ypač neišnešiotoms, vartoti atsargiai, nes „Duoseptic“ gali sukelti sunkius odos pažeidimus. Pašalinkite vaistinio preparato perteklių ir užtikrinkite, kad tirpalo neliktų ant odos ilgiau nei reikia. Venkite patekimo į akis; patekęs – nedelsdami gerai praskalaukite vandeniu. Neleiskite švirškui į giliosius raumenis. Naudokite tik išorškai. Po gelių žaizdų praplovimo švirškui buvo pranešama apie nuolatinę edemą (patinimą), eritemą (paraudimą), audinių nekrozę; kai kuriais atvejais prireikė chirurginės intervencijos. Reklamos teksto parengimo data 2024-11-11.

RANDŲ PROFILAKTIKAI IR PRIEŽIŪRAI

-20%



**DERMATIX® ULTRA**  
 gelis, 6 g 2<sup>72</sup> 22<sup>36</sup> €  
 gelis, 15 g 49<sup>22</sup> 39<sup>98</sup> €

**MEDICINOS PRIEMONĖS**  
 Vietinio vartojimo silikono gelis šviežiai užgyjusių žaizdų randų susiformavimo profilaktikai ir apsaugai nuo iškilii, matomų randų atsiradimo. „Dermatix® Ultra“ yra vietiskai vartojamas skaidrus silikono gelis, kuris greitai išdžiūsta ir padeda išlaikyti odos drėgmės balansą. Skirtas odos randams, susidariusiems po chirurginių procedūrų, nudegimų ir kitų sužalojimų, prižiūrei. Nustatyta, kad „Dermatix® Ultra“ gelis yginia, minkština ir mažina randus, naikina niežulį ir diskomforto jausmą rando vietoje, taip pat mažina dėl randų atsiradusių odos spalvos nelygumus. „Dermatix® Ultra“ taip pat tinka ir vaikams. „Dermatix® Ultra“ negalima vartoti ant atvirų ar šviežių žaizdų. „Dermatix® Ultra“ negalima tepti ant gleivinių arba trie aikių.

NIEŽĖJIMUI IR SKAUSMUI MALŠINTI

5<sup>99</sup> €



**PSILO-BALSAM**, 1% gelis, 20 g

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**  
 Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g gelio yra 10 mg difenhidramino hidroklorido. **Pagalbinės medžiagos:** cetilpiridinio chloridas, makrogolio 6 glicerolio kaprilokapratas, poliakrilato rūgštis, trometamolis, išgrynintas vanduo. **Terapinės indikacijos:** „Psilo-Balsam“ yra lokalaus poveikio vaistas nuo alergijos. „Psilo-Balsam“ vartojamas niežėjimui ir skausmui malšinti esant: pirmojo laposinio terminiam nudegimui ir nudegimui saulės spinduliais; vabzdžių įgėlimams ar įkandimams, dilgėlinei ar kitokiems nedidelėms odos pažeidimams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams, „Psilo-Balsam“ reikia tepti plonu sluoksniu pažeistas odos vietas ir švelniai trinti 3–6 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu Jūsų jautrumas cetilpiridinio chloridui yra padidėjęs, „Psilo-Balsam“ vartoti negalima. **Specialūs įspėjimai:** „Psilo-Balsam“ 1% gelio negalima tepti ant atvirų žaizdų ar gleivinių, nes dėl didesnę defenzidaminio absorbcijos gali pasireikšti sisteminis jo poveikis; vengti patekimo į akis; jei patepus gelio emė peršėti oda arba atsirado bėrimas, gydymą reikia nutraukti. Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartojimą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. „Psilo-Balsam“ 1% gelio negalima vartoti paskutinių nėštumo savaičių metu, nes yra galimi gimimo funkcijos sutrikimai. Žindant moterims vaisto vartoti nerekomenduojama. Reklamos teksto parengimo data 2026-03-10, 2604. „Psilo-balsam\_V01\_LT

JKANDIMAI, NUDEGIMAI, NIEŽULYS? NEKASYKITE – NURAMINKITE!

**-30%****SCHOLL****PĖDŲ IR NAGŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS**

Turėdamas daugiau nei 100 metų patirtį pėdų priežiūros srityje, prekį ženklas „Scholl“ įsitvirtino kaip vienas pėdų priežiūros sprendimų lyderių. Visi „Scholl“ produktai, įskaitant vidpadžius, dezodorantus, pėdų kaukes ir pleistus, nagų grybelio ir karpyų gydymo priemones, buvo sukurti taip, kad padėtų spręsti jūsų pėdų problemas – nuo sausos odos iki pavargusių ir skaudančių pėdų.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

**NUO VABZDŽIŲ****-20%****MOUSTICARE**

Nugalėkite uodus ir erkes su „MoustiCare“ iš Prancūzijos! Tinka visai šeimai: vaikams, nėščioms moterims, suaugusiems. Efektyvus prieš įvairių rūšių mašalus: uodus, erkes, blusas, muses, Egipto, Azijos tigrinius ir paprastuosius uodus. Sudėtyje 100% augalines veiklioji medžiagos. Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

**„MOUSTICARE“ GALI PAKEISTI CHEMIŠNIUS REPELENTUS!**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

**NUO GRYBELIO****IKI -35%****MYCOSAN****MEDICINOS PRIEMONĖS**

„Mycosan“ skirtas nagų ir pėdų grybelinėms infekcijoms gydyti ir apsaugoti nuo jų. „Mycosan“ serumas gydo ir užkerta kelią rankų ir kojų nagų grybeliui. Serumas prasiskverbia į nagą ir pagerina jo struktūrą, todėl nagas atauga sveikas. Pažeistoje vietoje „Mycosan“ sukuria apsauginį barjerą ir infekcija nebegali plisti į kitus nagus. Labai svarbu gydymą pradėti vos pastebėjus pirmuosius ligos simptomus. Labai svarbu griežtai laikytis produkto naudojimo instrukcijos. „Mycosan“ pėdų gelis nuo grybeliui skirtas „atleto pėda“ gydyti. „Atleto pėda“ yra grybeliui sukelta pėdos odos infekcija, kurią reikia gydyti, kad ji neįsiliptų. Galvinamasis ir vandeniui nelaidūs pėdų purškiklis „Mycosan Protect“ 12 val. apgaubia pėdą apsaugine plėvele, kuri saugo pėdas nuo grėsmės susigrąžinti grybeline pėdų odos infekcija.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

**-20%** **15.19€** ~~18.99~~**AMEDIPLUS**

odos priežiūros pleistras su Arnikos ir Bosvelijos ekstraktais, 9x14 cm, 10 vnt.

**MEDICINOS PRIEMONĖ****-25%****AMEDIPLUS**

Pleistrai pūslėms, 6,9 x 4,4 cm, 5 vnt. ~~5.19~~ **3.89 €**

Pleistrai pūslėms, 2 x 6 cm, 5 vnt. ~~4.99~~ **3.74 €**

**MEDICINOS PRIEMONĖS****1+1** Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!****AMEDIPLUS**

ULTRA SENSITIVE pleistrai, 10 vnt. ~~3.49~~ **€**

**MEDICINOS PRIEMONĖ****-25%** **12.37€** ~~16.49~~**AMEDIPLUS**

pleistras nuo lūpų pūselinės, 15 vnt.

**MEDICINOS PRIEMONĖ****-20%****AMEDIPLUS**

Tamprūs pleistrai, 7 x 2 cm, 10 vnt. ~~4.69~~ **1.35 €**

Tamprūs pleistrai, 7 x 3,8 cm, 200 vnt. ~~28.00~~ **22.40 €**

Tamprūs pleistrai, 7 x 2 cm, 200 vnt. ~~20.00~~ **16.00 €**

**MEDICINOS PRIEMONĖS**

Širdis sako **taip**,

lūpų pūslelinė

sako **ne?**



**Acic 200mg tabletės. Nereceptinis vaistinis preparatas. Veikliosios medžiagos, stiprumas.** Vienoje tabletėje yra 200 mg acikloviro. **Terapinės indikacijos.** Vaistas skirtas anksčiau gydytojo diagnozuotos pasikartojančios lūpų pūslelinės gydymui suaugusiems žmonėms. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Gerti po vieną tabletę 5 kartus per parą kas 4 val. Gydymo trukmė - 5 paros. **Kontraindikacijos.** „Acic“ naudoti negalima esant padidėjusiam jautrumui aciklovirui, valaciclovirui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vaisto nerekomenduojama vartoti vaikams ir paaugliams, jaunesniems nei 18 metų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [NepageidaujamaR@vvkt.lt](mailto:NepageidaujamaR@vvkt.lt) arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje [www.vvkt.lt](http://www.vvkt.lt). **Atstovas Lietuvoje:** „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, tel. +370 5 2636037, el.paštas: [info.lithuania@sandoz.com](mailto:info.lithuania@sandoz.com). BS2509244521. Teksto patvirtinimo data: 2025-09-24

ACIC pasiekia herpes viruso dauginimosi vietą iš vidaus ir jį blokuoja

**SANDOZ**



# SKIEPAI NUO ERKINIO ENCEFALITO

SU  
LOJALUMO  
KORTELE

28<sup>99</sup> €

SKIEPO KAINA  
BE KORTELĖS

31<sup>99</sup> €



Galima išankstinė registracija:

- internetu [www.nvaistine.lt/skiepai](http://www.nvaistine.lt/skiepai)
- telefonu **+370 800 10 008**



Nuolaidos taikomos  
su PC Norfa kortele.  
Akcijos „Laimės valandos“  
nuolaidos netaikomos.

IKI **-45%**



**AMBIO**  
LAKTO-BIFIDOBAKTERIJOS SU INULINU, 30 kapsulių ~~44<sup>98</sup> 7<sup>96</sup> €~~ **-45%**  
VIRŠKINIMO FERMENTAI, 12 krantomųjų tablečių ~~4<sup>99</sup> 3<sup>49</sup> €~~ **-30%**  
MAISTO PAPILDAS

**1+1** Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



**EPITOME**  
SPIRIT MELATONIN, 385 papurškimai, 50 ml **17<sup>58</sup> €**  
MAISTO PAPILDAS

**-40%** **11<sup>27</sup>€**  
~~18<sup>78</sup>~~



**AMBIO**  
KOFERMENTAS Q10, 100 mg, 30 kapsulių  
MAISTO PAPILDAS

**1+1** Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



**EPITOME**  
EYE'S FORMULA, 30 minkštųjų kapsulių **15<sup>99</sup> €**  
MAISTO PAPILDAS

**-35%**



**AMBIO**  
HOT HERBAL DRINK, milteliai karštam gėrimui, 10 paketėlių **40<sup>99</sup> 7<sup>14</sup> €**  
BRONCHO COMPLEX, 20 tablečių ~~7<sup>99</sup> 5<sup>19</sup> €~~  
MAISTO PAPILDAS

**-45%** **14<sup>84</sup>€**  
~~26<sup>88</sup>~~




**EPITOME**  
OMEGA, 90 kapsulių  
MAISTO PAPILDAS

**-20%** **5<sup>43</sup>€**  
~~6<sup>79</sup>~~



**UNDEVIT**, 50 dražečių  
MAISTO PAPILDAS  
Vitaminų A, C, E, B grupės (B1, B2, B6, B12) ir niacino, rutino, pantoteno rūgšties, folio rūgšties preparatas. Vitaminai C ir A padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo, vitaminas B1 (tiaminas) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, vitaminas B2 (riboflavinas) padeda išsaugoti normalų regėjimą, vitaminas B6 (piridoksinas) padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, vitaminas B12 (cianokobalaminas) padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją, pantoteno rūgštis padeda palaikyti normalią protinę veiklą. Vartojimas: gerti po 1 dražetę per dieną po valgio. Gamintojas: „Technology“, Ukraina. Išskirtinis platintojas Lietuvoje: UAB VERATRUM PHARMA, Žarijų g.2B, Vilnius

**-40%** **9<sup>59</sup>€**  
~~15<sup>98</sup>~~



**AMBIO**  
VITAMINAS D3, 4000 IU, 60 minkštųjų kapsulių  
MAISTO PAPILDAS

-20%



## FLORADIX

### MAISTO PAPILDAI

„Floradix“ – svarbiausi mineralai ir vitaminai gerai savijautai. „Floradix“ natūralios sudedamosios dalys užtikrina gerą organizmo svarbiausių vitaminų ir mikroelementų pasisavinimą. Skystos formos medžiagos greičiau rezorbuojasi nei esančios tablete, o dėl puikaus skonio juos noriai geria maži vaikai ir yra tinkami vartoti nėščioms moterims.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-40%



**PROSTAN FORTE**, 30 kapsulių **45<sup>90</sup> 9<sup>54</sup> €**  
**POTENZINE SUPERIOR**, 30 tablečių **25<sup>90</sup> 15<sup>59</sup> €**  
**TOTALPOWER MAN**, 30 tablečių **20<sup>90</sup> 12<sup>59</sup> €**

### MAISTO PAPILDAI

„Prostan forte“ – pagalba vyresnio amžiaus vyrų prostatai. Sudėtyje esantys sabelpalmių ir rugių žiedadulkių ekstraktai padeda palaikyti normalią prostatos funkciją, o afrikinių pigių ekstraktas – normalią šlapimo pūslės funkciją. Kininio ženšenio ekstraktas padeda išlaikyti energingumą. Šio preparato sudėtis taip pat praturtinta vitaminu D3 ir cinku. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 2 kartus per dieną, valgio metu.

„Potenzine superior“ – subalansuotas derinys potencijai. Šio maisto papildu sudėtyje esantis ženšenio šakni ekstraktas padeda palaikyti lytinę funkciją, išverme ir energingumą. Normali lytinė potraukis ir seksualini pajėguma padeda palaikyti gulsčiosios ragūžės vaisių ekstraktas, o normalų vaisingumą ir testosterono koncentraciją kraujyje – cinkas. Sudėtyje taip pat yra L-arginino. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną, valgio metu.

„TotalPower man“ – galingi multivitaminai aktyviam vyrui su 23 aktyviais medžiagomis. Šis maisto papildas puikiai tinka intensyviai gyvenantiems vyrams. Jo sudėtyje esantis jodas eluterokokas padeda palaikyti normalią proteinų veiklą ir energiją, magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, o vitaminai B6 ir B12 – palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną.

-40%



## RHINOLAYA

### MEDICINOS PRIEMONĖS

Himalajų druskos purškalkas Jums ir Jūsų kūdikiai

Vienintelis Himalajų druskos nosies purškalkas. Be konservantų.

- Natūraliai išvalo, drėkina ir padeda atkurti užburkusią nosį
- Tinka šalčio, vėjo ir alergenu (namų dulkių, oro taršos, gyvūnų plaukų, žiedadulkių) pakeistai nosies gleivinei
- Nedirgina ir nesusausina nosies gleivinės
- Skystina gleives
- Paspyžina greitai veikimu

### „RHINOLAYA“ nosies purškalkas yra kelių rūšių:

„RHINOLAYA FORT“ hipertoniškas, 50 ml – sloguojantis, peršalus, sinusito metu.

„RHINOLAYA KIDS“ izotoninis, 50 ml – užburkusiai ir išsausėjusiai kūdikio nosies gleivinei.

„RHINOLAYA PROTECT“, izotoninis, 50 ml – alergenu pakeistai nosies gleivinei.

Medicinos priemonės CE 0459

„RHINOLAYA“ – IŠ HIMALAJŲ GELMIŲ PRIEŠ ALERGIJĄ IR SLOGĄ!

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-30%



## MAGNUS REX

### MAISTO PAPILDAI

„Magnus Rex“ – aukštos kokybės, natūralios kilmės magnio bisglicinato iš Negyvosios jūros produktų linija, kuriai būdingas geras įsisavinimas ir švelnus poveikis organizmui.

• „Magnus Rex 150“ – 150 mg magnio dozė kasdienai.

• „Magnus Rex 300“ – 300 mg magnio dozė didesniems organizmo poreikiams.

• „Magnus Rex 300 + Ashwagandha 300“ – papildyta KSM-66\* migdomųjų vitaminų (ašvagandų) ekstraktu, padedančių palaikyti nervų sistemos balansą.

Produktai be pridėtinii priedų – be dažikliu, konservantų ir saldikiliu. Tinka veganams, vegetarams, nėščioms ir žindančioms moterims.

**BISGLICINATAS – MAGNIO FORMA, KURIA GALITE PASITIKĖTI.**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

NUO 5<sup>99</sup> €

## TANTUM VERDE®

TANTUM VERDE®, 1,5 mg/ml, burnos gleivinės purškalkas (tirpalas), 30 ml **9<sup>99</sup> €**

TANTUM VERDE®, 3 mg/ml, burnos gleivinės purškalkas (tirpalas), 15 ml **9<sup>99</sup> €**

TANTUM VERDE®, 3 mg, 20 kietųjų pastilių **5<sup>99</sup> €**

TANTUM LEMON®, 3 mg, 20 kietųjų pastilių **5<sup>99</sup> €**

### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veiklioji medžiaga, stiprumas:** 1 ml burnos gleivinės purškalko yra 1,5 mg arba 3 mg benzidamino hidrochlorido. 1 pastilėje yra 3 mg benzidamino hidrochlorido.

**Terapinės indikacijos:** lokalus simptominis skausmingo burnos, ryklės bei dantenu uždegimo ir patinimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti į burną ir ryklę. **Purškalkai:** reikia purkšti 2–6 kartus per parą. Suaugusiesiems: po 4–8 „Tantum Verde“ išpurškimus; 6–12 m. vaikams: po 4 „Tantum Verde“ išpurškimus; 3–5 m. vaikams: po 1 „Tantum Verde“ išpurškimą 4 kg kūno svorio (daugiausia 4 išpurškimus). Suaugusiesiems: po 2–4 „Tantum Verde“ forte išpurškimus; 6–12 m. vaikams: po 2 „Tantum Verde“ forte išpurškimus; 3–5 m. vaikams: po 1 „Tantum Verde“ forte išpurškimą 8 kg kūno svorio (daugiausia 2 išpurškimus). **Pastilės.** Suaugusiesiems: 1 kietoji pastilė 3–4 kartus per parą; 6– <12 m. vaikams galima vartoti tik suaugusiam žmogui prižiūrint; jaunesniems negu 6 m. vaikams vartoti negalima. **Kontraindikacijos:** alergija benzidaminui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Alergija salicilo rūgščiai arba (ir) bet kuriam nesteroidiniam vaistui nuo uždegimo. **Specialūs įspėjimai:** per apsirūkimą pavartojus (pvz., vaiku) labai daug vaisto, būtina nedelsiant informuoti gydytoją. Pirmoji pagalbinė gydymo priemonė gali būti vėmimo sukėlimas. Jeigu trumpalaikis gydymas benzidaminu reikiamo poveikio nesukelia, būtina kreiptis į gydytoją. Reikia saugotis, kad vaistinio preparato nepatektų į akis. Ilgalais gydymas benzidaminu gali lemti jutrumo padidėjimą. Tokiu atveju vaistinio preparato vartojimą turite nutraukti ir kreiptis į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2025-04-03.

IKI -40%



## AIDWISE

Automatinis žastinis kraujospūdių matuoklis DBP-1358, **64<sup>95</sup> 38<sup>97</sup> € -40 %**

Bekontaktis skaitmeninis termometras DET-306, **39<sup>90</sup> 25<sup>99</sup> € -35 %**

### MEDICINOS PRIETAISAS

## NUO HEMOROJAUS

-20% 11<sup>98€</sup> ~~14<sup>7</sup>~~

## REPAHERB

tiesiosios žarnos tepalas, 25 g

tiesiosios žarnos žvakutės, 10 vnt.

### MEDICINOS PRIEMONĖS

Natūralios sudėties „RepaHerb“ priemonės su veikliąja medžiaga sukalfatū mažina su hemoroidais ir jo komplikacijomis susijusius simptomus: egzema, išangės įtrūkimas, „RepaHerb“ padengia ir apsaugo epidermį, mažina odos uždegimą ir niežulį, skatina odos regeneraciją, greitina žaizdų gijimą. Tinka nėščioms ir žindančioms moterims. Reklamos teksto parengimo data 2026 04 20.

-30%



## BIOGAIA

PROTECTIS, 10 kramtomųjų tablečių su vitaminu D3 **40<sup>90</sup> 7<sup>27</sup> €**

PROTECTIS BABY, lašai, 5 ml **48<sup>90</sup> 13<sup>01</sup> €**

PHARAX, lašai, 5 ml **24<sup>90</sup> 15<sup>39</sup> €**

### MAISTO PAPILDAI

„BioGaia Protectis“ lašai – saugus ir paprastas būdas papildyti kūdikio žarnyno mikroflorą nuo pirmųjų gyvenimo dienų, vos 5 lašai per dieną.

„BioGaia Protectis“ kramtomosios tabletės su vitaminu D3 – patogus būdas palaikyti žarnyno mikroflorą ir imuninę sistemą, 1 apelsinų skonio tabletė per dieną; tinka suaugusiesiems ir vaikams nuo 3 metų.

„BioGaia Pharakx“ lašai – dvejoopa pagalba burnos ir gerklės mikrobiotai; tinka vaikams nuo 6 mėnesių ir suaugusiesiems, vartoti po 5 lašus 2 kartus per dieną.

-35%



**BIOCINKAS**, milteliai geriamajam tirpalui, 20 pakelių ~~46<sup>99</sup>~~ 7<sup>14</sup> €  
**RETINA**, milteliai geriamajam tirpalui, 28 pakelių ~~29<sup>99</sup>~~ 19<sup>49</sup> €  
**REBRRAIN**, 60 kapsulių ~~59<sup>99</sup>~~ 38<sup>99</sup> €  
**LABANAKT**, 14 pakelių ~~6<sup>99</sup>~~ 4<sup>54</sup> €

**MAISTO PAPILDAI**

Išsirinkite maisto papildą, kurio reikia: „**bioCinkas**“ – ypač stiprus cinko maisto papildas milteliais, papildantis organizmą net 30 mg cinko mineralu! „**reBRRAIN**“ sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų poveikis smegenų veiklai, atmintčiai ir gerai nuotaikai patvirtintas klinikiniais tyrimais. Fosfolipidai padeda išlaikyti kognityvinę funkciją ir ryškia atmintį. Vidurinės grandinės trigliceridai (MCT aliejus) turi sąsają su žmogaus bendra psichologine funkcija, atmintimi, sprendimų priėmimu, minčių dėstymu. „**Labanakt**“ – melatonino, valerijonų ir magnio kompleksas geriamam miegui. Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti. „**Retina**“ – liuteino, cinko, vitaminių A, B2 ir „Pycnogenol“ kompleksas, padedantis išsaugoti regėjimą. 1 pakelėlyje – net 50 mg liuteino. Vitaminai A ir B2 padeda išsaugoti normalų regėjimą. Cinkas padeda palaikyti normalią vitamino A apykaitą. Pagaminta Izraelyje.

-30%

Perkant bent DVI bet kurias pakuotes



**VIRIDIAN**  
MAISTO PAPILDAI

„Viridian“ – tai natūralūs, aukštos kokybės vitaminai ir maisto papildai, sukurti remiantis mokslu, etiška gamyba ir gryna sudėtimi.

**KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIAI, INHALIATORIAI, TERMOMETRAI**

IKI -50%



**„AMEDIPLUS“ MEDICINOS PRIETAISAI**  
MEDICINOS PRIETAISAI

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

IKI -25%



**MAGLIQUID**, 20 paketėlių ~~44<sup>99</sup>~~ 11<sup>24</sup> € -25%  
**ENERGY BOOST LIQUID**, 20 paketėlių ~~24<sup>99</sup>~~ 19<sup>99</sup> € -20%  
**EMELIN® FF LIQUID**, 20 paketėlių ~~45<sup>99</sup>~~ 12<sup>79</sup> € -20%

**SKYSTI MAISTO PAPILDAI SU SALKIKLIAIS**

Mangų ir apelsinų skonio „**Magliquid**“ – lengvai įsisavinamas skystos formos **magnio citratas (815 mg) raumenims, kaulams, energijai, nervų sistemai, jungiamajam audiniui**. Rekomenduojamas aktyviems, sportuojantiems žmonėms, senjorams, siekiantiems įgyti energijos, palaikyti normalią raumenų ir kaulų būklę. Apelsinų skonio „**Energy Boost Liquid**“ – itin stiprus **aminorūgščių L-karnitino, L-arginino L-aspartato ir L-citrulino DL-malato kompleksas su vitaminais B ir B<sub>6</sub> energijai, gyvybingumui**. Tinka sportuojantiems ir aktyviai gyvenantiems žmonėms, jaučiantiems didesnę energijos poreikį ar nuovargį. Avičių skonio „**Emelin® FF liquid**“ – naujos kartos bioaktyvi **chelatinė geležis su folio rūgštimi ir vitaminu B<sub>12</sub>**. Sudėtyje esantis **geležies bisglucinat** (geležies aminorūgščių chelatai su patentuotu „**Ferrochel**“ geležies kompleksu) efektyviai įsisavinamas organizmo, yra gerai toleruojamas ir nesukelia diskomforto virškinimo trakte. Produktai neturi gliukio, laktozės ir pridėtų cukrų.

-10%

5<sup>39€</sup>



**GLICINAS**, 50 tablečių

**MAISTO PAPILDAS**

Sudedamosios dalys: glicinas (65 % grynojo kiekio), dekstrozės monohidratas, kukurūzų krakmolos, lipnumą reguliuojanti medžiaga riebalų rūgščių magnio druskos. Grynasis kiekis: 7,6 g. Vartojimo būdas: vartoti po 1 tablete 3 kartus per dieną. Tablete laikyti po liežuvio, kol ištirps. Rekomenduojamame suvartoti per para kiekįje (3 tabletelės) yra 300 mg glicino. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Laikymo sąlygos. Laikyti sausoje, tamsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Gamintojas: UAB „Medicata Filia“, Žarijų g. 2B, Vilnius. Išskirtinis platintojas Lietuvoje: UAB VERATRUM PHARMA, Žarijų g.2B, Vilnius

-40%

4<sup>79€</sup>



**MIRAMILE TONSIL**, gerklės ir burnos purškalas, 30 ml

**MEDICINOS PRIEMONĖ**

„Miramile Tonsil“ – burnos ir gerklės purškalas net su 8-iais aliejais: šalavankiu, miramidžiu, medetkų, apelsininių citrinmedžių, karčiųjų migdolų aliejais, čobrelėlių bei pipirmėčių eteriniais aliejais padeda užkurti, mažina uždegiminiu gleivinės simptomus, palaiko gleivinės drėgmę, apsaugo sudirgintą gerklę nuo isorinių žalingų veiksnių ir patogenų. Tinka ir vaikams nuo 2 metų.

-15%



**MAGNEX**

**MAISTO PAPILDAI**

Magnis – mineralas, reikalingas normaliai žmogaus organizmo veiklai. „MagNex“ asortimentą sudaro skirtingi magnio maisto papildai, pritaikyti skirtingiems vartotojų poreikiams. Vartojant rekomenduojama paros dozę, gaunama 375 mg magnio – visa suaugusiam žmogui rekomenduojama paros norma. „**MagNex 375 mg**“ – magnis magnio oksido forma (1 tablete per dieną). „**MagNex 375 mg + B6**“ – magnis magnio oksido forma, papildytas vitaminu B6 (1 tablete per dieną). „**MagNex Citrate + B6**“ – magnis magnio citrato forma, papildytas vitaminu B6 (2 tabletelės per dieną). „**MagNex Citrate + B6 Chew**“ – kramtomosios citrinų skonio tabletes su magniu magnio citrato forma ir vitaminu B6. Patogi vartojimo forma nemegstantiems įprastų tablečių ar kapsulių (2 tabletelės per dieną).

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

-30%



**UNITAL**

**MAISTO PAPILDAI**

„Unital“ sudėtyje yra 1 mg melatonino. Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojus 1 mg melatonino prieš einant miegoti). Melatoninas padeda mažinti subjektyvų laiko juostų skirtumą pajautimą (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojus ne mažiau kaip 0,5 mg prieš einant miegoti pirmą kelionės dieną ir kelias dienas po atvykimo į kelionės tikslo vietą). Vartojamas suaugusiems rekomenduojama vartoti ½–1 tablete. Dozė visada turėtų būti suvartota tuo pačiu metu vakare.

**„UNITAL“ PADEDA MAŽINTI LAIKO, REIKALINGO NORINT UŽMIGTI, TRUKMĘ!**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

**-30%**

## NEW NORDIC MULTIVITAMINAI

### MAISTO PAPILDAI

Skandinavų bendrovės „New Nordic“ multivitaminai – tai puikiai suderinti vitaminų, mineralų, mikroelementų ir augalinių ekstraktų kompleksai imunitetui ir gerai savijautai. „**Multivitamin active woman**“ – moterims, besirūpinančioms gera savijauta ir grožiu. „**Multivitamin active woman 55+**“ – vyresnių moterų organizmo poreikiams. „**Multivitamin pregnant and breastfeeding woman**“ – besilaukiančioms moterims ir žindymėms. „**Multivitamin active man**“ ir „**Multivitamin active man energy boost**“ – vyrams. Nepamiršome ir mažųjų – „**Mineralai kaulams**“, apelsinų arba mišrių uogų skonio krantmosios tabletės – kalcio, magnio ir vitamino D šaltinis augančiam organizmui. „**Multi vegan GUMMIES**“ – gaivaus vaisių ir uogų skonio multivitaminai guminukai imunitetui. Tinka visai šeimai, taip pat vegetarams ir veganams. Sudėtyje esantys vitaminai A, C, D padeda palaikyti normalią imunitinės sistemos veiklą.

### JAUSKITEŠ PUIKIAI!

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



## ESANT VIDURIAVIMUI

**4<sup>39</sup> €**



## LOPERAMIDUM WZF POLFA, 2 mg, 10 tablečių

### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veiklioji medžiaga:** loperamido hidrokloridas. **Indikacijos:** simptomini suaugusių ir vyresnių negu 12 metų paauglų ūminio viduriavimo gydymas tokiu atveju, jei negalima pašalinti viduriavimo sukėlusios priežasties. **Dozavimas:** pradžioje geriama 2 tabletės (4 mg), vėliau – po 1 tabletę (2 mg) po kiekvieno išsituštinimo nesuformuotomis išmatomis. Draudžiama per parą gerti daugiau kaip 6 tabletes (12 mg). **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas loperamidui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jaunesni negu 12 metų pacientai; paralyžinis žarnų nepažeidimas; vidurių užkietėjimas; pilvo pūtimas; organizme per mažai skysto; pseudomembraninis kolitas, kurį dažniausiai sukelia plataus poveikio antibiotikai; ūminė bakterinė dizenterija, bei kitoks bakterinis viduriavimas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** loperamido hidrokloridų gydymas pacientas turi vartoti pakankamai vandens bei mineralinių medžiagų. Šio vaistinio preparato reikia atsargiai vartoti ligoniams, kuriems yra kepenų nepakankamumas. Sergant Krono liga, loperamido hidrokloridą reikia vartoti atsargiai. Jeigu pasireiškia vidurių užkietėjimas, pilvo pūtimas ar atsiranda pirmųjų žarnyno obstrukcijos simptomų, šio vaistinio preparato vartojimą būtina nutraukti. Jeigu ligonis karščiauja bei jo išmatos yra kraują, prieš pradėdant vartoti loperamido hidrokloridą, būtina išsiaiškinti tokio viduriavimo priežastį. Vartojant loperamido hidrokloridą, gali pasunkėti šlapinimasis. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Reklamos teksto parengimo data 2025-01.

**-30%**



## „EMILI“ ŽOLELIŲ ARBATOS

Atraskite natūralų kasdienės ramybės ir geros savijautos šaltinį – „Emili“ žolelių arbatas iš kruopščiai atrinktų augalų.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

## NERVAMS, RAUMENIMS, ENERGIJAI

**-35%**

## MAGIC MAGNESIUM™

### MAISTO PAPILDAI

Jaučiatės pavargę, trūksta energijos dienos iššūkiams, norite palaikyti nervų sistemos veiklą ar papildyti organizmą magniu? „**Magic Magnesium**“™ iš „New Nordic“ gali būti tai, ko ieškojote, nes tabletėse yra gerai pasisavinamo magnio, kuris reikalingas daugybei organizmo funkcijų.  
 • „**Magic Magnesium**™ Glycinat“ – nervų sistemos veiklai palaikyti.  
 • „**Magic Magnesium**™ Malat“ – raumenims ir kaulams.  
 • „**Magic Magnesium**™ Citrat“ – nuovargiui mažinti ir energijai palaikyti.  
 • „**Magic Magnesium**™ Taurat“ – širdžiai ir kraujotakai.  
 Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą, palaikyti normalią raumenų funkciją, nervų sistemos veiklą ir energijos apykaitą. Tiaminas padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Pajūrinį pušų žievės ekstraktas padeda palaikyti normalią kraujagyslių sienelių būklę ir kraujotaką.

### „MAGIC MAGNESIUM“™ – INDIVIDUALIEMS JŪSŲ POREIKIAMS!

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



**-20%**



## DOPPELHERZ

### MAISTO PAPILDAI

Maisto papildus „Doppelherz“ gamina viena farmacinių produktų gamintojų lyderių Vokietijoje „Queisser Pharma“, todėl produktai kuriami pasitelkiant naujausius technologinius ir gamybos laimėjimus bei laikantis tarptautinių kokybės standartų. Maisto papildai „Doppelherz“ yra vieni perkamiausių Lietuvoje ir jau daugiau kaip 20 metų garantuoja savo klientams gerą savijautą.

### „DOPPELHERZ“ – DVIEJŲ ŠIRDŽIŲ JEGA!

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

**-15%**



## NUTRIDRINK, CUBITAN, FORTINI

### SPECIALIOS MEDICININĖS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAI

Turi būti vartojami prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

# Dovana sveikatai



Daugiau informacijos bei vaistinių, kuriose negalima įsigyti  
dovanų kuponų ir jais atsiskaityti, sąrašą rasite

[www.nvaistine.lt](http://www.nvaistine.lt)

**-20%****SUNSTAR GUM****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

Jau daugiau kaip 80 metų „Sunstar“ yra viena burnos ertmės higienos priemonių gamybos lyderių. GUM\* sukūrė produktų liniją vaikams su saugiu fluorido kiekiu. Fluoridas padeda dantims greičiau įsisavinti mineralus ir saugo emalį nuo rūgščių poveikio. O sudėtyje esantis izomaltas padeda efektyviau įsisavinti fluoridą.

**SVEIKOS DANTENOS, SVEIKESNIS GYVENIMAS.**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

**1+1**

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati — NEMOKAMA!!

**JORDAN**FLOSSER 3 - IN - 1, dantų siūlas, 36 vnt. **3,79 €**CLEAN BETWEEN, dantų šepetėlis, 1 vnt. **3,29 €**STEP BY STEP, dantų šepetėlis vaikams (3 - 5 m.), 1 vnt. **3,29 €**STEP BY STEP, dantų šepetėlis vaikams (6 - 9 m.), 1 vnt. **3,29 €****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

Platus dantų priežiūros priemonių asortimentas visai šeimai - nuo pirmo dantuko! Rinkitės dantų šepetėlius, pastas bei tarpdančių valymo priemones pagal savo individualius poreikius.

**„JORDAN“ RŪPINASI ŠYPSENOMIS NUO 1927-ŪJŪ!****-30%****ELMEX****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

„Elmex“ burnos higienos priemonės sukurtos siekiant užtikrinti visapusišką burnos ertmės apsaugą - nuo kasdienės priežiūros iki specializuotų sprendimų jautriems dantims ir skirtingoms amžiaus grupėms. Švelnios valomosios dalelės yra pritaikytos net jautriems dantims, todėl priemonės tinka kasdieniui, švelniai, bet veiksmingai priežiūrai. PRO-ARGIN® technologija gali padėti greitai ir veiksmingai mažinti dantų jautrumą - ji padeda sandarinti smulkius kanalėlius, vedančius į danties nervą, ir formuoja kalcio papildytą apsauginį sluoksnį, kuris veikia kaip ilgalaikis barjeras nuo dirgiklių. NEO-AMINEX® technologija gali užtikrinti dar stipresnę emalio apsaugą nuo rūgščių atakų - padeda ilgainiui mažinti emalio praradimą ir išsaugoti natūralių dantų atspalvą. Reguliariai naudojant, „Elmex“ priemonės padeda palaikyti stiprius dantis ir bendrą burnos ertmės pusiausvyrą.

**PASIRINKITE PATIKIMŪMĄ, PASIRINKITE MOKSLU PAGRISTĄ VEIKSMINGUMĄ.****PASIRINKITE „ELMEX“.**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

**1+1**

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati — NEMOKAMA!!

**TEPE**SUPREME SOFT, dantų šepetėlis (minkštas), 1 vnt. **5,99 €**DAILY, kasdieninė dantų pasta (mėtų skonio), 75 ml **6,49 €**DAILY BABY, dantų pasta vaikams, 0-6 metų (be skonio), 50 ml **6,49 €**DAILY KIDS, dantų pasta vaikams, 0-6 metų (mėtų skonio), 75 ml **6,49 €**PURE, dantų pasta jautriai-sausai burnai (be skonio), 75 ml **10,29 €**PURE, dantų pasta jautriai-sausai burnai (mėtų skonio), 75 ml **10,19 €****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

„TePe“ dantų pastos yra švelnios, su fluoru, neputojančios arba mažai putojančios, skirtos kūdikiams nuo pirmo dantuko, vaikų pieniniams dantims, suaugusiems kasdieniui ar turintiems sausą burnos gleivinę.

„TePe“ dantų šepetėlis SUPREME su dviejų dydžių šereliais. Ilgesni šereliai geriau pasiekia tarp dantų esančius nesvarumus, o trumpesni efektyviai bei švelniai nuvalo likusį danties plotą. Tinka kabų priežiūrai.

**IKI -25%****TENA****SAUSKELNĖS, ĮKLOTAI, PAKLOTAI IR KOSMETIKA**

Patikimos, odos sveikatą užtikrinančios TENA sauskelnės, įklotai ir paklotai greitai sugeria šlapimą, apsaugo nuo pratekėjimo ir nemalonaus kvapo. Papildomai naudojamos TENA odos priežiūros priemonės padeda pasirūpinti odos švara, higiena ir pragulų profilaktika.


\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

**JAUTRIŲ DANTŲ PRIEŽIŪRAI****-25%****SENSODYNE****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

SENSODYNE – jautrių dantų priežiūros ekspertas. Mūsų dantų pastos kliniškai įrodytai mažina dantų jautrumą ir kasdien saugo jūsų šypseną. Jei jaučiate dantų jautrumą, rinkitės prekės ženklą, kurio pasitiki milijonai visame pasaulyje – mėgaukitės komfortu ir sveika šypseną kasdien.

**EKSPERTO PAGALBA JAUTRIEMS DANTIMS.**


\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

**-30%** **13,29€**  
~~18,99€~~**DRICLOR**

rutulinis dezodorantas-antiperspirantas, 20 ml

**KOSMETIKOS PRIEMONĖ**

„Driclor“ antiperspirantas specialiai sukurtas apsaugoti nuo gausaus prakaitavimo. Jis sudaro gelio matricą, kuri, veikdama prakaito liaukas, mažina ir ilgainiui sustabdo prakaitavimą.

**-25%****BLEND-A-DENT****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

Fiksuojamasis dantų protezų kremas „Blend-a-dent“ – puikus pasirinkimas, jei nenorite galvoti apie savo protezus. Nesvarbu, ką darote ar valgoite, galite pasitikėti savimi, nes dantų protezai savo vietoje laikosi tvirtai ir patogiai. „Blend-a-dent“ suteikia stiprią fiksaciją visą dieną, užtikrina komfortą, sukurdamas pagalvėlę tarp dantų bei dantų protezų, ir apsaugo nuo maisto dalelių patekimo po protezus. Galite atsipalaiduoti ir mėgautis gyvenimu nesvaržydami.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

# „Noriu tik jaustis geriau“: tylūs jausmai, kuriuos sunku išgirsti

„Kaip viskas pasikeitė... Buvau sveikas ir judrus žmogus... Bendravau, dirbau, rūpinausi kitais – gyvenau... Bet atėjo laikas, kai sunkiai sergu ir nebegaliu pasirūpinti net savimi... Visos mano mintys ir veikla – tai mano būklė ir buvimas su ja. Ryte, dieną, vakare... Pasikeitė gyvenimas. Be kitų pagalbos negaliu nusiprausti... Šlapinuosi, tuštinuosi po savimi... Specifinis kvapas, nepatogu, spaudžia, peršti, skauda, drėgna... Gal kitos sauskelnės mažiau veržtų? Valgau su kitų pagalba... Norėčiau būti dažniau nuplaustas, bet slaugantiejiems nuplauti mane vonioje yra sunkus, daug jėgų reikalaujantis darbas. Slaugos patalpe norėčiau jaustis geriau, bet pats nieko padaryti nebegaliu... Nenoriu įkyrėti, ne visada pasakau, ne visada atsižvelgia... Viskas priklauso nuo kitų žmonių sprendimų, galimybių ir noro manimi pasirūpinti.“

Slaugos patalpe gulinių ligonių kasdienybėje dažnai nebėra asmeninio pasirinkimo. Slaugomasis retai pats sprendžia, kaip jis bus prižiūrimas, kas jam patogu. Sudėtingiau tuomet, kai žmogus nebegali aiškiai pasakyti, išreikšti savo pojūčių ir poreikių. Liga paveikia ne tik kūną, bet ir emocijų būklę. Priklausomybė nuo kitų, gėda dėl šlapimo ar išmatų nelaikymo, būtinybė atsisakyti ankstesnių įpročių – visa tai sukelia nerimą ir bejėgiškumą. Jei jau slaugote ar tektų slaugyti artimąjį, norėtumėte, kad slaugos patalpe gulintis artimas žmogus jaustųsi kuo geriau.

Tai nelengvas kelias – reikia kantrybės, švelnumo ir sprendimų, kurie palengvina tiek jūsų, tiek slaugomojo kasdienybę. Vienas jautriausių slaugos iššūkių yra šlapimo nelaikymas. Nuolatinė drėgmė ir trintis greitai pažeidžia jautrią, senstančią odą, sukelia sudirgimus, skausmą, atsiranda nemalonūs kvapas. Todėl svarbu naudoti kokybiškas sauskelnes, kurios gerai sugertų, patogiai priglustų ir taip apsaugotų nuo pratekėjimo ir išlaikytų odą sveiką. Net kai žmogus nebegali rinktis pats, mes galime parinkti tai, kas gražina orumą.

## Kokias savybes turi turėti sauskelnės, kad užtikrintų kokybišką šlapimo nelaikančio artimojo slaugą?

Įsivaizduokite rytą, kurį pradodate nuo labai svarbių dalykų ir vienas iš jų – sauskel-

nių keitimas. Tas pats darbas laukia dieną ir vakare. Jūsų artimasis nusipelno geriausios priežiūros, todėl reikia sauskelnių, kurios sukurtos taip, kad padėtų pasirūpinti juo kuo geriau.

„TENA Slip“ sauskelnės gali tapti tylia kasdienės slaugos pagalba išsaugant slaugomojo orumą ir gerovę. Tai lipdukais klijuojamos sauskelnės, dar vadinamos anatominėmis. Juosmens ir nugaros srityje jos turi tamprias elastines dalis, dėl kurių švelniai, bet tvirtai priglunda prie kūno ir prisitaiko prie judesių, pavyzdžiui, verčiantis ar variant ligonį. Dėl tamprių detalių sauskelnės juda kartu su kūnu, todėl išlieka savo vietoje ir taip išvengiama šlapimo pratekėjimo, o jų medžiaga neveržia, nespaudžia, netrina gležnos odos. Gerai sukimbantys lipdukai leidžia atsegti ir užsegti sauskelnes tiek kartų, kiek reikia, ir taip reguliuoti jų užsegimą, kol bus užsegtos tinkamai ir ligonis jausis patogiai.

Dar viena itin svarbi „TENA Slip“ savybė yra greitas sugėrimas. Ji užtikrina, kad nebūtų pratekėjimų ir patalynė išliktų sausa – nereikės jos vėl ir vėl keisti ir skalbti. O svarbiausia, kad dėl greito sugėrimo ir šlapimo sulaikymo sauskelnių viduje odos paviršius išliks sausas ir apsaugotas nuo drėgmės sukeltų nemalonių odos pažeidimų ir pragulų. Galite būti tikri, kad jūsų artimojo oda išliks apsaugota ir prižiūrėta.

Slaugant ligonį namuose, viena dažniausių problemų gali būti kambaryje tvyrantis

šlapimo kvapas, kuris dažnai atsiranda dėl nuolatinės drėgmės. „TENA Slip“ turi efektyvią kvapo kontrolės sistemą, neleidžiančią atsirasti nemaloniui kvapui ir padedančią išlaikyti jaukią, švarią ir orią aplinką tiek slaugomam žmogui, tiek artimiesiems, su kuriais jis gyvena.

Galiausiai mažas, bet labai naudingas pagalbininkas yra drėgmės indikatorius. Tai ant išorinės pusės per visą sauskelnių ilgį einanti juostelė. Tiesiog reikia stebėti, kada ji visa iš geltonos tampa mėlyna: tai parodo, kad sauskelnės jau tikrai pilnos. Stebint indikatorius išvengiama bereikalingo keitimo. Tai taupo laiką ir pinigus, o artimajam suteikia daugiau komforto.

Slaugos patalpe gulintys ligoniai dažnai turi kitų, gretutinių ligų, vartoja daug vaistų ir patiria sunkų šlapimo nelaikymą. Praktika rodo, kad sunkius ligonius prižiūrintys artimieji dažniausiai renka daug sugeriančias anatomines sauskelnes „TENA Slip“: „TENA Slip Maxi“ (M arba L dydis), „TENA Slip Super“ (XL dydis). Kompensuojamųjų priemonių sąrašė jos patenka į didžiausio sugėrimo grupę „Pagal sugeriamą tūrį daugiau kaip 2500 ml“.

## Sauskelių kompensavimas

Šlapimą ir išmatas sugeriančios sauskelnės yra kompensuojamos. Kreipkitės į šeimos gydytoją dėl kompensuojamųjų priemonių paskyrimo. Jeigu jūsų slaugomasis yra sulaukęs 75 metų arba turi negalią ir gauna mažai draudžiamųjų pajamų, arba yra sulaukęs senatvės pensijos amžiaus ir gauna mažai draudžiamųjų pajamų, sauskelnes gausite be priemokos.

Slauga visada bus iššūkis, reikalaujantis kantrybės, stiprybės ir žmogiško jautrumo. Rūpestis slaugos patalpe prasideda nuo supratimo. Kai žmogus nebegali pasirinkti pats, mes galime parinkti jam tai, kas padeda jaustis geriau.



## „TENA SLIP“ ANATOMINĖS SAUSKELNĖS MES GIRDIME TYLIUS SLAUGOMOJO POREIKIUS

„TENA Slip“ sauskelnės kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašė grupėje pagal sugeriamą tūrį daugiau kaip 2500 ml: „TENA Slip Maxi“ M ir L dydžiai ir „TENA Slip Super“ XL dydis.





# Grožiui, jai

Veidui



-25%

## BIODERMA

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Prancūzijos dermatologijos laboratorija „Bioderma“ vadovaujasi pozitūriū, kad odos priežiūros priemonės turi padėti atkurti natūralius biologinius procesus, šalindamos odos problemų kilmės priežastis bei simptomus. Priežiūros priemonės „Bioderma“ kuriamos tik iš grynų veikliųjų medžiagų, atliekančių svarbų vaidmenį odos veikloje.

„NAOS“ EKOLOGIOLGIJA – DERMATOLOGIJOS ESMĖ.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

Perkant drėkinamąjį veido kremą, veido serumui

-60%



## ZIEDĖ

drėkinamasis veido kremas su hialurono rūgštimi, 50 ml **19<sup>99</sup> €**  
drėkinamasis veido serumas su hialurono rūgštimi, 30 ml **19<sup>99</sup> €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS



IKI -30%

## SVR

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Laboratoire SVR“ yra dermatologinė laboratorija, kurios misija - atkurti odos grožį aktyviomis, bet gerai toleruojamomis formulėmis. Net itin jautriai veido odai pritaikyta kosmetika padeda palaikyti odos drėgmę, komfortą ir minkštumą.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-30%



## INTIMOHELP

MEDICINOS PRIEMONĖS

**Makšties tabletės „Intimo help“** atkuria ir palaiko fiziologinį makšties pH, slopina bakterijų plitimą. Priemonės sudėtyje esantis inulinas skatina natūralios bakterinės floros augimą, sugeria pagausėjusias išskyras, naikina blogą kvapą. Sudėtyje yra inulino, hialurono rūgšties ir vitamino E. Naudojimo instrukcija: naudokite po 1 makšties tabletę vieną kartą per parą.

**Intymios higienos emulsija „Intimo help“** su rožių vandeniū ir hialurono rūgštimi padeda atkurti natūralią mikroflorą. Sudėtyje yra pieno rūgšties ir prebiotikų. Rožių vanduo veikia antiseptiškai ir raminamai. Nedidelį kiekį emulsijos užtepti ant rankos, nuplauti intymias vietas, paskui nuskalauti šiltu vandeniu.

**Drėgnos intymios higienos servetėlės „Intimo help“** su alavijų lapų ekstraktu ir D-pantenoliu švelniai valo ir nedirgina odos, užtikrina optimalią higieną bet kokiomis aplinkybėmis.

„INTIMOHELP“ – MOTERS INTYMIOS SVEIKATOS RECEPTAS.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-70%

Antrai bet kuriai pakuotei



## HI GENIE!

BACTOR PROTECT, 7 makšties ovulės po 2 g **11<sup>29</sup> €**  
HYDRA INTENCE, 7 makšties ovulės po 2 g **11<sup>29</sup> €**

MEDICINOS PRIEMONĖS

-30%



## FORCAPIL

MAISTO PAPILDAI, KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Forcapil“ – tai pažangios plaukų ir nagų priežiūros priemonės iš Prancūzijos, jungiančios mokslą ir natūralių ingredientų galią. „Forcapil“ išskirtinumas – jų sudėtyje, kuriose derinami vitaminai, mineralai, augalų ekstraktai ir didelė dozė sieros turinčių aminorūgščių, kas juos plaukai taptų gražūs ir gyvybingi.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-30%



## AMEDIPLUS

Lūpas apsaugantis balzamas su pantenoliu, 4,5 g **5<sup>58</sup> 3<sup>91</sup> €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Intymiai higienai

-30%



## LACTACYD

LACTACYD PHARMA intymios higienos prausiklis su prebiotikais, 250 ml **14<sup>08</sup> 7<sup>76</sup> €**  
LACTACYD CLASSIC intymios higienos prausimosi losjonas kasdieniam naudojimui, 200 ml **14<sup>08</sup> 10<sup>17</sup> €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

LACTACYD® intymios higienos prausikliai yra specialiu produktų, praturtintų natūraliais aktyviais ingredientais, grupė, skirta kasdieni intymiai higienai. Sudėtyje esanti natūrali L-pieno rūgštis bei tinkamas pH – švelniai intymios zonos natūralios pusiausvyros atstatymui ir apsaugai. Iš plataus LACTACYD® asortimento paprasta išsirinkti sau tinkamiausią priemonę: prausiklis su PREBIOTIKAIS stiprina natūralią mikroflorą; prausimosi losjonas – skirtas normaliai odai, sukurtas harmoningai dirbti su Josų kūnu.



IKI **-50%**



## PREGNACARE

### MAISTO PAPILDAI

„Pregnacare“ – maisto papildų linija, sukurta mitybai papildyti planuojant nėštumą, nėštumo bei žindymo laikotarpiams. „Pregnacare Him&Her“ – sukurta paslojimą planuojančiai porai. „Pregnacare“ – vitaminų ir mineralų kompleksas, rekomenduojamas nuo pirmojo nėštumo mėnesio. „Pregnacare Plus“ papildyta omega-3 riebalų rūgštimis (DHR ir EPR). „Pregnacare Breast Feeding“ pritaikyta žindymo laikotarpiui, sudėtyje papildyta kalciumu ir omega-3. „Pregnacare New Mum“ sukurta mamų tyčių grožiui ir energijai palaikyti.

### TVIRTAI KŪDIKIO IR MAMYTĖS DRAUGYSTEI!

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

IKI **-40%**



## AMBIO KIDS

VITAMINAS C, 60 guminukų **4,3<sup>99</sup> 8<sup>33</sup> € -40 %**  
 BRONCHO COMPLEX, 150 ml **8<sup>49</sup> 5<sup>99</sup> € -40 %**  
 GERKLEI SU ČIOBRELIU, 6 aviečių skonio ledinukai **5<sup>28</sup> 3<sup>89</sup> € -35 %**

### MAISTO PAPILDAI

**1+1**

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



## JAMIESON

KIDS MULTI, 60 kramtomųjų tablečių **16<sup>99</sup> €**

### MAISTO PAPILDAI

Sudėtyje yra ne tik vitaminų, bet ir mineralų: kalcio, vario, jodo, geležies.  
 4 skirtingų formų ir skonio kramtomos tabletės: vyšnių, apelsinų, vynuogių bei braškių.  
 Tik viena tabletė per dieną.  
 Pakuotės užtenka dviem mėnesiams.  
 Tinka vaikams nuo 3 metų.

**1+1**

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMAI!

### Moterims



## DIFOLIN

DIFOLIN, 60 tablečių **9<sup>99</sup> €**  
 DIFOLIN+, 30 kapsulių **19<sup>29</sup> €**

### MAISTO PAPILDAI

„Difolin+“ – moters gerai savijautai: hemoglobiniui, energijai, nervams, imunitetui. Mikrokapsuluota liposomose geležis + folio rūgštis + vitaminai B12, D3, C + varis. „Difolin+“ sudėtyje naudojama mikrokapsuluota liposomose geležis yra efektyviai pasisavinama organizmo, neturi geležies poskonio, nedirgina virškinimo trakto, neturi sąveikos su maistu. Geležis, folio rūgštis, vitaminas B12 – vieni būtinausių kraujo gamybai elementų. Vitaminas B12 padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, geležis – hemoglobino susidarymą, foliatų – kraujodarą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, varis – nervų sistemos veiklą, geležis, varis, vitaminai C, B12 – energijos apykaita.  
 „Difolin+“ – planuojančioms pastoti, nėščiosioms, žindančioms moterims: folio rūgštis + vitaminas D3. Folio rūgštis padeda palaikyti normalią kraujodarą, mažinti nuovargį. Mažas foliatų kiekis nėščiosios kraujo eritrocituose yra besivystančio vaisiaus nervinio vamzdelio defektų rizikos veiksnys. Teigiama poveikis atsiranda per parą papildomai suvartojant 400 µg folio rūgšties ne trumpiau kaip vieną mėnesį iki pastojimo ir iki trijų mėnesių po jo. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, dalyvauja ląstelių dalijimosi procese.

„DIFOLIN“ – MAISTO PAPILDAI MOTERIMS.

## GAMINAME VAISTUS PAGAL INDIVIDUALIUS RECEPTUS

- Atneškite gydytojo receptą iki 13 val.
- Atsiimkite pagamintą vaistą kitą darbo dieną.

**VAISTINĖ**  
 VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS



# LAIMĖS VALANDOS

I II III IV V VI

**8-9 val.**  
ir  
**14-15 val.\***

VII

**14-15 val.\***

Perkant **3\*** ir daugiau prekių

**-30%**

Perkant **2\*** prekes

**-25%**

Perkant **1** prekę

**-20%**

\*Nuo 2023 m. spalio 23 d. NORFOS vaistinėje akcijos LAIMĖS VALANDOS metu perkant 1 prekę taikoma 20 % nuolaida, perkant 2 prekes – 25 % nuolaida, vaistams – 20 % nuolaida, o įsigyjant 3 ir daugiau prekių – 30 % nuolaida, nereceptiniams vaistams – 25 %, receptiniams – 20 % nuolaida.

Taikomos momentinės 20 % dydžio nuolaidos receptiniams vaistams, 20 ar 25 % nuolaidos nereceptiniams vaistams ir vaistiniams preparatams, o kitoms prekėms – 20, 25 arba 30 % nuolaidos, atsižvelgiant į atitinkamo pirkimo metu įsigyjamų prekių bendrą kiekį. Nuolaida taikoma perkant pilnas prekių pakuotes, kurių kiekvienos vertė arba priemoka ne mažesnė nei 1,50 euro. Prekės, perkamos su kompensuojamuoju receptu, įskaičiuojamos į įsigyjamų (perkamų) prekių krepšelį (kiek), tačiau joms nuolaida netaikoma.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaidos netaikomos perkant su kompensuojamuoju receptu, mokant už skiepus, taip pat pradinio maitinimo pieno mišiniams, kartiniams (gaminamiems vaistinėje) ir vardinams vaistams, įsigyjant dovanų kuponus, pakavimo maišelius. Nuolaidos netaikomos perkant [www.gintarine.lt](http://www.gintarine.lt), net jei už prekes atsiskaitoma jas atsiimant vaistinėse. Nuolaidos netaikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Visos nuolaidos galioja tik su PC NORFA lojalumo kortele.

Informaciją apie kitu nei nurodyta laiku vykstančias LAIMĖS VALANDAS rasite [www.nvaistine.lt](http://www.nvaistine.lt). Informacija apie kitas akcijas ir prekes, kurioms netaikomos akcijos LAIMĖS VALANDOS nuolaidos, suteikiama kiekvienoje vaistinėje, el. paštu [info@nvaistine.lt](mailto:info@nvaistine.lt) arba nemokamu tel. +370 800 10008.

 **VAISTINĖ**