

TOP BIRŽELIO PASIŪLYMAI




-50%



AMBIO
MAGNIO CITRATAS miteliai geriamajam tirpalui, 30 paketėlių **44⁹⁹ 6⁰⁰ €**
MAISTO PAPILDAS

-50%



AMBIO
VITAMINAS D3 4000IU 120 minkštųjų kapsulių **26⁹⁸ 13⁴⁹ €**
MAISTO PAPILDAS

-50%



ECOSH
BIOAKTYVI GELEŽIS FERROCHEL 90 kapsulių **24⁹⁹ 12⁵⁰ €**
MAISTO PAPILDAS
„ECOSH Geležis“ – tai aukštos kokybės maisto papildas su patentuotos bioaktyvios formos geležies bisglucinatų „Ferrochel“[®]. 1 kapsuleje yra 135 mg geležies bisglucinato (iš kurio elementinės geležies – net 27 mg). Maisto papildas taip pat yra papildytas vitaminu C.

IKI -50%



MAGVIT
MAISTO PAPILDAS
„Magvit“ – Jūsų magnio šaltinis!
„Magvit Platinum“ – greitas ir ilgalaikis poveikis. Tabletė magnį į organizmą išskiria trimis skirtingomis fazėmis ir leidžia magniui greitai ir ilgai veikti. Tik 1 tabletė per parą.
„Magvit Plus“ – taikant specialią ilgalaikio veikimo Depo formulę, vitaminai ir magnis išskiriami daugelį valandų. Tik 1 tabletė per parą.
„Magvit B Complex“ – greitas poveikis dėl burnoje tirpstančios formos, tinka vartoti fizinio krūvio metu. Suaugusiems ir vaikams nuo 12 m. – gerti po 1 paketėlį per dieną.
„Magvit Go“ – greitas ir efektyvus poveikis dėl skystos formos. Organinės formos magnio citratą organizmas geriau įsivaina. Naudojimas: suaugusiems ir paaugliams nuo 14 m. gerti 1 buteliuką per dieną.
Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją ir kartu su vitaminais B2, B6 ir B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Magnis, biotinas ir niacinas padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. Tiaminas padeda palaikyti normalią širdies veiklą.
„MAGVIT“ – RAUMENIMS, NERVŲ SISTEMAI, ENERGIJAI!

*Aikcia laikoma geltona etikete pažymėtomis priemonėms

1⁹⁹ €



OMEPRAZOLE ZENTIVA
20 mg, 14 kietųjų kapsulių

GREITO ATPALDAVIMO NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Kiekvienoje kietojoje kapsuleje yra 20 mg omeprazolo. **Terapinės indikacijos.** „Omeprazole Zentiva“ vartojamas trumpą laiką suaugusių žmonių refluksio simptomams (pvz., rėmeniui ir rūgšties atpylimui) gydyti. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Rekomenduojama dozė yra viena 20 mg kapsulė 1 kartą per parą ne ilgiau kaip 14 parų. Jei po šio laikotarpio simptomai neišnyksta, kreipkitės į gydytoją. Kad sumažėtų simptomai, gali tekti kapsulių vartoti 2–3 paras iš eilės. Daugumai pacientų rėmuo visiškai palengvėja per 7 dienas. Kai simptomai visiškai išnyksta, turite nustoti vartoti „Omeprazole Zentiva“. Vartoti tuščiui skrandžiui, kiekvieną dieną tuo pačiu laiku. Kapsules nuryti nepažeistas, užsigeriant puše stiklinės vandens, jų kramtyti ar atidaryti negalima, nes tai gali pakenkti vaisto veikimui. **Kontraindikacijos.** „Omeprazole Zentiva“ vartoti negalima esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai, benzimidazolo dariniams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Omeprazole, kaip ir kitų protonų siurblio inhibitorių, draudžiama vartoti kartu su nelfinaviru. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Omeprazole Zentiva“ nėra skirtas vaikams ir jaunesniems kaip 18 m. paaugliams. Nevartokite vaisto ilgiau kaip 14 parų, nepaskonsultavę su gydytoju. Jei būklė nebegerėja ar simptomai pasunkėja, kreipkitės į gydytoją. Pacientams draudžiama vartoti omeprazolo profilaktiškai. **Reklamams teksto parengimo data 2025-08. ID:000785487**

-50%



STARAZOLIN
MEDICINOS PRIEMONĖS
Drėkinamojo, raminamojo ir apsauginio poveikio akių lašai.
„Starazolin sausoms ir sudirgusioms akims“ (be konservantų) – akių lašai, skirti padėti sumažinti simptomus, esant lengvam ar vidutinio sunkumo sausų akių sindromui ir (arba) sudirgintam akies paviršiui. Jie greitai palengvina nemalonius pojūčius, tokius kaip sausumas, smėlio pojūtis, niežėjimas, ašarojimas ar akių nuovargis, kuriuos sukelia darbas kompiuteriu, vėjas, saulė ar kontaktinių lęšių nešiojimas. „Starazolin Hydroforte“ (be konservantų) – intensyviai drėkinantys akių lašai, skirti vartoti esant sunkiam sausų akių sindromui, kai jaučiamas stiprus sausumas, aštrus dirginimas ar diskomfortas po chirurginių intervencijų, ilgai dirbant kompiuteriu ar esant sausam orui. „Starazolin Lipid Multi Balance“ (be konservantų) – drėkinamieji akių lašai, skirti visų tipų sausų akių simptomams palengvinti. Jie atkuria ir stabilizuoja lipidinį ir kitus ašarų plėvelės sluoksnius, optimaliai drėkina akies paviršių. Ypač tinka, kai yra ryšius akių traškanojimas, vokų sulipimas. „Starazolin BlueLight Protect“ (be konservantų) – akių lašai, drėkinantys ir saugantys akis nuo UV spindulių ir mėlynosios ekrano šviesos poveikio. Tinka daug laiko praleidžiant prie ekranų arba lauke. „Starazolin sausoms ir sudirgusioms akims“, „Starazolin Lipid Multi Balance“, „Starazolin Hydrobalance PPH“ ir „Starazolin BlueLight Protect“ gali vartoti žmonės, naudojančius visų tipų kontaktinius lęšius. Prieš vartojant „Starazolin HydroForte“ reikia išimti kontaktinius lęšius. Įprasta dozė – 1–2 lašai 3 kartus per parą į kiekvienos akies jungines maišelis.

*Aikcia laikoma geltona etikete pažymėtomis priemonėms



-50 % pigiau



-50 %

AMBIO
GERKLEI SU ISLANDINE KERPENA IR EUKALIPTU 20 čiulpiamųjų tablečių **6⁹⁹ 3³⁵ €**
MAISTO PAPILDAS

Energijai,
imuninei sistemai,
atsigavimui po
vakarėlio

-50 %



GREENIFY

MAISTO PAPILDAI

„GREENIFY“ – tai, ko reikia grožiui ir gerai savijautai: išgryninta sudėtis, efektyvus įsisavinimas ir patikima kokybė. Be pridėtinio cukraus ir kitų nereikalingų priedų. Sveiklaus poveikio virškinimo sistemai.

- Odos švytėjimas ir grožis – rinkitės „Collagen Beauty Shots“
- Greitas užmigimas ir kokybiškas miegas – išbandykite „Deep Sleep Shots“
- Sąnariai ir lengvas judesys – „Collagen Joints Shots“
- Atmintis, gyvybingumas, nervų sistema – atraskite „Brain Booster Shots“

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

-50 %



EPITOME
EYE'S FORMULA 30 minkštųjų kapsulių **45⁹⁹ 8⁰⁰ €**
VITAL OMEGA-3 90 minkštųjų kapsulių **26⁹⁹ 13⁴⁹ €**
MAISTO PAPILDAI

Gerklei

-50 %



HERBITASSIN®

MAISTO PAPILDAI, MEDICINOS PRIEMONĖ, MAISTAS

„Herbitassin“™ įvairių skonių pastilės bei ledinukai su augaliniais ekstraktais ir vitaminu C – gerkliai ir imuniteiui. Islandinės kerpenos padeda palaikyti normalią gerklės ir balso stygų funkciją, vitaminas C – normalią imuninės sistemos veiklą. „Herbitassin“™ Iceland moss HYDRO™ pastilės su hialuronu drėkina gerklės gleivinę, ramina gerklės skausmą, mažina sauso kosulio ir užkimo simptomus.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

-50 %



AMBIO
VITAMINAS C SU CITRUSINIŲ VAISIŲ BIOFLAVONOIDAIS 30 tablečių **9⁹⁹ 5⁰⁰ €**
MAISTO PAPILDAS

-50 %



ARTHROSTOP PROENZI

MAISTO PAPILDAI

„Arthrostop Proenzi Collagen Shots“ – unikali dviejų tipų kolageno, vitaminų ir mineralų kombinacija sąnariams. Net 11 000 mg hidrolizuoto ir 20 mg nedenažuoto II tipo kolageno viename buteliuke! Naujiena – juodųjų serbentų skonio.

„Arthrostop Proenzi Intensive“ tabletės – sąnariams su gliukozaminu, chondroitinu, bosveljų žievės ekstraktu ir II tipo kolageno. Tik 1 tabletė per dieną!

„Arthrostop Proenzi Rapid“ tabletės – kompleksas su gliukozaminu, chondroitinu, bosveljų žievės ekstraktu sąnariams.

„Arthrostop Proenzi PLUS“ tabletės – sąnariams su MSM, gliukozaminu ir bosveljų žievės ekstraktu, kuris padeda palaikyti sąnarių lankstumą bei bendrą sąnarių funkciją. 2603_SB_Proenzi_V01_LT

JUDEK LAISVAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis



NUO 2⁴⁹ €

NUROFEN 200 mg, 12 tablečių 2⁴⁹ €
NUROFEN FORTE 400 mg, 12 tablečių 3⁴⁹ €
NUROFEN FORTE EXPRESS 400 mg, 12 tablečių 3⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

NUROFEN dengtoje tablete yra 200 mg ibuprofeno. **NUROFEN FORTE** ir **NUROFEN FORTE EXPRESS** dengtoje tablete yra 400 mg ibuprofeno. **Terapinės indikacijos.** Trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių, mėnesinių sukulto skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. **NUROFEN dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams pradinė dozė yra 2 tabletės, užgeriant vandeniu. Po to, jei reikia, gerti po 1-2 tabletes kas 4 valandas. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 6 tabletes (1200 mg). **NUROFEN FORTE** ir **NUROFEN FORTE EXPRESS dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams pradinė dozė yra 1 tabletė, užgeriant vandeniu. Po to, jei reikia, gerti po vieną tabletę kas 8 valandas. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 3 tabletes (1200 mg). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai; buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; kraujavimas iš smegenų, virškinimo trakto arba kitoks kraujavimas; jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai.** Reikia atsargiai vartoti pacientams, kuriems yra sisteminė raudonai vilkligė; anksčiau buvo padidėjęs kraujospūdis ir (arba) širdies nepakankamumas; jei yra nesunkus inkstų pakenkimas ar inkstų funkcijos pablogėjimas; jei yra nesunkus kepenų funkcijos sutrikimas; pacientams, kurie sirgo opiniu kolitu, Krono liga; pacientams, kurie vartoja kraują stynkiančių vaistinių preparatų bei vaistų, galinčių padidinti išopėjimo ar kraujavimo pavojų. Gydyant ibuprofenu buvo pranešta apie sunkias odos reakcijas, įskaitant ekzfoliacinį dermatitą, daugiaformę eritemą, Stiveno-Džonsono sindromą, toksinę epidermio nekrolizę, vaisto sukeltą reakciją bei eozinofiliją ir sisteminės simptomais (VRESS), ūminę generalizuotą egzantemine pustulozę (UGEP), kuri gali būti pavojinga gyvybei arba mirtina. Jei atsiranda šių reakcijų požymių ir simptomų, ibuprofeno vartojimą reikia nedelsiant nutraukti. Šie vaistai gali būti susiję su nedideliu širdies priepuoliu ("miokardo infarkto") ar insulto pavojaus padidėjimu. Šie vaistiniai preparatai gali maskuoti infekcijos simptomus, dėl to gali būti vėluojama pradėti tinkamą gydymą, o tai gali pabloginti infekcijos gydymo rezultatus. Šių vaistų negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Kiekvienoje tablete yra natrio, būtina atsižvelgti, jei kontroliuojamas natrio kiekis maiste. Reklamos tekstas parengtas 2026-03-18.

Nuo alergijos

4⁴⁹ €



CETIRIZIN ACTAVIS
10 mg, 10 dengtųjų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje plevėle dengtoje tablete yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** suaugusiems žmonėms ir 6 m. amžiaus bei vyresniems vaikams cetirizinas vartojamas sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito simptomams (nosies ir akių) palengvinti bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės simptomams palengvinti. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** 6-12 m. vaikams: 5 mg (pusė tabletes) 2 kartus per parą; suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams: 10 mg (1 tabletė) 1 kartą per parą. Esant inkstų funkcijos sutrikimui, dozė reikia mažinti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, hidroksiziniui arba bet kuriam piperazino dariniui. Pacientams, sergantiems sunkia lėtine inkstų liga, kai reikalingos dializės. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarite su gydytoju ar vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Cetirizin Actavis“; jeigu sergate inkstų nepakankamumu (jei būtina, Jums reikės vartoti mažesnę vaisto dozę. Reikalinga dozė nustatys gydytojas); jeigu turite šlapimoimo problemų (tokių kaip nugaros smegenų problemų arba prostatos ar šlapimo pūšies problema); jei sergate epilepsija ar Jums gali būti traukuliai. Kartu su „Cetirizin Actavis“ vartoti alkoholio nerekomenduojama, kaip ir su kitais antihistaminiais vaistais. Dėl sudėtyje esančios laktazės Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-01. OTC-UL-00089

Pagalba nuo viduriavimo

4³⁹ €



LOPEDIUM EXPRESS 2 mg, 10 kietųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje kapsulėje yra 2mg loperamido hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** simptominis suaugusiųjų ir vyresnių kaip 12 metų paauglių ūminio viduriavimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** iš pradžių reikia gerti 2 kapsules, vėliau (po kiekvieno išsistūtinimo beformėmis išmatomis) – po 1 kapsulę. **Kontraindikacijos:** nevartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliajai ar pagalbinei medžiagai, jeigu yra bakterijų sukeltas žarnyno uždegimas. **Specialūs įspėjimai:** jei per 48 val. po vaisto išgerimo viduriavimas nesusilpnėja, jo vartojimą reikia nutraukti ir kreiptis į gydytoją. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, Vilnius LT-01828, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. Elpaštas: info.lithuania@sandoz.com. BS2601069674. Reklamos teksto parengimo data: 2026 01 06.



2⁴⁹ €

PARACETAMOL ACTAVIS

500 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tablete yra 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos.** Trumpalaikis karščiavimo mažinimas. Lengvo ir vidutinio stiprumo skausmo (pvz., galvos, dantų, sąnarių, raumenų, mėnesinių) malšinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems: įprastinė dozė yra 500-1000 mg kas 4-6 val. pagal poreikį. Didžiausia paros dozė yra 3 g, didžiausia vienkartinė – 1000 mg. „Paracetamol Actavis“ saugumas ir veiksmingumas vaikams, sergantiems iki 50 kg, neištyrti. Pacientams, kurie nuolat vartoja alkoholi, intervalas tarp dozių vartojimo turi būti bent 8 val. Jiems negalima viršyti 2 g paros dozės. Jeigu praėjus daugiau kaip 3 paroms nuo gydymo pradžios didelis karščiavimas ar infekcijos požymiai išlieka arba jeigu praėjus daugiau kaip 5 paroms nuo gydymo pradžios skausmas išlieka, pacientai reikia iširti dėl simptomų sukėlusios priežasties. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Ilgalaikis arba dažnas vartojimas yra gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės trūkumas, hemolizė anemija ar dehidratacija, sergantiesiems astma, piktnaudžiaujantiems alkoholiu arba nuolat blogai besimaityantiems, paracetamolio vartojama vartoti atsargiai. Po ilgalaikio (3 mėn.) gydymo, kurio metu paracetamolio buvo vartota kas antra parą arba dažniau, gali pasireikšti arba sustiprėti galvos skausmas. Pacientams, kuriems nustatytas mažas glutatono kiekis, paracetamolio vartojimas gali didinti metabolinės acidozės riziką. Dėl sudėtyje esančios laktazės šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. „Paracetamol Actavis“ sudėtyje yra kviečių krakmolo. Tinka sergantiems celiakija. Šio vaistinio preparato negalima vartoti kviečiams alergiškiems pacientams (ši liga skiriasi nuo celiakijos). **Teksto peržiūros data** 2025-01-02. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-04-04. OTC-UL-00094

Nuo skausmo

4⁴⁹ €



METAFENEX 200 mg/500 mg, 10 plevėle dengtųjų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Kiekvienoje plevėle dengtoje tablete yra 200 mg ibuprofeno ir 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos.** „Metafenex“ skirtas trumpalaikiam lengvo ar vidutinio stiprumo skausmui, siejamam su migrena, galvos skausmu, nugaros skausmu, mėnesinių skausmu, dantų skausmu, reumatininiu bei raumenų skausmu, nestipriu artrito skausmu, peršalimo ir gripo simptomais, gerklės (ryklės) skausmu bei karščiavimu, malšinti. Šis vaistinis preparatas ypač tinka skausmui, kuriam reikia stipresnės analgezijos nei vartojant vien ibuprofeną ar paracetamolį. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems gerti po 1 tabletę ne dažniau kaip 3 kartus per parą valgio metu užgeriant vandeniu. Tarp dozių išlaikyti ne mažiau kaip 6 valandų tarpą. Jei, vartojant po 1 tabletę, simptomai neišnyksta, daugiausia galima vartoti po 2 tabletes ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių per bet kurį 24 valandų laikotarpį. „Metafenex“ negalima vartoti ilgiau kaip 3 dienas. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų asmenims. **Kontraindikacijos.** Šio vaistinio preparato vartoti negalima pacientams, kuriems yra padidėjęs jautrumas ibuprofenui, paracetamolui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio ar kitų NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius ir didesnes kaip 75 mg acetilsalicilo rūgšties paros dozes; jei anksčiau buvo padidėjusio jautrumo reakcijų, susijusių su acetilsalicilo rūgštimi arba kitais nesteroidiniais vaistais; jei yra anksčiau buvę aktyvi arba buvusi pasikartojanti pėptinė opa; buvo ar yra virškinimo trakto išopėjimas ir (arba) ar jo prakurimas ar kraujavimas, susijęs su ankstesniu gydymu NVNU. Pacientams, kuriems yra kraujo krešėjimo sutrikimų; kuriems yra sunkus kepenų, inkstų arba širdies nepakankamumas. Negalima vartoti paskutinio nėštumo trimestro metu. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Būtinai ypatingas atsargumas: jei pacientas serga infekcine liga, pacientas yra senovo amžiaus; serga ar anksčiau sirgo astma; yra inkstų, širdies, kepenų arba žarnyno sutrikimas; serga sisteminė raudonajai vilkligė; yra virškinimo trakto sutrikimų arba lėtinė uždegiminė žarnyno liga; pacientė neščia pirmuosius 6 nėštumo mėnesius arba žinda. Reklamos teksto parengimo data 2026.02.

SKAUSMĄ KEISKI „METAFENEX“!



4⁹⁹ €

ALMAGEL A geriamoji suspensija, 170 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

5 ml geriamosios suspensijos yra 340 mg aliuminio hidroksido (atitinka 218 mg aliuminio oksido), 109 mg magnio hidroksido (atitinka 75 mg magnio oksido) ir 109 mg benzokaino. **Terapinės indikacijos.** Virškinimo trakto sutrikimų, susijusių su skrandžio rūgšties pertekliumi, tokių kaip rėmuo, rūgšties skrandžio netalavimas, skrandžio ar dvilypkarištes žarnos opa, simptominių gydymas 14 m. arba vyresniems paaugliams ir suaugusiems žmonėms. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems, atsivėlgiant į ligos sunkumą, 3-4 kartus per dieną (30 min. prieš valgį ir vakare prieš miegą) gerti po 1-3 pilnus dozavimo šaukštėlius (1 šaukštelyje yra 5 ml). Jei yra dvilypkarištes žarnos opa ir kai kurių formų skrandžio opa (prievarčio opa), „Almagel A“ galima gerti tarp valgių. Prieš vaistų, dirginančių virškinimo traktą, vartojimą profilaktikai reikia išgerti 1-2 pilnus dozavimo šaukštėlius „Almagel A“. Vaistinio preparato rekomenduojama vartoti ne ilgiau kaip 12 parų. Jei inkstų funkcija sutrikusi, atsivėlgiant į sutrikimo laipsnį, suspensijos reikėtų gerti rečiau arba mažesnę dozę. Prieš vartojimą buteliuką reikia stipriai pakratyti. Preparato skiešti nerekomenduojama. Išgerus suspensijos, 30 min. negalima gerti skystųjų. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosios arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Fruktozės netoleravimas (nes sudėtyje yra sorbitolio). Hipofosfatemija. Sunkus inkstų funkcijos nepakankamumas (Kreatinino klirensas yra mažesnis kaip 30 ml/min.). Alzheimerio liga. Pacientams jaunesniems nei 14 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Almagel A“ nerekomenduojama vartoti, jei yra nuolatinis vidurių užkietėjimas, ūminio apendicito simptomai, metabolinė alkalozė, kepenų cirozė, sunkus slazinis širdies nepakankamumas, nešlumo toksikoze, opinis kolitas, divertikuliozė, kolostomija ar ileostomija, inkstų funkcijos sutrikimas, lėtinis viduriavimas. Vaistas gali sunkinti hemorojus sukeltus negalavimus. Pagyvenusiems pacientams gali pasunkėti kaulių ir sąnarių ligos bei Alzheimerio liga. Vaistinio preparato vartoti ilgiau negu 2 savaites galima tik prižiūrint gydytoją. Sudėtyje yra parahidrobenzozato darinių, kurie gali sukelti alerginių reakcijų, įskaitant uždelstas alergines reakcijas. Sudėtyje yra etanolio, dėl kurio pacientams, sergantiems kepenų, smegenų ligomis, epilepsija ir alkoholizmu, bei nėščioms moterims ir jaunesniems nei 14 m. vaikams gali atsirasti pavėžimui. „Almagel A“ nepatariama vartoti kartu su alkoholiu ir maistinėmis rūgštimis (citrinu, acto ir kt.), nes jos neutralizuoja vaistinio preparato veikimą anestezijai poveikį. Tarp „Almagel A“ ir kitokių vaistų vartojimo reikia daryti ne trumpesnę kaip 1-2 val. pertrauką. Dėl sudėtyje esančio benzokaino vartoti ilgiau kaip 10-12 parų nepatariama. Vaikams benzokainas gali sukelti metemoglobinemiją. **Teksto peržiūros data.** 2023-04-03. **Reklamos teksto parengimo data.** 2025-11. OTC-UL-000102

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMAI!



ACONITUM

MAISTO PAPILDAS

ACONITUM nuo 1999 metų kuria ir gamina augalinius vaistus, maisto papildus ir biomedicininis preparatus. Kiekviena formulė gimsta iš žinių, patirties ir atsakingo požiūrio į žmogaus sveikatą, o kokybę užtikrina griežti Genos gamybos praktikos (GMP) standartai ir nuosekli žaliavų kontrolė.

AUKŠTOS KOKYBĖS LIETUVIŠKI PREPARATAI, KURIUOS SUKŪRĖME JUMS

*AKCIJA TAIKOMA GELTONA ETIKETĖ PAŽYMĖTMS PREKMS

6⁹⁹ €

MAGNE B6

geriamasis tirpalas, 10 ampulių
470 mg/5 mg, 60 dengtų tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tableteje yra 470 mg magnio laktato dihidrato bei 5 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6); Vienoje 10 ml ampulėje yra 186 mg magnio laktato dihidrato, 936 mg magnio pidoato, 10 mg piridoksino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** MAGNE B6[®] skirtas magnio trūkumo sukeltiems simptomams gydyti. Magnio trūkumas gali sukelti tam tikrus simptomus ar jų derinius: nervingumą, irzlumą, nedidelį nerimą, trumpalaikį nuovargį, nedidelius miego sutrikimus; mėšlungį, dilgčiojimo pojūtį, **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tabletes reikia nuryti užgeriant stikline vandens. Suaugusiems paros dozė yra 6–8 tabletes, svieriantiems daugiau kaip 10–30 mg/kg kūno svorio. Geriamojai tirpalui ampulės turinys ištirpinamas pusėje stiklinės vandens. Suaugusiems paros dozė yra 3–4 ampulės, kurias reikia išgerti per 2–3 kartus tarp valgyimų. Vaikams ir kūdikiams, svieriantiems daugiau kaip 10–30 mg/kg kūno svorio arba 1–4 ampulės per 2–3 kartus tarp valgyimų. **Kontraindikacijos:** preparato vartoti negalima, jeigu: yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei MAGNE B6[®] medžiagai; sergate tam tikra inkstų liga; vartojama levodopa. **Specialūs įspėjimai:** nėštumo ir žindymo laikotarpiu vaista galima vartoti tik tada, jei nurodo gydytojas. MAGNE B6[®] dengtosios tabletes skirtas suaugusiems žmonėms ir vyresniems nei 6 metų vaikams. MAGNE B6[®] geriamojai tirpalui negalima duoti mažiau kaip 10 kg svieriantiems (iki 1 metų) kūdikiams. Jeigu sergate inkstų, širdies ir kraujagyslių liga, prieš pradėdami vartoti MAGNE B6[®] preparatus, reikia pasitarti su gydytoju. Piktinaudžiant vitaminu B6, pakenkiami jutlimiausi periferiniai nervai: atsiranda tirpimas ir padėties jutimo pablogėjimas, drebulys galvosne ir koordinacijos sutrikimai. Nustojus vartoti vaistą, pažeidimai paprastai išnyksta. Reklamos teksto parengimo data 2022-08. 2604_Magne_B6_V01_LT

„MAGNE B6“ PADĖS ĮVEIKTI MAGNIO TRŪKUMĄ!

NUO ALERGIJOS

5⁹⁹ €

TAVEGYL 1 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje tableteje yra 1 mg klemastino fumarato, kuris atitinka 1 mg klemastino. **Indikacijos:** „Tavegyl“ lengvina alerginę slogą (šienligę, ašarojimą, čiaudulį, nosies varvėjimą); alerginę odos reakciją (paraudimą, spuogelius, niežėjimą, patinimą); vabzdžių įgėlimo ir įkandimo sukeltą reakciją. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: iš ryto ir vakare gerti po 1 tablete, 6–12 m. vaikams: gerti prieš pusryčius ir vakare prieš miegą po 0,5 arba 1 tablete, 3–6 m. vaikams: gerti prieš pusryčius ir vakare prieš miegą po 0,5 tabletes. Tabletes gerti prieš valgį užgeriant vandeniu. **Kontraindikacijos:** alergija klemastinui, kitokiems antihistamininiams vaistams ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Porfirija. Jaunesniems nei 3 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** atsargiai turi vartoti pacientai, sergantys: uždarai kampo glaukoma; stenozė sukeliančia peptine opa; dvilykapištes žarnos obstrukcija; prostatos hipertrofija, dėl kurios susilaukia šlapimas, bei šlapimo pūslės kaklelio obstrukcija. Reikia atsargiai skirti epilepsijai sergantiems arba praėityje traukulius patyrusiems pacientams. Sudėtyje yra laktozės. Reklamos teksto parengimo data 2024-07. 2603_SB_Tavegyl_V01_LT

PATIKIMA PAGALBA NUO ALERGIJOS VISAI ŠEIMAI!

5⁹⁹ €

IBUMENTIN EXPRESS 400 mg, 20 minkštųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga: kiekvienoje minkštoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno. **Terapinės indikacijos:** suaugusiems ir paaugliams, svieriantiems ne mažiau kaip 40 kg (12 m. ir vyresniems): trumpalaikis lengvo ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip galvos, dantų, raumenų, sąnarių ar sukkelto menstruacijų, malšinimas. Karščiavimo, susijusio su persilimu, malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** įprasta vienkartinė dozė yra 1 kapsulė. Didžiausia paros dozė yra 1200 mg ibuprofeno (3 kapsulės). Kapsulę reikia užsigerti stikline vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Anksčiau buvo pasireikšiusi acetilsalicilo rūgšties arba kitokių nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) sukelta astma, dusulys, sloga, patinimas ar (niežintis) išberimas. Aktyvi arba buvusi pasikartojanti skrandžio opa arba kraujavimas iš skrandžio, su NVNU susijęs kraujavimas iš virškinimo trakto arba virškinimo trakto perforacija. Jei yra sunkus kepenų, širdies, inkstų funkcijos nepakankamumas, kraujavimas iš smegenis arba kitas aktyvus kraujavimas, pasireiškia kraujo krešėjimo sutrikimų arba kitų kraujavimo sutrikimų, sunki skydžių stoka (sukelta vėmimo, viduriavimo arba nepakankamo skydžių vartojimo), paskutiniai trys nėštumo mėnesiai. Netinka vaikams ir paaugliams iki 12 m. **Specialūs įspėjimai:** specialiai atsargumo priemonių reikia, jei padidėjęs kraujospūdis, sergate širdies, inkstų ir kepenų liga, turite paveldimą kraujodaros sutrikimą (ūminį kintančią porfiriją), turite arba anksčiau esate turėję žarnos problemų arba ligų (ūminis kolitas, Krono liga), sergate astma, sisteminė raudonoji vilkligė arba kita jungiamojo audinio liga, jei jums neseniai buvo atlikta dielės apimties chirurginė operacija, sergate šienlige, turite nosies polipų arba lėtinį obstrukcinių kvėpavimo sutrikimų. Ilgai vartojant skausmą malšinančius vaistus nuo galvos skausmo, jis gali pasunkėti. Tai pajūtę arba įtardami, turėtumėte nutusti vartoti šį vaistą ir kreiptis į gydytoją. Dažnas (kelių rūšių) skausmą malšinančių vaistų vartojimas gali sukelti ilgalaikį sunkių inkstų pažeidimą. Ilgai vartojant šio vaisto, būtina reguliariai tirti kepenis ir inkstus veiklą bei atlikti bendrą kraujo tyrimą. Reikia vengti „Ibumentin Express“ vartoti sergant vėžaruopais ar kartu su kitais NVNU. Vaistai nuo uždegimo ir (arba) skausmo, tokie kaip ibuprofenas, gali būti susiję su nedideliu širdies priepuoliu ar insulto rizikos padidėjimu, ypač vartojant didesnes dozes. Neviršykite rekomenduojamos dozės ar gydymo trukmės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu jums pasireiškia širdies problemų, įskaitant širdies nepakankamumą, kritines angina, arba jeigu jums buvo širdies priepuolis, atlikta širdies kraujagyslių jungčių suformavimo operacija, diagnozuota periferinių arterijų liga arba buvo išties bet kurios rūšies insultas; Jūsų kraujospūdis yra padidėjęs, sergate cukriniu diabetu, nustatytas didelis cholesterolio kiekis, buvo širdies liga susijusių giminių ar giminaičių, kuriuos ištkio insultas, arba jeigu rūkote. Jeigu vartojate šio vaisto sirgami infekcinė liga ir jūsų infekcijos simptomai nepaėriauna arba pasunkėja, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Buvo pranešta apie alergines reakcijas ir šį vaisto požymius, įskaitant kvėpavimo sutrikimus, vėmimo ir kaulo srities patinimą, kritines skausmus. Gydat ibuprofenu buvo pranešta apie sunkias odos reakcijas, įskaitant ekfoliacinį dermatitą, daugiafrekvencinę eritemą, Stivenso-Džonsonso sindromą, toksinę epidermio nekrozę, vaisto sukeltą reakciją su eozinofilija ir sisteminiais simptomais, ūminę generalizuotą egzanteminių pustuliozę. Jei pastebėte bet kurį sunkių odos reakcijų ar alergijos simptomų, nutraukite „Ibumentin Express“ vartojimą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Vaisto negalima vartoti, jei nustatytas paveldimas sutrikimas – visiškas laktozės stovygis arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pirmuosius 6 nėštumo mėnesius vartoti negalima, nebent tai neabejotina būtina ir taip pataria gydytojas. Teksto parengimo data 2025-06-03.

NUO 12⁹⁹ €

Dextralex

500 mg, 30 pėvele dengtų tablečių 12⁹⁹ €500 mg, 60 pėvele dengtų tablečių 22⁹⁹ €500 mg, 120 pėvele dengtų tablečių 42⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Sudėtis: Vienoje pėvele dengtoje tableteje yra 500 mg mikronizuotos ir išrynkintos flavonoidų frakcijos (atitinka 450 mg diosmino ir 50 mg flavonoidų, apskaičiuoti pagal hesperidiną). **Indikacijos:** Apatinių galūnių vė nepakankamumo simptomų: kojų sunkumo, skausmo bei antsvorio rlynio neramumo, lengvinimas. Simptomų, susijusių su hemorojais padėjimui, lengvinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** Rekomenduojama dozė yra 2 tabletes per parą – viena vidurienį, antra – vakare, valgio metu. Patėmusiu hemorojais atveju – 6 tabletes per parą per 4 dienas, po to 4 tabletes per parą 3 dienas. **Nėštumas ir žindymo laikotarpis:** Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Nėštumas: Laikintis atsargumo reikėtų vartoti „dextralex“ nėštumo metu. Žindymo laikotarpis: Kadangi nėra duomenų apie vaisto išsiskyrimą į motinos pieną, žindyti gydytoju laikotarpis nerekomenduojamas. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Įspėjimai:** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jei pradėdami vartoti „dextralex“, Jeigu Jums yra simptomų, susijusių su hemorojais padėjimui, „dextralex“ galima vartoti trumpai. Jei simptomai neįsnyksta, kreipkitės į gydytoją. Pagalbinės medžiagos: be natrto. Teksto peržiūros data: 2021-09. Reklamos parengimo data: 2024-03-14.

PAJUOS KOJŲ LENGVUMĄ SU „Dextralex“!

NUO 11⁹⁹ €

CANEPHRON®

60 dengtųjų tablečių 11⁹⁹ €INTENS 30 dengtųjų tablečių 14⁹⁹ €

NERECEPTINIAI AUGALINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Terapinės indikacijos. „Canephron“ intens“ yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio paskirtis – palaikomas ir specifines gydymo priemones papildantis apatinių šlapimo takų uždegimo sukeltų lengvų negalavimų (tokių kaip dažnas šlapinimasis, deginantis skausmas šlapinantis ir impulsinis noras šlapintis) gydymas; kad prasplautų šlapimo takai ir juose sumažėtų konkretnų nuosėdų. Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. „Canephron“ yra skirtas apatinių šlapimo takų uždegimo sukeltiems lengviems negalavimams gydyti bei inkstų akmens susidarymo profilaktikai. „Canephron“ turėtų būti vartojamas kaip palaikomoji gydymo priemonė kartu su gydytojo paskirtomis specifinėmis gydymo priemonėmis. Tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. **Veikliosios medžiagos ir stiprumas:** 1 dengtuoje „Canephron“ intens“ tableteje yra 36 mg širdažolių žolės, 36 mg gelsvių šaknų, 36 mg rozmarinų lapų; 1 dengtuoje „Canephron“ intens“ tableteje yra 18 mg skėtinii širdažolių žolės, 18 mg vaistinių gelsvių šaknų, 18 mg kvapiųjų rozmarinų lapų. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Canephron“ intens“ suaugusiems ir paaugliams nuo 12 m. amžiaus vartoti po 1 dengtą tablete 3 kartus per parą. „Canephron“ suaugusiems ir paaugliams nuo 12 m. vartoti po 2 dengtas tabletes 3 kartus per parą. Išgerti vienkartine doze ryte, per pietus ir vakare. Tablete reikia nuryti nekrantvija, geriausia užgeriant skysčiu, pvz., stikline vandens. **Kontraindikacijos:** „Canephron“ intens“ ir „Canephron“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija ar padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos, kitoms skėtinii šeimoms augalams (pvz., aniziams, pankoliams, krapams), anetoliui (eteriniui aliejui sudedamajai daliai) ar bet kuriai pagalbinei šiu vaistų medžiagai; jei sergama skrandžio (pepsine) opa; esant edemai dėl širdies funkcijos sutrikimo. „Canephron“ intens“ draudžiama vartoti esant edemai dėl inkstų funkcijos sutrikimo ir (ar) gydytoju rekomenduojamą mažinti skysčių vartojimą. „Canephron“ draudžiama vartoti, jeigu sutrikusi inkstų funkcija; sergant uždegimine inkstų liga. **Specialūs įspėjimai:** tęsiantis karščiavimu, pasireiškus apatinių pilvo dalies skausmui, spazmams, pastebėjus šlapime kraują, atsiradus šlapinimosi sutrikimų ar ūminiam šlapimo susilaikymui, reikia nedelsiant pasitarti su gydytoju. „Canephron“ intens“ negalima vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams, nes nepakanka duomenų. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Canephron““. Teksto parengimo data 2026-05-04.

NEĮSVENGAMA CISITO PABAIGA!

NUO 2⁹⁹ €



HJERTEMAGNYL

150 mg, 30 plėvele dengtų tablečių 2⁹⁹ €
 150 mg, 90 plėvele dengtų tablečių 6⁹⁹ €
 75 mg, 100 plėvele dengtų tablečių 4⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: 1 tabletyje yra 75 mg arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties. **Indikacijos:** trombozės profilaktika, sergant išemine širdies liga, po miokardo infarkto, išeminio smegenų insulto ar praeinančio smegenų išemijos (kraujotakos sutrikimo) priepuolio. Vaistas slopina trombocitų (kraujo plokštelių) agregaciją (sukibimą), todėl juo vartojama krešulių, susidariusių iš sukibusių kraujo plokštelių, atsiradimo rizikai mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną, užsigeriant stikline vandens; įprastinė dozė: ilgalaikiam vartojimui yra 75 – 150 mg viena kartą per parą. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, padidėjęs jautrumas kitiems salicilatams; jei neseniai kraujavo į virškinamąjį traktą; yra polinkis į kraujavimą, ūminė pepsinė opa, sunkūs inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, slapiame padaugejo oksalatu, jeigu yra trys paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas; vaikams ir paaugliams, jaunesniems kaip 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai vartoti, jei pacientas serga bronchių astma, šienlige, nosies polipais ar kita lėtine kvėpavimo takų liga, gydymui atsparia hipertenzija, podagra, esant gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stokai, sutrikusiai kepenų ir (ar) inkstų arba virškinimo trakto funkcijai, likus 10 parų iki chirurginės operacijos, senyvo amžiaus pacientams neparatina ilgai vartoti dėl galimos kraujavimo ir virškinamojo trakto rizikos, esant vaikų ir paauglių virusinėms infekcijoms. Teksto parengimo data: 2022-04-07. LT-HJERT-2200001

NUO 8⁹⁹ €



PANANGIN

158 mg/140 mg, 60 plėvele dengtų tablečių 8⁹⁹ €
 316 mg/280 mg, 30 plėvele dengtų tablečių 10⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletyje yra 158 mg kalio aspartato ir 140 mg magnio aspartato arba 316 mg kalio aspartato ir 280 mg magnio aspartato. **Terapinės indikacijos:** „Panangin“ tabletes vartojamos magnio ir kalio trūkumo profilaktikai tuo atveju, jei šiu jonų pasisavinama per mažai arba pernelyg daug netenkama, pvz., ilgai vartojant diuretikų. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Panangin 158 mg/140 mg“: paprastai skiriama po 2-3 tabletes 3 kartus per parą, „Panangin 316 mg/280 mg“: paprastai skiriama po 1 tablete 3 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, ūminis ir lėtinis inkstų nepakankamumas, Adisono liga, hiperkalemija, kalį sulaukantių diuretikų vartojimas, atrioventriculinė III laipsnio blokada, kardiogeninis šokas (kraujospūdis mažesnis negu 90 mm Hg). **Specialūs įspėjimai:** pacientams, sergantiems ligomis, dėl kurių kraujyje padidėja kalio kiekis, vaistinio preparato būtina vartoti atsargiai ir reguliariai kontroliuoti kalio kiekį kraujyje. **Rinkodaros teisės turėtojas:** „Gedeon Richter Plc.“, Vengrija. **Atstovas Lietuvoje:** „Gedeon Richter“ atstovė, Maironio g. 25-3, LT-01125 Vilnius, tel. +370 5 268 5392. **Teksto peržiūros data:** 2023-05-03 („Panangin 158 mg/140 mg“); 2022-07-07 („Panangin 316 mg/280 mg“). **Reklamino teksto paruošimo data:** 2025-05-12.

NIEŽULIUI MALŠINTI

NUO 3⁹⁹ €



GRIVIX 1 mg/g gels, 30 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: kiekviename gramme gelio yra 1 mg dimetindeno maleato. Pagalbinės medžiagos: benzalkonio chloridas ir propilenglikolis. **Terapinės indikacijos:** dermatozės, dilgėlinės, vabzdžių įkandimo, nudegimo saulėje arba paviršutinio odos nudegimo (pirmojo laipsnio) sukeltą niežėjimo trumpalaikis malšinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** vaikams, suaugusiems ir senyviems pacientams: ant pažeistos ir niežtinčios odos GRIVIX reikia tepti plonu sluoksniu 2-4 kartus per parą. Kūdikiams ir mažiems vaikams (jaunesniems nei 2 metų amžiaus) reikia vengti vartoti ant didelių odos plotų. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Antrojo ir trečiojo laipsnio nudegimai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jei GRIVIX gydymas didelis odos plotas, reikia vengti ilgalaikių šiu paviršių saulės apšvietimo. Kūdikiams ir mažiems vaikams (jaunesniems nei 2 metų amžiaus) didelio odos ploto, ypač pažeisto ar apimto uždegimo, gelio tepti reikia vengti. Vaistinio preparato sudėtyje yra benzalkonio chlorido, kuris dirgina, gali sukelti odos reakcijų, ir propilenglikolio, kuris gali sudirginti odą. Reklamino teksto parengimo data: 2026.02.

NURAMINK SUDIRGINTĄ IR NIEŽTINČIĄ ODĄ!

NUO SPAZMINIO SKAUSMO

NUO 5⁹⁹ €



NO-SPA

40 mg, 24 tabletes 5⁹⁹ €
 40 mg, 24 plėvele dengtos tabletes 6⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletyje ir plėvele dengtoje yra 40 mg drotaverino hidrochlorido. **Indikacijos:** lygiųjų raumenų spazmas, susijusių su tulžies latakų ligomis (tulžies pūslės ir (arba) latakų akmenlige, tulžies pūslės ir (arba) šalia jos esančių audinių, tulžies latakų ar didžiojo dvilypkapitės žarnos spenelio uždegimas), šalinai. Inkstų ir (arba) šlapimtakų akmenlige, inkstų gėdelių ar šlapimo pūslės uždegimo sukeltą šlapimo takų lygiųjų raumenų spazmams šalinti, medžiagų apykaitai normaliai šlapintis slopinti. Kaip pagalbinis gydymas šalinant skrandžio ir žarnyno lygiųjų raumenų spazmus, jei yra skrandžio ir dvilypkapitės žarnos opa, skrandžio, plonosios ar storiosios žarnos uždegimas, įskrandžio ir žarnyno lygiųjų raumenų spazmas bei esant skausmingoms mėnesinėms. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** reikia vartoti po 1-2 tabletes 1-3 kartus per parą. Įprastinė suaugusio žmogaus paros dozė yra 3-6 tabletes. **Kontraindikacijos:** alergija drotaverinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Sunkūs kepenų, inkstų ir širdies nepakankamumas. Negalima vartoti jaunesniems kaip 1 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** vaikams ir paaugliams, jaunesniems kaip 18 metų. NO-SPA nerekomenduojama. Jei kraujospūdis mažas, vaistą reikia vartoti labai atsargiai. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Drotaverin vartojant su levodopa, mažėja pastarojo vaisto poveikis parkinsonizmui, todėl stiprią drebulys ir raumenų štingulys. Teksto parengimo data: 2025-06. 2602_SB_No-spa_V01_LT

PILVO SKAUSMAS? GYDYKITE JĮ TINKAMAI SU „NO-SPA“

NUO 9⁹⁹ €



VOLTAREN EMULGEL

23,2 mg/g gels, 100 g 9⁹⁹ €
 23,2 mg/g gels, 150 g 14⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Diklofenako dietilaminas. **Terapinės indikacijos.** *Suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams:* skausmo ir uždegimo mažinimas, kai yra minkštųjų audinių sužalojimas (sausyslių, raščių, raumenų ir sąnarių trauma, pvz., patempimas, sumušimas); vietinis minkštųjų audinių uždegimas (nugaros skausmas, tendinitas, bursitas). *Tik suaugusiems (18 m. ir vyresniems):* sąnarių (pvz., kelio) degeneracinis ligos sukeltas skausmas malšinti. **Vartojimas.** Vartoti ant odos. Tepti 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Daugiau informacijos žr. pakuočių lapelyje. **Kontraindikacijos.** Alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitiems vaistams nuo skausmo, uždegimo arba kraujavimo; paskutinis nėštumo trimestras; jaunesniems kaip 14 m. paaugliams. **Specialūs įspėjimai.** Netepi ant pažeistos odos, atvirus žaizdas, odos išberimo ar egzemos vietas, didelių odos plotų, saugoti, kad nepažeistų į akis ir ant gleivinės, pvz., burnos, nenuryti. Jeigu pasireiškia bėrimas, gydymą nutraukti; nenaudoti su oro neprežiuoančiais tvarštais. Sudėtyje yra propilenglikolio ir butilhidroksitolueno. **Reklamino teksto parengimo data:** 2025-05. Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi jiems licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas.

NUO SLOGOS

NUO 5⁴⁹ €



XYMELIN

1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 5⁴⁹ €
 MENTHOL 1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 5⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Sudėtis: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. **Indikacijos:** susirusęs peršalimo ligomis, paburkus nosies gleivinei arba pasireiškus nosies ančių uždegimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 10 metų paaugliams (XYMELIN MENTHOL atveju – vyresniems kaip 12 metų paaugliams) 1 įpurškimas į kiekvieną nosies landą 2-3 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, uždaro kampo glaukoma, sausasis nosies gleivinės uždegimas, atrofinis rinitas (XYMELIN MENTHOL atveju), jei hipofizės ar smegenų operacija atlika pro nosi arba burną; XYMELIN MENTHOL: jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai:** Vartoti atsargiai, jei yra antinksčių navikas (teochromocitoma), sustiprėjusi skydliaukės veikla, sergate cukriniu diabetu ar sutrikęs šlapinimasis dėl padidėjusios prostato. Sergant sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis ar ligomis, kurių metu susiaureja kraujagyslės, vartoti tik su gydytojo leidimu. Ilgiau kaip 7 paras šio vaisto vartoti draudžiama. Dažnai ir ilgai vartojant vaisto gali atsinaujinti nosies gleivinės paburkimas, susilpninti jo slopinimas ir atsirasti nosies užgulimas. Gali sukelti miego sutrikimų, galvos svaigimą, tremorą, širdies ritmo sutrikimą, aukštą kraujospūdį. XYMELIN nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 10 metų vaikams. XYMELIN MENTHOL: Pasitarti su gydytoju arba vaistininku, jei vartojate arba per paskutinę diel savaitės vartojote vaistų nuo depresijos, vadinamų monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI). Reklamino teksto parengimo data: 28.05.2024 LT-XYME-2200004

SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO GYDYMAS

1⁹⁹ €

APAP EXPRESS 500 mg, 10 minkštųjų kapsulių

NERCEPTIVIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklos medžiagos, stiprumas: vienoje „APAP express“ minkštojoje kapsulėje yra 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos:** simptominio lengvo ar vidutinio skausmo ir (arba) karščiavimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir paaugliams, svėrantiems daugiau kaip 55 kg (nuo maždaug 15 m.): 1-2 minkštiosios kapsulės (500-1000 mg) vienu metu, ne daugiau kaip 6 kapsulės (didžiausia paros dozė – 3000 mg) kas 24 valandas. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas paracetamoliiui, žemės riešutams, sojomis arba bet kuriai vaisto sudėtyje esančiai pagalbinei medžiagai. Sunkus kepenų nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai:** atsargiai reikia vartoti pacientams, kuriems nustatytas inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka, piktnaudžiaujantiems alkoholiu, dehidratuotiems arba nuolat blogai besimintantiems, sergantiems astma. Gydančios šio vaistinio preparato, alkoholio vartoti negalima. Ligas ir dažnas vartojimas nerekomenduojamas. Jeigu per 3 dienas įtų sąvartta nepagerėja arba net pablogėja, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2025-03-31.

„APAP“ - IR TU VĖL SAVO VĖŽEŠ

ESANT AKIŲ UŽDEGIMUI

-40% 14^{98€}
~~24^{99€}~~

DESODROP® akių lašai, 8 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

Liposominis ozonuotas tirpalas akims su „LipozonEye™“ Ozonas – galingas natūralus antiseptikas, turintis plataus spektro antibakterinį, antivirusinį, priešgrybelinį poveikį. Preparatas skirtas uždegimo simptomams gydyti, taip pat ir infekcinės kilmės (konjunktyvitui, keratitui, blefaritui ir pan.), sergantiems pasikartojančioms akių infekcijoms, infekcijų profilaktikai po chirurginių intervencijų, traumų. Apsaugo rageno epitelį, skatina gijimą, stabilizuoja ašarų pėvelę. 2024-11-19

OZONO TERAPIJA AKIES PAVIRŠIAUS LIGOMS.

ŽAIZDŲ GIJIMUI SKATINTI

-30%



HELP4SKIN

WOUND HEALING gelis, 20 g ~~6⁹⁹~~ 4⁹⁹ €
WOUND HEALING gelis, 50 g ~~12⁹⁹~~ 9⁹⁸ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Help4skin Wound Healing“ yra hidrokoloidinis gelis be parabenų, skirtas lokaliai sausu ir šlapiu žaizdų priežiūrai bei jų gijimui skatinti. Skirtas gydyti ūminės ar lėtinės žaizdoms, tokioms kaip: žaizdos (skaitant chirurgines); įpjuovimai, įbrėžimai; odos nubrozdinimai ir įtrūkimai; atviros kojų opos; paviršiniai nudegimai (I ir IIA laipsnio); pragulos. Galima naudoti vyresniems nei 2 m. vaikams.

PAPRASTA IR EFEKTYVU.

KOJŲ VENOMS

16⁹⁹ €

VELIOS 1000 mg, 30 pėvelė dengtų tablečių

NERCEPTIVIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje pėvelė dengtoje tableteje yra 1000 mg mikronizuoto diosmio. **Terapinės indikacijos:** suaugusiųjų lėtinio veninės kraujotakos nepakankamumo simptomų gydymas, esant: apatinių galūnių venų varikozei, venų opoms, telangiektazijoms ir retikuliniams varikozėms ar venoms, sunkiumi, nuovargiui, diskomfortui ar nemirami kojų pojūčiui, kojų skausmui ar deginimui pojūčiui, šaltų kojų pojūčiui, naktiniam kojų mėšlungiui, apatinių galūnių patinimui, niežuliui, parastezijai (odos dilgčiojimui, bėdymui ar niežėjimui), odos eritemai ar cianozei. Suaugusiųjų paūmėjusio hemorojus simptomų gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** lėtinio venų nepakankamumo simptomais gydymas: 1 tablete per parą valgio metu, vartoti bent kelias savaites. Ūminio hemorojus simptomais gydymas: pirmąsias 4 dienas gerti 3 tabletes per parą, 3 kitas dienas – po 2 tabletes per parą, gydymas turi būti trumpalaikis. Vartoti per burną. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija diosmiui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** patimėjus hemorojus simptomams, reikia prisiminti, kad „Velios“ veikia tik simptomus ir turi būti vartojamas trumpai. Jei simptomai nepaieina, reikia atlikti tiesiosios žarnos tyrimą ir parinkti tinkamą gydymą. „Velios“ nėra veiksmingas gydant su stažiu širdies nepakankamumu susijusią edemą. „Velios“ pėvelė dengtų tablečių turi nevartoti pacientai, kuriems yra širdies nepakankamumas. Kai sutrikusi kojų veninė kraujotaka, „Velios“ gydymą poveikį gali sustiprinti saulės bei ilgalaikio stovėjimo vengimas, tinkamo kūno svorio palaikymas, specialūs kojinių nešiojimas. Kai apatinės kojų dalys palimusios dėl širdies, inkstų arba kepenų ligos, šis vaistas nepaieina. Jeigu gydytojas jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „Velios“ sudėtyje yra saulėlydžio gettono dažalo (E10), kuris gali sukelti alerginių reakcijų. **Reklamos teksto parengimo data 2024-11-18.**

PAJUSK KOJŲ LENGVUMĄ.

MAKŠTIES MIKROBIOTOS NORMALIZAVIMUI IR PALAIKYMUI

11⁹⁹ €

COCILLO

10⁸ KSV makšties minkštiosios kapsulės, 6 kapsulės

NERCEPTIVIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga yra Lactobacillus plantarum P 17630. Kiekvienoje makšties kapsulėje yra 10⁸ KSV (kolonijas sudarančių vienetų) *Lactobacillus plantarum* P 17630. **Terapinės indikacijos:** sutrikusios makšties mikrobiotos normalizavimui po bakterinės vaginozės gydymo antibiotikais; normalios makšties mikrobiotos palaikymui pasikartojančių makšties infekcijų atveju. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** suaugusios moterims po bakterinės vaginozės gydymo antibiotikais: 1 kapsulė reikia įstumti giliai į makštį naktiai prieš miegą 6 paras. Normaliai makšties mikrobiotai palaikyti esant pasikartojančioms makšties infekcijoms: 6 paras iš eilės naktiai prieš miegą giliai į makštį reikia įstumti 1 makšties kapsulę. Jei reikia, ciklą galima kartoti kartą per mėnesį daugiau nei 2 mėnesius iš eilės. Moterų, turinčių menstruacijas, turi pradėti gydymą iškart po jų. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai vaisto pagalbinei medžiagai; vaikams ir paaugliams iki 18 metų. **Specialūs įspėjimai:** nevartoti vietoje gydymo antibiotikais ar chemoterapijos, naudojamų infekcijoms gydyti, bet jiems papildyti; nevartoti kartu su prezeratyvais ar kitais vietiniais kontracepcijos metodais (pvz., diafragma), nes gali sumažėti jų veiksmingumas; gydymo COCILLO metu makšties drėkinimo antiseptiniais preparatais negalima taikyti; kapsulės sudėtyje yra parahidroksibenzoatų, kurie gali sukelti alerginių reakcijų (jos gali būti uždeštos). **Reklamos teksto parengimo data 2026-05-14.**

4⁹⁹ €

HELMINTOX

125 mg/2,5 ml, geriamoji suspensija, 15 ml

NERCEPTIVIS VAISTINIS PREPARATAS

Pirantelis

„Helmintox“ yra parazitines kirmėles veikiantis preparatas. Juo gydomas spalinių, askaridžių ir dvylikapirštinių ankilostomų sukeltas parazitinis ligos. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** Spalinių sukeltos ligos ir askaridozės gydymas: vidutinė dozė yra 10-12 mg/kg kūno svorio (didžiausia dozė 1 g). Ji gerinama 1 kartą. Dvylikapirštinių ankilostomų sukeltos ligos: pasireiškus sunkiai dvylikapirštinių ankilostomų sukeltai ligai, 2-3 dienas reikia gerti per 1 ar 2 kartus 20mg/kg kūno svorio dozė (didžiausia paros dozė 2 g). Jei sergama lengva dvylikapirštinių ankilostomų sukelta liga (taip būna vietovėse, kur liga nepaplitusi), gali pakakti vienos 10 mg/kg kūno svorio dozės. **Kontraindikacijos:** „Helmintox“ vartoti negalima: jeigu yra alergija piranteliui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jeigu yra alergija žemės riešutams ir sojomis. **Specialūs įspėjimai:** Jei yra kepenų funkcijos sutrikimas, dozė reikia mažinti, nes nedidelė daliai pacientų buvo pastebėta laikino kepenų fermentų aktyvumo padidėjimo atveju. Reklamos teksto parengimo data 2026-05.

HELMINTOX

125 mg, 6 pėvelė dengtos tabletės
250 mg, 3 pėvelė dengtos tabletės

NERCEPTIVIS VAISTINIS PREPARATAS

Pirantelis

„Helmintox“ yra parazitines kirmėles veikiantis preparatas. Juo gydomas spalinių, askaridžių ir dvylikapirštinių ankilostomų sukeltas parazitinis ligos. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** Sės vaistas skirtas suaugusiems žmonėms, vyresniems kaip 6 m. vaikams ir paaugliams, geriamas. Spalinių sukeltos ligos ir askaridozės gydymas: vidutinė dozė yra 10-12 mg/kg kūno svorio (didžiausia dozė 1 g). Ji gerinama 1 kartą. Dvylikapirštinių ankilostomų sukeltos ligos: pasireiškus sunkiai dvylikapirštinių ankilostomų sukeltai ligai, 2-3 dienas reikia gerti per 1 ar 2 kartus 20 mg/kg kūno svorio dozė (didžiausia paros dozė 2 g). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** Pastirkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Helmintox“. Jei yra kepenų funkcijos pakikimas, gali reikėti vartoti mažesnę dozė. Tokiu atveju pastirkite su gydytoju. Reklamos teksto parengimo data 2026-05.

NUO GERKLĖS SKAUSMO IR UŽDEGIMO

NUO 6⁹⁹ €



DECATYLEN™

0,25 mg/0,03 mg, 20 kietųjų pastilių 6⁹⁹ €
0,25 mg/0,03 mg, 40 kietųjų pastilių 9⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 pastilė yra 0,25 mg dekvalinio chlorido, 0,03 mg cinchocaino hidroklorido. **Terapinės indikacijos:** burnos ir ryklės uždegimo (gingivito, opinio ir aftinio stomatito, faringito) vietinis gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams kas 2 val. lėtai sūciuoti po 1 pastilę, 4–12 m. vaikams kas 3 val. lėtai sūciuoti po 1 pastilę. Kai uždegimo simptomų sumažėja, vartoti po 1 pastilę kas 4 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai ar kelvintiniams amonio dariniams (pvz., benzalkonio chloridui). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Decatilen“ sudėtyje yra sorbitolio. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas reatas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurius laisvinantį poveikį. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-01-13. DCLT-LT-00019

KAI REIKIA NE TIK MALŠINTI SIMPTOMUS, BET IR GYDYTI GERKLĖS SKAUSMĄ!

SKAUSMUI MALŠINTI

2⁹⁹ €



MIALDEX 25 mg, 10 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

„Mialdex“ yra vaistas skausmui malšinti, priklausantis nesteroidinių vaistų nuo uždegimo grupei (NVNU). „Mialdex“ veiklioji medžiaga yra deksketoprofenas (deksketoprofeno trometamolio pavidalu). „Mialdex“ vartojamas lengvo ir vidutinio stiprumo raumenų skausmui, skausmingų mėnesinių, dantų skausmui malšinti. **Vartojimas:** visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Įprastinė vaisto dozė yra pusė tabletės (12,5 mg) kas 4–6 valandas arba 1 tabletė (25 mg) kas 8 valandas, bet ne daugiau kaip 3 tabletės per parą (75 mg). **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) deksketoprofeno trometamolui arba bet kuriai pagalbinei „Mialdex“ medžiagai. Įspėjimai: jeigu sergate arba sirgote inkstų, kepenų ar širdies ligomis, širdies nepakankamumu, jeigu sergate kraujodaros sistemos ligomis; jeigu sergate sisteminė raudonąja vilkige ar mišriomis jungiamojo audinio ligomis; jeigu sergate arba sirgote virškinimo trakto ligomis pasikonsultuokite su gydytoju. **Galimas šalutinis poveikis:** šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025.09.17

NUO SLOGOS

4⁹⁹ €



GALATHENAL

1 mg/50 mg/ml, nosies purškalas, 10 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidroklorido ir 50 mg dekspantenolio. **Terapinės indikacijos:** „Galathenal“ skirtas suaugusiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) ir kaip pagalbinė priemonė odos bei gleivinės pažeidimams gydyti, nealerginės kilmės išskyros iš nosies (vazomotorinio rinitu) mažinti ir kvėpavimui per nosį palengvinti esant nosies užgulimui po nosies operacijos; nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu ir ūminiu prienosiuo ančių uždegimu (rinosinusu). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams – 1 purškalo tirpalo dozė į kiekvieną šnervę pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Dozavimas priklauso nuo individualaus paciento jautrumo ir klinikinio atsako. „Galathenal“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 paras, nebent gydytojas nurodė kitaip. Dėl vaiku gydymo trukmės reikia pasikonsultuoti su gydytoju. **Kontraindikacijos:** Šio vaistinio preparato vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliosios ar pagalbinės medžiagos; jeigu yra sausasis nosies gleivinės uždegimas (rinitis sicca); po chirurginio posmeginės liaukos pašalinimo per nosį (transfenoidalinės hipofizektomijos) arba po kitų chirurginių intervencijų, pažeidžiančių smegenų dangalą; kūdikiams ir jaunesniems kaip 6 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Galathenal“, jeigu esate gydomas monoaminooksidazės (MAO) inhibitoriais; jei yra padidėjęs akispūdis; jeigu sergate sunkia širdies ar kraujagyslių sistemos liga; jeigu yra antinksnių navikas; sergate cukriniu diabetu ar yra suaktyvėjęs skydliaukės veikla; jei yra padidėjęs prostata (prostato hiperplazija). **Reklamos teksto parengimo data:** 2026.02.

ATKĖMŠA NOSĮ IR ATKURIA PAŽEISTĄ NOSIES GLEIVINĘ.

NUO RĖMENS IR PADIDĖJUSIO RŪGŠTINGUMO

NUO 2⁹⁹ €



ELFIMEST

20 mg, 7 skrandyje neiūros tabletės 2⁹⁹ €
20 mg, 14 skrandyje neiurių tablečių 4⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Kiekvienoje skrandyje neiurioje tablete yra 20 mg ezomeprazolo (altitinkančio 21,75 mg ezomeprazolo magnio druskos dihidrato). **Terapinės indikacijos.** „Elfimest“ skirtas suaugusių žmonių gastroezofaginio refliuks simptomams (pvz., rėmens ir skrandžio rūgšties reguliacijos) trumpam laikui gydyti. **Dozavimas.** Rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 tabletė) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, tabletes gali prireikti vartoti 2–3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaites. Simptomams visiškai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Reikia nuryti visą tabletę, užgeriant pušę stiklinės vandens. **Tablečių negalima nei krampyti, nei trauškyti.** Kitoks pasirinkimas – tablete galima ištrinti pusę stiklinės negazuoto vandens, kitokie stikliniai netinka. **Kontraindikacijos.** Jeigu yra alergija ezomeprazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu yra alergija bet kuriam kitam protonų siurblio inhibitoriumi (pvz., pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui); jeigu po „Elfimest“ ar kitų panašių vaistų vartojimo kada nors pasireiškė sunkus odos išbėrimas arba odos lupimasis, pūsles ir (arba) burnos opos; jeigu vartojate vaistinių preparatų, kuriuose yra neflinavino (vaistas ŽIV infekcijai gydyti). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pastatarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu anksčiau sirgote skrandžio opa arba patyrėte skrandžio operaciją; jeigu 4 savaites arba ilgiau nepertraukiamai gydytės dėl refliuksio arba rėmens; jeigu yra gelta (odos arba akių pagellimas) arba sunkių kepenų sutrikimų; jeigu turite sunkių inkstų veiklos sutrikimų; jeigu esate vyresnis negu 55 metų ir pasireiškė nauji arba neseniai pakito refliuksio simptomai, arba jeigu kasdien Jums reikia vartoti nereceptinių vaistų nuo nevirskinimo ar rėmens; jeigu Jums kada nors pasireiškė odos reakcija po gydymo vaistu, panašiu į „Elfimest“, kuriuo mažinamas skrandžio rūgštingumas; jeigu bus atliekama endoskopija arba šlapalo kvėpavimo testas, arba specialus kraujo tyrimas (dėl chromogranino A). Reikia kreiptis į gydytoją, jeigu netelete daug kūno svorio dėl neįprastų priežasčių; rydami juntate sunkumą arba skausmą; patariate skrandžio skausmą arba nevirskinimo požymius, pvz., pykinimą, pilnumą, vidurių potimą, ypač pavaię; pradėjote vemti maistu arba krauju, kuris vėmaluose gali atrodyti kaip tamsūs kavos tiršai; pastebėjote juodomis išmatomis (krauju nudažytos išmatos); patariate stiprų arba nuolatinį viduriavimą; ezomeprazolo vartojimas siejamas su nedideliu infekciniu viduriavimo padidėjimo rizika; jeigu Jums išbėrė oda, ypač saulės apšviestoje vietoje, nuo skubiau pasakykite apie tai savo gydytojui, nes Jums gali tekti nutraukti gydymą „Elfimest“. Taip pat nepamirškite pasakyti, jeigu Jums pasireiškė bet koks kitas šalutinis poveikis, pvz., sąnarių skausmas. **Reklamos teksto peržiūros data:** 2025-03-03. **Reklamos parengimo data:** 2025-07. ELF-LT-00010

GREITAI IR INOVATIVY PAGALBA NUO RĖMENS!

5⁹⁹ €



FENKAROL 25 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Kiekvienoje tablete yra 25 mg kvifenadino hidroklorido. **Terapinės indikacijos.** Simptomais alerginės slogos (su konjunktyvitu ar be jo), dermatito (egzemos, dilgėlinės) ir niežulio gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems žmonėms dozė yra 25–50 mg (1–2 tabletės) 2–4 kartus per dieną. Vaikams ir paaugliams: vyresniems negu 12 m. vaikams dozė yra 25 mg (1 tabletė) 2–3 kartus per dieną. „Fenkarol“ netinka vartoti 12 m. ir jaunesniems vaikams. **Vartojimo būdas.** Vartoti per burną. „Fenkarol“ tabletes yra geriamos iš karto po valgio. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas kvifenadino hidrokloridui arba sacharozei, liguvių krakmolui, kalcio stearatui. Pirmasis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Atsargiai vaistinio preparato reikia vartoti ligoniams, sergantiems sunkiomis širdies ir kraujagyslių sistemos, virškinimo trakto, kepenų ir (arba) inkstų ligomis. Nevartoti, jeigu nustatytas reatas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltozės stygius. Registravimo liudijimo turėtojas ir gamintojas: JSC „Olpha“, Rupnicu 5, LV-2114 Oļaine, Latvija. Naujausias pakuočės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje <http://www.vvkt.lt>.

Reklamos teksto parengimo data: 2025-06-05. FEN03062025LT

GREITAI NUGALI ALERGIJOS SIMPTOMUS!

5⁴⁹ €



MILGAMMA® N 20 minkštųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 40 mg bentofitamins (riebaluose tirpus vitaminas B, darinio), 90 mg piridoksino hidroklorido (vitamino B) ir 250 µg cianokobalamino (vitamino B₁₂). **Terapinės indikacijos.** Vitaminų B₁, B₆, B₁₂ trūkumo šalinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** *Suaugusiems:* po 1 kapsulę 3–4 kartus per parą. Kai liga lengva ir jei vaistinis preparatas padėda, per parą pakanka 1–2 kapsulių. Vartoti per burną. Kapsulę reikia praryti po valgio nesukramtyta, užsigerinti truputi skysčio. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos, žemės riešutams, sojoms arba bet kuriai vaistinio preparato pagalbinei medžiagai. Asmenims, kuriems trūksta vitamino B₁₂, ir kuriems gresia Leberio regos atrofija. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vartojama ilgiau negu 6 mėn. „Milgamma N“ gali sukelti neuropatiją. Reikia atsiveltvęti į adityvų kartu vartojamų vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra sorbitolio (ar fruktozės), ir su maistu vartojamų sorbitolio (ar fruktozės) poveikį. Geriamojo vaistinio preparato sudėtyje esantis sorbitolis gali paveikti kitų kartu vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį priėmimą. Jeigu yra alergija žemės riešutams arba sojoms, šio vaistinio preparato vartoti negalima. **Registruotojas.** „Worwag Pharma GmbH & Co. KG“, Vokietija. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026-01-12.

GYVYBIŠKAI BŪTINAS GERAI SAVIJAUTAI!

NUO 5⁹⁹ €**TROXEVASIN**2%, 40 g gelis 5⁹⁹ €
2%, 100 g gelis 9⁹⁹ €**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

1 g gelio yra 20 mg troksertino. **Terapinės indikacijos:** lėtinio venų nepakankamumo simptomų (kojų skausmo, sunkumo, patinimo) lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems pacientams iš ryto ir vakare ligos pažeistą vietą reikia patepti nedideliu kiekiu gelio ir švelniai masažuoti, kol vaistinis preparatas visiškai įsisers į odą. Gydomo gėlių veiksmingumas daugiausia priklauso nuo vaistinio preparato dozės, vartojimo reguliarumo ir trukmės (patariama vartoti ilgai). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** vartoti tik ant nepažeistos odos, negalima tepti atvirų žaizdų bei gleivinės, pvz., akių. Gelio sudėtyje yra benzalkolio chlorido, kuris gali sudirginti odą. Nesitikima, kad vartojimas nėštumo ir žindymo laikotarpiu gali būti susijęs su žalingu poveikiu motinai, nes benzalkolio chlorido absorbcija per odą yra minimali. TROX-LF-00034. **Reklamines medžiagas parengimo data 2026-03.**

KAD KOJOS BŪTŲ LENGVOS: MĖGAUKITĖS TYRINĖDAMI PASAULĮ BE LĒTINIO VENŲ NEPAKANKAMUMO SUKELTŲ SIMPTOMŲ!**KAI VARGINA HEMOROJAUS SIMPTOMAI**-30% 7^{48€}
10^{59€}**HEMAGEL® PROCTO**

5 rektalinės žvakutės

MEDICININĖS PASKIRTIES PREKĖ

PASKIRTIS: skatinanti ūmių ir lėtinį tiesiosios žarnos gleivinės žaizdų gijimą pacientams, kenčiantiems nuo įtrūkimų ir hemorojaus, taip pat pacientams po Barono operacijos. Mažina kraujavimą, atsiradusį dėl hemorojaus, padeda pašalinti diskomforto pojūtį, ypač deginimą ir peršėjimą tiesiosios žarnos srityje. **SUDĖTIS:** miltelių pavidalo kopolimeras HEMA-HAS ir kietųjų riebalų apvalkalas. **NAUDOJIMAS:** Kartą per parą, geriausia prieš einant miegoti, žvakutę įdėti į tiesiąją žarną suvalpinamiu galu. **GAMINTOJAS:** VH Pharma a.s., Čekijos Respublika.

NUO 5⁹⁹ €**TONZIRIN**8,75 mg, 12 kietųjų pastilų 5⁹⁹ €
8,75 mg, 24 kietosios pastilės 9⁹⁹ €**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

TONZIRIN 8,75 mg kietosios pastilės yra flurbiprofeno. Flurbiprofenas priklauso vaistų, kurie vadinami nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU), grupei. Šie vaistai pasižymi skausmą ir karščiavimą mažinančiu bei priešuždegiminiu poveikiu. TONZIRIN kietosios pastilės yra vartojamos skaudančios gerklės simptomams palengvinti, tokiems kaip gerklės skausmas, skausmingumas ir patinimas, sunkumas nuryti, suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams. Jei po 3 dienų ligos požymiai išlieka ar pasunkėja, kreipkitės į gydytoją. Prieš pradėdami vartoti TONZIRIN, turite atidžiai perskaityti informaciją lapelį. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti TONZIRIN. TONZIRIN vartoti draudžiama: - jeigu yra alergija; jeigu kada nors buvo pasireikusi astma, netikėtas švokštimas ar dusulys, sloga, veido patinimas ar niežintis bėrimas (dilgėlinė) pavartojus aspirino ar kitų NVNU; - paskutiniuosius 3 nėštumo mėnesius; - jeigu Jums yra ar kada nors buvo pasireikę sunkių širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų. Vairavimas ir mechanizmų valdymas. Tyrimų poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus nebuvo atlikti. Tačiau suaugusių ir regos sutrikimai yra galimi šalutiniai poveikiai pavartojus nesteroidinių vaistų nuo uždegimo. Jeigu tokių pasireišimų, nevaivokite ir nevaldykite mechanizmus. Suaugusiems ir vyresniams kaip 12 metų vaikams: viena kietąją pastilę įsidėkite į burną ir lėtai čiulpkite. Čiulpiamo metu nuolat judinkite kietąją pastilę burnos ertmėje. Pastilių gydymasis poveikis turėtų pasireikšti po 30 minučių. Jeigu reikia, vartokite po vieną pastilę kas 3-6 valandas. - Vartoti daugiau kaip 5 kietąsias pastiles per 24 valandas negalima. Jaunesniems kaip 12 metų vaikams vartoti negalima. **Nutraukite šio vaisto vartojimą ir nedelsiant susisiekiite su gydytoju, jeigu Jums pasireiškia:** alerginės reakcijos, veido, liūvuo ar gerklės patinimas, širdies ritmo padidėjimas ir kraujospūdžio sumažėjimas, sunkios odos reakcijos. **Tekstas paskutinį kartą peržiūrėtas 2025-08-08**

BAKTERIJŲ AUGIMĄ STABDANTIS PAVIRŠINIŲ ŽAIZDŲ ANTISEPTIKASNUO 5⁹⁹ €400+
IPURŠKIMU**OCTEZY**1 mg/20 mg/g, odos purškalkas (tirpalas), 50 ml 5⁹⁹ €
1 mg/20 mg/g odos purškalkas (tirpalas), 100 ml 8⁹⁹ €**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Veikliosios medžiagos stiprumas: kiekviename tirpalo gramе yra 1 mg oktenidino dihidrochlorido ir 20 mg fenoksietanolio. **Terapinės indikacijos:** visų amžiaus grupių pacientų kartotinis trumpalaikis pagalbinis mažų, paviršinių žaizdų antiseptinis gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems žmonėms ir vaikams „Octezy“ vartojamas ant gydomos sritys, kol ji bus visiškai sudrekinata. Pavartojus šį vaistinį preparatą ir prieš imantis kitų priemonių, pvz., uždedant ant žaizdos tvarstį, reikia palaukti mažiausiai 1-2 minutes. „Octezy“ turi būti vartojamas ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Jaunesniems kaip 6 m. vaikams vartojimą reikia riboti iki kelių dienų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Octezy“ negalima nuryti, vartoti didesniais kiekiais nei būtina. Siekiant išvengti audinio pažeidimo, reikia būti atsargiems plauçant žaizdą ir užtikrinti, kad vaistinis preparatas nebūtų naudojamas su slėgiu ar suleidžiamas į ausinius. Esant žaizdai su ertmėmis, reikia užtikrinti, kad bet kurio metu būtų užtikrintas jo išleidimas. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. „Octezy“ draudžiama vartoti piavo ertmei (t. y. intraoperacinei), šlapimo pūslėi ar ausies būgneliui plauti. Čia pateiktas sutrumpintas vaistinio preparato aprašas. Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje <http://www.vkt.lt>. **Reklamos teksto parengimo data 2026-03.**

-30% 24^{48€}
34^{99€}**KELOTAN® silikoninis gelis randų priežiūrai, 15 g****MEDICININĖS PRIEMONĖ**

„Kelotan“ gelis – vietiskai naudojamas silikoninis gelis, skirtas naujiems ir seniems odos randams, susidariusiems po nudegimų, bendrųjų chirurginių procedūrų ir traumų, prižiūrėti.

„Kelotan“ gelis naudojamas:

- hipertrofinių ir keloidinių randų formavimosi prevencijai;
- iškilusiems randams minkštinti ir lyginti;
- dėl rando atsiradusiems odos spalvos pokyčiams mažinti;
- niežėjimui ir diskomfortui mažinti.

Kad nesufurmuotų hipertrofinių ar keloidinių randų, rekomenduojama „Kelotan“ gelį naudoti iš karto, kai žaizda sugyja, ar pašalinami silūai. Tepti 2 kartus per dieną ploną gelio sluoksnį. Tinka vaikams nuo 3 mėnesių amžiaus.

PAVIRŠINIŲ ODOS PAŽEIDIMŲ GYDYMAS3⁹⁹ €**RECREOL**50 mg/g, kremas, 50 g
50 mg/g, tepalas, 50 g**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Veikliosios medžiagos stiprumas: 1 g tepalo yra 50 mg dekspantenolio. **Terapinės indikacijos:** paviršinių odos pažeidimų (tokių kaip maži nudegimai ir žaizdos, odos nubrozdinimai ir įtrūkimai), odos uždegimo (atsirandanti dėl spinduliuojamojo gydymo, fototerapijos ar ultravioletinių spindulių) pagalbinis gydymas. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** vartoti išoriskai. Įprastinis dozavimas yra viena ar kelis kartus per parą plonu sluoksniu tepti pažeistą odą. Gydomo trukmė priklauso nuo ligos kilmės ir eigos. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** reikia vengti atsitiktinio dekspantenolio kontakto su akimis. **Vietinis rinkodaros teisės turėtojo adresas:** UAB „Grindeks Kalceks Lietuva“, Kalvarijų g. 300, LT-06318 Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2026-05-18.

5⁹⁹ €



DEEP RELIEF

50 mg / 30 mg/g gels, 50 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 g gelio yra 50 mg ibuprofeno ir 30 mg levomentolio. **Terapinės indikacijos:** Lokalus sąnario aplinkos minkštųjų audinių uždegimo ir (ar) traumos (pvz., palempimo, išnirimio) sukeltos skausmo malšinimas. **Dozavimas:** Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: gėli vartoti iki 3 kartų per parą, bet ne dažniau kas 4 valandas. Tėpli reikia apie 1–4 cm gelio iš 50 g pakuočės. Viename centimetre gelio iš 50 g tubelės yra vidutiniškai 50 mg ibuprofeno. 4 cm iš 50 g tubelės yra vidutiniškai 125 mg ibuprofeno. Neviršyti nurodytą dozę. Jeigu simptomai nepraeina per penkis dienas, kreiptis į gydytoją. Vaikų populiacija: Duomenų apie „Deep Relief“ saugumą ir veiksmingumą jaunesniems kaip 12 metų vaikams nėra. **Vartojimo metodas:** Plonu geliu sluoksniu tėtli skaudamą vietą, švelniai masažuoti, kol susigers. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas aspirinui ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, įskaitant ir vartojamus per burną. Astma sergantys pacientai, kuriems aspirinas arba kiti nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, gali sukelti astmos priepuolį, niežėjimą, rinitą ar dilgėlinę. Nutrozidinta, pažeista infekcijos ar uždegimo oda arba plota be virusinio odos sluoksnio. Kiti toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu lokaliai vartojami vaistiniai preparatai. Vartojimo vietoje esanti infekcija. Paskutinis neštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Deep Relief“ gelio sudėtyje yra propilenglikolio, kuris gali sukelti odos sudirginimą. Gėli netepti ant (arba) šalia gleivinės ir akių. Nelinki tėtli po sandarinamųjų tvarsiu. Pirmą kartą išbandyti ant mažo odos ploto. Vartoti tik ant odos. Registruotojas ir gamintojas: The Mentholatum Company (Ireland) Limited, Airija.

„DEEP RELIEF“ – VĖSINANTIS IR GREITAI VEIKIANTIS TEPALAS NUO SKAUSMO!

NUO GALVOS SVAIGIMO

6⁹⁹ €



VERTIGOHEEL, 50 tablečių

NERECEPTINIS HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tabletyje yra veikliųjų medžiagų: *Anamirta cocculus* D4 210 mg, *Conium maculatum* D3 30 mg, *Ambra grisea* D6 30 mg, *Petroleum rectificatum* D8 30 mg. **Terapinės indikacijos:** Dėl įvairių priežasčių atsiradęs galvos svaigimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** Suaugusiems žmonėms, 12 m. ir vyresniems vaikams: paprastai reikia vartoti po 3 tabletes 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps). Ūmiai atsiradus galvos svaigimui ir pykinimui, pradžioje (pirmas 2 valandas) vartoti po 1 tabletyje kas 15 min. „Vertigoheel“ saugumas ir veiksmingumas jaunesniems nei 12 m. vaikams neiširti. Duomenų nėra. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Registruotojas:** „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). **Registruotojo atstovas:** UAB „Farmahelis“. **Teksto parengimo data:** 2024-08-01.

NUO 1⁹⁹ €



IBUMETIN

200 mg, 10 pėlele dengtų tablečių 1⁹⁹ €
400 mg, 10 pėlele dengtų tablečių 2⁹⁹ €
400 mg, 20 pėlele dengtų tablečių 3⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: 1 tabletyje yra 200 mg arba 400 mg ibuprofeno. **Indikacijos:** trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip galvos, dantų, raumenų, sąnarių ar sukeltos menstruacijų, malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams įprasta vienkartinė dozė yra 1-2 tablete(s) IBUMETIN 200 mg arba 1 tablete IBUMETIN 400 mg. Didžiausia paros dozė yra 1200 mg. Tabletyje reikia užsigeri stikline vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, acetalisalicilo rūgščiai arba kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU). Ligonis anksčiau sirgo acetalisalicilo rūgščies arba kitokių NVNU sukelta astma, angioneurozine edema, dilgėline, rinitu ar kitokia padidėjusio jautrumo reakcija. Aktyvi arba buvusi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, opinis kolitas, kraujavimas iš virškinimo trakto ar kitoks kraujavimas, sunkus kepenų, širdies, inkstų funkcijos nepakankumas, hemoraginė diatezė, paskutinių 3 neštumo mėnesių ar žindymo laikotarpis. Vaikams ir paaugliams iki 12 m. vartoti negalima. **Specialūs įspėjimai:** specialiai atsargumo priemonių reikia, jei inkstų, kepenų arba širdies funkcija yra sutrikusi, yra buvę virškinimo trakto pažeidimų, sutrikęs kraujo krešėjimas arba vartojami antikoagulantai, jei vartojama kitų NVNU ar vaistinių preparatų, galinčių padidinti skrandžio opos susidarymo arba kraujavimo pavojų, diuretikų ar nefrotoksinių poveikį turinčių vaistinių preparatų, sergama cukriniu diabetu, raudonąja vilkigė ar kitomis kolagenozėmis, Krono liga, opiniu kolitu, hipertenzija, periferinių arterijų liga, galvos smegenų kraujagyslių liga, astma, šienligė, yra nosies polipų ar lėtinųjų infekcinių kvėpavimo takų ligų, senyviams žmonėms. Priešingus kraujavimui, atsiradus opų ar odos reakcijai, vartojama būtina nedelsiant nutraukti ir kuo skubiau kreiptis į gydytoją. Negalima vartoti, jei nustatytas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pirmuosius 6 neštumo mėnesius vartoti negalima, nebent tai neabejotinai būtina ir taip palaria gydytojas. Teksto parengimo data: 2023-03-01.

ALERGINIO RINITO SIMPTOMŲ GYDYMUI IR PROFILAKTIKAI

-30% 9^{78€} ~~13⁹⁹~~



ECTOGARD®

nosies purškalas nuo alergijos, 20 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

Medicinos priemonė „Ectogard“ yra hipertoniškas nosies purškalas, skirtas alerginiam rinitui būdingų simptomų, tokių kaip sloga, nosies niežulys, čiaudulys ir nosies užgulimas, gydymui ir profilaktikai. ECTOGARD nosies purškalas natūraliai mažina gleivinės paburkimą, uždegimą ir palaiko alergeno sudirgintos gleivinės regeneracijos procesą. Tinka ir vaikams iki 2 metų. ECTOGARD nesukelia pripratimo ir gali būti vartojamas iki 50 dienų.

PATIKĖKITE SAVO ALERGIJĄ „ECTOGARD“.

SKAUSMUI MALŠINTI

3⁹⁹ €



DICUNO 25 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: diklofenako kalcio druska, 25 mg. **Terapinės indikacijos:** simptominiams ūminio silpno ir vidutinio stiprumo skausmo gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems rekomenduojama dozė yra 25-50 mg (1-2 tabletes). Vartoti ne daugiau kaip 150 mg (6 tabletes) per parą. Tabletes nurykite užgeriant stikline vandens. Tablečių negalima vartoti su maistu ar škartu po jo. **Kontraindikacijos:** „Dicuno“ vartoti draudžiama: jeigu yra alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu Jums kada nors buvo ar yra skrandžio ar žarnyno opa; jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto arba jo prakiurimas dėl skausmą mažinančių vaistų vartojimo (NVNU). (du ar daugiau patvirtintų opas ar kraujavimo atvejų); jei yra padidėjęs polinkis kraujuoti; jeigu yra labai sutrikusi kepenų funkcija; jei sergate porfirija (medžiagų apykaitos liga); jeigu Jums nustatyta širdies liga ir (arba) galvos smegenų kraujagyslių liga, pavyzdžiui, jeigu Jūs patyrėte širdies smūgį, insultą, „mikroinsultą“ (praėnantį smegenų išemijos priepuolį) arba Jums buvo užsikimšusios širdies ar galvos smegenų kraujagysles, arba Jums buvo atlika operacija siekianti išvalyti arba sustuotinti užsikimšusias kraujagysles; jeigu Jums yra arba anksčiau buvo sutrikusi kraujotaka (periferinių arterijų liga); jeigu sergate sunkia inkstų liga; per paskutinius tris neštumo mėnesius; jei pacientas yra jaunesnis kaip 18 metų; jei manote, kad Jūs galite būti alergiškas (-a) diklofenako kalcio druskai, aspirinui, ibuprofenui arba kuriams nors kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo arba bet kuriai pagalbinei „Dicuno“ medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš pradėdami vartoti „Dicuno“, jeigu sergate arba esate sirgę bet kuria iš toliau išvardintų ligų: uždegiminė žarnų liga (opinis kolitas, Krono (Crohn) liga), astma, širdies liga, kepenų ar inkstų liga; lėtinė obstrukcinė plaučių liga arba lėtinis kvėpavimo takų uždegimas (ligos, kurios sukelia kvėpavimo takų susiaurėjimą ir oro praeinamumo apribojimą, apsupunkinti kvėpavimą), nosies gleivinės uždegimas, sisteminė raudonoji vilkigė (jungiamojo audinio liga), dilgėlinė arba angioneurozinė edema (apunkindasi pasireiškiantis vietinis linimas), ligos, sukeliančios padidėjusį polinkį kraujuoti; kepenų porfirija (medžiagų apykaitos liga); jeigu pavartojus „Dicuno“ arba kitų vaistų nuo skausmo, jums kada nors yra pasireiškęs sunkus odos berimas arba lupimasis, ant odos atsirado pūslių ir (arba) burnos ertmėje atsirado opų; jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti. Reklamos teksto parengimo data: 2026-05-14.

7⁹⁹ €



KAMISTAD N gėlis 10 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Lidokaino hidrochloridas, 20 mg/g, ramunėlių žiedų skykštasis ekstraktas, 185 mg/g. **Indikacijos:** gėlis vartojamas esant nesunkiam dantenu ir burnos gleivinės uždegimui. **Vartojimas:** suaugusiems ir vaikams, vyresniems nei 12 metų, reikia tėtli 0,5 cm ilgio geliu juostele 3 kartus per parą. Gėlis tepamas ant pažeistų vietų ir švelniai įtrinamas. **Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai:** geliu vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Saugoti, kad geliu nepatektų į akis ir ant atvirų žaizdų. Panaudojus geliu, kruopščiai nusiplauti rankas. Pakuočės lapelio peržiūros data: 2022 sausio mėn. **Reklamos teksto parengimo data:** 2605_SB_Kamistad_V01_LT

„KAMISTAD N“ – PAGALBA ESANT BURNOS GLEIVINĖS UŽDEGIMUI!



Jamieson™

NATURAL SOURCES | SINCE 1922

JAMIESON turi ilgametę patirtį - savo produkciją eksportuoja po visą pasaulį jau nuo 1922 metų. JAMIESON naudoja išskirtinę „360 Pure“ technologiją, kuri apima net 360 gamybos proceso kontrolės etapų.

-40%

„JAMIESON“ MAISTO PAPILDAMS



Pagaminta Kanadoje

Vitaminai ir mineralai visai šeimai

-40%



WALMARK

MAISTO PAPILDAI

NAUJIENA! „Walmart NutriPack Immuno“ – tai keturių vitaminų ir mineralų rinkinys, supakuotas į patogius kasdienius paketėlius – lengva naudoti ir pasiimti visur su savimi.

1 paketėlyje yra: vitamino D 4000 IU kapsulė, prailginto veikimo vitamino C 600 mg tabletė, cinko tabletė ir seleno su juodųjų pipirų ekstraktu tabletė. Vitaminai D ir C, cinkas bei selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. 1 paketėlis – kasdienis tavo imuniteto skydas!

NAUJIENA! „Vitaminai D3 + K2“ – aliejuje mikrokapsuluoti vitaminai D ir K užtikrina gerą bioaktyvumą, stabilumą ir tikslią bei vienodą maistingųjų medžiagų dozę kiekvienoje kapsulėje. Vitaminų poveikis išlieka ilgiau, nes jie veikia palaipsniui ir ilgesnį laiką. Patentuota vitamino K2 technologija „Mena07“!

„Super Vitaminas C“ – prailginto veikimo vitaminas imunitetui. Papildytas erškėtuogių vaisių milteliais, kurie padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir kvėpavimo takų veiklą.

„Mega Vitaminas D 4000 IU“ – didelė dozė vitamino D imunitetui, kaulams ir dantims. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei normalią kaulų ir dantų būklę. Taip pat padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsavinimą. 2601_SB_Walmart_V01_LT.

„WALMARK“ – ŽYDĖK SVEIKATA! VITAMINAI IR MINERALAI VISAI ŠEIMAI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

Plaukams

-40%



HAIR VOLUME

MAISTO PAPILDAI

Netenkina plaukų būklė? Jie atrodo ploni ir nušūre? Maisto papildai plaukams „Hair Volume™“ gali būti tai, ko reikia, norint turėti vešlius, žvilgančius ir sveikai atrodančius plaukus! „Hair Volume™“ tabletės ir gumukai suteikia mitybinių medžiagų galvos odai ir plaukų folikulams, kur ir formuojasi plaukai. Sudėtyje yra biotino, cinko, kurie padeda palaikyti normalią plaukų būklę. Taip pat ypatingo „Annurca“ veisles obuolių ekstrakto, kuriame randama biologiškai aktyvios medžiagos procianidino B-2. Tik 1 tabletė ar 2 gumukai obuolių skonio gumukai per dieną padės puoseletį jūsų plaukus.

PASTEBIMAI VĖŠLENI, STORESNI IR LABIAU ŽVILGANTYS PLAUKAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-40%



LISTERINE

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Burnos skalavimo skysčiai LISTERINE padeda saugoti dantis nuo apnašų, palaiko gaivų burnos kvapą. Pasiekia vietas, kurių dantų šepetėlis negali pasiekti. **SU ŠEPETĖLIU TIK PUSĖ DARBO - NAUDOK IR „LISTERINE“**

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-40%



HI GENIE!

KOSMETIKOS PRIEMONĖS, MEDICINOS PRIEMONĖS


*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



◀ SKENUOKITE QR KODĄ IR
NORFOS VAISTINĖS
LEIDINIUS VARTYKITE
TELEFONE.



-40%

**EPITOME**

CARDIOVASCULAR FORMULA 90 kapsulių **36⁹⁹ 22¹⁹ €**
 RESVERATROL 200 mg, 30 kapsulių **49⁹⁹ 11⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

-40%

**AMBIO**

ŽUVŲ TAUKAI 250 kapsulių **24⁸⁹ 14⁹³ €**
 MAGNIS mielių geriamajam tirpalui, 30 paketėlių **44⁴⁹ 6⁸⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

IKI -40%

**MICROLIFE**

BP B2 BASIC automatinis kraujospūdžio matuoklis **76⁹⁹ 42⁵⁹ € -40 %**
 BP B3 COMFORT PC automatinis kraujospūdžio matuoklis **89⁹⁹ 53⁹⁹ € -40 %**
 BP B6 CONNECT automatinis kraujospūdžio matuoklis **99⁹⁹ 59⁹⁹ € -40 %**
 NEB 200 inhaliatorius **72⁹⁹ 47⁰⁵ € -35 %**
 NEB 400 inhaliatorius, mėšiuokas **79⁹⁹ 47⁹⁹ € -40 %**
 OXY 300 pulsoksimetras **49⁹⁹ 32⁴⁹ € -35 %**
 NC 200 skaitmeninis bekontaktis termometras **47⁹⁹ 28⁷⁹ € -40 %**

MEDICINOS PRIETAISAI

„MICROLIFE“ INOVATYVIOS TECHNOLOGIJOS

-30%

**ARTILANE**

MAISTO PAPILDAI

Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno susidarymą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. **Cinkas** padeda palaikyti normalią plaukų, nagų, odos būklę, atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese. **Magnis** padeda išlaikyti elektrinių pusiausvyrą, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, normalią raumenų funkciją, normalią baltymų sintezę, normalią kaulų būklę, normalią nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

*Akcija taikoma geltona etiketė pažymėtomis prekėmis

KRAJOTAKAI IR ATMINČIAI11⁹⁹ €**GINKOBIL 120 mg, 40 kietųjų kapsulių**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 120 mg rafinuoto ir kiekybiškai įvertinto ginkmedžių lapų sausosios ekstrakto. **Indikacijos:** lengvo ir vidutinio smegenų kraujotakos nepakankamumo, pasireiškiančio susilpnėjusia atmintimi ir dėmesio koncentracija, spengimu ar ūzmu ausyse, triukšmu galvos skausmu, simptominiu gydymu. **Prevencinio arterinio užkomo (proterapinio albumino) simptomatinis gydymas.**

VEIKSMINGAI GERINA SUTRIKUSIĄ KRAJOTAKĄ!**KAULAMS STIPRINTI**NUO 4⁹⁹ €**CALCIGRAN**

500 mg/200 TV, 30 kramtomųjų tablečių **4⁹⁹ €**
 500 mg/200 TV, 100 kramtomųjų tablečių **9⁹⁹ €**
 FORTE 500 mg/400 TV, 60 kramtomųjų tablečių **9⁹⁹ €**
 FORTE LEMON 500 mg/800 TV, 60 kramtomųjų tablečių **11⁹⁹ €**
 SINE 500 mg, 100 kramtomųjų tablečių **8⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Sudėtis: 1 tablete yra 500 mg kalcio (kalcio karbonato pavidalu), o 1 „Calcigran“, „Calcigran Forte“ ir „Calcigran Forte Lemon“ tableteje taip pat yra 200, 400 arba 800 TV vitamino D3 (cholekaliferolio). **Indikacijos:** priklausomai nuo vaistinio preparato sudėties, kalcio arba vitamino D ir kalcio trūkumui išvengti ir gydyti. Kaip papildomas vaistas ligoniams, kurie gydomi specifiniais vaistais nuo osteoporozės ir kuriems yra kalcio arba vitamino D ir kalcio stokos pasireiškimo pavojus. „Calcigran Sine“ taip vartojamas fosfatams surišti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Calcigran“ ir „Calcigran Sine“ suaugusiems vartoti po 1 tablete 1-3 kartus per parą, vaikams – po 1 tablete 1-2 kartus per parą. „Calcigran Forte“ dozė fosfatams surišti yra nustatoma gydytojo. „Calcigran Forte“ suaugusiems vartoti po 1 tablete 2 kartus per parą, vaikams ir paaugliams nelinka. „Calcigran Forte Lemon“ suaugusiems vartoti po 1 tablete 1 kartą per parą, vaikams ir paaugliams nelinka. **Kontraindikacijos:** alergija veikliąjam arba bet kuriai pagalbinei šių vaistų medžiagai. Sunkus inkstų funkcijos sutrikimas. Jeigu padidėjęs kalcio kiekis kraujyje (yra hiperkalcemija) ar (ir) šlapime (yra hiperkalcūrija), inkstuose formuojasi akmenys. „Calcigran“, „Calcigran Forte“ ir „Calcigran Forte Lemon“ taip pat negalima vartoti jeigu yra padidėjęs vitamino D kiekis kraujyje. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai vartoti jeigu gydotės ilga laiką, ir ypač jeigu kartu vartojate diuretikų (vaistų, vartojamų aukštam kraujospūdžiui arba pabrėžimams gydyti) arba širdį veikiančių glikozidų (vaistų, vartojamų širdies ligoms gydyti); yra inkstų funkcijos sutrikimo požymių arba turite ryškų polinkį inkstų akmenų formavimuisi; sergate osteoporozė ir negalite vaikščioti. „Calcigran“, „Calcigran Forte“ ir „Calcigran Forte Lemon“ taip pat reikia vartoti atsargiai jeigu sergate imuninės sistemos sutrikimu, dėl kurio gali padidėti vitamino D kiekis kraujyje ir jeigu vartojate kitų vaistų, kuriuose yra vitamino D. Sudėtyje yra izomaltolito. Jeigu gydytosis Jums yra saikes, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „Calcigran“, „Calcigran Forte“ ir „Calcigran Forte Lemon“ sudėtyje taip pat yra sacharozės, kuri gali kenkti dantims. Reklamos teksto parengimo data 2025-12-11.

Dovana sveikatai



Daugiau informacijos bei vaistinių, kuriose negalima įsigyti
dovanų kuponų ir jais atsiskaityti, sąrašą rasite

www.nvaistine.lt

2 UŽ 1 KAINĄ

Akims



OCUVAL

MAISTO PAPILDAI

Akių drėgmei palaikyti – ypač jautrioms, pavargusioms ir daug dirbančioms akims – išbandykite „Ocual Hydro Max“. Normaliam regėjimui išsaugoti ir akių sveikatai palaikyti rinkitės „Ocual Strong“. Vaizdo aiškumui, normaliai akių būklei palaikyti – daug dirbant ar mokantis – atraskite „Ocual“ tabletes.

„OCUVAL“ – MATYK, KAI LABIAUSIAI REIKIA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

Vitamino D3 šaltinis



OLIDETRIM®

2000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių **10⁹⁹ €**
 4000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių **14⁹⁹ €**
 2000 TV, 60 minkštųjų kapsulių **11⁴⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

Imunitetui – vitaminas D 2000 ir 4000 TV.
 Širdžiai, smegenims – DHR+ EPR omega-3 rūgštys.
 Kaulams ir raumenims- vitaminai D ir K2.
 Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Omega-3 riebalų rūgšties DHR (dokozaheksaeno) ir EPR (eikozapentaeno) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą. Siekiant maksimaliai padidinti vitamino D papildito naudą, juos naudinga vartoti kartu su vitaminu K2.

GERIAUSIA GYNYBA – STIPRUS IMUNITETAS.

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

Antiperspirantai



PERSPIREX

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Itin veiksmingi antiperspirantai „Perspirex“ skirti tiems, kam reikia specialių priemonių prakaitavimui mažinti. „Perspirex“ užtikrina geriausią rezultatą, siekiant apsaugoti nuo padidėjusio prakaitavimo ir prakaito kvapo. Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad antiperspirantai „Perspirex“ užtikrina ypatingą ilgalaikę apsaugą nuo prakaitavimo ir gali padėti išspręsti prakaitavimo bei prakaito kvapo keliamas problemas.

GYVENIMĄ KEIČIANTI APSAUGA.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



ORALFLUX

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Reguliariai naudojamas „Oralflux“ gaivina burnos kvapą. **Be alkoholio.** Inovatyvus dozatorius užtikrina tikslią skalavimo skysčio dozę ir ekonomišką naudojimą. „Oralflux“ turėtų būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė valant dantis. Naudojimas: noredami gauti 10 ml skysčio, švelniai paspauskite butelį, kol skystis atsirs virš pūrkimo prietaiso. Skalaukite burną skysčiu apie 1 min., išspjaukite. Kad poveikis būtų geresnis, nevalgykite ir negerkite 2 val. po skalavimo. Buteliukas turi INOVATYVŲ DOZATORIŲ – TIKSLŲ IR EKONOMIŠKĄ!

STIPRESNI DANTYS. GAIVESNIS KVAPAS. PLATESNĖ ŠYPSENA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMAI!

Inkstams ir šlapimo takams



FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS 30 kapsulių 12⁴⁹ €

MAISTO PAPILDAS

„Fitolizyna Nefrocaps PLUS“ yra unikalus 7 koncentruotų augalinių ekstraktų mišinys, kuris: – padeda palaikyti normalią inkstų ir šlapimo takų veiklą (petražolių šaknis, dirvinio asiūklėlio žolė ir paprastųjų varpučių šakniastiebiai, karpotųjų beržų lapai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė); – padeda palaikyti normalų vandens pašalinimą iš organizmo, todėl skatinamas nepageidaujamų metabolizmo produktų šalinimas su šlapimu (dirvinio asiūklėlio žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė). **Rekomenduojamas vartojimas:** 1 kapsulė 2 kartus per parą prieš valgį, užgeriant dideliu kiekiu vandens (ne mažiau kaip ½ stiklinės).

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



BELLA

HIGIENOS PRIEMONĖS

„BELLA“ higieniniai paketai ir kasdieniniai įklotai – ypač ploni, diskretiški, laidūs orui, su kvapo kontrolės sistema. Vatos gaminiai – iš 100% medvilnės.

UŽTIKRINTA APSAUGA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMAI!



LADY ANION

kasdieniniai įklotai su anijonų juostele, 24 vnt. **3⁶⁵ €**

HIGIENOS PRIEMONĖS

„Lady ANION“ higieniniai paketai ir įklotai su ekologiška medvilne ir anjonine juostele. Medvilnė sukuria komforto pojūtį, anjoninė juostelė kvapo kontrolę, laidūs orai, švelnus paviršius išlieka sausas. Rekomenduojami ginekologų. „Pantiliner“ – ploni įklotai kasdieniniam naudojimui.

„LADY ANION“ – TAVO KASDIENIS PASIRINKIMAS

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



OLIPROX

nagų lakas grybeliui (gelis vandens pagrindu), 12 ml **21⁴⁹ €**

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Oliprox“ nagų lakas (gelis vandens pagrindu) – veiksminga priemonė, padedanti užkirsti kelią grybelinei infekcijai bei pagalbinė priemonė gydant onichomikozę (nagų grybelį).

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMA!

VISIONACE

ORIGINAL 30 tablečių **25⁹⁹ €**
PLUS 28 tabletės / 28 kapsulės **32⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

VISIONACE – subalansuotas liuteino, melnylių ekstrakto, antioksidantų kompleksas. Sudėtyje esančios medžiagos padeda išsaugoti normalų regėjimą (cinkas, vitaminas A, B2), o antioksidantai – manganas, selenas palaiko ląstelių apsaugą nuo oksidacinių pažeidimų. VISIONACE tinka daug laiko praleidžiantiems prie kompiuterių ar TV ekranų, dirbantiems akims reikiu darbu, dažnai jaučiantiems akių nuovargį, vyresnio amžiaus žmonėms, devintiems kontaktinius lęšius. VISIONACE PLUS sudėtyje praturtinta omega-3 rūgštimis ir 12 mg liuteino.

VISIONACE – REGĖJIMO JĖGA!

Miegui ir nervų sistemai



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

NEUROMED

MAISTO PAPILDAI

Nuo šiol čiulpiamosios „Neuromed“ tabletės – ne tik nakčiai, bet ir ramiai dienai! Išbandykite NAUJIENA „Neuromed Anti-Stress“ – greičiau įsisavinamas, čiulpiamas tabletes, kurios padeda nusiraminti, suvaldyti stresą ir mėgautis akimirka be įtampos jausmo. Greitam užmigimui rinkitės „Neuromed Sleep“, o trigubo poveikio „Neuromed Sleep Forte“ padės ne tik greičiau užmigti, gerai išsimiegoti, bet ir ryte jausitės žvaliai.

„Neuromed Relax“ – streso kontrolei ir nervų sistemai. Vartoti jaučiant laikiną nervinę įtampą ir stresą. „Neuromed Good Mood“ su safranu ir kurkuminu – gerai nuotaikai, psichologinei funkcijai, nuovargiui mažinti. Vartoti patiriant ilgai užsitęsusį stresą, jaučiant nuovargį, apleidžiant pozityvius mintims.

KARTU Į RAMYBĘ SU „NEUROMED“!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis



1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMA!

BIOGAIA

PROTECTIS 10 kramtomųjų tablečių su vitaminu D3 **10⁹⁹ €**
PHARAX lašai, 5 ml **21⁹⁹ €**
PROTECTIS BABY lašai, 5 ml **18⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

„BioGaia Protectis“ lašai – saugus ir paprastas būdas papildyti kūdikį žarnyno mikroflorą nuo pirmųjų gyvenimo dienų, vos 5 lašai per dieną. „BioGaia Protectis“ kramtomosios tabletės su vitaminu D3 – patogus būdas palaikyti žarnyno mikroflorą ir imuninę sistemą, 1 apelsinų skonio tabletė per dieną, tinka suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų. „BioGaia Phaxar“ lašai – dvejojama pagalba burnos ir gerklės mikrobiotai; tinka vaikams nuo 6 mėnesių ir suaugusiems, vartoti po 5 lašus 2 kartus per dieną.



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

AMEDIPLUS

pleistras nuo lūpų pūselinės, 15 vnt. **16⁴⁹ €**

MEDICINOS PRIEMONĖ



1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMA!

VELYM

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Velym pH neutro“ – klinikiniais tyrimais patikrintas balinamasis dantų kremas. Kasdienė apsauga. Sudėtyje – natūralios kilmės medžiagos ir 1450 ppm fluoro. Skirtas suaugusiems.

„Velym Mineral O3“ sudėtyje – ozono prisotintas alyvuogių aliejus. Daugiau dėmesio dantenoms. Aukštas apnašų valymo koeficientas (angl. Pellicle Cleaning Ratio, PCR).

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

ODONTE tarpdančių siūlas su laikikliu, 50 vnt. **3⁹⁹ €**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖ

Urologiniai įklotai moterims



1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMA!

SENI LADY

HIGIENOS PRIEMONĖS

- Ploni
- Prailginti
- Diskretiški
- Su kvapo kontrolės sistema

PROFESIONALŪS UROLOGINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

IKI -35%

„MÖLLER'S“ ŽUVŲ TAUKAI IR OMEGA-3 KAPSULĖS

MAISTO PAPILDAI

„Möller's“ – tai šimtmečiui puoselejami žuvų taukai visai šeimai. „Möller's“ žuvų taukų kapsulės išsiskiria kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyviu medžiagų deriniais. Tyri ir gerai išvalyti „Möller's“ žuvų taukai puikiai tinka vartoti kasdien visą gyvenimą, įvairaus skonio krantomosiose zuvelėse „Möller's Junior“ yra omega-3 ir vitamino D – augančiam vaikų organizmui naudingų medžiagų.

OMEGA-3 EKSPERTA! JAU DAUGIAU NEI 170 METŲ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



AMBIO

ŠIRDŽIAI 30 kramtomųjų tablečių 9⁹⁹ €

OMEGA-3 FORTE 60 kapsulių 18⁹⁹ €

CHOLESTEROL BALANCE COMPLEX 90 kapsulių 32⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAI

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



NATASPIN

CONTROL PRO 90 kietųjų kapsulių 43⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAS

Teisingai cholesterolio kontrolei rinkintis 90 dienų kursas „NatAspin CONTROL PRO“.

Visu „NatAspin“ formuliu sudėtyje naudojami išskirtinai tik standartizuoti bioaktyvūs ekstraktai, kurie užtikrina fiksuotą veikliųjų medžiagų kiekį ir patikimumą.

„NATASPIN“ – TEISINGI SPRENDIMAI ŠIRDŽIAI, KRAUJOTAKAI, GLIUKOZĖS IR CHOLESTEROLIO KONTROLEI.

KOJŲ VENOMS

NUO 14⁹⁹ €

VENORUTON

FORTE 500 mg, 30 tablečių 14⁹⁹ €

1000 mg, 15 šnypščiančių tablečių 16⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje „Venoruton forte“ tabletyje yra 500 mg O-(β-hidroksietil)-rutozidų; kiekvienoje Venoruton šnypščioje tabletyje yra 1000 mg O-(β-hidroksietil)-rutozidų (HR). **Indikacijos:** lėtinio venų nepakankamumo simptomams (edemos, kojų nuovargio, sunkumo, skausmo, mėšlungio, parestezijos lengvinti, hemorojus simptomams mažinti. Papildomam diabetinės retinopatijos (diabeto komplikacijos tinklainės kraujagyslių pažeidimo) ir limfos sąstovio gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Venoruton forte“ – 1 tablete 2 kartus per parą; Venoruton šnypščiosios tabletės: 1 tablete – 1 karta per parą. Venoruton neskirtas vartoti vaikams. Dozavimas, esant visoms indikacijoms, pateikiamas pakuotės lapelyje arba www.vk.lt. **Kontraindikacijos:** alergija veikliąjai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** negalima vartoti, jeigu yra kojų edema dėl širdies, inkstų arba kepenų ligių. Venoruton 1000 mg šnypščiuoju tablečių sudėtyje yra kalio ir natrio. Reklamos teksto parengimo data 2023 balandžio mėn. 2605_SB_Venoruton_V01_U1.

IKI -40%



OILESEN

MAISTO PAPILDAI

„Oilesen D3“ – grynas vitaminas D dėl geresnio pasisavinimo ištirpintas natūraliuose aliejuose lašiuokis arba kapsulėmis. Be konservantų, paprasta vartoti. „Oilesen D3 400“ – 1 lašė yra 400 TV vitamino D, ištirpinto extra virgin alyvuogių aliejuje. Tinka kūdikiams nuo pirmos gimimo dienos. Paprasta dozoti pipete.

„Oilesen D3 1000“ – 1 kapsulėje yra 1000 TV vitamino D ištirpinto extra virgin alyvuogių aliejuje. Tinka vartoti vaikams nuo 3 metų.

„Oilesen D3 Forte“ – 1 kapsulėje yra net 4000 TV vitamino D₃, ištirpinto kanapių aliejuje. Tinka vartoti žmonėms, turintiems padidintą vitamino D poreikį, pavyzdžiui, vyresniems.

„Oilesen D3 su juodųjų ikry aliejumi“ – 1 kapsulėje yra 4000 TV vitamino D, ištirpinto juodųjų ikry aliejuje. Itin vertingas gerai savijautai.

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų būklę, normalią raumenų ir kau funkciją. Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją lastelių dalijimosi procese.

Oilesen D3+K2 su kanapių aliejumi N60 - Itin vertinga sudėtis, apjungianti 3 svarbius gerai savijautai komponentus: 75 mcg vitamino K2 sinergiškai veikiančio su 4000 TV vitamino D3 ir 500 mg kanapių sėklų aliejumi.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-30%



SMARTHIT IV® FERRUM

EFEKTYVAUS PASISAVINIMO MAISTO PAPILDAI

„SMARTHIT IV“^{***} geležis pagaminta taip, kad nesukeltų šalutinių reiškinų ir būtų pasisavinama kelis kartus efektyviau. „SMARTHIT IV“ Ferrum[®] galima rinkintis kapsulėmis arba skystą.

„SMARTHIT IV“ Ferrum[®] 1 kapsulėje yra 28 mg mikrokapsuliuotos geležies. Tinka suaugusiems ir vaikams nuo 12 metų.

„SMARTHIT IV“ Ferrum Strong[®] – stipresnis, išmanus ir kompleksinis sprendimas, padedantis efektyviai palaikyti geležies atsargas organizme. 2 kapsulės – 40 mg mikrokapsuliuotos geležies versija su bioaktyvia folio rūgštimi bei aminorūgštimi L-histidinu.

„SMARTHIT IV“ Ferrum Liquid[®] – 5 ml skystis yra 14 mg mikrokapsuliuotos geležies. Tinka suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų.

„SMARTHIT IV“ Lactoferrin[®]. Laktofeinas yra natūraliai organizme aptinkamas geležį surišantis glikoproteinas. Naudojant patentuotą technologiją „Miosol“[®] pagaminamos mikrokapsulės, į kurias įterpiamos geležies molekulės. Mikrokapsulių tikslas – apsaugoti veikliąją medžiagą nuo skrandžio rūgščių ir užtikrinti, kad jos pasiektų plonąją žarną. Šis technologinis sprendimas leidžia kelis kartus pagerinti veikliosios medžiagos pasisavinimą ir sumažinti įprastai geležiai būdingus šalutinius poveikius. Geležis svarbi, nes padeda palaikyti normalų hemoglobino ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą bei padeda palaikyti normalų deguonies pamešimą organizme.

„SMARTHIT IV“ FERRUM[®] – GELEŽIS, KURI PASIEKIA TIKSLĄ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

NORMALIAI GLIUKOZĖS KONCENTRACIJAI

-30%

SUGAR CUT BERBERINE 60 tablečių 26⁹⁹ 18⁸⁹ €MULBERRY 60 tablečių 28⁹⁹ 20⁰¹ €

MAISTO PAPILDAI

Nėra gerai, kai cukraus kiekis kraujyje yra nuolat padidėjęs, todėl svarbu, kad jo kiekis būtų normalus. Deja, daug žmonių nežino, ar jų gliukozės kiekis kraujyje yra normalus.

„Mulberry“[™] ir „Sugar Cut“[™] Berberine[®] sudėtyse esančios medžiagos padeda palaikyti normalią angliavandenių apykaitą ir gliukozės koncentraciją kraujyje. Šių medžiagų lapų ekstraktas padeda palaikyti normalią angliavandenių apykaitą organizme, o chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Taip pat svarbu įvairi, subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

PALAIKYKITE NORMALIĄ GLIUKOZĖS KONCENTRACIJĄ KRAUJYJE!

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



AMBIO
VIRŠKINIMO FERMENTAI 12 kramtomųjų tablečių **4,99 €**
MAISTO PAPILDAS

6²⁵ €



ESPUMISAN 240 mg, 20 minkštųjų kapsulių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veiklioji medžiaga: 1 minkštąjoje kapsulėje yra 240 mg simetikono. **Terapinės indikacijos.** „Espumisan“ vartojamas su dujomis susijusiems virškinimo trakto sutrikimams, pvz., dujų kaupimuisi virškinimo trakte ar vidurių pūtimu, pilnumo pojūčiu, simptomškai gydyti; kaip pagalbini priemonė atliekant pilvo ertmės organų diagnostines procedūras, pvz., rentgeno ar ultragarso (sonografijos) tyrimus. „Espumisan“, 240 mg, skirtas vartoti suaugusiems nuo 15 m. ir suaugusiems. **Kontraindikacijos.** „Espumisan“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija simetikonui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Išpėjimai ir atsargumo priemonės.** Pastarūkie su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Espumisan“. Jei atsiranda naujų virškinimo veiklos sutrikimų ir (ar) jei išlieka 3 dienas, reikia pasitarti su gydytoju, nes reikia nustatyti šių sutrikimų priežastį, taip pat ar nėra kitos galimos ligos, dėl kurios reikia gydyti. **Dozavimas.** Rekomenduojama dozė suaugusiems nuo 15 m. ir suaugusiems: savarankiškai gydanis dėl su dujomis susijusių virškinimo trakto negalavimų (pvz., dujų kaupimuisi virškinimo trakte, vidurių pūtimu, pilnumo pojūčiu) – po viena „Espumisan“ kapsulę po kiekvieno pagrindinio valgyimo (pietu ir vakarienės); kaip pagalbini priemonė atliekant pilvo srities diagnostines procedūras (pvz., rentgeno ar ultragarso (sonografijos) tyrimus) gydytoju nurodymu – viena „Espumisan“ kapsulė dieną prieš tyrimą. „Espumisan“ reikia išgerti po pagrindinio valgyimo, užgeriant stikline vandens. **Priekeis.** „Espumisan“ galima vartoti tol, kol yra nusiskundimų. Be to, jeigu reikia, „Espumisan“ gali būti vartojamas 30 dienų. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 1947, LT@berlinchemie.com. LT-ESP-1-2026. MFLOW, 2026/02.

KAI PUČIA PILVĄ!

NUO PILVO PŪTIMO

-20%




SIMETIGAST FORTE, SIMETIGAST FORTE BABY
MEDICINOS PRIEMONĖS
„SIMETIGAST FORTE“ 240 mg kapsulės (simetikonas) skirtos vartoti vyresniems nei 12 m. pacientams, esant pilvo pūtimui, pilnumo jausmui pilve, raugėjimui. Taip pat galima naudoti prieš pilvo ertmės diagnostines procedūras, nes tai pagerina vaizdų kokybę. Vartoti: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. amžiaus jaunuoliai – po 1 kapsulę 2–3 kartus per dieną. Prieš diagnostines procedūras: 1 kapsulė vakare dieną prieš tyrimą ir 1 kapsulė ryte tyrimo dieną. „SIMETIGAST FORTE BABY“ geriamieji lašai (simetikonas) skirti kūdikiams nuo 28-os gyvenimo dienos ir vaikams iki 12 metų. Vartoti: kūdikiams (nuo 28-os gyvenimo dienos) ir vaikams iki 2 metų 3 lašai prieš, per ar po kiekvieno valgio. Negalima vartoti daugiau kaip 18 lašų per dieną.

GREITAI PAGALBA IŠPŪSTAM PILVUI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-20% **10^{38€}** **12^{12€}**



FORLAX FAST 6 mikroklizmas
MEDICINOS PRIEMONĖ
Medicinos priemonė „Forlax Fast“ – tai mikroklizma, skirta suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams, esant retkarčiais pasitaiknčiam vidurių raugėjimui. Jos sudėtyje yra glicerolio, vandens ir polisacharidų iš vaistinių svilarožių, turinčių šalinamąjį, minkštinamąjį ir raminaujamą poveikį. Priemonė minkština išmatą, palengvina išmatų pašalinimą ir mažina diskomfortą užkietėjus viduriams. Naudoti 1 tiesiąją žarną. Suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams. Pagal poreikį naudokite 1 mikroklizmą. Jei vidurių užkietėjimas nepaieina, skirkite 2 dozes iš eilės. Praneškite apie bet kokį rimtą įvykį, susijusį su medicinos priemone, vietiniam atstovui „Mayoly Baltics“, UAB, el. paštu vigilance.BAL@mayoly.com. Teksto peržiūros data 2024-07. Reklamos teksto parengimo data 2026-04-07. FFAST-LT-2026-0002

NUO 3⁴⁹ €



MEZYM
10000V, 10 skrandyje neiurių tablečių **3,49 €**
20000V, 20 skrandyje neiurių tablečių **7,49 €**
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
1 skrandyje neiurių „Mezym 10000V“ tablečių yra 80–110 U/ml kiekiu kiaušinių kasos miltelių, kurių aktyvumas atitinka ne mažiau kaip 10000 lipazės vienetų, 7500 amilazės vienetų, 375 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. 1 skrandyje neiurių „Mezym 20000V“ tablečių yra 160–2222 mg kasos miltelių (šiuo kiekiu kasos pagaminto pankreatino), kurių minimalus aktyvumas atitinka 20000 lipazės vienetų, 12000 amilazės vienetų, 900 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. „Mezym“ vartojamas tuomet, kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentus ir tai sukelia virškinimo sutrikimus. „Mezym“ vartoti negalima; jeigu yra alergija kasos milteliams, kiaušinių baltymams arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Šio vaisto negalima vartoti, jeigu jus sergate ūminiu kasos uždegimu (pankreatitu) arba jums patiriate lėtinis kasos uždegimas, kai ligos požymiai yra stipriai išreikšti. Specialūs išpėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju ir vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Mezym“. Častine fibrozė kartais gali komplikuotis žarnyno nepaieinamumu. Esant simptomų, panašių į žarnyno nepaieinamumo požymius, reikia apsvaistyti žarnyno susaurejimo galimybę. Jeigu pajutote neįprastą diskomfortą skrandyje ar žarnyne, pasitarkite nusiskundimų pobūdį, būtinai kreipkitės į gydytoją, kuris jus apžiūrės, kad atmetum žarnų padėtimų galimybę. „Mezym“ sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas yra saikes, kad netoleruotė kokiu nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „Mezym“ reikia būtina nuryti nelkramdus. „Mezym 10000V“ sudėtyje esantis dažiklis azorubinas (E122) gali sukelti alerginių reakcijų. Dozavimas. „Mezym“ visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. „Mezym“ dozes priklauso nuo virškinimo sutrikimų laipsnio, optimali dozė nustatoma individualiai. Jeigu nenorudytė kaip, vaigant išgeriamas 2–4 plevele dengtos „Mezym 10000V“ tabletes arba 1–2 plevele dengtos „Mezym 20000V“ tabletes. Dienos dozė: 5000–20000 lipazės vienetų kiekį atitinkanti Kūno svorio neturėtu būti viršijama. Dozės vaikams turi pasitikti gydytojas. Atsivėligant 1 maista ir virškinimo sutrikimu sunkuma, rekomenduojama dozė gali būti padidinta. Plevele dengtos tabletes nurijamos nekramtant ir užgeriant dideliu kieku skysčiu. Gydanis ilgą laiką, vartojimo trukmė nustato gydytojas. Vartojimo trukmė vaikams taip pat nustato gydytojas. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 1947, LT@berlinchemie.com. LT-MEZ-3-2025. MFLOW, 2025/12
„MEZYM“ PADEDA PAGERINTI SUTRIUKIŲ VIRŠKINIMĄ!

VIRŠKINIMO SISTEMAI

NUO 6⁹⁹ €



GUTTALAX
7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 15 ml **6,99 €**
7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml **10,99 €**
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
1 ml tirpalo (0,5 lašo) yra 75 mg natrio pikosulfato. **Indikacijos.** „Guttalax“ vartojamas, jei pacientas yra varginamas vidurių užkietėjimo; yra būklė, kai reikia palengvinti tuštinimą. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** „Guttalax“ geriamas vakare. Suaugusiems ir vyresniems nei 10 m. vaikams: 10–20 lašų per parą, 4–10 m. vaikams: 5–10 lašų per parą. Vartoti per burną. Rekomenduojama gydymą pradėti nuo mažausios dozės. Didžiausios rekomenduojamos paros dozės viršyti negalima. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs organinio jautrumas vaistams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; žarnų nepaieinamumas ar obstrukcija; stiprus pilvo skausmas ir (arba) karščiavimas dėl ūminės pilvo būklės (pvz., apendicito), galimai susijęs su pykinimu, vėmimu; ūminė uždegiminė žarnų liga; sunki dehidracija; jaunesni kaip 4 m. vaikai; retos paveldimos būklės, kurios gali būti nusiderinamos su preparato pagalbini medžiaga. **Specialūs išpėjimai.** Nenustatęs vidurių užkietėjimo priežasties, negalima vartoti nepaieinamumui kasdien ar ilgiai. „Guttalax“ pavartojusis žmonėms buvo buvęs svaigimo ir (arba) sinkopės atvejai. Vaikams be gydytoju nurodymo „Guttalax“ vartoti negalima. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas fruktozės netoleravimas. Nevartokite šio vaisto noredami numesti svorio. Teksto peržiūros data 2024-12. 2603_SB. Guttalax_V01_LT.
UŽKIETĖS VIDURIAMS VEIKIA PATIKIMAI IR NIEKAM NEPASTEIBINTI.

NUO 7⁹⁹ €



ENTEROL®
250 mg kietosios kapsulės, 10 kapsulių **7,99 €**
250 mg kietosios kapsulės, 20 kapsulių **11,99 €** **80**
250 mg kietosios kapsulės, 30 kapsulių **15,99 €**
250 mg milteliai geriamajai suspensijai, 10 paketėlių **8,99 €**
250 mg milteliai geriamajai suspensijai, 20 paketėlių **11,99 €**
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Saccharomyces boulardii CNCM 1-745.
„Enterol“ vartojamas kaip pagalbini ūminio viduriavimo priemonė kartu su kitais vaistais nuo viduriavimo. „Enterol“ vartojamas su antibiotikų vartojimu susijusio viduriavimo profilaktikai. **Vartojimo būdas:** kapsulės nuryti užgeriant gurkšniu vandens arba atidarytos kapsulės turinį supilti į nedidelį kiekį šaldinto gerimo ar į maistą. Mažems (iki 6 m.) vaikams kapsuliu negydyti, kad vaikas neušgugtų, bet jas atidarius turinį supilti į geriamą ar maistą. Miltelių geriamajai suspensijai pakeltilio turinį supilti į nedidelį kiekį vandens ar šaldinto gerimo, sumaišyti ir išgerti. Miltelius taip pat galima maišyti su maistu. Vaisto vartoti dar kelias paras, pasibaigus viduriavimo simptomams. **Dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems nei 2 m. amžiaus vaikams rekomenduojama dozė yra 1 kapsulė arba 1 paketėlis vartojami 1–2 kartus per parą. **Specialūs išpėjimai:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Enterol“. Pacientams, kuriems istatytas centrinės venos kateteris, pasitaikė pavieniu sistemines grybelines infekcijas atvejai. Šis vaistas nepakeičia rehidracijos (normalaus organizmo skysčių tūrio ir sudėties palaikymo), jei jos reikia. Kietųjų kapsulių sudėtyje yra laktozės monohidrata. Miltelių geriamajai suspensijai sudėtyje yra laktozės monohidrata, fruktozės ir sorbitolio. „Enterol“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu yra alergija miltelių grybeliui, ypač *Saccharomyces boulardii*; jeigu nuslopis imuninė sistema ar esate gydomas liginėje; jei esate kritinės sveikatos būklės arba jums yra istatytas centrinės venos kateteris; jeigu pacientas yra jaunesnis kaip 2 m. amžiaus vaikas. ID 1bc0a5f4. Reklamos teksto parengimo data: 2025-12-17.

PAGALBA NUO RĖMENS

5⁹⁰ €



NEXMEZOL
20 mg, 14 skrandyje neiurių tablečių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veiklioji medžiaga, stiprumas: vienoje tabletyje yra 20 mg ezomeprazolom. **Terapinės indikacijos:** vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refluksu simptomų gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti po 1 tabletyje per parą bet kuriuo paros laiku, valgio metu arba nevalgius. Tablečių nekramtyti ir netraisyti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ezomeprazolui (taip pat pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, omeprazolui) ar pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs išpėjimai:** sudėtyje yra sacharozės. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Ufės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2636307. El.paštas: info.lit@uania@sandoz.com. BS260107920. Reklamos teksto parengimo data: 2026 01 07.

ANTIALERGINIS VAISTAS

5¹⁵ €

OPEXA® 20 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Terapinės indikacijos: „Opexa“ vartojamas šienligės (kuriai būdingi simptomai yra čiaudulys, niežulys, sloga, užgulta nosis, paraudusios ar ašarojančios akys) ir kitų alerginio rinito formų simptomams slopinti. Jis taip pat gali būti vartojamas niežintiems odos išbėrimams (pūksliams arba dilgėlinei) gydyti. Kontraindikacijos: „Opexa“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija bilastinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs išėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jei Jums nustatytas vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų veiklos sutrikimas ir vartojate kitų vaistų. Neduokite šio vaisto jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Neviršykite rekomenduojamos dozės. Gydomo trukmė priklauso nuo jūsų ligos simptomų, trukmės ir eigos. Nevartokite „Opexa“ ilgiau nei 10 dienų nepasikonsultavę su gydytoju. Jei po 3 dienų jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Dozavimas ir vartojimo metodas: rekomenduojama dozė suaugusiems, įskaitant senyves žmones ir 12 m. bei vyresnius paauglius, yra 1 tabletė (20 mg) per dieną. Tabletę reikia nuryti ivalgius, 1 valandą prieš valgį arba sulčių gėrimą, arba praėjus 2 valandoms po valgyto arba sulčių gėrimo. Reklama paruošta 2024-10. LT_Ope_15_2024_pharma UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, Lietuva.

SUTRAMDYK ALERGIJĄ!

NUO ALEGIJOS

8⁹⁹ €

ALLERGODIL

0,05 % akių lašai (tirpalas), 6 ml
0,1 % nosies purškalas (tirpalas), 10 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

„Allergodil“, 0,1 %, nosies purškalas (tirpalas): 1 ml tirpalo yra 1 mg (0,1 %) azelastino hidroklorido. Terapinės indikacijos. Simptominis nuolatinis alerginės slogos arba sezoninės alerginės slogos (šienligės) gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas. Suaugusiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams įprastinė dozė yra 1 įpurškimas į šnervę 2 kartus per parą (ryte ir vakare). „Allergodil“ nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 6 m. vaikams. Vartoti į nosį. Pūrkiant vaistinio preparato į nosį, galvą reikia laikyti tiesiai. Vaistas tinka gydyti ilgą laiką. Nepasitarus su gydytoju, nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 4 savaites. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas azelastinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs išėjimai ir atsargumo priemonės. Nosies purškalas neskirias vartoti į akis. Vengti kontakto su akimis. Vartojant kartus su alkoholiu, gali pasireikšti papildomas buvimas sumažėjęs. „Allergodil“, 0,05 %, akių lašai (tirpalas): 1 lašas tirpalo yra 0,05 mg azelastino hidroklorido. 1 ml tirpalo yra 0,5 mg azelastino hidroklorido. Terapinės indikacijos. Simptominis suaugusiųjų ir vyresnių nei 4 m. amžiaus vaikų sezoninio alerginio konjunktyvito gydymas ir profilaktika. Simptominis suaugusiųjų ir vyresnių nei 12 m. vaikų nuolatinio (nesazoninio) alerginio konjunktyvito gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas. Abiem indikacijoms įprastinė dozė yra 1 lašas į kiekvieną akį 2 kartus per dieną. Smarkaus padmėjimo metu dozė gali būti padidinta iki 4 kartų per dieną po 1 lašą į kiekvieną akį. Gydomo ciklas neturėtų viršyti 6 savaites. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas azelastino hidrokloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Jaunesni kaip 4 m. vaikai. Specialūs išėjimai ir atsargumo priemonės. „Allergodil“ netinka akių infekcijoms gydyti. Sudėtyje yra benzalkonio hidroklorido, kuris gali sukelti akies sudirginimą, sausos akies simptomus ir gali daryti poveikį ašarų plovelei bei ragenos paviršiui. Turi būti atsargiai vartojamas sergantiesiems akies sausme ir jei yra ragenos padėmio pavojus. Prieš „Allergodil“ vartojimą kontaktiniai lęšiai turi būti išimti ir prieš įsidedant juos atgal reikia palaukti mažiausiai 15 minučių. Reklamos teksto parengimo data 2026-03-09.

4⁹⁹ €

LORATIN EXPRESS 10 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 10 mg loratadino. Terapinės indikacijos: simptominis alerginės slogos ir lėtinis idiopatinis dilgėlinės gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems negu 2 m. vaikams gerti po 1 tabletę per dieną. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas loratadinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nevartoti jaunesniems nei 2 m. arba svieriantiems mažiau kaip 30 kg vaikams. Specialūs išėjimai: vaista atsargiai reikia vartoti pacientams, kuriems yra sunkus kepenų veiklos sutrikimas. „Sanoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sanoz.com. BS2601069675. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

Pasūlymai galioja 2026 06 01 – 2026 06 30.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Nuolaidos taikomos prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą, kurio galite teirautis kiekvienoje vaistinėje, el. paštu evaistine@nvaistine.lt arba nemokamu tel. +370 800 10008. Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį/informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkvtt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkvtt.lt.

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Daugiau informacijos NORFOS vaistinėje, el. paštu evaistine@nvaistine.lt arba tel. +370 800 10008. Reklaminių teksto parengimo data – 2026 05 19.

-25%



NAVIVISION, NAVITAE, NAVI INFLA

NAVIVISION PLUS pavargusiųs akims, 15 ml 4⁹² 9⁷³ €NAVIVISION PLUS paraudusiųs akims, 15 ml 4⁹² 9⁷³ €NAVIVISION PLUS sudirgusiųs akims, 15 ml 4⁹² 9⁷³ €NAVITAE PLUS PF antioksidaciniai ir lubrikuojantys akių lašai, 10 ml 1⁸⁹ 14²³ €NAVI INFLA akių lašai konjunktyvito simptomams lengvinti, 15 ml 4⁹² 9⁷³ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

Navivision akių lašai – stipriai drėkinantys natūralūs akių lašai su natrilo hialuronatu 0,3 % pagrindinėms akių problemoms spręsti. Pavargusiųs akims – užtikrinta greitą ir ilgalaikį palengvėjimą esant sausų ir pavargusių akių pojūčiui. Sudirgusiųs akims – akių alergijos simptomams palengvinti bei pagrindinėms akių problemoms spręsti. Paraudusiųs akims – palengvina paraudusių ir pavargusių akių būklę, susijusią su konjunktyvitu (niežėjimas, ašarojimas, deginimas ir t.t.). Navitae Plus PF – antioksidaciniai poveikiu ir tepamosiomis savybėmis pasižymintys akių lašai su vitaminais A + E. Palengvina sausų akių sindromą ir akių diskomfortą, kurį sukelia: keratitas, šalutinis poveikis po ragenos operacijos, trauminės opos, ragenos uždegimas. Be konservantų. Navinfla – antioksidaciniai drėkinamieji akių lašai su natūraliais augaliniams ekstraktais skirti naudoti esant ūminiam, lėtiniam ar alerginiam konjunktyvitui. Lengvina su konjunktyvitu susijusius simptomus: ašarojimą, paraudimą ir niežėjimą.

„UNIMED PHARMA“ AKIŲ LAŠAI

NUO 7⁴⁹ €HYPROMELOZA-P 10 ml 7⁴⁹ €OCUFLASH 2 x 10 ml 9⁹⁹ €OCUHYL C 10 ml 11⁹⁹ €POTASSIUM-U 10 ml 7⁴⁹ €SEPTOZINC 10 ml 8⁹⁹ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Unimed Pharma“ – medicinos priemonių linija, skirta pagrindinėms akių problemoms spręsti. „SeptoZinc“ – pirmoji pagalba sudirgusioms akims. Idealiai tinka kaip plaušiamasis tirpalas dirginančioms dalelėms ir chemikalams iš akių išplauti. „Ocuflysh“ – sudėtyje esantis cinko gliukonatas turi dezinfekuojamąjį (antibakterinį ir antivirusinį) poveikį. „Potassium-U“ drėkinamasis izotoninis akių tirpalas su kalio jodidu. Naudojamas akims drėkinti, skatinant tam tikrus rezorbcijos procesus akyje (ypač esant eksudatui, stiklakūnio kraujavimui ar įvairių priežasčių sukeltai kataraktai). „Hypromelozą-P“ drėkinamoji ir apsauginio poveikio priemonė, naudojama ašarų gamybos trūkumui kompensuoti. „Ocuhyl C“ turi drėkinamąjį, raminamąjį ir tepamąjį poveikį. Akių lašuose esantis medetkų ekstraktas apsaugo akies epitelį, slopina juo uždegimą ir skatina regeneraciją.

SVEIKAS ŽVILGSNIS Į PASAULĮ!

BE KONSERVANTŲ

-20%



OCUTEARS

ALO+ 0,2 %, oftalmologinis tirpalas, 10 ml 4⁵⁹ 12⁷⁸ €HYDRO+ 0,2% lašai, 10 ml 4⁴⁹ 11⁹⁸ €

AKIŲ LAŠAI

„Ocutears“ ALO+ sudėtyje esantis alavijai turi akiai paraudimą ir paburkimą mažinantį, antimikrobinį, priešuždegiminį, žaizdų gijimą skatinantį, antioksidacinį poveikį. Alavijai stiprina hialonono drėkinamąjį ir regeneracinį poveikį, užtikrinami dar ilgiau trunkantį komfortą ir akies paviršiaus apsaugą.

„OCUTEARS“ ALO+ IR „OCUTEARS“ HYDRO+ – EFEKTYVI IR ILGALAIKĖ APSAUGA SAUSOMS AKIMS BE KONSERVANTŲ.



PERŠALIMO IR GRIPO SIMPTOMAMS LENGVINTI

NUO **5⁹⁹** €



GRIPEX

325/30/10 mg, 12 pėvele dengtų tablečių **5⁹⁹ €**
 325/30/10 mg, 24 pėvele dengtos tabletės **8⁹⁹ €**
 500/30/15 mg, 10 pėvele dengtų tablečių **6⁹⁹ €**
 500/30/15 mg, 20 pėvele dengtų tablečių **9⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tableteje „Gripex 500/30/15 mg“ yra 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidroklorido, 15 mg dekstrometorano hidrobromido. 1 tableteje „Gripex 325/30/10 mg“ yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidroklorido, 10 mg dekstrometorano hidrobromido. **Terapinis indikacija:** peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Gripex 500/30/15 mg“ suaugusiems po 1-2 tabletes 3-4 kartus per parą, „Gripex 325/30/10 mg“ suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams įprasta dozė yra 2 tabletes 3-4 kartus per parą, kas 4-6 val. tada, kada reikia. Neviršyti vienkartines 2 tablečių dozes. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. **Kontraindikacijos:** negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šių vaistų sudedamajai medžiagai; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; smarkiai padidėjęs kraujospūdis; chroniškas alkoholizmas. Negalima vartoti kartu su monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI) arba anksčiau negu 2 savaites baigus juos vartoti. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** esant sutrikusiai kepenų funkcijai, sergant alkoholizmu, sutrikus mitybai yra didesnis kepenų toksinio pažeidimo pavojus. Gydančias šiais vaistais, nepartaria vartoti alkoholio. Jeigu per 3 dienas juos saviužiai nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2025-03-31.

„GRIPEX“ VEIKIUI!

NUO **6⁹⁹** €



GRIPEX THERMAL

1000/100/12 mg, milteliai geramajam tirpalui, 8 paketėliai **7⁹⁹ €**
 1000/100/12 mg, milteliai geramajam tirpalui, 12 paketėlių **9⁹⁹ €**
 650/50/10 mg, milteliai geramajam tirpalui, 8 paketėliai **6⁹⁹ €**
 300/20/5 mg, milteliai geramajam tirpalui 12 paketėlių **8⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: (1 paketėlyje) „Gripex Thermal 300/20/5 mg“: 300 mg paracetamolio, 20 mg askorbo rūgšties, 5 mg fenilefrino hidroklorido; „Gripex Thermal 650/50/10 mg“: 650 mg paracetamolio, 50 mg askorbo rūgšties, 10 mg fenilefrino hidroklorido; „Gripex Thermal 1000/100/12 mg“: 1000 mg paracetamolio, 100 mg askorbo rūgšties, 12 mg fenilefrino hidroklorido. **Terapinis indikacija:** peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. „Gripex Thermal 300/20/5 mg“: 6-12 m. vaikams: 1 paketėlis kas 4-6 val.; suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams: 1-2 paketėliai kas 4-6 val. „Gripex Thermal 650/50/10 mg“ arba „Gripex Thermal 1000/100/12 mg“: suaugusiems ir vyresni nei 12 m. vaikai: po 1 paketėlį kas 4-6 val. Nepasirte su gydytoju, nevatokite ilgiau nei 7 d. Nevatokite didesnes nei rekomenduojamas dozes. Pasakykite gydytojui, jei jūs ir inkstų ar kepenų veiklos sutrikusi ar nuolat vartojate alkoholi. **Kontraindikacijos:** alergija veikliosios ar pagalbinės medžiagoms, taip pat vaistams, kurių sudėtyje yra simpatomimetinių amonių; širdies ligos, padidėjęs kraujospūdis, gliukozės 6-fosfordehidrogenazės arba metilmeloidino reduktazės stoka; sunkus kepenų ar inkstų nepakankamumas, tiroksinozė; šlapimo užstailėjimas arba feochromocitoma; zidovudino, MAO inhibitorių vartojimas, nėštumas ar kūdikio žindymas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarite su gydytoju, jei sergate kepenų arba inkstų nepakankamumu, bronchine astma, prostatos hiperplazija, Reino sindromu (rankų ar kojų pirštų, ausies kraštų ir nosies galiuko išdykimas, dažnai sukeltas šalčio arba emocijų streso), cukriniu diabetu. Reklamos teksto parengimo data 2025-05-09.

„GRIPEX THERMAL“ VEIKIUI!

GERKLĖS PERŠĖJIMUI IR UŽKIMIMUI LENGVINTI

IKI **-35%**



ISLA®

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Isla“ pastilių su islandinėmis kepenomis sudedamosios dalys padengia gleivines, gerklę ir ryklę kalp bazamas. Tokių būduo sudirgusi gleivinė apsaugoma nuo tolesnio dirginimo ir greičiau atsigauja dėl malonaus pastilių poveikio, ypač esant užkimmui ir peršūtinai gerklei. „Isla Moos“, „Isla Mint“, suaugusieji ir vyresni kaip 4 metų vaikai turi lėti sučiūpti 1-2 pastiles keletą kartų per dieną pagal poreikį. „Isla Junior“: vyresniems kaip 4 metų amžiaus vaikams pagal poreikį galima duoti lėti sučiūpti iki 6 pastilių per dieną. Reikia įstikinti, kad vaikai jau sugeba kontroliuojamai čiūpti pastile. „Isla Medic Acute“: suaugusiems ir vyresniems kaip 6 metų vaikams pagal poreikį galima sučiūpti iki 6 pastilių per dieną. Reklamos teksto parengimo data 2026-02-09, PM-LI-2026-2-709

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

7⁹⁷ €

ILOXEN 200 mg/30 mg 12 pėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos ir stiprumas: kiekvienoje pėvele dengtoje tableteje yra 200 mg feno ir 30 mg pseudoefedrino hidroklorido. **Terapinis indikacija:** „Iloxen“ vartojamas kaip suaugusiųjų ir 15 m. bei vyresnių paaujų peršalimo (nosies užgulimas, pasireišęs kartu su galvos skausmu ir (arba) karščiavimu) simptomams gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tablete reikia nuryti nepažeidžiant ir nekramtyti, užgeriant didele stikline vandens, geriausia - valgio metu. **Suaugusiems ir 15 m. bei vyresniems paaujiamis:** po 1 tablete kas 6 val. pagal poreikį. Jeigu simptomai išreikšti stipriau: po 2 tabletes kas 6 val. pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 6 tabletes per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios ar pagalbinės šio vaisto medžiagoms, pacietas yra valkas iki 15 m. moterims trečia nėštumo trimestras, žindymo laikotarpis, anksčiau pasireišė alerginė reakcija arba dusulys, astma, širdies, nosies kraujagyslių ir kraujagyslių varžymas arba veido patinimas, suvėli acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NNU), virškinimo trakto kraujavimas arba perforacija, anksčiau pasireišė vartojant NNU, skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa ar kraujavimas arba anksčiau buvę 2 arba daugiau aktyvių paritvintios opos ar kraujavimo epizodai; sunkus kepenų nepakankamumas, sunki ūminė ar lėtinė inkstų liga arba sunkus ūminis ar lėtinis inkstų nepakankamumas, sunkūs širdies nepakankamumas; sunkus širdies arba kraujagyslių sutrikimas (širdies liga, aukštas kraujospūdis, kritinės angina, padidėjęs širdies susitraukimas), padidėjęs širdies kraujotakumas, diabetas arba feochromocitoma (antinksčių navikas); jei anksčiau patyrė širdies priepuolį (miokardo infarktą); patyrė insultą arba gydytojas yra Jums sakes, kad turite padidėjusio insulto riziką; yra labai padidėjęs kraujospūdis arba jeigu hipertenzija nesugebėjusia skiriant vaistus, jei Jums yra buvę traukulių, dėl neskaus priepuolių sutrikus kraujo gamybai; padidėjęs akispūdis (sergant užtaro kamno glaukoma); pasunkėjęs šlapinimasis dėl prostatos sutrikimų; glaukoma (suformuota šlapimo rūgšties; negalima vartoti kartu su kitais vaistais nuo nosies užgulimo, melnėdūniu, kai kuriais vaistais nuo depresijos). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Iloxen“ reikia vengti vartoti kartu su kitais NNU. Pastaritie su gydytoju arba vaistininku, jei sergate bronchiu astma, cukriniu diabetu, psichoze, yra padidėjęs širdies kraujotakumas, yra buvęs koks nors virškinimo trakto sutrikimas ar sergate ar sirgote virškinimo trakto liga, padidėjęs kraujospūdis, neveikė instalai ar kepenys, sutrikęs kraujo krejėjimas, sergate infarkine liga, sergate širdies liga, skaitant širdies nepakankamumą ir kritinės angina (kritinės skausmas), arba jeigu anksčiau Jus buvo iškęs širdies priepuolis, atlikta kraujagyslių šuntavimo operacija, sergate periferiniu arterijų liga arba Jus buvo iškęs bet koks insultas, jeigu padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje, Jūsų šeimos nariai serga ar sirgo širdies liga ar insultu, rikote. **Nutraukti „Iloxen“ vartojimą ir susisiekti su gydytoju arba slaugytoja kreipkitės pagalbos, jei pasireiškia staigus pilvo skausmas, kraujavimas iš žarnynų, žarnos ar kitų šerminių kilitų simptomai, jei Jums pasireiškia odos išbėrimas, gleivinių pažeidimas, odis ar kitų gleivinių pažeidimai, jeigu staiga pasirodė regėjimo, jeigu Jums pasireiškia užpakalinis gripotomosos encefalopatijos sindromas (UES) ar gripotomosos smegenų vazokonstriktijos sindromas (SVS) simptomų: stiprus staigus praeidėjęs galvos skausmas, pykinimo jausmas, vėmimas, sumišimas, traukuliai, pakitus rega. Reklamos teksto parengimo data: 2024-12**

DVIGUBAS SMŪGIS SINUSITUI!

6⁹⁹ €

NUO **7⁴⁹** €

IKI **-30%**



URGO

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Urgo“ pleistrai - inovatyvūs produktai padės prižiūrėti paviršines žaizdas. Tai patogūs, alergijs nesukeliantys bei onai pralaidūs pleistrai, kurių nelipni pleistro pagalvėlė impregnuota antiseptiniu tirpalu, žaizdes saugant nuo bakterijų. „Urgo Filmogel“ geliai - naujos kartos technologija pažeistiems nagams, pselnei, burnos žaizdoms, gelis odos įtrūkimams ir purškiamas pleistas mažems odos įtrūkimams. „URGO“ - PLEISTRŲ EKSPERTAI JAU 60 METŲ. PRIŽIŪRIMOS ŽAIZDOS GYJA GREIČIAU!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

NUO **14⁹⁹** €

KETOCONAZOL-RATIOPHARM

20 mg/ml, šampūnas, 120 ml

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 mililitre šampūno yra 20 mg ketokonazolo. **Terapinis indikacija:** Galvos seborėjos ir pleiskanojimo (*pityriasis capitis*) gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** „Ketoconazol-ratiopharm“ šampūnas vartojamas paaujiamis ir suaugusiems pacientams. Plaukiant galva plaukai įtrinami „Ketoconazol-ratiopharm“ šampūnu ir paliekama veikti 5-10 min., prieš nuplaunant vandeniu. Gydymas. Galvos oda ir plaukai gydomi 2 kartus per savaitę. Gydymo kurso trukmė - 2-4 savaitės. Profilaktika. Norint išvengti simptomų pasikartojimo, plaukai ir galvos oda šio šampūno turi būti plaujami karta per savaitę arba kas antra savaitė. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Reikia saugotis, kad šampūno nepatektų į akis. Patekus į akis, jas reikia gerai praplauti vandeniu. Pleiskanojimas ir seborėjinis dermatitas dažnai būna susiję su plaukų slinkimu, tai, nors ir retai, tačiau taip pat pasitaiko vartojant „Ketoconazol-ratiopharm“ šampūna. Pacientams, ilgai vartojantiems vienoje odos vietoje vietiniam gydymui kortikosteroidus, rekomenduojama toki gydymą palaengva per 2-3 savaites užbaigti, kad vartojant „Ketoconazol-ratiopharm“ šampūną būtų išvengta ligos pasikartojimo. Šio vaistinio preparato kvapiosios medžiagos sudėtyje yra α -zometionono, benzilo alkoholio, benzilbenzoato, benzilaminolio, citralo, citronelio, kumarino, eugenolio, farnesolio, geraniolio, heksilcinamolio, izoeugenolio, linalolio, kurie gali sukelti alerginius reakcijas. Kiekvienam šio vaistinio preparato mililitre yra 100 mg natrio laurilsulfato, kuris gali sukelti vietinio odos reakcijų (gelimo arba deginimo pojūli) arba sustiprinti odos reakcijas, kurias sukėlė toje pačioje vietoje pavartoti kiti preparatai. **Teksto peržiūros data 2022-07-06. Reklaminės medžiagos parengimo data 2026-03. OTC-LI-00108**

NUO **6⁹⁹** €

HYDROCORTISON TAKEDA

10 mg/g, gelis, 10 g

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Sudėtis. 1 g gelio yra 10 mg hidrokortizono. **Indikacijos.** Trumpalaikis lengvo odos niežulio ir sudirginimo malšinimas, esant nedidelėms odos pažeidimams (pvz., po vabzdžių įgėlimo ar įkandimo). **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Suaugusiems 1-3 kartus per parą, vyresniems kaip 2 m. vaikams 1-2 kartus per parą ant odos tepli plona sluoksnį gelio. Vartoti ne ilgiau kaip 7 paras. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, rožinė, peroralinis dermatitas, paprastieji spuogai, bakterinė, grybelinė arba parazitinė odos infekcija, kai netaikomas reikiamas gydymas. Įtariamais ausies būgnelio prakiurimas, vartojamas ant veido, išsargus ar lytinių organų srities arba altvųjų žaizdų, jaunesniems nei 2 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai.** Vartoti tik išorškai, saugotis, kad nepatektų į akis. Gali atsirasti odos atrofija, pažeisti virusinė, bakterinė ar grybelinė infekcija, suleisti žaizdų gydymą, pasireikšti regėjimo sutrikimai, ilgalaikis vartojimas ant veido gali sukelti kataraktą ar glaukomą. Jei atsiranda padidėjusio jautrumo simptomų, gydymą reikia nutraukti. Šio vartojimo po uždaras drabužias (skaitant uždaras sauskelines) ar vietose, kur oda liečiasi su oda. **Teksto parengimo data: 2022-04-14 LI-HYCO-Z20001**

NUO **6⁹⁹** €

NUMALŠINK IR ODOŠ SUDIRGINIMĄ, IR NIEŽĖJIMĄ!

ODOS IR LŪPŲ PŪSELINEI GYDYTI

5⁹⁹ €

ACIC 5 % kremas, 2 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g kremo yra 50 mg acikloviro. **Terapinės indikacijos:** odos ir lūpų pūseLINEI, kurią sukelia *Herpes simplex* virusas, gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** pažeista odą tepi plonu sluoksniu 5 kartus per parą kas 4 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas acikloviro, valacikloviro, propilenglikolio arba bet kurioms pagalbinėms medžiagoms. Netepi ant gleivinės (burnos, akių, makšties). **Specialūs įspėjimai:** vaisto draudžiama nuryti. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. ZI-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2601069662. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSELINEĮ SU „ACIC“!

ODOS IR LŪPŲ PŪSELINEI GYDYTI

14⁹⁹ €

ACIC 200 mg, 25 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tableteje yra 200 mg acikloviro. **Terapinės indikacijos:** anksčiau gydytojo diagnozuotas pasikartojantis lūpų pūseLINEIS gydymas suaugusiems žmonėms. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** gerti po 1 tablete 5 kartus per parą kas 4 val. Gydymo trukmė – 5 paros. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas acikloviro, valacikloviro arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** palietus viruso pažeista vietą, reikia tuoj pat nusiplauti rankas. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. ZI-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2601069662. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSELINEĮ IŠ VIDAUS!

ODOS PRIEŽIŪRAI

-20%



BEN'S

„BEN'S“ tai priemonės skirtos apsaugai nuo erkių, uodų ir kitų kraujasiurblių vabzdžių. „BEN'S“ repelentai maksimaliai saugo nuo įkandimų iki 6 valandų. „BEN'S MAX“ yra didžiausios DEET koncentracijos repelentas, kuris karščių yra išbandytas ekstremaliomis sąlygomis visame pasaulyje: Sibiro taigoje, Aliaskoje ir atogrąžų miškuose. Produktas efektyvus prieš erkes, prieš uodus, tropinius uodus ir kitus kraują siurbiančius vabzdžius.

„BEN'S 30“ ir „BEN'S“ su citrinųkapių eukaliptų aliejumi – tinka visai šeimai, todėl tiks ir vaikams, ir tiems šeimos nariams, kurių oda yra ypač jautri. Puriškiamas repelentas naudojamas tiesiai ant žmogaus odos. Prieš naudojimą perskaityti etiketę.

„After Bite“ produktų linija kaip patikima niežuli mažinanti priemonė žinoma nuo 1975 m, todėl neieskite, kad vabzdžių įkandimai ir jų sukeltas niežulys laikyti jūsų šeimai namuose. „AFTER BITE“ Raminamasis pieštukas – suteikia ramintinį bei simptomus lengvinantį poveikį įsidišginus, po uodų, musų, vapsvų, bičių, medužių ir skruzdėlių įkandimų bei įgėlimų.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-20%



BEPANTHEN®

ANTI-EXEM, kremas, 50 g 44⁹² 11⁹⁸ €

MEDICINOS PRIEMONĖ

Kliniškai patikrintas kremas be hormonų slopina atopinės egzemos (atopinio dermatito), odos išsausėjimo sukeltą niežėjimą ir paraudimą, atstato apsauginę odos barjerą. Numalšina odos niežėjimą vos per 30 minučių, poveikis išlieka mažiausiai 7 valandas. Kremą galima vartoti tiek gydymo hormoniniais preparatais, tiek pertraukų tarp hormoninio gydymo metu. Tinka kūdikiams, vaikams ir suaugusiems. Galima vartoti nešuturo ir žindymo laikotarpiu, odai apie akis.

SENSICONTROL®, prausimosi gelis, 400 ml 47⁹⁹ 14³⁹ €SENSICONTROL®, kremas, 200 ml 47⁹⁹ 14³⁹ €

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Bepanthen SensiControl“ – kasdienis prausimosi gelis jautriai ir į ežemą linkusiai odai. Nuramina, drėkina odą, prisitaiko prie jūsų odos pH, saugo natūralią odos barjerą ir mikrobiomą. Sudėtyje yra provitamino B5 ir prebiotikų. Tinka visai šeimai.

„Bepanthen SensiControl“ – kremas, skirtas jautriai, atopinei, į ežemą linkusiai odai. Kliniškai patikrinta „Dermo-Defense“ formulė, pagidytą prebiotikų, suteikia kasdienę odos apsaugą; palaiko odos apsauginę mikroflorą, stiprina odos barjerinę funkciją, užtikrina ilgalaikį, iki 24 val. trunkantį, drėkinimą ir padeda raminti sausą, niežtinčią odą. Greitai įsigeriantis kremas tinka kūniui, veidui ir akių vokams. Tinka visai šeimai.

Reklamos teksto parengimo data 2026-02. CH-20260203-57

„BEPANTHEN“ – PRODUKTŲ LINIJA | EGZEMĄ LINKUSIOS ODOS SVEIKATAI!

5⁹⁹ €

FENISTIL 1 mg/g gelis, 30 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Indikacijos. Niežulio, susijusio su odos išberimu, dilgeline, vabzdžių įkandimu arba saulės ar kitokių priežasčių sukeltu paviršiniu odos nudegimu, trumpalaikis malšinimas. **Vartojimas.** Pažeista odą plota tepi 2-4 kartus per dieną. **Kontraindikacijos.** Alergija dimetindeno maleatui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai.** Jei niežulys labai sunkus arba odą labai pažeista, jei simptomai per 7 d. nepalengvėja, būtina kreiptis į gydytoją. Jei gelis tepamas didelės odos plotas, ligai būli saulėje draudžiama. Kūdikiams ir vaikams iki 2 m. didelio odos ploto, ypač apimto uždegimo arba pažeisto, gelio tepi draudžiama. Nevartoti ant gleivinės. Sudėtyje yra propilenglikolio ir benzalkonio chlorido. Teksto parengimo data 2025-02. Prekių ženklai priklauso HALBON arba HALBON turi jų licenciją. ©2025 HALBON arba licencijos turėtojas.

-30%



AMEDIPLUS

Propolio aliejus, 15 ml 5⁹⁹ 4¹⁹ €Propolio - medetkų kremas, 40 g 6⁹⁹ 4⁸⁹ €

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

-20%

BEN'S

„BEN'S“ tai priemonės skirtos apsaugai nuo erkių, uodų ir kitų kraujasiurblių vabzdžių. „BEN'S“ repelentai maksimaliai saugo nuo įkandimų iki 6 valandų. „BEN'S MAX“ yra didžiausios DEET koncentracijos repelentas, kuris karščių yra išbandytas ekstremaliomis sąlygomis visame pasaulyje: Sibiro taigoje, Aliaskoje ir atogrąžų miškuose. Produktas efektyvus prieš erkes, prieš uodus, tropinius uodus ir kitus kraują siurbiančius vabzdžius.

„BEN'S 30“ ir „BEN'S“ su citrinųkapių eukaliptų aliejumi – tinka visai šeimai, todėl tiks ir vaikams, ir tiems šeimos nariams, kurių oda yra ypač jautri. Puriškiamas repelentas naudojamas tiesiai ant žmogaus odos. Prieš naudojimą perskaityti etiketę.

„After Bite“ produktų linija kaip patikima niežuli mažinanti priemonė žinoma nuo 1975 m, todėl neieskite, kad vabzdžių įkandimai ir jų sukeltas niežulys laikyti jūsų šeimai namuose. „AFTER BITE“ Raminamasis pieštukas – suteikia ramintinį bei simptomus lengvinantį poveikį įsidišginus, po uodų, musų, vapsvų, bičių, medužių ir skruzdėlių įkandimų bei įgėlimų.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

IKI -30%

AMEDIPLUS

rankų kremas su pantenoliu, 100 ml 6⁵⁹ 4⁶¹ € -30%pantenolio putos, 150 ml 9⁹⁹ 7⁴⁹ € -25%

KOSMETIKOS PRIEMONĖS



-20%

AMEDIPLUS

Vandeniui atsparūs pleistrai, 7 x 2 cm, 10 vnt. 4⁶⁹ 1³⁵ €Vandeniui atsparūs pleistrai, 7 x 3,8 cm, 10 vnt. 2⁰⁹ 1⁶⁷ €Vandeniui atsparūs, permatomi pleistrai, 7 x 2 cm, 10 vnt. 4²⁹ 1⁴³ €Vandeniui atsparūs pleistrai, 2,5 cm, 10 vnt. 4²⁹ 1⁰³ €Vandeniui atsparus, karpomas pleistras, 6 x 100 cm 2¹⁹ 1⁷⁵ €Pleistrai su alavijų ekstraktu, 7 x 2 cm, 10 vnt. 4⁸⁵ 1⁴⁸ €Juodi aksominiai pleistrai, 7 x 2 cm, 10 vnt. 4²⁹ 1⁴³ €Vaikiški pleistrai, 6 x 2 cm, 10 vnt. 2³⁹ 1⁹¹ €Pleistrų rinkinys šeimai, 20 vnt. 4⁴⁵ 3⁵⁶ €

MEDICINOS PRIEMONĖS



AMEDIPLUS

Propolio aliejus, 15 ml 5⁹⁹ 4¹⁹ €Propolio - medetkų kremas, 40 g 6⁹⁹ 4⁸⁹ €

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

SANDOZ

ĮVEIK GRYBELĮ



POSAMYK
78,22 mg/ml vaistinis nagų lakas
terbinafinas

VAISTINIS NAGŲ LAKAS

3,3 ml vaistinio nagų lako

SANDOZ

POSAMYK 78,22 mg/ml vaistinis nagų lakas terbinafinas
Sandoz d.d.
Verovškova 97, SI-1000 Ljubljana, Slovenija



INOVACIJA

**Gydymo trukmė:
6+ mėnesiai**

- SLOPINA GRYBELĮ
- JOKIO DILDYMO
- IŠDŽIŪSTA PER 30 SEKUNDŽIŲ

Posamyk 78.22 mg/ml vaistinis nagų lakas. Nereceptinis vaistinis preparatas.
Veiklosios medžiagos stiprumas: viename vaistinio nagų lako ml yra terbinafino hidrochlorido, kuris atitinka 78,22 mg terbinafino. *Terapines indikacijas:* vaistas skirtas suaugusiųjų, sergančių lengva ar vidutinio sunkumo nagų grybeline infekcija, gydymui. *Vartojimo būdas ir dozavimas:* per pirmąsias 4 gydymo savaites „Posamyk“ ant pakenktų nagų reikia tepti 1 kartą per parą. Po to – vaistą vartoti 1 kartą per savaitę. *Kontraindikacijos:* vaisto naudoti negalima esant padidėjusiam jautrumui terbinafinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. *Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:* „Posamyk“ skirtas tik išoriniam vartojimui. Prašome idemiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. *Atstovas Lietuvoje:* „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 52636037. El. paštas: info.lithuania@sandoz.com. B52601120206. Reklamos teksto parengimo data: 2026-01-12.

-35%**„LIVOL“ VITAMINAI****MAISTO PAPILDAI**

Kviečiame Jus atrasti iš naujo „Livol“ vitaminų prekių ženklą – dabar naujose pakuotėse. Atnaujintas „Livol“ įkvėptas Danijos vertybių, šiaurietiškos estetikos ir Hygge balanso, kuris atspindi harmoningą požiūrį į kasdienę gerą savijautą. Danų kultūroje gyvenimo pusiausvyra gimsta iš paprastų, bet prasmingų kasdienybės akimirkų – judėjimo, ramybės, artumo, šypsenų bei sąmoningo rūpesčio savimi. Šia filosofija vadovaujasi ir „Livol“ vitaminai, sukurti Danijoje, naudojant pažangias, subalansuotas formules ir efektyvią gamybos technologiją, kuri užtikrina maksimalų pasisavinimą.

„LIVOL“ – GEROS SAVIJAUTOS MEISTRAI IŠ DANIJOS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

IKI -40%**VITABIOTICS WELL LINIJA****MAISTO PAPILDAI**

WELLWOMAN – nakvišiu, agurkelių, vitaminų ir mineralų kompleksas moterims. WELLMAN – sibirinių žensėnių, amino rūgščių, vitaminų ir mineralų kompleksas vyrams. WELLTEEN – subalansuota paaugliams, o WELLKID – patiems mažiausiems.

GERA SAVIJAUTA VISAI ŠEIMAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-30% **370€****TRAVELOK 10 kapsulių****MAISTO PAPILDAS**

Imbieriai padeda palaikyti normalią savijautą keliaujant.

-40% **1229€****MENOPACE 30 tablečių****MAISTO PAPILDAS**

„Menopace“ – biologškai aktyvių medžiagų kompleksas su sojų izoflavonais, kurie pagal savo struktūrą ir poveikį panašūs į moters lytinį hormoną estrogeną. Menopauzės laikotarpiui subalansuotas derinys pasižymi kompleksiniu poveikiu: hormonų balansui (vitaminas B1), psichologinei būsenai (foliatas, biotinas, magnis), kaulų funkcijai (cinkas, magnis), nuovargio mažinimui (geležis, pantoteno rūgštis).

„MENOPACE“ – NELEISK MENOPAUZEI TAVES SUSTABDYTI!

-30%**ABC VIT**

VITAMINAS C 500 mg, 50 braškių skonio tablečių **6⁹⁹ 4⁸⁹ €**

VITAMINAI A IR E 60 kapsulių **44⁹⁹ 7⁸³ €**

MAISTO PAPILDAS

Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės, nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą, palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, taip pat palaikyti normalią odos būklę. Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

-10% **296€****GINTARO RŪGŠTIS 20 tablečių****MAISTO PAPILDAS**

Vartojimas: gerti po 1 tablete 3 kartus per dieną valgant.

Rekomenduojamame suvartoti per parą kiekyje (3 tabletės) yra 0,3 g gintaro rūgšties.

Gamintojas: UAB „Medicaria Filia“, Žarijų g.2B, Vilnius

Išskirtinis platintojas Lietuvoje: UAB „VERATRUM PHARMA“, Žarijų g. 2B, Vilnius

ENERGIJAI, GROŽIUI, VIRŠKINIMUI, SVORIO KONTROLEI**IKI -30%****ACORUS BALANCE****MAISTO PAPILDAS**

„Acorus Balance“ produktų linija skirta subalansuotam gyvenimui.

Asortimente rasite skirtingų produktų, įvairioms organizmo funkcijoms palaikyti: imunitetui, grožiui, virškinimo ir žarnyno funkcijai, svorio kontrolei, sąnariams. Produktai pasižymi išskirtinėmis vartojimo formomis – nuo gumulčių ir vienodozių butelių.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

STRESUI, MIEGUI, VIRŠKINIMUI, MENOPAUZEI**IKI -30%****ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS****MAISTO PAPILDAS**

Sukurta fitoterapijos ekspertų, pasitelkiant mokslą ir tradicijas nuo 1883 m.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

ŠLAPIMO TAKŲ SISTEMAI

-30%



URINAL

MAISTO PAPILDAI

NAUJENAI „Urinal Cranberry Gummies“ guminukai – sudėtyje yra proantocianidinų: 18 mg PAC viename guminuke. Tinka visai šeimai. Nuo 3 metų.

„Urinal Akut“ tabletės – unikalus spanguolių ekstrakto, paprastųjų rykštenių ir vitamino D derinys normaliai šlapimo takų funkcijai palaikyti. Paprastosios rykštenės padeda palaikyti normalią šlapimo takų funkciją.

„Urinal“ kapsulės – sudarytos iš unikalių maistingų medžiagų kombinacijos: džiovintų spanguolių (*Vaccinium macrocarpon*) sulčių koncentrato, didelės koncentracijos spanguolių (*Vaccinium macrocarpon*) sulčių ekstrakto „ExoCyanTM“, paprastųjų rykštenių (*Solidago virgaurea*) ekstrakto ir vitamino D. 2605_SB_Urinal_V01_L1

DEGINIMO POJŪTIS? NELAUKITE IR VEIKITE IŠKART!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

URINAL

D-MANNOSE, 2000 mg,
14 šnypščiųjų tablečių

29⁹⁹ 14⁵⁵ €

MEDICINOS PRIEMONĖ

NAUJENAI „Urinal D-Mannose“, 2000 mg, medicinos priemonė. Padeda išvengti pasikartojančių šlapimo takų infekcijų, cistito, kuriuos sukelia bakterija E. coli. Pagalbinė priemonė gydant šlapimo takų infekcijas.

IKI -50%



ECOSH

ZARNYNO DETOX 260 g 32⁹⁹ 16⁵⁰ € -50%BIOAKTYVUS SELENAS 90 kapsulių 24⁹⁹ 10⁹⁰ € -50%BIOAKTYVUS MAGNIO BISGLICINATAS 90 kapsulių 29⁹⁹ 17⁹⁹ € -40%ECOBIOTIC pieno rūgšties bakterijos, 90 kapsulių 32⁹⁹ 26³¹ € -20%

MAISTO PAPILDAI

„ECOSH“ – Estijos maisto papildų gamintojas, siekiantis gaminti kuo natūralesnius, kokybiškus ir efektyvius maisto papildus. Naudojamas vegetariškas, augalinės kilmės kapsulės, maisto papildai yra be konservantų, dauguma tinkami vegetarams ir veganams.

SKUBIOS PAGALBOS KONTRACEPTIKAS

13⁹⁷ €

AVODELE 1,5 mg, 1 tabletė

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Avodele yra skubios pagalbos kontraceptikas, kurį galima pavartoti per 72 valandas (t. y. per tris paras) po lytinio akto, kurio metu kontraceptinės priemonės nebuvo naudotos arba naudota kontraceptinė priemonė nebuvo veiksminga. Avodele sudėtyje yra sintetinio hormono, veikliosios medžiagos, vadinamos levonorgestrelu. Suvartotas per 72 valandas po nesaugaus lytinio akto, jis 79 % atvejų apsaugo nuo nėštumo. Vartotinas šiais atvejais:

– Lytinio akto metu nebuvo naudota kontraceptinė priemonė.

– Jei kontraceptinė priemonė naudota netinkamai.

Kaip vartoti Avodele. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Po nesaugaus lytinio akto išgerkite vieną tabletę kuo greičiau, bet ne vėliau kaip po 72 valandų (3 parų). Tablete geriausia išgerti per 12 valandų. Antra tabletė išgerkite praėjus 12 val. (bet ne daugiau kaip 16 val.) po pirmosios tabletės išgerimo. Jei žinote arba manote, jog nesate nėščia, Avodele galite vartoti bet kuria ciklo diena. Tablete nurykite nekramtyta, užsigerkite vandeniu. Ji bus tuo veiksmingesnė, kuo greičiau ją išgeriate. Avodele vartoti negalima. Jeigu yra alergija levonorgestrelui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos informacinio lapelio 6 skyriuje), įspėjimai ir atsargumo priemonės. Prieš vartojimą, pasitarkite su gydytoju, nes Avodele, kaip skubios kontracepcijos priemonė, Jums gali neikti. Gydytojas gali Jums skirti kitokią skubios kontracepcijos priemonę. Kaip dažnai galima vartoti Avodele. Avodele vartotina tik neatidėliotinu atveju ir nėra reguliaros kontracepcijos metodas. Galimas šalutinis poveikis. Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visoms žmonėms. Labai dažnas. Šleikštulys (nykimas); Gali būti nereguliarus pakraujavimas iki pradedant mėnesinės; Gali skaudėti pilvo apačią; Nuovargis; Galvos skausmas. Dažni Vėmimas; Gali pakisti mėnesinių ciklas; Išgėrus šio vaisto, gali atsirasti krūtų jautrumas, viduriavimas, svajulio pojūtis. Labai retas Bėrimas, dilgėlinė, niežulys, veido patinimas, duburs srities skausmas, skausmingos mėnesinės. Prašome įdėmiai perskaityti pakuočių lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant informaciniame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Ši informacija paskutinį kartą peržiūreta 2025-07-15.

-30%



SVEIKAŽOLIŲ ARBATOS

BRUKNIŲ LAPAI 1,3g x 20 pak. 2⁷⁸ 1⁹⁵ €MEDETKŲ ŽIEDAI 1,2g x 24 pak. 2⁶⁸ 1⁸⁸ €MEDETKŲ ŽIEDAI 40 g 2⁹⁵ 2⁰⁷ €MEŠKAUOGIŲ LAPAI 1,3g x 20 pak. 2⁶⁸ 1⁸⁸ €MEŠKAUOGIŲ LAPAI 40 g 3⁶⁵ 2⁹⁰ €

„Sveikažolių arbatos“ asortimente garuoja kruopščiai atrinkti vaistažolių mišiniai bei pavienių žolelių arbatos, svaiginančios gardžiu skonių ir silandicos iš vidus.

-30%



ŠALTALANKIŲ ALIEJUS

50 ml 40⁹⁹ 7⁴¹ €100 ml 43⁹⁹ 9³⁷ €

MAISTO PAPILDAI

Šaltalankių aliejus padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir širdies veiklą, normalų virškinimą, normalią odos būklę. Vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą.

-10%

6²⁹ €

ELEUTEROKOKŲ SKYSTASIS EKSTRAKTAS 50 ml

MAISTO PAPILDAS

Sudedamosios dalys: eleuterokokų šaknų su šakniastiebiais (*Eleutherococcus rhizomata et radices*) etanolinė ištrauka t1 (etanolis, eleuterokokų šaknų su šakniastiebiais). Sudėtyje yra ne mažiau kaip 33 tūrio % etanolio. Vartojimas: suaugusiems gerti po 10 lašų 2 kartus per dieną 30 min. prieš valgį. Prieš vartojimą suplakyti. Rekomenduojamame suvartoti per parą kiekyje (20 lašų) yra apie 0,75 ml eleuterokokų skystojo ekstrakto. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.

Gamintojas: „Ternofarm“, Ukraina. Išskirtinis importuotojas ir platintojas Lietuvoje: UAB „VERATRUM PHARMA“, Žarijų g. 2B, Vilnius.

-15%



LACTO SEVEN, VITA B12, MULTI B STRONG

MAISTO PAPILDAI

„Lacto Seven“ sudėtyje yra sėtylių skirtingų rūšių pieno rūgšties bakterijų ir vitamino D. Pagaminta Suomijoje, laikant aukštus kokybės standartus!

„Vita B12“ – vitamino B12 pastilės, metu skonio. Vitaminas B12 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją, normalią nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. „Vita B12 + folio rūgštis“ – vitamino B12 ir folio rūgšties pastilės su saldikiu. Vartojimas: suaugusiems – 1 pastilė per dieną. Leiskite pastilei lėtai išsijūti burnoje.

„Multi B Strong“ – 8 grupės vitaminų tabletes. Dauguma B grupės vitaminų (B1, B2, B6, B12, niacinas, pantoteno rūgštis) padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vitaminai B1, B6, B12 ir niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją. Vitaminai B2, B6, B12, niacinas ir pantoteno rūgštis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: suaugusiems rekomenduojama vartoti po 1 tabletę 1-2 kartus per parą, užsigeriant vandeniu.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

Sertifikuota kokybė ir autentiškumas! Jau 15 metų Lietuvoje!

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMI!

Kaulams, raumenims ir gerai savijautai

„**MAGNUS REX 300**“ – natūralios kilmės magnio bisglicinatas, švarios sudėties „Biofarmacija“ maisto papildas, švelniai veikiantis virškinimo sistemą ir gerai įsisavinamas. Maisto papildas skirtas magnio kiekiui organizme papildyti ar atstatyti. Tinka po gausaus prakitavimo, buvimo saulėje ar karštoje aplinkoje, intensyviai judant ar kitaip netekus daug skysčių.

„**CALCIUM FORTE 600**“ – grynas „Biofarmacija“ natūralios kilmės kalcio iš Negyvosios jūros maisto papildas. Skirtas norintiems palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę, kraujo krešumą, nervų impulso perdavimą, virškinimo fermentų veikimą, energijos apykaitą ir raumenų veiklą.



Maisto papildai

Virškinimui ir kepenims

„**bioSILYMARIN**“ – Biofarmacija ekologiškas silimarino (tikrojo margainio) kompleksas virškinimui ir kepenų funkcijai palaikyti. Padeda kepenų ląstelių regeneracijai, organizmo valymo procesams ir normaliai gliukozės koncentracijai kraujyje. Su skaidulinėmis medžiagomis. Nr. 1 maisto papildas kepenims Lietuvoje!

2024–2025 m. UAB „Softident“ duomenys.

„**Silymarin lipid**“ – kompleksas kepenų funkcijai ir riebalų apykaitai palaikyti, tinka kai kliniškai nustatytas kepenų suriebėjimas. Cholinai padeda normaliai lipidų apykaitai, silimarinas prisideda prie kepenų ląstelių regeneracijos, o ciberžolės ekstraktas padeda palaikyti kepenų funkciją ir apsaugą nuo riebalų kaupimosi.

„**MAGNULIN**“ – „Biofarmacija“ sukurtas unikalus magnio ir skaidulų kompleksas iš natūralios kilmės Negyvosios jūros magnio bei inulino iš cikorių šaknų. Inulinas padeda palaikyti normalią virškinimo sistemos veiklą, o magnis svarbus raumenų funkcijai, nervų sistemai, energijos apykaitai ir nuovargio mažinimui. Paprastoji trūkažolė padeda palaikyti normalią virškinimo ir kepenų veiklą.



Maisto papildai

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms



Šlapimo takams ir kraujagyslėms

„Biofarmacija“ „URITA“ – natūralus stambiauogių spanguolių ir miltinių meškaugių kompleksas kasdieniui šlapimo takų priežiūrai ir komfortui palaikyti. Tinka ieškantiems natūralaus sprendimo gerai savijautai.

„**VENOLEGS**“ – stiprios sudėties „Biofarmacija“ dviejų veiklių medžiagų diosmino ir hesperidino kompleksas efektyviam kojų nuovargiui mažinti, kojų venoms stiprinti, hemoroidui ir normaliai venų mikrocirkuliacijai. Papildo sudėtyje mineralai, vitaminai, kolagenas ir 4 augalų ekstraktai.

Maisto papildai

Imunitetui ir žarnynui

„**HYDRO FORTE milteliai**“ – natūralios kilmės elektrolitų tirpalas skirtas papildyti mitybą mineralinėmis medžiagomis ir gyvybingomis bakterijomis, netekus skysčių. Elektrolitai svarbūs žmogaus organizmui, kad būtų palaikoma normali energijos apykaita, psichologinė funkcija, normali kaulų ir dantų būklė, raumenų funkcija, nervų sistemos veikla, sumažintas pavargimo ir nuovargio jausmas.

„**20 MILLIARDS**“ – tirpių akacijų sakų skaidulų ir cinko mineralų kompleksai „Biofarmacija“ gerosios bakterijos žarnyno mikroflorai atstatyti ir palaikyti, bei imunitetui stiprinti. Net 20 mlrd. kolonijas sudarančių vienetų gyvybingųjų bakterijų.



Maisto papildai



Maisto papildai

Kolageno papildai sveikatai ir jaunystei

„**Colagena BEAUTY 10 000**“ (su hialurono rūgštimi – grožiui) ir „**Colagena JOINTS 10 000**“ (sąnariams) – „Biofarmacija“ aukštos kokybės hidrolizuotas kolagenas su itin maža molekuline mase (800–3000 Da), gerai prisavinamas ir toleruojamas organizmo. Kolagenas išgautas iš galvijų, atitinka griežtus kokybės standartus, patvirtintas košeriniu ir halal sertifikatais. Kolagenas padeda palaikyti normalią odos, kremzlių, dantų, dantenų, kaulų ir kraujagyslių funkciją.

PRIEMONĖS SLAUGAI

IKI -50%



SENI

SENI sauskelnės ir sauskelnės keičiamos – orui laidžios, su kvapo kontrolės sistema.

SENI apsauginiai paklotai – tai papildoma apsauga, kuri išsaugo švartą patalynę.

SENI kosmetika odos priežiūrai – nuvalo, naikina kvapus, maitina ir apsaugo odą nuo dirgiklių.

SENI urologiniai įklotai ypač greitai sugeria, komfortiški ir diskretiški.

*Sauskelnėms negalioja nuolaidos su kompensuojamų vaistų pasu.

PROFESIONALŲS UROLOGINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis.

NOSIES GLEIVINĖS PABURKIMUI MAŽINTI

5⁹⁹ €

RHINO-STAS

nosies purškalkas, tirpalas, 10 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 ml nosies purškalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** „Rhino-stas“ yra simptomaticinis preparatas. Purškalkas siauria kraujagysle, todėl mažina nosies gleivinės paburkimą. Vartojamas trumpalaikiam nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant sloga arba prienosinių ančių uždegimu (sinusitu). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 10 m. vaikams bei pagyuliams reikia purškėti po 1 išpurškimą „Rhino-stas“ tirpalu į kiekvieną nosies landą 1–3 kartus per parą tada, kada reikia. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; sausasis nosies gleivinės uždegimas (sausasis rinitas); pacientams, kuriems pro nosį neseniai buvo atlikta smegenų operacija; jaunesniems kaip 10 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** „Rhino-stas“ galima vartoti tik atidžiai įvertinus jo vartojimo riziką ir galima naudoti šiais atvejais: pacientams, kurie vartoja ar vartoja vaistų nuo depresijos (monoaminooxidazės inhibitorių) arba kitų vaistų, kurie gali labai padidinti kraujospūdį; kai padidėjęs akispūdis, ypač sergant uždaruoju kampo glaukoma; sergant sunkia širdies ir kraujagyslių sistemos liga (pvz., vainikinių širdies arterijų liga, hipertenzija); sergant feochromocitoma (antinksčių naviku); sergant porfirija; sergant medžiagų apykaitos ligomis (pvz., hipertiroze, cukriniu diabetu). Pakuotės lapelio peržiūros data 2025-08-12. 2605_SB_Rhino-stas_V01_LT

„RHINO-STAS“ PURŠKALKAS – PIRMOJI PAGALBA SERGANT SLOGA AR SINUSITU!

-30%



WALMARK BIORYTHM

MAISTO PAPILDAI

Inovatyvios formos maisto papildų linija su lėto atpalaidavimo mikrogranulėmis, kurios išskiria maistingąsias medžiagas iki 8 valandų per dieną. Palyginti su įprastomis tabletėmis ar kapsulėmis, šie papildams būdingas didesnis biologinis prieinamumas – medžiagos pasisavinamos palaipsniui žarnyne. BIORYTHM maisto papildų linija sudaro 6 produktai – „Ashwaganda“ (migdamosios vitanijos), „Cinkas 15 mg“, „Geležis 28 mg“, „Vitaminas B12 Max“, „Selenas 100 µg“ ir „Magnis su vitaminu B6“. 2605_SB_Biorythm_V01_LT.

„BIORYTHM“ – INOVATYVI PRAILGINTO VEIKIMO LINIJA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis.

AUSŲ SIERIĄ SUMINKŠTINTI IR IŠVALYTI

-15% 11^{86€}

VAXOL ausų purškalkas 10 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Vaxol“ – tai saugus ir veiksmingas būdas suminkštinti ir natūraliai išvalyti ausų sierą; sušvelnina, drėkina ir natūraliai šalina ausų sierą. Tinka vaikams nuo 1 metų, greitai ir lengvai naudojamas. Sumažina ausies praplovimo švirkštu poreikį. Ypač patariama naudoti užsiimantiems vandens sportu, dažnai naudojamiems ausinukams, klausos aparatais, taip pat vyresnio amžiaus žmonėms.

AUSŲ PURŠKALKAS SU ALYVUOGIŲ ALIEJUMI



SKIEPAI NUO ERKINIO ENCEFALITO

SU LOJALUMO KORTELE

28⁹⁹ €

SKIEPO KAINA BE KORTELĖS


31⁹⁹ €

Galima išankstinė registracija:

- internetu www.nvaistine.lt/skiepai
- telefonu +370 800 10 008

Nuolaidos taikomos su PC Norfa kortele. Akcijos „Laimės valandos“ nuolaidos netaikomos.



-40%**EPITOME**

BEAUTY MARINE COLLAGEN 12.200 mg, milteliai, 30 paketėlių **59⁹⁹ 35⁹⁹ €**
 SPIRIT MELATONIN 385 papurškimai, 50 ml **47⁵⁸ 10⁵⁵ €**
MAISTO PAPILDAI

-40%**AMBIO**

KALIS 300 mg IR MAGNIS 350 mg milteliai geriamajam tirpalui, 30 paketėlių **12⁹⁹ 7⁹⁹ €**
 MAGNIS FORTE 30 tablečių **9⁹⁹ 5⁹⁹ €**
MAISTO PAPILDAS

-35% **21^{44€}**
~~32⁹⁹~~**EPITOME**

ASHWAGANDHA 60 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!**AMBIO**

MAGNIS SU B6 FORTE 30 tablečių **12⁹⁹ €**
MAISTO PAPILDAS

-40% **23^{99€}**
~~39⁹⁹~~**SALVITIS COLLAGEN**

12000 mg, 15 buteliukų po 30 ml
MAISTO PAPILDAS

IKI -40%**AMBIO**

PATIRIANTIEMS ĮTAMPĄ 15 kramtomųjų tablečių **6⁹⁹ 4¹⁹ € -40 %**
 NERVŲ SISTEMAI 15 kramtomųjų tablečių **5⁵² 3⁵⁹ € -35 %**
MAISTO PAPILDAS

-60% **ANTRAI TOKIAI PAČIAI****AMEDIPUS**

kištukai ausims skrydžiui, S dydis, 1 pora **9⁹⁹ €**

-40% **8^{69€}**
~~14⁴⁹~~**AMBIO**

LAKTO-BIFIDOBAKTERIJOS SU S.BOULARDI 20 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

ATRINKTAI KOSMETIKAI „ŽIEDĖ“

iki **-40%**





UŽ 1 CT

Perkant bet kuriuos du ŽIEDĖ šampūnus, kondicionierius - TIK UŽ 1 CT!

ŽIEDĖ

atkuriamasis šampūnas su migdolais ir kinrozėmis, 300 ml 10⁹⁹ €
drėkinamasis šampūnas su bergamotėmis ir medetkomis, 300 ml 10⁹⁹ €
drėkinamasis kondicionierius su bergamotėmis ir medetkomis, 300 ml 11⁹⁹ €

KOSMETIKOS PRIEMONĖS



IKI -30%

BABĖ

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Laboratorios BABĖ“ – tai farmācijas tradīcijas puoseļējanti dermkosmetikos laboratorija īs Spānijā, kurianti saugius, veiksmīgus ir pieņemamus odas priērtiēus produktus, pritaikytus visems odas tipams, īskaitant jautriā odā. Daugiau nei 30 metū patirī turintis gamintojas siūlo platū priemoniū asortimentā kiekvienam odos poreikiui.

*Akciā taikoma geltonā etiķetē pažīmētos prekēs



NUO 5⁷⁵ €

CANESTEN®, 10 mg/g kremas, 20 g 5⁷⁵ €

NERECEPTĪVAIS VAISTINIS PREPARĀTAS

Canesten 10 mg/g kremas. Terapīnās indikācijas. Canesten skirtas saugusiem, paaugļams ir vaļkams gydīt: grybelīnēs odas infekcijās, pvz., sportinīko pēdā, grybelīs grybelīnīs sausleņiū bērnīs ir grybelīnīs prakaitavimo suķētas bērnīs; grybelīnīs suķētas īsoniņu moties lytēs organū arba varpos galū uždēgims. **Vartojimo būdas.** Vartoti ant odos. **Dozavimas.** Kremu plonai ir tolygiai tepkite pažeistas vietas 2-3 kartus per parā ir švelniai trinīkite. Kremu juosteles (0,5 cm līgjo) pakanka maīžaiū deļno dydimo plotiū gydīt. **Specialis īpazīmā.** Pastārkite su gydītviēu arba vaistinīku, priēš pradēdami vartoti Canesten. Kremas galī samaznīnā laktēso gamiņu, tūkiū kaip prezervatīvai ir diatēzīmas, veļsmīgumu ir saugāmā, jēgu jīs tepamas lytīnu organū sītiē (moties lytēs lāpos ir sītiē aģe vāļv; vīrāms apvārsē ir varpos galūvā). Gydymo metu naudokite alternatyvūs apsaugus priemonēs. Vengti slytū su alimīs. Nedēliū burnā, nerūryti. Vaikams (jaunesnīs negu 12 metū) ir senyviems pacientams vartoti galima tik priērtinū gydītviēu. Vengti līgalko gydymo dedeliosis odos plotuose, ypač kūdikiams ir vaikams. Vulvūo abėjū jaunesnīs kaip 16 metū paaugļams galima vartoti tik po gydītviēo konsultājos. Per pirmuosīs trīs nēštumo mėnesius priē vartojant reikia pasitarti su gydītviēu. Sudėtyje yra cetostearilo alkoholio, benzilo alkoholio. **Kontraindikācijas.** Alerģija klitrimazolui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Registravimas.** UAB „Bayer“, Sporto g. 18, LT-09238, Vilnius, Lietuva. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-08-27 GH-20250827-35

„CANESTEN“ KREMAS - GRYBELINĖS INFEKCIJOS GYDYMU!

CANESTEN®, 500 mg makšties minkštoji kapsulė 11⁵⁰ €

NERECEPTĪVAIS VAISTINIS PREPARĀTAS

Canesten 500 mg makšties minkštoji kapsulė. Klitrimazolas. **Terapīnās indikācijas.** Makšties ir īsoniņu moties lytēs organū infekcijā, suķēty klitrimazolū jautriū mikroorganismū gydymā. **Vartojimo būdas.** Makšties minkštaiū kapsulē reikia iēsti kaip galima giliai i makšty, naudojant pateiktā aplikatoriū, geruusia ugnī, vāre priē miegā. Jei laukiate, iēskite makšties minkštājam kapsulē i makšty pūrtās. **Dozavimas.** Viena makšties minkštoji kapsulė, pēsta giliai i makšty vakare (vienkartinė dozė). **Specialis īpazīmā.** Pastārkite su gydītviēu, jēgu jīs tepamas pirmā kartā; makšties infekcija pirmo nēštumo trimestro metu, per pastaruosīs sēšis mėnesius infekcija pasikartojū daugiau nei du kartus; pasireiškia karščiavimas ($\geq 38^{\circ}\text{C}$); skauda apatinē pilvā dalī; nugarā; atsiradū nemalonus kvapo išskyriū iš makšties; pasireiškia pykinimas; pasireiškia kraujavimas iš makšties ir (arba) tuo pačiu metu pečū skausmas. Nerekomenduojama gydīt menstruacijū metu. Gydymas turi būti uzbūgias iki menstruacijū pradīs. Vartojant negalima naudoti tamponū, makšties plovikū, spermicidū ar kitokiū i makšty vartojamū preparatū. Vartojant rekomenduojama vengti lytinių santykiū, nes partneris gali užsikrēsti. Jei Jūs partneriū yra infekcijos simptomu, tai turi būti gydoma tuo pačiu metu. Tuo pačiu metu naudojami lateko kondicionierius, pvz., prezervatyvai ir diafragmā, elkytyvumas ir patikimas galī samaznēti. Negalima nuryti. **Kontraindikācijas.** Alerģija klitrimazolui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Registravimas.** UAB „Bayer“, Sporto g. 18, LT-09238, Vilnius, Lietuva. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-08-27 GH-20250827-35

„CANESTEN“ MAKŠTIES MINKŠTOJI KAPSULĖ - 1-OS DIENOS MAKŠTIES GRYBELINĖS INFEKCIJOS GYDYMAS!

Intymiai higienai

IKI -30%



VAGISAN

KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS

Priemonēs „Vagisan“ su natūralia pieno rūgštimi skirtos tinkamai lytinių organū priežiūrai. Rūgšti aplinka – būtina sąlyga, kad laktobakterijos galėtų pačios gaminti pieno rūgštį ir daugintis. Taip užtikrinama optimali natūrali apsauga nuo infekcijos. Intymiosios higienos prausiklis „Vagisan“ tinka kasdieninei intymiajai higienai. Drėkinamasis makšties kremas „Vagisan“ sumažina tokius simptomus kaip sausumas, niežulys, deginimo pojūtis ir skausmas. Ovulės su pieno rūgštimi, skirtos natūraliai makšties pH terpei palaikyti ir atkurti.

TAVO INTYMAI SVEIKATAI

*Akciā taikoma geltonā etiķetē pažīmētos prekēs

Moters higienai

IKI -30%



LADY ANION

HIGIENOS PRIEMONĖS

„Lady ANION“ higieniniai paketai ir įklotai su ekologiška medvilne ir anjonine juostele. Medvilnė sukuria komforto pojūtį, anjoninė juostele kvapo kontrolei, laidūs orai, švelnus paviršius išlieka sausas. Rekomenduojami ginekologijai.

- „Pantiliner“ • (48 vnt.) – ploni įklotai kasdieniniam naudojimui.
- „Dayliner“ •• (16 vnt.) – įklotai su sparneliais gausioms išskyroms, negausioms menstruacijoms.
- „Active“ ••• (15 vnt.) – ploni paketai idealiai tinka keliaujant, sportuojant, šokant ar menopauzės metu.
- „Day Use“ •••• (10 vnt. ir 20 vnt.) – paketai dieniui menstruacijų metu.
- „Night Use“ ••••• (8 vnt.) – paketai naktį menstruacijų metu.
- „Post Partum“ •••••• (10 vnt.) – paketai po gimdymo arba esant itin gausioms menstruacijoms.

„LADY ANION“ – TAVO KASDIENIS PASIRINKIMAS

*Akciā taikoma geltonā etiķetē pažīmētos prekēs



UŽ 1 CT

Perkant pakuotę „Gentle Day“, drėgnos servetėlės „Bamboo“ – TIK UŽ 1 CT!



GENTLE DAY®

HIGIENOS PRIEMONĖS

„Gentle Day“ ir produktai – moterims, kurios myli save, saugo savo sveikatą ir rūpinasi aplinka. Ekologiškos „Gentle Day“ higienos prekės itin tinkamos moterims, kurių oda linkusi sudirgti ar alergiška. Lietuviškas prekių ženklas „Gentle Day“ garantuoja aukštą produktų kokybę, yra draugiškas Jums ir gamtai. Produktai yra sertifikuoti „Oeko-Tex“ 100“, „Made for Health“, VEGAN sertifikatais.



13⁹⁷ €

LOMEXIN

200 mg, 3 makšties minkštosios kapsulės
600 mg, 1 makšties minkštoji kapsulė

NERECEPTĪVAIS VAISTINIS PREPARĀTAS

„Lomexin“ kapsulėje yra 200 mg arba 600 mg fentikanzolo nitrato. Skirtas išorinių lyties organū ir makšties kandidozės lokaliui gydymui. „Lomexin“ vartoti i makšty 3 paras iš eilės po vienā 200 mg makšties kapsulē arba 1 kartą vartoti vienā 600 mg makšties kapsulē (priē miegā). „Lomexin“ nevartojamas vaikams ir paaugļams iki 16 m. gydīt. Vartoti draudžiama, jei yra padidējēs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. „Lomexin“ 600 mg kapsulėje yra sojų lecitīno – negalima vartoti pacientēms, kurios yra alergiškos žemės riešutams ar sojai. Kreipkitės i gydītviēu ar vaistininkā, jēgu esate nėščia ar maitinate krūtimi, simptomai nepagerėja per 1 savaitē ar pasikartojū daugiau nei 2 kartus per pastaruosīs 6 mėnesius, Jūs ar Jūsų partneris kada nors sirgote lytiškai plintančiomis ligomis. Jums daugiau nei 60 metų, yra nustatytas jautrumas imidazolams ar kitiems priešgrybeliniams vaistams, pasireiškia nenormalus ar nereguliarus kraujavimas iš makšties, kraujingoms makšties išskyroms, vulvos ar makšties žaizdos, opos arba pūslelės, apatinės pilvo dalies skausmas arba sutrikūs šlapinimasis, nepageidaujamas poveikis, toks kaip paraudimas, niežėjimas ar išbėrimas, susijęs su gydymu. Vartoti nerekomenduojama, jēgu naudojate „barjerinį“ kontracepcijos metodā, pagaminatū iš latekso, spermicidus, makšties plovikūlius ar kitus makšties produktus. Reklamos teksto parengimo data 2026-05-RE_LT_L0_2026_475

-30 %**ROYAL DENTA****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

„Royal Denta“ burnos priežiūros priemonės sukurtos remiantis mokslu ir odontologijos srities atradimais. Auksu ir sidabru praturtintų dantų pastų savybės ir jų poveikis patvirtintas nepriklausomoje sertifikacijoje laboratorijoje. Taip pat įrodyta, kad dantų šepetėliuose esantis auksas ir sidabras sunaikina iki 99,9% ant šerelių besikaupiančių bakterijų, todėl šepetėlį galima naudoti ilgiau. Be to, dviejų ilgių šerelių pasiekia sunkiai prieinamas tarpdančių vietas, todėl dantys yra išvalomi geriau. Kartą išbandę, klientai ir vėl pasirenka „Royal Denta“. Rekomenduoja odontologai.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-25 %**JORDAN****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

Platus dantų priežiūros priemonių asortimentas visai šeimai - nuo pirmo dantuko! Rinkitės dantų šepetėlius, pastas bei tarpdančių valymo priemones pagal savo individualius poreikius.

„JORDAN“ RŪPINASI ŠYPSENOMIS NUO 1927-ŪJU!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMA!

**COREGA**

WHITENING dantų protezų valymo tabletės, 30 vnt. **6⁹⁵ €**

EXTRA STRONG dantų protezų fiksuojantis kremas, mėtų skonio, 70 g **12⁹⁵ €**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

COREGA – visapusiška dantų protezų priežiūra. Tvirtinimo priemonės užtikrina saugų laikymą ir komfortą visą dieną, o valymo tabletės efektyviai pašalina dėmes, naikina bakterijas ir padeda palaikyti gaivą.

ŠVARA IR PASITIKĖJIMAS – KIEKVIENAI ŠYPSENAI.

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMA!

**SUNSTAR GUM**

ACTIVITAL daugiavfunkcinė dantų pasta, 75 ml **10⁷⁹ €**

SENSIVITAL+ dantų pasta jautriems dantims, 75 ml **11²⁵ €**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Jau daugiau kaip 80 metų „Sunstar“ yra viena burnos etmės higienos priemonių gamybos lyderių. Fluoridas padeda dantims greičiau įsisavinti mineralus ir saugo emalį nuo rūgščių poveikio. O sudėtyje esantis izomaltas padeda efektyviau įsisavinti fluoridą.

ŠVEIKOS DANTENOS, ŠVEIKESNIS GYVENIMAS.

IKI -40 %**ODONTE**

balinamoji ir gaivų burnos kvapą suteikianti dantų pasta, 75 ml **7⁹⁹ 4⁷⁹ € -40 %**

gaivų burnos kvapą suteikiantis burnos skalavimo skystis, 500 ml **8²⁹ 5²⁷ € -40 %**

regeneruojamasis burnos skalavimo skystis, 250 ml **9⁹⁹ 6⁷¹ € -30 %**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**-20 %****PARODONTAX****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

PARODONTAX – dantenu sveikatos specialistas. Padeda sumažinti dantenu kraujavimą ir stiprina danteną, kad būtų išvengta dantenu netekimo. Sveikatos dantenos – sveikatos šypsenos pagrindas. Rūpinkitės savo burnos sveikata kiekvieną dieną.

TARKITE SUDIE KRAUJUOJANČIOMS DANTENOMS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMA!

**ELMEX****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

„Elmex“ produktai padeda kasdien jaustis komfortiščiau – nuo kliniškai patvirtintos kasdienės apsaugos iki specializuotos priežiūros jautriems dantims.

RINKITĖS PATIKIMUMĄ, RINKITĖS „ELMEX“.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

IKI -40 %**TEPE****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

„TePe“ dantų ir tarpdančių šepetėliai yra kasdienės dantų higienos pagrindas. „TePe“ siūlo didelių dantų ir tarpdančių šepetėlių pasirinkimą kasdieniai dantų priežiūrai ir turintiems specialiujiu poreikiu. „TePe“ dantų pastos yra švelnios, su fluoru, neputojančios arba maži putojančios. Skirtos kūdikiams nuo pirmo dantuko, vaikų pienujamiems dantims, suaugusiems kasdieniai ar turintiems sausą burnos gleivinę.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



-30%

**PHILIPS
AVENT**

www.philips.lt/avent

Žarnyno mikroflorai



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

ACIDOLAC® JUNIOR

20 meškiuko formos tablečių **10⁴⁹ €**

braškių skonio, 20 meškiuko formos tablečių **10⁴⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

ACIDOLAC® JUNIOR meškiuko formos tablečių sudėtyje yra gerųjų žarnyno bakterijų *Lactobacillus acidophilus* La-14TM ir *Bifidobacterium lactis* BI-04TM, inulino ir vitamino B6, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vartojimas: vyresniems kaip 3 m. vaikams ir suaugusiems vartoti po 1 meškiuko formos tabletę 2 kartus per parą. Be sacharozės ir gliitimo.

Kūdikių odos apsauga



-25%

RELIZEMA™

BABY CARE kremas, 100 ml **18⁹⁹ 14²⁴ €**

SPRAY & GO – ZINC + PANTHENOL purškalkas, 100 ml **19⁹⁹ 14⁹⁹ €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Relizema“ Baby Care® ir „Relizema“ Spray & Go – Zinc + Panthenol® yra produktai, skirti jautriai ir švelniai kūdikių ir vyresnio amžiaus žmonių odai. Cinkas ir pantenolis – vienoje formulėje! Puikiai tinka odai raminti ir saugoti nuo paraudimo ir deginimo pojūčio, ypač sauskelnių srityje. Ant odos sudaro apsauginę plėvelę, saugančią nuo išorinių dirgiklių. Klinikiniais tyrimais įrodytas veiksmingumas. Patikrinta dermatologų. Rekomenduojama tėvų „Relizema“ Spray & Go – Zinc + Panthenol® purškalkas, be dujų, skirtas konkrečioms, sunkiau pasiekiamoms odos sritims, galima purkšti tiesiai ant pažeistos vietos, nereikia įtrinti. Daugiau higienos ir patogumo. „Relizema™“ priemonės rekomenduojama naudoti kiekvieną kartą keičiant sauskelnes arba tada, kada reikia. Reklama paruošta 2024-10. LT_Riz_22_2024_VI_pharma. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, Lietuva.

VEIKSMINGA, TYRIMAIS PAGRĮSTA APSAUGA SAUSKELNIŲ SRITIES ODAI!



-30%

DOCTOR FISH OMEGA-3 + VITAMINS D & E 30 kapsulių 42⁹⁵ 9⁹⁷ €

MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIU

Maisto papildas sudėtyje yra omega-3 riebalų rūgščių (EPR ir DHR) ir vitaminų D ir E: EPR (eikozapentaeno rūgštis) ir DHR (dokozaheksaeno rūgštis) padeda palaikyti normalią širdies veiklą; DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją, išsaugoti normalų regėjimą; vitaminas D padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų, raumenų, dantų būklę; vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.

GAMINAME VAISTUS PAGAL INDIVIDUALIUS RECEPTUS

- Atneškite gydytojo receptą iki 13 val.
- Atsiimkite pagamintą vaistą kitą darbo dieną.

VAISTINĖ
VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS



LAIMĖS VALANDOS

I-VI

iki 9 val. ir
14-15 val.*

VII

14-15 val.*

Perkant **3***
ir daugiau prekių

-30%

Perkant **2***
prekes

-25%

Perkant **1**
prekę

-20%



*Nuo 2026 m. gegužės 1 d. NORFOS vaistinėje akcijos LAIMĖS VALANDOS metu perkant 1 prekę taikoma 20% nuolaida, perkant 2 prekes – 25% nuolaida, vaistams – 20% nuolaida, o įsigyjant 3 ir daugiau prekių – 30% nuolaida, nereceptiniams vaistams – 25%, receptiniams – 20% nuolaida.

Taikomos momentinės 20% dydžio nuolaidos receptiniams vaistams, 20 ar 25% nuolaidos nereceptiniams vaistams, o kitoms prekėms – 20, 25 arba 30% nuolaidos, atsižvelgiant į atitinkamo pirkimo metu įsigyjamų prekių bendrą kiekį.

Nuolaida taikoma perkant pilnas prekių pakuotes, kurių kiekvienos vertė arba priemoka ne mažesnė nei 1,50 euro. Prekės, perkamos su kompensuojamuoju receptu, įskaičiuojamos į įsigyjamų (perkamu) prekių krepšelį (kiekį), tačiau joms nuolaida netaikoma.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms (pvz., mėnesinio leidinio nuolaidos; prekėms, vaistinėse pažymėtoms geltonais kainoženkliais; akcinėms prekėms, kai nuolaida taikoma įsigyjant ne mažiau kaip 2 nurodytus produktus, ir kt.). Momentinės nuolaidos netaikomos perkant prekes su kompensuojamuoju receptu, mokant už skiepus, taip pat pradinio maitinimo pieno mišiniams, kartiniams (gaminamiems vaistinėje) ir vardiniam vaistams, įsigyjant dovanų kuponus, prekių pakavimo maišelius. Momentinės nuolaidos netaikomos perkant www.gintarine.lt, net jei už prekes atsiškaitoma jas atsiimant vaistinėse. Nuolaidos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Informacija apie akcijas ir prekes, kurioms taikomos LAIMĖS VALANDŲ nuolaidos, teikiama kiekvienoje vaistinėje, el. paštu info@vaistine.lt arba nemokamu tel. +370 800 10008. Visos nuolaidos galioja tik su PC NORFA lojalumo kortele.

Rytinės LAIMĖS VALANDOS vyksta nuo vaistinės atidarymo iki 9 val. ryto. Jei vaistinė pradeda dirbti 9 val. ar vėliau, rytinės LAIMĖS VALANDOS joje nevyksta.