

# VAISTINĖ

## TOP LIEPOS PASIŪLYMAI



**-50%**



**AMBIO**  
MAGNIS SU B6 FORTE, 30 tablečių **42<sup>99</sup> 6<sup>50</sup> €**  
MAISTO PAPILDAS

**1+1**

Dvi tokios pačios  
pakuotės už  
VIENOS KAINĄ!



**EPITOME**  
SKIN FORMULA, 60 kapsulių **29<sup>98</sup> €**  
MAISTO PAPILDAS

**-50%**



**FJØRD STRONG OMEGA-3**  
80 kapsulių **28<sup>99</sup> 14<sup>35</sup> €**  
GENIUS DROPS, žuvų taukų lašai, 50ml **18<sup>19</sup> 9<sup>10</sup> €**  
SMART GUMMIES, 45 guminukai **24<sup>48</sup> 12<sup>25</sup> €**  
SPORT, 60 kapsulių **36<sup>99</sup> 18<sup>50</sup> €**

**MAISTO PAPILDAS**  
Išbandykite **NAUJENĄ**:  
„FJØRD STRONG OMEGA-3 SPORT“ – stipriausios koncentracijos žuvų taukai iš visų „FJØRD“, su didžiausiu EPR ir DHR kiekiu – išvermei, fiziniam pajėgumui, nuovargio mažinimui.  
Kininiai ženšeniai padeda palaikyti organizmo išvermei, fizinį pajėgumą, padeda mažinti nuovargį.  
„FJØRD STRONG OMEGA-3“ GALI DAUGIAU, NEI TIKIESI.

**-50%**



**VERSAN SHOTS**  
20 geriamųjų dozių po 10 ml **32<sup>99</sup> 16<sup>45</sup> €**

**MAISTO PAPILDAS**  
„Versan Shots“ – geriamos skystos dienos dozės sąnariams, sklandžiam darbui. Vienas buteliukas per dieną aprūpina sąnarius reikalingomis medžiagomis: kolagenu, hialurono rūgštimi, gliukozaminu, chondroitinu, vitaminais C ir D3.  
„VERSAN“ – PROFESIONIŲ PAGALBA JŪSŲ SĄNARIAMS!

**NUO 6<sup>99</sup> €**



**HESIO**  
500 mg, 30 plėvele dengtų tablečių **6<sup>99</sup> €**  
500 mg, 60 plėvele dengtų tablečių **12<sup>99</sup> €**  
500 mg, 120 plėvele dengtų tablečių **24<sup>99</sup> €**  
1000 mg, 30 plėvele dengtų tablečių **12<sup>99</sup> €**

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**  
Kiekvienoje „Hesio“ 500 mg tablete yra 500 mg mikronizuotų flavonoidų (atitinka 450 mg diosmimo ir 50 mg kitų flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną). Kiekvienoje „Hesio“ 1000 mg tablete yra 1000 mg mikronizuotų flavonoidų (atitinka 900 mg diosmimo ir 100 mg kitų flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną). **Terapinės indikacijos.** „Hesio“ skirtas suaugusiųjų: lėtinio kojų venų nepakankamumo simptomams (kojų sunkumui, kojų patinimui, skausmui, naktiniam kojų mėšlungiui) lengvinti; patinėjimo hemoroidų simptomams (skausmui, kraujavimui ir patinimui išangės srityje) lengvinti. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** „Hesio“ 500 mg tabletes: lėtinis venų nepakankamumas: rekomenduojama dozė suaugusiems yra 2 tabletes per parą 2 mėnesius: 1 tablete vidurdienį ir 1 tablete vakare valgio metu. Jei simptomai išlieka, gydymas gali būti tęsiamas dar 2 mėnesius; hemoroidus pašalinimas: pirmas 4 gydymo dienas rekomenduojama dozė suaugusiems yra 3 tabletes 2 kartus per parą (6 tabletes per parą). Kitas 3 dienas – 2 tabletes 2 kartus per parą (4 tabletes), tabletes vartokite valgio metu. „Hesio“ 1000 mg tabletes: lėtinis venų nepakankamumas: rekomenduojama dozė suaugusiems yra 1 tablete per parą 2 mėnesius valgio metu. Jei simptomai išlieka, gydymas gali būti tęsiamas dar 2 mėnesius; hemoroidus pašalinimas: pirmas 4 gydymo dienas rekomenduojama dozė suaugusiems yra 3 tabletes per parą (1 tablete 3 kartus per parą arba 1 tablete pirma karta ir 2 tabletes antrą kartą per parą). Kitas 3 dienas – 1 tablete 2 kartus per parą (2 tabletes), tabletes vartokite valgio metu. **Kontraindikacijos.** „Hesio“ vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vaikams ir paaugliams „Hesio“ vartoti nerekomenduojama. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025 m. vasario mėn. ID: 000864446

**NUO 2<sup>99</sup> €**



**IBUPROM EXPRESS**  
400 mg, 10 minkštųjų kapsulių **2<sup>99</sup> €**  
400 mg, 20 minkštųjų kapsulių **4<sup>99</sup> €**

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**  
**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** Ibuprofenas, 400 mg. **Indikacijos:** skausmo (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimo malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems pacientams ir vyresniems nei 12 m. vaikams kaip trumpalaikis pagalbinis gydymas kas 4 val. geriama 1 kapsulė (negeri daugiau kaip 5 kapsulių per parą). Kapsulę negalima kramtyti. Kapsulę reikia užsigerti stikline vandens. **Kontraindikacijos:** alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, praėjusio buvusios padidėjusio jautrumo reakcijos vartojant kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo, sunkus kepenų, inkstų ar širdies funkcijos nepakankamumas, esama (ar praėjusio buvusio) peptinės opa, buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, kraujavimas į smegenis, virškinimo trakto arba kitoks kraujavimas, sisteminė raudonoji vilkligė, paskutinis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai:** specialiu atsargumo priemonių reikia, jeigu sutrikusi inkstų, kepenų, širdies ir virškinimo trakto veikla, vartojama kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo, sergama bronchine astma, alerginėmis ligomis ar sisteminė raudonąja vilkligė; senyviems žmonėms. Reklamos teksto parengimo data 2024.11.29.  
**RENKUOSI „IBUPROM“ - RENKUOSI LAISVĘ.**

**-50 % pigiau**



**-50 %**

**ATLANTI**, milteliai geriamajam tirpalui, 28 pakeliai **55<sup>99</sup> 28<sup>00</sup> €**  
**BIO SILYMARIN**, granulės, 28 pakeliai **40<sup>99</sup> 5<sup>25</sup> €**  
**COR 4 COMPLEX**, granulės, 28 pakeliai **18<sup>99</sup> 9<sup>45</sup> €**  
**MINERALVIT CARDIO**, 20 pakelių **9<sup>99</sup> 4<sup>75</sup> €**

**MAISTO PAPILDAI**

„Atlanti“ – „Biofarmacija“ kolageno, gliukozamino, kalcio ir vitamino C kompleksas kaulų, kremzlių ir odos funkcijai. Sudėtyje net 12 200 mg kolageno. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno susidarymą, reikalingą normaliai kremzlių, kaulų ir odos funkcijai, o kalcis svarbus normaliai kaulų būklei.  
 „BioSilymarin“ – „Biofarmacija“ ekologiškas maisto papildas su tikrųjų margaričių ekstraktu (silymarinu). Tikrieji margaričiai padeda palaikyti normalią kepenų funkciją ir virškinimo sistemos veiklą. Sudėtyje taip pat yra skaidulinių medžiagų. Nr. 1 maisto papildas kepenims Lietuvoje!  
 \*Nustatyta pagal 2024–2025 m. UAB „Softlenti“ duomenis.

„Cor4 Complex“ ir „Mineralvit Cardio“ – „Biofarmacija“ maisto papildai, kurių sudėtyje esantys mineralai ir vitaminai padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir kraujospūdį. Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį, magnis – normalią raumenų funkciją, o vitaminas B1 – normalią širdies veiklą. Augalinės kilmės medžiagos papildoma formulė ir tradiciškai naudojamos širdies bei kraujotakos sistemos palaikyti.

**-50 %**



**NATASPIN**

**CONTROL PRO**, 30 kapsulių **49<sup>99</sup> 10<sup>00</sup> €**  
**CARDIO PROTECT**, 30 kapsulių **20<sup>99</sup> 10<sup>50</sup> €**  
**H**, 30 kapsulių **17<sup>99</sup> 9<sup>00</sup> €**

**MAISTO PAPILDAI, SPECIALIOS MEDICININĖS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAS**

Širdies stiprybei ir apsaugai rinkites „NatAspin CARDIO PROTECT“ su stipriausiu antioksidantais ir **kofermentu Q10** (net 80 mg 1-joje kapsulėje). Teisingai cholesterolio kontrolei išbandykite 30 dienų kursą „NatAspin CONTROL PRO“.

Esant kraujotakos sutrikimų ir trombozės susidarymo rizikai vartokite „NatAspin H“ su natokinaze ir hidrokortizoliu iš alyvuogių. Visų „NatAspin“ formulių sudėtyje naudojami išskirtinai tik standartizuoti bioaktyvūs ekstraktai, kurie užtikrina fiksuotą veikliųjų medžiagų kiekį ir patikimumą.

„NATASPIN“ – TEISINGI SPRENDIMAI ŠIRDŽIAI, KRAUJOTAKAI, GLIUKOZĖS IR CHOLESTEROLIO KONTROLEI.

**IKI -65 %**



**RAMI ŠIRDIS**

**MAISTO PAPILDAI**

„Rami širdis“ – dvejuose pakeičio maisto papildai, pripažinti Lietuvos vartotojų. Šios linijos preparatams būdinga puikiai suderinta sudėtis, kuri, be vitaminų ir mineralų, papildyta natūraliais augaliniais ekstraktais, šintetinius naudojamais medicinoje. „Rami širdis“ maisto papildai padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir psichologinę funkciją, taip pat padeda mažinti nuovargį.

**RAMIAME KŪNE – RAMI ŠIRDIS**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

**-50 %**



**ACONITUM**

**MAGNIS + B6 COMPLEX**, 30 kapsulių **44<sup>99</sup> 7<sup>50</sup> €**  
**MAGNIS + B6 SUPERIOR**, 30 kapsulių **13<sup>99</sup> 7<sup>00</sup> €**

**MAISTO PAPILDAI**

„Magnis + B6 complex“ sudėtyje magnis yra magnio oksido pavidalu. „Magnis + B6 superior“ naudojama ypatinga magnio forma – dvi magnio druskos (magnio oksidas ir magnio citratas), kurios organizme išlieka ilgiau, nes suvija skirtingu metu. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų ir nervų sistemos veiklą. Magnis ir vitaminas B6 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją bei mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

**IKI -60 %**



**GASTROVAL**

**MAISTO PAPILDAI**

Naujiena: **GASTROVAL MAX** – 4 kartus stipresnė augalinė formulė!  
 „Gastroval MAX“ – augalinių fermentų, ekstraktų ir prebiotiko kompleksas, padedantis palaikyti sklandų virškinimą;

lengvumo pojūtį po valgio;  
 žarnyno mikrofloros balansą;  
 normalų virškinimą tiems, kurie patiria stresą.

**GASTROVAL FLUXUS** padeda palaikyti skrandžio rūgštingumo pusiausvyrą dėl sudėtyje esančių: augalų sėklų ir šaknų ekstraktų, magnio, virškinimo fermentų, bifido- bei lakto bakterijų, inulino.

**GASTROVAL HEPAR FORMULA** – tik 1 kapsulė per dieną! Geresnio pasisavinimo augalinė formulė – rimtesnė kepenų apsauga nuo oksidacinių pažeidimų, kepenų ląstelių regeneracija, organizmo valymo funkcija, normalaus cholesterolio lygio palaikymas. „Gastroval“ suprantą, ko reikia virškinimui, skrandžio rūgštingumui, kepenų veiklai.

**GASTROVAL FORTE** – stiprus net 7 augalines kilmės fermentų ir augalinių ekstraktų derinys virškinimui. Sudėtyje yra didesnis kiekis fermentų – kai reikia stipresnės pagalbos.

**GASTROVAL** sudėtyje – augalinių fermentų ir ekstraktų derinys, kurio nauda lengva pajauti.  
**GASTROVAL suprantą, ko reikia virškinimui, kepenų veiklai, skrandžio rūgštingumui.**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

**Akims**

**-50 %**



**OCUVAL**

**MAISTO PAPILDAI**

„Ocual“ – akims naudingų medžiagų kompleksas su liuteinu, dumblių ekstraktu ir beta karotenu.

„Ocual Strong“ – kai reikia stipresnės pagalbos akims – net 30 mg liuteino, omega-3, zeaksantinas, vitaminai A, B2 ir cinkas.  
**„Ocual Hydro Max“** – skirtas pavargusių, jautrių, daug dirbančių akių drėgmei palaikyti.

„OCUVAL“ – MATYK, KAI LABIAUSIAI REIKIA!

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

Nuo skausmo ir karščiavimo

NUO 2<sup>99</sup> €



**IBUPROM**

200 mg, 10 dengtųjų tablečių 2<sup>99</sup> €  
 200 mg, 20 dengtųjų tablečių 4<sup>49</sup> €  
 400 mg, 10 dengtųjų tablečių 3<sup>49</sup> €  
 400 mg, 20 dengtųjų tablečių 4<sup>99</sup> €

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** ibuprofenas, 400 mg ir 200 mg. **Terapinės indikacijos:** skausmo (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimo mažinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** ibuprofeną, 400 mg: suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 1 tablete 3 kartus per parą. „Ibuprom, 200 mg“: 6–9 m. vaikams (kūno svoris 20–25 kg) gerti po 1 tablete kas 6–8 val. (negerti daugiau nei 3 tablečių per parą); 10–12 m. vaikams gerti po 1 tablete kas 6 val. (negerti daugiau nei 4 tablečių per parą); suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams pradinė dozė yra 2 tabletes, po to galima gerti po 1–2 tabletes kas 4 val. (negerti daugiau nei 6 tablečių per parą). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, taškinis kraujavimas, ūminis skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligės stadija; anksčiau buvusi alergija acetylsalicilo rūgščiai ir kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; sergant sunkiu širdies nepakankamumu; esant trečiam nėštumo trimestriui. **Specialūs įspėjimai:** vartoti nepatartina, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu, bronchių astma. Reklamos teksto parengimo data 2026-03-23.

**RENKUOSI „IBUPROM“.** RENKUOSI LAISVĖ.

2<sup>49</sup> €



**PARACETAMOL ZENTIVA 500 mg, 20 tablečių**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Kiekvienoje tablete yra 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos.** Trumpalaikis simptominis lengvo ar vidutinio stiprumo skausmo ir (arba) karščiavimo malšinimas. „Paracetamol Zentiva“ 500 mg tabletes skirtas suaugusiems, paaugliams ir 6 metų bei vyresniems vaikams, sveriantiems daugiau kaip 21 kg. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Reikia vartoti mažiausią veiksmingą dozę kiek galima trumpesniąją laiką. Didžiausios paros dozės viršyti negalima. Paracetamolis dozuojamas atsizvelgiant į kūno svorį ir amžių, paprastai skiriant vienkartinę 10-15 mg/kg kūno svorio dozę, nevirsiant didžiausios paros dozės – 60 mg/kg kūno svorio. Tabletes reikia nuryti užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio, vartoti valgio metu arba nevalgius. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbine medžiagai; Sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas. Ūminis hepatitas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Paracetamol Zentiva“ nevartokite kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio. Vartojant didesnes nei rekomenduojama vaisto dozes, padidėja sunkaus kepenų pažeidimo pasireiškimo rizika. Vartodami šį vaistą negerkite alkoholinių gėrimų. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025. rugsėjo mėn. ID:000785499

Nuo rėmens

NUO 2<sup>99</sup> €



**RANIGAST S-O-S**

12 kramtomųjų tablečių 2<sup>99</sup> €  
 24 kramtomosios tabletes 4<sup>99</sup> €

**MEDICINOS PRIEMONĖS**

„Ranigast S-O-S“ yra skirtas gastroezofaginio refliksu simptomams (rėmeniui, skrandžio skausmui, dispepsijai) malšinti.

- Veikia akimirksniu – nuo to momento, kai tik sučiulpsite ar išgersite tablete.
  - Dėl ypatingos sudėties apsaugo skrandžio gleivinę ir sumažina rėmens epizodų skaičių.
  - Tinka naudoti ir kaip papildoma priemonė sergantiems gastritu, peptine opa.
  - Galima naudoti nėštumo ir žindymo metu, prieš tai pasitarus su gydytoju.
- Suaugusiems ir vaikams nuo 12 metų; rekomenduojama pavalgius vartoti 2 tabletes. Vaikams (6–12 metų); rekomenduojama pavalgius vartoti 1 tablete.

4<sup>99</sup> €



**ACETERIN EXPRESS 10 mg, 10 tablečių**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 tablete yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito bei lėtinis idiopatinis dilgėlinės spalvingumas palengvinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vyresniems kaip 12 metų asmenims – po 1 tablete per dieną, 6–12 metų vaikams – po pusę tabletes 2 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pagalbine medžiagai, hidroksizinui arba bet kuriam piperazino dariniui. Pacientai, kuriems smarkiai sutrikusi inkstų funkcija. **Specialūs įspėjimai:** atsargiai vartoti sergantiems epilepsija ir pacientams, kuriems yra traukulių pavojus. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“, filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS260109661. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

Nuo alergijos

4<sup>99</sup> €



**LORATADINE ACTAVIS 10 mg, 10 tablečių**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Kiekvienoje tablete yra 10 mg loratadino. **Terapinės indikacijos.** Simptominis alerginio rinito ir lėtinis idiopatinis dilgėlinės gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** *Suaugusiems:* 10 mg tablete 1 kartą per parą, 6 m. ir vyresniems vaikams ir paaugliams, sveriantiems daugiau negu 30 kg: 10 mg tablete 1 kartą per parą. Jaunesniems kaip 6 m. vaikams arba sveriantiems mažiau negu 30 kg žmonėms vartoti 10 mg tablečių nerekomenduojama. Loratadino saugumas ir veiksmingumas jaunesniems kaip 2 m. vaikams nenustatyti. Pacientams, sergantiems sunkiu kepenų funkcijos nepakankamumu, skiriama pradinė 10 mg dozė kas antrą dieną. **Kontraindikacijos.** Loratadino tablečių vartoti draudžiama, jeigu padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbine medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Loratadine Actavis“, jeigu sergate kepenų liga; Jums numatoma atlikti kokius nors odos mėginius dėl alergijos. Nevartokite „Loratadine Actavis“ 2 dienas iki numatomų alerginių odos mėginių. To reikia, nes šis vaistas gali paveikti šio tyrimo rezultatus. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.OTC-LT-00107.  **Teksto peržiūros data 2024-07-11. Reklaminės medžiagos parengimo data 2026-02.**

Esant viduriavimui

4<sup>49</sup> €



**LOPERAMIDUM PPH, 2 mg, 10 tablečių**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veiklioji medžiaga.** loperamido hidrochloridas. **Indikacijos:** simptominis suaugusių ir vyresnių negu 12 metų paauglių ūminio viduriavimo gydymas tokiu atveju, jei negalima pašalinti viduriavimą sukėlusios priežasties. **Dozavimas:** pradžioje geriami 2 tabletes (4 mg), vėliau – po 1 tablete (2 mg) po kiekvieno išsistūtinimo nesuformuotomis išmatomis. Draudžiama per parą gerti daugiau kaip 6 tabletes (12 mg). **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas loperamido hidrochloridui arba bet kuriai pagalbine medžiagai; jaunesni negu 12 metų pacientai; paralyžinis žarnų nepraeinamumas; vidurių užkietėjimas; pilvo pūtimas; organizme per mažai skysčių; pseudomembraninis kolitas, kurį dažniausiai sukelia plataus poveikio antibiotikai; ūminė bakterinė dizenterija, bei kitoks bakterinis viduriavimas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** loperamido hidrochloridu gydymas pacientams turi vartoti pakankamai vandens bei mineralinių medžiagų. Šio vaistinio preparato reikia atsargiai vartoti ligoniams, kuriems yra kepenų nepakankamumas. Sergant Krono liga, loperamido hidrochloridu reikia vartoti atsargiai. Jeigu pasireiškia vidurių užkietėjimas, pilvo pūtimas ar atsiranda pirmųjų žarnyno obstrukcijos simptomų, šio vaistinio preparato vartojimą būtina nutraukti. Jeigu ligonis karščiuoja bei jo išmatose yra kraujo, prieš pradėdami vartoti loperamido hidrochlorido, būtina išsiaiškinti tokio viduriavimo priežastį. Vartojant loperamido hidrochlorido, gali pasunkėti slėpimasis. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Reklamos teksto parengimo data 2025-01.

NUO 4<sup>99</sup> €

## DICLAC

1% gelis, 50 g 4<sup>99</sup> €  
5% gelis, 50 g 6<sup>99</sup> €

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** 1 g „Diclac“ 5% gelio yra 50 mg, 1 g „Diclac“ 1% gelio yra 10 mg diklofenako natrio druskos. **Terapinės indikacijos:** lokaliai skausmui malšinti, uždegimui slopinti ir palatinimui mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** ploną „Diclac“ 5% gelio sluoksnį tepti 2 kartus per dieną, „Diclac“ 1% geli tepti 3–4 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** jautrumas diklofenakui ar pagalbinėms medžiagoms, jaunesni kaip 14 m. vaikai, 3 paskutiniai nėštumo mėnesiai. **Specialūs įspėjimai:** negalima tepti burnos, nuryti. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS26201069663. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

STIPRUS AKTIRTSIS SKAUSMUI!

-50%

AQUAMAG + B6, geriamasis tirpalas, 10 pakelių 8<sup>99</sup> 4<sup>10</sup> €AQUAMAG + B6 FORTE, milteliai geriamajam tirpalui, 28 pakeliai 44<sup>99</sup> 5<sup>80</sup> €BIOMAGNESIUM, 300 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 30 pakelių 44<sup>99</sup> 7<sup>20</sup> €BIOMAGNIS + BIOKALIS, milteliai geriamajam tirpalui, 30 pakelių 44<sup>99</sup> 7<sup>50</sup> €

## MAISTO PAPILDAI

**Magnis ir kalis** – esminiai mineralai kasdienei pusiausvyrai palaikyti. „Biofarmacija“ Nėgyvosios jūros mineralų formulės sukurtos normaliai raumenų funkcijai, nervų sistemos veiklai ir energijos apykaitai palaikyti. Vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, o magnis svarbus elektrolitų pusiausvyrai.

„bioMagnesium 300 mg“, „bioMagnis 300 mg + bioKalis 300 mg“ ir „AquaMag+B6 Forte“ ir „AquaMag+B6“ – tai grynų mineralų formulės, sukurtos kasdieniam kūno tonusui, energijai ir vidinei pusiausvyrai palaikyti.

Perkamausi magnio ir kalio maisto papildai Lietuvoje 2019–2025 metais.\*

\*Pagal UAB „Softident“ duomenis.

2<sup>99</sup> €

OMEP UNO 20 mg, 14 skrandyje neirių kietųjų kapsulių

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** 1 kapsulėje yra 20 mg omeprazolo. **Terapinės indikacijos:** suaugusių žmonių trumpalaikis refluksio simptomų gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti po 1 kapsulę per parą, ryte. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas omeprazolui (taip pat pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, ezomeprazolui) ar pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** sudėtyje yra sacharozės. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS26201079717. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-07.

NUO 2<sup>99</sup> €

## THROMBO ASS

50 mg, 100 skrandyje neirių tablečių 2<sup>99</sup> €75 mg, 100 skrandyje neirių tablečių 3<sup>99</sup> €100 mg, 100 skrandyje neirių tablečių 4<sup>99</sup> €

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veiklioji medžiaga:** acetilsalicilo rūgštis. **Terapinės indikacijos:** miokardo infarkto rizikos mažinimas sergantiesiems krūtinės angina. Antrinė miokardo infarkto profilaktika. Trombozės profilaktika po vainikinių arterijų nuosrovio operacijos. Antrinė praeinąčio smegenų išemijos priepuolio (PSIP) ar insulto profilaktika. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti po 1 tablete 1 kartą per dieną (patariama vakare). Skrandyje neirių tablete reikia nuryti nesukramtyta, užsigeriant pakankamu skysčio kiekiu valgio metu arba tarp valgių tuo pačiu paros metu. Įprastinė paros dozė ilgalaikiam vartojimui yra 50–150 mg. Dalyti į dalis. „Thrombo ASS“ skrandyje neiros tabletes negalima, nes bus pažeista skrandyje neiri plevelė. Norint, kad tikty individualiam vartojimui, reikia rinktis atitinkamo stiprumo preparatą (50 mg, 75 mg ir 100 mg). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei salicilatams ir kitiems NVNU; bronchų spazmas; ūminė pepsinė opa; polinkis į kraujavimą, hemofiliją; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; sunkus, nepakankamai kontroliuojamas širdies nepakankamumas; nėštumas; vaikai ir paauguliai iki 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Atsargumo reikia laikytis šiais atvejais: sergant bronchine astma, šienlige, esant nosies gleivinės paburkimui ir esant kito pobūdžio alergijai; vartojant kartu su vaistais, mažinančiais kraujo krešumą; sergant hemolizine anemija; esant skrandžio ir žarnų sutrikimams, esant anamnezėje duomenims apie opaligę ar kraujavimą iš virškinimo trakto; esant inkstų ligoms ir (arba) kepenų funkcijos sutrikimui; turintiems polinkį podagrai. Prieš numatytą operaciją 10 dienų acetilsalicilo rūgštis reikia nevartoti. Šio vaisto sudėtyje yra laktozės monohidrata, todėl vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pakuotė. 50 mg, 75 mg arba 100 mg, 100 skrandyje neirių tablečių. Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas. G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. Teksto peržiūros data. 2020 05 13. Reklamos teksto parengimo data: 2026 06 17.

-40%



## VIZIK

ALLERGY, 10 ml 46<sup>99</sup> 10<sup>18</sup> €Pavargusioms ir sausoms akims, 10 ml 42<sup>99</sup> 7<sup>78</sup> €Sudirgusioms ir paraudusioms akims, 10 ml 42<sup>99</sup> 7<sup>67</sup> €

## MEDICINOS PRIEMONĖS

Be konservantų.

ATIDARIUS BUTELIUKUS GALIMA NAUDOTI NET VIENERIUS METUS!

SLENKA PLAUKAI?\* PASITIKĖK VAISTO GYDOMAJA GALIA!

NUO 9<sup>99</sup> €

## BEOTEBAL

10 mg, 30 tablečių 9<sup>99</sup> €10 mg, 60 tablečių 19<sup>99</sup> €

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

BEOTEBAL 10 mg tabletes. **Kokybinė ir kiekybinė sudėtis.** Kiekvienoje tablete yra 10 mg biotino. **Terapinės indikacijos.** „BEOTEBAL“ priklauso B vitamino preparatų grupei ir vartojamas biotino trūkumo gydymui suaugusiesiems. Biotino trūkumas gali sukelti plaukų retėjimą, plaukų slinkimą, nagų ir plaukų augimo sutrikimus bei padidėjusį trapumą, dermatitą (odos uždegimą, kuriam paprastai būdingas niežulys ir paraudimas) aplink akis, nosį, burną, ausis ir kirksnius, korinktyvitą (akies junginės uždegimą, dėl kurio akys atrodo paraudusios), nuovargio, parestezijos (nenormalaus odos pojūčio, pasireiškiančio tokiais simptomais kaip dilgčiojimas, peršėjimas, šalimas, deginimas, tirpimas) simptomus. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiesiems, įskaitant senyvus pacientus, vartoti 10 mg biotino, t.y. 1 tablete „BEOTEBAL“ per parą. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paauguliams. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu yra numatoma atlikti laboratorinius tyrimus, turite pasakyti savo gydytojui arba laboratorijos darbuotojams, kad vartojate arba neseniai vartojote „BEOTEBAL“, nes biotinas gali turėti įtakos tokių tyrimų rezultatams. Atsivėlįjiant į tai, koks tyrimas atliekamas, dėl biotino poveikio tyrimų rezultatai gali būti klaidingai didesni arba klaidingai mažesni. Reklamos teksto parengimo data 2025-02.

\*Slenkantys, silpni, trapūs plaukai yra viena iš biotino trūkumo išraiškų. „Beotebal“ yra nereceptinis vaistas skirtas biotino trūkumo gydymui.

NUO 3<sup>99</sup> €



**NALGESIN S**

Natrio naproksenas, 10 dengtųjų tablečių 3<sup>99</sup> €  
Natrio naproksenas, 20 dengtųjų tablečių 5<sup>99</sup> €

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** natrio naproksenas – 275 mg. **Indikacijos:** galvos, dantu, mėnesinių, snarių, raumenų, potrauminio, pooperacinio skausmams malšinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 18 metų vaikams įprastinė paros dozė skausmui malšinti – 550–1100 mg, iš pradžių vartojama 550 mg, vėliau – po 275 mg kas 6–8 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bet kuriai sušedamajai preparato medžiagai, buvusi alerginė reakcija, kurią sukėlė nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, aktyvi ar atsinaujanti skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, kraujavimas iš virškinamojo trakto, sunkus širdies nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai:** naproksenu gydoma pacienta, serganti epilepsija ar porfija, kuriam buvo ar yra virškinamojo trakto sutrikimų, ypač opinis kolitas ar Krono liga, privalo stebėti gydytojas. Naproksenu draudžiama vartoti, jei yra sunki senesni žaizda arba iki didelės operacijos liko mažiau kaip 48 valandos. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024 07 12.

**MAŠINA SKAUSMĄ IR UŽDEGIMĄ.**

**SKAUSMUI, TINIMUI IR UŽDEGIMUI MAŽINTI**

9<sup>99</sup> €



**DIFORTAN 100 mg/g, gelis, 100 g**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** kiekviename „Difortan“ gelio grame yra 100 mg etofenamato. **Terapinės indikacijos:** lengvų arba vidutinio stiprumo raumenų skausmų, kraujosruvų, potrauminio skausmo, lengvo arba vidutinio stiprumo raumenų skausmo (osteoartritozės / osteoartrito), lengvo arba vidutinio stiprumo snarių skausmo, sinovito, (neinfekcinio) artrito, bursito, tendinito, vidutinio sunkumo su raumenų ir skeleto sistema susijusio uždegimo, t. y. potrauminio ar reumatinės kilmės, lokalaus gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems kasdien 3–4 kartus per parą, 14 parų, dozės kiekis atitinka nuo 2,5 iki 5 cm išpausto gelio. **Kontraindikacijos:** vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai ar ant egemos pažėistų paviršių, atvirų žaizdų, vietų su opomis ar pažeidimais. **Specialūs įspėjimai:** „Difortan“ negalima tepti ant gleivinių arba ant akių. Galimas padidėjęs jautrumas dėl kryžminės reakcijos su kitais uždegimus malšinančiais vaistiniais preparatais. Kontaktinės fotoalergijos rizika, todėl saugoti nuo saulės spindulių. Negalima atvesti sisteminio poveikio reiškinį galimybės, todėl pacientams, kuriems yra inkstų ar kepenų nepakankamumas, šį vaistinį preparatą reikia vartoti atsargiai. Pasitarti su gydytoju, jeigu būklė nepagerėja arba jei po 7 parų būklė pablogėja. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-05-19.

2<sup>99</sup> €



**FREST® 1 mg/g gelis, 30 g**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

1 g gelio yra 1 mg dimetindeno maleato. **Terapinės indikacijos:** Frest vartojamas niežėjimo, susijusio su dermatozėmis, dilgeline, vabzdžių įkandimais, nudegimais nuo saulės spindulių ir paviršinių odos nudegimais (pirmojo laipsnio) trumpalaikiam malšinimui suaugusiems, paaugliams ir 1 mėnesio bei vyresniams vaikams. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Suaugusiems, paaugliams ir vaikams Frest gelį reikia tepti plonu sluoksniu ant pažeistos ir niežtinčios odos vietos iki 3 kartų per parą. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Frest negalima vartoti jaunesniems nei 1 mėnesio vaikams, ypač neišnešiotiems. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu pasireiškė labai sunkus niežėjimas arba oda labai paražėsta, kartu su lokaliai vartojamu dimetindeno maleatu rekomenduojama skirti gydymą sisteminio poveikio geriamaisiais vaistiniais preparatais. **Vietinis rinkodaros teisės turėtojas atstovs** UAB „Grindeks Kalceks Lietuva“. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026-04-14

6<sup>99</sup> €



**INOVOX**

HONEY LEMON, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, 24 kietosios pastilės  
ORANGE, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, 24 kietosios pastilės  
MENTHOL, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, 24 kietosios pastilės

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 kietojoje pastilėje yra 2 mg lidokaino hidroklorido, 0,6 mg amilmetakrezolio ir 1,2 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio. **Indikacijos:** gerklės skausmas malšinimas, vietinis antispazminis gerklės ir burnos ertmės uždegiminių būklių (pvz., paraudimo, patinimo) gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** po 1 kietąją pastilę kas 2–3 val. ir kai reikia, bet ne daugiau kaip 8 kietąsias pastiles per parą (vaikams – ne daugiau kaip 4 pastiles). Vartoti ant burnos gleivinės. Kietąją pastilę reikia lėtai susiūplinti laikant burnoje, bet ne už skruosto. Vaisto nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti jaunesniams kaip 12 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** jei simptomai nesnyksta ilgiau kaip 2 paras, sunkėja, arba atsiranda nauji simptomai, reikia įvertinti paciento klinikinę būklę. Atsargiai vartoti ūminė liga sergantiems, nusilpusiems pacientams. Nevartoti esant ūminios burnos ir gerklės žaizdoms, įverti valgant ar atsigeriant. Astma sergantys pacientai turi būti pržiūrinami gydytoju. Sudėtyje yra levomentolio terpenų, gliukozės, sacharozės, saulėlydzio geltonejo ir kosulnio raudonojo. **Reklamos teksto parengimo data:** 2022-06-09.

„INOVOX“. EFEKTAS – JAU PO 1 MINUTĖS!

NUO 2<sup>49</sup> €



**IBUPROFEN LANNACHER**

400 mg, 10 plėvele dengtų tablečių 2<sup>49</sup> €  
400 mg, 20 plėvele dengtų tablečių 3<sup>99</sup> €

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Vienoje plėvele dengtoje tabletyje yra 400 mg ibuprofeno. **Indikacijos:** „Ibuprofen Lannacher“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos ibuprofeno. Ibuprofenas malšina uždegimo sukeltą skausmą, patinimą ir karščiavimą, vartojamas trumpą laiką silpno ar vidutinio stiprumo skausmui, tokiam kaip mėnesinių, galvos, dantu, raumenų, snarių, malšinti. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** tabletes reikia nuryti valgant arba pavalgus, užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: 0,5–1 plėvele dengtą tablete 3 kartus per parą. Negalima viršyti didžiausios paros dozės 1200 mg ibuprofeno (3 plėvele dengtų tablečių). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofeni arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijų, vartojant kita nesteroidinį vaistą nuo uždegimo, acetilsalicilo rūgšties darinius. Sunkus kepenų, inkstų ar širdies funkcijos nepakankamumas. Paskutiniu trijų mėnesių laikotarpis. Pėsinė opa. Kraujavimas iš smegenis, virškinimo trakto arba kt. Sisteminė raudonoji vilkligė. Jaunesni nei 12 m. vaikai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai skirti pacientams, sergantiems širdies ir kraujagyslių, smegenų kraujagyslių ligomis, cukriniu diabetu ir jungiamojo audinio ligomis, senyviems pacientams. Pacientams, sergantiems bronchine astma ar alerginėmis ligomis, gali išsivystyti bronchų spazmas. Virškinimo trakto sutrikimai ir lėtinės uždegiminės žarnyno ligos gali pažeisti. Atsirdus virškinimo trakto kraujavimui ar išopėjimui, gydymas turi būti nedelsiant nutrauktas. Vartojimas gali mažinti moters vaisiungumą. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Pakuotė:** 10 ir 20 plėvele dengtų tablečių. **Farmakoterapinė grupė:** nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo. **ATC kodas:** M01AE01. **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:** „G.L. Pharma GmbH“, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. **Paskutinė teksto peržiūros data:** 2024-10-18. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026 06 17.

**NUSIMESK SKAUSMO KAUKE!**

-30%



**NEOBIANACID**

**MEDICINOS PRIEMONĖS**

Mašina refliksa, rėmeni, skrandžio skausmą, virškinimo sutrikimus.  
• „NeoBianacid Pediatric“ – vaikams nuo 1 metų amžiaus.  
• „NeoBianacid“ tabletes (metų arba citrinų aromato) – vaikams nuo 6 metų ir suaugusiems.  
• Tinka vartoti nėštumo, žindymo metu.  
100 % natūralus ir biologiškas skaidus produktas, kurio sudedamosios dalys yra iš ekologiškai ūkių.  
Gamintojas: „Aboca S.p.A. Società Agricola“, Italija

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

## SAUSOMS AKIMS ARTELAC®

-30%



## ARTELAC®

## MEDICINOS PRIEMONĖS

„Artelac® Splash“ – vienas populiariausių mūsų produktų su hialuronu, skirtas sausoms akims nedelsiant nuraminti ir sudrėkinti. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius.

„Artelac® Rebalance“ užtikrina stiprų drėkinamąjį poveikį ir palėnėvimą, esant nuolat pasikartojančiam akių sausumui. Drėkina akis ir apsaugo jų paviršių, papildoma ašarų plevėle puoselejanciais joniais, vitaminu B12, sureguliuoja osmosinį akių paviršiaus balansą ir taip padeda ilgam sustabdyti sausų akių simptomų pasireiškimą.

„Artelac® TripleAction“ pažangus tirpalas, sukurtas taip, kad išliktų ant akių paviršiaus, ir intensyviai drėkinamas greitai ir ilgam numalintų sausų akių simptomus. Sudėtyje esantys komponentai (hialuronas, glicerolis, karbomeras, lipidiniai komponentas) atkuria visus tris ašarų plevėles sluoksnius. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius.

„Artelac® Nighttime Gel“ atkuria ašarų plevėlę nakties metu. Produktas suteikia papildomą apsaugą tiems, kam pasireiškia didesnis ir nuolatinis akių sausumas. 2026-03-23

„ARTELAC“ – PAŽANGŪS SPRENDIMAI SAUSOMS AKIMS.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

## ALERGIJOS SIMPTOMAMS LENGVINTI

3<sup>99</sup> €

## BILASTINE STADA 20 mg, 10 tablečių

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** kiekvienoje tabletyje yra 20 mg bilastino. **Terapinės indikacijos:** vartojamas šienligės (kuriai būdingi simptomai yra čiaudulys, niežulys, sloga, užgulta nosis, paraudusios ir ašarojančios akys) ir kitų alerginės slogos formų simptomams lengvinti. Taip pat gali būti vartojamas nežiūntiems odos bėrimams (pūkslės, dilgėlinė) gydymui. Skirtas suaugusiems ir 12 m. bei vyresniems paaugliams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** rekomenduojama dozė yra 1 tablete per parą. Tablete reikia nuryti nevalgius, 1 val. prieš valgį arba sulčių gėrimą, arba praėjus 2 val. po valgyto arba sulčių gėrimo. Nuryti tablete užsigeriant stikline vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** esant vidutinio sunkumo arba sunkiam inkstų funkcijos sutrikimui, jei vartojami kiti vaistai (pvz., ketokonazolas, eritromicinas, difliazemas, ciklosporinas, ritonaviras, rifampicinas), reikia vengti vartoti kartu su bilastinu. Reklamos teksto parengimo data 2024-12-2604 - Bilastine\_V01\_LT

PALENGVINKITE ALERGIJĄ IR MĖGAUKITĖS GYVENIMU!

## LĒTINIAMI HEPATITUI, KEPENŲ CIROZEI IR TOKSINIAMI KEPENŲ PAŽEIDIMUI PAPILDOMAI GYDYTI

6<sup>99</sup> €

## CARSIL

110 mg, 30 kietųjų kapsulių

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** veiklioji medžiaga – silimarinas. 1 kietojoje kapsulėje yra 200–275 mg margainių vaisių (*Silybum marianum* (L.) Gaertn., *fructus*) rafinolato ir standartizuoto sausos ekstrakto (35–50:1), atitinkančio 110 mg silimarino, išreikšto silibininu. Ekstraktas tirpiklis – 98 % (V/V) metanolis. **Indikacijos:** papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms, sergantiems lengva arba vidutiniu sunkumo kepenų liga, rekomenduojama vartoti po 1 kietąją kapsulę 2–3 kartus per parą. Gydymo kurso trukmė turėtų būti ne trumpesnė kaip 3 mėnesiai. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. **Kontraindikacijos:** preparato „Carsil“ vartoti negalima, jeigu yra alergija silimarinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, taip pat astriinių ar graižietinių (*Asteraceae* / *Compositae*) šeimos augalams. **Specialūs įspėjimai:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Carsil“. Jeigu sergate diabetu ar yra sumažėjusi gliukozės koncentracija kraujyje, vartojant „Carsil“ gali sumažėti gliukozės koncentracija kraujyje. Vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems nei 18 metų paaugliams, nes duomenų apie šio preparato saugumą ir veiksmingumą nepakanka. Kitų vaistų vartojimas: duomenų apie „Carsil“ sąveiką su kitais preparatais nėra „Carsil“ vartojimas su maistu ir gėrimais: duomenų nėra. Nėštumas ir žindymo laikotarpis: jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Klinikinių duomenų apie silimarino vartojimą nėštumo metu nėra, taip pat nežinoma, ar silimarino patenka į motinos pieną.

KAD JŪSŲ KEPENYS BŪTŲ SVEIKOS!

6<sup>99</sup> €

## MAGNEROT 500 mg, 50 tablečių

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekvienoje tabletyje yra 500 mg magnio orotato dihidrato (atitinka 32,8 mg magnio). **Terapinės indikacijos.** Magnio trūkumo, jeigu jis sukelia raumenų veiklos sutrikimą (pvz., mėšlungį), šalinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** *Suaugusiems žmonėms:* jei nepaskirta kitaip, magnio atsargoms papildyti pirmą savaitę reikia gerti po 2 tabletes 3 kartus per parą, po to – po 2–3 tabletes per parą. *Vaikų populiacija:* „magnerot“ nėra skirtas vaikams iki 18 metų. Vartoti per burną. Tablete reikia nuryti visą arba sukramtyta prieš valgį ar valgant, užgeriant nedideliu kiekiu skysčio. Tablete reikia vartoti mažiausiai 6 savaites. Galima vartoti ir ilga laiką. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Inkstų funkcijos sutrikimas ir polinkis formuotis kalcio, magnio ir amonio fosfatų akmenims. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktazės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktazės malabsorbcija. Sąveika su kitais vaistinėmis preparatais ir kitokia sąveika. Jei kartu vartojama geležies vaistinių preparatų, magnis gali sutrikdyti geležies absorbciją. Tokiu atveju geležies vaistini preparatą reikia gerti ne anksčiau, kaip praėjus 2–3 val. po magnio vaistinio preparato pavartojimo (arba atvirkščiai). Taip turi būti vartojami ir tetracikliniai bei natrio fluoridais. Nepageidaujamas poveikis. Didelės dozės gali sukelti viduriavimą arba išmatų suminkštėjimą. Sumažinus dozę, toks poveikis išnyksta. **Pakuotė.** 50 tablečių. **Teksto peržiūros data.** 2024.09.26. **Registruotojas.** Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Vokietija. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-09-29.

ORGANINĖ MAGNIO DRUSKA, LENGVAS PASISAVINIMAS.

## PAVIRŠINIŲ ODOS ŽAIZDŲ GYJIMO GERINIMUI

NUO 4<sup>99</sup> €

## BEPANTHEN

50 mg/g kremas, 30 g 4<sup>99</sup> €  
50 mg/g tepalas, 30 g 4<sup>99</sup> €

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 g preparato yra 50 mg dekspantenolio. **Terapinės indikacijos:** įvairios kilmės paviršinių odos ir gleivinių pažeidimų pagalbinis gydymas, drėkinant odą ir atkuriant epidermio barjerą, palaikant epitelizaciją su atitinkamu prieuždegiminiu ir niežėjimą mažinančiu poveikiu, pavyzdžiui, nedidelių pažeidimų (nedidelių nudegimų arba nubrozdinimų), odos sudirginimų, išbėrimo nuo sauskelnių, skausmingų ir įtrūkusius spenelių gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** pažeista oda tepti plonu sluoksniu preparato vieną ar daugiau kartų per dieną, kai reikia. Skausmingus ir įtrūkusius spenelius tepti po kiekvieno maitinimo, tepti žindant nuplauti. Tepti kiekvieną kartą keičiant sauskelnes, prieš tai oda reikia kuo kruopščiau nuvalyti. Gydymo trukmė priklauso nuo ligos pobūdžio ir eigos. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jei sergate kita liga, esate alergiškas arba vartojate kitus vaistus, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Naudojant tepalą ar kremą reikia vengti kontakto su akimis. Reklamos teksto parengimo data 2024-10. CH-20241030-71

## BEPANTHEN PLUS

50 mg/5 mg/g kremas, 30 g 5<sup>99</sup> €

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 g kremo yra 50 mg dekspantenolio ir 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** lokalus įvairių paviršinių žaizdų, pvz., nubrozdinimų, įpjovimų, išbrėžimų, odos įtrūkių, nudegimų gydymas, kai yra infekcijos pavojus. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** kūdikiams nuo 1 mėn., vaikams, paaugliams ir suaugusiems išvalytą žaizdą arba pažeistą odą pažeista odą reikia tepti plonu kremo sluoksniu vieną ar kelis kartus per dieną, kol žaizda užgis. Venkite tepti didelius odos plotus. **Kontraindikacijos:** alergija veikliosios arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; gilus arba stipriai užkrėstas žaizdos; jei trūkės ausies būgnelis, negalima tepti ausies srityje. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** saugokitės, kad kremas nepatektų į akis, ausis ir ant gleivinių. Negalima tepti ant sudirgintos, bet neinfekuotos odos. Negalima vartoti kartu su kitomis antiseptinėmis medžiagomis, muilu. Jei pasireiškia sunkios alerginės reakcijos simptomai, vartojimą nedelsdami nutraukite ir pasitarkite su gydytoju. Reklamos teksto parengimo data: 2024-10. CH-20241030-71

LAIMEI, YRA „BEPANTHEN“ GYDO IR APSAUGO ODA

-30% 11<sup>08€</sup> 15<sup>99€</sup>

## OCHISAN

akių vokų tepalas, 15 g

## MEDICINOS PRIEMONĖ

Akių vokų tepalas be konservantų. Padeda palengvinti tokius simptomus, kaip vokų odos niežulys, ju skausmingumas ir patinimas, susjūsus, be kita ko, su išorinio miežio ir chalaziono atsiradimu. Veiklioji medžiaga sluotinių sklėklių medus (manuka) MGO 400+, sluotinių sklėklių aliejus (manuka).

NUO RĒMENS

2<sup>99</sup> €



**PANZILAN® 20 mg, 14 skrandyje neišsijusių tablečių**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Pantoprazolas. Vienoje tabletyje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidrato pavidalu). **Indikacijos.** „Panzilan“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos pantoprazolo, kuri blokuoja skrandžio rūgštį gaminant „sūrbią“, todėl skrandyje sumažėja rūgšties kiekis. „Panzilan“ vartojamas trumpalaikiam gastroezofaginio refliksio simptomų (pvz., rėmens, rūgščių atpylimo) suaugusiems pacientams gydymui. Refliuksas yra rūgščių iš skrandžio atgalinis patekimas į stemplę, kurioje gali prasidėti uždegimas ir sukelti skausmą. Dėl to gali atsirasti tokių simptomų, kaip skausmingas deginimo pojūtis krūtineje kylantis iki ryklės (rėmuo) ir rūgštus skonis burnoje (rūgšties atpylimas). **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Gerti po 1 tablete per parą prieš valgį tuo pačiu paros laiku 2-3 dienas iš eilės, užsigeriant vandeniu. Tabletes reikia nuryti, negalima kramtyti ar laužyti. Neviršykite rekomenduojamos 20 mg pantoprazolo dozės per parą. Nutraukite „Panzilan“ vartojimą, kai visai pranyks ligos simptomai. Nepasitarus su gydytoju vartoti „Panzilan“ ilgiau kaip 4 savaites negalima. **Kontraindikacijos.** Jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) pantoprazoliui, sojų lecitinui arba bet kuriai pagalbinei „Panzilan“ medžiagai; kartu vartojami vaistai, kurių sudėtyje yra atazanavirio; amžius iki 18 metų; nėštumas arba kūdikio žindymas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu dėl rėmens arba virškinimo sutrikimo gydotes ilgiau kaip 4 savaites; esate vyresnis kaip 55 metai ir kasdien vartojate nereceptinius vaistus dėl sutrikusio virškinimo; atsirado naujų simptomų arba simptomai neseniai pasikartė; anksčiau sirgote skrandžio opalige arba buvo atlikta skrandžio operacija; sutrikusi kepenų veikla arba atsirado gelta; numatoma atlikti endoskopiją arba C-šlapalo mėginį. Jeigu numatyta atlikti kraujo mėginį, pasakykite gydytojui, kad vartojate šį vaistą. Atsirgimo ir rėmens simptomai gali palengvėti pavartojus „Panzilan“ vos vieną dieną, tačiau šis vaistas neturi sukelti pagerėjimo nedelsiant. Jo negalima vartoti profilaktikai. Jei Jums gydytojas sakė, kad netoleruojate kai kurių angliavandenių, prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su gydytoju. „Panzilan“ sudėtyje yra sojų lecitino. Jei esate alergiškas žemės riešutams ar sojai, vaisto vartoti negalima. **Teksto peržiūros data.** 2025 09 25. **Reklamos parengimo data.** 2026 01 17.

**UŽGESINK GAISRĄ SKRANDYJE!**

VYRŲ IR MOTERŲ PLAUKŲ SLINKIMO GYDYMUI

NUO 19<sup>99</sup> €



**MINOXIDIL INTELI**

2% odos tirpalas, 60 ml 19<sup>99</sup> €  
5% odos tirpalas, 60 ml 24<sup>99</sup> €

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

MINOXIDIL INTELI veiklioji medžiaga minoksidilis. MINOXIDIL INTELI 5% odos tirpalas vartojamas gydyti vidutinio stiprumo vyrų nuplikimą, susijusį su hormonais. Gydymas šiuo tirpalu rekomenduojamas pacientams po nesėkmingo 4 mėnesių gydymo MINOXIDIL INTELI 2% odos tirpalu. **Kaip vartoti MINOXIDIL INTELI:** MINOXIDIL INTELI 2% ar MINOXIDIL INTELI 5% odos tirpalą visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. **Dozavimas:** MINOXIDIL INTELI 2% odos tirpalo ar MINOXIDIL INTELI 5% odos tirpalo reikia tepti ant pažeistos galvos odos po 1 ml (10 pusrūškiliu paspaudimu) kas 12 valandų. Nesvarbu, koks alopecijos plotas, rekomenduojama dienos dozė visada tokia pati. Maksimali dienos dozė yra 2 ml (20 paspaudimų). **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas minoksidiliui arba bet kuriai pagalbinei MINOXIDIL INTELI medžiagai. Dėl galimo kitų kūno vietų plaukuotumo padidėjimo, MINOXIDIL INTELI 5% moterims vartoti nepalima. MINOXIDIL INTELI 5% odos tirpalą draudžiama vartoti jaunesniems kaip 18 ir vyresniems kaip 65 metų asmenims. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Pacientams su galvos odos dermatote preparatas gali rezorbuotis po oda. Prieš pradėdami vartoti MINOXIDIL INTELI 5% reikėtų pasitikrinti sveikatą. Dėl preparato esančio propilenglikolio poveikio gali atsirasti sudirginimas ir kontaktinis dermatitas. Pacientams, kurie sirgo širdies ir kraujagyslių ligomis, MINOXIDIL INTELI reikia vartoti ypač atsargiai dėl galimo sisteminio preparato poveikio. Vartojant MINOXIDIL INTELI reikia saugotis, kad preparato nepatektų į akis. Jei preparato atsitiktinai patekna ant jautrių vietų, reikia kruopščiai nuplauti dideliu vandens kiekiu. **Teksto peržiūros data:** 2024-09-05.

**„MINOXIDIL INTELI“ ... IR PLAUKAI SUGRĄŽIA...**

5<sup>99</sup> €



**GARDYXON®**

1 mg/g, gels, dimetindeno maleatas, 30 g

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Terapinės indikacijos.** Kūdikių, vaikų, paauglių ir suaugusiųjų dermatozės, dilgėlinės, vazodilijų įkandimo, nudegimo saulėje arba paviršutinio odos nudegimo sukkelto niežėjimo gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Kūdikiams, vaikams, paaugliams, suaugusiems ir senovo amžiaus žmonėms „Gardyxon“ 1 mg/g gelio reikia tepti pažeistą odos vietą 2-4 kartus per parą. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei „Gardyxon“ gydymas didelis odos plotas, reikia vengti ilgalaikio saulės poveikio. Kūdikiams ir mažiems vaikams (jaunesniems nei 2 m.) vengti gelių tepti ant didelio odos ploto, ypač pažeisto epitelio ar uždegimo apimtų vietų. Jaunesniems nei 2 m. vaikams vaistinį preparatą galima vartoti tik prižiūrint gydytojui. Kūdikiams, ypač nešnešiotiems kūdikiams, reikia vengti naudoti vaistinį preparatą ant didelių odos paviršių, ypač ant išbertų ir uždegimo apimtų vietų. Kiekviename šio vaistinio preparato gramme yra 150 mg propilenglikolio ir 0,05 mg benzalkonio chlorido, kurie gali sukelti odos sudirginimą. Nenaudokite šio vaistinio preparato žindymo metu kaip 4 savaitių kūdikiams, kuriems yra atvirų žaizdų ar didelių pažeistos ar pakenktos odos plotų, nepasitarę su gydytoju ar vaistininku. Jausdami laikotarpio šio vaistinio preparato negalima tepti ant krtū. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Reklamos teksto parengimo data** 2026-06.

**NURAMINA NIEŽULY VOS PO KELIŲ MINUČIŲ!**

EFEKTYVUS IR PATOGUS NAŲŲ GRYBELIO GYDYMAS

NUO 22<sup>99</sup> €



**POSAMYK**

78,22 mg/ml, vaistinis nagų lakas, 3,3 ml 22<sup>99</sup> €  
78,22 mg/ml, vaistinis nagų lakas, 6,6 ml 32<sup>99</sup> €

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 ml vaisto yra 78,22 mg terbinafino. **Terapinės indikacijos:** suaugusiųjų, sergančių lengva ar vidutiniu sunkumu nagų grybeline infekcija, gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** per pirmąsias 4 gydymo savaites „Posamyk“ ant pakenktų nagų reikia tepti 1 kartą per dieną, vėliau – 1 kartą per savaitę. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas terbinafinui arba pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** vartoti tik išorškai. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS260107978. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-07.

**INOVACIJA! EFEKTYVUS IR PATOGUS NAŲŲ GRYBELIO GYDYMAS**

-30% 11<sup>18€</sup> / 15%



**SMECTAGO®**

paruošta vartoti suspensija, 12 pakelių

**MEDICINOS PRIEMONĖ**

SmectaGo® paruošta vartojimui geriamoji dismektito suspensija pakelių pavidalu. Suaugusiųjų ir vyresnių kaip 8 metų vaikų ūminiam viduriavimui gydyti, ne ilgiau kaip 3 dienas. Jei viduriavimas tęsiasi ilgiau kaip 3 dienas, pasikonsultuokite su gydytoju. Suaugusiųjų lėtiniam viduriavimui arba pilvo skausmui gydyti, ne ilgiau kaip 2 savaites nesikreipiant medicininės pagalbos. **Praneškite apie šalutinį poveikį** gamintojo vietiniam atstovui „Mayoly Baltics“ UAB, el. paštu: vigilance.BAL@mayoly.com. **Teksto parengimo data** 2024-02-13. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026.01.02 SCGO-LF-2026-0021

NUO 10<sup>99</sup> €



**NIZORAL**

20 mg/g šampūnas, 60 ml 10<sup>99</sup> €  
20 mg/g šampūnas, 100 ml 15<sup>99</sup> €

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veiklioji medžiaga, stiprumas:** 1 g šampūno yra 20 mg ketokonazolo. **Terapinės indikacijos:** „Nizoral“ šampūnas yra vaistas, vartojamas infekcinėms odos ligoms, kurias sukelia grybeliai, gydyti: seborėjiniam galvos odos pleiskanėjimui (*Pityriasis capitis*); seborėjiniam dermatitui (rausvai rudos dėmės, padengtos geltonomis arba baltomis pleiskanomis); įvairiaspalvei dėderinei (*Pityriasis versicolor*) (ant liemens esančios mažos rudos ar baltos spalvos, nevlygiais kraštais dėmės). „Nizoral“ šampūnas tinka *Pityriasis capitis* ir seborėjinio dermatito profilaktikai. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Nizoral“ šampūnas skirtas vartoti paaugliams ir suaugusiems. Pažeistą odą reikia sudrėkinti „Nizoral“ šampūnu ir palaikyti 3-5 minutes, kad įsigerėtų (paprastai 1 kartui užtenka 1 saujos šampūno). Po to odą ir plaukus reikia gerai nuplauti vandeniu. Odos drėkinimo šampūnu dažnis priklauso nuo grybelių rūšies ir nuo to, ar vaistas vartojamas ligai gydyti, ar jos profilaktikai. Gydant galvos odos seborėjinį dermatitą ir pleiskaną, „Nizoral“ šampūnu reikia plauti 2 kartus per savaitę 2-4 savaites, profilaktiškai, – 1 kartą per savaitę arba kas 2 savaites. Gydant įvairiaspalvę dėderinę: odą „Nizoral“ šampūnu reikia plauti 1 kartą per dieną 1 dieną. **Kontraindikacijos:** „Nizoral“ šampūno vartoti negalima, jeigu yra alergija ketokonazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (suderinkite šampūno odą parausta, pradeda niežėti). **Specialūs įspėjimai:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Nizoral“. Reikia saugotis, kad „Nizoral“, kaip ir kitokio šampūno, nepatektų į akis. Jeigu taip atsitinka, jas reikia plauti vandeniu. **Reklamos teksto parengimo data** 2022-11. 2601\_SB\_Nizoral\_V01\_LT

**NUGALĖK PLEISKANAS SU „NIZORAL“!**

NUO RĖMENS IR PADIDĖJUSIO RŪGŠTINGUMO

3<sup>99</sup> €

## RENNIE

680 mg/80mg, 24 kramtomosios tabletės

ORANGE, 680 mg/80 mg, 24 kramtomosios tabletės

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 kramtomosios tabletėje yra 680 mg kalcio karbonato ir 80 mg sunkiojo magno subkarbonato. **Terapinės indikacijos:** „Rennie“ veikliosios medžiagos – kalcio karbonatas ir sunkusis magno subkarbonatas – neutralizuoja skrandžio rūgštį ir mažina rūgštines dispepsijos sukeltus negalavimus – rėmenį, skrandžio pilnumo arba sunkumo jausmą, virškinimo sutrikimą, rūgštaus skystičio atpylimą į burnos ertmę, pilvo pūtimą, skrandžio skausmą. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: sučiuoti arba sukramtyti 1–2 kramtomasias tabletes, praėjus 1 val. po kiekvieno valgio, prieš miegą ir kai pasireiškia rėmuo ar skausmas. Negalima vartoti daugiau kaip 11 kramtomųjų tablečių per 24 valandas. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 2 savaites. **Specialūs įspėjimai:** vaistinį preparatą reikia vengti vartoti ilgai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. „Rennie“ nėštumo ir žindymo laikotarpiu vartoti laikinai rekomenduojama, bet reikia vengti vartoti ilgą laiką. Vaistas neturi būti vartojamas su dideliu kiekiu pieno ar jo produktais. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jeigu yra sunkus inkstų nepakankamumas arba inkstų akmenligė; jeigu yra padidėjęs kalcio kiekis kraujyje arba sumažėjęs fosfatų kiekis kraujyje. Reklamos teksto parengimo data 2024-10 (CH-20241030-74).

8<sup>99</sup> €

## LAMISIL

10 mg/g, kremas, 15 g

DERMGEL, 10 mg/g, gelis, 15 g

## NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Indikacijos:** grybelių sukeltos ligos. „Lamisil DermGel“: Dermatomiketų pvz., trichofitonų (*Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton violaceum*), *Microsporum canis* ar *Epidemioypton floccosum* sukeltų dermatomikozių, pvz., pėdų, kirksnių, kūno (lygiosios odos) gydymas. Ivaiviaspalvės dedervinės (*Tinea versicolor*), sukeltos *Pityrosporum orbiculare* (dar vadinamą *Malassezia furfur*) grybelių, gydymas. „Lamisil“ kremas: Dermatofitų, pvz., trichofitonų (*Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton violaceum*), *Microsporum canis* ar *Epidemioypton floccosum* sukeltų dermatomikozių, pvz., pėdų, kirksnių, kūno (lygiosios odos) gydymas. Mieliaugrybių, t. y. baltšvagybių (*Candida*) genties grybelių, pvz., *Candida albicans*, sukeltos dermatomikozės gydymas. Ivaiviaspalvės dedervinės (*Tinea versicolor*), sukeltos *Pityrosporum orbiculare* (dar vadinamą *Malassezia furfur*) grybelių, gydymas. **Dozavimas:** „Lamisil“ kremas: Suaugusiesiems ir 12 metų bei vyresniems paaugliams „Lamisil“ gali būti vartojamas 1 ar 2 kartus per parą, priklausomai nuo indikacijos. „Lamisil DermGel“: Suaugusiesiems ir 12 metų bei vyresniems paaugliams Grybelių pažeista oda (abeju nurodytų indikacijų atveju) geliu reikia tepti 1 kartą per parą. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Lamisil“ kremą tepant ant veido reikia saugoti, kad nepatektų į akis. Patekęs į akis, jis gali dirginti. Jeigu vaistinio preparato atsitiktinai į akis patenka, jas reikia gerai nuplauti tekančiu vandeniu. Negalima vartoti ant burnos gleivinės. Jeigu yra odos pažeidimas, kurį alkoholis gali dirginti (pavyzdžiui, po nudegimo saulėje ar esant stipriam odos lupimuisi), „Lamisil DermGel“ geliu reikia gydyti atsargiai. Negalima vartoti ant veido odos ir ant burnos gleivinės. Patekęs į akis, jis gali dirginti. Jeigu gelio į akis patenka, reikia jas praplauti tekančiu vandeniu. Daugiau informacijos pateikta pakuočių lapelyje.



# RŪPESTINGAI. KIEKVIENAME GYVENIMO ETAPE.



## PAGRĮSTA MOKSLU. PATVIRTINTA MOTERŲ.

Canephron® intens, 30 dengty tablečių. Klimadynon® 2,8 mg, 90 plėvele dengty tablečių. Agnucaston® 4 mg, 30 plėvele dengty tablečių. Nereceptiniai augaliniai vaistiniai preparatai. **Terapinės indikacijos:** „Canephron® intens“ yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, skirtas palaikomajam ir specifiniam gydymui priemonės papildančiam apatinių šlapimo takų uždegimo sukeltų lengvų negalavimų (tokių kaip dažnas šlapinimasis, deginantis skausmas šlapinantis ir impulsinis noras šlapintis) gydymui; kad prasplautų šlapimo takai ir juose sumažėtų konkrečių nuosėdų. Tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. „Klimadynon®“ yra augalinis vaistas, vartojamas menopauzės simptomų, tokių kaip karščio pylimas ir gausus prakaitavimas, lyginimui. „Agnucaston®“ yra augalinis vaistas vartojamas menstruacinio ciklo sutrikimams, premenstruaciniam sindromui bei jo metu pasireiškiančiam krūtų skausmui ar tempimui (mastodinijai) gydymui. **Veikliosios medžiagos ir stiprumas:** dengtoje „Canephron® intens“ tablete yra 36 mg širdazolio žolės, 36 mg gelsvių šaknų, 36 mg rozmarinų lapų, 1 plėvele dengtoje „Klimadynon®“ tablete yra 2,8 mg kekiųjų blakėžučių šakniastiebių sausosio ekstrakto (5:10), 1 plėvele dengtoje „Agnucaston®“ tablete yra 4 mg tikrųjų skaisminių vaisių sausosio ekstrakto (7:11). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Canephron® intens“ suaugusiesiems ir paaugliams nuo 12 metų amžiaus vartoti po 1 dengtą tabletę 3 kartus per parą (rytį, per pietus, vakare). Įprastinė „Klimadynon®“ dozė suaugusioms moterims, kurioms pasireiškia menopauzė, yra: 1 tablete 2 kartus per parą (rytį ir vakare), daugiausia 2 tabletes per parą. Suaugusioms moterims ir 12 metų bei vyresniems merginoms turi vartoti po 1 dengtą „Agnucaston®“ tabletę 1 kartą per parą. Visas tabletes vartoti per burną, nuryti nekramtant ir užgerti pakankamu kiekiu skysčio (pvz., vandens). **Kontraindikacijos:** „Canephron® intens“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija ar padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos, kitoms skėtinėms šeimoms augalams (pvz., anyžiu, pankoliui, krabui), anetoliui (eterinių aliejų sudedamajai daliai) ar bet kuriai pagalbinei šių vaistų medžiagai; jei sergama skrandžio (pepsine) opa; esant edemai dėl širdies funkcijos sutrikimo, dėl inkstų funkcijos sutrikimo ir (ar) gydytoju rekomendavus mažinti skysčių vartojimą. „Klimadynon®“, „Agnucaston®“ vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** testantys sutrikimui, pasireiškiant apatinės pilvo dalies skausmui, spazmams, pastebėjus šlapime kraują, atsiradus šlapinimosi sutrikimams ar ūmiam šlapimo susilaikymui, reikia nedelsiant pasitarti su gydytoju. „Canephron® intens“ negalima vartoti jaunesniems nei 12 metų vaikams, nes nepakanka duomenų. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Canephron®“. Prieš pradėdami vartoti „Klimadynon®“ pasitarkite su gydytoju jeigu: jums yra buvę kepenų sutrikimų, turi būti atlikti kepenų veiklos tyrimai; atsiranda galimų kepenų pažeidimo požymių ar simptomų (nuovargis, apetito stoka, odos ir akių pageltimas, stiprus skausmas viršutinėje pilvo dalyje su pykinimu ir vemimu arba patamsėjęs šlapimas); gydytojas jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių. Nedelsiant nustokite vartoti „Klimadynon®“ ir pasitarkite su gydytoju, jeigu: atsiranda kraujavimas iš makšties arba atsiranda kiti neaiškūs ar nauji simptomai; buvotė gydoma arba esate gydoma dėl krūties vėžio arba kiti nuo hormonų priklausomų navikinių susirgimų; vartojate estrogenus; šio vaisto vartojimo laikotarpiu simptomai pasunkėja. Jeigu kurie nors iš aukščiau išvardintų punktų gali būti pritaikyti jums, „Klimadynon®“ bei gydytojo leidimo vartoti negalima. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti „Agnucaston®“ jeigu sergate ar sirgote vėžiu; jautri estrogenams; vartojate vaistų, kurie skatina dopamino poveikį (dopamino agonistų), siolina dopamino poveikį (dopamino antagonistų); vartojate estrogenus ir antiestrogenus; „Agnucaston®“ vartojimo metu simptomai pasunkėja; jums yra pasireiškę hipofizės sutrikimų; gydytojas jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių. Reguluojant mėnesinį ciklą, gali padidėti tikimybė pastoti. Teksto parengimo data 2026-06-04.

-50%



**BIOCELL**

**MAISTO PAPILDAI**

**BIOCELL** puoselėja gamtos sukurtą grožį ir sąmoningą gyvenimo būdą, vertina natūralumo estetiką ir skatina moterį pamilti save tokią, kokia ji yra – tobulą. Geriamieji **BIOCELL** grožio eliksyras „shots“ su kolagenu ar keratinu, grožio kapsulės, hidrolizuotas kolagenas miltelių forma ir skaidulų puoselėjas odai, plaukų bei nagų grožį iš vidaus.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtais prekėmis

NUO 3<sup>99</sup> €



**OTRIVIN**

1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 5<sup>99</sup> €  
 MENTHOL, 1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 6<sup>99</sup> €  
 1 mg/ml nosies lašai (tirpalas), 10 ml 3<sup>99</sup> €  
 0,5 mg/ml nosies lašai (tirpalas), 10 ml 3<sup>99</sup> €

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Ksilometazolino hidrochloridas. **Terapinės indikacijos.** Nosies gleivinės paburkimo mažinimas peršalus, sergant sinusitu, Senilė ar kitokia alerginė sloga. Nosiaršklės gleivinės paburkimo mažinimas, gydant vidurinės ausies uždegimą. Nosies ertmės apžiūros atlikimo lengvinimas. **Vartojimas.** *Otrivin 0,5 mg/ml nosies lašai.* 2–5 m. vaikai: po 1–2 lašus į kiekvieną nosies landą 1–2 kartus per parą (kas 8–10 val.). 6–11 m. vaikai ir paaugliai: po 2–3 lašus į kiekvieną nosies landą 2–3 kartus per parą, kai reikia. *Otrivin 1 mg/ml nosies lašai.* Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: po 2–3 lašus į kiekvieną nosies landą, kai reikia. *Otrivin Menthol 1 mg/ml nosies purškalas ir Otrivin 1 mg/ml nosies purškalas.* Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: po 1 įpurškimą į kiekvieną nosies landą, kai reikia. Negalima lašinti / purkšti daugiau kaip 3 dozių per parą į kiekvieną nosies landą. **Kontraindikacijos.** Alergija ksilometazolino arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; pacientams, kuriems neseniai buvo atlikta operacija per nosį; sergantiesiems uždarą kampo glaukoma (padidėjęs akispūdis), lėtiniu nosies uždegimu (sausu nosiu arba atrofiniu rinitu). **Specialūs įspėjimai.** Negalima vartoti ilgiau kaip 7 d. iš eilės. Negalima virsti rekomenduojamos dozės, ypač vaikams ir pagyvenusiems žmonėms. Atsargiai vartoti, jeigu yra padidėjęs kraujospūdis, širdies liga (pvz., paigėjusio QT intervalo sindromas), cukrinis diabetas, padidėjęs skydliaukės aktyvumas, padidėjusi prostata, yra gerybinis antinksčių auglys, jei vartojate trichiklį ir tetra ciklį antidepressantų, jeigu vartojate arba per pastarąsias 2 sav. vartojote vaistų nuo depresijos ar Parkinsono ligos, vadinamųjų MAOI. Labai jautriems pacientams gali sukelti miego sutrikimą, galvos svaigimą, tremorą. Sudėtyje yra benzalkonio chlorido. Reklamos teksto parengimo data 2025-02. Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi jų licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas.

6<sup>99</sup> €



**TOT'HEMA** geriamasis tirpalas ampulėmis, 20 x 10 ml

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veikliosios medžiagos: 50 mg geležies, 133 mg manganu, 0,7 mg vario. Terapinės indikacijos: geležies trūkumo šalinimas ir profilaktika, ypač nėštumo metu. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugę žmonės, įskaitant senyvus: gerti 2–3 ampules per parą (kaip vienkartinę ar kelias dozes). Vyresni kaip 1 mėn. kūdikiai ir vaikai: sugirdyti doze, atitinkančia 3 mg/kg kūno svorio geležies per parą, neviršijant 60 mg. Profilaktika: pacientams, kuriems yra geležies stokos rizika, ir moterims nuo ketvirtuo mėnesio gerti 1 ampulę per parą. Prieš vartojimą ampulę pakratyti. Skiesti vandenu ar kitu nealkoholiniu gerimu. Geriausia gerti prieš valgį. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; geležies perteklius organizme; ne geležies stokos anemija; Vilsono liga. **Specialūs įspėjimai:** neskirti jaunesniems nei 1 mėn. kūdikiams. Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Kai kurių vaistų kartu su „tot'hema“ vartoti negalima, kai kurių vartojimą reikia koreguoti. Pavartojus „tot'hema“ prieš valgant ir geriant reikia daryti pertrauką. Sudėtyje yra gliukozės, sacharozės, etanolio, natrio ir natrio benzoato. Netinkamai vartojant, geriamasis tirpalas gali patekti į kvėpavimo takus ir sukelti sunkių pažeidimų (nekrozė, bronchų uždegimą, susiaurėjimą). Simptomai gali pasireikšti net po kelių dienų ar mėnesių: nuolatinės kosulys, kraujo atkosėjimas, dusulys. Įkvėpimo atveju nedelsdami kreipkitės į gydytoją ar greitąją pagalbą. „Tot'hema“ draudžiama leisti į vėną. Reklamos teksto parengimo data 2025-08.

NUO 2<sup>99</sup> €



**MEZYM**

10000V, 10 skrandyje neirių tablečių 2<sup>99</sup> €  
 20000V, 20 skrandyje neirių tablečių 6<sup>99</sup> €

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

1 skrandyje neirioje „Mezym 10000V“ tablečių yra 80–111,11 mg kauliųjų kasos miltelių, kurių aktyvumas atitinka ne mažiau kaip 10000 lipazės vienetų, 7500 amilazės vienetų, 375 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. 1 skrandyje neirioje „Mezym 20000V“ tablečių yra 160–222,22 mg kasos miltelių (iš kauliųjų kasos pagaminto pankreatino), kuriu minimalus aktyvumas atitinka 20000 lipazės vienetų, 12000amilazės vienetų, 900 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. „Mezym“ vartojamas tuomet, kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentų ir tai sukelia virškinimo sutrikimų. „Mezym“ vartoti negalima: jeigu yra alergija kasos milteliams, kauliųjų baltymams arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; šio vaisto negalima vartoti, jeigu jūs sergate ūminiu kasos uždegimu (pankreatitu) arba jums paūmėjo lėtinis kasos uždegimas, kai ligos požymiai yra stipriai išreikšti. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju ir vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Mezym“. Čistinė fitrozė kartais gali komplikuoti žarnyno nepažeidimą. Esant simptomams, panašiai į žarnyno nepažeidimą požymius, reikia apsaugyti žarnyno susiaurėjimo galimybe. Jeigu pajutote neįprastą diskomfortą skrandyje ar žarnyne, pasiklitę nusiskundimų pobūdį, būtinai kreipkitės į gydytoją, kuris jus apžiūrės, kad atmetų žarnų pažeidimo galimybę. „Mezym“ vartoti negalima: jeigu yra alergija žarnyne, pasiklitę nusiskundimų pobūdį, būtinai kreipkitės į gydytoją, kuris jus apžiūrės, kad atmetų žarnų pažeidimo galimybę. „Mezym“ reikia vartoti nuryti nekrakmuo. „Mezym 10000V“ sudėtyje esantis daiktinis azorubinas (E122) gali sukelti alerginių reakcijų. Dozavimas: „Mezym“ visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. „Mezym“ dozės priklauso nuo virškinimo sutrikimų laipsnio, optimali dozė nustatoma individualiai. Jeigu nenurodyta kitaip, valgant išgeriamas 2–4 plevėle dengtos „Mezym 10000V“ tabletes arba 1–2 plevėle dengtos „Mezym 20000V“ tabletes. Dienos dozė 15000–20000 lipazės vienetų kilogramo kūno svorio neturėtų būti viršijama. Dozės vaikams turi paskirti gydytojas. Atsivėlgiant į maistą ar virškinimo sutrikimo sunkumą, rekomenduojama dozė gali būti padidinta. Plevėle dengtos tabletes nuryjamas nekrakmuo ir užsigeriant dideliu kiekiu skysčio. Gydant ilgą laiką, vartojimo trukmė nustato gydytojas. Vartojimo trukmė vaikams taip pat nustato gydytojas. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 1947, LT@berlin-chemie.com. LT-MEZ-3-2025\_MFLOW\_2025/12

„MEZYM“ PADEDA PAGERINTI SUTRIKUSĮ VIRŠKINIMĄ!

**PAGALBA NUO RĖMENS**

4<sup>99</sup> €



**NEXMEZOL**

20 mg, 14 skrandyje neirių tablečių

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** vienoje tabletyje yra 20 mg ezomeprazolo. **Terapinės indikacijos:** vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refluksinio simptomo gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti po 1 tablete per parą bet kurio paros laiku, valgio metu arba nevalgius. Tablečių nekrakmuo ir netraškinti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ezomeprazolui (taip pat pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, omeprazolui) ar pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** sudėtyje yra sacharozės. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Ūpės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2636057. El.paštas: info.lithuania@sandoz.com. BS260107920. Reklamos teksto parengimo data: 2026 01 07.

IKI -50%



**DAILEE**

**HIGIENOS PRIEMONĖS**

„DAILEE“ – PATIKIMAS PASIRINKIMAS ARTIMOJU SLAUGAI

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtais prekėmis

1+1

Dvi tokios pačios  
pakuotės už  
VIENOS KAINĄ!

**AMBIO**  
ŠIRDŽIAI, 30 tablečių **11<sup>98</sup> €**  
REGĖJIMUI, 30 kapsulių **12<sup>98</sup> €**  
MAISTO PAPILDAI

-25%

5<sup>24€</sup>  
5<sup>30€</sup>

**AMBIO**  
VALERIJONAS PLUS, 50 tablečių  
MAISTO PAPILDAI

## RAIŠČIAMS, SAUSGYSLĖMS, FASCIJOMS

-40%



**CIGNON**  
30 minkštų kapsulių **19<sup>99</sup> 11<sup>75</sup> €**  
SHOTS, 20 geriamųjų dozių po 10 ml **35<sup>29</sup> 21<sup>47</sup> €**  
MAISTO PAPILDAI

Raiščiai, sausgyslės, fascijos yra judėjimui būtini jungiamojo audinio dariniai: sausgyslėmis raumenys jungiasi prie kaulų. Joms susitraukiant pritraukiami kaulai ir taip įvyksta judesys. Raiščiai lyg virvės suriša sąnariusose esančius kaulų galus ir garantuoja judesio tikslumą. Fascijos lyg tinklas apsupa ir sujungia kaulus, raumenis, sąnarius, raiščius, sausgysles ir visuma, padeda raumenims sąveikauti tarpusavyje atliekant judesius. Nuolat pasikartojantis arba netikėti, staigūs judesiai, didesnės, intensyvesnės raumenų apkrovos, pertempiami gali pakenkti raiščiams, sausgysliams, fascijoms sveikatai. Rūpinantis jų sveikata svarbu sureguliuoti darbo, poilsio režimą, taikyti optimalius fizinius krūvius ir apriškinti raiščius, sausgysles, fascijas reikiamomis maisto medžiagomis: mukopolisacharidais, hidrolizuotu kolagenu, variu, padedančiu palaikyti jungiamojo audinio būklę, energijos apykaitą, cinku, padedančiu palaikyti baltymų sintezę, rūgštinę ir bazinę bei angliavandenių, maistinių makromedžiagų apykaitas, kurkuminiu, apsaugančiu ląsteles nuo oksidacines pažeidimų.

„Cignon“ – vienintelis maisto papildas Lietuvoje, specialiai sukurtas raiščiams, sausgyslėms, fascijoms.

„Cignon Shots“ – geriamos dienos dozės papildas mityba raiščiams, sausgyslėms, fascijoms reikiamomis medžiagomis, siekiant užtikrinti harmoningą judėjimą, puikiai raiščiams, sausgysliams, fascijoms sveikata bei sklandių jų darbą.

**NELĖTINK TEMPO SU „CIGNON“!**

## NERVINĖS ĮTAMPOS MAŽINIMAS IR UŽMIGIMO LENGVINIMAS

4<sup>99</sup> €

**PERSEN**  
40 dengtųjų tablečių  
FORTE, 20 kietųjų kapsulių

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas.** PERSEN tablečių yra 35 mg valerijonų šaknų sausosjo alkoholinio ekstrakto, 175 mg melisu lapų sausosjo ekstrakto, 175 mg pipirmėčių lapų sausosjo ekstrakto. PERSEN FORTE kapsulėje yra 875 mg valerijonų šaknų sausosjo alkoholinio ekstrakto, 175 mg melisu lapų sausosjo ekstrakto, 175 mg pipirmėčių lapų sausosjo ekstrakto. **Indikacijos.** Vartoti laikinoms nedidelės nervinės įtampos mažinimui, pasunkėjusio užmigimo lengvinimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** PERSEN: Nervinės įtampos atvejui reikia gerti po 3-4 PERSEN tab. 3 kartus per parą. Pasunkėjusio užmigimo atvejui reikia gerti 3-4 PERSEN tab. 1 kartą per parą 1 val. prieš miegą. Tabletes reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai nuo valgyimo laiko. PERSEN FORTE: Nervinės įtampos mažinimui reikia gerti po 2 PERSEN FORTE kaps. 2 kartus per parą. Pasunkėjusio užmigimo atvejui reikia gerti 2 PERSEN FORTE kaps. 1 kartą per parą 1 val. prieš miegą. Kapsules reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai nuo valgyimo laiko. PERSEN ir PERSEN FORTE pradeda veikti palaipsniui, kad gydymo veiksmingumas būtų optimalus, vaisto rekomenduojama gerti mažiausiai 14 dienų. Gydymo trukmė neribojama. PERSEN ir PERSEN FORTE nėra skirtas jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** PERSEN tablečių sudėtyje yra laktozės ir sacharozės. PERSEN FORTE kapsulių sudėtyje yra laktozės. Reklamos teksto parengimo data: 2025 m. gegužės mėn. ID:000746625

„PERSEN“ – NURAMINK SAVO RŪPESIUŠ!

## PIC MATUOKLIAI / INHALIATORIAI / TERMOMETRAI

IKI -45%



## PIC SOLUTION

## MEDICINOS PRIETAISAI

„PIC Solution“ jau daugiau nei 50 metų yra vienas žinomiausių Italijos medicinos priemonių prekių ženklų. Kiekvienas PIC sprendimas yra daugiau nei kraujospūdžio matuoklis, inhaliatorius ar termometras. Tai paprastas būdas parodyti rūpestį ir paklausti „Kaip jautiesi?“. Savo laboratorijose kuriame pažangius prietaisus, skirtus inhaliacijai, širdies darbai ar temperatūrai stebėti. Visi prietaisai turi 5 metų garantiją\* ir jų tikslumas patvirtintas klinikiniais tyrimais\*\*.

\* Išskyrus termometrus, matuoklij „LiteRapid“, inhaliatorių „AirCube“.

\*\* Taikoma kraujospūdžio matuokliams

**KIEKVIENA ŠIRDIS TURI SAVO RITMĄ!**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

3<sup>49</sup> €

## NEOCITRAMONAS


240 mg / 200 mg / 30 mg, 20 tablečių

## NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** vienoje tablečių yra 240 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg paracetamolio ir 30 mg kofeino. **Terapinės indikacijos:** vaistas vartojamas trumpalaikiam lengvo ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių ir menstruacijų skausmui malšinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tabletes reikia vartoti nekrantant, užgeriant ne mažesniu kaip 250 ml kiekiu vandens. Atsivėginti į ligos sunkumą, vartoti po 1 tablete 1-4 kartus per dieną. Didžiausia paros dozė – 4 tabletes. Negalima vaisto vartoti dažniau kaip kas 6 valandas ir ilgiau kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** alergija veikliąjam arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, esanti ar buvusi virškinimo trakto opa ir (arba) kraujavimas iš virškinimo trakto, buvusi bronchų astma, kurią sukėlė salicilatai ar kitokie nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, pacientas jaunas negu 12 metų, 3 paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas, ligos, kurių metu yra padidėjęs kraujavimo pavojus, kraujo krešėjimo sutrikimas, vartojama 15 mg ar didesnė metotretsato savaitės dozė, sunkus širdies, kepenų, inkstų nepakankamumas, labai sunki aukšto kraujo spaudimo liga, kamuoja nemiga, padidėjęs nervingumas, dirglumas, nerimas, baimė, susijaudinimas ar panašūs simptomai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergama podagra, bronchų astma, kolagenozėmis ar kraujodaros sistemos ligomis, yra sustiprėjusi skydliaukės veikla ar sergama cukriniu diabetu, yra virškinimo trakto, inkstų, kepenų ar širdies funkcijos sutrikimų, yra buvusi alergija kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, planuojama chirurginė operacija, pacientas yra jaunesnis kaip 16 metų ir serga virusine ligomis, pacientas yra senyvo amžiaus, planuojama pastoti, pakinta slėpimo kiekis, pasireiškia pabrūkinimų ar skausmas juosmens srityje, pagelssta oda ar akys, patamsėja šlapimas, atsiranda bendras silpnumas, yra nerimo sutrikimas, panikos sutrikimas ar nemiga. Sudėtyje esantis kofeinas gali sukelti drebulį, dažną širdies plakimą, viduriavimą, susijaudinimą, stiprų širdies plakimą, nemigą, galvos skausmą, raumenų trūkčiojimą ir slėpimo išsiskyrimo padidėjimą. **Reklamos teksto parengimo data** 2026-03-25

# Epitome

GERAI JAUSTIS YRA KELIONĖ



Maisto papildai



# 2 UŽ 1 KAINĄ



## 1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

**AMBIO**  
GELEŽIS SU B12, 30 tablečių **15<sup>99</sup> €**  
MAISTO PAPILDAS



## 1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMAI!

### IMUNITAL

#### MAISTO PAPILDAS

Imuninė sistema – tai žmogaus organizmo atsakas neigiamiems aplinkos veiksniams. Tam tikru metu laiku ar pasikeitus įprastoms gyvenimo sąlygoms (pvz., esant persėjimo ligų sezonui) gali prireikti stipresnio palaikymo imuninei sistemai. „Imunital“ – skirtingų vartojimo formų ir sudėčių produktai, skirti imuninei sistemai.

„Imunital SHOTS“ – itin stipri programa imunitetui su bičių pieneliu, priešpienio koncentratu, *reishi* (tikriniai blizgučiai) ir *shiitake* (valgomieji danteniai) grybų ekstraktais bei vitaminu B6. Tinka vaikams nuo 3 metų.

„Imunital FORTE+“ – ypač didelės vitaminų D, C ir cinko dozės 1 kapsulėje su vertingais beta gliukanais ir augaliniais ekstraktais. Komponentai veiksdami kartu padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą, apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo bei mažinti nuovargį.

#### MAGIŠKAI TVIRTAS IMUNITETAS!

\*Kliją taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms



## 1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

**ZIEDĖ**  
drėkinamasis lūpų balzamas su alavijų sultimis, 4,5 g **5<sup>99</sup> €**  
damaskinių rožių hidrolatas, 100 ml **10<sup>99</sup> €**  
lavandų hidrolatas, 100 ml **10<sup>99</sup> €**  
veido serumas brandžiai odai su šlamiučių aliejumi, 30 ml **20<sup>99</sup> €**  
KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Energijai, imuninei sistemai, atsigavimui po vakarėlio



## 1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMAI!

### GREENIFY

#### MAISTO PAPILDAS

„GREENIFY“ – tai, ko reikia grožiui ir gerai savijautai: išgryninta sudėtis, efektyvus įsisavinimas ir patikima kokybė. Be pridėtinio cukraus ir kitų nereikalingų priedų. Sveiklaus poveikio virškinimo sistemai.

- Odos sveikėjimas ir grožis – rinkitės „Collagen Beauty Shots“
- Greitas užmigimas ir kokybiškas miegas – išbandykite „Deep Sleep Shots“
- Sanariai ir lengvas judesys – „Collagen Joints Shots“
- Atmintis, gyvybingumas, nervų sistema – atraskite „Brain Booster Shots“


\*Kliją taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms



## 1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

**ODŪNTE**  
balinamoji dantų pasta jautriems dantims, 75 ml **7<sup>99</sup> €**  
balinamoji ir gaivi burnos kvapą suteikianti dantų pasta, 75 ml **7<sup>99</sup> €**  
dantų šepetėlis su auksu, minkštas, 1 vnt. **4<sup>99</sup> €**  
dantų šepetėlis su sidabru, minkštas, 1 vnt. **4<sup>99</sup> €**  
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS  
ODŪNTE – tai patikimumas ir dėmesys detalėms, užtikrinantis nepriekaištingą burnos priežiūrą kiekvieną dieną.



## 1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

### HYDROLESS

30 kapsulių **12<sup>99</sup> €**

#### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Padeda palaikyti normalią skysčių pasisalinimą per inkstus, normalią šlapimo takų funkciją.

Medžiagos, turinčios fiziologinį poveikį: džiovintų stambiauogių spanguolių milteliai, 80 mg; didžiųjų dilgėlių ekstraktas, 50 mg; obuolių acto milteliai, 50 mg; cinkas, 12 mg (120 %). Vartojimo būdas: po 1 kapsulę per dieną. Vartoti po valgio, užgerti stikline vandens.

### HYDROLESS SLIM

60 kapsulių **15<sup>99</sup> €**

#### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Padeda palaikyti normalią kūno svorį, normalių skysčių pasisalinimą per inkstus, normalią maistinių makromedžiagų apykaitą.

Juodieji pipirai padeda palaikyti normalią virškinamojo trakto bei kepenų funkciją. Juodieji pipirai ir karčiais citrusmedis padeda palaikyti normalią kūno svorį. Didžiųjų dilgėlių ekstraktas padeda palaikyti normalią skysčių pasisalinimą per inkstus, padeda palaikyti normalią šlapimo takų funkciją. Cinkas ir chromas padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų apykaitą. Cinkas padeda palaikyti normalią riebalių rūgščių apykaitą, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo ir padeda palaikyti normalią baltymų sintezę. Vartojimo būdas: 2 kapsules per dieną. Ryte ir vakare. Vartoti po valgio, užgerti stikline vandens.



## 1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMAI!

**JAMIESON**  
MULTI MAX STRENGTH, 90 tablečių **29<sup>99</sup> €**  
MULTI MEN, 90 tablečių **29<sup>99</sup> €**  
MULTI WOMEN, 90 tablečių **29<sup>99</sup> €**  
MULTI ADULTS, 90 tablečių **29<sup>99</sup> €**  
KIDS MULTI, 60 kramtomųjų tablečių **16<sup>99</sup> €**  
MAISTO PAPILDAS

NUO PILVO PŪTIMO

NUO 2<sup>99</sup> €



ESPUMISAN

40 mg, 25 minkštosios kapsulės 2<sup>99</sup> €  
40 mg, 50 minkštųjų kapsulių 4<sup>99</sup> €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: 1 minkštojoje kapsulėje yra 40 mg simetikono. „Espumisan“ vartojamas ligų, kurių metu virškinimo trakte kaupiasi dujos (meteorizmas), būna pilvo pūtimas, pilnumo pojūtis, simptomams gydyti; prieš pilvo ertmės organų tyrimus, pvz.: rentgenu, ultragarsu. „Espumisan“ skirtas vaikams nuo 6 m., paaugliams ir suaugusiems. „Espumisan“ vartoti draudžiama: jeigu yra alergija veikliajai medžiagai, dažikiui saulelydžio geltonajam FCF (E110), konservantui metilo parahidroksibenzoatui (E218) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pastartikite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Espumisan“. Jei šių virškinimo veiklos sutrikimų atsiranda ar jie trunka ilgai, reikia pasitarti su gydytoju. Jis nustatys, ar nėra kitų ligų, kurias reikia gydyti kitaip. Dozavimas: kai dėl susilaikiusių dujų sutrinka virškinimo trakto veikla: paaugliams, suaugusiems ir 6–14 m. amžiaus vaikams rekomenduojama skirti vartoti po dvi „Espumisan“ 40 mg minkštąsias kapsules 3–4 kartus per parą. „Espumisan“ 40 mg minkštąsias kapsules galima gerti valgant arba po valgio, prireikus – ir prieš miegą. Vartojimo trukmė priklauso nuo ligos eigos. Prireikus „Espumisan“ 40 mg minkštąsias kapsules galima vartoti ilgai. Rengiant pacientus tyrimams, rekomenduojama skirti po dvi „Espumisan“ 40 mg minkštąsias kapsules 3 kartus per parą vieną dieną prieš tyrimus ir dvi „Espumisan“ 40 mg minkštąsias kapsules tyrimo dienos rytė. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com. LT-ESP-8-2025\_MFLOW\_2025/12

JEI PILVE URAGANAS – JUNS PADĖS „ESPUMISANAS“!

NUO RĖMENS

6<sup>99</sup> €



MAALOX

400 mg/400 mg, be cukraus, 40 kramtomųjų tablečių  
40 mg/35 mg/ml, geriamoji suspensija, 250 ml

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kramtomąjioje tableteje yra 400 mg magnio hidroksido ir 400 mg aliuminio hidroksido; 1 ml geriamosios suspensijos yra 40 mg magnio hidroksido ir 35 mg aliuminio hidroksido. Terapinės indikacijos: rėmens ir skrandžio turinio kilimo į stemplę simptomams malšinti suaugusiems ir paaugliams nuo 15 metų. Vartojimo būdas ir dozavimas: suspensija reikiu gerti neskiesta. Buleluko suspensija gerinama po 1 valgomąjį šaukštą (15 ml) pasireiškus rėmeniui arba skrandžio turinio refliksui į stemplę; negalima gerti daugiau kaip 6 valgomųjų šaukštų (90 ml) per parą; šio vaisto negalima vartoti ilgaiu kaip 10 dienų; sušalpioti arba sukramtyti 1–2 tabletes, pajutęs rėmenį arba atsiradus refliksui; negalima vartoti daugiau kaip 6 kartus per parą ir daugiau kaip 8 tablečių per parą. Kontraindikacijos: alergija (padidėjęs jautrumas) magnio hidroksidui ar aliuminio hidroksidui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sunki inkstų liga; stiprus pilvo skausmas arba ūmus žarnų nepažeidimas. Specialūs įspėjimai: vaista galima vartoti tik pastatus su gydytoju, jeigu mažėja kėno svoris, kraujuoja arba anksčiau yra kraujuję iš virškinimo trakto, sutrūkęs rijimas arba nusilg jautumė nemalonu pojūtį pilve, virškinimo sutrikimų atsirado pirmą kartą arba jie neseniai pakito, sergate inkstų liga. Pacientams, kuriems nustatytas inkstų funkcijos sutrikimas, jaunesniems kaip 2 m. vaikams, senyviems pacientams bei kitiems pacientams, kuriems yra fosforo trūkumo pavojus, prieš pradėdami vartoti „Maalox“ reikia kreiptis į gydytoją. Norint išvengti perdozavimo, negalima kartu vartoti vaistinių preparatų, savo sudėtyje turinčių aliuminio hidroksido ir magnio hidroksido. Atsargumo dėlei tarp bet kokio per burną vartojamo vaisto ir antacidinio vaisto vartojimo turi būti bent 2 val. (vartojant fluorodionolonus – 4 val.) intervalas. Jeigu gydytojas jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „Maalox“ (be cukraus) tabletes tinka cukriniu diabetu sergantiems pacientams. Reklamų teksto parengimo data 2024-12-2603\_SB\_Maalox\_VOI\_LT.

GREITA PAGALBA NUO RĖMENS!

VIDURIAMS LAISVINTI

6<sup>75</sup> €



REGULAX PICOSULPHATE

7,23 mg/ml, geriamieji lašai, tirpalas, 20 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: natrio pikosulfatas. 1 ml (20 lašų) tirpalo yra 75 mg natrio pikosulfato monohidrato (atitinka 723 mg natrio pikosulfato). Terapinės indikacijos: veiklioji vaisto medžiaga natrio pikosulfatas yra lokaliai veikiantis vidurių laisvinamoji medžiaga. Storojoje žarnoje ji, veikiant bakterijoms, suskyla ir skatina storosios žarnos peristaltiką, stimuliuojama jos gleivine. Vartojimo būdas ir dozavimas: jei gydytojo neskirta kitaip, suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams rekomenduojama dozė yra 14–27 lašai (atitinka 5–10 mg natrio pikosulfato). 4–12 m. vaikams vaistą vartoti galima tik gydytojo paskyru! Vienkartinė dozė yra 7–14 lašų (atitinka 2,5–5 mg natrio pikosulfato). „Regulax Picosulphate“ patariama gerti vakare. Jo poveikis pasireiškia po 10–12 val. Kontraindikacijos: šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Trumpai vartojant „Regulax Picosulphate“, šalutinis poveikis yra retas ir dažniausiai pasireiškia vidurių pūtimu, silpnu skrandžio skausmu ar padidėjusiu tuštinimusi. Specialūs įspėjimai: „Regulax Picosulphate“ vidurių laisvinamoji poveikį gali silpninti arba naikinti kartu vartojami antibiotikai (bakterijas naikinantys preparatai). Nėštumo laikotarpiu „Regulax Picosulphate“ galima vartoti tik paskyru gydytoju, kadangi nėščių moterų gydymo šiuo vaistu patirtis yra nepakankama. Nors duomenų, rodančių, kad veiklioji „Regulax Picosulphate“ medžiaga patenka į motinos pieną, nėra, tačiau šio vaisto vartojantoms moterims kūdikiui kritimi maitinti nepatariama. PASTABA DIABETIKAMS. „Regulax Picosulphate“ lašuose yra cukraus pakaitalai; 1 ml lašų atitinka 0,03 duonos vieneto. Reklamų teksto parengimo data 2026-05-01.

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



AMBIO

LAKTO-BIFIDOBAKTERIJŲ KOMPLEKSAS, 20 kapsulių 11<sup>48</sup> €

LAXATIVE COMPLEX, 10 kapsulių 4<sup>18</sup> €

MAISTO PAPILDAI

IKI -50 %



SALUTIL®

MAISTO PAPILDAI

„Salutil Hydra“ – elektrolitų ir gliukozės mišinys, papildytas vitaminais, mineralinėmis medžiagomis ir cholinu. Tinka vartoti po įtemptos veiklos ar jaučiant nuovargį.

„Salutil Shots“ – gyvybingosios bakterijos, prebiotikai ir vitaminai miltelių pavidalu viename pakelyje. Vaikams nuo 3 metų.

„Salutil Forte“ – kiekvienoje kapsulėje yra 5 milijardai gyvybingųjų bakterijų.

„Salutil Premium 9“ – sudėtyje yra 9 mikroorganizmų padermių ir vitamino D.

2601\_SB\_Salutil\_VOI\_LT

„SALUTIL“ – PROBIOTIKAI IR ELEKTROLITAI JŪSŲ ŠEIMAI!

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

ŽARNYNO MIKROFLORAI

-25 %



BIFOVAL®

FORTE, 15 kietųjų kapsulių 10<sup>23</sup> 8<sup>09</sup> €

BABE, 25 kramtomosios tabletės 10<sup>43</sup> 7<sup>87</sup> €


MAISTO PAPILDAI

Specialiai parinktos sudėties maisto papildai kiekvieno ryto ritualui 15-30 min prieš kiekvienus pusryčius.

„Bifoval Forte“ – 5 milijardai lacto- ir bifidobakterijų. Sudėtyje 3 bakterijų padermės. Visai šeimai (vaikams nuo 5 metų).

„Bifoval Babe“ – braškių skonio kramtomos tabletės, kurių sudėtyje yra 4 rūšių Lacto ir Bifido bakterijų kompleksas (3,15 mlrd. 1 tableteje). Vaikams nuo 3 metų.

Vartojant antibiotikus gerti 1 val. prieš arba po antibiotikų vartojimo.



SKENUOKITE QR KODĄ IR  
NORFOS VAISTINĖS  
LEIDINIUS VARTYKITE  
TELEFONE.



IKI -40%

**FJORD STRONG OMEGA-3**

IMMUNITY, 60 kapsulių ~~31<sup>99</sup>~~ 19<sup>19</sup> € -40 %  
 CARDIO, 60 kapsulių ~~27<sup>99</sup>~~ 19<sup>59</sup> € -30 %  
 ŽUVY TAUKAI, 100 ml ~~22<sup>52</sup>~~ 18<sup>07</sup> € -20 %

**MAISTO PAPILDAI**

Išbandykite NAUJIENA:

„FJORD STRONG OMEGA-3 IMMUNITY“ – tai stiprios koncentracijos omega-3 (EPR ir DHR), vitamino D ir ypač gryno alyvuogių aliejaus derinys (dar geresniam įsisavinimui) – jūsų stipriam imunitetui.  
 Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

„FJORD STRONG OMEGA-3“ GALI DAUGIAU, NEI TIKIESI.

-60% 5<sup>60€</sup> 13<sup>99</sup>**AMBIO**

KALIS IR MAGNIS, miltelių geriamajam tirpalui, 30 paketėlių  
**MAISTO PAPILDAS**


**NUO SUMUŠIMŲ**10<sup>99</sup> €**DOLOBENE™** gels, 50 g**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

1 g gelio yra 500 TV heparino natrio druskos, 150 mg dimetilsulfoksido, 25 mg dekspantenolio. **Terapinės indikacijos:** patinimo, hematomos ir uždegimo po bukus raumenų, sausgyslių, sausgyslių mąkščių, raiščių, sąnarių traumos gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tepti geliu pažeistą vietą 1–2 kartus per parą. Nereikia įtrinti, tik švelniai užtepti ir paskleisti. Nenaudoti po oro nepralaidžiančiais tvarščiais. „Dolobene“ negalima tepėti ant atviros žaizdos, pažeistos odos ir gleivinės. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sergantiesiems raudonąja vilkige; astma; jaunesniems kaip 5 m. vaikams; esant sunkių inkstų ir (arba) kepenų pažeidimų, kraujotakos sutrikimų; negalima vartoti kartu su sulindaku. **Specialūs įspėjimai:** nepatariama tepėti ant pažeistos odos ir gleivinės. Sudėtyje esantis makrogolglicerolio hidroksistearatas gali sukelti odos reakciją. DLBN-LT-00002. Teksto peržiūradata 2024-02-01. Reklamos teksto parengimo data 2024-03.

-25%

**„OMRON“ KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIAI****MEDICINOS PRIETAISAI**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-30% 8<sup>11€</sup> 11<sup>59</sup>**NATASPIN® GLUCOSE**

30 kapsulių

**MAISTO PAPILDAS**

Rinkitės inovatyvią, daugiafunkcę formulę gliukozės kontrolei – „NatAspin® GLUCOSE“. Sudėtyje yra biologiškai aktyvių standartizuotų ekstraktų (cinamono, ožragių, vynuogių sėklių), chromo, vitamino K2 ir natokinazės derinys.

- Gliukozės kontrolei ir angliavandenių apykaitai.
- Kraujotakai, kraujagyslės, lipidų lygiai.
- Laistyti apsaugai nuo oksidacinės pažeidos.
- Apetitui, kūno svoriui, virškinimo sistemai, maistingai makromedžiagų apykaitai.

„NATASPIN® GLUCOSE“ – TAVO GLIUKOZĖS REVOLUCIJAI.

-20% 3<sup>03€</sup> 3<sup>79</sup>**LAŠAI ŠIRDŽIAI SU MAGNIU** geriamieji lašai, 50ml**MAISTO PAPILDAS**

Lašai širdžiai su magniu – skystasis maisto papildas su magniu, gudobelių, valerijonių ir sukatzolių ekstraktais. Gudobelės, valerijonai ir sukatzolės padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos funkciją. Magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą bei mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Skystos formos, patogiai vartoti kasdien.

NUO 21<sup>99</sup> €**VIVITON**

1000 mg, 30 plėvele dengtų tablečių 21<sup>99</sup> €  
 1000 mg, 60 plėvele dengtų tablečių 37<sup>99</sup> €

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Mikronizuotas diosminas. **Terapinės indikacijos.** „Viviton“ gydymi suaugusieji toliau išvardytas atvejais: su lėtine apatinių galūnių venų liga susijusių simptomų, pvz., skausmo, kraujavimo ir patinimo išangės srityje, gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Lėtinė apatinių galūnių venų liga: 1 plėvele dengta tabletė per parą, kurią reikia išgerti ryte valgio metu ( trumpiausia rekomenduojama gydymo trukmė – mažiausiai 4–5 savaitės); ūminė hemorojaus liga: po 1 plėvele dengta tabletė 3 kartus per parą pirmąsias 4 dienas, po to – po 1 plėvele dengta tabletė 2 kartus per parą kitas 3 dienas. Vėliau reikia vartoti palaikomąją dozę – po 1 plėvele dengta tabletė per parą. Tabletes reikia išgerti valgio metu. **Kontraindikacijos.** „Viviton“ vartoti draudžiama: jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) diosminui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pastartite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Viviton“. Jeigu jūsų kepenų arba inkstų funkcija yra sutrikusi, prieš pradėdami vartoti „Viviton“, pastartite su savo gydytoju. Vaistas nėra veiksmingas mažinant kojų patinimą, pasireiškusi dėl širdies, inkstų ar kepenų ligos. Ūminės hemorojaus ligos gydymas šiuo vaistu nepakeičia specifinio kitų išangės sutrikimų gydymo. **Atstovas Lietuvoje:** UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, Lietuva. El. paštas LT@berlin-chemie.com Reklama paruošta 2026-04. LT-VIV-2.2026\_MFL0W

**VISAPUSIŠKA PAGALBA JŪSŲ VENOMS**



# SKIEPAI NUO ERKINIO ENCEFALITO

SU  
LOJALUMO  
KORTELE

28<sup>99</sup> €

SKIEPO KAINA  
BE KORTELĖS

31<sup>99</sup> €



Galima išankstinė registracija:

- internetu [www.nvaistine.lt/skiepai](http://www.nvaistine.lt/skiepai)
- telefonu +370 800 10 008



Nuolaidos taikomos  
su PC Norfa kortele.  
Akcijos „Laimės valandos“  
nuolaidos netaikomos.

-30%

**SCHOLL**

**PĖDŲ IR NAGŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS**

Turėdamas daugiau nei 100 metų patirtį pėdų priežiūros srityje, prekių ženklas „Scholl“ įsitvirtino kaip vienas pėdų priežiūros sprendimų lyderių. Visi „Scholl“ produktai, įskaitant vidpadžius, dezodorantus, pėdų kaukes ir pleistrus, nagų grybelio ir korpų gydymo priemones, buvo sukurti taip, kad padėtų spręsti jūsų pėdų problemas – nuo sausos odos iki pavargusių ir skaudančių pėdų.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



**RANDŲ PROFILAKTIKAI IR PRIEŽIŪRAI**

-20%



**DERMATIX® ULTRA**

gelis, 6 g **29<sup>99</sup> 23<sup>98</sup> €**  
gelis, 15 g **54<sup>99</sup> 43<sup>98</sup> €**

**MEDICINOS PRIEMONĖS**

Vietinio vartojimo silikono gelis šviežiai užgyjusių žaizdų randų susiformavimo profilaktikai ir apsaugai nuo iškilų, matomų randų atsiradimo. „Dermatix® Ultra“ yra vietiskai vartojamas skaidrus silikono gelis, kuris greitai išdžiūsta ir padeda išlaikyti odos drėgmės balansą. Skirtas odos randams, susidariusiems po chirurginių procedūrų, nudegimų ir kitų sužalojimų, prižiūrai. Nustatyta, kad „Dermatix® Ultra“ gelis lygina, minkština ir mažina randus, naikina niežulį ir diskomforto jausmą rando vietoje, taip pat mažina dėl randų atsiradusios odos spalvos nelygumus. „Dermatix® Ultra“ taip pat tinka ir vaikams. „Dermatix® Ultra“ negalima vartoti ant atvirų ar šviežių žaizdų. „Dermatix® Ultra“ negalima tepti ant gleivinių arba arti prie akis.

5<sup>99</sup> €



**ACICLOVIR ACTAVIS 5 % kremas, 5 g**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 g kremo yra 50 mg acikloviro. **Terapinės indikacijos.** Lokalus odos ir lūpų pūslelinės gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems „Aciclovir Actavis“ 5 % kremo reikia tepti 5 kartus per parą, vidutiniškai kas 4 val.; naktį daroma pertrauka. Gydoma 4 paras. Jei per šį laikotarpį nepasveikstama, gydymą reikia tęsti dar 6 paras. Jei pažeidimas neišnyksta ir po 10 parų, rekomenduojama kreiptis į gydytoją. „Aciclovir Actavis“ 5 % kremo nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Vartoti ant odos. **Kontraindikacijos.** „Aciclovir Actavis“ 5 % kremo negalima skirti pacientams, kurie yra jautrūs aciklovirovi, valaciklovirovi, propilenglikoliui ar bet kuriai „Aciclovir Actavis“ 5 % kremo pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Aciclovir Actavis“ 5 % kremu nerekomenduojama tepti gleivinės, pvz., burnos, akių ar lyties organų, nes galimas sudirginimas. Būtina laikytis atsargumo priemonių ir saugoti akis, kad į jas nepatektų kremo. Jeigu Jūsų imunitetas labai susilpnėjęs, (t. y. Jūsų organizmo gebėjimas kovoti su infekcija yra sumažėjęs), tokiu atveju dėl bet kokios infekcijos gydymo reikia kreiptis į gydytoją ir įvertinti gydymo geriamojo acikloviro galimybę. Pagalbinės medžiagos cetoestearilo alkoholis, natrio laurilsulfatas ir propilenglikolis gali sukelti vietinių odos reakcijų. **Teksto peržiūros data.** 2023-04-03. **OTC-LT-00093 Reklamos teksto parengimo data.** 2025-04-01.

**NIEŽĖJIMUI IR SKAUSMUI MALŠINTI**

5<sup>99</sup> €



**PSILO-BALSAM 1 % gelis, 20 g**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 g gelio yra 10 mg difenhidramino hidrochlorido. **Pagalbinės medžiagos:** cetilpiridino chloridas, makrogolio 6 glicerolio kaprilokapratas, poliakrilato rūgštis, trometamolis, išgrynintas vanduo. **Terapinės indikacijos:** „Psilo-Balsam“ yra lokalaus poveikio vaistas nuo alergijos. „Psilo-Balsam“ vartojamas niežėjimui ir skausmui malšinti esant: pirmojo laipsnio terminiam nudegimui ir nudegimui saulės spinduliais; vabzdžių įgėlimams ar įkandimams, dilgėlinei ar kitokiems nedidelės odos pažeidimams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams „Psilo-Balsam“ reikia tepti plonu sluoksniu pažeistos odos vietas ir švelniai įtrinti 3–6 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu Jūsų jautrumas cetilpiridino chloridui yra padidėjęs, „Psilo-Balsam“ vartoti negalima. **Specialūs įspėjimai:** „Psilo-Balsam“ 1 % gelio negalima tepti ant atvirų žaizdų ar gleivinių, nes dėl didesnės difenhidramino absorbcijos gali pasireikšti sisteminis jo poveikis; vengti patekimo į akis; jei patepus gelio ėmė peršėti odą arba atsirado bėrimas, gydymą reikia nutraukti. Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. „Psilo-Balsam“ 1 % gelio negalima vartoti paskutinių nėštumo savaičių metu, nes yra galimi gimdos funkcijos sutrikimai. Žindančioms moterims vaisto vartoti nerekomenduojama. **Reklamos teksto parengimo data** 2026-03-10. 2604\_Psilo-Balsam\_V01\_LT

**ĮKANDIMAI, NUDEGIMAI, NIEŽULYS? NEKASYKITE – NURAMINKITE!**

**NUO GRYBELIO**

-25%



**MYCOSAN**

**MEDICINOS PRIEMONĖS**

„Mycosan“ skirtas nagų ir pėdų grybelinėms infekcijoms gydyti ir apsaugoti nuo jų. „Mycosan“ serumas gydo ir užkerta kelią rankų ir kojų nagų grybeliui. Serumas praskisverbia į nagą ir pagerina jo struktūrą, todėl nagas atauga sveikas. Pažeistoje vietoje „Mycosan“ sukuria apsauginį barjerą ir infekcija nebegali plisti į kitus nagus. Labai svarbu gydymą pradėti vos pastebėjus pirmuosius ligos simptomus. Labai svarbu griežtai laikytis produkto naudojimo instrukcijos. „Mycosan“ pėdų gelis nuo grybelių skirtas „atleto pėdai“ gydyti. „Atleto pėda“ yra grybelių sukelta pėdos odos infekcija, kurią reikia gydyti, kad ji neišplistų. Gaivinamasis ir vandeniu nelaidus pėdų purškiklis „Mycosan Protect“ 12 val. apgaubia pėdą apsaugine plėvele, kuri saugo pėdas nuo grymės susigrįti grybeline pėdų odos infekcija.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-40% 2<sup>99€</sup> 4<sup>99€</sup>



**AMEDIPLUS**

Pantenolio kremas su chlorheksidinu, 30 g  
Pantenolio kremas, 30 g  
**KOSMETIKOS PRIEMONĖS**

-30% 6<sup>29€</sup> 9<sup>99€</sup>



**DERMATONICS ONCE**

kulnų balzamas, 60 ml

**MEDICINOS PRIEMONĖ**

„Dermatonics Once Heel Balm“ – sausai, šiurkščiai, suragėjusiai kulnų ir padų odai. Produkto sudėtyje yra 25 % šlapalo, kuris veikia kaip drėkiklis, sulauko vandenį raginami suksniyje, padeda šalinti negyvas odos ląsteles. Užtenka naudoti kartą per dieną. Rezultatas matomas po 24 valandų.

NUO SKAUSMO

NUO 6<sup>99</sup> €



**DITEL**  
23,2 mg/g, gels, 50 g 6<sup>99</sup> €  
23,2 mg/g, gels, 100 g 9<sup>99</sup> €

**NERCEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veiklioji medžiaga, stiprumas:** diklofenako dietilaminas, 23,2 mg/g. **Terapinės indikacijos:** skirtas suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: vietinis skausmo malšinimas, esant ūminiams patempimams ar sumušimams po bukos traumos. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** reikia vartoti 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Reikia nuo vėsnos iki graikiško riešuto dydžio kiekio, atitinkančio 1–4 g gelio. Didžiausia paros dozė – 8 g gelio. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Anksčiau pasireiškusias padidėjusio jautrumo reakcijas, pavartojus acetylsalicilo rūgšties ar nesteroidinių vaistinių preparatų nuo uždegimo (NVPNU). Vartojimas ant alvių žaizdų, gleivinių, jei yra odos uždegimas arba infekcija bei egzema. Vartojimas paskutinį nėštumo trimestrą. Vartojimas vaikams ir paaugliams iki 14 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atšargiai vartoti pacientams, kurių inkstų, širdies ar kepenų funkcija sutrikusi, taip pat pacientams, kuriems yra aktyvi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos peptinė opa. Vartoti tik ant nepažeistos ir sveikos odos. Vengti, kad nepatektų į akis, ir kontakto su gleivinėmis. Nenaudoti oriu nepraėjusių tvarsčių. Jei yra tiesioginių saulės spindulių arba dirbtinės saulės poveikis, kyla odos reakcijų pavojus. Gydomo metu ir dvi savaites po gydymo reikia vengti saulės spindulių ar dirbtinės saulės. Reklamos teksto parengimo data 2024-04. 2604\_SB\_Ditel\_V01\_LT

„DITEL“ – NUOSPRENDIS SKAUSMUI!

-25% 8<sup>32€</sup> ~~11<sup>00€</sup>~~



**AMEDIPLUS ACTIVE GEL**  
šaldomasis-šildomasis kūno gelis, 100 ml  
**KOSMETIKOS PRIEMONĖ**

-20%



**AMEDIPLUS**  
Tamprūs pleistrai, 7 x 2 cm, 10 vnt. 4<sup>99</sup> 3<sup>35</sup> €  
Tamprūs pleistrai, 7 x 2 cm, 200 vnt. 20<sup>99</sup> 16<sup>00</sup> €  
Tamprūs pleistrai, 7 x 3,8 cm, 200 vnt. 28<sup>99</sup> 22<sup>40</sup> €  
ULTRA SENSITIVE pleistrai, 10 vnt. 3<sup>49</sup> 2<sup>79</sup> €  
**MEDICINOS PRIEMONĖS**

-25%



**AMEDIPLUS**  
Pleistrai pūslėms, 2 x 6 cm, 5 vnt. 4<sup>99</sup> 3<sup>74</sup> €  
Pleistrai pūslėms, 6,9 x 4,4 cm, 5 vnt. 5<sup>19</sup> 3<sup>89</sup> €  
**MEDICINOS PRIEMONĖS**

6<sup>99</sup> €



**SOLPADEINE**  
500 mg/8 mg/30 mg, 12 tirpinamųjų tablečių

**NERCEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Kiekvienoje tirpinamojoje tablete yra 500 mg paracetamolio, 8 mg kodeino fostato hemihidratao ir 30 mg kofeino. **Terapinės indikacijos:** šilono ir vidutinio stiprumo skausmo (šnarai, nugaros, galvos ir migreninio, menstruacinio, neuralginio bei dantų) malšinimas. Peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems: po 2 tabletes išstiprinti ne mažiau kaip pusę stiklinės vandens ir gerti iki 4 kartų per parą (pagal poreikį). Negalima dozės gerti dažniau nei kas 4 val. ir ne daugiau kaip 8 tablečių per bet kurias 24 val. 12–15 m. paaugliams: po 1 tablete kas 6 val. Neviršyti maksimalios paros dozės – 4 tablečių per parą. 16–17 m. paaugliams: po 1–2 tabletes kas 6 val. Neviršyti maksimalios paros dozės – 8 tablečių per parą. Gydymo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 5 paros. **Specialūs įspėjimai:** Pastarūkie su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti vaistą. Jeigu Jūs sergate sunkia inkstų ar kepenų liga; jei sutrikusi žarnyno veikla, įskaitant žarnyno veiklos sustojimą; jei jums operacijos metu buvo pašalinata tulies pūslė; jeigu vartojate vaistų nuo depresijos arba kvėpavimo sutrikimų; jei vartojate vaistų nuo pykinimo, vėmimo arba padidėjusio cholesterolio kiekio kraujyje; jei valgoite maistą, kuriame yra mažai natrio. Kiekvienoje tirpinamojoje tablete yra 427 mg natrio; jeigu esate arba kada nors buvote priklausomas (-a) nuo opioidų, alkoholio, receptinių vaistų arba netiesių cheminių medžiagų. Nevartokite per daug produktų, kuriuose yra kofeino. Kartu su šiuo vaistu nevartokite kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio ar kodeino. Kaip ir kitų opioidų, kodeino reikia vartoti atsargiai, jeigu Jūsų kraują spaudimas yra žemas ar sergate hipotenzija; patyrėte galvos traumą ar turite padidėjusį intrakranijinį (kaulikos vidaus) spaudimą. Nedelsdami pasakykite gydytojui, jeigu sergate sunkiomis ligomis, įskaitant sunkius inkstų funkcijos sutrikimus arba sepsį, netinkamą mitybą, lėtinį alkoholiizmą arba jei vartojate ir fluoksalaciną. Gaila pranešimų apie sunkių sveikatos sutrikimų – metabolinę acidozę. Gali sukelti mieguistumą ar sąnėjimą. Jei taip nutiko, nevadykite mechanizmų. **Kontraindikacijos:** „Solpadeine“ vartoti draudžiama; jeigu yra alergija veikliosios medžiagos, skausmą malšinančioms opioidams arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio; jeigu yra kvėpavimo funkcijos nepakankamumas; jeigu buvo galvos trauma; jeigu yra padidėjęs intrakranijinis spaudimas; jeigu buvo atlikta tulies latakų operacija; jeigu yra lėtinis vidurių užkietėjimas; jaunesniems kaip 12 m. vaikams; skausmą malšinti vaikams ir paaugliams (0–18 m.) po gerklės ir ryklės migdolų pašalinimo dėl obstrukcinės miego apnėjos sindromo operacijos; jeigu yra žinoma, kad organizme kodeinas labai greitai metabazuojamas į morfiną; moterims nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Reklamos teksto parengimo data 2026-04-01.

6<sup>99</sup> €



**LARYXIN**  
LEMON, 5 mg/1 mg, 24 suslėgtosios pastilės  
MENTHOL, 5 mg/1 mg, 24 suslėgtosios pastilės  
STRAWBERRY, 5 mg/1 mg, 24 suslėgtosios pastilės

**NERCEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Sudėtis:** 1 suslėgtoje pastilėje yra 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido ir 1 mg lidokaino hidrochlorido monohidratao. **Terapinės indikacijos:** gerklės skausmo simptomų malšinimas suaugusiems ir 12 m. bei vyresniems paaugliams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** leiskite pastilei lėtai išstiprinti burnoje. Suaugusiems – po 1 pastilę kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 10 pastilių per dieną. 12–18 m. paaugliams – po 1 pastilę kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 5 pastiles per dieną. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 5 dienas iš eilės. **Kontraindikacijos:** alergija chlorheksidiniui, lidokainui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jaunesniems kaip 12 m. vaikams ir paaugliams. **Specialūs įspėjimai:** vaistą vartokite tik trumpa laiką skausmą ir dirginimą malšinti. Kreipkitės į gydytoją, jei per 3–4 dienas Jūsų sąjauja nepagerėjo arba karščiavoje, skauda galva, pykina, vemiate ar atsiranda odos išbėrimas. Jeigu esate alergiški kitiems vietiniams amidių grupės anestetikams, pavyzdžiui, lidokainui, turite laikytis saugumo priemonių. Vartojant didesnes nei rekomenduojama dozes, gali sumažėti rijimo refleksų valdymas. Dėl to gali padidėti skysčių ir maisto dalelių įkvėpimo rizika. Nevartokite tuo pačiu metu, prieš pat ar iš karto po kitų burnos ir (arba) gerklės dezinfekavimo priemonių. „Laryxin Lemon“ suslėgtųjų pastilių sudėtyje yra sorbitolio (fruktozės šaltinis, taip pat gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurių laisvinantį poveikį), aspartamo (fenilalanino šaltinis, gali būti kenksmingas sergantiems fenilketonurija), benzilo alkoholio (gali sukelti alerginių reakcijų), maltodekstrino (jis skaidomas į gliukozę) ir natrio (dėl mažo kiekio jis beveik neturi reikšmės). „Laryxin Menthol“ suslėgtųjų pastilių sudėtyje yra sorbitolio ir levomentolio (duodant vartoti mažiams vaikams, kuriems anksčiau yra buvę traukuliu, reikia laikytis saugumo priemonių). „Laryxin Strawberry“ suslėgtųjų pastilių sudėtyje yra sorbitolio, maltodekstrino, levomentolio ir natrio (dėl mažo kiekio jis beveik neturi reikšmės).

8<sup>99</sup> €



**LARYXIN MENTHOL**  
2 mg/0,5 mg/ml, burnos gleivinės purškalo (tirpalas), 30 ml

**NERCEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Sudėtis:** 1 išpurškime yra 0,17 mg chlorheksidino digluconato ir 0,043 mg lidokaino hidrochlorido monohidratao. **Terapinės indikacijos:** gerklės skausmo simptomų malšinimas suaugusiems ir 12 m. bei vyresniems paaugliams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti ant burnos gleivinės. Suaugusiems – po 3–5 išpurškimus į galinę gerklės dalį kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 10 kartų per parą. 12–18 m. paaugliams – po 2–3 išpurškimus į galinę gerklės dalį kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 5 kartus per parą. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 5 dienas iš eilės. **Kontraindikacijos:** alergija chlorheksidiniui, lidokainui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jaunesniems kaip 12 m. vaikams ir paaugliams. **Specialūs įspėjimai:** vaistą vartokite tik trumpam laikui skausmą ir dirginimą malšinti. Kreipkitės į gydytoją, jei per 3–4 dienas Jūsų sąjauja nepagerėjo arba karščiavoje, skauda galva, pykina, vemiate ar atsiranda odos išbėrimas. Jeigu esate alergiški kitiems vietiniams amidių grupės anestetikams, pavyzdžiui, lidokainui, turite laikytis saugumo priemonių. Vartojant didesnes nei rekomenduojama dozes, gali sumažėti rijimo refleksų valdymas. Dėl to gali padidėti skysčių ir maisto dalelių įkvėpimo rizika. Nevartokite tuo pačiu metu, prieš pat ar iš karto po kitų burnos ir (arba) gerklės dezinfekavimo priemonių vartojimo. „Laryxin Menthol“ burnos gleivinės purškalo sudėtyje yra etanolio (96 %) ir levomentolio (duodant vartoti mažiams vaikams, kuriems anksčiau yra buvę traukuliu, reikia laikytis saugumo priemonių). Mažas alkoholio (etanolio) kiekis, esantis šio vaisto sudėtyje, nesukelia pastebimo poveikio. Reklamos teksto parengimo data 2025-01.

RAUMENIMS IR SĄNARIAMS

-30%



**AXANOVA**  
**MEDICINOS PRIEMONĖS**  
„Axanova“ priemonių pagrindas – eteriniai aliejai. Atsivėlgiant į priemonės sudėtį, šildo arba vėsina, gali būti naudojamos esant sumušimams, patempimams, maudžiant sąnarius ar raumenis. Pagaminta Šveicarijoje.  
\*Akių ir odos geltona etiliethe pažymėtomis priemonėmis

6<sup>99</sup> €



**NEURORUBINE FORTE LACTAB 20 plėvele dengtų tablečių**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Kiekvienoje plėvele dengtoje tablete yra 200 mg ti amino nitrato (vitamino B1), 50 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6), 1 mg cianokobalamino (vitamino B12). **Terapinės indikacijos.** Dėl B grupės vitaminų stokos atsiradusių nervų sistemos ligų gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Per parą reikia išgerti 1-2 tabletes. Vartoti per burną. Kiek laiko vartoti „Neurorubine Forte Lactab“, patars gydytojas. Vėliausiai po 4 savaitių būkle turi įvertinti gydytojas. Jeigu simptomai nepaėna, reikia kreiptis į gydytoją, kad jis parinktų kitą gydymą. **Vaikių populiacija.** Saugumas ir veiksmingumas vaikams dar neištirtas, todėl vaistas neturi būti skiriamas vaikams. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija vitaminams B1, B6 ar B12 arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu sergate žvyneline. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vaisto sudėtyje esanti didelė vitamino B6 dozė gali silpninti I-Dopos poveikį bei pabloginti Parkinsono ligą. Taip pat vitaminas B6 gali silpninti altretamino (vaisto, vartojamo vėžiui gydyti) poveikį. Kartu vartojamo izoniazido toksinis poveikis gali stiprėti. Tiosemikarbazonas ir 5-fluorouracilas, būdami ti amino antagonistais, gali trikdyti vitamino B1 poveikį. Kartu su „Neurorubine Forte Lactab“ vartojant vaistus, surišančius skrandžio rūgštis (antacidus), pablogėja vitamino B1 pasisavinimas. **Teksto peržiūros data 2024-02-01. Reklamos teksto parengimo data 2026-01. NEUR-LF-0002**

**PALIKITE SKAUSMĄ UŽ NUGAROS!**

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



**AMBIO PATIRIANTIEMS ĮTAMPA,** 100 ml 7<sup>98</sup> €  
**GERAM POILSIUI,** 30 kapsulių 10<sup>99</sup> €  
**MAISTO PAPILDAI**

IKI -50 %



**NEUROZAN,** 30 tablečių 34<sup>48</sup> 15<sup>75</sup> € -50 %  
**NEUROZAN PLUS,** 28 kapsulės + 28 tabletes 50<sup>99</sup> 38<sup>24</sup> € -25 %  
**MAISTO PAPILDAI**

NEUROZAN – platus ir subalansuotas kompleksas normaliai proteinei (pantoteno rūgštis) ir nervų sistemos (jodas, magnis, ir kt.) veiklai palaikyti. Vitaminai B1, B3 ir kt. palaiko normalią psichologinę būklę, o geležis ir cinkas – pažinimo funkciją. Sudėtis papildyta ginkmedžių ekstraktu ir kofeinentu Q10.

-30 %



**VALERIJONAS FORTE** 50 tablečių 7<sup>29</sup> 5<sup>45</sup> €  
**VALERIJONŲ EKSTRAKTAS** 20 mg, 50 tablečių 2<sup>29</sup> 1<sup>95</sup> €  
**MAISTO PAPILDAS**  
Vaistinis valerijonas padeda atsipalaiduoti, palaiko normalią miego funkciją.

7<sup>99</sup> €



**VISINE 0,5 mg/ml akių lašai (tirpalas), 15 ml**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veikioji medžiaga, stiprumas:** kiekviename akių lašų mililitre yra 0,5 mg tetrazilino hidrochlorido (L. y. 21 jūg laš). **Terapinės indikacijos:** „Visine“ skirtas akių paraudimui, kurį sukėlė nedidelis neriekinis akių sudirginimas (pvz., dūmai, dulkes, vėjas, chloruotas vanduo, šviesa ar alergija, trumpam laikui gydyti suaugusiems, paaugliams ir 2 m. bei vyresniems vaikams. Vaikams nuo 2 iki 6 m. amžiaus „Visine“ galima vartoti tik su sveikatos priežiūros specialisto rekomendacija. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti ant akių. Vaikams nuo 6 m. amžiaus, paaugliams ir suaugusiems: jei gydytojas nenurodė kitaip, lašinti po 1-2 lašus ant pažeistos akies (-ių) 2-3 kartus per parą. Vaikams nuo 2 iki 6 m. „Visine“ galima vartoti tik su sveikatos priežiūros specialisto rekomendacija. Jei nenurodyta kitaip, rekomenduojama dozę yra 1 lašas ant pažeistos akies (-ių) 2-3 kartus per parą. Vaikams iki 12 m. šį vaistą įlašinti galima tik su suaugusiųjų pagalba. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija tetrazilino hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, sergate uždarą kampo glaukoma, jaunesniems kaip 2 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** pastariktis su gydytoju, jeigu sergate sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis (pvz., koronarinė širdies liga, padidėjusiu kraujospūdžiu, feochromocitoma), gerybinė prostatos hiperplazija, medžiagų apykaitos sutrikimais (pvz., hipertiroidizmas, cukrinis diabetas, raudonoji kraujo pigmento susidarymo sutrikimai), sausuoju rinitu (priekinės nosies dalies lėtinu uždegimu), sausuoju keratokonjunktyvitu (junginės ir ragenos sausumas), glaukoma (akių būkle, kai patelidžiamas regos nervas, jungiantis akį su smegenimis). Jei per 48 valandas simptomai nepagerėja arba jeigu akių dirginimas ar paraudimas išlieka arba didėja, jeigu pastebite regėjimo pokyčių ar akių skausmą, vaisto vartojimą nutraukite ir kreipkitės į gydytoją. Jeigu pasireiškia galvos skausmas, regėjimo praradimas, regos sutrikimai (pvz., judančios dėmelės regėjimo lauke ar dvejetainis akys), stiprus ūminis ar tik vienos akies paraudimas, arba šviesa sukelta skausmą, vaisto vartojimą nutraukite ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Nenaudokite šio vaisto daugiau ir ilgiau nei 3-5 dienas iš eilės, nes tai gali pabloginti akių paraudimą ar nosies simptomus. Vartojant šį vaistą, jūsų vyzdžiai gali laikinai išsipilti. Paprastai kontaktinių lašų negalima nesoti sergant akių ligomis. Jei nesigate kontaktinius lašus, prieš vartodami vaistą juos išsimikite ir vėl įsidėkite atgal ne mažiau kaip po 15 minučių. „Visine“ sudėtyje yra fosfatų. Jeigu Jums yra akies priekinė dalį gaubiančio skaidraus sluoksnio (ragenos) sunkių patelidžių, labai retas atvejis fosfatai gali sukelti drumzlinus ragenos plotelius dėl gydyto metu susiformavusių kalcio nuosėdų. Reklamos teksto parengimo data: 2026-02-11-VISN-2026-290736

**SAUSOMS, PAVARGUSIOMS, SUDIRGUSIOMS AKIMS BEI LĒTINIAM AKIŲ SAUSUMUI**

-20 %



**BEPANTHEN® EYE**  
akių lašai, 20 x 0,5 ml 14<sup>42</sup> 11<sup>58</sup> €  
akių lašai, 10 ml 16<sup>42</sup> 13<sup>18</sup> €  
INTENSIVE, akių lašai, 10 ml 17<sup>92</sup> 14<sup>38</sup> €

**MEDICINOS PRIEMONĖS**

„Bepanthen® Eye“ akių lašų sudėtyje yra natrio hialuronato ir deksapanterolio. „Bepanthen® Eye Intensive“ akių lašų sudėtyje yra ne tik natrio hialuronato ir deksapanterolio, bet ir vitamino A ir E bei fosfolipidų. Natrio hialuronatas suformuoja tolygią, stabilią ir ilgalaikę apsauginę plėvelę ant akies paviršiaus. Dekspanterolis geba prisijungti didelį vandens kiekį, drėkina ir apsaugo akis. Vitaminai A ir E veikia kaip antioksidantai, neutralizuodami laisvuosius radikalus (pvz., UV šviesa). Fosfolipidai palengvina žmonių plėvelės lipidinio sluoksnio regeneraciją. „Bepanthen® Eye“ akių lašai skirti sausoms ir pavargusioms akims. Drėkina ir apsaugo. Tinka esant mechaniniam stresui, stresui dėl aplinkos poveikio arba intensyvaus žiūrėjimo. „Bepanthen® Eye Intensive“ akių lašai skirti labai sausoms, sudirgusioms akims ir lėtiniam akių sausumui. Drėkina, saugo, regeneruoja ir gydo. Tinka ne tik esant mechaniniam stresui, stresui dėl aplinkos poveikio arba intensyvaus žiūrėjimo, bet ir esant smėlio pojūčiui akyse, sumažėjusiam ašarų gamybai, esant diskomfortui dėl tam tikrų vaistų vartojimo ar išorinių alergenų. Visi lašai tinka neįsijautantiems kontaktiniais lašais. Lašanant kontaktinių lašų išsimikite akis. Sudėtyje nėra konservantų, todėl lašai labai gerai toleruojami net vartojant ilgą laiką. Lašinti po lašai akies jungtims mašelj iki 3-5 kartų per parą. „Bepanthen® Eye“ vienadotės akių lašų talpyklės skirtos tik vienkarčiam vartojimui. „Bepanthen® Eye“ buteliuką galima vartoti net 12 mėnesių po jo atidarymo. „Bepanthen® Eye Intensive“ buteliuką galima vartoti 2 mėnesius po jo atidarymo. Jei norite sužinoti daugiau, skaitykite visas vartojimo instrukcijas. Reklamos teksto parengimo data 2025-02-CH-20250227-72

**PAŠALINKITE SAUSŲ AKIŲ SIMPTOMUS IŠ KARTO!**

-20 %



**OCUSYST**  
kontaktinių lašų tirpalas, 100 ml 5<sup>29</sup> 4<sup>23</sup> €  
kontaktinių lašų tirpalas, 360 ml 8<sup>19</sup> 6<sup>55</sup> €  
**MEDICINOS PRIEMONĖS**

-30 % 5<sup>10€</sup> 7<sup>10€</sup>



**ABC VIT VITAMINAS A,** 60 kapsulių  
**MAISTO PAPILDAS**  
Vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą, palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, taip pat palaikyti normalią odos būklę.

7<sup>49</sup> €**NASOMETIN**

50 mikrogramų/dozėje nosies purškalas, 60 dozių

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** kiekvienoje išpurškiamoje dozėje yra 50 mikrogramų mometazono furoato. **Terapinės indikacijos:** vaistas skirtas anksčiau gydytojo diagnozuoto suaugusiųjų sezoninio alerginio rinito simptomams gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** 2 įpuskijimai į kiekvieną nosies landą 1 kartą per parą, vėliau - po 1 įpuskijimą į kiekvieną nosies landą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, neišgydyta vietinė nosies gleivinės infekcija ar neužgyjusi žaizda po nosies operacijos ar traumas. **Specialūs įspėjimai:** kvėpavimo takų tuberkuliozė arba kita infekcija. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El.paštas: info.lithuania@sandoz.com. BS2601079716. Reklamos teksto parengimo data: 2026 01 07.

**KANKINA ALERGINĖ SLOGA? METAS TAI PAKEISTI!****ESANT HEMOROJUI**-20% 9<sup>58€</sup>**MASTU<sup>®</sup>**, 10 žvakučių**MEDICINOS PRIEMONĖ**

**Veikliosios medžiagos:** bismuto subgalatas, titano dioksidas (E 171), aukštos dispersijos silicio dioksidas, kietieji riebalai. **Terapinės indikacijos:** medicinos priemonė, skirta naudoti esant hemorojui. Žvakutės slopina negalavimus, kurie dažnai atsiranda esant hemorojui: sudirginimą, niežulį, uždegimą, šlapinavimą, skatiną žaizdos gijimą. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** 2 kartus per dieną į išangę arba į tiesiąją žarną įkišti po 1 žvakutę (geriau tai daryti po ištuštinimo). „Mastu“ žvakutes naudoti ne ilgiau kaip 30 dienų. **Kontraindikacijos:** „Mastu“ žvakutes vartoti draudžiama, jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) viena iš sudedamųjų dalių. **Specialūs įspėjimai:** esant kraujavimui ar pastebėjus išmatose kraują, pakilus temperatūrai ar atsiradus skausmams, nebenaudoti „Mastu“ žvakučių ir kreiptis į gydytoją. **Specialūs įspėjimai:** esant kraujavimui ar pastebėjus išmatose kraują, pakilus temperatūrai ar atsiradus skausmams, nebenaudoti „Mastu“ žvakučių ir kreiptis į gydytoją, jei kamuoja nuolatiniai negalavimai, sukelti hemorojus. „Mastu“ žvakutes skirtos naudoti išoriskai išangės srityje, jų negalima nuryti. **Reklamos teksto parengimo data** 2026-06-17. 2606\_SB\_Mastu\_V01\_LT **PAGALBA ESANT HEMOROJUI.**

-30% 6<sup>50€</sup>**FITOLIZIN** valgomoji pasta, 100 g  
**MAISTO PAPILDAS**-20% 5<sup>43€</sup>**UNDEVIT** 50 dražečių**MAISTO PAPILDAS**

Vitaminų A, C, E, B grupės (B1, B2, B6, B12) ir niacino, rutino, pantoteno rūgšties, folio rūgšties preparatas. Vitaminai C ir A padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo, vitaminas B1 (tiaminas) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, vitaminas B2 (riboflavinas) padeda išsaugoti normalų regėjimą, vitaminas B6 (piridoksinas) padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, vitaminas B12 (cianokobalaminas) padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją, pantoteno rūgštis padeda palaikyti normalią protinę veiklą. Vartojimas: gerti po 1 dražetę per dieną po valgio. Gamintojas: „Technology“, Ukraina. Išskirtinis platintojas Lietuvoje: UAB VERATRUM PHARMA, Žarijų g.2B, Vilnius

-10% 2<sup>51€</sup>**FERMENTUOTAS GĖRIMAS „GÉRIS“**

„GÉRIS“ - natūraliai fermentuotas, nepasterizuotas gėrimas su gyvosiomis bakterijų kultūromis. Gaminamas iš uogų ir šėšių grūdų mišinio, naudojant lėtos fermentacijos procesą. Vartojimas: 15-30 ml per dieną. Galima vartoti vieną arba maišyti su šaltais gėrimais. Sudėtyje nėra pridėtinio cukraus, laktozės, gliutimo ar konservantų. Šis fermentuotas gėrimas gali būti įvairios ir subalansuotos mišybės dalis.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

-25%

**MAGNESIUM DIASPORAL****MAISTO PAPILDAS**

„Magnesium-Diasporal“ Pro<sup>®</sup> linijos produktuose didelės magnio dozės derinamos su kitomis gyvybiškai svarbiomis maistinėmis medžiagomis – vitaminais, kurie nori gyventi aktyvų gyvenimą. Ar jau žinote apie mūsų produktus, skirtus raumenims ir nervams (1), raumenims ir kaulams (2) bei miegui (3)?

1. „Magnesium-Diasporal“ Pro<sup>®</sup> raumenims ir nervams: magnis palaiko normalią raumenų funkciją. Vitaminai B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>6</sub> ir B<sub>12</sub> prisideda prie normalios nervų sistemos veiklos ir energijos apykaitos. Todėl „Magnesium-Diasporal“ Pro<sup>®</sup> raumenims ir nervams aprūpina jūsų organizmą didele magnio ir B grupės vitaminų doze – praktiškas, tiesiai į burną vartojamų granuliu paketelis.
2. „Magnesium-Diasporal“ Pro<sup>®</sup> raumenims ir kaulams: magnis palaiko normalią raumenų funkciją. Vitaminas D palaiko normalią imuninės sistemos veiklą. Puikių sąlygų savarankiskam ir aktyviam gyvenimui užtikrinti. „Magnesium-Diasporal“ Pro<sup>®</sup> raumenims ir kaulams yra didelės dozės magnio, vitamino D ir K, derinys – praktiškas, tiesiai į burną vartojamų granuliu paketelis.
3. „Magnesium-Diasporal“ Pro<sup>®</sup> miegui: magnis, kaip ir vitaminai B<sub>1</sub> ir B<sub>6</sub>, dalyvauja normalios raumenų funkcijos procesuose, padeda raumenims atsipalaiduoti ir prisideda prie normalios nervų sistemos veiklos. Miego hormonas melatoninas savo ruožtu paruošia tavo kūną ir protą miegui. „Magnesium-Diasporal“ Pro<sup>®</sup> miegui yra kruopščiai suderintas magnio, melatonino, vitamino B<sub>1</sub> ir B<sub>6</sub> derinys – praktiškas, tiesiai į burną vartojamas granuliu paketelis.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

**ABC VIT** VITAMINAS D3, 100 mg (4000 TV), 60 kapsulių 8<sup>19 €</sup>**MAISTO PAPILDAS**

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, padeda palaikyti normalią kaulų, dantų būklę, normalią raumenų funkciją, padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą.


1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

**TRAVELOK**, 10 kapsulių 5<sup>29 €</sup>**MAISTO PAPILDAS**

Imbierai padeda palaikyti normalią savijautą keliaujant.

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



**EPITOME**  
MEMORY FORMULA, 14 x 25 ml **29<sup>98</sup> €**  
MAISTO PAPILDAS

1+1


Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



**EPITOME**  
MAGNESIUM BISGLYCINATE, 90 kapsulių **24<sup>98</sup> €**  
MAISTO PAPILDAS

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



**EPITOME**  
MUSCULARITY SHOTS, 14 x 25 ml **29<sup>98</sup> €**  
MAISTO PAPILDAS

-35% 12<sup>99€</sup>  
~~19<sup>98€</sup>~~

**EPITOME**  
SELENIUM, 90 kapsulių  
MAISTO PAPILDAS

-35% 14<sup>29€</sup>  
~~21<sup>98€</sup>~~

**AMBIO**  
NAKVIŠŲ ALIEJUS, 1000 mg, 100 kapsulių  
MAISTO PAPILDAS

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



**AMBIO**  
HEPALIPID COMPLEX, 30 kapsulių **11<sup>99</sup> €**  
MAISTO PAPILDAS

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



**AMBIO**  
VITAMINAI A IR E FORTE, 30 kapsulių **6<sup>48</sup> €**  
VITAMINAS C, 500 mg, 56 kramtomųjų tablečių **8<sup>98</sup> €**  
MAISTO PAPILDAS

-35% 10<sup>39€</sup>  
~~15<sup>98€</sup>~~

**AMBIO**  
SELENAS IR CINKAS SU VITAMINAIŠ, 90 tablečių  
MAISTO PAPILDAS

**-50%** 7<sup>99€</sup>  
~~15<sup>99€</sup>~~



**AMBIO**  
VITAMINAS D3, 4000 IU, 60 minkštųjų kapsulių  
MAISTO PAPILDAS

**1+1** Dvi tokios pačios  
pakuotės už  
VIENOS KAINĄ!



**AMBIO**  
VITAMINŲ B KOMPLEKSAS FORTE, 90 tablečių **22<sup>99€</sup>**  
MAGNIS SU B6 FORTE, 375 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 30 paketėlių **13<sup>99€</sup>**  
MAISTO PAPILDAS

**1+1** Dvi tokios pačios  
pakuotės už  
VIENOS KAINĄ!



**AMBIO**  
GERKLEI SU ISLANDINE KERPENA, miško uogų skoniu, 24 minkštosios pastilės **6<sup>89€</sup>**  
GERKLEI SU ISLANDINE KERPENA, juodųjų serbentų skoniu, 24 minkštosios pastilės **6<sup>98€</sup>**  
GERKLEI SU ISLANDINE KERPENA IR EUKALIPTU, 20 čiulpiamųjų tablečių **6<sup>69€</sup>**  
GERKLEI SU ISLANDINE KERPENA IR IMBIERU, 20 čiulpiamųjų tablečių **6<sup>69€</sup>**  
GERKLEI AVIEČIŲ SKONIO, 20 čiulpiamųjų tablečių **5<sup>70€</sup>**  
MAISTO PAPILDAS

**-35%** 12<sup>21€</sup>  
~~18<sup>99€</sup>~~



**AMBIO**  
KOFERMENTAS Q10, 100 mg, 30 kapsulių  
MAISTO PAPILDAS

**1+1** Dvi tokios pačios  
pakuotės už  
VIENOS KAINĄ!



**AMBIO**  
GERKLEI SU ŠALTALANKIŲ IR MEDETKŲ ALIEJAIS, purškalas, 20 ml **7<sup>99€</sup>**  
MAISTO PAPILDAS

IKI **-30%**



**SVEIKAŽOLIŲ ARBATA**  
KIAULPIENIŲ ŠAKNYS, 40 g ~~3<sup>35€</sup>~~ **2<sup>35€</sup> -30%**  
LINŲ SĖKLOS, 200 g ~~3<sup>55€</sup>~~ **2<sup>84€</sup> -20%**  
MELISŲ LAPAI, 1,5g x 20 pak. ~~2<sup>45€</sup>~~ **1<sup>72€</sup> -30%**  
PELYNAS, 1,5g x 20 pak. ~~2<sup>15€</sup>~~ **1<sup>51€</sup> -30%**  
PELYNAS, 40 g ~~2<sup>05€</sup>~~ **1<sup>44€</sup> -30%**  
SALDŽIŲIŲ PANKOLIŲ VAISIAI, 1,5g x 20 pak. ~~2<sup>25€</sup>~~ **1<sup>58€</sup> -30%**  
VALERIJONŲ ŠAKNYS, 40 g ~~3<sup>45€</sup>~~ **2<sup>42€</sup> -30%**

IKI **-40%**



**AIDWISE**  
Automatinis žastinis kraujospūdis matuoklis DBP-1358, ~~64<sup>95€</sup>~~ **38<sup>97€</sup> -40%**  
Bekontaktis skaitmeninis termometras DET-306, ~~39<sup>99€</sup>~~ **31<sup>99€</sup> -20%**  
Termometras skaitmeninis lankščiu galiuku, ~~7<sup>99€</sup>~~ **6<sup>39€</sup> -20%**  
MEDICINOS PRIETAISAI

**-20%** 15<sup>19€</sup>  
~~18<sup>99€</sup>~~



**AMEDIPUS**  
odos priežiūros pleistras su Arnikos ir Bosvelijos ekstraktais, 9x14 cm, 10 vnt.  
KOSMETIKOS PRIEMONĖ

IKI -50%


**FOMAN®**30 kapsulių ~~45<sup>99</sup>~~ 10<sup>39</sup> € -35 %**MAISTO PAPILDAS**

„Foman“ – maisto papildas, skirtas 3 pagrindinėms vyrų seksualioms funkcijoms: **prostato, šlapimo sistemos, reprodukinei**. Išskirtinėje „Foman“ sudėtyje yra 4 kompleksškai veikiantys elementai: gulsčių serenojų vaisių ekstraktas padeda palaikyti šlapimo ir reprodukcinę funkcijas; didžiųjų dilgėlių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią prostatos funkciją; fermentas proteazė papildoma vyro mityba; organinė seleno forma, padeda palaikyti normalią spermatogenezę. Rekomenduojama suaugusiems gerti po 1-2 tabletes per dieną ne valgio metu.

„FOMAN“ – TECHNISKAI TVARKINGAM VYRUI.

**FOMAN® UP SHOTS**14 x 25 ml ~~40<sup>99</sup>~~ 20<sup>45</sup> € -50 %**MAISTO PAPILDAS**

„Foman UP Shots“ – skirtas seksualiai aktyviems VYRAMS. Viename buteliuke yra koncentruotų veikliųjų medžiagų dozė pritaikyta vyru: **lytiniam potraukiui, erekcijai, pajėgumui ir energijai**. Natūrali seksualinė aktyvumas ir energija padeda palaikyti **Peturvinė pipimė (maca)**. Lytinį potraukį ir pajėgumą padeda palaikyti **Gulsčioji raguvė**. **Ženšenis** padeda palaikyti normalią erekcijos funkciją. **Pantoteno rūgštis** (vitaminas B5) padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei padeda palaikyti normalią proteinę veiklą bei normalią energijos apykaitą. Sudėtyje taurinas (natūrali amino rūgštis). **VIRŠYK GALIMYBES SU „FOMAN UP SHOTS“**

IKI 5<sup>99</sup> €**SEPTANAZAL**

SUAUGUSIESIEMS, 1 mg/50 mg/ml

nosies purškalas (tirpalas), 10 ml

VAIKAMS, 0,5 mg/50 mg/ml

nosies purškalas (tirpalas), 10 ml

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Ksilometazolino hidrochloridas / Dekspantenolis „Septanazal“ nuo 6 metų amžiaus vartojamas: - nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) bei gleivinės pažeidimo gijimui skatinti; - neslerginiam nosies gleivinės uždegimui (vazomotoriniam rinitu) lengvinti; - kvėpavimo pro nosį pasunkėjimui po nosies operacijos šalinti. Rekomenduojama dozė 6 metų bei vyresniems vaikams yra po vieną purškimą į kiekvieną šnervę iki 3 kartų per parą. **Kontraindikacijos**. „Septanazal“ suaugusiems vartoti negalima, jeigu yra alergija ksilometazolino hidrochloridui, dekspantenoliui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu Jums arba Jūsų vaikui yra sausasis nosies gleivinės uždegimas ir atsiranda šašų (sausasis rinitas), jeigu Jums arba Jūsų vaikui buvo chirurginiu būdu pašalinta posmegeninė liauka arba buvo atlikta kita operacija, susijusi su smegenų dangalais. **Specialūs įspėjimai**. „Septanazal“ galima vartoti tik atidžiai įvertinus rizikos ir naudos santykį, jeigu: pacientas yra gydomas monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI) ar kitokiais kraujospūdį didinančiais vaistais, yra padidėjęs akispūdis (ypač jei sergama uždarą kampo glaukoma), pacientas serga sunkia širdies ir kraujagyslių liga, yra feochromocitoma, yra metabolinių sutrikimų, yra porfirija, yra prostatos hiperplazija. **Teksto peržiūros data:** 2023.11.20.

ATKĖMSA UŽGULUSIĄ NOSĮ IR ŠVELNIAI GYDO IŠSAUSĖJUSIĄ NOSIŲ GLEIVINĘ.

**KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIAI, INHALIATORIAI, TERMOMETRAI**

IKI -40%

**„AMEDIPLUS“ MEDICINOS PRIETAISAI****MEDICINOS PRIETAISAI**

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

**ASKORBO RŪGŠTIS** 50 mg, 200 dražečių ~~29<sup>99</sup>~~ €**MAISTO PAPILDAS**

Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninę, nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

**AMEDIPLUS**kištukai ausims skrydžiui, S dydis, 1 pora ~~9<sup>99</sup>~~ €

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesne arba tokia pati — NEMOKAMA!

**ŠALTALANKIŲ ALIEJUS**50 ml ~~10<sup>99</sup>~~ €100 ml ~~13<sup>99</sup>~~ €**MAISTO PAPILDAS**

Šaltalankių aliejus padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir širdies veiklą, normalų virškinimą, normalią odos būklę. Vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą.

-10%

6<sup>02</sup> € ~~6<sup>69</sup>~~**GLICINAS** 50 tablečių**MAISTO PAPILDAS**

Sudedamosios dalys: glicinas (65 % grynojo kiekio), dekstrozės monohidratas, kukurūzų krakmolas, lipnumą reguliuojanti medžiaga riebalų rūgščių magnio druskos. Grynasis kiekis: 7,6 g. Vartojimo būdas: vartoti po 1 tablete 3 kartus per dieną. Tablete laikyti po liežuviu, kol išsirs. Rekomenduojamame suvartoti per parą kiekyje (3 tabletėse) yra 300 mg glicino. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Laikymo sąlygos. Laikyti sausoje, tamsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Gamintojas: UAB „Medicata Filia“, Žarijų g. 2B, Vilnius. Išskirtinjas platintojas Lietuvoje: UAB VERATRUM PHARMA, Žarijų g.2B, Vilnius

# Dovana sveikatai



Daugiau informacijos bei vaistinių, kuriose negalima įsigyti  
dovanų kuponų ir jais atsiskaityti, sąrašą rasite

[www.nvaistine.lt](http://www.nvaistine.lt)



GROŽIUI, JAI



-40%

**AMBIO**  
MULTIVITAMINAI MOTERIMS PLIUS, 60 tablečių ~~14,99~~ 11,99 €  
MAISTO PAPILDAS



9<sup>99</sup> €

**CAGYNOL** 300 mg, ovulė, 1 vnt.

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Ovulė vietiniam makšties kandidozės gydymui. Kiekvienoje ovulėje yra 300 mg sertakonazolo nitrato. **Terapinės indikacijos.** Vietiniam makšties grybelinės Candida infekcijos gydymui. „Cagynol“ skirtas suaugusiems. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Dozavimas. Viena ovulė vakare prieš miegą, vienkartiniam vartojimui, įterpiama giliai į makštį, geriausia gulint. Gydymo trukmė – vienkartinė dozė. Didžiausia vienkartinė dozė yra viena ovulė (300 mg sertakonazolo). Jei klinikiniai požymiai išlieka, antroji ovulė vartojama 7 dienų intervalu. Vartojimo metodas. Vartoti šį vaistinį preparatą negalima naudoti tamponų ir intravaginalinių dušų. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas priešgrybeliniams imidazolo klasės vaistiniams preparatams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Lėtąsio prezervatyvų arba diafragmų naudojimas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei kandidozė patvirtinta, reikia atidžiai ieškoti ekologinių veiksnių, kurie sudaro sąlygas ir skatina grybelinės infekcijos vystymąsi. Norint išvengti atkryčių, labai svarbu nustatyti ir eradiuoti infekciją bei atsivėlgti į ją skatinančius veiksnius. Palaritina vienu metu gydyti visą grybelinės infekcijos židinį, pripažintą sukeleja, partnerį. Nėštumas. Tyrimais su gyvūnais terageninis poveikis nenustatytas. Sertakonazolo vartojimas nėštumo metu turėtų būti svarstomas tik esant būtinybei. Teksto peržiūros data: 2022 m. gegužės 30 d. Reklamoms parengimo data: 2025.08.11.

**VIENOS OVULĖS SĖKMĖS ISTORIJA**

-30%



**FORCAPIL**  
MAISTO PAPILDAS IR KOSMETIKOS PRIEMONĖS PLAUKAMS

„Forcapil“ – tai pažangios plaukų ir nagų priežiūros priemonės iš Prancūzijos, jungiančios mokslą ir natūralių ingredientų galią. „Forcapil“ išskirtinumas – jų sudėtyje, kuriose derinami vitaminai, mineralai, augalų ekstraktai ir didelė dozė sieros turinčios aminorūgštys, kad jūsų plaukai taptų gražūs ir gyvybingi.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

boderm



-40%

**OLIPROX**

nagu lakas grybeliui (gelis vandens pagrindu), 12 ml ~~24,49~~ 12,99 €

**MEDICINOS PRIEMONĖ**

„Oliprox“ nagų lakas (gelis vandens pagrindu) – veiksminga priemonė, padedanti užkirsti kelią grybelinei infekcijai bei pagalbinė priemonė gydant onichomikozę (nagu grybelį).



ŽIEDĖ

VAISTINĖJE  
SUKURTA  
KOSMETIKA



UŽ 1 CT

Perkant bet kuriuos du ŽIEDĖ dušo gelius, kūno gelius TIK UŽ 1 CT!

**ŽIEDĖ**

dušo gelis su bergamotėmis ir lelijomis, 300 ml 8<sup>99</sup> €  
 dušo gelis su jazminais ir apelsinų žiedais, 300 ml 8<sup>99</sup> €  
 kūno gelis su ašalvų ir ramunėlių ekstraktais, 200 ml 11<sup>99</sup> €

KOSMETIKOS PRIEMONĖS



UŽ 1 CT

Perkant ŽIEDĖ veido kremą brandžiai odai, kaukė brandžiai odai TIK UŽ 1 CT!

**ŽIEDĖ**

veido kremas brandžiai odai su erškėtrožių aliejumi, 50 ml 19<sup>99</sup> €  
 veido kaukė brandžiai odai su rožių vandeniui ir hialuronatu, 15 ml 5<sup>99</sup> €

KOSMETIKOS PRIEMONĖS



1+1

Dvi tokios pačios pakuočių už VIENOS KAINĄ!

**HI GENIE!**

MENOPAUSE COMFORT, intymios higienos prausiklis, 200 ml 10<sup>99</sup> €

KOSMETIKOS PRIEMONĖ



12<sup>99</sup> €

**CANIFUG CREMOLUM 200 mg, 3 ovulės**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** vienoje ovulėje yra 200 mg klotrimazolo. **Indikacijos:** mieliagyrybių (dažniausiai Candida albicans) sukeltos makšties uždegimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** 1 „Canifug Cremolum“ ovulė (tai atitinka 200 mg klotrimazolo) įkisti kuo giliau į makštį vieną kartą per parą, vakare. Dažniausiai pakanka 3 dienų gydymo šiuo vaistu kursu. Prieiktus galima paskirti antrą 3 dienų trukmės gydymo kursą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Canifug Cremolum“ medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** specialių atsargumo priemonių reikia nštumo ir žindymo laikotarpiu; jeigu vartojami dezodorantai arba intymiosios higienos priemonės; jeigu kartu yra lytinių lūpų ir gretimos srities odos infekcinė liga; šiais atvejais reikia papildomai skirti lokalią gydymą tinkamais vaistais; jeigu atsiranda tokių požymių – paraudimas, dilgčiojimas, niežėjimas, makšties išskyros, makšties uždegimas su skausmu: šie požymiai taip pat gali būti dėl to, kad ligos sukėlėjas neįtrautų „Canifug Cremolum“; jeigu tuo pačiu metu vartojamas „Canifug Cremolum“ su latekso produktais (pvz., prezervatyvais, diafragmomis), dėl vaisto sudėtyje esančių pagalbinųjų medžiagų (ypač stearatų) šių produktų veiksmingumas gali sumažėti ir jie tampa mažiau patikimi. Vaisto sudėtyje yra cetosteario alkoholio. Cetosteario alkoholis gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą). Geriausia gydytis ne mėnesinių metu ir (arba) gydymą baigti prieš mėnesinių pradžią. Gydyti mėnesinių metu galima tik esant sunkiems klinikiniais simptomams. Nštumo metu gydymą gali skirti tik gydytojas. Jeigu kartu yra lytinių lūpų ir gretimų sričių infekcija ir (arba) partneriui mediciniškai diagnozuotas varpos galvutės ir apvarpės uždegimas, partneriui reikia papildomai vartoti lokalią gydymą tinkamais vaisto formomis. Siekiant išvengti galimos pakartotinės infekcijos, tuo pat metu reikia mediciniškai tirti ir partnerį. Ligai pasireiškus pirmą kartą arba jeigu liga pasireiškė dažniau nei 4 kartus per paskutinius 12 mėnesius vaisto galima vartoti tik gydytoji nurodžius ir jam prižiūrint. **Reklamos teksto parengimo data 2024-01-15**

Intymiai higienai



-30%

**LACTACYD**

PHARMA, intymios higienos prausiklis su prebiotikais, 250 ml 14<sup>95</sup> 10<sup>47</sup> €  
 CLASSIC, intymios higienos prausimosi losjonas kasdieniam naudojimui, 200 ml 14<sup>95</sup> 7<sup>76</sup> €

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

LACTACYD® intymios higienos prausikliai yra specialiu produktų, praturtintų natūraliais aktyviais ingredientais, grupė, skirta kasdieninei intymiai higienai. Sudėtyje esanti natūrali L-pieno rūgštis bei tinkamas pH – švelniam intymios zonos natūralios pusiausvyros atstatymui ir apsaugai. Iš plataus LACTACYD® asortimento paprasčia išsirinkti sau tinkamiausią priemonę: prausiklis su PREBIOTIKAIS stiprina natūralią mikroflorą; prausimosi losjonas – skirtas normaliai odai, sukurtas harmoningai dirbti su Jūsų kūnu.



1+1

Dvi tokios pačios pakuočių už VIENOS KAINĄ!

**AMEDIPLUS**

Lūpas apsaugantis balzamas su pantenoliu, 4,5 g 5<sup>99</sup> €

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Makšties drėgmei ir mikroflorai atstatyti

-20%



**FEMINELLA® PLUS** 10 ovulių 47<sup>25</sup> 14<sup>20</sup> €

**BIOHYL® LACTO** 7 ovulės 45<sup>25</sup> 12<sup>20</sup> €

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Feminella“ Plus® makšties ovulės yra naudojamos kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė esant nespecifiniam makšties sausumui bei atrofianiam makšties uždegimui. Jos gali būti naudojamos ir kaip papildoma priemonė esant makšties dirginimui, deginimui ir niežėjimui, kuriuos sukelia tiek makšties uždegiminės ligos, tiek infekcijos. Priemonė skirta vaisingo amžiaus moterims, taip pat moterims perimenopauzės ir menopauzės laikotarpiu. „Biohyl“ lacto® ovulės yra vartojamos siekiant: atkurti normalią makšties mikroflorą; slopinti uždegimų procesus makštyje; apsaugoti makšties gleivinę ir skatinti jos regeneraciją.



-30%

**ISEREN CR, 30 tablečių 45<sup>95</sup> 11<sup>19</sup> €**

MAISTO PAPILDAS

Maisto papildas su gauruotosios sojos ekstraktu, kuriame gausu natūralių izoflavonų. **Vartojimas:** po vieną tabletę per dieną.

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati — NEMOKAMAI!



### ROYAL DENTA

#### BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Royal Denta“ burnos priežiūros priemonės sukurtos remiantis mokslu ir odontologijos srities atradimais. Auksu ir sidabru praturtintų dantų pastų savybės ir jų poveikis patvirtintas nepriklausomoje sertifikuotoje laboratorijoje. Taip pat įrodyta, kad dantų šepetėliuose esantis auksas ir sidabras sunaikina iki 99,9% ant šerielių besikaupiančių bakterijų, todėl šepetėlį galima naudoti ilgiau. Be to, dviųjų ilgių šereliai pasiekia sunkiai prieinamas tarpdančių vietas, todėl dantys yra išvalomi geriau. Kartą išbandę, klientai ir vėl pasirenka „Royal Denta“. Rekomenduoją odontologai.

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

IKI -40 %



### VELYM

#### BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Velym pH neutro“ – klinikiniais tyrimais patikrintas balinamasis dantų kremas. Kasdienė apsauga. Sudėtyje – natūralios kilmės medžiagos ir 1450 ppm fluoro. Skirtas suaugusiems.  
„Velym Mineral 03“ sudėtyje – ozono prisotintas alyvuogių aliejus. Daugiau dėmesio dantenoms. Aukštas apnašų valymo koeficientas (angl. Pellicle Cleaning Ratio, PCR).

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

IKI -40 %



### ODÒNTE

burnos skalavimo skystis jautriems dantims, 500 ml ~~8,99 €~~ 6,29 € -30 %  
tarpdančių siūlas su laikikliu, 50 vnt. ~~3,99 €~~ 2,93 € -40 %

#### BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati — NEMOKAMAI!



### JORDAN

FLOSSER 3 - IN - 1, dantų siūlas, 36 vnt. ~~3,79 €~~  
GUM PROTECTOR, dantų šepetėlis, 1 vnt. ~~4,95 €~~  
dantų pasta vaikams, 6-12 metų, 50 ml ~~3,39 €~~  
dantų pasta vaikams, 0-5 metų, 50 ml ~~3,39 €~~

#### BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Platus dantų priežiūros priemonių asortimentas visai šeimai – nuo pirmo dantuko! Rinkitės dantų šepetėlius, pastas bei tarpdančių valymo priemones pagal savo individualius poreikius.

„JORDAN“ RŪPINASI ŠYPSENOMIS NUO 1927-ŪJU!

### DANTŲ PROTEZŲ KLIIJAI

-30% 10,12€



### BLEND-A-DENT

COMPLETE STRONG HOLD, fiksuojamasis dantų protezų kremas, be skonio, 47 g, 2 vnt.  
COMPLETE STRONG HOLD FRESH FLAVOR, fiksuojamasis dantų protezų kremas, 47 g, 2 vnt.

#### BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Fiksuojamasis dantų protezų kremas „Blend-a-dent“ – puikus pasirinkimas, jei nenorite galvoti apie savo protezus. Nesvarbu, ką darote ar valgo, galite pasitikėti savimi, nes dantų protezai savo vietoje laikosi tvirtai ir patogiai. „Blend-a-dent“ suteikia stiprią fiksaciją visą dieną, užtikrina komfortą, sukurdamas pagalvėlę tarp dantelių bei dantų protezų, ir apsaugo nuo maisto dalelių patekimo po protezus. Galite atsispauduoti ir mėgautis gyvenimu nesivarždami.

IKI -30 %



### ABENA

#### HIGIENOS PRIEMONĖS

Danijos gamintojo ABENA produktai, skirti šlapimo nelaikymui, yra aukščiausios kokybės, atitinkantys skandinaviskus standartus. Produktai itin gerai sugeria ir sugalio skystus bei „užrakina“ nemalonius kvapus su „Odour system“ sistema. Diskretiški, švelnūs ir orni pralaidūs, todėl tinka net ir jautriausiai odai bei užtikrina komfortą. Pagaminti nenaudojant jokio balinimo ir latekso, pažymėti NORDIC ECO LABEL ženklu, garantuojančiu tvarumą ir ekologiją.

#### AKTYVIOMIS DIENOMIS IR PATOGIOMS NAKTIMS

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

Pasiūlymai galioja 2026 07 01 – 2026 07 31.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Nuolaidos taikomos prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą, kurio galite teirautis kiekvienoje vaistinėje, el. paštu [evaistine@nvaistine.lt](mailto:evaistine@nvaistine.lt) arba nemokamu tel. +370 800 10008. Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį/informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [NepageidaujamaR@vvkt.lt](mailto:NepageidaujamaR@vvkt.lt) arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje [www.vvkt.lt](http://www.vvkt.lt).

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Daugiau informacijos NORFOS vaistinėje, el. paštu [evaistine@nvaistine.lt](mailto:evaistine@nvaistine.lt) arba tel. +370 800 10008. Reklaminių tekstų parengimo data – 2026 06 19.





## 1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

**AMBIO**  
BIFIDOBACTERIJOS VAIKAMS, 16 kramtomųjų šokolado skonio tablečių **728 €**  
MAISTO PAPILDAS



## 1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

**DIFOLIN**  
DIFOLIN, 60 tablečių **999 €**  
DIFOLIN+, 30 kapsulių **1929 €**

**MAISTO PAPILDAI**  
„Difolin+“ – moters gerai savijautai: hemoglobiniui, energijai, nervams, imunitetui. Mikrokapsuluota liposomose geležis + folio rūgštis + vitaminai B12, D3, C + varis. „Difolin+“ sudėtyje naudojama mikrokapsuluota liposomose geležis yra efektyviai pasisavinama organizmo, neturi geležies poskonio, nedirgina virškinimo trakto, neturi sąveikos su maistu. Geležis, folio rūgštis, vitaminas B12 – vieni būtiausių kraujo gamybai elementų. Vitaminas B12 padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, geležis – hemoglobino susidarymą, foliatas – kraujodarą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, varis – nervų sistemos veiklą, geležis, varis, vitaminai C, B12 – energijos apykaitą.  
„Difolin“ – planuojančioms pastoti, nėščioms, žindančioms moterims: folio rūgštis + vitaminas D3. Folio rūgštis padeda palaikyti normalią kraujodarą, mažinti nuovargį. Mažas foliatų kiekis nėščiosios kraujo eritrocituose yra besivystančio vaistaus nervinio vamzdelio defektų rizikos veiksnys. Teigiamas poveikis atsiranda per parą papildomai suvartojant 400 µg folio rūgšties ne trumpiau kaip vieną mėnesį iki pastojimo ir iki trijų mėnesių po jo. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, dalyvauja lastelių dalijimosi procese.  
„DIFOLIN“ – MAISTO PAPILDAI MOTERIMS.

## IKI -50%



### PREGNACARE

#### MAISTO PAPILDAI

„Pregnacare“ – maisto papildų linija, sukurta mitybai papildyti planuojant nėštumą, nėštumo bei žindymo laikotarpiais. „Pregnacare Him&Her“ – sukurta pastojimą planuojančiai porai. „Pregnacare“ – vitaminų ir mineralų kompleksas, rekomenduojamas nuo pirmojo nėštumo mėnesio. „Pregnacare Plus“ papildyta omega-3 riebalų rūgštimis (DHR ir EPR). „Pregnacare Breast Feeding“ pritaikyta žindymo laikotarpiui, sudėtis papildyta kalciumi ir omega-3. „Pregnacare New Mum“ sukurta mamų tyčių grožiui ir energijai palaikyti.

#### TVIRTAI KŪDIKIO IR MAMYTĖS DRAUGYSTEI!

\*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

Temperatūrai mažinti ir skausmui malšinti



## NUO 4<sup>50</sup> €

**IBUGARD**  
100 mg/5 ml geriamoji suspensija, 120 ml **450 €**  
200 mg/5 ml geriamoji suspensija, 100 ml **850 €**

#### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** 5 ml IBUGARD 100 mg/5 ml geriamosios suspensijos yra 100 mg ibuprofeno. 5 ml IBUGARD 200 mg/5 ml geriamosios suspensijos yra 200 mg ibuprofeno. **Terapinės indikacijos.** Įvairios kilmės karščiavimas, įvairios kilmės silpno ir vidutinio stiprumo skausmo, tokio, kaip virusinės ar kitokios infekcijos sukulto galvos, gerklės ir raumenų skausmo; sąnarių ir kaulų skausmo; pooperacinio skausmo; danties skausmo, galvos skausmo; ausies skausmo, esant vidurinės ausies uždegimui, mažinimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** nustatant ibuprofeno dozę, reikia atsižvelgti į paciento kūno svorį ir amžių. Paprastai vienkartinė ibuprofeno dozė yra 7–10 mg/kg kūno svorio, maksimali paros dozė yra 20–30 mg/kg kūno svorio. Dozė galima kartoti kas 6–8 valandas, tarp dozių turi būti ne mažesnis nei 4 valandų intervalas. Tik trumpalaikiam vartojimui. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas ibuprofenui, aspirinui ar kitam nesteroidiniam vaistui nuo uždegimo (NNU), arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei sergate ar sirgote skrandžio ir (arba) dvylikapirštės žarnos opa ar kraujavimu iš virškinamojo trakto; sergate sunkiu kepenų, širdies ar inkstų funkcijos sutrikimu. Yra polinkis į kraujavimą. **Specialūs įspėjimai:** specialiai atsaugomo priemonių reikia, jei inkstų, kepenų ar širdies funkcija yra sutrikusi, sutrikęs kraujo krešėjimas arba vartojami antiokagulantai, sergama cukriniu diabetu, raudonoji vilkligė, krono liga, opiniu kolitu, hipertenzija, astma, šienlige, yra nosies poliopų ar lėtinių infekcinių kvėpavimo takų ligų. **Teksto paruošimo data** 2025 02 mėn.

## GAMINAME VAISTUS PAGAL INDIVIDUALIUS RECEPTUS

- Atneškite gydytojo receptą iki 13 val.
- Atsiimkite pagamintą vaistą kitą darbo dieną.

**VAISTINĖ**  
VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS



# LAIMĖS VALANDOS

I-VI

iki 9 val. ir  
14-15 val.\*

VII

14-15 val.\*

Perkant **3\***  
ir daugiau prekių

**-30%**

Perkant **2\***  
prekes

**-25%**

Perkant **1**  
prekę

**-20%**



\*Nuo 2026 m. gegužės 1 d. NORFOS vaistinėje akcijos LAIMĖS VALANDOS metu perkant 1 prekę taikoma 20% nuolaida, perkant 2 prekes – 25% nuolaida, vaistams – 20% nuolaida, o įsigyjant 3 ir daugiau prekių – 30% nuolaida, nereceptiniams vaistams – 25%, receptiniams – 20% nuolaida.

Taikomos momentinės 20% dydžio nuolaidos receptiniams vaistams, 20 ar 25% nuolaidos nereceptiniams vaistams, o kitoms prekėms – 20, 25 arba 30% nuolaidos, atsižvelgiant į atitinkamo pirkimo metu įsigyjamų prekių bendrą kiekį.

Nuolaida taikoma perkant pilnas prekių pakuotes, kurių kiekvienos vertė arba priemoka ne mažesnė nei 1,50 euro. Prekės, perkamos su kompensuojamuoju receptu, įskaičiuojamos į įsigyjamų (perkamų) prekių krepšelį (kiekį), tačiau joms nuolaida netaikoma.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms (pvz., mėnesinio leidinio nuolaidos; prekėms, vaistinėse pažymėtoms geltonais kainoženkliais; akcinėms prekėms, kai nuolaida taikoma įsigyjant ne mažiau kaip 2 nurodytus produktus, ir kt.). Momentinės nuolaidos netaikomos perkant prekes su kompensuojamuoju receptu, mokant už skiepus, taip pat pradinio maitinimo pieno mišiniams, kartiniams (gaminamiems vaistinėje) ir vardiniam vaistams, įsigyjant dovanų kuponus, prekių pakavimo maišelius. Momentinės nuolaidos netaikomos perkant [www.gintarine.lt](http://www.gintarine.lt), net jei už prekes atsiškaitoma jas atsiimant vaistinėse. Nuolaidos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Informacija apie akcijas ir prekes, kurioms taikomos LAIMĖS VALANDŲ nuolaidos, teikiama kiekvienoje vaistinėje, el. paštu [info@vaistine.lt](mailto:info@vaistine.lt) arba nemokamu tel. +370 800 10008. Visos nuolaidos galioja tik su PC NORFA lojalumo kortele.

Rytinės LAIMĖS VALANDOS vyksta nuo vaistinės atidarymo iki 9 val. ryto. Jei vaistinė pradeda dirbti 9 val. ar vėliau, rytinės LAIMĖS VALANDOS joje nevyksta.