

TOP SPALIO PASIŪLYMAI



-60% **4⁷⁹ €**
~~11⁹⁸~~

RAMI ŠIRDIS, 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS



Rami širdis sudėtyje esantis vaistinių valerijonų šaknų ekstraktas padeda atsipalaiduoti ir palaikyti gerą psichologinę būseną. Plunksnapių gudobelų ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies veiklą, paprastųjų sukažolių žolių ekstraktas – normalų širdies ir kraujagyslių sistemos funkcionavimą, valgomųjų česnakų ekstraktas – normalią širdies veiklą. Magnis, folio rūgštis, vitaminai B6 ir B12 padeda mažinti nuovargį ir palaikyti normalią psichologinę funkciją. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną, užgeriant stikline vandens.

RAMIAME KŪNE – RAMI ŠIRDIS!

1+1 Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ! **11⁸⁹ €**

MOLEKIN IMUNO

vitaminas C 1000 mg, vitaminas D 2000 IU,
cinkas 10 mg, 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS



Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidos, vitaminas C padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Tablečių sudaryta iš dviejų dalių, vienoje – vitaminas C, kitoje – vitaminas D ir cinkas, todėl vitaminai geriau įsisavinami. „Molekin Imuno“ maisto papildas yra didelis vitaminų C ir D kiekis. Tinka vegetarams. Sudėtyje nėra laktozės. Sudėtyje nėra gliutimo. Rekomenduojama suvartoti po 1 tabletę per dieną.

NUO 2⁹⁹ €

HJERTEMAGNYL

150 mg, 30 plėvele dengtų tablečių **2⁹⁹ €**
150 mg, 90 plėvele dengtų tablečių **4⁹⁹ €**
75 mg, 100 plėvele dengtų tablečių **3⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI



Veiklioji medžiaga: 1 tablete yra 75 mg arba 150 mg acetasalicilo rūgšties. **Indikacijos:** trombozės profilaktika, sergant išemine širdies liga, po miokardo infarkto, išeminio smegenų insulto ar praeinančio smegenų išemijos (kraujotakos sutrikimo) priepuolio. Vaistas slopina trombocitų (kraujo plokštelių) agregaciją (sukibimą), todėl jo vartojama krešulių, susidariusių iš sukibusių kraujo plokštelių, atsiradimo riziką mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną, užsigeriant stikline vandens; įprastinė dozė ilgalaiam vartojimui yra 75 – 150 mg viena kartą per parą. **Kontraindikacijos:** įsigiję yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, padidėjęs jautrumas kitiems salicilatams; jei neseniai kraujavo į virškinamąjį traktą; yra polinkis į kraujavimą; vaikams ir paaugliams; jaunesniems kaip 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai vartoti, jei pacientas serga bronchių astma, šienlige, nosies polipais ar kita lėtine kvėpavimo takų liga, gydymui atsparia hipertenzija, podagra, esant gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stokai, sutrikusiai kepenų ir (ar) inkstų arba virškinimo trakto funkcijai, likus 10 parų iki chirurginės operacijos, servy amžiams pacientams nepatartina ilgai vartoti dėl galimos kraujavimo ir virškinamojo trakto rizikos, esant vaikų ir paauglių virusinėms infekcijoms. Teksto parengimo data: 2022-04-07. LT-HJERT-2200001

-50% **3⁵⁵ €**
~~7⁰⁹~~

NEUROMED SLEEP,
15 čiulpiamųjų tablečių
MAISTO PAPILDAS



„Neuromed Sleep“ – greita pagalba epizodiškai neužmiegant, dažnai prabudinėjant naktį, trumpiau miegant. Čiulpiamosios „Neuromed Sleep“ tabletės su melatoninu ir augaliniais ekstraktais padės sutrumpinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę, o vaistinės melisos bei pipirinės mėtų padės atsipalaiduoti bei gerai pailsėti.

NEUROMED SLEEP – LAIKAS ĮSIMEIGOTI!

1⁴⁹ €

PARACETAMOL ZENTIVA 500 MG,

20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS



Kiekvienoje tablete yra 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos.** Trumpalaikiai simptominiams lengvo ar vidutinio stiprumo skausmo ir (arba) karščiavimo mažinimas. Paracetamol Zentiva 500 mg tabletės skirtos suaugusiems, paaugliams ir 6 metų bei vyresniems vaikams, sveriantiems daugiau kaip 21 kg. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Reikia vartoti mažiausią veiksmingą dozę kiek galima trumpesnį laiką. Didžiausios paros dozės viršyti negalima. Paracetamol dozuojamas atsižvelgiant į kūno svorį ir amžių, paprastai skiriant vienkartinę 10-15 mg/kg kūno svorio dozę, neviršijant didžiausios paros dozės – 60 mg/kg kūno svorio. Tabletes reikia nuryti užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio, vartoti valgio metu arba nevalgius. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbine medžiagai. Sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas. Ūminis hepatitas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Paracetamol Zentiva nevartokite kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio. Vartojant didesnes nei rekomenduojama vaisto dozes, padidėja sunkaus kepenų pažeidimo pasireiškimo rizika. Vartodami šį vaistą negerkite alkoholinių gėrimų. **Reklamos teksto parengimo data:** 2022 m. gruodžio mėn. ID000562231

1⁹⁹ €

OMEPRAZOLE NORD 20MG,
14 skrandyje neiurių kietųjų kapsulių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS



Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija. Kas yra Omeprazole Nord ir kam jis vartojamas. Omeprazole Nord kapsulių sudėtyje yra veikliosios medžiagos omeprazolio, kurį priklauso vaistų, vadinamųjų protonų siurblio inhibitoriais, grupelė. Šie vaistai mažina rūgšties gamybą skrandyje. Omeprazole Nord vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refliukso simptomų (riems ir rūgšties atpylimo) gydymui. Kas žinotina prieš vartojant Omeprazole Nord. Omeprazole Nord vartoti negalima, jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) omeprazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriaus 14.1 papunktyje). Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Omeprazole Nord. Omeprazole Nord gali maskuoti kitų ligų simptomus, todėl laiku pat pasikonsultuokite su gydytoju, jeigu prieš pradėdami vartoti Omeprazole Nord. Vaikams ir paaugliams. Šis vaistas jaunesniems kaip 18 metų pacientams netinka. Kiti vaistai ir Omeprazole Nord. Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant psichotropinius, arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytoju arba vaistininkui. Tai svarbu dėl to, kad Omeprazole Nord gali keisti kai kurių kitų vaistų veikimą, o kai kurie kiti vaistai gali keisti Omeprazole Nord veikimą. Galimas šalutinis poveikis. Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Teksto parengimo data: 2022-03-12



PERŠALIMO IR GRIPO SIMPTOMAMS LENGVINTI

NUO 4⁹⁹ €

GRIPEX

GRIPEX, 325/30/10 mg, 12 plėvele dengtų tablečių 4⁹⁹ €
 GRIPEX, 325/30/10 mg, 24 plėvele dengtos tabletės 7⁹⁹ €
 GRIPEX, 500/30/15 mg, 10 plėvele dengtų tablečių 5⁹⁹ €
 GRIPEX, 500/30/15 mg, 20 plėvele dengtų tablečių 8⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje „GripeX 500/30/15 mg“ yra 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrinio hidrochlorido, 15 mg deksketorprofano hidrochlorido. 1 tabletėje „GripeX 325/30/10 mg“ yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrinio hidrochlorido, 10 mg deksketorprofano hidrochlorido. Terapinės indikacijos: peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užbūrimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „GripeX 500/30/15 mg“ suaugusiems po 1–2 tabletes 3–4 kartus per parą. „GripeX 325/30/10 mg“ suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams įprasta dozė yra 2 tabletes 3–4 kartus per parą, kas 4–6 val. tada, kada reikia. Neviršyti vienkartinės 2 tablečių dozės. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. Kontraindikacijos: negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šių vaistų sudedamajai medžiagai; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; smarkiai padidėjęs kraujospūdis; lėtinis alkoholizmas. Negalima vartoti kartu su monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI) arba anksčiau negu 2 savaites baigus juos vartoti. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: esant sutrikusiai kepenų funkcijai, sergant alkoholizmu, sutrikus mitybai yra didesnis kepenų toksinio pažeidimo pavojus. Gydančias šiais vaistais, nepartina vartoti alkoholio. Jeigu per 3 dienas jūsų savijauta nepagerėja arba net pablogėja, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2022-10-11. „GRIPEX“. GALI!

PERŠALIMO IR GRIPO SIMPTOMAMS LENGVINTI GRIPEX THERMAL

NUO 5⁹⁹ €

GRIPEX THERMAL

GRIPEX THERMAL, 1000/100/12,2 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 8 paketėliai 6⁹⁹ €
 GRIPEX THERMAL, 1000/100/12,2 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 12 paketėlių 8⁹⁹ €
 GRIPEX THERMAL, 650/50/10 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 8 paketėliai 5⁹⁹ €
 GRIPEX THERMAL, 300/20/5 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 12 paketėlių 6⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: (1 paketėlyje): „GripeX Thermal 300/20/5 mg“: 300 mg paracetamolio, 20 mg askorbo rūgšties, 5 mg fenilefrino hidrochlorido, „GripeX Thermal 650/50/10 mg“: 650 mg paracetamolio, 50 mg askorbo rūgšties, 10 mg fenilefrino hidrochlorido, „GripeX Thermal 1000/100/12,2 mg“: 1000 mg paracetamolio, 100 mg askorbo rūgšties, 12,2 mg fenilefrino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. „GripeX Thermal 300/20/5 mg“: 6–12 m. vaikams: 1 paketėlis kas 4–6 val.; suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams: 1–2 paketėliai kas 4–6 val. „GripeX Thermal 650/50/10 mg“ arba „GripeX Thermal 1000/100/12,2 mg“: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. vaikai: po 1 paketėlį kas 4–6 val. Nepažastų su gydytoju, nevertokite ilgiau nei 7 d. Nevertokite didesnis nei rekomenduojama dozės. Pasakykite gydytoju, jei jūsų inkstų ar kepenų veikla sutrikusi ar nuolat vartojate alkoholi. Kontraindikacijos: alergija veikliosioms arba pagalbinėms medžiagoms, taip pat vaistams, kurių sudėtyje yra simpatomimetinių aminių; širdies ligos, padidėjęs kraujospūdis; gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės arba metilgلوبino reduktazės stoka; sunkus kepenų ar inkstų nepakankamumas; tetrociklozės; šlapimo užsikimšimas arba leuconocitoma; zidovudino, MAO inhibitorių vartojimas; nėštumas ir kūdikio žindymas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju, jei sergate kepenų arba inkstų nepakankamumu, bronchine astma, prostatos hiperplazija, Reimo sindromu (rankų ar kojų pirštų, ausies kraštų ir nosies galuko išblyškimas, dažnai sukeltas šaltio arba emocinio streso), širdies liga, padidėjusiu kraujospūdžiu, cukriniu diabetu. Reklamos teksto parengimo data 2022-11-5. „GRIPEX THERMAL“. GALI.

NUO GERKLĖS SKAUSMO

5⁹⁹ €

INOVOX HONEY LEMON,

2 mg/0,6 mg/1,2 mg, 24 kietosios pastilės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje pastilėje yra 2 mg lidokaino hidrochlorido, 0,6 mg amilmetakrezolio ir 1,2 mg 2,4-dichlorobenzolio alkoholio. Indikacijos: gerklės skausmo mažinimas, vietinis antiseptinis gerklės ir burnos ertmės uždegimo būklių (pvz., paraudimo, patinimo) gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: po 1 kietąją pastilę kas 2–3 valandas ir kai reikia, bet ne daugiau kaip 8 kietąsias pastiles per parą (vaikams – ne daugiau kaip 4 pastiles). Vartoti ant burnos gleivinės. Kietąją pastilę reikia lėtai sučiulpti laikant burnoje, bet ne už skruosčio. Vaisto nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 5 paras. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: jei simptomai neišnyksta ilgiau kaip 2 paras, sunkėja arba atsiranda nauji simptomai, reikia įvertinti paciento klinikinę būklę. Atsargiai vartoti ūmine liga sergantiems, nusilpusiems pacientams. Nevartoti esant ūmii burnos ir gerklės žaizdų, prieš valgant ar atsigeriant. Astma sergantys pacientai turi būti prižiūrimi gydytojo. Sudėtyje yra terpenų, gliukozės, saulėlydžio getonojo. Reklamos teksto parengimo data 2022-06-09.

„INOVOX“. EFEKTAS – JAU PO 1 MINUTĖS!

SKAUSMUI MALŠINTI

2⁹⁹ €

MIALDEX 25 mg, 10 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. Mialdex yra vaistas skausmui malšinti, priklausantis nesteroidinių vaistų nuo uždegimo grupei (NVNU). Mialdex veikioji medžiaga yra deksketopropenas (deksketopropeno trometamolio pavidalu). Mialdex vartojamas lengvo ir vidutinio stiprumo raumenų skausmų, skausmingų mėnesinių, dantų skausmų malšinti. Vartojimas: visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Įprastinė vaisto dozė yra pusė tabletės (12,5 mg) kas 4–6 valandas arba 1 tabletė (25 mg) kas 8 valandas, bet ne daugiau kaip 3 tabletes per parą (75 mg). **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) deksketopropeno trometamoliui arba bet kuriai pagalbinei Mialdex medžiagai. **Ispėjimai:** jeigu sergate arba sirgote inkstų, kepenų ar širdies ligomis, širdies nepakankamumu, jeigu sergate kraujodaros sistemos ligomis; jeigu sergate sisteminė raudonoja vilkligė ar mišriomis jungiamojo audinio ligomis; jeigu sergate arba sirgote virškinimo trakto ligomis pasikonsultuokite su gydytoju. **Galimas šalutinis poveikis:** šis vaistas, kaip ir visi tik, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Reklamos teksto parengimo data: 2022.11.17

NUO SKAUSMO

5⁹⁹ €

PERSEN

PERSEN, 40 dengtų tablečių.

PERSEN FORTE, 20 kietųjų kapsulių.


NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas. PERSEN tabletėje yra 35 mg valerijonų šaknų sausio alkoholinio ekstrakto, 17,5 mg melisų lapų sausio ekstrakto, 17,5 mg pipirmėčių lapų sausio ekstrakto. **PERSEN FORTE** kapsulėje yra 87,5 mg valerijonų šaknų sausio alkoholinio ekstrakto, 17,5 mg melisų lapų sausio ekstrakto, 17,5 mg pipirmėčių lapų sausio ekstrakto. **Indikacijos.** Vartoti laikinus nedidelės nervinės įtampos mažinimui, pasunkėjusio užmigimo lengvinimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** PERSEN: Nervinės įtampos atveju reikia gerti po 3–4 PERSEN tab. 3 kartus per parą. Pasunkėjusio užmigimo atveju reikia gerti 3–4 PERSEN tab. 1 kartą per parą 1 val. prieš miegą. Tabletes reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai nuo valgyimo laiko. **PERSEN FORTE:** Nervinės įtampos mažinimui reikia gerti po 2 PERSEN FORTE kaps. 2 kartus per parą. Pasunkėjusio užmigimo atveju reikia gerti 2 PERSEN FORTE kaps. 1 kartą per parą 1 val. prieš miegą. Kapsules reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai nuo valgyimo laiko. **PERSEN ir PERSEN FORTE** pradedama veikti palaipsniui, kad gydymo veiksmingumas būtų optimalus, vaisto rekomenduojama gerti mažiausiai 14 dienų. Gydymo trukmė neribojama. **PERSEN ir PERSEN FORTE** nėra skirtas jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** PERSEN tablečių sudėtyje yra laktozės ir sacharozės. **PERSEN FORTE** kapsulių sudėtyje yra laktozės. Reklamos teksto parengimo data: 2022 m. gruodžio mėn. ID000557059

PERSEN- NURAMINK SAVO RŪPESČIUS!

PERŠALIMUI

4⁹⁹ €



XYMELIN

XYMELIN, 1 mg/ml, nosies purškalo (tirpalas), 10 ml

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. **Indikacijos:** rinito ar sinusito sukeltos nosies gleivinės paburkimo mažinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vyresniems kaip 10m. vaikams ir suaugusiems: 1 įpurškimas į kiekvieną nosies landą 2–3 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, uždaro kampo glaukoma, sausasis nosies gleivinės uždegimas arba atrofijos rinitas, jei hipofizės ar smegenų operacija atlikta pro nosį arba burną. **Specialūs įspėjimai:** sergant cukriniu diabetu ar esant hipertiroidizmui vartoti atsargiai. Sergant sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis ar ligomis, kurių metu susiaureja kraujagyslės, vartoti tik su gydytojo leidimu. Ilgiau kaip 7 paras šio vaisto vartoti draudžiama. Dažnai ir ilgai vartojant vaistą gali atsinaujinti nosies gleivinės paburkimas, susilpnėti jo slopinimas ir atsirasti nosies užgulimas. Reklamos teksto parengimo data 2020-06-16. C-APROM/LTYXLO/0002

PAJUSK PASAULIO KVAPUS SU XYMELIN!

NUO 11⁹⁹ €



DETRALEX

500 mg, 30 plevėle dengtų tablečių 11⁹⁹ €
500 mg, 60 plevėle dengtų tablečių 19⁹⁹ €
500 mg, 120 plevėle dengtų tablečių 39⁹⁹ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

SUDĖTIS: Vienoje plevėle dengtoje tabletėje yra 500 mg mikronizuotos ir išgrynintos flavonoidų frakcijos (atitinka 450 mg diosmino ir 50 mg flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną). **INDIKACIJOS:** Apatinių galinių venų nepakankamumo simptomų: kojų sunkumo, skausmo bei ankstyvo rytinio neramumo, lengvinimas. Simptomų, susijusių su hemorojaus paūmėjimu, lengvinimas. **DOZAVIMAS IR VARTOJIMO METODAS:** Rekomenduojama dozė yra 2 tabletės per parą – viena vidurdienį, antra – vakare, valgio metu. Paūmėjusio hemorojaus atveju – 6 tabletės per parą pirmas 4 dienas, po to 4 tabletės per parą 3 dienas. **NĖSTUMAS IR ŽINDYMO LAIKOTARPIS:** Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Nėštumas laikantis atsargumo reikėtų vengti vartoti dextralex nėštumo metu. **Žindymo laikotarpis:** kadangi nėra duomenų apie vaisto išsiskyrimą į motinos pieną, žindyti gydymo laikotarpiu nerekomenduojama. **KONTRINDIKACIJOS:** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **ĮSPĖJIMAI:** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš pradėdami vartoti dextralex. Jeigu Jums yra simptomų, susijusių su hemorojaus paūmėjimu, dextralex galima vartoti trumpai. Jei simptomai neišnyksta, kreipkitės į gydytoją. Pagalbinės medžiagos: be natrio. Teksto peržiūros data: 2021-09 REKLAMOS PARENGIMO DATA: 2023-01-17

PAJUSK KOJŲ LENGVUMĄ SU DETRALEX!

NUO 9⁹⁹ €



GINGIUM 120 MG, 30 plevėle dengtų tablečių 9⁹⁹ €

GINGIUM 120 MG, 60 plevėle dengtų tablečių 18⁹⁹ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: vienoje „Gingium“ tabletėje yra 120 mg dviskiaužio ginkmedžio lapų (*Ginkgo biloba L., folium*) ekstrakto. **Indikacijos:** „Gingium“ vartojamas vyresnio amžiaus žmonių lengvo ir vidutinio sunkumo smegenų kraujotakos nepakankamumo simptomams (susilpnėjusi atmintis ir dėmesio koncentracija, bloga nuotaika, spengimas ar ūžimas ausyse, svagulybės ar galvos skausmas), protarpiui šlubavimui (jei yra II laipsnio periferinių arterijų užkimas pagal Fontaine) mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti po 1 tabletę 1–2 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** vaisto vartoti negalima jeigu yra padidėjęs jautrumas dviskiaužio ginkmedžio lapų ekstraktui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, esant nėštumui. **Specialūs įspėjimai:** „Gingium“ yra neskiriamas vartoti jaunesniems nei 18 metų žmonėms. Atsargiai vaistą reikia vartoti jei yra nustatytas priepuolinis sutrikimas, patologiskai padidėjęs polinkis į kraujavimą, taikant gydymą antikoaguliantais, jei depresinė būseną ir galvos skausmas nėra susijęs su silpnąsiosios sindromu. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Seimynių g. 3A LT-09312 Vilnius, Lietuva. BS220927261. Teksto patvirtinimo data: 2022-09-23.

ATMINČIAI IR DĖMESIO KONCENTRACIJAI PAGERINTI.

NUO MIGRENINIO GALVOS SKAUSMO

3⁹⁹ €



SUMATRIPTAN ACTAVIS, 2 dengtos tabletės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Vienoje tabletėje yra 50 mg sumatriptano. **Terapinės indikacijos:** Neatidėliotinas migrenos priepuolių, pasireiškiančių su aura ar be jos, gydymas suaugusiems, kuriems mediciniškai patvirtinta migrenos diagnozė ir turintiems traukulių vartojimo patirties. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems rekomenduojama gerti vieną 50 mg sumatriptano dozę. Kai kuriems pacientams gali prireikti 100 mg dozės. Jei pacientui nepasiegia pirmoji sumatriptano dozė, antrosios dozės tam pačiam priepuoliui palengvinti vartoti negalima. Tokiu atveju skausmas gali būti malšinamas paracetamoliu, acetilsalicilo rūgštimi ar nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo. Sumatriptano gerti galima, jei prasideda naujas priepuolis. Pats dozė neturi viršyti 100 mg. Sumatriptan Actavis negalima vartoti dažniau kaip 9 dienas per mėnesį. Pacientams, kuriems migrena malšinti prireikia dažniau, turėtų kreiptis į gydytoją dėl kitokio gydymo (migrenos profilaktikos). Sumatriptano nerekomenduojama vartoti vaikams. Tabletė reikia nuryti užgeriant vandeniu. Ją galima sutraukti ir sumaišyti su skysčiu. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; buvęs miokardo infarktas, arba diagnozuota širdies ligos, Prinzmetal (Prinzmetal) krūtinės angina (vaiknių širdies kraujagyslių spazmas), periferinių kraujagyslių liga, širdies širdies ligos simptomai arba požymiai, buvusi smegenų kraujagyslių liga arba praeinančią smegenų išemijos priepuolių; sunkūs kepenų veiklos sutrikimai; vidutinio sunkumo arba sunki hipertenzija, lengva nekontroliuojama hipertenzija; gydymas ergotaminu ar jo dariniais, įskaitant metilergidą arba bet kurį triptano ar 5-HT₁ receptorių agonistų vaistą; gydymas tiek laiku, tiek nepažeidžiančio poveikio monoamino oksidazės (MAO) inhibitoriais ir 2 savaitės po gydymo nenaudojimo poveikio MAO inhibitoriais nutraukimo. **Spec.įspėjimai:** Sumatriptano galima gydyti tik nusistudius, jį pacientas serga migrena. Jei migrena baziline, hemiplegine ar oftalmoplegine, sumatriptanas netinka. Išgerus sumatriptano, galimi laikini simptomai, ypač krūtinės skausmas ir spaudimas, kurie gali būti stiprūs ir plisti į gerklę. Įtarus, kad šie simptomai rodo širdies ligą, sumatriptano vartojimą reikia nutraukti ir tinkamu būdu padėti širdį. Atsargumo priemonės reikalingos pacientams, kurie serga vidutinio laipsnio kontroliuojama hipertenzija, moterims postmenopauzinio periodo ar vyresniems negu 40 metų vyrams, kuriems širdies ligų rizikos veiksniai, pacientams, kuriems anksčiau yra buvę traukulių arba esant kitoms rizikos veiksniais, kurie mažina smegenų kraujotakos aktyvumą slenkstį, pacientams vartojantiems SSR₁ ligų nuo galvos skausmo vartojant bet kokią skausmo malšinamąją preparatą, galvos skausmas gali sustiprėti. Pacientams, kuriems yra retas paveldimas sutrikimas, pvz., galaktazės netoleravimas, Lapp laktazės trūkumas ar gliukozės ir galaktazės malabsorbcija, šio medikamento vartoti negalima. Teksto peržiūros data: 2022-02-14

GYDO MIGRENINĮ GALVOS SKAUSMĄ

NUO GERKLĖS SKAUSMO IR UŽDEGIMO

NUO 5⁹⁹ €



DECATYLEN™

DECATYLEN™, 0,25 mg/0,03 mg, 20 kietųjų pastilių 5⁹⁹ €
DECATYLEN™, 0,25 mg/0,03 mg, 40 kietųjų pastilių 9⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: vienoje pastilėje yra 0,25 mg dekalvino chlorido, 0,03 mg cinchokaino hidrochlorido. **Indikacijos:** burnos ir ryklės uždegimo (gingivito, opinio ir aftinio stomatito, faringito) vietinis gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams kas 2 val. lėtai susiūpti po 1 pastilę, vaikams nuo 4 iki 12 metų kas 3 val. lėtai susiūpti po 1 pastilę. Kai uždegimo simptomų sumažėja, vartoti po 1 pastilę kas 4 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai ar ketvirtiniams amonio dariniams (pvz., benzalkonio chloridui). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Decatylen sudėtyje yra sorbitolio. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurius laisvinantį poveikį. **Reklamos teksto parengimo data** 2023-02-17. DCLT-LT-00012

KAI REIKIA NE TIK MALŠINTI SIMPTOMUS, BET IR GYDYTI GERKLĖS SKAUSMĄ.

4⁹⁹ €**TAVEGIL 1 mg, 20 tablečių.****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veiklioji medžiaga, stiprumas: Vienoje tabletėje yra 134 mg klemastino fumarato, kuris atitinka 1 mg klemastino. **Indikacijos:** tinka šieno stogos ar kitokios alerginės rinopatijos, įvairių priežasčių sukelto dilgėlinės, įskaitant dermatografinę dilgėlinę, niežulio, niežėjimo sukeliančios dermatozės, vabzdžių įgėlimo ir įkandimo gydymui. **Vartojimas:** Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams du kartus per parą iš ryto ir vakare gerti po 1 tabletę (1 mg). 6–12 metų vaikams reikia gerti prieš pusryčius ir vakare, prieš miegą, po pusę (0,5 mg) arba vieną (1 mg) Tavegil tabletę. 3–6 metų vaikams reikia gerti prieš pusryčius ir vakare, prieš miegą, po pusę (0,5 mg) Tavegil tabletes. Tabletes reikėtų gerti prieš valgį užsigeriant vandeniu. Vartoti tik per burną. **Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai:** padidėjęs jautrumas klemastinui, kitokiems antihistamininiams vaistiniams preparatams ar bet kuriai kitai pagalbine medžiagai, porfirija, pacientas jaunesnis negu 3 metų vaikas. atšargai vartoti turi pacientai, sergantys uždarą kampo glaukoma; stenozė sukeliančia peptine opa; dvilykapištes žarnos obstrukcija; prostatos hipertrofija, dėl kurios susiaukio šlapimas, bei šlapimo pūslės kaklelio obstrukcija. Tavegil tablečių sudėtyje yra laktozės. Tavegil negalima vartoti pacientams, kuriems nustatyta – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Vaistinių preparatų reikia atšargai skirti epilepsijai sergantiems pacientams. Pakuotės lapelio perčiūrus arba pakūtės lapelio perčiūrus. Reklamos teksto parengimo data 2021-03-18. Z005_SB_Tavegil_V01_LT

NUO 6⁹⁹ €**VOLTAREN EMULGEL**Voltaren Emulgel 23,2 mg/g gelis, 50g 6⁹⁹ €Voltaren Emulgel 23,2 mg/g gelis, 150g 18⁹⁹ €**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Diklofenako dietilaminas. **Indikacijos:** Suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: skausmo ir uždegimo mažinimas, kai yra minkštųjų audinių sužalojimas (sausgyslių, raiščių, raumenų ir sąnarių trauma, pavyzdžiui, patempimas, sumušimas); vietinis minkštųjų audinių uždegimas (nugaros skausmas, tendinitas, bursitas). Tik suaugusiems (18 m. ir vyresniems): sąnarių (pvz., kelių) degeneracinės ligos sukeliamas skausmas mašinti. **Vartojimas.** Vartoti ant odos. Tepti 2 k. per parą (geriausia ryte ir vakare). Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje. **Kontraindikacijos.** Alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbine medžiagai, kitiems vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo; paskutinis nėštumo trimestras; jaunesniems kaip 14 m. paaugliams. **Specialūs įspėjimai.** Netepti ant pažeistos odos, atvirus žaizdas, odos išbėrimo ar egzemos vietas, didelių odos plotų, saugoti, kad nepatektų į akis ir ant gleivinės, pvz., burnos, nenuryti. Jeigu pasireiškia bėrimas, gydymą nutraukti; nenaudoti su oro nepreleidžiančiais tvaršiais. Sudėtyje yra propilenglikolio ir butilhidroksitolueno. Teksto parengimo data 02/2023. Prekių ženklai priklauso GSK arba GSK turi jiems licenciją. ©2023 GSK arba licencijos turėtoja. NP-LT-VOLT-23-00001

ODOS IR LŪPŲ PŪSELINEI GYDYTI4⁹⁹ €**ACIC 5 % kremas, 2 g****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veiklioji medžiaga, stiprumas: viename grame „Acic“ 5 % kremo yra 50 mg acikloviro. **Indikacijos:** vaistas skirtas odos ir lūpų pūselei, kurią sukelia Herpes simplex virusas, gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** pažeistą odą vieta tepti plonu sluoksniu 5 kartus per parą kas 4 val. **Kontraindikacijos:** „Acic“ naudoti negalima esant padidėjusiam jautrumui aciklovirovi, valaciklovirovi, propilenglikoliui arba bet kurioms pagalbinėms „Acic“ medžiagoms. Kremo negalima tepti ant gleivinės (burnos, akių, makšties). **Specialūs įspėjimai:** vaisto draudžiama nuryti. Specialių atsargumo priemonių reikia susilpnėjus imunitetui. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Šeimyniškių g. 3A LT-09312 Vilnius, Lietuva. BS221097971. Teksto patvirtinimo data: 2022 12 09.

UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSELINĘ SU „ACIC“!**SAUSOMS AKIMS**

-30%

**ARTELAC®****MEDICINOS PRIEMONĖS**

„Artelac“ Nature“ akimirksniu suteiks akies skausmą, baltumą ir švėtimą, bei užtikrins ilgalaikį drėkinimą. Sudėtyje esantis akiečių ekstraktas numalšina akių sudirginimą ir greitai pašalina akių paraudimą, o hialuronas užtikrina ilgalaikį drėkinimą. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius. „Artelac“ Splash“ pasirenkiamasis mūsų produktas su hialuronu skirtas sausoms akims nedelsiant nuraminti ir sudrėkinti. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius. „Artelac“ Rebalance“ užtikrina maksimaliai drėkinantį poveikį ir palengvėjimą, esant nuolat paskartojančiam akių sausumui. Drėkina akis ir apsaugo jų paviršių, papildoma asarų plovėlių pusele-jančios jona, vitaminu B12, bei sureguliuoja osmosinį akies paviršiaus balansą ir tokiu būdu padeda ilgam sustabdyti sausų akių simptomų pasireišimą. „Artelac“ Triple Action“ pažangiausias tirpalas, sukuriant taip, kad išliktų ant akies paviršiaus ir intensyviai drėkindamas akimirksniu ir ilgam numalšintų sausų akių simptomus. Sudėtyje esantys komponentai (hialuronas, glicerolis, karbomeras, lipidinis komponentas) aktyviai visus tris asarų plovėlių sluoksnius. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius. „Artelac“ Nighttime Gel“ aktyviai asarų plovėlių nakties metu. Produktas suteikia papildomą apsaugą tiems, kam pasireiškia dienos ir naktinis akių sausumas. 2023 04 28

*„ARTELAC“ – PAŽANGŲ SPRENDIMAI SAUSOMS AKIMS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

NUO 9⁹⁹ €**NIZORAL**NIZORAL 20 mg/g šampūnas, 60 ml 9⁹⁹ €NIZORAL 20 mg/g šampūnas, 100 ml 14⁹⁹ €**Ketokonazolas****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veiklioji medžiaga, stiprumas: ketokonazolas, 20 mg/g. **Indikacijos:** vartojamas infekcinės odos ligoms, kurias sukelia grybeliai, gydyti: seborėjinė galvos odos pleiskanojimo (Pityriasis capitis); seborėjinė dermatit (sausai rudos dėmės, padengtos geltonomis arba baltomis pleiskanomis); įvairios spalvės odos pleiskanojimo (Pityriasis versicolor) (ant liemens esančios mažos rudos ar baltos spalvos, nelygios kraštai dėmės); tinka Pityriasis capitis ir seborėjinio dermatito profilaktikai. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** skirtas vartoti paaugliams ir suaugusiems. Pažeistą odą reikia švelniai Nizoral šampūnu ir palaikyti 3-5 min., kad įsigerėtų. Po to oda ir plaukus reikia gerai nuplauti vandeniu. Odos drėkinimo šampūno dozės priklauso nuo grybelių rūšies ir nuo to, ar vaistas vartojamas ilgai gydyti, ar jos profilaktikai. **Kontraindikacijos:** šampūno vartoti negalima: jeigu yra alergija ketokonazolui arba bet kuriai pagalbine šio vaisto medžiagai. **Įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pastebėjus su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Nizoral. Reikia saugoti, kad Nizoral, kaip ir kitokio šampūno, nepatektų į akis. Jeigu taip atsitinka, jas reikia praplauti vandeniu. Reklamos teksto parengimo data: 2022 balandžio mėn. Z004_SB_Nizoral_V01_LT

PERŠALIMO LIGŲ SIMPTOMAMS LENGVINTINUO 6⁹⁹ €**FERVEK**FERVEK vaikams, granulės geriamajam tirpalui pakuotėje, N8 6⁹⁹ €FERVEK suaugusiems, granulės geriamajam tirpalui pakuotėje, N8 6⁹⁹ €FERVEK suaugusiems, be cukraus, granulės geriamajam tirpalui pakuotėje, N8 7⁹⁹ €**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 pakuotėje „Fervek“ suaugusiems ir suaugusiems be cukraus yra 500 mg paracetamolio, 25 mg feniramino maleato, 200 mg askorbo rūgšties; 1 pakuotėje „Fervek“ vaikams yra 200 mg paracetamolio, 10 mg feniramino maleato, 100 mg askorbo rūgšties. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikis ūminis peršalimo ligų simptomams (karščiavimas, nosies gleivinės patinimas, skausmas) palengvinti. „Fervek“ vaikams ir paaugliams nuo 6 iki 15 metų; trumpalaikis ūminis peršalimo ligų simptomams (karščiavimas, nosies gleivinės patinimas, skausmas) palengvinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Fervek“ suaugusiems, granulės geriamajam tirpalui pakuotėje, be cukraus: suaugusiems ir paaugliams nuo 15 metų (svėrimais) skausmą kaip 50 kg gerti po 1 pakuotę 3 kartus per parą, bet ne dažniau kaip 4 kartus per parą. „Fervek“ vaikams: 6–10 m. vaikams gerti po 1 pakuotę 2 kartus per parą; 10–12 m. vaikams – po 1 pakuotę 3 kartus per parą; 12–15 m. paaugliams – po 1 pakuotę 4 kartus per parą, bet ne dažniau kaip kas 4 valandas. Maksimali gydymo trukmė yra 5 dienos vartojant Fervek suaugusiems 3 dienas – Fervek vaikams. Jei imti ar kepti ar kitiems būdais sušildyti vartoti atšargai, rekomenduojama sumažinti dozę ir paliginti minimalių intervalų tarp dozių. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas vaisto sudedamosioms dalims, sunkūs kepenų nepakankamumas, aktyvios kepenų ligos, uždegimo glaukoma, šlapimo susilaikymas, skrandžio priverstinė stenozė, šlapimo takų akmenys, draudžiama vartoti vaikams ir paaugliams iki 15 m., „Fervek“ vaikams: draudžiama vartoti vaikams iki 6 metų, Fervek suaugusiems be cukraus – fenileketonurija. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pastebėjus su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergate Žilberto sindromu, sergate kepenų arba inkstų liga, piktnaudžiaujate alkoholiniais gėrimais, yra anoreksija, kacheksija arba ilgalaikė bloga mityba (glutatioono atsargos kepenyse būna mažos), yra dehidratacija, hipovolemija, sergate epilepsija, sutrikusi geležies apykaita, yra polinkis susidaryti akmenims šlapimo takuose, pacientams, svėrimais mažiau nei 50 kg, trūksta gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės, yra hemolitinė anemija, yra padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgšties, pasireiškiantis bronchų spazmo pavidalu, yra sergate ar pasireiškė ūminis virusinis hepatitas. Atsargiai odos išbėrimo ar kitoms alergijos požymiams, netaikyti gydymą ir nedelsiant kreiptis į gydytoją. Nevartokite kartu jokių kitų vaistų, kurie sudėtyje yra paracetamolio, feniramino ar kitų antihistamininių vaistų, vitaminų C ir patikrinkite ar nevartojate didelesis dozes. Sergantiems cukriniu diabetu atšargai vartoti „Fervek“ suaugusiems, sergantiems fenileketonurija atšargai vartoti „Fervek“ suaugusiems be cukraus. Daugiau informacijos žr. vaistinių preparatų charakteristikų santraukose arba pakūtės lapeliuose. Reklamos teksto parengimo data 2023-06-22. PM-LT-2023-6-3271.

JĖGA, KOVOJANTI SU PERŠALIMU!

6⁹⁹ €



JOX 85/1 mg/ml burnos gleivinės, gėrklių ir ryklės purškalkas (tirpalas), 30 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 85 mg joduoto povidono ir 1 mg alantoino. **Indikacijos:** Papildomas lokalus lengvų burnos ir ryklės infekcinių ligų faringito, stomatito, gingivito gydymas kartu su antibiotikais; burnos ertmės infekcijos profilaktika ligoniams, kuriems atliekamos burnos ar ryklės operacijos. Jox purškalo gali vartoti suaugusieji ir vyresni kaip 8 metų vaikai. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** Suaugusiems ir vyresniems kaip 8 metų vaikams įprastinė dozė – puršksti 2-4 kartus per parą, bet jeigu būtina, galima vartoti ir dažniau (kas 4 valandas). Vaisinio preparato negalima įkvėpti ar nurinti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; inkstų funkcijos sutrikimas; dekomensuotas širdies nepakankamumas; nėštumo ir žindymo laikotarpis; 2 sav. prieš planuojamą tyrimą arba gydymą radioaktyviųjų jodu ir 2 sav. po to, nuolat vartoti ligoniams, kuriems diagnozuotas skydlaukės funkcijos sutrikimas; nuolat vartoti ligoniams, kurie kartu vartoja ličio vaistinių preparatų; jaunesniems kaip 8 metų vaikams (dėl farmacinės formos). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Jeigu Jox atsitiktinai patenka į akis, jas reikia gerai nuplauti vandeniu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, Jox purškalo reikia vartoti atsargiai. Šiems pacientams preparatas gali sukelti kepenų transaminazių kiekio padidėjimą. Ligoniams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, Jox vartoti draudžiama. Vaisinio preparato vartojimą reikia nutraukti. Sergant laringitu, vaisinio preparato galima vartoti tik būtinu atveju. **Teksto patvirtins data:** 2021-03-31 OT-11-00023

JOX – VIENINTELIS TOKS!

NUO 4⁹⁹ €



ALIFLUSIN 500 MG/200 MG/4 MG, 10 šnypščiučių tablečių 4⁹⁹ €

ALIFLUSIN 500 MG/200 MG/4 MG, 20 šnypščiučių tablečių 7⁹⁹ €

paracetamolis / askorbo rūgštis / chlorfenamino maleatas

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Aliflusin sudėtyje yra 3 veikliosios medžiagos: paracetamolis, pasižymintis skausmą malšinančiu ir karščiavimą mažinančiu poveikiu, chlorfenamino maleatas, kuris mažina išsiskyrimą iš nosies, slopina čiaudėjimo refleksą ir akių ašarojimą, bei askorbo rūgštis, papildanti vitamino C trūkumą organizme. Vaistas skirtas trumpalaikiam gripo, peršalimo ir gripą panašios būklės simptomų, tokių kaip galvos skausmas, karščiavimas, ryklės (gerklės) skausmas, ypač lydimas slogos gydymui. Negalima vartoti kartu su kitais vaistais peršalimui ir gripui gydyti. Vartojimas suaugusiems ir vyresniems kaip 15 metų paaugliams. Rekomenduojama vienkartinė dozė yra viena šnypščiučių tabletė (500 mg paracetamolio, 200 mg askorbo rūgšties ir 4 mg chlorfenamino maleato) iki 3 kartų per parą pagal poreikį, tarp dozių išlaikant bent 4 valandų tarpą. Negalima viršyti didžiausios paros dozės 3 šnypščiučių tablečių (1500 mg paracetamolio, 600 mg askorbo rūgšties ir 12 mg chlorfenamino maleato) per 24 valandas. Vartoti per burną. Šnypščiąją tabletę reikia ištrinti stiklinėje šilto vandens. Išgerti iškart po paruošimo.

4⁹⁹ €



DR. THEISS EUCALIPIN, tepalas 50 g

NERECEPTINIS VAISTAS

Indikacijos: Persalimo (pvz., slogos, kosulio, užkimo) simptomų lengvinimas. **Poveikis:** Eukaliptų eterinio aliejaus komponentas yra 1,8-cineolas, pasižymintis bronchų sekreciją skatinančiu ir sekreto pašalinimą stimuliuojančiu poveikiu. Jis žinomas kamparo bronchų sekreciją skatinantis ir sekreto pašalinimą stimuliuojantis poveikis. Pušų spyglių eterinio aliejaus svarbiausia sudėties medžiaga yra alfa-pinenas, pasižymintis bronchų sekreto susidarymą skatinančiu ir antimikrobinu poveikiu. **Sudėtis:** 1 g tepalo yra 75 mg eukaliptų eterinio aliejaus, 75 mg paprastųjų pušų eterinio aliejaus ir 50 mg raceminio kamparo. **Vartojimas:** Vartojant ant odos: tepalą vartojant ant odos jis kelia kurtų per dieną ir prieš miegą tepamas krūtims šiltose ir ant nugaros, po to šilai apvyniojama flaneliniu ar vilnoniu audiniu arba pacientui reikia šilto apdangalo. **Inhaliacijos:** Žinio dydžio tepalo kiekis ištrinamas karštime vandenyje. Garas kvėpuoti 5-10 minučių. Jei simptomai išlieka 3-5 dienas, bet atsiranda dusulys, galvos skausmas, prasideda karščiavimas, atsiranda pilingas ar su krauju skreplių ar išsiskyrimas iš nosies, pacientui rekomenduojama skubiai pasikonsultuoti su gydytoju. **Ypatingai:** Dr. Theiss Eucalipin nerekomenduojama vartoti inhaliacijos jaunesniems nei 6 metų vaikams, o jaunesniems nei 2 metų vaikams jo vartoti draudžiama. Pirmą kartą atidarius buteliuką naudoti 6 mėn.

KOJŲ VENOMS

14⁹⁹ €



PATOGI DOZĖ. TIK VIENA TABLETĖ PER PARĄ

VELIOS 1000 mg plėvele dengtos tabletės, 30 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 1000 mg mikronizuoto diosminio. **Terapinės indikacijos:** suaugusiųjų lėtinio veninės kraujotakos nepakankamumo simptomų gydymui, esant: apatinių galūnių venų varikozė, venų opoms, telangiektazijoms ir retikulinėms varikozėms ar venoms, sunkumui, nuovargui, diskomfortui ar neramumui kojų poilsiu, kojų skausmui ar degimo pojūčiui, šaltų kojų pojūčiui, naktiniam kojų mėšlungiui, apatinių galūnių patinimui, niežuliui, paraudėjimui (odos dilgčiojimui, bėdymui ar niežėjimui), odos eritemai ar cianozėi. Suaugusiųjų palimėjusio hemorojaus simptomų gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** lėtinio veninės kraujotakos nepakankamumo simptominiams gydymui 1 tabletė per parą valgio metu, vartoti bent 4-5 savaites. Palimėjusio hemorojaus simptominiams gydymui, pirmąsias 4 dienas gerti 3 tabletes per parą, 3 vėlesnes dienas – po 2 tabletes per parą, gydymas turi būti trumpalaikis. Vartoti per burną. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija diosminui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** palimėjus hemorojaus simptomams, reikia prisiminti, kad „VELIOS“ veikia tik simptomus ir turi būti vartojamas trumpai. Jei simptomai nesprauna, reikia atlikti tiesiosios žarnos tyrimą ir parinkti tinkamą gydymą. „VELIOS“ nėra veiksmingas gydant su stažiniu širdies nepakankamumu susijusią edemą. „VELIOS“ plėvele dengtų tablečių turi nevartoti pacientai, kuriems yra širdies nepakankamumas. Kai sutrinka kojų veninė kraujotaka, „VELIOS“ gydymą poveikį gali sustiprinti sąsėdės bei ilgalaikio stovėjimo vengimas, tinkamo kūno svorio palaikymas, specialūs kojinių nešiojimas. Kai apatinės kojų dalys patinusios dėl širdies, inkstų arba kepenų ligos, šis vaistas nepadeda. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. „VELIOS“ sudėtyje yra saulėlydžio geltono dažalo (E101), kuris gali sukelti alerginių reakcijų. Reklamos teksto parengimo data: 2023 04 25.

PAJUSK KOJŲ LENGVUMĄ.

-50% 5⁹⁵ € ~~11⁹⁹ €~~



OCUVAL, 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Vis dažniau jaučiate, kad trūksta ryškumo?

OCUVAL – akims naudingų medžiagų kompleksas, kurio sudėtyje net 25 mg. liuteino ir beta karoteno, kuris reikalingas tinkamam regėjimui palaikyti.

Sudėtyje esantis vitaminas A padeda palaikyti ne tik normalų regėjimą, bet ir imuninės sistemos veiklą bei normalią geležies apykaitą. Dėl sudėtyje esančių medžiagų „Ocuval“ gali būti puiki priemonė akių ligų profilaktikai žmonėms, turintiems silpnąjo regėjimo riziką. „OCUVAL“ – MATYK, KAI LABIAUSIAI REIKIA!

3⁹⁹ €



DR. THEISS HUSTICUM, Sirupas 1g/ 50 mg 100 ml

NERECEPTINIS VAISTAS

Indikacijos: Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas burnos ar ryklės dirginimui ir sausam kosuliui lengvinti. **Poveikis:** Gyslotyje esantis gliukozidai aukubinas ir katalpolis slopina uždegimą. Dėl specifinio tiesioginio poveikio gleivinėms labai tinka nuo gerklės dirginimo ir sauso kosulio pašalinti. Gyslotis padeda stiprinti imunitetą ir suaktyvinti organizmą – tinka peršalus kaip pirmas vaistas. Esant sausam kosuliui, ryklės dirginimui - lengvina atsisakojimą, slopina uždegimą. Esant drengam kosuliui - skystina tirštą sekretą, Gyslotyje yra bakterijų dauginimąsi slopinančių junginių - padeda gydyti bronchitą. **Sudėtis:** 1 g (0,8 ml) sirupo yra 50 mg veikliosios medžiagos: gyslotų ekstrakto (ET). **Vartojimas:** 3-6 metų amžiaus vaikams po 2,5 ml 4-6 kartus per dieną vienodais intervalais. 6-12 metų amžiaus vaikams po 5 ml 4-6 kartus per dieną vienodais intervalais. 12-18 metų paaugliams, suaugusiems ir senyviams žmonėms gerti po 15 ml 4-6 kartus per parą vienodais intervalais. Pirmą kartą atidarius buteliuką suvartoti per 3 mėn.



NUO **2⁹⁹ €**



ESPUMISAN

ESPUMISAN, 40 mg, 25 minkštosios kapsulės **2⁹⁹ €**

ESPUMISAN, 40 mg, 50 minkštųjų kapsulių **4⁹⁹ €**

ESPUMISAN L 40mg/ml susp.oral 30ml **4⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Espumisan 40mg minkštosios kapsulės N25; N50 nereceptinis vaistas. Veiklioji medžiaga: vienoje minkštojoje kapsulėje yra 40mg simetikonu. Indikacijos: ligų, kurių metu virškinimo trakte kaupiasi dujos (meteorizmas), būsna pilvo pūtimas, pilnumo pojūtis, simptominiams gydymui; prieš pilvo ertmės organų tyrimus, pvz.: rentgenu, ultragarsu. Kontraindikacijos: Espumisan negalima vartoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai simetikonui arba sudėtyje esančioms pagalbinėms medžiagoms (saulelydžio geltonajam FCF (E110), metilo parahidroksibenzoatui ar kitoms). Specialūs įspėjimai. Dujų sankaupa gali atsirasti dėl rimtesnių virškinimo trakto negalavimų. Jų požymiai gali būti: spaudimo ir pilnumo pojūtis, raugėjimas, žarnų gurguliuojimas, pilvo pūtimas. Jei šie virškinimo veiklos sutrikimai atsiranda ar jie trunka ilgai, reikia pasitarti su gydytoju. Jis nustatys, ar nėra kitokio gydymo reikalaujančių ligų. Dozavimas: kai dėl susikaupusių dujų sutrinka virškinimo trakto veikla; paauklėjimas ir suaugusiems, bei 6-14 metų amžiaus vaikams rekomenduojama skirti vartoti po dvi Espumisan 40 mg minkštasias kapsules 3-4 kartus per parą. Espumisan 40 mg minkštasias kapsules galima vartoti ilgai. Renigiant pacientus tyrimams rekomenduojama skirti po dvi Espumisan 40 mg minkštasias kapsules 3 kartus per parą vieną dieną prieš tyrimus ir dvi Espumisan 40 mg minkštasias kapsules tyrimo dienos ryte. Reklama paruošta 2021 m. lapkričio mėn. LT-Esp-11-2021-VI-pharma JEI PILVE URAGANAS – JUMS PADĖS „ESPUMISANAS“!

NUO **4⁹⁹ €**



TROXEVASIN

2%, 40 g gels **4⁹⁹ €**
2%, 100 g gels **8⁹⁹ €**
300 mg, 50 kapsulių **11⁹⁹ €**
300 mg, 100 kapsulių **19⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Troxevasin 300 mg kietosios kapsulės. Troxevasin 2% gels. Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 300 mg trokserutino. Viename grame gelsio yra 20 mg trokserutino. Indikacijos: lėtinio venų nepakankamumo simptomų (kojų skausmo, sunkumo, patinimo) lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** Troxevasin kapsulės – rekomenduojama pradinė dozė suaugusiems 600 mg (2 kapsulės) parai tolygiais intervalais. Gydoma kojų išimties edema ir kiti simptomai, dažniausiai 2 sav. Palaikomoji dozė – 1 kapsulė (300 mg) per parą 2-4 sav. Maksimali paros dozė yra 1500 mg. Kapsules reikėtų vartoti valgio metu, nes jos gali sukelti dispepsijos simptomus. Troxevasin gels – suaugusiems pacientams iš ryto ir vakare ligos pažeista vieta reikia patepti nedideliu gelsio kiekiu ir švelniai masažuoti tol, kol vaistinis preparatas visiškai įsigers į odą. Gydymo gelsio veiksmingumas daugiausia priklauso nuo vaistinio preparato dozės, vartojimo reguliarumo ir trukmės (patariama vartoti ilgai). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Troxevasin kapsulių reikėtų atsargiai vartoti kepenų nepakankamumu ar tulžies apytakos sutrikimu sergantiems pacientams. Vaistinis preparatas neveiksmingas gydant edemas, atsiradusias dėl kepenų, inkstų ar širdies-kraujagyslių sistemos ligų. Vaikams iki 18 metų trokserutino vartoti nerekomenduojama, kadangi duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra. Kapsulių negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, viskas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Esantis sudėtyje saulelydžio geltonasis FCF (E110) gali sukelti alerginių reakcijų. Troxevasin gelsi galima vartoti tik ant nepažeistos odos, juo negalima tepti atvirų žaizdų bei gleivinės, pvz., akių. Gelsio sudėtyje yra benzalkonio chlorido, kuris gali sudirginti odą. Nesitikima, kad vartojimas nėštumo ir žindymo laikotarpiu gali būti susijęs su žalingu poveikiu motinai, kadangi benzalkonio chlorido absorbcija per odą yra minimali. **Reklaminės medžiagos parengimo data:** 2023 m. liepa. TROX-LT-00024

KAD KOJOS BŪTŲ LENGVOS! MĖGAUKITĖS TYRINĖDAMI PASAULĮ BE LĖTINIO VENŲ NEPAKANKAMUMO SUKELTŲ SIMPTOMŲ!

-15%



VISIONACE, 30 tablečių **23⁹⁹ 20⁹⁹ €**

VISIONACE PLUS, 28 tabletės / 28 kapsulės **32⁹⁹ 28⁰⁴ €**

MAISTO PAPILDAI

VISIONACE – subalansuotas luteino, mėlynių ekstrakto, antioksidantų kompleksas. Sudėtyje esančios medžiagos padeda išsaugoti normalų regėjimą (cinkas, vitaminas A, B₂), o antioksidantai – manganas, selenas palaiko ląstelių apsaugą nuo oksidacinių pažeidimų. VISIONACE tinka daug laiko praleidžiantiems prie kompiuterių ar TV ekranų, dirbantiems akims reiklų darbą, dažnai jautantiems akių nuovargį, vyresnio amžiaus žmonėms, devintiems kontaktinius lęšius. VISIONACE PLUS sudėtis praturtinta omega-3 rūgštimis ir 12 mg luteino.

VISIONACE – REGĖJIMO JEGA!

-20%



BLEND-A-DENT KLIJAI DANTŲ PROTEZAMS

Fiksuoja dantis, klijais pritvirtinti protezus visai dienai, suteikdamas saugumo jausmą. Jis apsaugo gleivinę nuo mechaninių sužalojimų, kuriuos gali sukelti protezai, ir neleidžia maistui patekti po dantų protezais. Kasdien naudodami fiksuojamąjį kremą „Blend-a-dent“, galėsite nevaržomai juoktis, kalbėti ir valgyti.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

-40%



ARTHROSTOP PROENZI

MAISTO PAPILDAI

Arthrostop proenzi maisto papildai sąnariams su gliukozaminu, chondroitinu, kolagenu, bosvelijos ekstraktu. Judėk laisvai! **NAUJENAI!** Arthrostop proenzi collagen shots – unikali dviejų tipų kolageno, vitaminių ir mineralų kombinacija sąnariams. Net 11 000mg hidrolizuoto kolageno viename buteliuke! Z305_SB_Prozenzi_V01_LT

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

-40%

0^{89€} ~~149~~



VALIDOL, 10 čiulpiamųjų tablečių

MAISTO PAPILDAI

Sudėtyje esantis vaistinių valerijonų ekstraktas padeda atsipalaiduoti bei palankiai gerą psichologinę būseną. Vartojimas: Tablete reikia laikyti po liežuviu tol kol ji visiškai ištirps. Vartojama po 1 tabletę 2-4 kartus per dieną. **VALIDOL ACONITUM – JŪSŲ GERAI SAVIJAUTAI!**

Onkologinės ligos - tikras iššūkis.

KARTU MES STIPRESNI



Su POLA kortele nuolaidos:

15% vaistams*

20% kitoms prekėms*



*Nuolaidos netaikomos perkant su kompensuojamuoju receptu, vardinius, kartinius vaistus, pradinio maitinimo mišinius, administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Nuolaidos nesumuojamos ir galioja perkant fizinėse NORFOS vaistinėse.



VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS



VITAMINO D3 ŠALTINIS

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

OLIDETRIM®

OLIDETRIM® 2000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių 10³⁵ €OLIDETRIM® 4000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių 14⁹⁹ €OLIDETRIM® 2000 TV, 60 minkštųjų kapsulių 10⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAI

Imunitetui – vitaminas D 2000 ir 4000 TV.

Širdžiai, smegenims – DHR• EPR omega-3 rūgštys.

Kaulams ir raumenims – vitaminai D ir K2.

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Omega-3 riebiųjų rūgščių DHR (dokozaheksaeno) ir EPR (eikozapentaeno) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą. Siekiant maksimaliai padidinti vitamino D papildų naudą, juos naudinga vartoti kartu su vitaminu K2.

GERIAUSIA GYNYBA – STIPRUS IMUNITETAS.

IMUNITETUI

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

MOLEKIN IMUNO

Molekin Imuno, 20 Šnypščiučių apelsinų skonio tablečių 10⁶⁷ €Molekin Imuno Kids, 20 šnypščiučių tablečių 9⁹⁹ €Molekin Imuno Junior, 20 šnypščiučių tablečių 9⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAI

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo, vitaminas C padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Tablečių sudaryta iš dviejų dalių, vienoje – vitaminas C, kitoje – vitaminas D ir cinkas, todėl vitaminai geriau įsisavinami. „Molekin Imuno“ maisto papildas yra didelis vitaminų C ir D kiekis. Tinka vegetarams. Sudėtyje nėra laktozės. Sudėtyje nėra gliukozės. Rekomenduojama suvartoti po 1 tabletę per dieną.

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!BIOCALCIUM FORTE 600MG, 30 pakelių 10⁷⁹ €BIOKALCIS 1200MG, 15 pakelių 7⁵⁹ €BIOCA+K+MG+ZN SU VITAMINU D3, 28 pakeliai 13⁴⁵ €ATLANT, 28 pakelių 48⁴⁹ €

MAISTO PAPILDAI

Maisto papildai milteliais geriamajam tirpalui ruošti. „bioCALCIUM FORTE 600mg“ ir „bioKALCIS 1200mg“ sudėtyje – grynas kalcio citratas! Išsirinkite reikalingiausią: 600 mg kalcio su vitaminu D3 bei 1200 mg kalcio su fosforu, vitaminu K ir D3. Kalcis reikalingas kaulų ir dantų būklei palaikyti, padeda palaikyti normalią raumenų veiklą, nervų impulso perdavimą, virškinimo fermentų veikimą bei energijos apykaitą. Vitaminas D padeda palaikyti normalų kalcio ir fosforo įsisavinimą. Fosforas ir vitaminai D, K padeda palaikyti normalią kaulų būklę. „bioCA+K+MG+ZN“ su vitaminu D3 – net 4 mineralų kompleksas: kalcis, kalis, magnis ir cinkas su vitaminu D. Magnis mažina pavargimo jausmą, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, raumenų funkciją. Cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, odos, plaukų ir nagų būklę. „ATLANT“ – net 12 200 mg kolageno, 1500 mg gliukozamino, 120 mg kalcio ir 12 mg vitamino C kompleksas. Kolagenas – natūraliai žmogaus organizme sintetinamas baltymas, kuris yra odos bei sąnarių kremzlės ir kaulų sudedamoji dalis. Gliukozaminas yra sąnarių kremzlės struktūrinė dalis. Produktų sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be dažiklių, konservantų ir stabilizatorių. Pagaminta Izraelyje.

STIPRIEMS SĄNARIAMS, KAULAMS, DANTIMS IR IMUNITETUI!

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!MAGNESIUM CITRATE, 50 pakelių 18³⁹ €BIOMAGNESIUM FORTE 500 MG, 20 pakelių 13¹⁵ €BIOMAGNESIUM 300 MG, 30 pakelių 11¹⁹ €BIOMAGNIS 300 MG + BIOKALIS 300 MG, 30 pakelių 13⁷⁶ €

MAISTO PAPILDAI

Maisto papildai milteliais geriamajam tirpalui ruošti. Išsirinkite reikalingiausią: 300, 375 mg ar net 500 mg gryno magnio, magnis su kaliu. Magnis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą bei nuovargį. Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį. Produktų sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, be stabilizatorių. Magnis išgautas iš Negyvosios jūros. Pagaminta Izraelyje. MAGNIO MAISTO PAPILDAI IŠ IZRAELIO!

ŠIRDŽIAI IR KRAUJOSPŪDŽIUI

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!BIOKALIS 400 MG, 30 pakelių 7⁹⁹ €BIOKALIS FORTE 750 MG, 30 pakelių 9⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAI

Maisto papildai milteliais geriamajam tirpalui ruošti. „bioKalis 400 mg“ ir „bioKalis forte“ sudėtyje – grynas kalio citratas! Išsirinkite reikalingiausią: 400 mg ar net 750 mg kalio 1 pakelyje. Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį, svarbus normaliai nervų sistemos ir raumenų veiklai palaikyti. Produktų sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be dažiklių, konservantų ir stabilizatorių. Tinka veganams, vegetarams, nešiojantiems ir žindantiems moterims. Pagaminta Izraelyje.

100 % GRYNAS KALIO CITRATAS!

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!1⁴⁹ €

DINADAX KRAMTOMOSIOS LAZDELĖS

MAISTO PAPILDAI

„DinadaxActive“ – maisto papildas su laktobakterijomis, fruktooligosacharidais, bičių pieneliu, vitaminais B1 ir B6.

„Dinadax Energy“ – maisto papildas su bičių pieneliu, želatina ir B grupės vitaminais.

„Dinadax Sapiens“ – maisto papildas su cholino bitartratu, omega-3, linolo ir oleino rūgštimis, vitaminais, folio rūgštimi, biotinu ir cinku.

KRIMSK PASIGARDŽIUODAMAS!

1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra
tokia pati arba
pigesnė –
NĖMOKAMAI!

HIPOCRAT

HIPOCRAT RELAXIUM, gelis, 10 paketėlių 10²⁹ €HIPOCRAT SILICIUM, gelis, 14 paketėlių 11⁹⁹ €HIPOCRAT SPORTUS, gelis, 14 paketėlių 12⁸⁹ €HIPOCRAT SKINDRINK, gelis, 14 paketėlių 26⁷⁹ €HIPOCRAT GASTROCHLORID gelis, 10 paketėlių 11⁴⁹ €

MAISTO PAPILDAI

NAUJIENA! „Hipocrat“ maisto papildų linija: „Siliciūm“ – silicio kompleksas su biotinu ir selenu. Biotinas padeda palaikyti normalią plaukų ir odos būklę, selenas – plaukų ir nagų būklę bei imuninės sistemos veiklą. „Skindrink“ – kolageno peptidas su hialurono rūgštimi, vitaminu C ir biotinu (net 500 mcg). „Sportus“ – elektrolitai su mineralais (cinku, magniu, kاليu) ir vitaminu C. „Relaxium“ – gudobelų žiedų, pasiflorų ir vaistinių melisų ekstraktai su vitaminu B1. Vitaminas B1 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir psichologinę funkciją. „Gastrochlorid“ – mineralinis silicio kompleksas su chloridais normaliam virškinimui palaikyti. Pagaminta Izraelyje.

BIOAKTYVUS MEDŽIAGOS AKTYVIAI GYVENIMUI!



NORFOS VAISTINĖJE GALITE PASISKIEPYTI NUO



GRIPO

18⁹⁹ €

SKIEPO KAINA
be kortelės

19⁹⁹ €

PNEUMOKOKO

77⁰⁰ €

SKIEPO KAINA
be kortelės

84⁰⁰ €

Galima išankstinė registracija internetu www.nvaistine.lt/skiepai
Telefonu: **8 800 10 008**
Nuolaida taikoma su **PC NORFA** kortele.



PREPARATAMS IMUNITETUI IR PERŠALIMUI

IKI **-40%**



5⁹⁹ €

THERAFLU

Theraflu ND 1000 mg/60 mg/30 mg
milteliai geriamajam tirpalui, 6 pakeliai
Theraflu NT milteliai geriamajam tirpalui, 6 pakeliai

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Indikacijos. Theraflu ND: peršalimo sukeltų simptomų (skausmo, nosies gleivinės užburkimo, erizano kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Theraflu NT: peršalimo sukeltų simptomų (skausmo, nosies gleivinės užburkimo ir sekrecijos, čiaudulio, erizano kosulio, akių ašarojimo ir niežėjimo bei karščiavimo) lengvinimas. **Varojimas.** Suaugusiems žmonėms bei 16 m. ir vyresniems paaugliams: gerti po 1 pak. kas 6 val. pagal poreikį. Negalima vartoti daugiau kaip 4 pak. per 24 val. Gydymo trukmė neturi viršyti 3 parų. 1 pak. turinį išvirti stiklinėje karšto, tačiau ne verdančio vandens (mažiausiai 250 ml). Vartoti per burną. **Kontraindikacijos.** Alergija veikliosios arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, jei vartojate ar per paskutines 2 sav. vartojote vaistų nuo depresijos arba Parkinsono ligos, vadinamų MAOI, vartojate kitų simpatomimetikų, yra uždarų kampo glaukoma, plaučių liga ar astmos priepuolis, jei vartojate oksazolidinono klasės antibiotikų, žindymo laikotarpis. **Theraflu NT:** sunki širdies liga, kepenų ar inkstų veiklos sutrikimas. **Specialūs įspėjimai.** Nevartoti kitų vaistų, kuriuose yra paracetamolio. Nevartoti alkoholio. Pastariti su gydytoju, jei yra inkstų ar kepenų liga, lėtinis alkoholizmas, gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės nepakankamumas, padidėjęs širdies ritmas, aukštas kraujospūdis, padidėjęs skydliaukės aktyvumas, cukrinis diabetas, padidėjusi prostata, psichikos liga, kosulys su dideliu skreplių kiekiu, lėtinis kosulys, aukšta temperatūra, išbėrimas, pastovus galvos skausmas, jei vartojate vaistų nuo depresijos ar psichozų, neketus skysčių ar badaujant. Pasireiškus karščiavimui ir išplitusiai raudonei su smulkiais plinėlėmis, staigiam pilvo skausmui, kraujavimui iš tiesiosios žarnos ar kitoms išeminio kolito simptomams, likus kelioms dienoms iki operacijos, būtina nutraukti vaisto vartojimą ir kreiptis į gydytoją. Gali sukelti priklausomybę. Sudėtyje yra aspartamo ir sacharozės. **Theraflu ND:** Pastariti su gydytoju, jeigu yra širdies liga ar antinksčių auglys, vyresniems nei 60 m. Pasireiškus stipriam galvos skausmui, pykinimui, vėmimui, regėjimo sutrikimams, būtina nutraukti vaisto vartojimą. **Theraflu NT:** Pastariti su gydytoju, jeigu yra kvėpavimo nepakankamumo pavojus, hemolizinė anemija. Daugiau informacijos pateikta šių vaistų pakuotės lapeliuose.

5⁹⁹ €

FARINGODOL, 150 mg, 16 kietųjų pastilių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Kiekvienoje kietjoje pastilėje yra 150 mg cholino salicilato. **Terapinės indikacijos:** lokalus simptominis stomatitas, faringitas, gingivitas ar periodontito gydymas. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams lėtai sudipti po 1 pastilę 4-6 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, salicilatams, kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo. Pacientams, kurių stemplėje yra veninių mazgų. **Specialūs įspėjimai:** Pastariti su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Faringodol. Panašiai kaip ir gydantis kitais salicilatais, jei sergate virškinamojo trakto uždegimais, pepsine opalige ar bronchine astma, prieš pradėdami vartoti Faringodol, pastarite su gydytoju. Faringodol sudėtyje yra medžiagos, iš kurios susidaro fenilalaninas. Gali būti kenksmingas sergantiems fenilketonurija. **Reklamos teksto parengimo data:** 2022-01-09.

-10%



QUIXX

Quixx acute nosies purškalkas, 100ml 10⁹⁹ 9²⁶ € Quixx Extra nosies purškalkas, 30ml 6⁹⁹ 6⁰² €
Quixx Baby nosies lašai, 10ml 6⁹⁹ 5³³ € Quixx nasal spray, 30ml 6⁹⁹ 6¹¹ €
Quixx daily nosies purškalkas, 100ml 10⁹⁹ 9¹⁷ € Quixx Soft nasal spray, 30ml 6⁹⁹ 6⁰² €

MEDICINOS PRIEMONĖS

Quixx efektyviai mažina peršalimo, gripo ar alergijos sukeltą nosies ir sinusų užsikimšimą. Dozavimas. Kūdikams (nuo 6 mėnesių) ir vaikams: 1-2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2-3 kartus per dieną. Suaugusiems: 1-3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2-3 kartus per dieną. **Quixx Soft** su alavijo ekstraktu – tai natūrali, pagalbinė priemonė, drėkinanti jautrius nosies ir ausų nosies peršalimo susilpnėjusių simptomų nosies. Dozavimas. Kūdikams (nuo 6 mėnesių) ir vaikams: 1-3 įpurškimai į kiekvieną šnervę iki 4 kartų per dieną. Vaikams nuo 6 metų ir suaugusiems: esant reikaliui, 1-3 įpurškimai į kiekvieną šnervę kelis kartus per dieną. **Quixx Extra** su eukaliptų aliejumi sumažina nosies ir sinusų užsikimšimą peršalus ir sergant gripu, stimuliuoja nosies ertmės išvalymą, suteikia stiprų gaivumo pojūtį. Dozavimas. Vaikams nuo 6 metų amžiaus: 1-2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2-3 kartus per dieną, suaugusiems ir paaugliams: 1-3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2-3 kartus per dieną. **Quixx Daily** kruopščiai praskalauja nosį ir sumažina bakterijų, virusų, alergenų bei žiedadulkių, kietųjų dalelių, dulkių kiekį. Priemonė gali vartoti vaikui nuo 2 metų amžiaus ir suaugusieji. **Quixx Acute** – natūrali nosies valymo priemonė ir pagalba pasireiškus slogai. Gali vartoti vaikai nuo 6 metų amžiaus ir suaugusieji. **Quixx Baby** – mažųjų nosies priežiūra ir higienos nuo pirmosios gyvenimo dienos. Dozavimas: 1-3 lašai į kiekvieną šnervę nuo 2 iki 6 kartų per dieną ar dažniau, jei reikia. Naupjagiams ir kūdikiams iki 3 mėnesių rekomenduojama vartoti nešildomai, užlašius ant vatės tamponėlio. Sudėtyje yra tik natūralios medžiagos. Specialūs įspėjimai: Quixx medicinos priemonių negalima vartoti jei yra jautrumas bet kuriai priemonės sudėtyje esančiai medžiagai. UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIČ“ įrašinėto m. Jsa, Vilnius LT-01613, tel. +370 2 569 19 47, LT@berlin-chemie.com LT. Qit. 01. 2023. VI Reklama paruošta 2023m. sausio mėn.

QUIXX- VANDENYNO GALIA PRIEŠ SLOGĄ!

SAUSAM KOSULIUI

3⁹⁹ €

STOPTUSSIN, 4 mg/100 mg tabletės, 20 tablečių

VAISTINIAI PREPARATAI

Stoptussin 4/100 mg tabletės. Vienoje tabletyje yra 4 mg butamirato divandenilio citrato ir 100 mg gvafenezino. **Terapinės indikacijos.** Sauso, dirginančio kosulio slopinimas. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Vyresniems kaip 12 metų paaugliams ir suaugusiems pacientams – nuo 1/2 tabletės iki 1 ir 1/2 tabletės 3 – 4 k/parą (dozė priklauso nuo ligonio kūno svorio). Tarp dozių būtina daryti 4-6 valandų pertrauką. Stoptussin vartoti ilgiau kaip 3 paras, nepasirūšus su gydytoju, draudžiama. Jaunesniems kaip 12 metų vaikams Stoptussin vartoti nerekomenduojama. Vartoti po valgio. Tablečių nuryti, užgeriant pakankamu skysčiu kiekiu. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosios arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sunkioji mastenija; pirmasis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pacientai, kuriems yra produktų ir (arba) pastovus ar lėtinis kosulys, sukeltas raudono, astmos, lėtinio bronchito ar emfizemos, neturėtų būti gydomi butamirato citratu ir gvafenezinu deriniu. Jei simptomai išlieka ar būklė blogėja, gydymas turėtų būti peržiūrimas. **Reklamos medžiagos parengimo data:** 2022 09 12 OT-CT-LD-00042

NUTILDYKITE KOSIŲ!

GERKLEI

1+1

Dvi tokios pačios
pakuočės už
VIENOS KAINĄ!

HERBITASSIN®

HERBITASSIN® Salvia + vit C, 12 pastilių 4⁹⁹ €
HERBITASSIN® Iceland moss + honey, 12 pastilių 4⁹⁹ €
HERBITASSIN® Iceland moss + blackcurrant, 12 pastilių 4⁹⁹ €

MAISTO PAPILAI

[Jauni skonių pastilės gerklė, pagamintos Šveicarijoje. Sudėtyje esančios išlandinės kerpės, vaistinių šaltųjų lapų ekstraktas padeda palaukti gerklės, ryklės ir balso stygų funkcijas, o vitaminai C – normalia imunitetui sustiprinti.

HERBITASSIN® ledinukai su šalavijais ir svilarožėmis, 4 vnt. 3⁹⁹ €

MAISTO PRODUKTAI

Obuolių ir aviečių skonio ledinukai vaikams nuo 3 metų.

HERBITASSIN® Iceland moss HYDRO, 12 pastilių 4⁹⁹ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

Drėkina gleivinę, ramina sausumą, peršėjimo ir gerklės skausmo jausmą, mažina sauso kosulio ir užkimo simptomus. Hialurono rūgštis intensyviai drėkina sausą ir sudirgusią gleivinę.

NOSIES GLEIVINĖS PABURKIMUI MAŽINTI

4⁴⁹ €


RHINO-STAS nosies purškalkas, tirpalas, 10 ml

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 ml nosies purškalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. **Indikacijos.** „Rhino-stas“ yra simpatikomimetikas. Purškalkas siauria kraujagysles, todėl mažina nosies gleivinės paburkimą. Vartojamas trumpalaikiam nosies gleivinės paburkimui mažinti, sergant sloga arba prienosinių ančių uždegimu (sinusitu). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 10 m. vaikams bei paaugliams reikia purkšti po 1 įpurškimą tirpalo „Rhino-stas“ į kiekvieną šnervę 1-3 kartus per parą tada, kada reikia. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jei yra sausasis nosies gleivinės uždegimas (sausasis rinitas), pacientams, kuriems pro nosį neseniai buvo atlikta smegenų operacija; jaunesniems kaip 10 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** „Rhino-stas“ galima vartoti tik atidžiai įvertinus jo vartojimo riziką ir galimą naudą šiais atvejais: pacientams, kurie vartojo ar vartoja vaistų nuo depresijos (monoaminooksidazės inhibitorių) arba kitų vaistų, kurie gali labai padidinti kraujospūdį; kai padidėjęs akispūdis, ypač sergant uždarą kampo glaukoma; sergant sunkia širdies ir kraujagyslių sistemos liga (pvz., vainikinių širdies arterijų liga, hipertenzija); sergant feochromocitoma (antinksčių naviku); sergant porfirija; sergant medžiagų apykaitos ligomis (pvz., hipertiroze, cukriniu diabetu). Pakuotės lapelio peržiūros data 2018-10-23. Reklamos teksto parengimo data 2020-02-05.

PURŠKALKAS „RHINO-STAS“ – PIRMOJI PAGALBA SERGANT SLOGA AR SINUSITU!

PERŠALUS

8⁹⁹ €

ACTIFED®

ACTIFED® 60 mg/2,5 mg tabletės, 12 tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 tabletyje yra 60 mg pseudoefedrinio hidrochlorido ir 2,5 mg triprolidino hidrochlorido. **Indikacijos:** nosies ir viršutinių kvėpavimo takų gleivinės užburkimo (užgulimo) peršalus mažinimas. Nosies tekėjimo ir čiaudulio slopinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: po 1 tabletę kas 4-6 val. iki 4 kartų per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Pacientai, kurie vartoja ar per pastarąsias 14 dienų vartoję monoaminooksidazės inhibitorius. Širdies ir kraujagyslių ligos, hipertenzija, sunkūs inkstų funkcijos sutrikimai, diabetas, feochromocitoma, hipertirozė, uždarą kampo glaukoma. Draudžiama kartu vartoti kitus simpatomimetikus dekonjestantus ir beta blokatorius. Vaikai iki 12 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „ACTIFED“ gali sukelti mieguistumą. Nevartoti kartu alkoholio. „ACTIFED“ vartojimą reikia nutraukti, jei pasireiškia šie simptomai: haluciacijos, neramumas, miego sutrikimai, karščiavimas ir išplitusi raudona su smulkiais plinėlėmis, staiga netekus regos arba sumažėjus regos aštrumui, staigus pilvo skausmas, kraujavimas iš ęganės ar kiti išeminio kolito simptomai. Pacientai, sergantys kepenų liga, vidutiniu sunkumu inkstų funkcijos sutrikimu, „ACTIFED“ turėtų vartoti atsargiai. Vaistas negali būti vartojamas vaikams raminti. „ACTIFED“ tablečių sudėtyje yra laktozės – jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. **Teksto peržiūros data:** 2021.08.17, LT-MU-200002.

GREITAS PALĖNGVĖJIMAS PERSALUS.

5⁹⁹ €

ILOXEEN 200 mg/30 mg plėvele dengtos tabletės, 12 tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga ir stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletyje yra 200 mg iluprofeno ir 30 mg pseudoefedrinio hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** ILOXEEN vartojamas nosies užgulimo, susijusio su ūminiu rinitu (šaltima virusinės kilmės), simptominiams gydymui, kai yra galvos skausmas ir (arba) karščiavimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tablečių reikia nuryti nepažeidžiant ir neraminti, užgeriant didele stikline vandens, geriausia – valgio metu. Suaugusiems ir 15 metų bei vyresniems paaugliams po 1 tabletę kas 6 val. pagal poreikį. Jeigu simptomai išlieka stipriai, po 2 tabletes kas 6 val. pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 6 tabletes per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios ar pagalbinei šio vaisto medžiagai, pacientams, kurie vartoja ar vaikus iki 15 metų, moterims trečią nėštumo trimestrą, žindymo laikotarpiu, ankstesnė pasireiškus alerginė reakcija arba dusulys, astma, išbėrimas, nosies niežėjimas ir varijamas arba vėdo patinimas, sukelti acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU), virškinimo trakto kraujavimas arba perforacija, ankstesnė pasireiškus vartojant NVNU, esama aktyvi peptinė opa ar kraujavimas arba ankščiau buvo 2 arba daugiau atkintų peptinių opų ar kraujavimo epizodų, dėl nesėkmes priežasties sutrikusi kraujo gamyba, kraujavimas iš smegenų arba kitų kraujagyslių, sunkūs kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas, sunkūs širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai (širdies liga, aukštas kraujospūdis, kritinės angina, padidėjusi širdies sustraikuma), padidėjęs skydliaukės aktyvumas, diabetas, antinksčių navikas, jeigu padidėjęs (jų akispūdis, yra šlapimo susilaikymo dėl šlapės ar prostatos sutrikimų rizika, miokardo infarktas, anksčiau patirtas insultas arba padidėjęs insulto rizika, yra buvę traukulių, sisteminė raudonoji vilkligė. Negalima vartoti kartu su kitais vaistais nuo nosies užgulimo, metilfenidatu, kai kuriais vaistais nuo depresijos. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** ILOXEEN reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU. Pastarite su gydytoju arba vaistininku, jei sergate bronchių astma, cukriniu diabetu, psichozu, yra padidėjęs skydliaukės aktyvumas, yra buvęs koks nors virškinamojo trakto sutrikimas ar sergate ar sergate virškinamojo trakto liga, padidėjęs kraujospūdis, nesveiki inkstai ar kepenys, sunkūs kraujo krešėjimas, sergate infekcine liga, sergate širdies liga, iškaltas širdies nepakankamumas ir kritinės angina (kritinės skausmas), arba jeigu anksčiau su buvo išties širdies priepuolis, atlikta kraujagyslių šuntavimo operacija, sergate periferinių arterijų liga arba su buvo išties bet kokią insultą, jeigu padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje, rūkote. Jei pasireiškia staigus pilvo skausmas, kraujavimas iš tiesiosios žarnos ar kiti išeminio kolito simptomai, reikia nutraukti vaisto vartojimą ir kreiptis medicinos pagalbos. Jei Jūs pasireiškėte odos išbėrimas, gleivinių pažeidimas, pūles ar kitų alergijos požymių, ILOXEEN vartojimą nutraukite ir nedelsdami kreipkitės medicinos pagalbos. Vartojant ILOXEEN gali sumažėti Jūsų regos nervo apraipinimas krauju. Jeigu staiga pradate regėjimą, nutraukite ILOXEEN vartojimą ir susisiekiu su gydytoju arba skubiai kreipkitės medicinos pagalbos. **Reklamos teksto parengimo data:** 2023-04-26

DVGUBAS SMOGIS SINUSITU!



-40%



VITAMIN C PROLONG, 40 kapsulių **11⁴⁵ 6⁸⁷ €**
VITAMIN C PRO FORTE, 30 kramtomųjų tablečių **11⁹⁵ 7¹⁹ €**
RUTIN FORTE + C, 30 kapsulių **10⁴⁵ 6²⁹ €**
VIRONOX JĖGOMS ATSTATYTI+, 14 paketėlių **33⁹⁵ 20³⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

„Vitamin C prolong“ kapsulės ir „Vitamin C PRO forte“ greifrutų skonio kramtomosios tabletės yra prailginto veikimo patentuotas vitaminas Ester-C®. Moksliniai tyrimai rodo, kad patentuota Ester-C forma organizme išlieka iki 24 valandų, nedirginia skrandžio, nėra toksiška kepenims, leidžia pasisavinti iš organizmo. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, taip pat apsaugoti organizmą nuo oksidacinės pažeidimo bei sumažinti pavojingumo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: „Vitamin C prolong“ gerti po 1 kapsulę per dieną, užgeriant stikline vandens, o „Vitamin C PRO forte“ sukrantyti po 1 tabletę per dieną. „Rutin forte+C“ sudėtyje yra rutinosio, vitamino C, cinko ir seleno. Normalių kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių funkcijai, susidarymą padeda palaikyti vitaminas C. Normalia imuninės sistemos veiklą padeda palaikyti vitaminas C, cinkas ir selenas. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną. „Vironox“ epigenetinė linija sukurta Šveicarijos ir Lietuvos mokslininkų. Natūralus energijos šaltinis – „Jėgoms atstatyti“. Kininių ženšenio šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalų organizmo gyvybingumą, vitaminas B6 – normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą bei mažinti nuovargį. Vartojimas: 1 paketėlis per dieną.

GERKLĖS PERŠTĖJIMUI IR UŽKIMIMUI PALENGVINTI

-20%



ISLA

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Isla“ pastilių su islandinėmis kerpėmis sudedamosios dalys padengia gleivines, gerklę ir ryklę kaip balzamas. Tokiu būdu sudirgusi gleivinė apsaugoma nuo tolesnio dirginimo ir greičiau atsigauna dėl malonaus pastilių poveikio, ypač esant užkimimui ir perštinčiai gerklei, pernelyg dideliui balso stygų įtempimui (dainininkai, pranešėjai), sausam orui (šildomose arba vėdinamose patalpose), burnos džiūvimui, apskunkintam kvėpavimui per nosį. Suaugusieji ir vyresni kaip 4 metų vaikai turi lėtai čiulpti 1-2 pastiles keletą kartų per dieną pagal poreikį.

Reklamos teksto parengimo data 2023-08-21 PM-LT-2023-8-3838

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-20%



ECOSH, PAU D'ARCO, 100 kapsulių **21⁹⁵ 17⁵⁹ €**
ECOSH PAU D'ARCO, ekstraktas, 50 ml **22⁹⁵ 18³⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

„Ecosh“ skruzdžių medis, arba Pau d'Arco (lot. Tabebuia impetiginosa, Tabebuia avellanedae) gali padėti apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. Kapsulių sudėtyje – ne tik skruzdžių medžio žievė, bet ir ekstraktas 10:1. Skysto maisto papildas (50ml) sudėtyje – skruzdžių medžio žievės ekstraktas 8:1, glicerolis ir vanduo. Vartojimas (kapsulių): suaugusiems vartoti po 2 kapsules per dieną. Vartojimas (50ml): suaugusiems po 2 ml (56 lašelius) per dieną. Nešiojoms ir kritūm maitinantioms moterims vartoti nerekomenduojama. Jei vartojate vaistus, prieš vartojimą pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. „Ecosh“ – Estijos maisto papildų gamintojas, siekiantis gaminti kuo natūralesnius, kokybiškus ir efektyvius maisto papildus. Naudojamos vegetarinės, augalines kilmės kapsulės, maisto papildai yra be konservantų, dauguma tinkami vegetarams.

„ECOSH“ – VEDAMI GAMTOS

MUNITETUI

-30%

9^{02€}
12⁹⁵

GOIMMUNE STRONG, 20 kapsulių

MAISTO PAPILDAI IMUNITETUI

Unikalus maisto papildas, kurio sudėtyje yra Brazilijos žaliojo propolio miltelių, balamedžio (Pau d'Arco) žievės ekstrakto, alvynmedžio lapų ekstrakto, cinko ir seleno. Cinkas ir selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Balamedis, alvynmedis, cinkas ir selenas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo, taip pat balamedis padeda apsaugoti organizmą nuo šorinių veiksnių. Vartojimo metodas. Suaugusiems gerti po 1-2 kapsules per parą, užgeriant stikline vandens. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos paros dozės. Vegetarams tinkamas produktas.

-30%



SINUSTRONG SPRAY

nosies purškalas, 20 ml **7⁴⁹ 5⁰³ €**

MEDICINOS PRIEMONĖ

Nosies užsikimšimai ir sloga lengvinti, taip pat apsaugoti nuo rinito bei kvėpavimo takų infekcijų. Veiklosios medžiagos: šaltalankių aliejus, medetkų tinktūra, ežiulių tinktūra, eukaliptų aliejus, eglių aliejus, pipirmėčių aliejus.

SINUSTRONG+

30 kapsulių **9⁹⁵ 6⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

Pavasarinės raktabulės ir vaistiniai čiobreliai padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų funkciją. Tikrieji imbieriai ir juodujai šėvamedžiai padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!DECATYL™ NATURAL, 12 pastilių **5⁴⁹ €**

MEDICINOS PRIEMONĖ

Decatyl™ Natural pastilių sudėtyje esantys augaliniai ekstraktai (pipirmėtės, vaistinės svilarožės) gali palengvinti gerklės ir ryklės dirginimą, suteikti ramintinį poveikį gerklei, ryklei ir balso stygoms. Taip pat pastilės yra vitamino C, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. **BE CUKRAUS. TINKA VARTOTI VAIKAMS NUO 4 METŲ**

RAMINANTIS POVEIKIS IŠ GAMTOS!

IMUNITETUI

-25%



ISKIAL

ISKIAL MAX, 120 kapsulių **21⁹⁵ 15⁹⁷ €**

ISKIAL JUNIOR, 30 kramtomųjų kapsulių **22⁹⁵ 17²⁴ €**

MAISTO PAPILDAI

„Iskial“ – ryklių kepenų aliejus iš Islandijos, papildytas didele doze vitamino D3, kuris yra svarbus normaliai imuninės sistemos veiklai. Ryklių kepenų aliejus – tai vienas gausiausių natūralių, vertingų, biologiškai aktyvių medžiagų – alkilglicerolio ir skvaleno – šaltinis. „Iskial Junior“ sudėtyje kartu yra ir žuvų taukų, kuriuose gausu DHR rūgščių, svarbių normaliai smegenų funkcijai ir padedančių išsaugoti normalų regėjimą. Tiks vaikams nuo 3 metų. „Iskial Max“ tiks suaugusiems ir vaikams nuo 6 metų.

„ISKIAL“ – RŪPINASI VISOS ŠĖIMOS IMUNITETUI!

IKI -20%



MOSS LINIJA

Maisto papildai, medicinos priemonės

„ColdMoss“ augalinių ekstraktų mišinys, praturtintas vitaminu C, padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą. „ColdMoss Baby“ tinka vaikams nuo 1 metų. Si-rupas „BronchoMoss“ skirta drėgnam ir sausam, dirginančiam kosuliui palengvinti bei susidariusioms tirštoms gleivėms skystinti. Biologiškai aktyvių veikliųjų medžiagų kompleksas sukuria apsauginį gleivinės sluoksnį, sumažina dirginimą, stabdo infekcijos plitimą, mažina kosulio priepuolius ir lengvina atsikosėjimą. Sirupas „BronchoMoss Baby“ skirtas vaikui nuo 1 m. apatinių kvėpavimo takų funkcijai pagerinti. „BronchoMoss“ tabletės esantys islandinės kerpės gniutalai ir baltųjų pušų žievės padeda palaikyti kvėpavimo takų funkciją, vitaminas C – imuninės sistemos funkciją. „SinuMoss“ minkštosios kapsulės ir „SinuMoss Baby“ geriamieji lašai pagaminti iš natūralių biologiškai aktyvių eterinių aliejų ir augalų ekstraktų, kurie padeda palaikyti viršutinių kvėpavimo takų funkciją. Kapsulės skirtos suaugusiems ir vaikams nuo 6 m., o geriamieji lašai – vaikams nuo 1 m. Mikštros „ImunMoss“ daugiakomponente sudėtis pasižymi kompleksiniu poveikiu – stiprina ne vien tik imunitetą, kartu palaiko kvėpavimo takų ir virškinamojo trakto funkciją. Tinka vaikams nuo 3 m.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



AMBIO

Ambio Vitaminas C, 20 tirpiųjų tablečių **4⁹⁸ €**

Ambio Vitaminas C su citrusinių vaisių bioflavonoidais, 30 tablečių **6⁹⁸ €**
MAISTO PAPILDAS

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė — NEMOKAMAI!!



AMBIO GERKLEI AVIEČIŲ SKONIO, 20 čiulpiamųjų tablečių **5⁴⁹ €**

AMBIO GERKLEI CITRINŲ SKONIO, 20 čiulpiamųjų tablečių **5⁹⁸ €**

AMBIO GERKLEI PIPIRMĖČIŲ SKONIO, 20 čiulpiamųjų tablečių **5⁴⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



AMBIO

Imunitetui su ežiuole, 30 tablečių **9⁹⁸ €**

Imunitetui su propoliu, 60 tablečių **10⁴⁸ €**

Imunitetui su šėnavėdžiu ir ežiuole, 20 tablečių **10⁴⁸ €**

MAISTO PAPILDAS

-40%



AMBIO

Ambio Sinuren complex 120ml **5⁹⁸ 3⁵⁹ €**

Ambio Sinuren complex, 60 tablečių **9⁹⁸ 5⁸⁷ €**

MAISTO PAPILDAS

-40%



AMBIO

Komplexas virškinimui su gerosiomis bakterijomis, 20 kapsulių **6⁹⁸ 4¹⁹ €**

Komplexas žarnynui su gerosiomis bakterijomis, 30 kapsulių **12⁴⁸ 7⁴⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

-40%



AMBIO LAKTO-BIFIDOBAKTERIJOS SU INULINU, 30 kapsulių **9⁴⁸ 5⁶⁹ €**

AMBIO LAKTO-BIFIDOBAKTERIJOS SU S.BOULARDI, 30 kapsulių **14⁴⁸ 8⁶⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

-40%

5^{52€}
9²⁸



AMBIO KEPENIMS SU MARGAINIU FORTE, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

-30%



LEVEREN 30 tablečių **6⁵⁹ 4⁶¹ €**

MAISTO PAPILDAS

Daržinio artiško ekstraktas *padeda palaikyti normalią kepenų funkciją, normalią lipidų apykaitą. **Trūkazoles šaknų ekstraktas** *padeda palaikyti normalią virškinimo sistemos veiklą. **Vitaminas B6** padeda palaikyti normalią baltymų ir gliukogeno, homocisteino apykaitą, normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. **Folio rūgštis** padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

* EFSA-Q-2008-4424, EFSA-Q-2010-00256, EFSA-Q-2008-3918.


ZINC 60 tablečių **3⁸⁹ 2⁷² €**

MAISTO PAPILDAS

Cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią maistinių makromedžiagų apykaitą, normalią riebalų rūgščių ir angliavandenių apykaitą, normalią pažinimo funkciją, normalią kaulų, plaukų, nagų ir odos būklę bei apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per parą, geriausiai po valgio.



-40%

2^{01€} ~~3³⁵~~**DIGESTRONG+ 6 kramtomosios tabletės****MAISTO PAPILDAS**

„Digestrong“ – ananasų skonio kramtomosios tabletės virškinimui, kurio sudėtyje yra patentuotas fermentų kompleksas – Digezyme (5 rūšių virškinimo fermentai). Virškinimo fermentai padeda suskaidyti maistą. Sudėtyje taip pat yra mėlynčiūnės liucernos žolės ekstraktas, ananasų vaisių milteliai ir papajinių melionmedžių vaisių ekstraktas. Vartojimas: sukramtyti po 1 tabletę po valgio. Rekomenduojama vartoti ne daugiau nei 2 tabletes per parą. **JŪSŲ GERAI SAVIJAUTAI!**

-25%

**LINEX®**LINEX® COMPLEX, 14 kapsulių **13⁷⁵ 10³¹ €**LINEX® FORTE, 14 kapsulių **9⁴⁹ 7¹² €**LINEX® BABY lašai, 8 ml **13⁹⁵ 10¹⁹ €**LINEX® KIDS milteliai geriamajai suspensijai, 10 paketėlių **9⁹⁵ 7⁴⁹ €****MAISTO PAPILDAI**

Vienoje LINEX® COMPLEX kapsulėje yra 10 mlrd. geriausiai iki šiol pasiekti moksliniai išbandyti gyvy Lactobacillus rhamnosus GG bakterijų, taip pat – vitaminų B1, B2, B6 ir cinko. Vienoje LINEX® FORTE kapsulėje yra 2 mlrd. gerai žinomų ir moksliniai išbandyti gyvy Lactobacillus acidophilus, DSM 13241 ir Bifidobacterium animalis subsp. lactis, DSM 15954 bakterijų. Vienoje LINEX® KIDS kapsulėje yra 6-juose LINEX® BABY lašuose yra 1 mlrd. Bifidobacterium animalis subsp. lactis, DSM 15954 bakterijų. Vartojimas: LINEX® COMPLEX suaugusiems ir vyresniems nei 6 metų vaikams gerti po 1-2 kapsules per dieną. LINEX® FORTE suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų paaugliams gerti po 1 kapsulę 1-3 kartus per dieną; vaikams nuo 3 iki 12 metų – po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną. LINEX® KIDS kūdikiams ir vaikams iki 12 metų – po 1 paketėlį 1 kartą per dieną. LINEX® BABY naujagimiams, kūdikiams ir vaikams iki 12 metų – po 6 lašus vieną kartą per dieną. „Sandoz Pharmaceuticals d. d.“ filialas, Seimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius, Lietuva. BS2212097787. Teksto patvirtinimo data: 2022.12.09.

KOKYBĖ, KURIA GALIMA PASITIKĖTI!

-20%

**REFLUXAID®**REFLUXAID® NIPIO, sirupas, 150 ml **10⁷⁵ 8⁶³ €**REFLUXAID®, sirupas, 250 ml **10⁷⁵ 8⁶³ €**REFLUXAID®, 12 tablečių **6⁴⁹ 5¹⁹ €****MEDICINOS PRIEMONĖS**

„Refluxaid“ – inovatyvus medicinos prietaisas, skirtas gastroezofaginio refliukso (GERL) bei ezofagito simptomams mažinti. Vartojant šį medicinos prietaisą, susilpnėja tokie simptomai kaip: deginimo pojūtis (rėmuo), atsirogiimas, pasunkėjęs rijimas (disfagija), skausmingas rijimas (odinofagija), kosulys, užkimmimas. **REFLUXAID® Sirupo Vartojimas.** Prieš naudojimą supurtyti. Suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams rekomenduojama vartoti po 10-20 ml sirupo po valgio arba prieš miegą. Jaunesniems nei 12 metų vaikams rekomenduojama vartoti pusę dozės (5 – 10 ml) po valgio arba prieš miegą. **REFLUXAID® tablečių Vartojimas.** Suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams rekomenduojama vartoti 1-2 tabletes po valgio ir / arba prieš miegą. **REFLUXAID® Nipio Vartojimas.** Prieš naudojimą supurtyti. Kūdikiams iki 5 kg svorio: rekomenduojama dozė yra 1 ml sirupo, praėjus 5-10 minutėms po maitinimo. Atsiradus vėmimui, rekomenduojama papildomai suvartoti 1 ml sirupo. Iki 3 metų amžiaus vaikams (6 – 15 kg svoris) rekomenduojama dozė yra 4 ml po valgio ir prieš miegą.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

2⁴⁹ €**PANZYNORM 20 000 V** skrandyje neiros kietosios kapsulės, 10 tablečių**VAISTINIS PREPARATAS**

Vienosios medžiagos: lipazė 20000 V, amilazė 12000 V, proteazė 900 V. Panzynorm vartojamas ilgalaikio kasos nepakankamumo, kurio metu sutrinka jos sekreto išskyrimas į virškinimo traktą, gydymui. Vartoti po 1 tabletę pagrindinių valgių metu užgeriant dideliu kiekiu skysčio. Tablečių reikėtų nuryti nepažeista, jos negalima kramtyti arba smulkinti. Kontraindikacijos: padmėjės pankreatitas, alergija bet kuriai sudedamajai vaisto medžiagai. Vaisto nereikėtų vartoti jaunesniems nei 15 m. vaikams. Kartu vartojami vaistai, blokuojantys H2 receptorius arba slopinantys protonų siurbį, gali padidinti kasos fermentų veikimą. Reklamos teksto parengimo data: 2023.09.06.

PUIKUS SPRENDIMAS GERAM VIRŠKINIMUI!

-20%

**LEPICOL****MAISTO PAPILDAI**

LEPICOL – unikalus, natūralios kilmės medžiagų derinys žarnymui ir virškinimui. Balkšvųjų gysločių luobelės, inulinas ir pieno rūgšties bakterijos – natūraliai žarnyne gyvenančios laktobacilos ir bifidobakterijos. LEPICOL PLUS papildytas augalinės kilmės fermentais iš imbiero šaknų, pipirmėčių lapų ir pankolio sėklų normaliai virškinimo funkcijai palaikyti.

LEPICOL – GERAI JAUSTIS LENGVAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

NUO 5²⁵ €**GUTTALAX**GUTTALAX, 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 15 ml **5²⁵ €**GUTTALAX, 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml **8⁷⁵ €**

(Natrio pikosulfatas)



NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 ml tirpalo (15 lašų) yra 7,5 mg natrio pikosulfato. **Indikacijos:** trumpalaikis vidurių užkietėjimo mažinimas, tuštinimosi lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** Guttalax geriamas vakare. Suaugusiems ir vyresniems nei 10 metų vaikams: 10 – 20 lašų per parą. 4 – 10 metų vaikams: 5 – 10 lašų per parą. Vartoti per burną. Rekomenduojama gydymą pradėti mažiausia doze. Siekiant, kad tuštinimosi būtų reguliarus, dozė galima koreguoti iki rekomenduojamos didžiausios. Didžiausias rekomenduojamas paros dozės viršyti negalima. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs organinio jautrumas veikliąjam arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; žarnų nepažeidimas ar obstrukcija; stiprus pilvo skausmas ir (arba) karščiavimas dėl ūminės pilvo būklės (pvz., apendicito), galimai susijęs su pykinimu, vėmimu; ūminė uždegiminė žarnų liga; sunki dehidracija; jaunesni kaip 4 metų vaikai; retos paveldimos būklės, kurios gali būti nesuderinamos su preparato pagalbine medžiaga. **Išėjimai ir atsargumo priemonės:** Nenustatęs vidurių užkietėjimo priežasties, negalima vartoti nepertraukiamai kasdien ar ilgiau. Guttalax pavartojusiems žmonėms buvo galvos svaigimo ir (arba) sinkopės atvejų. Vaikams be gydytojo nurodymo Guttalax vartoti negalima. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas fruktozės netoleravimas. Teksto parengimo data: 2017 m. spalio mėn. Reklamos teksto parengimo data: 2022 gegužės mėn. 2205_SB_Guttalax_V01_LT

-30%

**AKTYVINTOJI ANGLIS, 20 kapsulių 4⁷⁵ 3³⁵ €****AKTYVINTOJI ANGLIS, 100 tablečių 6⁰⁰ 4²⁰ €****AKTYVINTOJI ANGLIS 260 MG, 10 tablečių 0⁴⁹ 0³⁴ €****MAISTO PAPILDAS****AKTYVINTOJI ANGLIS PADEDA SUMAŽINTI PER DIDELĮ DUJŲ KAUPIMĄSI PAVALGIUS.**

-30%

5^{94€} ~~8⁴⁵~~**AMARIN FORTE, 45 tabletės****MAISTO PAPILDAS**

Rekomenduojamas suaugusiems, kurie linkę patirti nemalonius pykinimo simptomus kelionės metu. Maisto papildas „Amarin Forte“ sudėtyje yra tikraičių imbiero šakniastiebių sausosjo ekstrakto ir vitamino B₆. Vartojimas: po 1 tabletę 30 min. prieš kelionę.

GAMINAME VAISTUS PAGAL INDIVIDUALIUS RECEPTUS

- Atneškite gydytojo receptą iki 13 val.
- Atsiimkite pagamintą vaistą kitą darbo dieną.



VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS




-40%

**AMBIO PATIRIANTIEMS ĮTAMPĄ**mikstūra, 100ml **8⁹⁹ 5⁰⁹ €**20 kapsulių **7⁹⁸ 4⁴⁹ €****MAISTO PAPILDAI**

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!29⁹⁹ €**NEUROZAN, 30 tablečių****MAISTO PAPILDAI**

NEUROZAN – platus ir subalansuotas kompleksas normaliai protinei (pantoteno rūgštis) ir nervų sistemos (jodas, magnis, ir kt.) veiklai palaikyti. Vitaminai B1, B3 ir kt., palaiko normalią psichologinę būklę, o geležis ir cinkas – pažinimo funkciją. Sudėjęs papildytą ginkmedžių ekstraktu ir kofermento Q10.

PAMAITINK SAVO PROTĄ!-30% 35^{34€} 50⁴⁹**NEUROZAN PLUS, 56 tabletės/kapsulės****MAISTO PAPILDAI**

NEUROZAN PLUS – dviguba pakuotė su omega-3 riebiosiomis rūgštimis.

PAMAITINK SAVO PROTĄ!

-40%

**SALDUS MIEGAS, 15 kapsulių 6⁹⁹ 4¹⁹ €****SALDUS MIEGAS ELIKSYRAS, 150 ml 8⁹⁹ 5⁰³ €****MAISTO PAPILDAI**

Linija „Saldus miegas“: dvejoje poveikio, skirta padėti greičiau užmigti ir atsikelti pailsėjus. „Saldus miegas“ padeda mažinti laiką, reikalingą norint užmigti, trukmę bei padeda palaikyti normalią miego kokybę. Sudėtyje esantys šimtmetus naudojami ramunėlių, valerijonų ekstraktai ir mokslo pagrįstos medžiagos – 5-hidroksitriptofanas ir melatoninas – bei B grupės vitaminai padės patiriantiems stresą ir jautantiems nerimą. Tik 1 kapsulė prieš miegą! „Saldus miegas eliksyras“ malonaus karamelės skonio, skystas maisto papildas miegui. Unikalią sudėtyje yra GABA (gamma-amino sviesto rūgštis), 5-hidroksitriptofano (5-HTP) ir 1 mg melatonino, kuris padeda mažinti laiką, reikalingą norint užmigti, trukmę (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti). Vartojimas: suaugusiems ir vaikams vyresniems kaip 12 metų gerti po 15 ml (3 šarbatinius šaukštėlius) 30 min prieš miegą.

GERAM POILSIUI! SALDUS MIEGAS!

-40%

**MEMORIL FORTE, 30 kapsulių 12⁹⁹ 7⁶¹ €****TRIPTAN FORTE, 30 kapsulių 16⁷⁹ 10⁰⁷ €****B COMPLEX, 40 kapsulių 9⁴⁵ 5⁶⁷ €****MAISTO PAPILDAI**

„Memoril forte“ – subalansuotas, 11 sudedamųjų dalių kompleksas atminčiai bei kraujotakai. Tinka tiems, kuriems sunku susikaupti bei nuolat ką nors pamirštantys. Vienoje kapsulėje yra 80 mg ginkmedžių ekstrakto, kuris padeda palaikyti normalią atminties funkciją ir kraujotaką. Taip pat sudėtyje yra magnio, vitaminų B, C, E, seleno ir folio rūgštis, kuri padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną. „Triptan forte“ sudėtyje esantis 5-hidroksitriptofanas (5-HTP) yra natūrali medžiaga, gaunama iš Afrikos augančių augalų – *Griffonia simplicifolia* – sėklų, kuri kartu su vitaminu B6 reikalinga serotonino – geros nuotaikos hormono – gamybai. Serotonino išsiskyrimas suteikia gerą nuotaiką ir energiją. Tai pat sudėtyje esantys vitaminai B1 ir B6 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą. Vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną. „B complex“ – tai įvairių, gerai subalansuotų B grupės vitaminų derinys tiems, kurie jaučia nervinę įtampą bei nuovargį. Mažinti nuovargį, palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą padeda vitaminai B2, B6, B12. Normalią odos, plaukų būklę padeda palaikyti biotinas. Normalią proteinę veiklą padeda palaikyti pantoteno rūgštis. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

LENGVAM NERIMUI MALŠINTI IR MIEGUI PALENGVINTINUO 5⁹⁹ €**LILANDOR 80 MG, 14 minkštųjų kapsulių 5⁹⁹ €****LILANDOR 80 MG, 28 minkštųjų kapsulės 10⁹⁹ €****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Lilander 80 mg minkštiosios kapsulės, Lavandula angustifolia Miller, eterinis aliejus. Lilander yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Specialūs spėjimai ir atsargumo priemonės. Jeigu simptomai pablogėja šio vaisto vartojimo metu, pasitarkite su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, vartoti nerekomenduojama, nes lavandulio aliejaus sudėties medžiagos daugiausiai šalinamos iš organizmo perdirbant jas kepenyse. Kiekvienoje šio vaisto minkštojoje kapsulėje yra apytikriai 12 mg sorbitolio. Dozavimas ir vartojimo metodas. Visada vartokite iš vaistų tiksliai kaip aprašyta pakuotės lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: viena minkštoji kapsulė vieną kartą per parą. Minkštąją kapsulę reikia nuryti nesukramtytą užsigeriant pakankamu skysto kiekiu (geriausia stikline vandens). Jeigu simptomai išlieka po vaisto vartojimo dvi savaites, reikia kreiptis į gydytoją arba kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą. Paruošta 2023 m. sausio mėn. LT_Lil_04_2023_VI_print

LILANDOR - PASINERK Į RAMYBĘ!**NORMALIAI RAUMENŲ FUNKCIJAI IR NERVŲ SISTEMOS VEIKLAI**

IKI -50%

**MAGVIT**MAGVIT PLATINUM, 30 tablečių **15⁹⁹ 8⁰⁰ € -50 %**MAGVIT PLUS, 42 tabletės **15⁹⁹ 8⁰⁰ € -50 %**MAGVIT B COMPLEX, 20 paketėlių **12⁹⁹ 8⁶¹ € -30 %****MAISTO PAPILDAI**

„Magvit Platinum“ – greitas ir ilgalaikis poveikis. Raumenims, nervų sistemai, energijai. Trijų atpalaidavimo fazių technologijos tabletė magnį į organizmą išskiria trimis skirtingomis fazėmis ir leidžia magniui greitai ir ilgai veikti. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vitaminas B12 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. Vitaminas B6 ir magnis padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją. Tik 1 tabletė per parą. „Magvit Plus“ skirtas raumenims, nervų sistemai ir širdžiai. Sudėtyje esantis magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją ir kartu su sudėtyje esančiais vitaminais B2, B6 ir B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vitaminas B1 padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Specialios ilgalaikio veikimo Depo formulės dėka, vitaminai ir magnis išskiriami daugelį valandų, taip užtikrinant pastovų organizmo aprūpinimą. Tik 1 tabletė per parą. „Magvit B Complex“ sudėtyje yra 400 mg magnio ir aštuoni B grupės vitaminai. Tinkamas būdas greitai ir paprastai aprūpinti organizmą magniu ir svarbiais B grupės vitaminais, tinka vartoti fizinio krūvio metu. Magnis, vitaminai B2, B6, niacinas, pantoteno rūgštis, folio rūgštis ir B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Magnis, vitaminai B1, B6, niacinas ir biotinas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją. Suaugusiems ir vaikams nuo 12 m. – gerti po 1 paketėlį per dieną. Granulės suberkite tiesiai ant liežuvio, leiskite joms lėtai ištirpti ir nurykite.

ĮKRAUK KŪNĄ IR PROTĄ!

-30%

**GINKOPRIM®****MAISTO PAPILDAI**

Unikalus dviskiaučio ginkmedžių lapų ekstrakto ir magnio derinys. Dviskiaučiai ginkmedžiai padeda palaikyti normalią kognityvinę funkciją, smegenų veiklą, psichinę būklę ir atmintį.

LT.Gink.80907

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

NUO 2⁹⁹ €**VOLTAREN AKTI**12,5 mg, 10 plėvele dengtų tablečių 2⁹⁹ €25 mg, 10 minkštųjų kapsulių 5⁴⁹ €

Diklofenako kalio druska.

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Indikacijos. Trumpalaikis nesunkus ir vidutinio sunkumo skausmo (pvz., galvos, dantų, mėnesinių, nugaros, sąnarių ir raumenų), peršalimo ir gripo simptomų, įskaitant karščiavimą, malšinimas. **Vartojimas.** Suaugusiesiems ir 14 m. bei vyresniems paauguliams: **12,5 mg tablečių:** pradinė dozė – 2 tab., vėliau vartokite po 1 ar 2 tab. kas 4-6 val., jeigu reikia. Nevartokite daugiau kaip 6 tab. per 24 val. 25 mg kapsulės: pradinė dozė – 1 kapsulė, vėliau vartoti po 1 kapsulę kas 4-6 val., jeigu reikia. Vartoti ne daugiau kaip 3 kapsules per 24 val. Vartoti ne ilgiau kaip 5 paras skausmo malšinimui ir ne ilgiau kaip 3 paras karščiavimo mažinimui. **Kontraindikacijos.** Alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitoms vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo, širdies ligos, galvos smegenų kraujagyslių liga, sutrikus kraujotakai skrandžio ar žarnyno opa, sunkus inkstų ar kepenų nepakankamumas, kraujavimas iš virškinimo trakto arba jo prakurimas, paskutinis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai.** Sautini poveikį galima sumažinti, vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką. Pasitarkite su gydytoju, jeigu kada nors turėjote virškinimo trakto sutrikimų, sergate ar sirgote žarnyno ligomis, yra pasireiškę nemalonus pojūtis skrandyje ar rėmu, neseniai atlikta arba bus atliekama skrandžio arba žarnyno operacija, vartojate kitų vaistų nuo skausmo ar uždegimo, sergate bronchių astma arba šienlige, kepenų ar inkstų ligomis, sergate arba sirgote širdies liga arba yra padidėjęs kraujospūdis, brinks pėdos, esate neteile daug skysčių, yra kraujavimo sutrikimų ar kitų kraujo sutrikimų, rūkote, sergate diabetu, yra padidėjęs cholesterolio ar trigliceridų kiekis. Senyviems pacientams labai svarbu skubiai pranešti gydytojui apie pastebėtus šalutinius poveikius. Tablečių sudėtyje yra laktozės ir natrto, kapsulių sudėtyje yra sorbitolio ir manitolio. Teksto parengimo data 02/2023. Prekių ženklai priklauso GSK arba GSK turi jėms licenciją. ©2023 GSK arba licencijos turėtojas. NP-LI-VOLT-23-00001.

**INTENSYVAUS POVEIKIO ŠILDOMASIS PLEISTRAS**-20% 1^{59€}**PYRALGINA TERMO HOT, 1 vnt.**

MEDICINOS PRIEŠTAS. „PYRALGINA TERMO HOT“ yra intensyvaus poveikio šildomasis pleistras, kuris veiksmingai ir natūraliai apšildo giliuosius raumenis ir dėl to lengvina nugaros, pečių, šlaunų, karkso, sausgyslių bei reumatinę skausmą. „PYRALGINA TERMO HOT“ veikia iki 14 valandų. Ypatingai tinka lėtinį skausmą gydyti. Šiluma suaktyvina kraujotaką, limfos drenazę, apšildo giliuosius raumenis, susilpnėja skausmas, silpnėja uždegimo požymiai. **PAPRASTA IR EFEKTYVU!**

AUSŲ UŽDEGIMUI GYDYTI5⁴⁹ €**OTIPAX® 40 mg/10 mg/1 g ausų lašai (tirpalas), 16 g**

Fenazonas, lidokaino hidrochloridas

NERECEPTINIS VAISTAS

Sudėtis: veikliosios medžiagos yra fenazonas ir lidokaino hidrochloridas. 1 g ausų lašų yra 40 mg fenazono ir 10 mg lidokaino hidrochlorido. **Farmacinė forma:** ausų lašai (tirpalas). **Terapinės indikacijos:** ūminiam neperforuotam (kai ausies būgnelis nėra įtrūkęs) vidurinės ausies uždegimo gydymui; pūlinio virusinio ausies uždegimo gydymui; slėgio pokyčių metu atsiradusios traumos sukeltos ausies uždegimo gydymui. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Paprastai lašinama po 4 lašus 2-3 kartus per dieną į šoninę ausies landą. **Kontraindikacijos:** jeigu yra ausies būgnelio įtrūkimas, atsiradęs dėl traumos ar infekcinių susirgimų; jeigu yra alergija fenazonui, lidokaino hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pastar-kite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti OTIPAX. Prieš vartojant OTIPAX ausų lašus jūsų gydytojas turi patikrinti, ar nėra pažeistos ausies būgnelės. Jei jis yra pažeistas, lašų į ausis vartoti negalima dėl galimo jų patekimo į vidurinę ausį ir galimos sąveikos su vidurinės ausies struktūromis. **Įspėjimas:** šio vaisto negalima nuryti ar įkvėpti. Saugokitės, kad vaisto nepatektų į akis ar ant gleivinių. Informacija sutrumpinta. **Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registratojų atstovą:** Biocodex UAB, Savanorių pr. 345, LT-51480 Kaunas, tel. +370 37 408681, el. paštas info@biocodex.lt. 20220318. 98070570 Reklamos teksto parengimo data: 2022-03-18

ABRAKADABRA, IR AUSŲ SKAUSMO KAIP NEBŪTA!**NUO SKAUSMO**4⁴⁹ €**METAFENEX 200 mg/500 mg,**

10 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg ibuprofeno ir 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos.** „Metafenex“ skirtas trumpalaikiam lengvo ar vidutinio stiprumo skausmui, siejamam su migrena, galvos skausmu, nugaros skausmu, mėnesinių skausmu, dantų skausmu, reumatinio bei raumenų skausmu, nespūrio artritui skausmui, peršalimo ir gripo simptomams, gerklės (ryklės) skausmu bei karščiavimu, malšinti. Šis vaistinis preparatas ypač tinka skausmui, kuriam reikia stipresnės analgezijos nei vartojant vien ibuprofeną ar paracetamolį. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiesiems gerti po 1 tabletę ne dažniau kaip 3 kartus per parą valgio metu užgertį vandeniu. Tarp dozių išlaikyti ne mažiau kaip 6 valandų tarpą. Jei, vartojant po 1 tabletę, simptomai nesitruks, daugiau galima vartoti po 2 tabletes ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių per bet kurį 24 valandų laikotarpį. „Metafenex“ negalima vartoti ilgiau kaip 5 dienas. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų asmenims. **Kontraindikacijos.** Šio vaistinio preparato vartoti negalima pacientams, kuriems yra padidėjęs jautrumas ibuprofenui, paracetamolui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti kartu su kitais vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra paracetamolio ar kitų NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius ir paracetamolį 75 mg acetilsalicilo rūgšties paros doze; jei anksčiau buvo padidėjusio jautrumo reakcijų, susijusių su acetilsalicilo rūgštimi arba kitais nesteroidiniais vaistinėmis preparatais nuo uždegimo; jeigu anksčiau buvo aktyvi arba buvusi pasikartojanti peptinė opa, buvo ar yra virškinimo trakto išopėjimas ir (arba) ar jo prakurimas ar kraujavimas, susijęs su ankstesniu gydymu NVNU. Pacientams, kuriems yra kraujo krešėjimo sutrikimų, kuriems yra sunkus kepenų, inkstų arba širdies nepakankamumas. Negalima vartoti paskutiniuoju nėštumo trimestro metu. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Būtinai įspėjimas: jeigu pacientas serga infekcine liga, pacientas yra senyvo amžiaus, serga ar anksčiau sirgo astma, yra inkstų, širdies, kepenų arba žarnyno sutrikimas, serga sisteminė raudonoji vilkligė, yra virškinimo trakto sutrikimų arba lėtinė uždegiminė žarnyno liga, pacientė nežino pirmuosius 6 nėštumo mėnesius skausmą žindo. Reklamos teksto parengimo data 2022-03.

SKAUSMĄ KEISK Į METAFENEX!**RAUMENIMS IR SĄNARIAMS**

-30%


**AXANOVA**

Priemonių „Axanova“ pagrindas – eteriniai aliejai, kurie veikia raminamai, gali padėti malšinti maudimą ar skausmą. Atsivėlgiant į priemonės sudėtį, turi šildomąjį ar šaldomąjį poveikį, gali būti naudojami esant sumušimams, patempimams, maudžiant sąnarius ar raumenis. Priemonių „Axanova“ veiksmingumas įrodytas moksliniais tyrimais. Pagaminta Šveicarijoje.


*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis.

-30% 4^{54€}**AMEDIPLUS**Šildantis arklų balzamas, 250 ml
Šaldantis arklų balzamas, 250 ml**KOSMETIKA**-25% 0^{59€}**PIPIRINIS PLEISTRAS 10 x 18 cm**

**Žinokite
Testuokitės
Kreipkitės** →



ŠIANDIEN GALIMAS GYDYMAS NUO COVID-19



ŽINOKITE

rizikos veiksnius, dėl kurių galite
susirgti sunkia COVID-19 ligos forma:

- Vyresnis amžius (>65m.)
- Lėtinės ligos (>18m.)¹




TESTUOKITĖS

- Kai pajusite simptomus
- Po kontakto su COVID-19 sergančiu asmeniu



KREIPKITĖS

- Susisiekite su savo šeimos gydytoju
- Šiandien galimas gydymas rizikos grupių pacientams²



Daugiau sužinokite **www.jeicovid.lt**

Dėl informacijos apie COVID-19 gydymą, kreipkitės į sveikatos priežiūros įstaigą.

Šaltiniai: 1. People with certain medical conditions. Centers for Disease Control and Prevention. Updated May 11, 2023. Accessed August 2, 2023. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html>
2. Rekomendacijos ir oficiali informacija apie COVID-19 Lietuvoje. <https://koronastop.lrv.lt/lt/>

NUO 9⁹⁹ €

NICORETTE

Nicorette coolmint 1 mg/išpurškime burnos gleivinės purškalkas (tirpalas),

150 išpurškimų 19⁹⁹ €

Nicorette invisipatch 10 mg/16 h (15 mg/16 h; 25 mg/16 h) transderminis pleistras,

7 transderminiai pleistrai 22⁹⁹ €Nicorette freshfruit 2 mg (4 mg) vaistinė kramtomoji guma, 30 vienetų 9⁹⁹ €Nicorette freshmint 2 mg (4 mg) vaistinė kramtomoji guma, 30 vienetų 9⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI.

Veiklos medžiagos, stiprumas: vienoje gamoje yra 2 mg (4 mg) nikotino (reinato pavidalu), viename pleistre yra 15,75 mg (25,62 mg; 39,37 mg) nikotino; kiekvienam išpurškime (0,07 ml tirpalo) yra 1 mg nikotino. 1 ml tirpalo yra 13,6 mg nikotino. **Indikacijos:** vaistinė kramtomoji guma, transderminiai pleistrai: priklausomybė nuo tabako gydyti, lyginant nutraukimo simptomus, kad būtų lengviau laikinai susilaikyti nuo rūkymo, o apsinuodius – mesti rūkyti; purškalkas: priklausomybės nuo tabako gydymas, sumažinant potraukį nikotinui ir palengvinant nutraukimo simptomus, kurie atsiranda dėl rūkymo staiga ar palaipsniui. Tikslas yra visam laikui nutraukti tabako vartojimą. Nicorette coolmint geriausia vartoti kartu su elgesio pakeičimo programa. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** paprastai pakanka kramtyti 8–12 tam tikro stiprumo vaistinių kramtomųjų gumų per dieną. Pleistrą reikia priklijuoti ant odos ryte, o vakare jį nuimti. Purškalką reikia įsipurkšti 1–2 vaisto dozes tuo laiku, kai paprastai rūkoma, arba jeigu judamas poreikis rūkyti. Galima vartoti iki 4 purškimų per valandą. Negalima purkšti daugiau kaip 2 išpurškimus 6 kartų, per 24 valandas neviršyti 64 purškimų (4 purškimai per valandą, 16 valandų periode). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas nikotinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Gumsos negalima kramtyti vaikams iki 12 metų. Purškalką negalima vartoti jaunesniams kaip 16 metų pacientams, netikantiems pacientams. **Specialūs įspėjimai:** prieš vartojimą nicorette, pasitarkite su gydytoju, jeigu turėjote širdies infarktą, insultą, sergate nestabiliu arba progresuojančiu krūtinės angina, sunkiomis širdies aritmijomis, yra nekontroliuojama hipertenzija. Pacientai, sergantys cukriniu diabetu, pradėję naudoti nikotino pakeičiamąją terapiją, turi atidžiau sekti savo cukraus kiekį kraujyje. Galima rizika ir lėtinio gydymo nauda turi būti apsvaistytą gydytojo, jeigu pacientai serga inkstų ir kepenų nepakankamumu, feochromocitoma ir nekontroliuojama hipertenzija, virškinimo trakto ligomis. Jeigu sergate žvyneline, lėtiniu dermatitu ar dilgeline, neklaukšite nicorette pleistro ant pažeistos odos. Norint išvengti nudegimų rizikos, pleistrą reikia nuimti prieš atliekant magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą. Kramtomoji guma gali prilipsti prie dantų protezo ir jį sugadinti. Kramtomųjų gumų ir purškalko sudėtyje yra butilhidroksitolueno, kuris gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivinę. Kramtomųjų gumų sudėtyje yra kaliochlorido, kuris gali laisvinti vidurius. Reklamos teksto parengimo data: 2021.04.12, LT-N-2000005.

4⁹⁹ €

OPEXA 20 MG, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Vienoje tablete yra 20 mg balastino.

Indikacijos: Opexa vartojamas širdies (kuriai būdingi simptomai yra čiaudulys, niežulys, sloga, užgulta nosis, paraudimas ir asarojantis akys) ir kitų alerginio rinito formų simptomų slopinimui. Jis taip pat gali būti vartojamas: netiesinio odos šbėrimo (pūslelių, arba dilgėlinės) gydymui. **Kontraindikacijos:** Opexa vartoti draudžiama tiems, yra alergija balastinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jei jums nustatytas vidurinio sunkumo arba sunkus inkstų veiklos sutrikimas ir vartojate kitus vaistus. Neduokite šio vaisto jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Neviršykite rekomenduojamos dozės. Jei ligos simptomai išlieka, pasitarkite su gydytoju. Dozavimas ir vartojimo metodas. Rekomenduojama dozė suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų bei vyresniems kaip 12 metų bei vyresniems kaip 12 metų: 1 tabletė (20 mg) per dieną. Tablete vartojama per burną. Tablete reikia nuryti nevalgius, vieną valandą prieš valgį arba sulčių gėrimą arba praėjus dviem valandoms po valgyto arba sulčių gėrimo. Reklama paruošta 2023 m. sausio mėn. LT, Ope, 08_2023_VI „pharma UAB“ Berlin Chemie Menarini Baltic“ J. Jasinskio g. 16A, Vilnius LT-05163

SUSIDURIAUK SU SAVO ALERGIJA!

ESANT VIDURIAVIMUI

3⁹⁹ €

LOPERAMIDUM WZF POLFA

2 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga: loperamido hidrochloridas. **Indikacijos:** simptominiams suaugusių ir vyresnių negu 12 metų paaučių ūminio viduriavimo gydymas tokiu atveju, jei negalima pašalinti viduriavimo sukėlusios priežasties. **Dozavimas:** pradžioje geriamą 2 tabletes (4 mg), vėliau – po 1 tabletę (2 mg) po kiekvieno išsistūtinimo nesufomtuomis išmatomis. Draudžiama per parą gerti daugiau kaip 6 tabletes (12 mg). **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas loperamido hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jaunesni negu 12 metų pacientai; paralyžinis žarnų nepažeidimas; vidurių užkietėjimas; pilvo pūtimas; organizme per mažai skysčių; pseudomembraninis kolitas, kurį dažniausiai sukelia plataus poveikio antibiotikai; ūminė bakterinė dizenterija, bei kitos bakterinės viduriavimas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** loperamido hidrochlorido gydymas pacientams turi vartoti pakankamai vandens bei mineralinių medžiagų. Šio vaistinio preparato reikia atsargiai vartoti ligoniams, kuriems yra kepenų nepakankamumas. Sergant Krono liga, loperamido hidrochlorido reikia vartoti atsargiai. Jeigu pasireiškia vidurių užkietėjimas, pilvo pūtimas ar atsiranda pirmųjų žarnyno obstrukcijos simptomų, šio vaistinio preparato vartojimą būtina nutraukti. Jeigu ligonis karšiuoja bei jo išmatose yra kraujo, prieš pradėdant vartoti loperamido hidrochlorido, būtina išsiaiškinti tokio viduriavimo priežastį. Vartojant loperamido hidrochlorido, gali pasunkėti šlapinimasis. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapo laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Reklamos teksto parengimo data 2017-01.

GREITAI SUSTABDYTS VIDURIAVIMĄ.

4⁹⁹ €

LORATIN EXPRESS 10 mg tabletes, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklos medžiagos, stiprumas: vienoje „Loratin express“ 10 mg tablete yra 10 mg loratadino. **Indikacijos:** simptominiams alerginės slogos ir lėtinės idiopatinės dilgėlinės gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems negu 2 metų vaikams – po 1 tabletę per dieną. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas loratadinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nevartoti jaunesniems nei 2 metų arba svėriantiems mažiau kaip 30 kg vaikams. **Specialūs įspėjimai:** vaistą atsargiai reikia vartoti pacientams, kuriems yra sunkus kepenų veiklos sutrikimas. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Seimyniškų g. 3A LT-09512 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 2636107. El paštas: info.lituania@sandoz.com. BS230495476. Teksto patvirtinimo data: 2023.04.19.

IKI -50%



„MÖLLER'S“

Möller's Döbel Imunity žuvų taukai, 100 kapsulių 24⁹⁹ 12³⁵ € -50 %Möller's Omega-3 Cardio žuvų taukai, 76 kapsulės 21⁹⁹ 11⁰⁰ € -50 %Möller's žuvų taukai, natūralaus skonio, 250 ml 14⁹⁹ 8⁹⁹ € -40 %Möller's Omega-3 Junior, 45 braškių skonio kramtomos žuvelės 19⁹⁹ 11⁷⁵ € -40 %

MAISTO PAPILAI

„Möller's“ – tai šimtmečiui puoselėjami žuvų taukai visai šeimai. „Möller's“ žuvų taukų kapsulės išsiskiria kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyviu medžiagų deriniais. Tyri ir gerai išvalyti „Möller's“ žuvų taukai puikiai tinka vartoti kasdien visą gyvenimą. Įvairaus skonio kramtomosios žuvelės „Möller's Junior“ yra omega-3 ir vitamino D – augančiam vaikų organizmui naudingų medžiagų.

SAUGUS PASIRINKIMAS NUO 1854!

-40%



RAMI ŠIRDIS

Rami Širdis čiulpiamos tabletės, 20 tablečių 6⁹⁹ 4⁰¹ €Rami Širdis+ 50ml lašai 3⁹⁹ 2³¹ €Rami Širdis cholesterolio balansui, 30 kapsulių 13⁹⁹ 8³⁹ €

MAISTO PAPILAI

„Rami Širdis“ – gausios sudėties dviejų poveikio maisto papildai, pripažinti Lietuvos vartotojų. Šios linijos preparatai pasižymi puikiai suderintu sudėtimi, kuri, be vitaminų ir mineralų, papildyta natūraliais augaliniais ekstraktais, šimtmečius naudojamos medicinoje. „Rami Širdis“ maisto papildai padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir psichologinę funkciją, taip pat padeda mažinti nuovargį.

RAMIAME KŪNE – RAMI ŠIRDIS!

-30%

MAGNETRANS DRINK, 400 mg, vandenyje tirpstančios granulės, 20 paketėlių 11²⁵ 7⁸⁸ €MAGNETRANS DIRECT, 375 mg, granulės tirpios burnoje, 20 paketėlių 12⁹⁹ 9⁰⁹ €

MAISTO PAPILAI SU SALKIKLIAUS

„Magnetrans drink 400 mg“ 1 paketėlyje yra 400 mg magnio. Magnis naudingas daugeliui procesų mūsų organizme: padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą, raumenų ir psichologinę funkciją, normalią kaulų ir dantų būklę. Dalies žmonių magnio poreikis yra didesnis, pvz., žmonių, dirbančių sunkiu protinį ir fizinį darbą, sportininkų, paaučių, neščių moterų, vyresnio amžiaus žmonių. Gaivus apelsinų ir greipfrutų skonio.

„Magnetrans Direct“ – burnoje tirpstančios granulės raumenims ir nervų sistemai. Citrinų ir greipfrutų skonio. Tوبلا keliaujant. Magnis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą, raumenų ir psichologinę funkciją, normalią kaulų ir dantų būklę. Tinka nuo 12 metų.

-40%

0⁸⁹ €

VALIDOL-LUBNYPHARM,

10 poliežuvininių tablečių.

MAISTO PAPILAS

Grynasis kiekis: 12,23 g. **Sudedamosios dalys:** cukrus, mentolio tirpalas izovalerionų rūgšties mentilo esteryje, kalcio stearatas. 2-osie tabletes yra 0,12 g mentolio tirpalo izovalerionų rūgšties mentilo esteryje ir 4-osie tabletes yra 0,24 g mentolio tirpalo izovalerionų rūgšties mentilo esteryje. **Vartojimas:** VALIDOL-Lubnypharm tabletę reikia laikyti po liežuviu tol, kol ji visiškai ištirpsta. Vartojama po 1 tabletę 2–4 kartus per dieną. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Tablečių vaikams nespėjusioje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, gamintojo pakuotėje, kad produktas būtų apsaugotas nuo drėgmės. Tinkamumo laikui pasibaigus vartoti negalima. Geriausias laikas (pabaigos): žr. ant pakuotės. **Gaminiojas:** AAB „Lubnypharm“, Lubnai 37500, Petrovskogo g.16, Ukraina. Pagaminta pagal specialų UAB „FD group užsakymą“

ODOS IR LŪPŲ PŪSLELINEI GYDYTI

13⁹⁹ €

ACIC 200 MG, 25 tabletės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje tabletėje yra 200 mg acikloviro. **Indikacijos:** vaistas skirtas ankščiau gydytojo diagnozuotos pasikartojančios lūpų pūslelinės gydymui suaugusiems žmonėms. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** gerti po vieną tabletę 5 kartus per parą kas 4 val. gydymo trukmė - 5 paros. **Kontraindikacijos:** „Acic“ naudoti negalima esant padidėjusiam jautrumui acikloviro, valacikloviro arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** po viruso pažeistos vietos palietimo, reikia tuoj pat nusiplauti rankas. Iki tol reikia stengtis neliesiti kitų kūno vietų, ypač akių. „Sandoz Pharmaceuticals Ltd.“ filialas, Seimyniškių g. 3A LT-09312 Vilnius, Lietuva. BS2ZT09791. Reklamos teksto patvirtinimo data: 2022.12.09.

UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSLELINĘ SU „ACIC“!



6⁹⁹ €

TERBINAFIN-RATIOPHARM 10 mg/g kremas, 15 g.

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Terbinafin-ratiopharm 10 mg/g kremas. 1 g kremo yra 10 mg terbinafino hidrochlorido. **Indikacijos:** Odos infekcija, sukelta dermatofitų, tokių kaip Trichophyton, Microsporum canis ir Epidermophyton floccosum; mieliagrybių, daugiausia Candida genties; įvairiaspalvė dedervinė, sukelta pityriaspurum orbiculare (Malassezia furfur). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** Suaugę ir paaugliai (>12 metų amžiaus): pėdos grybelis, blauzdos grybelis ir liemens grybelis: 1 k. per parą savaitę laiko; odos kandidozė: 1 k. per parą 1-2 savaites; įvairiaspalvė dedervinė: 1-2 k. per parą 2 savaites. Tepėti ant sausos ir švarios odos. Terbinafin-ratiopharm 10 mg/g kremas turi būti tepamas ant pažeistos ir aplinkinės odos plonu sluoksniu ir tada švelniai įtrinamas. Jei infekcija yra raukšlėse (po krotimi, tarpupirščiuose, sėdmenų raukšlėje arba kirkšnyje), po kremo užtepimo oda galima uždengti steriliu marlės gabaliėliu, ypatingai naktį. Simptomų palengvėjimas dažniausiai atsiranda per kelias paras. Nereguliarus vaisto vartojimas arba ankstyvas nutraukimas padidina simptomų pasikartojimo riziką. Jei per 2 sav. nespėjama pagerėjimo, diagnozė turi būti svarstoma iš naujo. Terbinafin-ratiopharm 10 mg/g kremo nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 metų vaikams, nes duomenų apie saugumą nepakanka. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** Terbinafin-ratiopharm 10mg/g kremas yra skirtas tik išoriniam vartojimui. Sąlyčio su akimis turi būti vengiama. Gali atsirasti akių dirginimo požymių. Įvykus atsitiktiniam sąlyčiui su akimis, gerai išplaukite jas tekančiu vandeniu. Terbinafin-ratiopharm 10 mg/g kremą reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Sudėtyje esantis cetosteirolio alkoholis ir cetilo alkoholis gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą). Benzilo alkoholis gali sukelti alerginių reakcijų ir nesunkų vietinį sudirginimą. **Reklamos teksto parengimo data:** 2023 gegužė. OTC-LT-00061



PAVIRŠINIŲ ODOS ŽAIZDŲ GYJIMO GERINIMUI

NUO 5⁹⁹ €

BEPANTHEN

Bepanthen 50 mg/g kremas, 30 g 5⁹⁹ €
Bepanthen 50 mg/g tepalas, 30 g 5⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. 1 g preparato yra 50 mg dekspantenolio. **Terapinės indikacijos:** įvairios kilmės paviršinių odos ir gleivinių pažeidimų pagalbinis gydymas drėkinant oda ir alikvant epidermio barjerą, palaikant epitelizaciją su atitinkamu priešuždegiminiu ir niežėjimą mažinančiu poveikiu, ypač žaizdai medžiagų pažeidimų (medžiagų nudegimų arba nutrozdinimų), odos sudirginimų, žėberimo nuo sauskelnių, skausmingų ir įtrūkusių spenelių gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** pažeista oda tepti plonu sluoksniu preparato vieną ar daugiau kartų per dieną, reikaliui esant. Skausmingus ir įtrūkusius spenelius tepti po kiekvieno maitinimo, prieš žindant nuplauti. Tepėti kiekvieną kartą keičiant sauskelnes, prieš tai oda reikia kruopščiai nuvalyti. Gydymo trukmė priklauso nuo susirgimo pobūdžio ir eigos. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jei sergate kita liga, esate alergiškas arba vartojate kitus vaistus, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Naudojant tepalą ar kremą reikia vengti kontakto su akimis. Reklamos teksto parengimo data: 2023-01 CH-2023012-75

BEPANTHEN PLUS 50 mg/5 mg/g kremas, 30 g 6³⁹ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. 1 g kremo yra 50 mg dekspantenolio ir 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** lokalus įvairių paviršinių žaizdų, pvz. nutrozdinimų, įgyvimų, įbrėžimų, odos įtrūkių, nudegimų gydymas, kai yra infekcijos pavojus. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** kūdikiams nuo 1 mėn., vaikams, paaugliams ir suaugusiems išvalyti žaizdą arba pažeistą odą vieta reikia tepi plonu kremo sluoksniu vieną arba kelis kartus per dieną, kol žaizda užgis. Venkite tepi didelių odos plotus. **Kontraindikacijos:** alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; gilos arba stipriai užkrėstos žaizdos; jei trūkės ausies būgnelis, negalima tepi ausies ertmėje. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** saugokites, kad kremo nepatektų į akis, ausis ir ant gleivinių. Negalima tepi ant sudirgintos, bet neinfekuotos odos. Negalima vartoti kartu su kitomis antiseptinėmis medžiagomis, muilu. Jei pasireiškia sunkios alerginės reakcijos simptomai, vartojimą nedelsiant nutraukite ir pasitarkite su gydytoju. Reklamos teksto parengimo data: 2023-01 CH-2023012-75

LAIMEI, YRA BEPANTHEN®



-30% 1^{67€} ~~2^{39€}~~

AMEDIPLUS

Vazelino kremas, 50 g

Vazelino kremas su vitaminais A ir E, 50 g

MEDICINOS PREKĖ



-30% 2^{79€} ~~3^{99€}~~

MEDETKŲ KREMAS 20 g

Skirtas sudirgusiai, žvairių orų nualintai odai prižiūreti. Kremą naudoti pagal poreikį.

CINKO KREMAS 20 g

Skirtas sudirgusiai, jautriai odai. Kremą naudoti pagal poreikį.



-30% 11^{54€} ~~16^{49€}~~

PLEISTRAS NUO LŪPŲ PŪSLELINĖS, 15 vnt.

MEDICININĖ PREKĖ



-40% 2^{39€} ~~3^{99€}~~

AMEDIPLUS GLICERINAS SAUSOS ODOS PRIEŽIŪRAI, 60ml

KOSMETINOS PRIEMONĖ



🇨🇦 **Jamieson C Mix 500mg, 120 tablečių**

Maisto papildas



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

19¹⁹ €

🇨🇦 **Jamieson Coenzyme Q10 30mg, 60 kapsulių**

Maisto papildai



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

21⁴⁸ €



Pagaminta Kanadoje

🇨🇦 **Jamieson Folic Acid 1mg, 100 tablečių**

Maisto papildas



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

6⁵⁹ €

🇨🇦 **Jamieson D vitaminas kramtomas 1,000 IU, 100 tablečių**

Maisto papildai



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

9³⁹ €



Pagaminta Kanadoje

PROSTATAI IR POTENCIJAI

-40%



PROSTENAL® CONTROL, 30 tablečių **10⁹⁹ 6²³ €**

PROSTENAL® CONTROL, 60 tablečių **17⁹⁹ 10⁴³ €**

PERMEN MAX, 30 tablečių **21⁹⁹ 13⁰⁷ €**

MAISTO PAPILDAI

1 tabletė per dieną. **Gulščių serenoj** (Serenoa repens) vaisių ekstraktas padeda palaikyti normalią prostatos funkciją bei normalų šlapimo nutekėjimą. **Didžiųjų dilgėlių** (Urtica dioica) šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią šlapimo takų ir inkstų funkciją. **Gulščių rugėlių** (Tribulus terrestris) vaisių ekstraktas skatina lytinį potraukį ir padeda palaikyti normalią testosterono koncentraciją kraujyje, vaisiungumą ir reprodukciją. „Permen Max“ yra augalinis medžiagų derinys, papildytas L-argininu. Klininiai tyrimai padeda palaikyti normalią erekcijos funkciją. Z303_SB „Prostena_V01_LT

10⁹⁹ €

CANESTEN® 500 mg makšties minkštosios kapsulės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: makšties minkštosios kapsulės yra 500 mg klotrimazolo. **Terapinės indikacijos:** makšties ir moters šoninių lyties organų infekcijos, sukeltos klotrimazoliui jautrių mikroorganizmų, tokių kaip grybeliai, gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusioms moterims ir paauglėms nuo 16 metų makšties minkštosios kapsulės įdedamos giliai į makštį, geriausia gulint, vakare prieš miegą. Jaunesnėms kaip 16 metų paauglėms vaista galima vartoti tik po gydytojo konsultacijos. **Kontraindikacijos:** alergija klotrimazoliui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pastaraitė su gydytoju, prieš pradėdama vartoti Canesten, jeigu infekcija pasireiškia pirmą kartą; makšties infekcija pirmąjį nėštumo trimestrą metu per pastaruosius šešis mėnesius infekcija pasikartojo daugiau nei du kartus; pasireiškia karščiavimas ($\geq 38^{\circ}\text{C}$); skauda apatinę pilvo dalį, nugarą; atsiranda nemalonus kvapo išskyros iš makšties; pasireiškia pykinimas, kraujavimas iš makšties ir (arba) tuo pačiu metu pečių skausmas; jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, Canesten makšties minkštosios kapsulės nerekomenduojama gydyti menstruacijų metu. Gydymas turi būti užbaigtas iki menstruacijų pradžios. Gydymo metu negalima naudoti tamponų, makšties ploviklių, spermicidinių ar kitokių į makštį vartojamų preparatų, rekomenduojama vengti lytinių santykių. Reikalinga gydytojo konsultacija, jei simptomai nepagerėja per 7 dienas. **Reklamų teksto parengimo data:** 2022-09. CH-20220905-71. Informacija su trumpintais.

*Nė 1 pasaulyje pagal pardavimus nereceptinių ginekologinių priešgrybelinių preparatų kategorijoje. Remiantis 2019 m. pasauline Nicholas Hall's OTC duomenų baze DB6.

CANESTEN® – 1-OS DIENOS MAKŠTIES GRYBELINĖS INFЕКCIJOS GYDYMAS!

-40%



PROSTOSAN FORTE,

30 kapsulių **15⁹⁹ 9⁰⁹ €**

POTENZINE SUPERIOR,

30 tablečių **19⁹⁹ 11⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

„Prostosan forte“ – pagalba vyru prostatai. Sudėtyje esantis sabelgalmių ir rugių žiedaduklių ekstraktai padeda palaikyti normalią prostatos funkciją, o afrikinių pigių ekstraktas – normalią šlapimo pūslės funkciją. Klininio tyrimo ekstraktas padeda išlaikyti energingumą. Šio preparato sudėtis taip pat praturtinta vitaminu D3 ir cinku. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 2 kartus per dieną, valgio metu.

„Potenzine superior“ – subalansuotas derinys potencialai. Šio maisto papildas sudėtyje esantis žerdinio šaknų ekstraktas padeda palaikyti lytinę funkciją, išvengti energingumą. Normalų lytinį potraukį ir seksualinį jausmą padeda palaikyti gulsosios ragūžės vaisių ekstraktas, o normalų vaisiungumą ir testosterono koncentraciją kraujyje – cinkas. Sudėtyje taip pat yra L-arginino. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną, valgio metu.

KIEKVIENO VYRO PASIRINKIMAS!

IKI -40%



MENOSTOP PAIRA,

30 kapsulių **8⁹⁹ 6²² € -30 %**

MAISTO PAPILDAS

Sudedamosios dalys: sojos pupelių aliejus, želatina, sojų izoflavonai, drėgmė išlaikanti medžiaga glicerolis, vanduo, dažiklis geležties oksidai.

Vartojimas: suaugusioms po 2 kapsules per dieną valgio metu.

*Be gliutin.

ISEREN, 30 tablečių **12⁹⁹ 7⁷⁹ € -40 %**

MAISTO PAPILDAS

Maisto papildas su gauruotosios sojos ekstraktu, kuriame gausu natūralių izoflavonų.

Vartojimas: po vieną tabletę per dieną.

-30%



PANER, 30 tablečių **7⁹⁹ 5⁵⁹ €**

URAGIN, 30 tablečių **6⁹⁹ 4⁴⁷ €**

FITOLIZIN valgomoji pasta 100 g **6⁹⁹ 4⁵⁴ €**

MAISTO PAPILDAI

**MAISTO
PAPILDAMS
SĄNARIAMS**

IKI -40%





1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMBIO VITAMINAS D3 4000, 60 kapsulių 14⁹⁸ €
MAISTO PAPILDAS

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMBIO ŽUVŲ TAUKAI

Natūralaus skonio, 250ml 12⁴⁸ €

Citrinų skonio, 250ml 12⁹⁸ €

MAISTO PAPILDAS

IKI -50%



LIVOL VITAMINAI

MAISTO PAPILDAS

Kurdami LIVOL vitaminus Skandinavijos mokslininkai įvertino skirtingus žmonių poreikius ir pasiūlė optimalų sprendimą. Kiekvienas, kuris vartoja LIVOL vitaminus sistemingai, gali būti tikras, kad gauna tai, ko jo organizmui ir imunitetui labiausiai reikia. Produktai sukurti remiantis holistiniu požiūriu į Jūsų organizmo sveikatą, todėl maksimaliai veiksmingi.

SKANDINAVIŠKI LIVOL VITAMINAI – MAKSIMALIAM REZULTATUI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-40%



INOLAB

Inolab Atsparumas stresui, 30 kapsulių 26⁹⁹ 15⁶⁵ €

Inolab Širdžiai ir cholesterolio balansui, 30 kapsulių 18⁹⁹ 11³³ €

MAISTO PAPILDAS

„Inolab Atsparumas stresui“ – tai 8 veikliųjų medžiagų kompleksas nervų sistemai ir gerai nuotaikai. „Affron“ šafrono ekstraktas padeda palaikyti psichinę sveikatą, teigiamą nuotaiką ir atsipalaiduoti. Vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną. „Inolab Širdžiai ir cholesterolio balansui“ – tai 4 veikliųjų medžiagų kompleksas jūsų širdžiai, kraujagyslėms ir cholesterolio balansui. ABG25+* juodųjų česnakų ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies veiklą, normalų cholesterolio kiekį kraujyje. Resveratrolis „Veri-Te“ padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos funkciją. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

SVEICARIŠKAS PRECIZIŠKUMAS IR SINERGINIS POVEIKIS!

-20%

4^{39€} 5^{49€}

GLICINAS, 50 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Sudedamosios dalys: glicinas (65 % grynojo kiekio), dekstrozės monohidratas, kukurūzų krakmolas, lipnumą reguliuojanti medžiaga riebiųjų rūgščių magnio druskos. Grynasis kiekis: 7,6 g. Vartojimo būdas: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Tablete laikyti po liežuvio, kol ištirps. Rekomenduojamame suvartoti per parą kiekyje (3 tabletės) yra 300 mg glicino. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Laikymo sąlygos. Laikyti sausoje, tamsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Gamintojas: UAB „Medicata Fila“, Žarijų g. 28, Vilnius.

IKI -25%



ABENA

Danijos gamintojo ABENA produktai, skirti šlapimo nelaikymui, yra aukščiausios kokybės, atitinkantys skandinaviskus standartus. Produktai itin gerai sugeria ir sulaiko skysčius bei „užrakina“ nemalonius kvapus su „Odour system“ sistema.

Diskretūs, švelni ir orui pralaidūs, todėl linka net ir jautriausiai odai bei užtikrina komfortą. Pagaminti nenaudojant jokio balinimo ir latekso, pažymėti NORDIC ECO LABEL ženklu, garantuojančiu tvarumą ir ekologiją.

AKTYVIOMS DIENOMS IR PATOGIOMS NAKTIMS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-30%

NAUJIENA

MOCARD ATERO

MOCARD ATERO, 60 tablečių 21⁹⁹ 15³⁹ €

MOCARD ATERO, 120 tablečių 41⁹⁹ 29³⁹ €

MAISTO PAPILDAS

Cholesterolui, kraujagyslėms ir širdžiai*

Maisto papildas su monokolinu K, natokinaze, vitaminu B1, ciberžole ir augaliniais polifenoliais. Sudėtyje yra Omeolipid® – patentuotas artišokų, ciklanterų arba perujinių agurkų ir ozragės ekstraktų mišinys.

*Ciberžole padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje ir širdies ir kraujagyslių veiklą. Ciberžolė ir artišokas padeda palaikyti normalią lipidų koncentraciją kraujyje.

*Tiaminas padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Artišokas padeda palaikyti normalią kepenų veiklą.



IMUNITETUI IR GERAI SAVIJAUTAI

-30%NEW NORDIC
MULTIVITAMINAI

MAISTO PAPILDAI

Skandinavų bendrovės „New Nordic“ multivitaminai – tai puikiai suderinti vitaminų, mineralų, mikroelementų ir augalinių ekstraktų kompleksai imunitetui ir gerai savijautai. „Multivitamin active woman“ – moterims, besirūpinančioms gera savijauta ir grožiu. „Multivitamin active woman 55+“ – vyresnių moterų organizmo poreikiams. „Multivitamin pregnant and breastfeeding woman“ – besilaukiančioms moterims ir žindydėms. „Multivitamin active man“ ir „Multivitamin active man energy boost“ – vyrams. Nepamiršome ir mažųjų – „Mineralai kaulams“, apelsinų arba miško uogų skonio krantmosios tabletės – kalcio, magnio ir vitamino D šaltinis augančiam organizmui. „Multi vegan GUMMIES“ – gaivaus vaisių ir uogų skonio multivitaminai guminukai imunitetui. Tinka visi šeimai, taip pat vegetarams ir veganams. Sudėtyje esantys vitaminai A, C, D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

JAUSKĖS PUKIAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



NERVŲ SISTEMAI, ENERGIJOS APYKAITAI, NUOVARGIUI MAŽINTI

1+1Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!**AQUAMAG+B6 X 2**, 42 pakeliai **739 €****AQUAMAG+B6 FORTE**, 28 pakeliai **1159 €****AQUAMAG+B6 GERIAMASIS TIRPALAS**, 10 pakelių **735 €**

MAISTO PAPILDAI

Maisto papildai milteliais ir geriamasis tirpalas. Išsirinkite reikalingiausią: 100, 125 ar net 375 mg magnio su vitaminu B6. Magnis ir vitaminas B6 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą bei nuovargį. Magnis išgautas iš Viduržemio ir Negyvosios jūrų. Pagaminta Izraelyje.

-60%ANTRAI TOKIAI
PACIAI ARBA
PIGESNEI

UNIKALK

MAISTO PAPILDAI

UNIKALK – daniški maisto papildai su kalciumu Jūsų tvirtam kūnui! UNIKALK produktai gaminami Danijoje jų kokybę prižiūrint ir tikrinant farmacijos specialistams. UNIKALK maisto papildai padės papildyti organizmą kalciumu, magniu, vitaminais D3 ir K2. Skirtingų sudėčių, formų bei skonių tabletes užtikrina platų kalcio maisto papildų pasirinkimą, pritaikytą individualiems poreikiams.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-10%**2^{96€}**

GINTARO RŪGŠTIS, 20 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Vartojimas: gerti po 1 tabletę 3 kartus per dieną valgant.
Rekomenduojamame suvartoti per parą kiekyje (3 tabletės) yra 0,3 g gintaro rūgšties.
Gamintojas: UAB „Medicata Fila“, Žarijų g.28, Vilnius
Išskirtinis platintojas Lietuvoje: UAB „VERATRUM PHARMA“, Žarijų g. 28, Vilnius

-40%

GAMOS NAMŲ MAISTO PAPILDAI

MAISTO PAPILDAI

Gamos Namų maisto papildai – tai naujos kartos maisto papildai Jūsų gerai fizinei būklei, grožiui ir puikiai savijautai! Sukurta ir pagaminta Lietuvoje. Be GMO.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-20%

FLORADIX

MAISTO PAPILDAI

„Floradix“ – svarbiausi mineralai ir vitaminai gerai savijautai. „Floradix“ natūralios sudedamosios dalys užtikrina gero organizmo svarbiausių vitaminų ir mikroelementų pasisavinimą. Skystos formos medžiagos greičiau rezorbuojasi nei esančios tabletėse, o dėl puikaus skonio juos noriai geria maži vaikai ir yra tinkami vartoti nėščioms moterims.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

KOSMETIKAI „ŽIEDĖ“

IKI **-30%**



IKI -30%

**EUCERIN®
DERMATOLOGINĖ KOSMETIKA**

Individualiems odos poreikiams pritaikyta dermatologinė kosmetika Eucerin®, kurios efektyvumas yra patvirtintas klinikiniais tyrimais. Odos priežiūra apima kur kas daugiau nei poveikį odai. Išsprendus odos problemas, tavo oda jaučiasi geriau, tu jautiesi geriau.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

VEIDO KREMAI

IKI -30%

**BIODERMA
KOSMETIKOS PRIEMONĖS**

Prancijijos dermatologijos laboratorija „Bioderma“ vadovaujasi požiūriu, kad odos priežiūros priemonės turi padėti atkurti natūralius biologinius procesus, šalinamos odos problemų kilmės priežastis bei simptomus. Priežiūros priemonės „Bioderma“ kuriamos tik iš grynų veikliųjų medžiagų, atliekančių svarbų vaidmenį odos veikloje. Dermatologai, pediatrai, vaistininkai – visi šie specialistai rekomenduoja „Bioderma“ net ir jautriausią odą turintiems pacientams.

BIOLOGIJS MOKSLAS DERMATOLOGIJAI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-25%

**ALPECIN IR PLANTUR****KOSMETIKOS PRIEMONĖS**

„ALPECIN“ šampūnai skatina plaukų augimą ties plaukų šaknimis, gali padėti apsaugoti nuo paveldimo plikimo. Kofeinas saugo plaukų šaknis nuo neigiamo testosterono poveikio ir suteikia joms augti būtinos energijos. Kasdien trenkiant galvą šampūnu „ALPECIN“ plaukų šaknis iškart gauna aktyvinančios medžiagos.

„PLANTUR 39“ šampūnuose esantis fitokofeino kompleksas saugo plauko šaknis nuo hormonų sukeltą nuovargio. Stiprėja plaukų šaknis, mažėja plaukų slinkimas. „PLANTUR 21“ – skirtas jaunos moterims. Kofeinas stimuliuoja plaukų šaknis, išlaiko plaukus gyvybingus ir jie auga ilgesni.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-40%

TALIJA S 30 tablečių 13⁹⁸ 7⁸⁵ €MEFLOVAN FORTE, 60 kapsulių 25⁹⁹ 15⁵⁹ €SUPRA FORMULE GROŽIUI, 175ml 21²⁶ 12⁷⁶ €**MAISTO PAPILDAI**

„Supra formule grožiui“ – odai, plaukams, nagams. Viskas, ko ieškojai grožio puoselėjimui viename produkte: net 7 g kolageno, hialurono rūgšties, seleno, silicio, biotinas, cinkas ir vitaminas C. Aktyvūs ingredientai sumažinti su tikromis juodųjų serbentų sultimis, be pridėtinio cukraus, saldiklių ir dažiklių. Cinkas padeda palaikyti normalią odos būklę, selenas – normalią nagų ir plaukų būklę, o vitaminas C padeda palaikyti normalią kolageno susidarymą, kuris reikalingas normaliai odos funkcijai.

„Talijs S“ – subalansuotas augalinių medžiagų derinys, norint išlaikyti grožio kūno linijas. Šio maisto papildas sudėtyje esantys gvaraninių pailuinių ir kambarinių garcinijų vaisių ekstraktai padeda palaikyti normalią kūno svorį. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Cholinis padeda palaikyti normalią lipidų apykaitą.

„Meflovan forte“ – trijų augalinių medžiagų derinys, skirtas moterims, siekiančioms maksimalaus komforto ir geros savijautos menopauzės metu. Šio maisto papildas sudėtyje esantis raudonųjų dobilų ekstraktas padeda palaikyti normalią būseną menopauzės metu. Sudėtyje taip pat yra dvimečių naktivių aliejaus ir sojų izoflavonai. Pakuotėje 2 mėnesių kursas.

MAKŠTIES MIKROFLOROS ATSTATYMUJ

-25% 11 51€ 15⁵⁹**ECOCILLIN, 6 makšties kapsulės****MEDICINOS PRIEMONĖ**

Ecocillin makšties kapsulės skirtos vaginozės, vaginito ir jų pasikartojantiems simptomams (deginimas, niežėjimas, nemalonus kvapo išskyros iš makšties) mašinti. Sudėtyje yra Lactobacillus plantarum P17630 gerųjų bakterijų. Greitai atstatoma makšties mikrofloros balansas po antibiotikų, kontraceptikų vartojimo bei efektyviai apsaugo nuo makšties infekcijų. Įdėti 1 kapsulę į makštį prieš miegą. Naudoti 6 dienas iš eilės arba kaip pataria gydytojas. Komforto jausmas jau pirmą rytą!

ECOCILLIN ORAL, 15 geriamųjų kapsulių**MEDICINOS PRIEMONĖ**

Sukuria apsauginį barjerą nuo patogenų, atstato normalią makšties mikroflorą, skatina vaginozės ir vaginito simptomų išnykimą. Priemonė sudaryta iš 5 milijardų probiotinių pieno rūgšties bakterijų (Lactobacillus plantarum P 17630, Lactobacillus paracasei 11688, Lactobacillus salivarius 11794). Vartoti po 1 kapsulę per dieną, rekomenduojama ne valgio metu, ne trumpiau kaip 15 dienų iš eilės. Vartoti tik per burną. ECO/2023/01/11, reklamos teksto paruošimo data: 2023 sausio 12

-30%

**GROŽVITA MAISTO PAPILDAI****MAISTO PAPILDAI**

GROŽVITA LINIJA – tai vienas kitą papildantis produktai, bet galima naudoti ir atskirai pagal poreikį. Maisto papildai skirti odai, nagams, plaukams.

GROŽVITA 80 kapsulių – optimaliai subalansuotas vitaminų ir natūralių augalinių ekstraktų derinys Jūsų grožiui.

GROŽVITA COLLAGEN, 42 tabletės – praturtinta kolagenu.

GROŽVITA PLUS, 42 tabletės – tabletė per dieną

BŪK GRAŽI SU „GROŽVITA“!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-40% 12 89€ 21⁴⁹

boderm

**OLIPROX** nagų lakas grybeliui (gelis vandens pagrindu), 12 ml

Oliprox™ nagų lakas (gelis vandens pagrindu) – veiksminga priemonė, padedanti užkirsti kelią grybelinei infekcijai bei pagalbinė priemonė gydant onichomikozę (nagų grybelį).

-10%

**FEMINELLA**, makšties ovulės, 10 vnt. 13⁹⁹ 12⁵⁹ €**MEDICINOS PRIEMONĖ****Makšties drėgmei atkurti.**

Sudėtis: kiekvienoje makšties ovulėje yra 5 mg natrio hialuronato, 10 mg vitamino E, 60 mg azijinių raistinių, 60 mg dedešvų ir 60 mg ramunėlių ekstraktų, 2 mg arbatmedžių aliejaus. **Indikacijos:** ovulės vartojamos makšties gleivinei drėkinti, esant makšties sausumui dėl hormonų kiekio pokyčių bei kurio nors gyvenimo laikotarpio, ypač menopauzės periodo, po gimdymo ir žindymo laikotarpio, arba dėl chemoterapijos ar spindulinio gydymo. Dėl drėkinamojo poveikio ovulės lengvina makšties atrofijos simptomus (pvz., niežulį, deginimą, tempimą bei nemalonius pojūčius lytinių santykių metu). **Dozavimas:** vartoti po 1 makšties ovulę 10 dienų iš eilės arba pagal gydytojo nurodymus. Menopauzės laikotarpiu pirmas 10–20 parų vartoti po 1 ovulę per parą, palaikomas gydymas – po 1 ovulę 2 kartus per savaitę.

BIOHYL LACTO, makšties ovulės, 7 vnt. 14⁹⁹ 12⁶⁰ €**Makšties mikroflorai atkurti.**

Sudėtis: kiekvienoje makšties ovulėje yra 70 mg laktobakterijų lizato, 20 mg lizocimo hidroklorido, 50 mg alavijų ekstrakto, 10 mg morkų ekstrakto, 10 mg šaltalankių ekstrakto. **Indikacijos:** ovulės vartojamos siekiant atkurti normalią makšties mikroflorą, slopinti uždegiminius procesus makštyje, apsaugoti makšties gleivinę ir skatinti jos regeneraciją. **Dozavimas:** suaugusioms moterims vartoti 1 makštį prieš naktį po 1 ovulę 5–7 dienas.



JAUTRIŲ DANTŲ PRIEŽIŪRAI

-30%



SENSODYNE

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Dantų pastos Sensodyne yra specialiai sukurtos žmonėms, turintiems jautrius dantis. CHLT/GHMLBBA/0004/78a/JUL
EKSPERTO PAGALBA JAUTRIEMS DANTIMS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

SUAUGUSIŲJŲ IR VAIKŲ DANTŲ PRIEŽIŪRAI

-25%



ELGYDIUM DANTŲ PASTOS

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Dantų pastos „Elgydium“ siūlo specializuotus sprendimus dantų priežiūrai suaugusiems ir vaikams: dantų problemoms spresti, dantims balinti, jautriems dantims, dantų apnašų kontrolei bei edūmos prevencijai.

„ELGYDIUM“ – TOBULAI JŪSŲ ŠYPSENA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-20%



FITTIDENT

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Fittydent“ – stiprus, ilgai laikantis fiksuojamasis kremas, neleidžiantis protezams slįsti ir slankioti. Netiprus vandenyje ir atsparus rūgščiai, todėl nenuplaukiamas skysčių ar sėlių. „Fittydent“ dantų protezų fiksuojamasis kremas garantuoja stiprų dantų protezų ir dantelių sukibimą.

NAUJAS PAKUOTĖS DIZAINAS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

BURNOS HIGIENAI

-20%



SUNSTAR GUM

Jau daugiau kaip 80 metų „Sunstar“ yra burnos ermtės higienos produktų gamybos lyderė. „Sunstar GUM“ misija – užtikrinti savo klientams sveikus dantis bei danteną, naudojant produktus, sukurtus remiantis naujausiais išradimais ir klinikinių tyrimų rezultatais. „Sunstar GUM“ burnos higienos produktai sukurti, siekiant užkirsti kelią ne tik ligų simptomams, bet ir jų priežastims!

SVEIKOS DANTENOS, SVEIKESNIS GYVENIMAS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-25%



ELMEX

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„ELMEX“ burnos higienos priemonės profesionaliai pritaikytos ne tik skirtingoms amžiaus grupėms, bet ir pačioms įvairiausioms problemoms spresti.

INDIVIDUALIOS PROBLEMOS. PROFESIONALUS SPRENDIMAS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

TOBULAI BURNOS HIGIENAI

-25%



CURAPROX

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Curaprox“ – tai aukščiausios kokybės šveicariškos burnos higienos priemonės: platus spektras dantų šepetėlių, tarpdančių šepetėlių, dantų pastų. Taip pat kūdikiams ir vaikams skirtos priemonės. „Curaprox“ dantų šepetėlių šereliai gaminami ne iš nailono, o iš patentuotos „Curen“ medžiagos, todėl šie šepetėliai efektyviai pašalina apnašas, netraumuodami dantenų. Tarpdančių šepetėliai gaminami iš labai plonos, tačiau tvirtos „Cural“ patentuotos medienos vielės, todėl tarpdančius išvalysite knuopščiai ir be skausmo. Dantų pastų sudėtyje esantys fermentai veiksmingai apsaugo nuo dantų edūmos, o antibakterinės „Perio Plus“ linijos poveikis paremtas moksliniais tyrimais.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms



-50%

PIRKDAMI GINTARINĖJE VAISTINĖJE
JŪS GAUSITE ČEKĮ, KURIUO GALĖSITE APMOKĖTI
NET IKI 50% SUMOS UŽ ŠIUOS PRODUKTUS:

ROYAL DENTA

Dantų pasta Royal Denta Silver, 130g 15⁹⁹ 8⁰⁰ €

Dantų šep. Royal Denta Silver Soft 10⁹⁹ 5²⁰ €

Dantų pasta „Royal Denta Silver“ – padeda atkurti natūralų dantų baltumą. Dantų pasta praturtinta sidabru ir biologiškai aktyvių kompleksų: greitprutų sėklių, alajijų, žaliuosius arbatos ekstraktai stiprina ir tonizuoja danteną. Sudėtyje esantis fluoro junginys su ksilitoliu aktyviai saugo nuo edūmos.

Dantų šepetėlis „Royal Denta Silver Soft“, minkštas – jautrių dantų priežiūrai. Dviejų ilgų šerelių išvalo net sunkiai pasiekiamas tarpdančių vietas. Sidabras esantis šepetėlio šereliuose, panaikina net iki 99,9% ant jo patenkančių bakterijų, todėl j šepetėlį galite naudoti ilgai.



ENERGIJAI IR IMUNITETUI

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė – NEMOKAMAI!



VITIRON™ KIDS

VITIRON KIDS GROWUP, 50 guminukų vaikams 14⁹⁹ €

VITIRON KIDS IMMUNITY, 50 guminukų vaikams 17⁴⁹ €

VITIRON KIDS SCHOOL, 50 guminukų vaikams 15⁷⁹ €

VITIRON KIDS SPORTS FOR ENERGY, 50 guminukų vaikams 15⁷⁹ €

MAISTO PAPILDAL „Vitiron“ Kids – tai vaisių ir uogų skoniu, įvairių formų krantomųjų guminukų su vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis, „Vitiron“ Kids grow UP skirti vaikų kaulų augimui ir vystymuisi, „Vitiron“ Kids School for BRAIN – smegenims, normaliai psichologinei būklei, pažinimo funkcijai, „Vitiron“ Kids Sports for ENERGY – normaliai energijos apykaitai, o „Vitiron“ Kids Immunity su šėlavmedžio sultimis – imunitetui. VTR-LT-00051

PATENKINS AUGANČIO VAIKO MIKROELEMENTŲ POREIKIUS IR PADĖS PALAIKYTI NORMALIĄ IMUNINĖS SISTEMOS VEIKLĄ!

-40%

9⁴¹€

15⁰⁹

LOTAMILE BIOFOLIC COMPLEX, 30 kapsulių (24 g)
MAISTO PAPILDAS NĖSTUMĄ PLANUOJANČIOMS, NĖŠČIOMS IR ŽINDANČIOMS MOTERIMS

Lotamile® Biofoli Complex - nepakeičiamas bioaktyvios folio rūgšties, cholino ir vitamino D kompleksas sklandžiam nėštumui ir kūdikio vystymuisi.

- ✓ Kūdikio augimui ir smegenų sistemos vystymuisi.
- ✓ Kūdikio nervų sistemos vystymuisi.
- ✓ Sklandžiam nėštumui. Imunitetui.
- ✓ Geriau pasisavinama - bioaktyvi folio rūgštis.

6⁹⁹€

KAMISTAD N gelis 10g

Lidokaino hidrochloridas, 20 mg/g, ramunėlių žiedų skystasis ekstraktas, 185 mg/g.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Indikacijos: gelis vartojamas esant nesunkiam dantenų ir burnos gleivinės uždegimui.

Vartojimas: suaugusiems ir vaikams, vyresniems nei 12 metų, reikia tepti 0,5 cm ilgio gelio juostelę 3 kartus per parą. Gelis tepamas ant pažeistų vietų ir švelniai įtrinamas.

Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai: gelio vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliąjam arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Saugoti, kad gelio nepatektų į akis ir ant atvirų žaizdų. Panaudojus gelio, kruopščiai nusiplauti rankas.

Pakuotės lapelio peržiūros data: 2022 sausio mėn.

Reklamos teksto parengimo data:

2201_SB_Kamistad_N_V01_LT

„KAMISTAD N“ – PAGALBA ESANT BURNOS GLEIVINĖS UŽDEGIMUI!

TEMPERATŪRAI MAŽINTI IR SKAUSMUI MALŠINTI

NUO 4⁴⁹€

IBUGARD

100 mg/5 ml geriamoji suspensija, 120 ml 4⁴⁹ €
200 mg/5 ml geriamoji suspensija, 100 ml 8⁴⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 5 ml **IBUGARD 100 mg/5 ml** geriamosios suspensijos yra 100 mg ibuprofeno, 5 ml **IBUGARD 200 mg/5 ml** geriamosios suspensijos yra 200 mg ibuprofeno. Terapinės indikacijos. Įvairios kilmės karščiavimo, įvairios kilmės silpno ir vidutinio stiprumo skausmo, tokio, kaip virusinės ar kitokios infekcijos sukeltos galvos, gerklių ir raumenų skausmo; sąnarių ir kaulų skausmo; pooperacinio skausmo; danties skausmo, galvos skausmo; ausies skausmo, esant vidurinės ausies uždegimui, malšinimui. Vartojimo būdas ir dozavimas: nustatant ibuprofeno dozę, reikia atsižvelgti į paciento kūno svorį ir amžių. Paprastai vienkartinė ibuprofeno dozė yra 7–10 mg/kg kūno svorio, didžiausia paros dozė yra 20–30 mg/kg kūno svorio. Dozė galima kartoti kas 6–8 valandas, tarp dozių turi būti ne mažesnis nei 4 valandų intervalas. Tik trumpalaikiams vartojimui. Kontraindikacijos: Padidėjęs jautrumas ibuprofenui, aspirinui ar kitam nesteroidiniam vaistui nuo uždegimo (NVNU), arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei sergate ar sirgote skrandžio ir (arba) dvylikapirštės žarnos opa ar kraujavimu iš virškinamojo trakto; sergate sunkiu kepenų, širdies ar inkstų funkcijos sutrikimu. Yra polinkis į kraujavimą. Specialūs įspėjimai: specialų atsargumo priemonių reikia, jei inkstų, kepenų ar širdies funkcija yra sutrikusi, sutrūkęs kraujo krešėjimas arba vartojami antikoagulantai, sergamieji cukriniu diabetu, raudonąja vilkige, krono liga, opiniu kolitu, hipertenzija, astma, šienlige, yra nosies polipų ar lėtinio infekcinių kvėpavimo takų ligų. Teksto paruošimo data 2017 01 mėn.

ŽVAKUTĖS TEMPERATŪRAI MAŽINTI

4⁴⁹€

IBUGARD 60 mg, 10 žvakučių
IBUGARD 125 mg, 10 žvakučių
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Kiekvienoje žvakutėje yra 60 mg arba 125 mg ibuprofeno. **Terapinės indikacijos.** Karščiavimo mažinimas. Silpno ir vidutinio stiprumo skausmo malšinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** „Ibugard“ 60 mg arba 125 mg žvakučių rekomenduojama vartoti tada, kai ibuprofeno neįmanoma vartoti per burną. „Ibugard“ 60 mg žvakutės skirtos vaikams nuo 3 mėnesių (nuo 6 kg kūno svorio) iki 2 metų (12 kg kūno svorio), „Ibugard“ 125 mg žvakutės skirtos vaikams nuo 2 metų (12 kg kūno svorio) iki 6 metų (20,5 kg kūno svorio). Vienkartinė dozė neturi viršyti 10 mg/kg kūno svorio. Didžiausia ibuprofeno paros dozė yra 20–30 mg/kg kūno svorio, padalyta į 3–4 vienkartinės dozes.

Jeigu šio vaistinio preparato reikia vartoti 3–5 mėnesių vaikams ir jei per 24 valandas simptomai pasunkėja ar neišnyksta, reikia pasitarti su gydytoju. Jeigu šio vaistinio preparato reikia vartoti vyresniems kaip 6 mėnesių vaikams ligau nei 3 paras arba jeigu simptomai pasunkėja, reikia pasitarti su gydytoju. **Kontraindikacijos.** Vartoti negalima, jei yra padidėjęs jautrumas veikliąjam arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, acetilsalicilo rūgščiai ir kitokiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo. Padidėjęs skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa. Aspirininė astma. Nosies polipai. Angioedema. Sunkūs širdies nepakankamumas. Sunki dehidratacija. Paskutinieji trys mėnesiai. „Ibugard“ 60 mg negalima vartoti kūdikiams, kurių vidutinio kūno svoris ne didesnis kaip 6 kg (iki 3 mėnesių amžiaus). „Ibugard“ 125 mg negalima vartoti vaikams, kurių kūno svoris mažesnis nei 12,5 kg. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Atsargiai vartoti, jei pacientui per lėtai kresėja kraujas, sutrinka kepenų ir inkstų veikla, pacientas vartoja krešėjimą mažinančių vaistų, serga širdies nepakankamumu, hipertenzija, cukriniu diabetu, bronchine astma arba kitokia liga, kurios metu galimas bronchų spazmas, vartojantiesiems medikamentų, galinčių didinti virškinimo trakto išopėjimo ar kraujavimo riziką. Reklamos teksto parengimo data 2021-08.

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

11⁹⁹€

DOCTOR FISH OMEGA-3
+ VITAMINUS D & E 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS SU SALKIDULIU

Maisto papildas sudėtyje yra omega-3 riebiųjų rūgščių (EPR ir DHR) ir vitaminų D ir E: EPR (eikozapentaeno rūgštis) ir DHR (dokozahekseno rūgštis) padeda palaikyti normalią širdies veiklą; DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją, išsaugoti normalų regėjimą; vitaminas D padeda palaikyti imunitetą, normalią kaulų, raumenų, dantų būklę; vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.

Pasiūlymai galioja 2023 10 01 – 2023 10 31.

Leidinyje nurodytos maisto papildų, kosmetikos, medicininės paskirties prekių ir medicinos prietaisų kainos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortele, o vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Nuolaidos taikomos prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą. Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį/informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojiui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Daugiau informacijos NORFOS vaistinėje, tel. 8 800 10008, www.nvaistine.lt MAŽYLIUI IR MAMAI skirtas prekes ypatingomis kainomis greičiau ir patogiau užsisakykite internetinėje vaistinėje www.nvaistine.lt. Užsisakius prekių (išskyrus vaistinius preparatus) už 28,96 € ir daugiau – pristatymas NEMOKAMAI! Reklaminio teksto parengimo data – 2023 09 14.



AMBIO MAISTO PAPILDAMS

-40%



Pasiūlymai galioja **2023 10 01 - 2023 10 31**, perkant vaistinėje, pateikus PC NORFA kortelę. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą. Prekių kiekis ribotas. UAB „Norfos vaistinė“ pasilieka teisę bet kada keisti akcijos sąlygas. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

