

TOP LAPKRIČIO PASIŪLYMAI



-50%



AMBIO
OMEGA-3 FORTE, 60 kapsulių **49⁹⁹ 10⁰⁰ €**
MAISTO PAPILDAS

-50%



AMBIO
MAGNIS, milteliai geriamajam tirpalui, 30 paketėlių **44⁹⁹ 6⁰⁰ €**
MAISTO PAPILDAS

-50%



OILESEN FORTE
vitaminas D3 4000, 60 minkštųjų kapsulių **48⁹⁹ 9²⁰ €**
MAISTO PAPILDAS
„Oilesen D₃ Forte“ – 1 kapsulėje yra net 4000 TV vitamino D₃, išrūpinto kanapių aliejuje. Tinka vartoti žmonėms, turintiems padidintą vitamino D poreikį, pavyzdžiui, vyresniems.
DAUGIAU SAULĖS SU „OILESEN D3“!

1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra
pigesnė arba tokia pati
– NEMOKAMAI!



ATEROLIP® COMPLEX CAPS
30 kapsulių **16⁴⁹ €**
90 kapsulių **39⁹⁹ €**
MAISTO PAPILDAS
„Aterolip® complex caps“ sudėtyje esantis ciberžolių ekstraktas padeda palaikyti normalų cholesterolio kiekį kraujyje, širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą, taip pat normalizuoti kepenų lipidų kiekį.

NUO 6⁹⁹ €



LIVOSIL
140 mg, 30 kapsulių **6⁹⁹ €**
140 mg, 60 kapsulių **11⁹⁹ €**
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino. **Indikacijos:** papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livosil“ dozė yra 280–420 mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. „Livosil“ rekomenduojama vartoti ilgiau nei 3 mėnesius. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livosil“ medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemija), bei tuos, kurie vartoja preparatų, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. Teksto peržiūros data 2017-07-12.

NATŪRALI KEPENŲ APSAUGA IR GYDYMAS!

4⁹⁹ €



INOVOX
HONEY LEMON, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, 24 kietosios pastilės
MENTHOL, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, 24 kietosios pastilės
ORANGE, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, 24 kietosios pastilės

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje pastilėje yra 2 mg lidokaino hidroklorido, 0,6 mg amilmetakrezolio ir 1,2 mg 2,4-dichlorobenzilo alkoholio. **Indikacijos:** gerklės skausmo malšinimas, vietinis antiseptinis gerklės ir burnos ertmės uždegiminių būklių (pvz., paraudimo, patinimo) gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** po 1 kietąją pastilę kas 2–3 val. ir kai reikia, bet ne daugiau kaip 8 kietąsias pastiles per parą (vaikams – ne daugiau kaip 4 pastiles). Vartoti ant burnos gleivinės. Kietąją pastilę reikia lėtai sušūpti laikant burnoje, bet ne užsuku. Vaisto nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** jei simptomai neišnyksta ilgiau kaip 2 paras, sunkėja, arba atsiranda naujų simptomų, reikia įvertinti paciento klinikinę būklę. Atsargiai vartoti ūmine liga sergantiems, nusilpusiems pacientams. Nevartoti esant ūmioms burnos ir gerklės žaizdoms, prieš valgant ar atsigertiant. Astma sergantys pacientai turi būti prižiūrimi gydytojo. Sudėtyje yra levomentolio terpenų, gliukozės, sacharozės, saulėlydio geltonojo ir kosulilio raudonojo. **Reklamos teksto parengimo data 2022-06-09.**
„INOVOX“ - EFEKTAS – JAU PO 1 MINUTĖS!

 -50 % pigiau

Vitaminai ir mineralai visai šeimai



WALMARK

MAISTO PAPILDAI

NAUJIENAI „Walmart NutriPack Immuno“ – tai keturių vitaminų ir mineralų rinkinys, supakuotas į patogius kasdienius paketėlius – lengva naudoti ir pasiimti visur su savimi.

1 paketėlyje yra: vitamino D 4000 IU kapsulė, prailginto veikimo vitamino C 600 mg tabletė, cinko tabletė ir seleno su juodųjų pipirų ekstraktu tabletė. Vitaminai D ir C, cinkas bei selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. 1 paketėlis – kasdienis tavo imuniteto skydas!

NAUJIENAI „Vitaminai D3 + K2“ – aliejuje mikrokapsuliuoti vitaminai D ir K užtikrina gerą bioaktyvumą, stabilumą ir tikslią bei vienodą maistingųjų medžiagų dozę kiekvienoje kapsulėje. Vitaminų poveikis išlieka ilgiau, nes jie veikia palaipsniui ir ilgesnį laiką. Patentuota vitamino K2 technologija „MenaDot“!

„Super Vitaminas C“ – prailginto veikimo vitaminas imunitetui. Papildytas erškėtuogių vaisių milteliais, kurie padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir kvėpavimo takų veiklą.

„Mega Vitaminas D 4000 IU“ – didelė dozė vitamino D imunitetui, kaulams ir dantims. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei normalią kaulų ir dantų būklę. Taip pat padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą. 2601_SB_Walmart_V01_LT.

„WALMARK“ – ŽYDĖK SVEIKATA! VITAMINAI IR MINERALAI VISAI ŠEIMAI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-50 %



FJØRD STRONG OMEGA-3

CARDIO, 60 kapsulių 32⁹⁹ 16³⁵ €

GENIUS DROPS, žuvų taukų lašai, 50ml 48⁹⁹ 9¹⁰ €

IMMUNITY, 60 kapsulių 34⁹⁹ 16⁰⁰ €

MAISTO PAPILDAI

Rinkitės galtingus žuvų taukus „Fjord Strong Omega-3“, gaminamus iš aukščiausios kokybės sertifikuotos žaliavos.

Isbandykite naujieną – „Fjord Strong Omega-3 Immunity“! Tai didelės koncentracijos omega-3 riebiųjų rūgščių (EPR ir DHR), vitamino D ir alyvuogių aliejuje esančios oleino rūgšties derinys jūsų stipriam imunitetui.

Sirdies stiprybei rinkitės „Fjord Strong Omega-3 Cardio“ su dideliu biologiškai aktyvių polifenolių kiekiu.

„Fjord Strong Omega-3 Genius drops“ – genialūs lašai genialiems protams su išskirtinai dideliu kiekiu DHR ir vitaminu D.

„FJORD STRONG OMEGA-3“ – GALI DAUGIAU NEI TIKIESI.

-50 %

-50 %



MARSIEČIAI®

MAISTO PAPILDAI

NAUJIENAI „Marsiečiai“ guminukai su vitaminais, cinku ir beta gliukanais! Vitaminai C, D ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

„Marsiečiai“ guminukai su žaliuolemis, vitaminais C, D ir cinku, kurie padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

„Marsiečiai“ guminukai su šaltalankiais, vitaminais C, D ir cinku, kurie padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

„Marsiečiai BoneActive“ guminukai su vitaminais D ir K, kurie padeda palaikyti normalią kaulų būklę.

„Marsiečiai Immunactiv“ tabletės su beta gliukanais bei vitaminais ir mineralais vaikų imunitetui. Vitaminai C, D ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Jodas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.

Beukoris „Marsiečiai“ ledinukas su islandinių kerpenų ekstraktu, padedančiu palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Aviečių skonio.

2601_SB_Marsiečiai_V01_LT

„MARSIEČIAI“ GUMINUKAI – KASDIEN, KAD VIENĄ DIENĄ VAIKAI MUS PRAAUGT!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-50 %



ASHWA PRO600, 28 pakeliai 22⁹⁹ 11⁵⁰ €

BIOMAGNIS + BIOKALIS FORTE, milteliai geriamajam tirpalui, 20 pakelių 49⁹⁹ 10⁰⁰ €

MAGNUS REX, 28 pakeliai 25⁹⁹ 13⁰⁰ €

REBRAIN, 60 kapsulių 59⁹⁹ 30⁰⁰ €

MAISTO PAPILDAI

Stinga energijos, norisi palaikyti protinę veiklą ir gerą savijautą? „Biofarmacija“ siūlo rinktis maisto papildus, pritaikytus individualiems organizmo poreikiams.

„biomagnis + biokalis forte“ – maisto papildas milteliais, kurio viename pakelyje yra 500 mg magnio ir 500 mg kalcio citratų. Aukštos kokybės Negyvosios jūros mineralai padeda palaikyti normalią raumenų funkciją ir nervų sistemos veiklą.

„MAGNUS REX300“ – koncentruotas magnio bisglicinatas iš Negyvosios jūros. Viena pakelyje – 300 mg lengvai pasisavinamo magnio, padedančio mažinti pavargimo jausmą, nuovargį ir palaikyti normalią energijos apykaitą bei raumenų funkciją.

„reBRAIN“ – naujos kartos specializuotos sudėties maisto papildas smegenų veiklai, atmintiai, koncentracijai ir gerai nuotaikai. Sudėtyje esančios medžiagos turi net 6 biomedicininis tyrimus ir 10 patentų. * Tyrimų nuorodos pateikiamos www.biofarmacija.eu.

„ASHWA PRO600“ – koncentruotas produktas emocinei pusiausvyrai palaikyti ir stresui suvaldyti. Sudėtyje – 600 mg gryno ašvagandų (migdomųjų vitanijų) šaknų ekstraktas KSM-66® ir inulinas iš cikorijų. KSM-66® veiksmingumas pagrįstas 35 biomedicininiais tyrimais, skelbiamais oficialiame puslapyje www.ksm66ashwagandhaa.com.

„BIOFARMACIJA“ – KURIAME TIK TAI, KO ORGANIZMUJ IŠ TIESŲ REIKIA.

Miegui ir nervų sistemai

-50 %



NEUROMED

ANTI-STRESS, 20 žiupiamų tablečių 44⁹⁹ 6⁰⁰ €

SLEEP FORTE, 30 žiupiamųjų tablečių 44⁹⁹ 6⁰⁰ €

MAISTO PAPILDAI

Isbandykite „Neuromed Anti-Stress“ – greičiau įsisavinamas, žiupiamas tabletės, kurios padeda nusiraminti, suvaldyti stresą ir mėgautis akimirka bei įtampos jausmo.

Trigubos poveikio „Neuromed Sleep Forte“ padės ne tik greičiau užmigti, gerai išsimiegoti, bet ir ryte jaustis žvaliai.

KARTU Į RAMYBĘ SU „NEUROMED“!

KALCIKINON LIQUID

150 ml 46⁹⁹ 8²⁵ €

60 kapsulių 45⁹⁹ 7⁹⁵ €

MAISTO PAPILDAI

Stipriems kaulams ir dantims bet kuriame amžiaus tarpsnyje labai svarbu gauti pakankamai kalcio, vitaminų D3, K2, fosforo bei užtikrinti tinkamą šių medžiagų įsisavinimą: kalcis, vitaminas D3, K2, fosforas padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę, vitaminas D3 – normalią kalcio, fosforo absorbciją, įsisavinimą.

Kalciklon Liquid – skystas kalcis su vitaminais D3, K2, fosforu papildytas mitybą kaulams ir dantims reikalingomis medžiagomis. Skysta mikronizuota kalcio forma garantuoja geresnį, greitesnį kalcio įsisavinimą. Kalciklon Liquid yra švelnus perskio skonio, malonios, lengvos tekstūros, neturi kreidos skonio, nepalieka poskonio. Patiks tiek vaikams nuo 3 metų, tiek suaugusiems. Kalciklon Liquid paprasta ir lengva vartoti – vaikams tik 1 arb. šaukštelis, suaugusiems – 2.

Kalciklon kapsulės – įprasta, klasikinė vartojimo forma, kurioje yra tai, ko reikia kaulams ir dantims: optimalus kalcio bei didesnis vitamino D3 kiekis ir ypač svarbus kaulams vitaminas K2.

„KALCIKINON“ YRA TAI, KO REIKIA KAULAMS IR DANTIMS!

-50 %



-50 %



„LIVOL“ VITAMINAI

MAISTO PAPILDAI

Kviečiame Jus atrasti iš naujo „Livol“ vitaminų prekių ženklą – dabar naujose pakuotėse. Atnaujintas „Livol“ įkveptas Danijos vertybių, šiaurietiškos estetikos ir Hygge balanso, kuris atspindi harmoningą požiūrį į kasdienę gerą savijautą. Danų kultūroje gyvenimo pusiausvyrą gimsta iš paprasto, bet prasmingų kasdienybės akimirkų – judėjimo, ramybės, artumo, šypsenų bei sąmoningo rūpesčio savimi. Šia filosofija vadovaujasi ir „Livol“ vitaminai, sukurti Danijoje, naudojant pažangias, subalansuotas formules ir efektyvią gamybos technologiją, kuri užtikrina maksimalų pasisavinimą.

„LIVOL“ – GEROS SAVIJAUTOS MEISTRAI IŠ DANIJOS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

Nuo skausmo ir
karščiavimo

NUO 2⁹⁹ €

IBUPROM

200 mg, 10 dengtųjų tablečių 2⁹⁹ €
200 mg, 20 dengtųjų tablečių 4⁴⁹ €
400 mg, 10 dengtųjų tablečių 3⁴⁹ €
400 mg, 20 dengtųjų tablečių 4⁹⁹ €



NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg ir 200 mg. **Terapinės indikacijos:** skausmo (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimo mažinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** ibuprofeną, 400 mg; suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 1 tabletę 3 kartus per parą, 6–9 m. vaikams (dūno svoris 20–29 kg) gerti po 1 tabletę kas 6–8 val. (negerti daugiau nei 3 tablečių per parą); 10–12 m. vaikams gerti po 1 tabletę kas 6 val. (negerti daugiau nei 4 tablečių per parą); suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams pradinė dozė yra 2 tabletes, po to galima gerti po 1–2 tabletes kas 4 val. (negerti daugiau nei 6 tablečių per parą). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, taškinis kraujavimas, ūminis skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligės stadija; anksčiau buvusi alergija acetylsalicilo rūgščiai ir kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; sergant sunkiu širdies nepakankamumu; esant trečiam nėštumo trimestriui. **Specialūs įspėjimai:** vartoti nepatartina, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu, bronchių astma. Reklamos teksto parengimo data 2026-03-23.

RENKUOSI „IBUPROM“. RENKUOSI LAISVĖ.

Intensyvaus
poveikio šildomasis
pleistras

-20%



PYRALGINA TERMO HOT, šildomasis pleistras, 1 vnt. 2⁴⁷ 1⁹⁸ €

MEDICINOS PRIEMONĖ

PYRALGINA TERMO HOT yra intensyvaus poveikio šildomasis pleistras, kuris veiksmingai ir natūraliai atpalaiduoja giliosius raumenis ir dėl to lengvina nugaros, pečių, strėnų, kaklo, sausgyslių bei reumatinių skausmą. PYRALGINA TERMO HOT veikia iki 14 valandų. Ypatingai tinka lėtinių skausmų malšinimui. Šiluma suaktyvina kraujotaką, limfos dreną, atpalaiduoja giliosius raumenis, susilpnėja skausmas, silpnėja uždegimo požymiai.

PAPRASTA IR EFEKTYVU!

Nuo skausmo

4⁴⁹ €



METAFENEX, 200 mg/500 mg, 10 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg ibuprofeno ir 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos.** „Metafenex“ skirtas trumpalaikiam lengvo ar vidutinio stiprumo skausmui, siejamam su migrena, galvos skausmu, nugaros skausmu, mėnesinių skausmu, dantų skausmu, reumatiniu bei raumenų skausmu, nestipriu artrito skausmu, peršalimo ir gripo simptomais, gerklės (ryklės) skausmu bei karščiavimu, malšinti. Šis vaistinis preparatas ypač tinka skausmui, kuriam reikia stipresnės analgezijos nei vartojant vien ibuprofeną ar paracetamolį. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems gerti po 1 tabletę ne dažniau kaip 3 kartus per parą valgio metu užgeriant vandeniu. Tarp dozių išlaikyti ne mažiau kaip 6 valandų tarpą. Jei, vartojant po 1 tabletę, simptomai neišnyksta, daugiausia galima vartoti po 2 tabletes ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių per bet kurį 24 valandų laikotarpį. „Metafenex“ negalima vartoti ilgiau kaip 3 dienas. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų asmenims. **Kontraindikacijos.** Šio vaistinio preparato vartoti negalima pacientams, kuriems yra padidėjęs jautrumas ibuprofenui, paracetamolui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio ar kitų NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius ir didesnes kaip 75 mg acetylsalicilo rūgšties paros dozes; jei anksčiau buvo padidėjusio jautrumo reakcijų, susijusių su acetylsalicilo rūgštimi arba kitais nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo; jeigu anksčiau buvo aktyvi arba buvusi pasikartojanti peptinė opa; buvo ar yra virškinimo trakto išopėjimas ir (arba) ar jo prakiurimas ar kraujavimas, susijęs su ankstesniu gydymu NVNU. Pacientams, kuriems yra kraujo krešėjimo sutrikimų; kuriems yra sunkus kepenų, inkstų arba širdies nepakankamumas. Negalima vartoti paskutinio nėštumo trimestro metu. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Būtinas ypatingas atsargumas: jei pacientas serga infekcine liga, pacientas yra senovo amžiaus; serga ar anksčiau sirgo astma; yra inkstų, širdies, kepenų arba žarnyno sutrikimas; serga sisteminė raudonoji vilkligė; yra virškinimo trakto sutrikimų arba lėtinė uždegiminė žarnyno liga; pacientė neščia pirmuosius 6 nėštumo mėnesius arba žindė. Reklamos teksto parengimo data 2026-02.

SKAUSMĄ KEISKI „METAFENEX“!

4⁹⁹ €



ACETERIN EXPRESS, 10 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės simptomams palengvinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vyresniems kaip 12 metų asmenims – po 1 tabletę per dieną, 6–12 metų vaikams – po pusės tabletės 2 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pagalbinei medžiagai, hidroksizinui arba bet kuriam piperazino dariniiui. Pacientai, kuriems smarkiai sutrikusi inkstų funkcija. **Specialūs įspėjimai:** atsargiai vartoti sergantiems epilepsija ir pacientams, kuriems yra traukulių pavojus; „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. B52601069674. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

Skausmui malšinti

3⁹⁹ €



DICUNO, 25 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: diklofenako kalio druska, 25 mg. **Terapinės indikacijos:** simptominiams ūminio silpno ir vidutinio stiprumo skausmo gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems rekomenduojama dozė yra 25–50 mg (1–2 tabletes). Vartoti ne daugiau kaip 150 mg (6 tabletes) per parą. Tabletes nurykite užgeriant stikline vandens. Tablečių negalima vartoti su maistu ar iškart po jo. **Kontraindikacijos:** „Dicuno“ vartoti draudžiama: jeigu yra alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu Jums kada nors buvo ar yra skrandžio ar žarnyno opa; jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto arba jo prakiurimas dėl skausmą mažinančių vaistų vartojimo (NVNU), (du ar daugiau patvirtintų opų ar kraujavimo atvejų); jei yra padidėjęs polinkis kraujuoti; jeigu yra labai sutrikusi kepenų funkcija; jei sergate porfirija (medžiagų apykaitos liga); jeigu Jums nustatyta širdies liga ir (arba) galvos smegenų kraujagyslių liga, pavyzdžiui, jeigu Jūs patyrėte širdies smūgį, insultą, „mikroinsultą“ (praeinantį smegenų išemijos priepuolį) arba Jums buvo užsikimšusios širdies ar galvos smegenų kraujagyslės, arba Jums buvo atlikta operacija siekiant išvalyti arba šuntuoti užsikimšusias kraujagysles; jeigu Jums yra arba anksčiau buvo sutrikusi kraujotaka (periferinių arterijų liga); jeigu sergate sunkia inkstų liga; per paskutinius tris mėnesius; jei pacientas yra jaunesnis kaip 18 metų; jei manote, kad Jūs galite būti alergiškas (–a) diklofenako kalio druskai, aspirinui, ibuprofenui arba kuriam nors kitam nesteroidiniam vaistui nuo uždegimo arba bet kuriai pagalbinei „Dicuno“ medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš pradėdami vartoti „Dicuno“, jeigu sergate arba esate sirgę bet kuria iš toliau išvardintų ligų: uždegiminė žarnų liga (opinis kolitas, Krono (Crohn) liga), astma, širdies liga, kepenų ar inkstų liga; lėtinė obstrukcinė plaučių liga arba lėtinis kvėpavimo takų uždegimas (ligos, kurios sukelia kvėpavimo takų susiaurėjimą ir oro praeinamumo apribojimą, apsunkinantį kvėpavimą), nosies gleivinės uždegimas, sisteminė raudonoji vilkligė (jungiamojo audinio liga), dilgėlinė arba angioneurozinė edema (periodiškai pasireikiantis vietinis tinimas), ligos, sukeliančios padidėjusį polinkį kraujuoti; kepenų porfirija (medžiagų apykaitos liga); jeigu pavartojus „Dicuno“ arba kitų vaistų nuo skausmo, Jums kada nors yra pasireiškęs sunkus odos bėrimas arba lupimasis, ant odos atsirado pūslių ir (arba) burnos ertmėje atsirado opa; jeigu esate neščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate neščia, arba planuojate pastoti. Reklamos teksto parengimo data: 2026-05-14.

Pagalba nuo
viduriavimo

4⁴⁹ €



LOPEDIMUM EXPRESS, 2 mg, 10 kietųjų kapsulių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: vienoje kapsulėje yra 2 mg loperamido hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** simptominiams suaugusiųjų ir vyresnių kaip 12 metų paauglių ūminio viduriavimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** iš pradžių reikia gerti 2 kapsules, vėliau (po kiekvieno išsistūtinimo bėloformės išmatomis) – po 1 kapsulę. **Kontraindikacijos:** nevartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliajai ar pagalbinei medžiagai, jeigu yra bakterijų sukeltas žarnyno uždegimas. **Specialūs įspėjimai:** jei per 48 val. po vaisto išgerimo viduriavimas nesusilpnėja, jo vartojimą reikia nutraukti ir kreiptis į gydytoją. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El.pastas: info.lithuania@sandoz.com. B52601069674. Reklamos teksto parengimo data: 2026-01-06.

1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra
pigesnė arba
tokia pati —
NEMOKAMAI!



ACONITUM

MAISTO PAPILDAI

MAISTO PAPILDAI
ACONTINUO nuo 1999 metų kuria ir gamina augalinius vaistus, maisto papildus ir biomedicininis preparatus. Kiekviena formulė gimsta iš žinių, patirties ir atsakingo požiūrio į žmogaus sveikatą. o kokybę užtikrina griežti Geros gamybos praktikos (GMP) standartai ir nuosekli žaliavų kontrolė.

KŪNAS PRAŠO. MĒS PADEDAME

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

-35%



VIZIK

ALLERGY, 10 ml ~~16⁹⁷~~ 11⁰³ €

Pavargusioms ir sausoms akims, 10 ml **13⁹⁷ 908 €**
Sudirgusioms ir paraudusioms akims, 10 ml **13⁴⁷ 876 €**

MEDICINOS PRIEMONĖS

Re konservantu

ATIDARĪJS BIETEĻI KIŅĪS GAJUMA NAUDOTI NET VIENERĪJS METĪSI!

■ NUO SKAUSMO

NUO **6⁹⁹** €



QLEEN®

140 mg, 2 vaistiniai pleistrai **6⁹⁹ €**
140 mg, 5 vaistiniai pleistrai **11⁹⁹ €**
140 mg, 10 vaistinių pleistru **19⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Vēlējoties medzāga, stiprums: Vairāsimie pleistrie var 140 mg diklofenāku nātrio druskas. **Terapīnīs indikācijās:** lokāus sākusmo, sukelto (pvz., sporta traumas) del' oīmāus sākusmā, rāišū, sāņāu ar skaudumu pāņempmo, sumšums ar sāņānu pārimo, mālšmāms. **Dozāzīmīs ir varjotlmo metods:** sākusmāzīmīs i vāstīm pleistā rēķā pārijūoti ar skaudum vāzēms 2 kartus pā diēnā – rēķā ir vakarē. Māksmāli diēnos dēvā 2 vāstīm pleistā, nekā jēgu pāzēsta dāgu nē viēnā vāzē. Viēn mē gūdomā tik viēnā pāzēstā vāzē. Naudoti ant odes. Pleistās nēsturu bū dālijāms. Pleistā rēķā, pleistās pāri skaudums vāzē gāl bū pārijūotāms elastīnu stiprūmā. Gūdomā nē ilgāu kāp 7 diēnos. „Ofīnē” pleistā jāusmēns kāp 15 m, pāzēstā naudoti nērekemdojuma. **Kontrāindikācijās:** pādējēs Jāusmēns vēklājā ar bū kural pāgalimē medzāgā bū kītēms sākusmā ir udegimā slopānētēms nēsteroīdāms vāstīmāms pāparāms (NVNU) arā acetilsalicilā rūgštiā; astma, dilgēlne ar īmūnis rāisū, kēi pāzēstē pāvarjots acetilsalicilā rūgšties arā kāl NVNU; astma skandzo ar žārnū pā; atvīrs zābēds, nūdegimā, odes infekcijs ar egzēmā; pāskūstinā tū nēstūmē mēdāms. **Specialīs pējāmē:** jēgu simpotāli ilgāu kāp 3 d. arā pābēgē, rēķā kreipīs i gūdytōjā. Pācentims, kūrē sērgā ar ankāsiu žārnū bīronchīne astmā arā alērgijom, gāl būdū bronchū spāzēm. Jēgu pāvarjotus pleistā (pāstā) dāgu nēstūmē šēbīrnū, gūdyām rēķā nēdēsiu nūtraktū. Gūdyām vāzē rēķā sāusī gūdo nē tēsiogū sāusīs s ultravioletoji solāriūmū spindulī 1 diēnā, kād nēpārēskūt pādējēsu jūgām vāzēi rēķāzē. Vāstīm pāparāzā āsārgāi tū rāudoti pācentim, kūrē īnkstū, kēpēn ar šērdies funkcijā arā sūfruksi arā jēgu pāzēstē bū pēpsnē odu, žārnū udegimā ar ā pōlīnks kārjotū. Pāparāzā āsārgāi rēķā naudoti sēnviēms pācentims, nē sū dēisnē nēpādejamāo pōvēcio pāvojūs. Sūdēms ēastys propienglīnēkīs ir būtilidolizētojlēnā gāl sukelti lokāli vīetiņū odes reakcijs (pvz., kontaktī dermatitā) ar sūdrināti ālīs i dēlvēnē. **Rēķāms tekst pāreimā odu 2025-01-22, OL-01-00048**

TEISINGAS ĖJIMAS KOVOJANT SU SKAISMII!

NUO **3⁹⁹** €



IBUPROM EXPRESS

400 mg, 10 minkštųjų kapsulių **3⁹⁹ €**
400 mg, 20 minkštųjų kapsulių **4⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

[illegible]

BENKIOSI „IRIPROM“ BENKIOSI LAISVE

NUO **5⁹⁹** €



OTRIVIN


1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml **5⁹⁹ €**

MENTHOL, 1 mg/ml nosies purškals (tirpalas), 10 ml 6⁹⁹ €

NERCEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

[illegible]

NUO **2⁹⁹** €



THROMBO ASS

50 mg, 100 skrandyje neirių tablečių 2⁹⁹ €
75 mg, 100 skrandyje neirių tablečių 3⁹⁹ €
100 mg, 100 skrandyje neirių tablečių 4⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklijoji medžiaga: acetilsalicilo rūgštis. **Terapinės indikacijos:** miokardo infarkto rizikos mažinimas sergantiesiems krūtinės angina. Antrinė miokardo infarkto profilaktika. Trombozės profilaktika po vainikinių arterijų nuosėdų operacijos. Antrinė prienaičių smegenų išemijos priešlaikio (PSIP) ar insulto profilaktika. **Varijomo būdai ir dozavimas:** vartoti po 1 tabletę 1 kartą per dieną (pašarima vakare). Skrandinę veikliąją medžiagą nuryti nesukramtyti, užgerti pakankamu kiekiu kalcio valgomu arba arba valgyti tu pačiu paros metu. Įprastinė paros dozė ilgalaikiai vartojimui yra 50–150 mg, dalyje / dalis „Thrombo ASS“ skrandinę veikliąją medžiagą, nes bus pažeista skrandinė ir net plevė. Norint, kad būtų individualiam vartojimui, reikia rinktis atitinkamo stiprumo preparatą (50 mg, 75 mg ir 100 mg). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbini medžiagai bet salicilatams ir kitoms NMO; bronchių spazmas; ūminė pepsinė opa; polinkis į kraujavimą, hemofiliją; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; sunkus, nepakankamai kontroliuojamas širdies nepakankamumas; nėštumas; vaikai ir paauguliai iki 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Atsargumo reikia laikyti šiais atvejais: sergant bronchine astma, šienlige, esant netiesioginėms gleivinės paburkimams ir esant kito pobūdžio alergijai; vartojant kartu su vaistais, mažinančiais kraujo krešumą; sergant hemofiline anemija; esant skrandžio ir žarnų sutrikimams, esant anamnezėje duomenims apie opalę ar kraujavimą iš virškinimo trakto; esant inkstų ligoms ir (arba) kepenų funkcijos sutrikimui; turintiems polinkį podagrai. Pristatymą operacijai 10 dienų acetilsalicilo rūgšties reikia nevartoti. Šio vaisto vartojimą yra laikoties monohidratu, todėl negalima vartoti pacientams, kuriems nustatyta lėta cukrinė stovykla ar gliukozės ir galektokso malabsorbcija. Pakuotė 50 mg, 75 mg arba 100 mg; 100 skrandinę veikliąją tablečių. **Reklamodaros teisės turėtojas ir gamintojas.** G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria. **Teksto peržiūros data:** 2020.05.15, Reikiamas neringdoma data: 2026.10.10.

NUO **6⁹⁹** €



MAGNE B6

geriamasis tirpalas, 10 paketėlių po 10 ml **6⁹⁹** €
geriamasis tirpalas, 10 ampulių po 10 ml **6⁹⁹** €
470 mg/5 mg, 60 dengtų tablečių **8⁹⁹** €

NERECIPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 tablete yra 470 mg magnio laktato dihidrato bei 5 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6); 10 ml ampulėje arba paketėlyje yra 186 mg magnio laktato dihidrato, 956 mg magnio pidolato, 10 mg piridoksino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** „Magne B6“ skirtas magnio trūkumo sukeliamiems simptomams gydyti. Magnio trūkumas gali sukelti tam tikrus simptomus ar jų derinius: nervingumą, irzlumą, nedidelį nerimą, trumpalaikį nuovargį, nedidelius miego sutrikimus: mėšlungį, dilgčiojimo pojūtį. **Vertojimo būdas ir dozavimas:** tabletes reikia nuryti užgeriant stikline vandens. Suaugusiems paros dozė yra 6–8 tabletės, kurias reikia išgerti per 2–3 kartus valgiams. Vaikams paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno svorio. Geriamojo tirpalo ampulės arba paketėlio turinys ištrinamas pusėje stiklinės vandens. Suaugusiems paros dozė yra 3–4 ampulės arba paketėliai, kuriuos reikia išgerti per 2–3 kartus tarp valgių. Vaikams ir kūdikiams, sveriantiems daugiau kaip 10 kg, paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno svorio arba 1–4 ampulės arba paketėliai per 2–3 kartus tarp valgių. **Kontraindikacijos:** preparato vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei, „Magne B6“ medžiagai; sergate tam tikra inkstų liga; vartojama levodopa. **Specialūs įspėjimai:** nešumti ir žindymo laikotarpiu vaista galima vartoti tik tada, jei nurodo gydytojas. „Magne B6“ dengtosios tabletės skirtos suaugusiems žmonėms ir vyresniems nei 6 m. vaikams. „Magne B6“ geriamojo tirpalo negalima duoti mažiau kaip 10 kg sveriantiems (iki 1 m.) kūdikiams. Jeigu sergate inkstų, širdies ir kraujagyslių liga, prieš pradėdami vartoti „Magne B6“ preparatą, reikia pasitarti su gydytoju. Piktnaudžiaujant vitaminu B6, pakenkiami jutiminiai periferiniai nervai: atsiranda tirpimas ir padėties jautimo pablogėjimas, galūnių drebulys ir koordinacijos sutrikimų. Nustojus vartoti vaistą, pažeidimai paprastai išnyksta. Reiklamos tekstų parengimo data 2024-08. 2610_SB_Magne_B6_V01_LT

„MAGNE B6“ PADĖS ĮVEIKTI MAGNIO TRŪKUMĄ!

SKAUSMUI, TINIMUI IR UŽDEGIMUI MAŽINTI

8⁹⁹ €



DIFORTAN, 100 mg/g, gelis, 100 g

NERECIPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: kiekviename „Difortan“ gelio grame yra 100 mg etofenamato. **Terapinės indikacijos:** lengvų arba vidutinio stiprumo raumenų skausmų, kraujosruvų, potrauminio skausmo, lengvo arba vidutinio stiprumo raumenų skausmo (osteoartrito / osteoartrito), lengvo arba vidutinio stiprumo sąnarių skausmo, sinovito, (neinfekcinio) artrito, bursto, tendinito, vidutinio sunkumo su raumenų ir skeleto sistema susijusio uždegimo, t. y. potrauminio ar reumatinės kilmės, lokalus gydymas. **Vertojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems kasdien 3–4 kartus per parą, 14 parų, dozės kiekis atitinka nuo 2,5 iki 5 cm išpauso gelio. **Kontraindikacijos:** vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai ar ant egzemos pažeistų paviršių, atvirų žaizdų, vietų su opomis ar pažeidimais. **Specialūs įspėjimai:** „Difortan“ negalima tepti ant gleivinių arba ant akių. Galimas padidėjęs jautrumas dėl kryžinės reakcijos su kitais uždegimus mažinančiais vaistais: preparatais rizikos. Kontaktinės fotoalergijos rizika, todėl saugoti nuo saulės spindulių. Negalima atlikti sisteminio poveikio reikšminių galimybių, todėl pacientams, kuriems yra inkstų ar kepenų nepakankamumas, šį vaistinį preparatą reikia vartoti atsargiai. Pasitarti su gydytoju, jeigu būklė nepagerėja arba jei per 7 parų būklė pablogėja. Reiklamos tekstų parengimo data 2025-05-19.

AKIŲ LAŠAI

-40%



SYSTANE

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Systane“ Balance“ drėkinamieji akių lašai yra skirti laikinai palengvinti deginimo ir dirginimo pojūčius asmenims, kuriems pasireiškia akių sausumo simptomai. „Systane“ Balance“ drėkinamieji akių lašai padeda išlaikyti riebalinį sąsūrį pleveles sluoksnį ir sąsūrį pleveles stabilumą. „Systane“ Ultra MDPP“ drėkinamieji akių lašai BE KONSERVANTŲ apsaugo akies paviršių, palengvina akių sausumo simptomus ir pagerina matomo vaizdo ryškumą, padeda palaikyti kontaktinių lęšių drėgnumą ir juos drėkina. GREITAS SAUSŲ AKIŲ SIMPTOMŲ LENGINIMAS. „Systane“ Hydration MDPP“ drėkinamieji akių lašai BE KONSERVANTŲ, su hialuronu rūgštimi. „Systane“ Hydration MDPP“ drėkinamieji akių lašai apsaugo akių paviršių, pagerina matomo vaizdo ryškumą ir sąsūrį suvalkmyti akies paviršiuje, drėkina, suteipa ir apsaugo kontaktinius lęšius. ILGALAIKIS SAUSŲ AKIŲ SIMPTOMŲ PALENGVINIMAS. „Systane“ Gel Drops“ drėkinamieji geliniai akių lašai suteipa akies paviršių, kad apsaugotų nuo pažeidimų, kuriuos sukelia sausi akių simptomai. INTENSIVUS akių sausumo simptomų lenkinimas.

*Akių lašai laikomi geltona etikete pažymėtomis priemonėmis

6⁹⁹ €



THERAFLU

ND, 1000 mg/60 mg/30 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 6 paketėliai
NT, 1000 mg/60 mg/30 mg/4 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 6 paketėliai

NERECIPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Terapinės indikacijos. „Theraflu ND“: persalimo sukeltų simptomų (skausmo, nosies gleivinės užburkimo ir sekrecijos, čiaudulio, erzinančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. „Theraflu NT“: persalimo sukeltų simptomų (skausmo, nosies gleivinės užburkimo ir sekrecijos, čiaudulio, erzinančio kosulio, akių ašarojimo ir niežėjimo bei karščiavimo) lengvinimas. **Vartojimas.** Suaugusiems žmonėms bei 16 m. ir vyresniems paaugliams: gerti po 1 pak. kas 6 val. pagal poreikį. Negalima vartoti daugiau kaip 4 pak. per 24 val. Gydymo trukmė neturi viršyti 3 parų. 1 pak. turinį ištrinti stiklineje karšto, tačiau ne verdančio vandens (maždaug 250 ml). Vartoti per burną. **Kontraindikacijos.** Alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, jei vartojate ar per pastarąsias 2 sav. vartojote vaistų nuo depresijos arba Parkinsono ligos, vadinamųjų MAOI, vartojate kitų simpatomimetikų, yra uždaros kampo glaukoma (padidėjęs akispūdis), nešumti laikotarpiu. „Theraflu ND“: labai aukštas kraujospūdis, širdies kraujagyslių liga, sunkus inkstų veiklos sutrikimas, yra kvėpavimo nepakankamumas, plaučių liga ar astmos priepuolis, jei vartojate oksazolidinono klasės antibiotikų, žindymo laikotarpis. „Theraflu NT“: sunki širdies liga, kepenų ar inkstų veiklos sutrikimas. **Specialūs įspėjimai.** Nevartoti kitų vaistų, kuriuose yra paracetamolio. Nevartoti alkoholio. Pasitarti su gydytoju, jei yra inkstų ar kepenų liga, lėtinis alkoholizmas, gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės nepakankamumas, padidėjęs širdies ritmas, aukštas kraujospūdis, padidėjęs skydlaukės aktyvumas, cukrinis diabetas, padidėjusi prostata, psichikos liga, kosulys su dideliu kiekiu skreplių, lėtinis kosulys, aukšta temperatūra, išbėrimas, pastovus galvos skausmas, jei vartojate vaistų nuo depresijos ar psichozų, netekus kšysčių ar badaujant. Pasireiškus karščiavimui ir išplitusiai raudonei su smulkiais pūlinėliais, staigiam pilvo skausmui, kraujavimui iš tiesiosios žarnos ar kitiems išeminio kito simptomams, likus kelioms dienoms iki operacijos, būtina nutraukti vaisto vartojimą ir kreiptis į gydytoją. Gali sukelti priklausomybę. Sudėtyje yra aspartamo ir sacharozės. „Theraflu ND“: pasitarti su gydytoju, jeigu yra širdies liga ar antinksčių auglys, vyresniems nei 60 m. žmonėms. Pasireiškus stipriam galvos skausmui, pykinimui, vėmimui, regėjimo sutrikimams, būtina nutraukti vaisto vartojimą. „Theraflu NT“: pasitarti su gydytoju, jeigu yra kvėpavimo nepakankamumo pavojus, hemolizavė anemija. Daugiau informacijos pateikta šių vaistų pakučių lapeliuose. Teksto parengimo data 2024 m. Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi jų licenciją. ©2024 HALEON arba licencijos turėtojas.

ODAI IR PLAUKAMS

-20% **50^{39€}** ~~62^{99€}~~



BEOTEBAL HAIR & SKIN COLLAGEN BOOSTER, 30 paketėlių

MAISTO PAPILDAS

Augininės kilmės prokolagenas su vitaminu C padeda palaikyti normalų kolageno, reikalingo normaliai odos funkcijai, susidarymą. Klinikiniais tyrimais įrodytas efektyvumas: rauskulių sumažėjimas iki 22 % jau po 4 savaitių vartojimo. Į sudėtį įtrauktas patentuotas kompleksas „VeColla™“, kuriame yra 19 aminorogščių, vitaminų C, kitių žiniamų šaknų ir azijinių centelių lapų ekstraktų. Dėl biometilinių savybių jis yra suderinamas su natūraliu odos kolageno. „VeColla™“ apgripina organizmą 19 aminorogščių, kurios yra būtinos I tipo kolageno gamybai žmogaus organizme. Dėl mažos molekulinės masės yra lengvai pasisavinamas. Produkto sudėtyje esantis biotinas padeda palaikyti normalią plaukų ir odos būklę, 100 % veganškas, be gyvūninės kilmės alergenų, be cukrus.

100 % VEGANŠKAS PROKOLAGENAS ODAI IR PLAUKAMS.

SLENKA PLAUKAI?* PASITIKĖK VAISTO GYDOMĄJĄ GALIĄ!

NUO **9⁹⁹** €



BEOTEBAL

10 mg, 30 tablečių **9⁹⁹** €
10 mg, 60 tablečių **19⁹⁹** €

NERECIPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

BEOTEBAL 10 mg tabletes. **Kokybinė ir kiekybinė sudėtis.** Kiekvienoje tablete yra 10 mg biotino. **Terapinės indikacijos.** „BEOTEBAL“ priklauso B vitaminų preparatų grupei ir vartojamas biotino trūkumo gydymui suaugusiems. Biotino trūkumas gali sukelti plaukų retėjimą, plaukų skilimą, nagų ir plaukų augimo sutrikimus bei padidėjusį trapumą, dermatitą (odos uždegimą, kuriam paprastai būdingas niežulys ir paraudimas) aplink akis, nosį, burną, ausis ir kirkšnį, konjunktyvitą (akies junginės uždegimą, dėl kurio akys atrodo paraudusios), nuovargio, parestezijos (nenormalaus odos pojūčio, pasireiškiančio tokiais simptomais kaip dilgčiojimas, peršėjimas, šalimas, deginimas, tirpimas) simptomus. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems, įskaitant senyvus pacientus, vartoti 10 mg biotino, t. y. 1 tablete „BEOTEBAL“ per parą. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu yra numatoma atlikti laboratorinius tyrimus, turite pasakyti savo gydytojiui arba laboratorijos darbuotojams, kad vartojate arba neseniai vartojote „BEOTEBAL“, nes biotinas gali turėti įtakos tokių tyrimų rezultatams. Atsivėlėjant į tai, koks tyrimas atliekamas, dėl biotino poveikio tyrimų rezultatai gali būti klaidingai didesni arba klaidingai mažesni. Reiklamos tekstų parengimo data 2026.06.

*Slenkantys, silpni, trapūs plaukai yra viena iš biotino trūkumo išraiškų. „Beotebal“ yra neregistruotas vaistas skirtas biotino trūkumo gydymui.

NUO 2⁹⁹ €**NEUROMULTIVIT**20 plėvele dengtų tablečių 2⁹⁹ €
100 plėvele dengtų tablečių 14⁹⁹ €**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Indikacijos: „Neuromultivit“ yra vitamino B1, vitamino B6 ir vitamino B12, kurie yra ypač svarbūs užtikrinant normalias nervų sistemos medžiagų apykaitos funkcijas, derinys. Vartojant nervų sistemos ligų gydymui B grupės vitaminai atstato jų stoką organizme ir skatina nervinio audinio natūralų gijimo procesą. „Neuromultivit“ vartojamas esant B grupės vitaminų stokos sukeltiems negalavimams. Vitaminas B1 pasižymi skausmą malšinančiu poveikiu. **Vartojimas:** rekomenduojama dozė yra viena tabletė kartą per parą. Pavieniais atvejais paros dozė galima padidinti iki 3 tablečių. Tabletes reikia nuryti nesukramtytas po valgyto ir užsigerti truputį skysčio. **Kontraindikacijos:** retai pasitaiko nespecifinių požymių – vėmimas, galvos skausmas ir svalgulys. Mažiau tikėtinos padidėjusio jautrumo reakcijos, kurios vartojant vitaminus B1 arba B12 dažniausiai reiškiasi požymiais odos. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Neuromultivit“ vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas vitaminui B1, vitaminui B6, vitaminui B12 arba bet kuriai pagalbinei „Neuromultivit“ medžiagai. Negalima vartoti vaikams ir paaugliams (jaunesniems negu 18 metų) dėl per didelio veikliųjų medžiagų kiekio. Nedelsiant pranešti gydytojui, jei yra kontraindikacijų vaisto vartojimui, atsirado šalutinio poveikio požymių ar pastojote. Reikėtų vengti vartoti dideles vaisto dozes ilgiau nei 4 savaites. Vitaminas B6 gali sumažinti kartu vartojamos L-dopos poveikį. **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:** G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. **Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį RTT atstovą:** UAB „GL Pharma Vilnius“, A. Jakšto g. 12, Vilnius, tel. (8 5) 261 0705, el. paštas: office@gl-pharma.lt; www.gl-pharma.lt **Reklamos teksto parengimo data:** 2026 10 09.

NUO 5⁹⁹ €**TONZIRIN**8,75 mg, 12 kietųjų pastilių 5⁹⁹ €
8,75 mg, 24 kietosios pastilės 10⁹⁹ €**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

TONZIRIN 8,75 mg kietosios pastilės yra flurbiprofeno. Flurbiprofenas priklauso vaistų, kurie vadinami nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU), grupei. Šie vaistai pasižymi skausmą ir karščiavimą mažinančiu bei prieš uždegiminiu poveikiu. TONZIRIN kietosios pastilės yra vartojamos skaudančios gerklės simptomams palengvinti, tokiems kaip gerklės skausmas, skausmumas ir patinimas, sunkumas nuryti, suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams. Jei po 3 dienų ligos požymiai išlieka ar pasunkėja, kreipkitės į gydytoją. Prieš pradėdami vartoti TONZIRIN, turite atidžiai perskaityti informacinį lapelį. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti TONZIRIN. TONZIRIN vartoti draudžiama: - jeigu yra alergija; jeigu kada nors buvo pasireiškusi astma, netikėtas švokštimas ar dusulys, sloga, veido patinimas ar niežintis bėrimas (dilgėlinė) pavartojus aspirino ar kitų NVNU; - paskutiniuosius 3 mėnesius; - jeigu Jums yra ar kada nors buvo pasireiškę sunkių širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų. Vairavimas ir mechanizmo valdymas. Tyrimų poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus nebuvo atlikti. Tačiau svai gulys ir regos sutrikimai yra galimi šalutiniai poveikiai pavartojus nesteroidinių vaistų nuo uždegimo. Jeigu tokių pasireišimų, nevairuokite ir nevaldykite mechanizmo. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: viena kietąją pastilę įsidėkite į burną ir lėtai išplaukite. Čiulpimo metu nuolat judinkite kietąją pastilę burnos ertmėje. Pastilių gydymas poveikis turėtų pasireikšti po 30 minučių. Jeigu reikia, vartokite po vieną pastilę kas 3-6 valandas. - Vartoti daugiau kaip 5 kietąsias pastiles per 24 valandas negalima. Jaunesniems kaip 12 metų vaikams vartoti negalima. **Nutraukite šio vaisto vartojimą ir nedelsiant susisiekite su gydytoju, jeigu Jums pasireiškia:** alerginės reakcijos, veido, liežuvio ar gerklės patinimas, širdies ritmo padidėjimas ir kraujospūdžio sumažėjimas, sunkios odos reakcijos. **Tekstas paskutinį kartą peržiūrėtas 2025-08-08**

AKIŲ DIRGINIMO, AŠAROJIMO, PERVARGIMO, VOKŲ KRAŠTŲ UŽDEGIMO LENGVINIMAS11⁹⁹ €**OCULOHEEL**

akių lašai (tirpalas), 3 paketai po 5 viendozes talpykles

HOMEPATINIS NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 talpyklėje (0,45 ml tirpalo) yra veikliųjų medžiagų: *Euphrasia* D5 110,7 mg, *Cochlearia officinalis* D5 110,7 mg, *Pilocarpus* D5 110,7 mg, *Echinacea* D5 110,7 mg. **Terapinės indikacijos.** Akių dirginimo, ašarojimo, smėlio akys pojūčio, pervargimo, jautrumo šviesai ir vokų kraštų uždegimo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Vaikams nuo 6 m. ir suaugusiems žmonėms paprastai reikia lašinti į pažeistą akį po 1 lašą 3 kartus per dieną. Jei vartojama ir kitokių akių lašų, tarp jų ir „Oculoheel“ akių lašų vartojimo rekomenduojama daryti 15 minučių pertrauką. Kadangi šio vaistinio preparato sudėtyje yra ežiulės (*Echinacea*), prieš skiriant jį ilgesniam kaip 8 savaitų laikotarpiui, rekomenduojamas individualus įvertinimas. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, arba astriinių (graizdžiedžių) šeimos augalams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** **Pagalbinės medžiagos.** Fosfatiniai buferiai. Kiekvienoje šio vaistinio preparato viendozėje talpyklėje yra 2,81 mg fosfatų, tai atitinka 6,25 mg/g. Kadangi šio vaistinio preparato sudėtyje yra ežiulės (*Echinacea*), prieš skiriant jį pacientams, turintiems imunitinės sistemos funkcijos sutrikimų (pvz., progresuojančių sisteminių sutrikimų, autoimuninių ligų, imunodeficitų, imunosupresijos ir baltųjų kraujo ląstelių sistemos ligų atvejais), rekomenduojamas individualus įvertinimas. Talpyklės turinį galima vartoti tik 1 kartą, t. y. kartą įlašinti į kairiąją ir (arba) dešiniąją akį tiek, kiek reikia. Talpyklę reikia atidaryti tik prieš pat vaisto vartojimą. Naudotą talpyklę reikia išmesti, net jeigu joje yra vaistinio preparato likučių. **Registruotojas.** „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). **Registruotojo atstovas.** UAB „Farmahelis“. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-06-16.

TENA**SAUSKELNĖS, ĮKLOTAI, PAKLOTAI IR KOSMETIKA**

Paikimos, odos sveikatą užtikrinančios TENA sauskelnės, įklotai ir paklotai greitai sugeria šlapimą, apsaugo nuo pratekėjimo ir nemalonaus kvapo. Papildomai naudojamos TENA odos priežiūros priemonės padeda pasirūpinti odos švara, higiena ir pragulų profilaktika.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

SAŃARIAMS, SMEGENŲ VEIKLAI, GERAM MIEGUI, GROŽIUI

-50%

**GREENIFY****MAISTO PAPILDAI**

„Greenify“ – tai, ko reikia grožiui ir gerai savijautai: išgryninta sudėtis, efektyvus įsisavinimas, patogus vartojimas.

„Collagen Beauty Shots“ – pažangiu formulę švytinčiai odai, ląstelėms atsinaujinti, sveikam ir tolygiam odos spalvos tonui (odos pigmentacijai).

„Deep Sleep Shots“ – kokybiškam miegui: padeda greitai užmigti, atsipalaiduoti, giliai miegoti.

„Collagen Joints Shots“ – naudinga formulė sąnariams, lengvam judėjimui.

„Brain Booster Shots“ – kasdieniam protiniam pajėgumui: augalinį ekstraktų ir folio rūgšties formulę, padedanti palaikyti normalią atmintį, susikaupimą ir mažinti nuovargį.

„GREENIFY“ – IŠGRYNINTA TAVO KASDIENYBĖ.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

-40%

**GRINTUSS**ADULT, 20 tablečių 20⁹⁹ 12⁵⁸ €ADULT, sirupas, 180 ml 48⁹⁹ 11³⁸ €PEDIATRIC, sirupas, 180 ml 48⁹⁹ 11³⁸ €**MEDICINOS PRIEMONĖS**

Mašina kosuliui, saugo gleivinę, 100 % natūrali, biologiškai skaidi. Su sudedamosiomis dalimis iš ekologinio ūkio.

„Grintuss Pediatric“ – sirupas vaikams nuo 1 metų, „Grintuss Adult“ – sirupas ir tabletės, skirti vaikams nuo 12 m. bei suaugusiems.

„Grintuss“ – vienas produktas visų rūšių kosuliui: ūminiam, krūtininiam, sausam ir lėtiniam.

Gamintojas: „Aboca S.p.A. Società Agricola“, Italija.

Ila klases medicinos priemonė

NUO 9⁹⁹ €



DICLAC

5 % gels, 100 g 9⁹⁹ €
5 % gels, 150 g 14⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: g. Diclac 5 % gels yra 50 mg diklofenako natrio druskos. **Terapinės indikacijos:** lokaliams skausmui malšinti, uždegimui slopinti ir patinimui mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** Diclac 5 % gels sluoksni tepti 2 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** jautrumas diklofenakui ar pagalbinėms medžiagoms, jaunesni kaip 14 m. vaikai, 3 paskutiniai nėštumo mėnesiai. **Specialūs įspėjimai:** negalima tepti burnos, nuryti. Sandoz Pharmaceuticals d.d. filialas, Ulpės g. 21-1, LT-0128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. B52610169663. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

STIPRUS AKTIURTIS SKAUSMUI!

NUO 2⁴⁹ €



IBUPROFEN LANNACHER

400 mg, 10 plėvele dengtų tablečių 2⁴⁹ €
400 mg, 20 plėvele dengtų tablečių 3⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 400 mg ibuprofeno. **Indikacijos:** „Ibuprofen Lannacher“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos ibuprofeno. Ibuprofenas malšina uždegimo sukeltą skausmą, patinimą ir karščiavimą, vartojamas trumpą laiką silpno ar vidutinio stiprumo skausmui, tokiam kaip mėnesinių, galvos, dantų, raumenų, sąnarių, malšinti. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** tabletes reikia nuryti valgio metu arba pavėlyj, užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: 0,5–1 plėvele dengta tabletė 3 kartus per parą. Negalima viršyti didžiausios paros dozės 1200 mg ibuprofeno (3 plėvele dengtų tablečių). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijų, vartojant kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo, acetylsalicilo rūgšties darinius. Sunkus kepenų, inkstų ar širdies funkcijos nepakankamumas. Paskutinių trijų nėštumo mėnesių laikotarpis. Pepsinė opa. Kraujavimas į smegenis, virškinimo trakto arba kt. Sisteminė raudonoji vilkligė. Jaunesni nei 12 m. vaikai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai skirti pacientams, sergantiems širdies ir kraujagyslių, smegenų kraujagyslių ligomis, cukriniu diabetu ir jungiamąjo audinio ligomis, senyviems pacientams. Pacientams, sergantiems bronchine astma ar alerginėmis ligomis, gali išsivystyti bronchų spazmas. Virškinimo trakto sutrikimai ir lėtinės uždegiminės žarnyno ligos gali paūmėti. Atsiradus virškinimo trakto kraujavimui ar išopėjimui, gydymas turi būti nedelsiant nutrauktas. Vartojimas gali mažinti moters vaisiingumą. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Pakuotė:** 10 ir 20 plėvele dengtų tablečių. **Farmakoterapinė grupė:** nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo. **ATC kodas:** M01AE01. **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:** „G.L. Pharma GmbH“, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. **Paskutinio teksto peržiūros data:** 2024-10-18. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026 10 09.

NUSESİK SKAUSMO KAUKE!

3⁴⁹ €



NEOCITRAMONAS

240 mg / 200 mg / 30 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: vienoje tabletėje yra 240 mg acetylsalicilo rūgšties, 200 mg paracetamolio ir 30 mg kofeino. **Terapinės indikacijos:** vaistas vartojamas trumpalaikiam lengvo ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių ir menstruacijų skausmui malšinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tabletes reikia vartoti nekrantant, užgeriant ne mažesniu kaip 250 ml kiekiu vandens. Atsivėlgiant 1 ligos sunkumą, vartoti po 1 tabletę 1–4 kartus per dieną. Didžiausia paros dozė – 4 tabletės. Negalima vaisto vartoti dažniau kaip kas 6 valandas ir ilgiau kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** alergija veikliąjam arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, esanti ar buvusi virškinimo trakto opa ir (arba) kraujavimas iš virškinimo trakto, buvusi bronchų astma, kurią sukėlė salicilatai ar kitokie nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, pacientas jaunesnis negu 12 metų, 3 paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas, ligos, kurių metu yra padidėjęs kraujavimo pavojus, kraujo krešėjimo sutrikimas, vartojama 15 mg ar didesne metotreksato savaitės dozė, sunkus širdies, kepenų, inkstų nepakankamumas, labai sunki aukšto kraujo spaudimo liga, kamuojama nemiga, padidėjęs nervingumas, dirglumas, nerimas, baimė, susjaujimas ar panašios simptomai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergama podagra, bronchų astma, kolagenozėmis ar kraujodaros sistemos ligomis, yra susiję su skydliaukės veikla ar sergama cukriniu diabetu, yra virškinimo trakto, inkstų, kepenų ar širdies funkcijos sutrikimų, yra buvusi alergija kitems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, planuojama chirurginė operacija, pacientas yra jaunesnis kaip 16 metų ir serga virusinėmis ligomis, pacientas yra senyvo amžiaus, planuojama pastoti, pakinta šlapimo kiekis, pasireiškia paburkimai ar skausmas juosmens srityje, pagelsta oda ar akys, patamsėja šlapimas, atsiranda bendras stiprumas, yra nerimo sutrikimas, panikos sutrikimas ar nemiga. Sudėtyje esantys kofeinai gali sukelti drebulį, dažną širdies plakimą, viduriavimą, susjaujimą, stiprų širdies plakimą, nemigą, galvos skausmą, raumenų trūkčiojimą ir šlapimo išsiskyrimo padidėjimą. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026-03-23

NUO SLOGOS, SINUSŲ SKAUSMO, KARŠČIAVIMO

NUO 4⁹⁹ €



COLDREX HOTREM

LEMON, 750 mg/10 mg/60 mg, mieliai geriamajam tirpalui, 5 paketėliai 4⁹⁹ €
LEMON, 750 mg/10 mg/60 mg, mieliai geriamajam tirpalui, 10 paketėlių 8⁹⁹ €
HONEY & LEMON, 750 mg/10 mg/60 mg, mieliai geriamajam tirpalui, 10 paketėlių 8⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Terapinės indikacijos: trumpalaikis peršalimo ir gripo simptomų (karščiavimo, slogos ir skausmo) lengvinimas. **Vartojimo būdas:** suberti 1 paketėlio turinį į stiklinę, pripilti karšto vandens (maždaug 125 ml), gerai išmaišyti, kol mieliai ištirps. Pagal poreikį pripilti šalto vandens. **Dozavimas:** suaugusiems (skaitant senyvo amžiaus) ir 16 m. bei vyresniems paaugliams, kurių svoris didesnis nei 54 kg: po 1 paketėlio kas 4–6 val., jei reikia. Didžiausia paros dozė: 5 paketėliai per 24 val. **Specialūs įspėjimai:** nevartokite kartu jokių kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio, taip pat vaistų nuo kosulio arba peršalimo, gripo ir nosies gleivinės paburkimo ar užgulios nosies. Per didelės paracetamolio dozės gali sukelti sunkų kepenų pažeidimą. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti, jei: padidėjusi prostata arba Jums sunku šlapintis; sergate kraujagyslių liga, vadinama Reino (Raynaud) sindromu; sergate inkstų liga; yra lėtinis mitybos nepakankamumas; reguliariai vartojate alkoholį; sergate Žilberio (Gilbert) sindromu; vartojate kitų vaistų, kurie veikia kepenų funkciją; Jums trūksta fermento gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės; sergate hemolizine anemija; yra dehidratacija; esate senyvo amžiaus, suaugusysis ar paauglys, kurio kūno svoris mažesnis nei 54 kg; yra šlapimo susilaikymas ar šlapimo takų akmenų; sergate astma arba Jums yra padidėjęs jautrumas acetylsalicilo rūgščiai, pasireiškiantis bronchų spazmu; sergate sunkia infekcine liga, nes gali padidėti metabolinės acidozės rizika. Vartojant negalima gerti alkoholinių gėrimų dėl galimo kepenų pažeidimo. Nėštumo metu ir žindymo laikotarpiu vartoti negalima. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; padidėjęs kraujo spaudimas; padidėjęs skydliaukės aktyvumas; sergate cukriniu diabetu; sergate širdies liga; sergate uždaro kampo glaukoma; sergate feochromocitoma; sergate kepenų ar sunkia inkstų liga; esate neščia ar žindote kūdikį; vartojate vaistų, mažinančių nosies paburkimą, slopančių apėtią, vaistų nuo peršalimo ar apėtią didinančių vaistų; vartojate tokius vaistus depresijai gydyti kaip triciklius antidepressantus, betablockatorius arba monoamino oksidazės inhibitorius (MAOI) bei dvi savaites po MAOI vartojimo; jaunesniems kaip 16 m. vaikams ir paaugliams. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026-04-01.

NUO 2⁹⁹ €



NOLPAZA

20 mg, 7 skrandyje neiros tabletes 2⁹⁹ €
20 mg, 14 skrandyje neiros tablečių 4⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga, stiprumas: Kiekvienoje skrandyje neirosioje tabletėje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidrato pavidalu). **Terapinės indikacijos:** Trumpalaikis suaugusių žmonių gastroezofaginio refliksio simptomų (pvz., rėmens, rūgšties regurgitacijos) gydymas. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** Rekomenduojama pantoprazolo paros dozė yra 20 mg (viena tabletė). Kad simptomai palengvėtų, tablečių gali reikėti gerti 2–3 dienas iš eilės. Kai simptomai visiškai išnyksta, gydymas turi būti nutraukiamas. Nepasitarus su gydytoju, gydymas negali trukti ilgiau kaip 4 savaites. „Nolpaza“ nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nepakanka. „Nolpaza“ 20 mg skrandyje neiros tablečių negalima kramtyti arba smulkinti, jas reikia nuryti nesmulkintas užgeriant skysčiu prieš valgį. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliąjam arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nerekomenduojama pantoprazolo vartoti kartu su ŽIV proteazės inhibitoriais, pvz., atazanaviru, nefelnaviru, nes reikšmingai sumažėja tokių vaistinių preparatų biologinis priėmnumas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Pacientui turi būti paaiškinta, kad toliau išvardyti atvejais jis privalo kreiptis į gydytoją: netikėta mažia kūno svoris, yra anemija, kraujavimas iš virškinimo trakto, disfgija, nuolatinis vėmimas ar vėmimas krauju. Tokie simptomai gali palengvėti, todėl sunki liga gali būti diagnozuojama vėliau. Tokiu atveju būtina pakeičti vežinio susirgimo diagnozę; yra buvusi skrandžio opa arba operuotas virškinimo traktas; 4 savaites ar ilgiau nuolat vartojama nevirškinimo ar rėmens simptomus lengvinančių vaistinių preparatų; yra gelta, kepenų funkcijos sutrikimas arba kepenų liga; yra bet kokia kita sunki liga, bloginti bendrąja sveikata; pacientas vyresnis kaip 55 metų ir anksčiau simptomų nebuvo arba buvo simptomai pasikėlę. Simptomai gali pradėti lengvėti po maždaug vienos gydymo pantoprazolu dienos, tačiau kad rėmus išnyktų visiškai, vaistinio preparato gali tekti vartoti 7 dienas. Pantoprazolo pacientai negali vartoti profilaktikai. Dėl padidėjusios chromogranino A (CgA) koncentracijos gali būti sunkiau atlikti neuroendokrininių navikų tyrimus. „Nolpaza“ tabletes yra sorbitolis ir natris. Geriamojo vaistinio preparato sudėtyje esantis sorbitolis gali paveikti kitų kartu vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį priėmumą. Šio vaistinio preparato tabletėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025.04.07.

„NOLPAZA“ UŽGESINA RĖMENĮ ILGAM!

9⁹⁹ €



TONSILGON® N

50 dentų tablečių
geriamieji lašai (tirpalas), 50 ml

NERECEPTINIAI AUGALINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Terapinės indikacijos. „Tonsilgon N“ yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgaikiu vartojimu, skirtas dažnai pasikartojantiems viršutinių kvėpavimo takų uždegimams, ypač tonzilių uždegimui, gydyti. **Veiklosios medžiagos ir stiprumas.** Dėngtoje tabletėje yra šių veikliųjų medžiagų mišinys: 8 mg svilarožių šaknų, 4 mg ažuolų žievės, 6 mg ramunėlių žiedų, 4 mg kiaušinių žolės, 10 mg asilųjų žolės, 4 mg kraujaužių žolės, 12 mg nesūdetųjų lapų, 1 g tirpalo yra 290 mg skystojo ekstrakto, pagaminto iš: 4 mg svilarožių šaknų, 3 mg ramunėlių žiedų, 5 mg asilųjų žolės, 4 mg nesūdetųjų lapų, 4 mg kraujaužių žolės, 2 mg ažuolų žievės, 4 mg kiaušinių žolės. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Esant ūmiems ligos simptomams, suaugusiems ir paaugliams nuo 12 m. vartoti po 25 geriamuosius lašus arba 2 tabletes 5–6 kartus per dieną, 6–11 m. vaikams – po 15 geriamųjų lašų arba 1 tabletę 5–6 kartus per dieną, 2–5 m. vaikams – po 10 lašų 5–6 kartus per dieną. Ūmiams ligos simptomams susilpnėjusiems, suaugusiems ir paaugliams nuo 12 m. vartoti po 25 geriamuosius lašus arba 2 tabletes 3 kartus per dieną, 6–11 m. vaikams – po 15 geriamųjų lašų arba 1 tabletę 3 kartus per dieną, 2–5 m. vaikams – po 10 lašų 3 kartus per dieną. „Tonsilgon N“ dėnglas tabletes rekomenduojama vartoti dar vieną savaitę ūmiams ligos simptomams praėjus. Tabletes reikia išgerti neskrutamytais, užgeriant skysčiu (pvz., stikline vandens). Geriamuosius lašus, jei reikia, galima vartoti kartu su nedideliu kiekiu skysčio (pvz., stikline vandens). **Kontraindikacijos.** „Tonsilgon N“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, taip pat jeigu yra alergija graižžiedžių šeimos augalams. **Specialūs įspėjimai.** Jeigu simptomai išlieka ilgiau nei 1 savaitę arba atsiranda tokių simptomų kaip dusulys, karščiavimas, pilingi ar kruvini skrepliai, kreiklės į gydytoją. Vartojant vaistą, kurio sudėtyje yra ramunėlių žiedų, gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcija. Padidėjusio jautrumo reakcijų taip pat gali pasireikšti žmonėms, kuriems padidėjęs jautrumas graižžiedžių šeimos augalams (pvz., kiedams, kraujaužolėms, chrizantemoms, sidabrinkuoniams ir kt.). Jaunesniems nei 2 m. vaikams „Tonsilgon N“ geriamųjų lašų, o jaunesniems nei 6 m. vaikams „Tonsilgon N“ dentų tablečių vartoti nerekomenduojama, nes duomenų apie veiksmingumą ir saugumą nepakanka. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026-10-08.

5⁹⁹ €**WINTROZEN**

600 mg, 10 šnypščijų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekvienoje šnypščijoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino.

Terapinės indikacijos. „Wintrozen“ skirtas gleivėms skystinti ir atskosėjimo lengvinti sergant persalimo sukeltu bronchitu, suaugusiems ir vyresniems kaip 14 metų paaugliams. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems ir vyresniems kaip 14 metų paaugliams: rekomenduojama dozė yra 1 tabletė (600 mg) 1 kartą per parą, vakare. Jūsų gydytojas gali pakeisti vartojimo dažnį ir dozę, nevirsydamas 600 mg didžiausios paros dozės. „Wintrozen“ negali būti vartojamas ilgiau nei 5 dienas. **Vartojimo metodas.** 1 šnypščiąją tabletę ištrinti stiklinėje vandens. Paruoštą tirpalą reikia išgerti per kelias minutes. Rekomenduojama nemaityti „Wintrozen“ su kitais vaistais. **Kontraindikacijos.** „Wintrozen“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija acetilcisteinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Dėl didelio veikiosios medžiagos kiekio „Wintrozen“ negalima vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 14 metų paaugliams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Wintrozen“, jeigu: atsiranda naujų odos ir gleivinės pokyčių. Labai retai gauta pranešimų apie sunkių odos reakcijų, sergate uždegimine bronchių liga, netoleruojate histamino, yra ar anksčiau buvo skrandžio ar žarnyno problema, vadinamų skrandžio ar dvilypakiprės žarnos opomis, ypač kai kartu su „Wintrozen“ vartojami kiti skrandžio gleivinę dirginantys vaistai. Jeigu jaučiate sielos kvapą, nesijaudinkite, nes tai yra acetilcisteino savybė ir nereiškia, kad vaistas pakito. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025 m. gegužės mėn. ID:000729217

1⁹⁹ €**PARACETAMOL ZENTIVA, 500 mg, 20 tablečių****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Kiekvienoje tabletėje yra 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos.** Trumpalaikis simptominis lengvo ar vidutinio stiprumo skausmo ir (arba) karščiavimo malšinimas. „Paracetamol Zentiva“ 500 mg tabletės skirtos suaugusiems, paaugliams ir 6 metų bei vyresniems vaikams, sveriantiems daugiau kaip 21 kg. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Reikia vartoti mažiausią veiksmingą dozę kiek galima trumpesį laiką. Didžiausios paros dozės viršyti negalima. Paracetamolis dozuojamas atsižvelgiant į kūno svorį ir amžių, paprastai skiriant vienkartinę 10-15 mg/kg kūno svorio dozę, nevirsijant didžiausios paros dozės – 60 mg/kg kūno svorio. Tabletes reikia nuryti užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio, vartoti valgio metu arba nevalgius. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbine medžiagai. Sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas. Ūminis hepatitas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Paracetamol Zentiva“ nevartokite kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio. Vartojant didesnes nei rekomenduojama vaisto dozes, padidėja sunkaus kepenų pažeidimo pasireiškimo rizika. Vartodami šį vaistą negerkite alkoholinių gėrimų. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025. rugsėjo mėn. ID:000785499

SAŅARIAMS9⁹⁹ €**GLUCOSAMIN-RATIOPHARM**

1,5 g, miltelių geriamajam tirpalui, 20 paketėlių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 paketėlyje yra 1,5 g gliukozamino sulfato, tai atitinka 1,884 g gliukozamino sulfato natrio chlorido arba 1,178 g gliukozamino. **Terapinės indikacijos:** lengvo ar vidutinio sunkumo kelio osteoartrito sukeltų simptomų lengvinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** paketėlių turinį ištrinti stiklinėje vandens ir gerti 1 kartą per parą. Gliukozaminas netinka vartoti ūminio skausmo simptomams slopinti. Simptomų palengvėjimas (ypač skausmo) gali pasireikšti vartojant kelias savaites, kartais ir dar ilgiau. Jei simptomai nepalengvėja po 2-3 mėnesių vartojimo, reikia iš naujo spręsti, ar gydyma gliukozaminu terti toliau. Miltelius galima vartoti tiek valgio metu, tiek nevalgius. Gliukozaminą negalima vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas gliukozaminui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. „Glucosamin-ratiopharm“ negalima skirti ligoniams, alergiškiems kiaušiniams, vėžiagyviams, nes iš jų išgaunama preparato veiklioji medžiaga. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jei pacientui yra sutrikęs gliukozės toleravimas, prieš skiriant gydymą ir vėliau periodiškai rekomenduojama stebėti gliukozės kiekį kraujyje, jei reikia, insulino poreikį. Jei pacientai turi širdies ir kraujagyslių ligų rizikos faktorių, rekomenduojama stebėti lipidų kiekį kraujyje, nes vartojantiems gliukozaminą ligoniams buvo nustatyti keli hipercholesterolemijos atvejai. Buvo aprašytas atvejis, kai, pradėjus gliukozamino terapiją, pablogėjo astmos simptomai. Gliukozaminą negalima vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams, nes neįštinio preparato saugumas ir veiksmingumas. Atsargumas reikalingas, jei pacientui yra fenilketonurija. Šio vaistinio preparato paketėlyje yra 151 mg natrio, tai atitinka 8 % didžiausios PSO rekomenduojamos paros normos suaugusiems, kuri yra 2 g natrio. Dėl sudėtyje esančio sorbitolio šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems yra įgimtas fruktozės netoleravimas. Taip pat sorbitolis gali paveikti kitų kartu vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį prieinamumą. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-01-22. GLR-IT-00006

JUDĖJIMUI BE SKAUSMO!**PAVIRŠINĖMS ŽAIZDOMS IR ODOS DEZINFEKCIJAI PRIEŠ NECHIRURGINES PROCEDŪRAS**6⁹⁹ €**DUOSEPTIC, 1 mg/20 mg/ml odos purškalas (tirpalas), 50 ml****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml „DuoSeptic“ odos purškalo (tirpalas) yra 1 mg oktenidino dihidrochlorido, 20 mg fenoksietanolio. **Terapinės indikacijos:** mažų paviršinių žaizdų antiseptinis gydymas ir odos dezinfekcija prieš nechirurgines procedūras, kartotinis trumpalaikis gleivinių ir gleivinių audinių antiseptinis gydymas prieš diagnostines procedūras išangės ir lyties organų srityje, įskaitant makštį, moters išorinius lyties organus ir varpos galvutę, taip pat prieš šlapimo pūslės kateterizaciją; laikinas ribotas pagalbinis antiseptinis tarpinurštinis mikozės (gybelinės infekcijos tarp rankų ar kojų pirštų) gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti ant odos. Ant gydymų sričių užpurškite 1 kartą per dieną taip, kad jos visiškai sudrėktų. Kiti atveju galint užpurškiti ant tampono ir gydymą vietą patrinti (ne mažiau nei dviem „DuoSeptic“ supurkštais tamponais), kad visiškai sudrėktų. Tinkamiausias būdas – naudojant tamponus. Palaukite, kol „DuoSeptic“ visiškai išdžius, prieš apsidami ar užkišdami žaizdą. Naudojant gybelinei infekcijai gydyti – purškite ryte ir vakare. **Kontraindikacijos:** nenaudokite, jei padidėjęs jautrumas oktenidino dihidrochloridui, fenoksietanolui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. „DuoSeptic“ neturėtų būti naudojamas pilvo ertmei (pvz., atliekant operaciją), šlapimo pūslės ar ausies membranos skalauti. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** nenurykite, ypač didelio kiekio, ir neieskite patekti į kraujotakos sistemą, pėdų deltistikinio įsivirkimo. Naujagimiams, ypač neįsėsiotiems, vartoti atsargiai, nes „DuoSeptic“ gali sukelti sunkių odos pažeidimų. Pašalinkite vaistinio preparato pėdėlių ir užtikrinkite, kad tirpalas nekliūtų ant odos ilgiau, nei reikia. Venkite patekimo į akis. Patekus – nedelsdami gerai praskalaukite vandeniu. Neieskite švirkstu ir gliukozės raumenis. Naudoti tik išorškai. Po gliū žaizdų praplovimo švirkstu buvo pranešama apie nuolatinę edemą (patinimą), eritemą (paraudimą), audinių nekrozę; kai kuriais atvejais prireikė chirurginės intervencijos. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026-05-23.

NUO 4⁹⁹ €**OLFEN**

1 % gelis, 50 g 4⁹⁹ €
1 % gelis, 100 g 7⁹⁹ €
23,2 mg/g gelis, 50 g 6⁹⁹ €
23,2 mg/g gelis, 100 g 9⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 g gėlio yra 10 mg diklofenako natrio druskos arba 23,2 mg diklofenako dietilamino, atitinkanti 20 mg diklofenako natrio druskos. **Terapinės indikacijos.** Suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams skirtas lokaliai skausmo simptomams malšinti, esant ūminiams įtempimams, patempimams ar sumušimams po buklos traumos; minkštųjų audinių uždegimui slopinti (esant tendinitui, bursitui), 14 m. ir vyresniems paaugliams vaistinis preparatas skirtas gydyti trumpą laiką. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Atsižvelgiant į gydymosi kūno dalies dydį, 2-4 g (maždaug 1-2 pilnus antipirščius) „Oflen“ 1 % gėlio tepama 3-4 kartus per parą ir toliau paskirstoma (trinti nereikia). Neviršyti 16 g gėlio paros dozės. Gydymo trukmė priklauso nuo terapinių indikacijų bei vaistinio preparato poveikio. Nepasitarus su gydytoju suaugusiems, „Oflen“ 1 % gėlio negalima tepti ilgiau kaip 14 parų, o paaugliams – ilgiau kaip 7 paras. Jeigu per 7 dienas simptomai išlieka arba būklė pasunkėja, reikia kreiptis į gydytoją. „Oflen“ 23,2 mg/g gėlio reikia vartoti ant odos 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Atsižvelgiant į gydymosi pažeistos vietos dydį, reikia nuo vyšnios iki graikiško riešo dydžio gėlio kiekio, atitinkanti 1-4 g gėlio, kuris atitinka 20-80 mg diklofenako natrio druskos. Didžiausia paros dozė yra 8 g gėlio, kuris atitinka 185,6 mg diklofenako dietilamino (atitinkanti 160 mg diklofenako natrio druskos). Vartojimo trukmė priklauso nuo simptomų bei pagrindinės ligos. Be gydytojo patarimo „Oflen“ negalima vartoti ilgiau kaip 1 savaitę. Jeigu per 3-5 dienas simptomai nepagerėja arba net pablogėja, būtina gydytojo konsultacija. **Kontraindikacijos.** „Oflen“ vartoti draudžiama: jeigu yra alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu Jums kada nors anksčiau pavartojus acetilsalicilo rūgšties arba kitų NVNU (pvz., ibuprofeno) buvo sutrikęs kvėpavimas (astma, bronchų spazmas), dilgėlinė, sloga, vėdo arba lėtinis patinimas; esant odos arba gleivinių atvirų žaizdų, uždegimų arba infekcijai, taip pat sergant egzema, paskutini nštumo trimestras; jaunesniems kaip 14 m. vaikams ir paaugliams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės** reikalingi, jei sergate astma, šienlige, nosies gleivinės patinimu ar lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis. Lėtinėmis kvėpavimo takų infekcijomis arba yra padidėjęs jautrumas kitiems skausmą malšinantiems vaistams ir bet kuriems vaistams nuo reumatų; taip pat pacientams, kurie yra alergiški kitoms medžiagoms ir kuriems būna odos reakcijų, pasireiškia nežilūs arba dilgėlinė. Kai „Oflen“ vartojamas dideliu odos plotui ir ilgai gydyti, negalima paneigti galimo sisteminio šalutinio poveikio. „Oflen“ galima vartoti tik ant nepažeistos ir sveikos odos. Venkite patekimo į akis ir kontakto su gleivinėmis. Nesnaudokite oru nepalaidžiais tvarščiais. „Oflen“ vartojimą reikia nutraukti, jei atsiranda odos bėrimas. Vartodami šį vaistą venkite saulės spindulių, papildito asinadokite soliariumu. Saugokite, kad vaikai negalėtų paliesti šio vaisto gydymui odos vietų. „Oflen“ 1 % vartotaisiais jeigu inkstų, širdies ar kepenų funkcija sutrikusi, turite arba buvo anksčiau skrandžio opa, žarnyno uždegimas ar esate lėtinį kraujavimą. **Teksto peržiūros data:** „Oflen“, 1 % – 2024-09-05; „Oflen“, 23,2 mg/g – 2025-10-10. **Reklaminės medžiagos parengimo data:** 2026-05-05.OLF-IT-00047.

SAUSOMS AKIMS ARTELAC®

-30 %

**ARTELAC®****MEDICINOS PRIEMONĖS**

„Artelac“ **Splash®** – vienas populiariausių mūsų produktų su hialuronu, skirtas sausoms akims nedelsiant nuraminti ir sudrėkinti. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius.

„Artelac“ **Rebalance®** užtikrina stiprų drėkinamąjį poveikį ir palengvėjimą, esant nuolat pasikartojančiam akių sausumui. Drėkina akis ir apsaugo jų paviršių, papildoma asarų pėvelę puoselėjiančiais jonais, vitaminu B12, sureguliuoja osmosinį akių paviršiaus balansą ir taip padeda ilgam sustabdyti sauso akių simptomų pasireiškimą.

„Artelac“ **TripleAction®** pažangus tirpalas, sukuriantis taip, kad išliktų ant akies paviršiaus, ir intensyviai drėkindamas greitai ir ilgam numalšintų sauso akių simptomus. Sudėtyje esantys komponentai (hialuronas, glicerolis, alantoinas, lipidinis komponentas) aktyviai virsta šis asarų pėvelės sluoksnius. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius.

„Artelac“ **Nighttime Gel®** aktyvia asarų pėvelę nakties metu. Produktas suteikia papildomą apsaugą tiems, kam pasireiškia didesnis ir nuolatinis akių sausumas. 2026-05-23

„ARTELAC“ – PAŽANGŲ SPRENDIMAI SAUSOMS AKIMS.

*Akcia taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

7⁹⁹ €



VOLTAREN EMULGEL, 23,2 mg/g gelis, 50 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Diklofenako dietilaminas. **Terapinės indikacijos.** Suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: skausmo ir uždegimo mažinimas, kai yra minkštųjų audinių sužalojimas (sausgyslių, raiščių, raumenų ir sąnarių trauma, pavyzdžiui, patempimas, sumušimas); vietinis minkštųjų audinių uždegimas (nugaros skausmas, tendinitas, bursitas). Tik suaugusiems (18 m. ir vyresniems): sąnarių (pvz., kelių) degeneracinės ligos sukeltam skausmui malšinti. **Vartojimas.** Vartoti ant odos. Tepti 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje. **Kontraindikacijos.** Alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitoms vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo; paskutinis nėštumo trimestras; jaunesniams kaip 14 m. paaugliams. **Specialūs įspėjimai.** Nelepti ant pažeistos odos, atvirus žaizdas, odos iššerimo ar egzemos vietas, didelių odos plotų, saugoti, kad nepatektų į akis ir ant gleivinės, pvz., burnos, nenuryti. Jeigu pasireiškia bėrimas, gydymą nutraukti; nenaudoti su oro nepažeidžiančiais tvarsčiais. Sudėtyje yra propilenglikolio ir butilhidroksitolueno. Teksto parengimo data 2025-03. Prekių ženklai priklauso „Haleon“ arba „Haleon“ turi jų licenciją. ©2025 „Haleon“ arba licencijos turėtojas.

DIENAI BE STRESO, GERESNIAM MIEGUI NAKT!

8⁹⁹ €



NEUREXAN, 50 tablečių

HOMEOPATINIS NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tableteje yra veikliųjų medžiagų: 0,6 mg *Avena sativa* D2, 0,6 mg *Coffea arabica* D2, 0,6 mg *Passiflora incarnata* D2, 0,6 mg *Zincum isovalericum* D4. **Indikacijos.** Miego sutrikimų ir nerimastingumo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Suaugusiems žmonėms ir paaugliams nuo 12 metų vartoti po 1 tablete 3 kartus per dieną. Pradžioje, jei simptomai stiprūs, galima vartoti po 1 tablete kas 0,5–1 val., neviršyti 12 tablečių per dieną. Simptomams palengvėjus, gydymą tęsti įprastine doze. „Neurexan“ saugumas ir veiksmingumas jaunesniems kaip 12 metų vaikams neįvertinti. Duomenų nėra. Prieš nurijant tablete reikia išstiprinti burnoje. Ją vartoti likus ne mažiau kaip 30 min. iki valgio. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Neurexan“ sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktozės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. „Neurexan“ nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Registratojas.** „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). **Registratojo adresas.** UAB „Farmahelis“, www.heel.lt. Teksto parengimo data 2026-02-12.

KAULAMS STIPRINTI

NUO 3⁹⁹ €



CALCIGRAN

500 mg/200 TV, 30 kramtomųjų tablečių 3⁹⁹ €

500 mg/200 TV, 100 kramtomųjų tablečių 6⁹⁹ €

FORTE, 500 mg/400 TV, 60 kramtomųjų tablečių 6⁹⁹ €

FORTE LEMON, 500 mg/800 TV, 60 kramtomųjų tablečių 9⁹⁹ €

SINE, 500 mg, 100 kramtomųjų tablečių 6⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Sudėtis: 1 tableteje yra 500 mg kalcio (kalcio karbonato pavidalu), o 1 „Calcigran“, „Calcigran Forte“ ir „Calcigran Forte Lemon“ tableteje taip pat yra 200, 400 arba 800 TV vitamino D3 (cholekaliferolio). **Indikacijos:** priklausomai nuo vaistinio preparato sudėties, kalcio arba vitamino D ir kalcio trūkumui išvengti ir gydyti. Kaip papildomas vaistas ligoniams, kurie gydomi specifiniais vaistais nuo osteoporozės ir kuriems yra kalcio arba vitamino D ir kalcio stokos pasireiškimo pavojus. „Calcigran Sine“ taip vartojamas fosfatams surišti. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** „Calcigran“ ir „Calcigran Sine“ suaugusiems vartoti po 1 tablete 1–3 kartus per parą, vaikams – po 1 tablete 1–2 kartus per parą. „Calcigran Sine“ dozė fosfatams surišti yra nustatoma gydytojo. „Calcigran Forte“ suaugusiems vartoti po 1 tablete 2 kartus per parą, vaikams ir paaugliams netinka. „Calcigran Forte Lemon“ suaugusiems vartoti po 1 tablete 1 kartą per parą, vaikams ir paaugliams netinka. Tabletes sukramtyti arba sučiulpti. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šių vaistų medžiagai. Sunkus inkstų funkcijos sutrikimas. Jeigu padidėjęs kalcio kiekis kraujyje (yra hiperkalcemija) ar (ir) šlapime (yra hiperkalciurija), inkstusose formuojasi akmenys. „Calcigran“, „Calcigran Forte“ ir „Calcigran Forte Lemon“ taip pat negalima vartoti jeigu yra padidėjęs vitamino D kiekis kraujyje. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai vartoti jeigu gydotas ilgą laiką, ir ypač jeigu kartu vartojate diuretikų (vaistų, vartojamų aukštam kraujospūdžiui arba pabrūkinamam gydyti) arba širdį veikiančių glikozidų (vaistų, vartojamų širdies ligoms gydyti), yra inkstų funkcijos sutrikimo požymių arba turite ryškų polinkį inkstų akmenų formavimuisi; sergate osteoporoze ir negalite vaikščioti. „Calcigran“, „Calcigran Forte“ ir „Calcigran Forte Lemon“ taip pat reikia vartoti atsargiai jeigu sergate imuninės sistemos sutrikimu, dėl kurio gali padidėti vitamino D kiekis kraujyje ir jeigu vartojate kiti vaistai, kuriose yra vitamino D. Sudėtyje yra izomaltos. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „Calcigran“, „Calcigran Forte“ ir „Calcigran Forte Lemon“ sudėtyje taip pat yra sacharozės, kuri gali kenkti dantims. Reklamos teksto parengimo data 2025-12-11.

NUO 6⁹⁹ €



NUROFEN

ORANGE, 12 kramtomųjų minkštųjų kapsulių 6⁹⁹ €

FORTE ORANGE, 40 mg/ml, geriamoji suspensija, 100 ml 8⁹⁹ €

FORTE STRAWBERRY, 40 mg/ml, geriamoji suspensija, 100 ml 8⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml „Nurofen Forte Orange“, 40 mg/ml, ir „Nurofen Forte Strawberry“, 40 mg/ml, geriamosios suspensijos yra 40 mg ibuprofeno. Kiekvienoje „Nurofen Orange“, 100 mg, kramtomųjų minkštųjų kapsulėje yra 100 mg ibuprofeno. **Terapinės indikacijos:** „Nurofen Forte Orange“ ir „Nurofen Forte Strawberry“: trumpalaikis silpno ir vidutinio skausmo mažinimas. Trumpalaikis karščiavimo mažinimas. „Nurofen Orange“: karščiavimo mažinimas, persilimo ir gripo simptomų, silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip gerklės, dantų, ausys, galvos, nugaros, nedidelio maudimo ir pastėmpimo, mažinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** „Nurofen Forte Orange“ ir „Nurofen Forte Strawberry“: naudojant pakuočelę esanti dozavimo švirkštą dozuoti, kaip nurodyta toliau: sveikantiems daugiau nei 5 kg (5–5 metų) vaikams: gerti po 1,25 ml 3 kartus per parą, 7–9 kg (6–11 metų) vaikams: gerti po 1,25 ml 3–4 kartus per parą, 10–15 kg (1–3 metų) vaikams: gerti po 2,5 ml 3 kartus per parą, 16–19 kg (4–5 metų) vaikams: gerti po 3,75 ml 3 kartus per parą, 20–29 kg (6–9 metų) vaikams: gerti po 5 ml 3 kartus per parą, 30–40 kg (10–12 metų) vaikams: gerti po 7,5 ml 3 kartus per parą. „Nurofen Orange“: vaikams ibuprofeno dozė priklauso nuo kūno svorio, paprastai vienkartinė dozė yra 5–10 mg/kg kūno svorio. Didžiausia „Nurofen Orange“ paros dozė yra 20–30 mg/kg kūno svorio. Rekomenduojama paros dozė gali būti pasiekta remiantis šiais nurodymais: 20–29 kg svieriantiems vaikams – 200 mg ibuprofeno (atitinka 2 kapsules), didžiausia paros dozė – 600 mg ibuprofeno (atitinka 6 kapsules); 30–40 kg svieriantiems vaikams – 300 mg ibuprofeno (atitinka 3 kapsules), didžiausia paros dozė – 900 mg ibuprofeno (atitinka 9 kapsules). Jei reikia, dozės turėtų būti skiriamos maždaug kas 6–8 val. (mažiausias laiko tarpas tarp dozių yra 6 val.). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofeni arba bet kuriai vaistų pagalbinei medžiagai; jei praėjusio laiko buvo padidėjusio jautrumo reakcija (astma, rinitas, angioneurozinis pabrūkinimas, dilgėlinė) vartojant ibuprofeną, kita nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU), pakeičiant ir acetilsalicilo rūgšties darinius; anksčiau buvus su NVNU vartojimu susijęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar virškinimo trakto perforacija; aktyvi ar anksčiau buvusi paskartarpinė pepsinė opa arba opos kraujavimas (du ar daugiau atskirų patvirtintų opos susidarymo ar kraujavimo epizodų); kraujavimas į smegenis arba kitoks kraujavimas; sunkus kepenų, inkstų arba širdies nepakankamumas; neaiškios kilmės kraujodaros sutrikimai; paskutinis nėštumo trimestras laikotarpis; jeigu pasireiškė sunki dehidratacija (dėl vėmimo, viduriavimo ar nepakankamo skysčių kiekio). **Specialūs įspėjimai:** šių vaistų reikia atsargiai vartoti pacientams, sergantiems sistetine raudonąja vilkige, taip pat tiems, kurie serga mišria jungiamojo audinio liga, nes didėja aseptinio meningo rizika, kuriems yra gimtos porfiro metabolizmo sutrikimas (pavyzdžiui, ūminė intermituojanti porfiriya), virškinimo trakto sutrikimai ir lėtinis uždegiminis žarnyno ligos (opinis kolitas, Krono liga), serga vėžiaraišiais; jei anksčiau buvo padidėjęs kraujospūdis ir (arba) širdies nepakankamumas, yra inkstų, kepenų veiklos sutrikimai; širdies ar kitų organų chirurginės operacijos; jei yra šienligė, nosies polipai arba lėtinis obstrukcinis kvėpavimo sutrikimas; jei anksčiau buvo pasireiškusi alerginių reakcijų į kitas medžiagas, nes dėl to padidėja alerginių reakcijų pasireiškimo rizika vartojant šiuos vaistus. Gydyti ibuprofenu būna pranašta apie sunkias odos reakcijas, pakeičiant ekfoliacinį dermatitą, daugiaformę eritemą, Stevenso-Johnsono sindromą, toksiinę epidermio nekrolizę, vaisto sukeltą reakciją su eozinofilija ir sisteminiais simptomais (VRESS), ūminę generalizuotą egzantematinę pustuliozę (UGEP), kuri gali būti pavojinga gyvybei arba mirtina. Jei atsiranda šių reakcijų požymių ir simptomų, ibuprofeno vartojimą reikia nedelsiant nutraukti. Šie vaistai gali būti susiję su nedideliu širdies priekupio (miokardo infarkto) ar insulto pavojaus padidėjimu. „Nurofen Forte Orange“ ir „Nurofen Forte Strawberry“ negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas. Geriamosios suspensijos sudėtyje yra skystjo maltozolio, kuris gali trupučiui laisvinti vidurius, natrė – būtinai atšaldyti, jeigu kontroliuojamas natrė kiekis maiste. „Nurofen Orange“ negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos tekstas parengtas 2026-10-14.

6⁹⁹ €



NUROFLEX, 200 mg, 2 vaistiniai pleistrai

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekviename vaistiniame pleistre yra 200 mg ibuprofeno. **Farmacinė forma.** Vaistinis pleistras: bespalvis, lipnus vaistinio preparato sluoksnis, paskirstytas ant 10 cm x 14 cm dydžio lankstaus kūno spalvos austo pagrindo, ir padengtas nuimamu apsauginiu sluoksniu. **Terapinės indikacijos.** Nuroflex skirtas trumpalaikiam lokaliai skausmo, sukeltam ūminio raumenų patempimo arba lengvų viršutinių ar apatinių galūnių sąnario aplinkos audinių traumų, simptominių gydymui suaugusiems ir 16 metų ar vyresniems paaugliams. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems ar 16 metų ir vyresniems paaugliams: viena dozė yra lygi viename vaistiniame pleistru. Didžiausia dozė per vieną 24 valandų laikotarpį yra vienas vaistinis pleistras. Pleistrai gali būti vartojami bet kurio dienos ar nakties metu, tačiau ji reikia nuimti ir naują pleistrą vėl užklijuoti kitą dieną tuo pačiu laiku. Vartoti ant odos ir tik trumpą laiką. Vaistinis pleistras turi būti naudojamas visas, jo negalima karpyti. Klijuojama tik ant sveikos odos. Gydymasis pleistrais neturi būti vartojamas kartu su okliuziniais tvarsčiais. Prieš užklijuojant vaistinį pleistrą rekomenduojama kruopščiai nuplauti ir išdžiovinti gydymą kūno paviršių. Pirmiausia pašalinkite centrinę apsauginio sluoksnio dalį, skirtingai apsaugoti lipniam pagrindo paviršių, ir uždektite pleistrą šia lipnia sėmele ant skaudančio ploto. Kai pleistras yra užklijuotas ant odos, pašalinkite apsauginio sluoksnio dalį, esančią pleistro kraštuose. Vaistinis pleistras yra lankstus ir paslankus, todėl priekius gali būti užklijuotas ant odos šalia sąnario, tokiu būdu leisdamas jam normaliai judėti. Venkite vaistinio pleistro drėkinimo. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai vaisto pagalbinei medžiagai. Jeigu praėjusio laiko buvo padidėjusio jautrumo reakcija (pvz., astma, bronchų spazmas, rinitas, angioneurozinė edema ar dilgėlinė) vartojant ibuprofeną, acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistinių preparatų nuo uždegimo (NVNU). Vartojimas ant įtrūkusios ar pažeistos odos. Trečiasis nėštumo trimestras. Vartojimas ant akių, lūpų ar gleivinių. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei simptomai išlieka ilgiau nei 5 paras arba pablogėja, reikia pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu. Bronchų spazmams gali pasireikšti pacientams, vartojantiems ibuprofeno, kurie serga arba anksčiau sirgo bronchine astma ar alergija. Gydymą reikia nedelsiant nutraukti, jei užklijuojami vaistiniai pleistrai atsiranda odos iššerimas. Pacientai turi būti įspėjami apie gydymosi dozes nuo reakcijų stiprumo natūralaus ir (arba) dirbtinio apsvietimo šaltiniais (pvz., įdegio lėmos) poveikio metu ir vieną dieną po vaistinio pleistro pašalinimo, siekiant sumažinti jautrumo sviesai riziką. Pacientams, kuriems yra sutrikusi inkstų, širdies ir kepenų funkcija, buvo arba yra peptinė opa, žarnų uždegimas ar hemoraginė diatezė, prieš pradėdami vartoti šį vaistinį preparatą, reikia kreiptis į gydytoją. Senyviems pacientams nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo turėtų būti vartojami atsargiai, nes jiems yra didesnė nepageidaujimų poveikio tikimybė. Reklamos tekstas parengtas 2026-10-14.

5⁹⁹ €



FENKAROL, 25 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Kiekvienoje tableteje yra 25 mg kvifenedino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos.** Simptominis alerginės slogos (su konjunktyvitu ar be jo), dermatito (egzemos, dilgėlinės) ir niežulio gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems žmonėms dozė yra 25–50 mg (1–2 tabletes) 2–4 kartus per dieną. Vaikams ir paaugliams: vyresniems negu 12 m. vaikams dozė yra 25 mg (1 tablete) 2–3 kartus per dieną. „Fenkarol“ netinka vartoti 12 m. ir jaunesniems vaikams. **Vartojimo būdas.** Vartoti per burną. „Fenkarol“ tabletes yra geriamos iš karto po valgio. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas kvifenedino hidrochloridui arba sacharozės, bulvių krakmolui, kalcio stearatui. Pirmasis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Atsargiai vaistinio preparato reikia vartoti ligoniams, sergantiems sunkiomis širdies ir kraujagyslių sistemos, virškinimo trakto, kepenų ir (arba) inkstų ligomis. Nevartoti, jeigu nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Registravimo liudijimo turėtojas ir gamintojas: JSC „Olpha“, Rūpnicų 5, LV-2114 Olaine, Latvija. Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Vaistinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje <http://www.vvkt.lt>. **Reklamos teksto parengimo data 2025-06-05.** FEN03062025LT

GREITAI NUGALI ALERGIJOS SIMPTOMUS!

NUO GERKLĖS SKAUSMO

6⁹⁹ €


NEO-ANGIN

1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg, 24 kietosios pastilės
be cukraus, 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg, 24 kietosios pastilės

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas. Vienoje kietojoje pastilėje yra: „neo-angin“ – 1,20 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio, 0,60 mg amilmetakrezolio ir 5,90 mg levomentolio; „neo-angin“ be cukraus – 1,20 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio, 0,60 mg amilmetakrezolio ir 5,72 mg levomentolio. **Indikacijos.** „neo-angin“ sukelia vietinį mikrobų naikinantį ir skausmą malšinantį poveikį. 2,4-dichlorbenzilo alkoholis ir amilmetakrezolis turi dezinfekuojamųjų, levomentolis – skausmą malšinantį poveikį. „neo-angin“ kietosios pastilės vartojamos vietiniam ryklės gleivinės uždegimo gydymui. Jeigu per 3–4 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Suaugę žmonės, paaugliai ir vyresni nei 6 metų vaikai kas 2–3 valandas turi lėtai sučiulpti po vieną kietąją pastilę. Didžiausia paros dozė yra 6 pastilės. Nepasitarus su gydytoju, „neo-angin“ vartoti ilgiau nei 3–4 dienas negalima. **Kontraindikacijos.** Alergija bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „neo-angin“. **Reklamos teksto parengimo data** 2025.01.31.

ESANT AKIŲ UŽDEGIMUI

-40% 14^{98€} 24⁹⁹

DESODROP®, akių lašai, 8 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

Liposominis ozonuotas tirpalas akims su „LipozonEye“™.

Ozonas – galingas natūralus antiseptikas, turintis plataus spektro antibakterinį, antivirusinį, priešgrybelinį poveikį. Preparatas skirtas uždegimo simptomams gydyti, taip pat ir infekcinės kilmės (konjunktyvitui, keratitui, blefaritui ir pan.), sergantiesiems pasikartojančioms akių infekcijoms, infekcijų profilaktikai po chirurginių intervencijų, traumų. Apsaugo ragenos epitelį, skatina gijimą, stabilizuoja ašarų plėvelę.

2025-03-23

OZONO TERAPIJA AKIES PAVIRŠIAUS LIGOMS.

2⁹⁹ €

AMBROLAN, ambroksolio hidrochloridas, 30 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido. „Ambrolan“ yra labai veiksmingas vaistas, kurio veiklioji medžiaga ambroksolis yra bromheksino metabolitas. „Ambrolan“ mažina susikaupusių skreplių klampumą, gerina virpamojo epitelio aktyvumą ir taip skatina sekretą pašalinti iš bronchų, skystina pėmelį klampias gleives ir palengvina jų išsiskyrimą, vartojamas sergantiesiems ūmine arba lėtine bronchų ir plaučių liga, kurios metu sutrinka sekreto išsiskyrimas ir šalinimas, kvėpavimo takų sekretui skystinti. **Vartojimas.** Suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams įprastinė dozė yra 1 tabletė tris kartus per parą. Vartojama po valgio, užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Ambrolan“ vartoti negalima, jeigu yra: alergija ambroksoliui; skrandžio ir (arba) žarnyno opa; pirmuosius 3 nėštumo mėnesius ir maitinant krūtimi; jaunesniems nei 12 metų vaikams. Kiekvienoje tabletėje yra 100 mg laktozės (pieno cukraus). **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas.** „G.L. Pharma GmbH“, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025.10.09.

NUGALĖKITE KOSULĮ!

NUO 11⁹⁹ €

NIZORAL

20 mg/g šampūnas, 60 ml 11⁹⁹ €

20 mg/g šampūnas, 100 ml 16⁹⁹ €

20 mg/g šampūnas, 200 ml 22⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 g šampūno yra 20 mg ketokonazolo. **Terapinės indikacijos.** „Nizoral“ šampūnas yra vaistas, vartojamas infekcinėms odos ligoms, kurias sukelia grybeliai, gydyti: sėleniniam galvos odos pleiskanojimui (*Psoriasis capitis*); seborėjiniam dermatitui (rasai) nudos dėmės, padengtos gelsvomis arba baltomis pleiskanomis; įvairiaspalvei dėderinei (*Psoriasis versicolor*) (ant liemens esančios mažos rudos ar baltos spalvos, nelygios kraštas dėmės). „Nizoral“ šampūnas linka *Psoriasis capitis* ir seborėjinio dermatito profilaktikai. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** „Nizoral“ šampūnas skirtas vartoti paaugliams ir suaugusiesiems. Pabėista odą reikia sudrėkinti „Nizoral“ šampūnu ir palaikyti 3–5 minutes, kad įsigerių (paprastai 1 kartui užtenka 1 saujos šampūno). Po to odą ir plaukus reikia gerai nuplauti vandeniu. Odos drėkinimo šampūnu dažnis priklauso nuo grybelių rūšies ir nuo to, ar vaistas vartojamas ligai gydyti, ar jos profilaktikai. Gydyti galvos odos seborėjinį dermatitą ir pleiskanojimą: odą „Nizoral“ šampūnu reikia plauti 2 kartus per savaitę 2–4 savaites, profilaktikai, kad ligos neatsinaujintų, – 1 kartą per savaitę arba kas 2 savaites. Gydyti įvairiaspalvę dėderinę: odą „Nizoral“ šampūnu reikia plauti 1 kartą per dieną 1 dieną. **Kontraindikacijos.** „Nizoral“ šampūno vartoti negalima, jeigu yra alergija ketokonazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (suderinta šampūno oda parausta, pradeda niežėti). **Specialūs įspėjimai:** pastatkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Nizoral“. Reikia saugotis, kad „Nizoral“, kaip ir kitokio šampūno, nepatektų į akis. Jeigu taip atsitinka, jas reikia plauti vandeniu. **Reklamos teksto parengimo data** 2022-11-26.01_S8_Nizoral_V01_LT

NUGALĖK PLEISKANAS SU „NIZORAL“!

NUO RĖMENS IR PADIDĖJUSIO RŪGŠTINGUMO

NUO 2⁹⁹ €

ELFIMEST

20 mg, 7 skrandyje neišsijusios tabletės 2⁹⁹ €

20 mg, 14 skrandyje neišsijusios tablečių 4⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Kiekvienoje skrandyje neišsijusioje tabletėje yra 20 mg ezomeprazolo (atitinkanti 21,75 mg ezomeprazolo magnio druskos dihidrato). **Terapinės indikacijos.** „Elfimest“ skirtas suaugusių žmonių gastroezofaginio refliukso simptomams (pvz., rėmens ir skrandžio rūgšties reguliacijos) trumpam laikui gydyti. **Dozavimas.** Rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 tabletė) karta per parą. Kad simptomai palengvėtų, tabletes gali prireikti vartoti 2–3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaites. Simptomams vėl išsivysčius, gydymą reikia nutraukti. Reikia nuryti visą tabletę, užgeriant puštelint vandenį. Tablečių negalima nei kramtyti, nei trąškyti. Kitoks pasirinkimas – tabletę galima išsijusi pusę stiklinės negazuoto vandens, kitokiu skystičiu netinka. **Kontraindikacijos.** Jeigu yra alergija ezomeprazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu yra alergija bet kuriam kitam protonų siurblio inhibitoriui (pvz., pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, omeprazolui); jeigu po „Elfimest“ ar kitų panašių vaistų vartojimo kada nors pasireiškė sunkios odos išsiverimams arba odos lupimasis, pūslelės ir (arba) burnos opos; jeigu vartojate vaistinių preparatų, kuriuose yra neflinavio (vaistas ŽIV infekcijai gydyti). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu anksčiau sirgote skrandžio opa arba patyrėte skrandžio operaciją; jeigu 4 savaites arba ilgiau nepertraukiamai gydytės dėl refliukso arba rėmens; jeigu yra gelta (odos arba akių pageltimas) arba sunkių kepenų sutrikimų; jeigu turite sunkių inkstų veiklos sutrikimų; jeigu esate vyresnis negu 55 metų ir pasireiškė nauji arba senesni pakito refliukso simptomai, arba jeigu kasdien Jums reikia vartoti nereceptinių vaistų nuo nevirškinimo ar rėmens; jeigu Jums kada nors pasireiškė odos reakcija po gydymo vaistu, panašiu į „Elfimest“, kuriuo mažinamas skrandžio rūgštingumas; jeigu bus atliekama endoskopija arba šlapalo kvėpavimo testas, arba specialus kraujo tyrimas (dėl chromogranino A). Reikia kreiptis į gydytoją, jeigu netekote daug kūno svorio dėl nežinomų priežasčių; rydami juntate sunkumą arba skausmą; patiria skrandžio skausmą arba nevirškinimo požymius, pvz., pykinimą, pilnumą, vidurių pūtimą, vėją, pavargę; pradėjote vemti maistą arba kraują, kuris vėmaluose gali atrodyti kaip tamsūs kavos tirščiai; pastebėjote juodoms išmatoms (krauju nudždytos išmatos); patiria stiprų arba nuolatinį viduriavimą; ezomeprazolo vartojimas siejamas su nedidele infekcinio viduriavimo padidėjimo rizika; jeigu Jums ištėtų odą, vėją, saulės apšviesto vietose, ku skubiau pasakykite apie tai savo gydytoju, nes Jums gali tekti nutraukti gydymą „Elfimest“. Taip pat nepamirškite pasakyti, jeigu Jums pasireiškė bet koks kitas šalutinis poveikis, pvz., sąnarių skausmas. Reklamos teksto peržiūros data 2025-03-03. Reklamos parengimo data 2025-07-ELF-LT-0000

GREITA IR INOVATYVI PAGALBA NUO RĖMENS!

PERŠALIMUI IR KARŠČIAVIMUI, BŪKLEI, PANAŠIAI Į GRIPĄ, GYDYTI

7⁹⁹ €

INFLUCID, 40 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Homeopatinis vaistas. **Veiklosios medžiagos:** Aconitum D3, 25 mg, Gelsemium D3, 25 mg, Ipecacuanha D3, 25 mg, Phosphorus D5, 25 mg, Bryonia D2, 25 mg, Eupatorium perfoliatum D1, 25 mg. **Terapinės indikacijos.** „Influcid“ yra homeopatinis vaistas, skirtas peršalimui ir karščiavimui, pvz., būklei, panašiai į gripą, gydyti. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** visada vartokite šį vaistą tiksliai, kaip aprašyta informaciniame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Suaugusiesiems ūminės ligos metu vartoti po 1 tabletę kas valandą (iki 12 tablečių per dieną), kol pagerėja savijauta. Toliau po 1–2 tabletes 3 kartus per dieną. Iki 12 m. vaikams: ūminė liga: po 1 tabletę kas 2 valandas (iki 8 tablečių per dieną), kol pagerėja. Toliau po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Nuo 12 m. amžiaus ūminės ligos metu po 1 tabletę kas valandą (iki 12 tablečių per dieną), kol pagerėja. Toliau vartoti po 1–2 tabletes 3 kartus per dieną. Nerekomenduojama vartoti šio vaisto su maistu ir gerimais. Tabletes vartoti mažiausiai pusę valandos prieš valgį ar pusę valandos po jo. Rekomenduojama leisti tabletes lėtai išsijuti burnoje. Mažems vaikams tabletes galima išsijuti nedidele kiekyje vandens. **Kontraindikacijos.** Alergija veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju, jeigu temperatūra nekrenta 3 dienas ar pakyla virš 39 °C, arba atsiranda neaiškūs negalavimai, arba savijauta negerėja. Visa tai gali būti ligos, kurią turėtų įvertinti gydytojas, požymiai. Kadangi šio vaistinio preparato vartojimas kodikiams nėra pakankamai ištirtas, jo neturėtų vartoti jaunesni kaip 1 metų vaikai. Reklamos teksto parengimo data 2024-11-11.

NUO **9⁹⁹** €



HESIO

500 mg, 30 plėvele dengtų tablečių **9⁹⁹** €
500 mg, 60 plėvele dengtų tablečių **18⁹⁹** €
500 mg, 120 plėvele dengtų tablečių **34⁹⁹** €
1000 mg, 30 plėvele dengtų tablečių **18⁹⁹** €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Kiekvienoje „Hesio“ 500 mg tablete yra 500 mg mikronizuotų flavonoidų (atitinka 450 mg diosmino ir 50 mg kitų flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną). Kiekvienoje „Hesio“ 1000 mg tablete yra 1000 mg mikronizuotų flavonoidų (atitinka 900 mg diosmino ir 100 mg kitų flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną). **Terapinės indikacijos.** „Hesio“ skirtas suaugusiųjų: lėtinio kojų venų nepakankamumo simptomams (kojų sunkumui, kojų patinimui, skausmui, naktiniam kojų mėšlungiui) lengvinti; paūmėjusio hemorojaus simptomams (skausmui, kraujavimui ir patinimui išangės srityje) lengvinti. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** „Hesio“ 500 mg tabletes: lėtinis venų nepakankamumas: rekomenduojama dozė suaugusiems yra 2 tabletes per parą 2 mėnesius: 1 tabletė vidurdienį ir 1 tabletė vakare valgio metu. Jei simptomai išlieka, gydymas gali būti tęsiamas dar 2 mėnesius; hemorojaus paūmėjimas: pirmas 4 gydymo dienas rekomenduojama dozė suaugusiems yra 3 tabletes 2 kartus per parą (6 tabletes per parą). Kitas 3 dienas – 2 tabletes 2 kartus per parą (4 tabletes). Tabletes vartokite valgio metu. „Hesio“ 1000 mg tabletes: lėtinis venų nepakankamumas: rekomenduojama dozė suaugusiems yra 1 tabletė per parą 2 mėnesius valgio metu. Jei simptomai išlieka, gydymas gali būti tęsiamas dar 2 mėnesius; hemorojaus paūmėjimas: pirmas 4 gydymo dienas rekomenduojama dozė suaugusiems yra 3 tabletes per parą (1 tabletė 3 kartus per parą arba 1 tabletė pirmą kartą ir 2 tabletes antrą kartą per parą). Kitas 3 dienas – 1 tabletė 2 kartus per parą (2 tabletes). Tabletes vartokite valgio metu. **Kontraindikacijos.** „Hesio“ vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumų priemonės.** Vaikams ir paaugliams „Hesio“ vartoti nerekomenduojama. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025 m. vasario mėn. ID: 000829964

NERVINĖS ĮTAMPOS MAŽINIMAS IR UŽMIGIMO LENGVINIMAS

NUO **4⁹⁹** €

PERSEN

40 dengtų tablečių
FORTE, 20 kietųjų kapsulių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas. PERSEN tablete yra 35 mg valerijonų šaknų sausio alkoholinio ekstrakto, 17,5 mg melisų lapų sausio ekstrakto, 17,5 mg pipirmėčių lapų sausio ekstrakto. PERSEN FORTE kapsulėje yra 87,5 mg valerijonų šaknų sausio alkoholinio ekstrakto, 17,5 mg melisų lapų sausio ekstrakto, 17,5 mg pipirmėčių lapų sausio ekstrakto. **Indikacijos.** Vartoti laikinos nedidelės nervinės įtampos mažinimui, pasunkėjusio užmigimo lengvinimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** PERSEN: Nervinės įtampos atleidžiama geriant po 3-4 PERSEN tab. 3 kartus per parą. Pasunkėjusio užmigimo atleidžiama geriant po 3-4 PERSEN tab. 1 kartą per parą 1 val. prieš miegą. Tabletes reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai nuo valgyimo laiko. PERSEN FORTE: Nervinės įtampos atleidžiama geriant po 2 PERSEN FORTE kaps. 2 kartus per parą. Pasunkėjusio užmigimo atleidžiama geriant po 2 PERSEN FORTE kaps. 1 kartą per parą 1 val. prieš miegą. Kapsules reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai nuo valgyimo laiko. PERSEN ir PERSEN FORTE pradeda veikti palaipsniui, kad gydymo veiksmingumas būtų optimalus, vaisto rekomenduojama gerti mažiausiai 14 dienų. Gydymo trukmė neribojama. PERSEN ir PERSEN FORTE nėra skirtas jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** PERSEN tablečių sudėtyje yra laktozės ir sacharozės. PERSEN FORTE kapsulių sudėtyje yra laktozės. Reklamos teksto parengimo data: 2025 m. gegužės mėn. ID:000746625

„PERSEN“ – NURAMINK SAVO RŪPESČIUS!

NUO RAUMENŲ IR SĄNARIŲ SKAUSMO

NUO **5⁹⁹** €



VIPROSAL B®

tepalas, 50 g **5⁹⁹** €
tepalas, 75 g **7⁹⁹** €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo yra 0,05 V gyvačių nuodu, 10 mg salicilo rūgšties, 30 mg raceminio kamparo ir 30 mg terpentino eterinio aliejaus. **Kodifikacijos:** sąnarių ir raumenų skausmų malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** nedidelis „Viprosal B“ kiekis (5-10 g, t. y. 1 ar 2 arbatiniai šaukštai, atšilvėjęs ir pažeistos vietos plotas) užtepamas ant skaudamos vietos ir įtrinamas į odą 1 arba 2 kartus per parą. Tepėti ant odos. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, odos opa ar kitos odos ligos. **Specialūs įspėjimai:** „Viprosal B“ negalima tepėti ant pažeistos odos. Saugotis, kad tepalo nepatektų ant gleivinės ir į akis. Vietinis rinkodaros teisės turėtojas atstovs: UAB Grindeks Kačeks Lietuva, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026-04-14

ĮSIMINTINGAS SPRENDIMAS NUO SKAUSMO!

NUO KARŠČIAVIMO IR SKAUSMO

NUO **8⁹⁹** €



IBUPROM

40 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams, 100 ml

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml „Ibuprom“ 40 mg/ml geriamosios suspensijos yra 40 mg ibuprofeno. **Indikacijos:** trumpalaikis silpno ir vidutinio skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. „Ibuprom“ skirtas 3 mėn. ir vyresniems kūdikiams ir vaikams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. 3-6 mėn. kūdikiams (> 5 kg) gerti po 1,25 ml 3 k. per parą, 6-12 mėn. kūdikiams (8-10 kg) – po 1,25 ml 3-4 k. per parą, 1-3 m. vaikams (10-15 kg) – po 2,5 ml 3 k. per parą, 3-6 m. vaikams (15-20 kg) – 3,75 ml 3 k. per parą, 6-9 m. vaikams (20-30 kg) – po 5 ml 3 k. per parą, 9-12 m. vaikams (30-40 kg) – po 7,5 ml 3 k. per parą. Nurodytą vaisto dozę reikia skirti maždaug kas 6-8 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofenui, kitoms nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU) ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitų NVNU vartojimas, kraujo krešėjimo sutrikimai, paskutinis nėštumo trimestras, tromboticoponija, sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas, praėjusio buvusio padidėjusio jautrumo reakcijos (astma, rinitas, angioneurozinis patinimas, dilgėlinė) vartojant kitą NVNU, įskaitant ir acetilsalicilo rūgšties darinius, esama ar buvusi pepsinė opa / hemoragija, buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu, kraujavimas į smegenis, virškinimo trakto ar kitoks kraujavimas, sisteminė raudonoji vilkligė. **Specialūs įspėjimai:** senyviems pacientams, pacientams, turintiems inkstų, kepenų, žarnyno, virškinimo trakto problemų, pacientams, kuriems anksčiau buvo virškinimo trakto opa ar infarktas, sergantiems diabetu, sisteminė raudonoji vilkligė, širdies nepakankamumu, virškinimo trakto opa, hipertenzija, bronchių astma, rūkantiems pacientams, taip pat pacientams, kuriems padidėjęs cholesterolio kiekis, yra įgimtas porfirino apykaltos sutrikimas, dehidracija, vartojantiems vaistus, galinčius padidinti opų ar kraujavimo pavojų, ibuprofeną reikia vartoti atsargiai. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024-12-12.

RENKUOSI „IBUPROM“. RENKUOSI LAISVĖ.

SVORIO MAŽINIMUI

NUO **33⁹⁹** €



ORLISTAT POLPHARMA, 60 mg, 42 kietosios kapsulės

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Vienoje kietojoje kapsulėje yra 60 mg orlistato. **Indikacijos.** Orlistat Polpharma yra skirtas antsvorio turintiems (Kūno masės indeksas KMI ≥28 kg/m²) suaugusiems žmonėms svorio mažinti. Vartojant šį vaistinį preparatą reikia laikytis šiek tiek sumažinto kaloriningumo ir sumažinto riebiųjų kiekių dietos. **Dozavimas:** rekomenduojama „Orlistat Polpharma“ dozė yra viena 60 mg kapsulė tris kartus per parą. Per 24 valandas galima išgerti ne daugiau kaip tris 60 mg kapsules. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; kartu taikomas gydymas ciklosporinu; lėtinės malabsorbcijos sindromas; cholestazė; nešumas; žindymas; kartu taikomas gydymas varfarinu arba kitais geriamaisiais antikoaguliantais. **Specialūs įspėjimai ir atsargumų priemonės:** pacientas turi tvirtai laikytis rekomenduotos dietos. Jei orlistatas vartojamas kiekvieno maitinimosi metu arba valgomas riebus maistas, gali dažniau pasireikšti virškinimo trakto simptomų tikimybė. Gydymas orlistatu gali sutrikdyti ribalose tirpių vitaminų (A, D, E ir K) absorbciją. Todėl reikia gerti polivitaminų papildą. Cukrinii diabetu sergantis asmuo, prieš pradėdamas gydymą „Orlistat Polpharma“ turi pasitarti su gydytoju. Pacientai, vartojantys „Orlistat Polpharma“ kartu su vaistinėmis preparatais hipertenzijai arba hipercholesterolemijai gydyti, turi pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Amiodaroną, levotiroksiną vartojantis pacientai, prieš pradėdami gydymą „Orlistat Polpharma“, turi pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Pranešta apie kraujavimo iš tiesiosios žarnos atvejus pacientams, vartojantiems orlistatą. Jeigu taip nutinka, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Jeigu prasideda stiprus viduriavimas, geriamieji kontraceptikai gali nesukelti pageidaujamo poveikio, todėl rekomenduojama naudoti papildomas kontracepcijos priemones. Pacientai, sergantys inkstų ligomis, epilepsija prieš pradėdami gydymą „Orlistat Polpharma“, turi pasitarti su gydytoju. **Teksto parengimo data:** 2026.05.

SUMAŽINK SVORĮ SAUGIAI.

KVĖPAVIMO TAKŲ GLEIVĖMS SKYSTINTI

NUO **5⁹⁹** €



RESPIFORTIN, 600 mg, 10 šnypščiučių tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 šnypščiučio tablete yra 600 mg acetilcisteino. **Indikacijos:** trumpalaikiam gleivių skystinimui sergant ūminėmis kvėpavimo takų ligomis (persilimu), susijusiomis su padidėjusiu tirštų ir klampių gleivių išsiskyrimu. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Šnypščiąją tabletę reikia ištrinti 1/2 stiklinės vandens ir nedelsiant išgerti. Del galimo suskystėjusių gleivių susikaupimo bronchuose reikia vartoti likus bent 4 valandoms iki miego. Gydymo metu rekomenduojama vartoti daug skysčių. **Kontraindikacijos:** negalima vartoti padidėjusio jautrumui veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, esant astminėi būklei, sergant fenilketonurija, esant skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opai, jaunesniems nei 2 metų vaikams; taip pat netinkamas vartoti vaikams ir paaugliams nuo 2 iki 18 metų. **Specialūs įspėjimai:** jei kartu reikia vartoti acetilsalicilą ir per burną vartojamus antibiotikus, šiuos vaistus preparatus reikia vartoti su bent 2 valandų pertrauka. **Gamintojo atstovas:** „Natur Produkt Vilnius“, Konstitucijos pr. 12, Vilnius.

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!**AMBIO**

CHOLESTEROL BALANCE COMPLEX, 90 kapsulių **34⁹⁹ €**
 KALIS IR MAGNIS, miltelių geriamajam tirpalui, 30 paketėlių **14⁹⁹ €**
 MAISTO PAPILDAS

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!**AMBIO**

REGĖJIMUI, 30 kapsulių **12⁹⁸ €**
 MULTIVITAMINAI VYRAMS PLUS, 60 tablečių **19⁹⁹ €**
 MAISTO PAPILDAS

PIC MATUOKLIAI / INHALIATORIAI / TERMOMETRAI

IKI -45%

**PIC SOLUTION****MEDICINOS PRIETAISAI**

„PIC Solution“ jau daugiau nei 50 metų yra vienas žinomiausių Italijos medicinos priemonių prekių ženklų. Kiekvienas PIC sprendimas yra daugiau nei kraujospūdžio matuoklis, inhaliatorius ar termometras. Tai paprastas būdas parodyti rūpestį ir paklausti „Kaip jautiesi?“. Savo laboratorijose kuriame pažangius prietaisus, skirtus inhaliacijai, širdies darbui ar temperatūrai stebėti. Visi prietaisai turi 5 metų garantiją* ir jų tikslumas patvirtintas klinikiniais tyrimais**.

* Išskyrus termometrus, matuoklį „LiteRapid“, inhaliatorių „AirCube“.

** Taikoma kraujospūdžio matuokliams

KIEKVIENA ŠIRDIS TURI SAVO RITMĄ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtais prekėmis

1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra
pigesnė arba
tokia pati –
NEMOKAMAI!**COREGA**

fiksuojamasis dantų protezų kremas, be skonio, 40 g **8⁹⁵ €**
 BIO FORMULA, dantų protezų valymo tabletės, 30 vnt. **6⁹⁵ €**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

COREGA – visapusiška dantų protezų priežiūra. Tvirtinimo priemonės užtikrina saugų laikymą ir komfortą visą dieną, o valymo tabletės efektyviai pašalina dėmes, naikina bakterijas ir padeda palaikyti gaivą.

ŠVARA IR PASTIKĖJIMAS – KIEKVIENAI ŠYPSENAI.



PIRKDAMI **NORFOS VAISTINĖJE**
 JŪS GAUSITE ČEKĮ, KURIUO GALĖSITE APMOKĖTI
 NET **20%** SUMOS UŽ ŠĮ PRODUKTĄ:

-20%

PROTINĖI VEIKLAI, PAŽINIMO FUNKCIJAI

DEMATSYT® CHOLINE, 30 kapsulių **22⁹⁹ 18⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

Trigubo poveikio formulė su cholino bitartratu, dviskiausių ginkmedžių ir juodųjų pipirų ekstraktais jūsų smegenų veiklai. Padeda palaikyti normalią homocisteino bei lipidų apykaitą, kuri svarbi pažinimo funkcijai, smegenų kraujotakai ir nerviniams signalams perduoti.

PALAIKYMO KOMANDA JŪSŲ SMEGENIMS.



LAIMĖS VALANDOS

I -VI

iki 9 val. ir
14-15 val.*

VII

14-15 val.*

Perkant **3***
ir daugiau prekių

-30%

Perkant **2***
prekes

-25%

Perkant **1**
prekę

-20%



*Nuo 2026 m. gegužės 1 d. NORFOS vaistinėje akcijos LAIMĖS VALANDOS metu perkant 1 prekę taikoma 20 % nuolaida, perkant 2 prekes – 25 % nuolaida, vaistams – 20 % nuolaida, o įsigyjant 3 ir daugiau prekių – 30 % nuolaida, nereceptiniams vaistams – 25 %, receptiniams – 20 % nuolaida.

Taikomos momentinės 20 % dydžio nuolaidos receptiniams vaistams, 20 ar 25 % nuolaidos nereceptiniams vaistams, o kitoms prekėms – 20, 25 arba 30 % nuolaidos, atsižvelgiant į atitinkamo pirkimo metu įsigyjamų prekių bendrą kiekį.

Nuolaida taikoma perkant pilnas prekių pakuotes, kurių kiekvienos vertė arba priemoka ne mažesnė nei 1,50 euro. Prekės, perkamos su kompensuojamuoju receptu, įskaičiuojamos į įsigyjamų (perkamu) prekių krepšelį (kiekį), tačiau joms nuolaida netaikoma.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms (pvz., mėnesinio leidinio nuolaidos; prekėms, vaistinėse pažymėtoms geltonais kainoženkliais; akcinėms prekėms, kai nuolaida taikoma įsigyjant ne mažiau kaip 2 nurodytus produktus, ir kt.). Momentinės nuolaidos netaikomos perkant prekes su kompensuojamuoju receptu, mokant už skiepus, taip pat pradinio maitinimo pieno mišiniams, kartiniams (gaminamiems vaistinėje) ir vardinams vaistams, įsigyjant dovanų kuponus, prekių pakavimo maišelius. Momentinės nuolaidos netaikomos perkant www.gintarine.lt, net jei už prekes atsisikaitoma įs atsiimant vaistinėse. Nuolaidos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Informacija apie akcijas ir prekes, kurioms taikomos LAIMĖS VALANDŲ nuolaidos, teikiama kiekvienoje vaistinėje, el. paštu info@nvaistine.lt arba nemokamu tel. +370 800 10008. Visos nuolaidos galioja tik su PC NORFA lojalumo kortele.

Rytinės LAIMĖS VALANDOS vyksta nuo vaistinės atidarymo iki 9 val. ryto. Jei vaistinė pradeda dirbti 9 val. ar vėliau, rytinės LAIMĖS VALANDOS joje nevyksta.



2 UŽ 1 KAINĄ



1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMAI!

„MÖLLER'S" ŽUVŲ TAUKAI IR OMEGA-3 KAPSULĖS

MAISTO PAPILDAI

„Möller's" – tai šimtmečių puoselėjami žuvų taukai visai šeimai. „Möller's" žuvų taukų kapsulės išsiskiria kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyvių medžiagų deriniais. Tyri ir gerai išvalyti „Möller's" žuvų taukai puikiai tinka vartoti kasdien visą gyvenimą.

OMEGA-3 EKSPERTAI JAU DAUGIAU NEI 170 METŲ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

Gerklė ir imuninei sistemai



1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMAI!

PROPODEZAS

MAISTO PAPILDAI

„Propodezas" – tai propolis (bičių pikis) su vitaminu C ir augaliniais ekstraktais, naudingas ne tik gerklei ir imunitei, bet ir gaiviai skanūs. Rinkis iš 4 skirtingų skoniu arba stipresnę versiją – PROPODEZAS FORTE su šėvimedžių ir bičių pieneliu. Imbieriai, šėvimedžio uogų ekstraktas, vitaminas C padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų ir imunito veiklą.


Net 50 čiulpiamų tablečių!

Tinka suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų

BIČIŲ JĖGA IR GERKLEI, IR IMUNITETUI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

Širdžiai ir jos apsaugai



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

NATASPIN CARDIO PROTECT, 30 kapsulių 20⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAS

„NatAspin" CARDIO PROTECT™ – širdies stiprybei ir apsaugai nuo oksidacinės pažeidimo, sveikam širdies senėjimui, energijos apykaitai, kraujotakai, nervų sistemai – rinkintis japonų ilgaamžiškumo filosofijos įkvėpta formulė su dideliu kiekiu kofermento Q10, ypač stipriais antioksidantais iš standartizuotų ekstraktų.

„NATASPIN" CARDIO PROTECT™ – ŠIRDIES STIPRYBEI IR APSAUGAI.

Žarnyno mikroflorai



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

BIFOVAL®

FORTE, 15 kietųjų kapsulių 10⁷⁹ €

BABE, 25 kramtomosios tabletės 10⁴⁹ €

MAISTO PAPILDAI

Specialiai parinktos sudėties maisto papildai kiekvieno ryto ritualui 15-30 min prieš kiekvienus pusryčius.

„Bifoval" Forte™ – 5 milijardai lacto- ir bifidobakterijų. Sudėtyje 3 bakterijų padėrmės. Visai šeimai (vaikams nuo 5 metų).

„Bifoval" Babe™ – braškių skonio kramtomos tabletės, kurių sudėtyje yra 4 rūšių Lacto ir Bifido bakterijų kompleksas (3,15 mld. 1 tableteje). Vaikams nuo 3 metų.

Vartojant antibiotikus gerti 1 val. prieš arba po antibiotikų vartojimo.

boderm



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

OLIPROX

nagų lakas grybeliui (gelis vandens pagrindu), 12 ml 21⁴⁹ €

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Oliprox"™ nagų lakas (gelis vandens pagrindu) – veiksminga priemonė, padedanti užkirsti kelią grybelinei infekcijai bei pagalbinė priemonė gydant onichomikozę (nagų grybelį).

Stresui, miegui, virškinimui, menopauzei



1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMAI!

ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS

MAISTO PAPILDAI

Sukurta fitoterapijos ekspertų, pasitelkiant mokslą ir tradicijas nuo 1883 m.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

Vitaminai akims



1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

SUPEROPTIC, 60 minkštųjų kapsulių 23⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAS

Sudėtyje gausu omega-3 riebalų rūgščių, taip pat yra vitaminų (A, B grupės, C, E) ir mikroelementų (cinko, mangano, vario, seleno). Maisto papildas turi luteino ir zeaksantino, kurių natūraliai yra akių geltonojoje dėmėje. Dėl sudedamųjų dalių „SuperOptic" padeda išsaugoti normalų regėjimą ir apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. 1 kapsulė per parą nuryti užsigeriant nedideliu kiekiu skysčio. Rekomenduojama produktą vartoti valgio metu.

VISAPUSĖ APSAUGA TAVO AKIMS.

ROYAL DENTA

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Royal Denta" burnos priežiūros priemonės sukurtos remiantis mokslu ir odontologijos srities atradimais. Sidabru praturtintų dantų pastų savybės ir jų poveikis patvirtintas nepriklausomoje sertifikuotoje laboratorijoje. Kartą išbandę, klientai ir vėl pasirenka „Royal Denta". Rekomenduojama odontologai.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



JAMIESON turi ilgametę patirtį - savo produkciją eksportuoja po visą pasaulį jau nuo 1922 metų. JAMIESON naudoja išskirtinę „360 Pure“ technologiją, kuri apima net 360 gamybos proceso kontrolės etapų.

1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra
pigesnė arba
tokia pati —
NEMOKAMAI!

„JAMIESON“ MAISTO PAPILDAMS



Pagaminta Kanadoje

1+1

Perkant vieną pakuotę, antrą pigesnę arba tokia pati — NEMOKAMAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

biofarmacija

Kuriame tik tai, ko organizmui iš tiesų reikia



MINERALAI IR ELEKTROLITAI - ORGANIZMO FUNKCIJOMS PALAIKYTI

aquaELECTROLYTES forte, bioKALIS forte ir bioCa+K+Mg+Zn su vitaminu D3 – tai skirtingų sudėčių mineralų kompleksai su Negyvosios jūros kalio ir magnio mineralais. Formulės sukurtos svarbioms organizmo funkcijoms palaikyti.

Mineralai ir vitaminas D padeda palaikyti svarbias organizmo funkcijas: kalis – normalų kraujospūdį, magnis – energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą ir psichologinę funkciją, kalcis – normalią kaulų ir dantų būklę, cinkas – normalią imuninės sistemos veiklą, o vitaminas D – normalų kalcio ir fosforo įsisavinimą bei kaulų būklę.



KASDIENIAM IMUNITETUI IR ORGANIZMO ATSPARUMUI

bioCINKAS 30 mg – grynas cinko citratas imunitetui, odai ir ląstelių apsaugai. IMUNO C + ECHINACEA + GINGER – stiprus vitamino C, ežiuolės ir imbiero kompleksas imunitetui. Viename pakelyje – 500 mg vitamino C, kuris padeda palaikyti normalią imuninės ir nervų sistemos veiklą, energijos apykaitą ir mažinti nuovargį. Ežiuolės ir imbiero ekstraktai padeda palaikyti kvėpavimo takų funkciją ir natūralų organizmo atsparumą.



ŠŪNARIAMS, ŠIRDŽIAI IR KRAUJOTAKOS SISTEMAI

„ATLANT“ – kolageno formulė šūnariams. Viename pakelyje yra 12 200 mg kolageno, 1 500 mg gliukozamino, 120 mg kalcio ir 12 mg vitamino C. Nr. 1 kolageno maisto papildas šūnariams Lietuvoje 2024–2025 m.* „ATLANT Širdis“ – kompleksinė formulė su 260 mg resveratolio, 13 mg likopeno, kofermentu Q10, magniu, kaliu, geležimi, vitaminu B1 ir keturiais augalų ekstraktais. Išsiskiria didžiausiu polifenolių kiekiu.* Magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, kalis – normalų kraujospūdį, o vitaminas B1 – normalią širdies veiklą.

* Nustatyta pagal 2024–2025 m. UAB „Softdent“ duomenis. * „ATLANT Širdis“ sudėtyje – didžiausias resveratolio ir likopeno kiekis lyginant su visais Lietuvoje platinamais maisto papildais. Nustatyta pagal UAB „Softdent“ 2024 m. duomenis.



NATŪRALIOS FORMULĖS ENERGIJAI, MIEGUI IR VIRŠKINIMUI PALAIKYTI

HI Matcha + Inulin – natūralus antioksidantų, chlorofilo ir švelnaus kofeino šaltinis, padedantis palaikyti energiją, susikaupimą ir kasdienį gyvybingumą. „LABANAkt“ – melatoninas, magnis ir vaistinis valerijono ekstraktas – formulė geresniam miegui. „LAXMAG 3000 mg“ – 3000 mg magnio citrato (iš kurio magnio 474 mg), 3000 mg inulino, senos lapų ekstrakto ir rabarbarų šaknų ekstraktai – skaidulų šaltinis. Padeda normaliai žarnyno motorikai*.

* Senos lapų ekstraktas ir rabarbarų ekstraktas padeda normaliai žarnyno motorikai ir veiklai.

KEPENŲ FUNKCIJAI IR RIEBALŲ APSAUGAI

bioSILYMARIN ir Silymarin lipid formulėse esantis silimarinas (tikrojo margainio ekstraktas) padeda palaikyti kepenų ląstelių apsaugą ir natūralų organizmo valymo procesą. „bioSILYMARIN“ – Nr. 1 maisto papildas kepenims Lietuvoje!* SilyMARIN LIPID papildomai sudėtyje turi cholino, lecitino ir ciberžolės ekstrakto, kurie prisideda prie lipidų apykaitos ir palengvina riebalų atsargų kaupimąsi kepenyse.

* Pagal UAB „Softdent“ 2024–2025 m. duomenis.



SPORTUOJANTIEMS IR AKTYVIAI GYVENANTIEMS

„Biofarmacijos“ SPORT linija – tai skirtingų sudėčių maisto papildai aktyviam gyvenimo būdui ir sportui. Liniją sudaro „SPORT&CARDIO“, „SPORT&HYDRO+“, „SPORT&JOINTS“, „SPORT&Amino W.H.O.“, „SPORT&Creatine + BCAA 2:1:1“, „SPORT&Protein2“ ir „SPORT&Balance“ – kiekvienas produktas sukurtas pagal individualius fizinio krūvio ir atstatymo poreikius.

Formulėse derinami elektrolitai su magniu ir kaliu, kreatinas, BCAA, baltymai, vitaminai, folio rūgštis, augaliniai ekstraktai ir neuroadaptogenai. Miltelių forma užtikrina greitą pasisavinimą ir patogų vartojimą, o tiksliai subalansuotos sudėtyje leidžia rinktis pagal individualius tikslus – jėgą, ištvermę, energiją, šūnariams ar kasdieniam aktyvumui.

SPORT linija – aiškos formulės ir apgalvoti sprendimai žmonėms, kurie gyvena aktyviai.



MAISTO PAPILDAI

Jau 15 metų Lietuvoje!

SPRENDIMAS DRĖGNAM KOSULIUI GYDYTI

NUO 4²⁵ €

FLAVAMED
15 mg/5 ml, geriamasis tirpalas, 100 ml 4⁵⁰ €
30 mg/5 ml, geriamasis tirpalas, 100 ml 4⁷⁵ €
30 mg, 20 tablečių 4²⁵ €
60 mg, 10 šnypščių tablečių 5⁹⁰ €



NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
„Flavamed“ vartojamas sergant plaučių ir bronchių ligomis, kai susidaro klampūs gleivės ir jos gali lengviau pašalinti. Geriamasis tirpalas vartojamas po valgio naudojant matavimo šaukštą. Šnypščiosios tabletės šlirpinamos stiklinėje vandens ir tirpalas geriamas po valgio. 30 mg tabletes reikia nuryti nesukramtytas po valgio, užgeriant pakankiamu kiekiu skysčio. Suaugusiems ir vaikams, vyresniams kaip 12 m., po 30 mg ambrozolio hidrochlorido 3 kartus per parą pirmąsias 2–3 dienas, vėliau – po 30 mg ambrozolio hidrochlorido 2 kartus per parą, 6–12 m. vaikams – po 15 mg ambrozolio hidrochlorido 2–5 kartus per parą, 2–5 m. vaikams – po 7,5 mg 3 kartus per parą. Be gydytojo nurodymo ilgiau kaip 4–5 dienas „Flavamed“ vartoti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. „Flavamed“ 30 mg tablečių negalima vartoti vaikams iki 6 m. „Flavamed“ 60 mg šnypščių tablečių negalima vartoti vaikams iki 12 m. „Flavamed“ 30 mg/5 ml ir 15 mg/5 ml geriamąjį tirpalą negalima vartoti vaikams iki 2 m. Specialūs įspėjimai: Atsargiai reikėtų vartoti pacientams sutikus bronchių epizodo motoriką ir esant gausiai sekrecijai: sutikus rinito funkciją arba sergant sunkia kepenų liga; esant histamininiam netoleravimui. Pastabikite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Flavamed“, jeigu jums praėjęje pastebėta labai sunki padidėjusio jautrumo reakcija (Siverzo-Džonsono sindromas ir Lajelo sindromas). „Flavamed“ 15 mg/5 ml ir 30 mg/5 ml geriamąjį tirpalą bei šnypščiosias tabletes yra sorbitolis ir benzenkarboksirūgštis. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurius laisvinantį poveikį. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad Jūs (ar Jūsų vaikas) netoleruotumėte kokių nors angliavandenių arba Jums (ar Jūsų vaikui) nustatytas retas genetinis sutrikimas – įgimtas fruktozės netoleravimas – prieš vartodami šio vaisto (ar prieš duodami jį savo vaikui), pasakykite gydytojui. „Flavamed“ šnypščiosios tabletes yra benzoilo alkoholio, kuris gali sukelti alerginių reakcijų. Dėl susikaupimo ir toksinio poveikio rizikos (metabolinės acidozės) dideli kiekiai turi būti vartojami atsargiai ir tik tuo atveju, jeigu būtina, ypač neščioms ar žindančioms moterims, asmenims, kuriems yra kepenų arba inkstų pažeidimas. Galimos odos alerginės reakcijos. UAB „Berio Chemie Menapi Balti“, J. Jasiūnko g. 16A, LT-03623 Vilnius, tel. +370 5 269 19 41, l1@berlio-chemie.com, LT-FLA-P-2025_MFUDU, 2025/12.

SKYSTINA GLEIVES IR LINGVINA ATSIKOSĖJIMĄ.

NUO KOSULIO

NUO 4⁹⁹ €

HEDELIX
S.A. 40 mg/ml geriamieji lašai, tirpalas, 50 ml 4⁹⁹ €
8 mg/ml sirupas, 100 ml 8⁹⁹ €



NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Gebenų lapų tirštasis ekstraktas.
Vartojamas atsišokėjimui lengvinti, sergant peršalimo ligomis ar lėtiniu bronchitu. „Hedelix“ sirupo vartojimas: suaugusiems ir vyresniems nei 10 m. vaikams: 5 ml sirupo 3 kartus per parą; 4–10 m. amžiaus vaikams: 2,5 ml sirupo 4 kartus per parą; 1–4 m. amžiaus vaikams: 2,5 ml sirupo 3 kartus per parą; vaikams iki 1 metų: 2,5 ml sirupo 1 kartą per parą. Vartojimo būdas: vaistas vartojamas per burną. Sirupo neskieskite, bet užgerkite dideliu kiekiu skysčio. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija gebenų lapams arba bet kuriai pagalbinei „Hedelix“ medžiagai; jeigu yra argininsukcinatsintetazės trūkumas (metabolinė šlapalo ciklo liga). Specialūs įspėjimai: „Hedelix“ sudėtyje yra sorbitolio, propilenglikolio ir makroglicerolio hidroksisteatato. Makroglicerolio hidroksisteatatas ir sorbitolis gali sukelti skrandžio sutrikimų ir viduriavimą. „Hedelix s.a.“ geriamųjų lašų vartojimas: suaugusiems ir vyresniems nei 10 m. vaikams: po 31 lašą 3 kartus per parą; 4–10 m. amžiaus vaikams: po 21 lašą 3 kartus per parą; 2–4 m. amžiaus vaikams: po 16 lašą 3 kartus per parą. Vartojimo būdas: vaistas vartojamas per burną. „Hedelix s.a.“ reikia vartoti su pakankiamu kiekiu vandens. Rekomenduojama, kad mažai vaikų „Hedelix s.a.“ suvartotų įmėsąjį į arbaštą ar vaikai sulius. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija gebenų lapų ekstraktui arba bet kuriai pagalbinei „Hedelix“ medžiagai; jeigu yra argininsukcinatsintetazės trūkumas (metabolinė šlapalo ciklo liga); kūdikiams ir vaikams iki 2 m. amžiaus: didėję laringosmos pavojus; jeigu Jūs sergate bronchine astma ar kita kvėpavimo takų liga, dėl kurios yra padidėjęs kvėpavimo takų jautrumas. Specialūs įspėjimai: šio vaisto 1 ml (31 lašas) yra 857 mg propilenglikolio. Reklamos teksto parengimo data 2024-09.

JEI VARGINA KOSULYS, GANTA JUMS PATARIA: „HEDELIX“.

NOSIES GLEIVINĖS PABURKIMUI MAŽINTI

5⁹⁹ €

RHINO-STAS
nosies purškalas, tirpalas, 10 ml



NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml nosies purškalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: „Rhino-stas“ yra simpatikomimetikas. Purškalas siauria kraujagyslės, todėl mažina nosies gleivinės paburkimą. Vartojamas trumpalaikis nosies gleivinės paburkimo mažinti sergant sloga arba prienosinių ančių uždegimu (sinusitu). Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 10 m. vaikams bei paaugliams reikia purkšti po 1 špuškimą „Rhino-stas“ tirpalą į kiekvieną nosies landą 1–3 kartus per parą tada, kada reikia. Kontraindikacijos: alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; sausasis nosies gleivinės uždegimas (sausasis rinitas); pacientams, kuriems po nosį neseniai buvo atlikta smegenų operacija; jaunesniems kaip 10 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: „Rhino-stas“ galima vartoti tik atidžiai įvertinus jo vartojimo riziką ir galimą naudą šiais atvejais: pacientams, kurie vartojo ar vartoja vaistų nuo depresijos (monoaminooksidazės inhibitorių) arba kitų vaistų, kurie gali labai padidinti kraujospūdį; kai padidėjęs akispūdis, ypač sergant uždaruoju kampo glaukoma; sergant sunkia širdies ir kraujagyslių sistemos liga (pvz., vainikinių širdies arterijų liga, hipertenzija); sergant feochromocitoma (antinksčių naviku); sergant porfirija; sergant medžiagų apykaitos ligomis (pvz., hipertiroido, cukrinio diabetu). Pakuotės lapelio peržiūros data 2025-08-12. 2605_SB_Rhino-stas_V01.IT.

„RHINO-STAS“ PURŠKALAS – PIRMOJI PAGALBA SERGANČIAMS SLOGA AR SINUSITU!

6⁹⁹ €

DORITRI MINT
0,5 mg/1 mg/1,5 mg, 20 suslęgtųjų pastilių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos. Tyrotrichinas, benzalkonio chloridas, benzokainas (tyrotrichinum, benzalkonium chloridum, benzocainum). „Doritri Mint“ sudėtyje yra vietinio poveikio anestetiko benzokaino ir antimitrobinio poveikio medžiagų tirotrichino bei benzalkonio chlorido. Jie skiriami burnos ir gerklės ligoms gydyti. „Doritri Mint“ skirtas pagalbiniam lengvo arba vidutinio sunkumo gerklės ir burnos ertmės uždegimui gydyti, ypač, esant gerklės uždegimui su gerklės peršėjimu ir rijimo sutrikimu; burnos gleivinės ir dantenų uždegimui. Jeigu gerklės infekcija yra sunki arba gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti šį vaistą kreipkitės į gydytoją. Vartojimo būdas. Įdėkite kietąją (-ąsias) pastilę (-es) į burną ir leiskite jai (-oms) ištirpti. Pastilės negalima kramtyti ar nuryti. „Doritri Mint“ negalima vartoti prieš dantų valymą arba 8 kartų po jo, kadangi dantų pastos gali sumažinti pastilių poveikį. Dozavimas. Rekomenduojama dozė suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. bei vyresniems vaikams yra 1–2 kietosios pastilės, vartojamos keletą kartų per parą kas 2–3 val., leidžiant joms lėtai ištirpti burnoje. Negalima viršyti 8 kietųjų pastilių per parą dozę. Simptomams išnykus, gydymą reikia tęsti dar 1 parą. Kadangi vartojimo patirties jaunesniems kaip 12 m. vaikams nepakanka, vartojimo rekomendacijų vaikams nuo 6 iki 11 m. pateikti negalima. Specialūs įspėjimai. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“. Jeigu sergate pilingu tonzilitu (tonzilių uždegimas), kartu pasireiškiančiu su karščiavimu, gydytojas nuspręs, ar Jums reikia vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint“ kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint“, jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Je

PERŠALIMO LIGŲ SIMPTOMAMS LENGVINTI

NUO 7⁹⁹ €

FERVEX®

vaikams, granulės geriamajam tirpalui, 8 paketėliai 7⁹⁹ €
 suaugusiems, granulės geriamajam tirpalui, 8 paketėliai 7⁹⁹ €
 suaugusiems, granulės geriamajam tirpalui, be cukraus, 8 paketėliai 8⁹⁹ €



NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 paketėlyje „Fervex“ suaugusiems ir suaugusiems, be cukraus, yra 500 mg paracetamolio, 25 mg feniramino maleato, 200 mg askorbo rūgšties; 1 paketėlyje „Fervex“ vaikams yra 280 mg paracetamolio, 10 mg feniramino maleato, 100 mg askorbo rūgšties. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikis ūminis peršalimo ligų simptomas (karščiavimo, nosies gleivinės patinimo, skausmo) lengvinimas. **Vertojimo būdas ir dozavimas:** „Fervex“ suaugusiems, be cukraus: suaugusiems ir paaugliams nuo 15 m. (sveikiantiems daugiau kaip 50 kg) gerti po 1 paketėlį, jei reikia, kartoti mažiausiai po 4 val., neviršijant 3 paketėlių per parą; „Fervex“ vaikams: 6–10 m. vaikams gerti po 1 paketėlį 2 kartus per parą (mažiausiai 12 val.); 10–12 m. vaikams – po 1 paketėlį 3 kartus per parą (mažiausiai kas 8 val.); 12–15 m. paaugliams – po 1 paketėlį 4 kartus per parą, bet ne dažniau kaip kas 6 valandas. Mažiamajam gydymo trukmė yra 5 dienas, vartojant „Fervex“ suaugusiems, ir 3 dienas – „Fervex“ vaikams. Jei inkstų ar kepenų funkcija sutrikusi, vartoti atsargiai, rekomenduojama sumažinti dozę ir padidinti minimalų intervalą tarp dozių. Rekomenduojama, kad paros dozė trypalės būtų laikomas ne ilgiau kaip 3 valandas. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas vaisto sudedamosioms dalims, sunkios kepenų nepakankamumas, aktyvios kepenų ligos, uždegimo kampo glaukoma, šlapimo susilaikymas, skrandžio praeivės stenozė, šlapimo takų akmenys. „Fervex“ suaugusiems: draudžiama vartoti vaikams ir paaugliams iki 15 m. „Fervex“ vaikams: draudžiama vartoti vaikams iki 6 metų. „Fervex“ suaugusiems, be cukraus – feniletonurija. **Specialios įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergate Žilberto (Gilbert) sindromu, sergate kepenų arba inkstų liga, piktnaudžiaujate alkoholiniais gėrimais, yra anoreksija, kacheksija arba ligalaidė bloga mityba (glutathiono atsargos kepenyse būna mažos), yra dehidracija, hipovolemija, sutrikusi gėlių apykaita, yra polinkis susiaurėjusi aterosklerozė šlapimo takuose, pacientams mažiau nei 50 kg, trūksta gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės, yra hemolitinė anemija, yra padidėjęs jautrumas acetalicidui rūgšties, pasireiškiantis bronchų spazmo priepuoliais, jeigu sergate ar pasireiškė ūminis virusinis hepatitas arba jeigu vartojate fluoksalidolį (antibiotiką), labai psuolęje kvėpavimas – pagreityje kvėpavimas, atsiranda mieguistumas, pykinimas ir vėmimas. Atsiradus odos išbėrimui ar kitoms alergijos požymiams, nutraukite gydymą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Reikia patikrinti, ar tuo pat metu nevartojama kitų vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra paracetamolio, feniramino ar kitų anticholinerginių vaistų, vitamino C ir neryšyti diabeto insulino dozės. Sergantiems cukriniu diabetu atsargiai vartoti „Fervex“ suaugusiems, sergantiems feniletonurija atsargiai vartoti „Fervex“ suaugusiems, be cukraus, esant nustatyti gliukozės ir galaktosės malabsorbcijai. Šio vaistinio preparato negalima vartoti. Daugiau informacijos žr. vaistinių preparatų charakteristikų santraukose arba pakuočių lapeliuose. Reklamos teksto parengimo data: 2025-09-10. PM-IT-2025-9-5344.

NUO 5⁹⁹ €

PROSPAN®

7 mg/ml sirupas, 100 ml 7⁹⁹ €
 26 mg, 20 kietųjų pastilių 5⁹⁹ €
 65 mg, 10 šnypščiujų tablečių 6⁹⁹ €
 35 mg/5 ml, geriamasis tirpalas, 21 paketėlis po 5 ml 8⁹⁹ €



NERECEPTINIAI AUGALINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 ml sirupo yra 7 mg Hederæ helios L. folium (gebeņu lapų) sausio ekstrakto (5–75:1); 5 ml geriamojo tirpalo (viename paketėlyje) yra 35 mg Hederæ helios L. folium (gebeņu lapų) sausio ekstrakto (5–75:1); 1 kietoji pastilė yra 26 mg Hederæ helios L. folium (gebeņu lapų) sausio ekstrakto (5–75:1); 10 kietųjų pastilių yra 260 mg Hederæ helios L. folium (gebeņu lapų) sausio ekstrakto (5–75:1); 1 šnypščiuoji tabletė yra 65 mg Hederæ helios L. folium (gebeņu lapų) sausio ekstrakto (5–75:1). **Indikacijos:** ūminio bronchito sukeltos kosulio lengvinimas, atskleidimo gerinimas. **Vertojimo būdas ir dozavimas:** „PROSPAN“ 7 mg/ml sirupas: 1–6 m. vaikams vartoti po 25 ml 2 kartus per dieną; 6–12 m. vaikams – po 5 ml 2 kartus per dieną; suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams – po 5 ml 3 kartus per dieną. Sirupui matuoti naudoti matavimo taurelę, esančią pakuočėje. Prieš vartojimą buteliuką gerai supurtyti. „PROSPAN“ 35 mg/5 ml geriamasis tirpalas: suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų paaugliams vartoti po 1 paketėlį (tirpalą 5 ml) tris kartus per parą; 6–11 metų vaikams vartoti po 1 paketėlį (tirpalą 5 ml) du kartus per parą. Prieš vartojimą paketėlį lengvai pamaušyti. Vartoti per burną. Geriamajam tirpalui reikia šgeri nedidelę rie (arba prieigę du metū) ir vaker. „PROSPAN“ 26 mg kietosios pastilės: suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų paaugliams – 1 kietoji pastilė 4 kartus per parą; vaikams ir paaugliams nuo 6 iki 12 metų – 1 kietoji pastilė 2 kartus per parą. Vaistinis preparatas nesitirpina vandenyje, todėl jį galima vartoti su maistu. Vartoti ant burnos gleivinės. Kietąsias pastiles reikia suvalgyti. Vartoti po valgio. „PROSPAN“ 65 mg šnypščiuosias tabletes: suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų paaugliams – po 1 šnypščiują tabletę 2 kartus per parą; vaikams nuo 4 iki 12 metų – po dvi šnypščiuosias tabletes 3 kartus per parą. Prieš vartojimą tabletes štrpinti stiklinėje karšto arba šalto vandens (apie 200 ml). Vartoti per burną. **Kontraindikacijos:** „PROSPAN“ sirupo, geriamojo tirpalo, kietųjų pastilių ir šnypščiuųjų tablečių vartoti draudžiama, jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) gebeņu lapų ekstraktui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialios įspėjimai:** „PROSPAN“ 7 mg/ml sirupo sudėtyje yra etanolio ir sorbitolio. Nerekomenduojama vartoti vaikams iki 1 metų amžiaus. „PROSPAN“ 35 mg/5 ml geriamojo tirpalo sudėtyje yra etanolio ir sorbitolio. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 6 metų vaikams. „PROSPAN“ 26 mg kietųjų pastilių sudėtyje yra skysto sorbitolio (neskatinančio) ir skysto maltozės. Nesitirpina vandenyje. Nesitirpina vartoti jaunesniems nei 6 metų vaikams. „PROSPAN“ 65 mg šnypščiuųjų tablečių sudėtyje yra natrto, sorbitolio, makrogoliglicerolio hidroksisearato ir laktozės. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 metų vaikams. Daugiau informacijos apie specialius įspėjimus žr. vaistinių preparatų charakteristikų santraukose. Reklamos teksto parengimo data: PM-IT-2025-11-7394.

1+1

Perkant vieną pakuočę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMAI!



SILVANOLS

MAISTO PAPILDAI

„Silvanols Faringspray KIDS“ – NAUJIEJA! Pūrskalas gerklės vaikams su čiobreliais ir liepžiedžiais. Čiobreliai ir liepžiedžiai padeda palaikyti normalią gerklės, ryklės ir burnos ertmės būklę. Vaikams nuo 4 metų amžiaus. Be etanolio. Be konservantų. Be dirbtinių dažiklių. „Silvanols Faringspray“ klasikinis ir apelsinų skonio pūrskalai gerklės su šaltalankiais ir medetkomis. Medetkos padeda palaikyti normalią gerklės, ryklės ir burnos ertmės būklę bei normalią kvėpavimo takų veiklą. Šaltalankiai padeda palaikyti normalią gleivinių būklę. Nuo 4 metų. Be etanolio. Be konservantų. Be dirbtinių dažiklių. „Silvanols Faringspray“ pūrskalas gerklės su propoliu ir medetkų žiedų tinktūra. Propolis padeda palaikyti burnos ir gerklės gleivinės būklę. Medetkų žiedai ramina burnos ertmės bei gerklės gleivinę ir padeda palaikyti normalią jų funkciją. Glicerolis užtikrina malonią gamtinio konsistenciją ir tolygų padengimą. Nuo 12 metų. Be dirbtinių dažiklių. „Faringo SOFT“ minkštosios pastilės su hialuronu rūgštimi, šaltalankių aliejumi, sivilazėmis, vitaminais B ir C. Minkštosios pastilės švelnina burnos ertmės gleivinę, o kruopščiai atrinktos sudedamosios dalys gali padėti palaikyti normalią gleivinių funkciją. Nuo 4 metų. Be GMO. Be cukrų. Be laktozės. „Faringo“ ledinukai su šaltalankiais ir vitaminu C – šaltalankiai padeda palaikyti normalią gleivinių būklę. Vitaminas C palaiko tinkamą imuninės sistemos veiklą. Be konservantų. Be dirbtinių dažiklių.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

MOSS LINIJA

MAISTO PAPILDAI, MEDICINOS PRIEMONĖS

„ColdMoss“ augalinis ekstraktų mišinys, praturtintas vitaminu C, padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą. Sirupas „BronchoMoss“ skirta drėgnam ir sausam, dirginamam kosuliui palengvinti bei susidariusioms tirštoms gleivėms skystinti. Biologiškai aktyvių veikliųjų medžiagų kompleksas sukuria apsauginį gleivinės sluoksnį, sumažina dirginimą, stabdo infekcijos plitimą, mažina kosulio priepuolius ir lengvina atskleidimą. Sirupas „BronchoMoss Baby“ skirtas vaikų nuo 1 m. apatinių kvėpavimo takų funkcijai pagerinti. „BronchoMoss“ tabletės esantys islandinės kepenų gniuoliai ir baltųjų pušų žievės padeda palaikyti kvėpavimo takų funkciją, vitaminas C – imuninės sistemos funkciją. „SinuMoss“ minkštosios kapsulės ir „SinuMoss Baby“ geriamieji lašai pagaminti iš natūralių biologiškai aktyvių eterinių aliejų ir augalų ekstraktų, kurie padeda palaikyti viršutinių kvėpavimo takų funkciją. Kapsulės skirtos suaugusiems ir vaikams nuo 6 m., o geriamieji lašai – vaikams nuo 1 m. Minkštosios „ImunoMoss“ daugiakomponente sudėtis pasižymi kompleksiniu poveikiu – stiprina ne vien tik imunitetą, kartu palaiko kvėpavimo takų ir virškinamojo trakto funkciją. Tinka vaikams nuo 3 m.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



-15%



HUMER

MEDICINOS PRIEMONĖS

„HUMER“ nosies higienos ekspertas jau daugiau nei 20 metų. „HUMER“ nosies pūrskalai nosies higienai ir užgulusiai nosiai, tai 100% neskiestas jūros vanduo, skirtas kasdieninei nosies higienai, drėkina išsausėjusią gleivinę, suskystina sekretą, palengvina jo tekėjimą bei nosies išpūtimą. Natūraliai atkms užguliusią nosį esant peršalimui, alerginiam rinitui ar sinusitui. „HUMER“ labai užsikimšusiai nosiai – natūralus, iš augalinių ekstraktų, trejopo poveikio nosies pūrskalas labai užsikimšusiai nosiai, serganti sinusitu ar peršalus. „HUMER“ monodozės skirtos kasdieninei kodikiro nosies gleivinės priežiūrai bei kompleksiniam slogos gydymui, esant peršalimui ar alerginiam rinitui. „HUMER“ – POVEIKIS TIESIAI Į GAMTOS. TINKA VISAI ŠEIMAI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-30%



DR. PAKALNS

MAISTO PAPILDAI

Prekių ženklas „Dr. Pakalns“ – tai pagarba mokslui, gamtai ir žmogui. Įkvėptas vaistininko ir biologijos mokslų daktaro Dailonio Pakalno palikimo, jis jungia tradicijas, mokslą ir rūpestį žmogui.

Produktai:

- **BETA IMMUNE balzamas** – su beta gliukanais ir šėvamedžių uogomis. Šėvamedžių vaisių ekstraktas, vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Sudėtyje – itin grynai beta gliukanai. Tinka vaikams nuo 3 metų. **Be glitimo. Be GMO. Be alkoholio. Kokybė patvirtinta GMP standartu.**
- **GYSLIOČIŲ balzamas** – su siauralapių gysločių ekstraktu, padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų funkciją ir gerklės komfortą. Tinka vaikams nuo 3 metų. **Be glitimo. Be GMO. Be alkoholio. Kokybė patvirtinta GMP standartu.**
- **PINI PLUS sirupas** – su pušų pumpurais ir čiobreliais, tradiciniai vartojami kvėpavimo takų funkcijai palaikyti, padeda išlaikyti gerklės komfortą ir natūralų atskleidimo procesą. Tinka vaikams nuo 4 metų. **Be glitimo. Be GMO. Kokybė patvirtinta GMP standartu.**
- **ISLANDIŲ KERPENŲ sirupas** – su pipirėlių tinktūra. Padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų funkciją ir gerklės komfortą. Tinka vaikams nuo 12 metų. **Be glitimo. Be GMO. Kokybė patvirtinta GMP standartu.**

„DR. PAKALNS“ – GAMTOS GALIA.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

RYKLĖS UŽDEGIMO SUKELTIEMS NEGALAVIMAMS LENGVINTI

8⁹⁹ €



TONSILOTREN, 40 tablečių

HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra šių veikliųjų medžiagų: *Atropinum sulfuricum* D5 12,5 mg, *Hepar sulfuris* D3 10 mg, *Kalium bichromicum* D4 50 mg, *Silicea* D2 5 mg, *Mercurius bijodatus* D8 25 mg. **Terapinės indikacijos:** „Tonsilotren“ yra homeopatinis vaistinis preparatas ryklės uždegimo sukeltiems negalavimams lengvinti. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Vertojimo būdas ir dozavimas:** Suaugusiems ir paaugliams nuo 12 m. ūminės ligos metu vartoti po 1 tabletę kas valandą, iki 12 tablečių per dieną, kol pagerėja savijauta. Toliau gydantis arba esant lėtinei ligai, vartoti po 1–2 tabletes 3 kartus per dieną, 2–5 m. vaikams ūminės ligos metu ir toliau gydantis arba esant lėtinei ligai, vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną, 6–11 m. vaikams ūminės ligos metu vartoti po 1 tabletę kas 2 valandas, iki 6 tablečių per dieną, kol pagerėja savijauta. Toliau gydantis arba esant lėtinei ligai, vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Pakartotiniai gydymo kursai (keli 6–8 savaitžių gydymo kursai per metus) yra veiksmingi, esant lėtinei ir lėtinei pasikartojančiai ligos eigai. **Kontraindikacijos:** Alergija chromui, gyvsidabriui arba bet kuriai kitai veikliajai ar pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialios įspėjimai:** Jeigu Jūs sergate skydliaukės liga (hipertireozė), prieš pradėdami vartoti „Tonsilotren“ pasitarkite su gydytoju. Jeigu ligiai nei 3 paras karščiavote arba kūno temperatūra aukštesnė nei 39 °C, uždegimas stiprus arba pilnis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2026-10-07.

1+1

Perkant vieną pakuočę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMAI!



RHINOLAYA

MEDICINOS PRIEMONĖS

Himalajų druskos pūrskalas Jums ir Jūsų kūdikui. Vienintelis **Himalajų druskos** nosies pūrskalas. Be konservantų. • Natūraliai išvalo, drėkina ir padeda atkurti užburkusią nosį • Tinka šalčiui, vėjo ir alergenu (namų dulkių, oro tarso, gyvūnų plaukų) pažeistai nosies gleivinei • Nedirgina ir nesusaina nosies gleivinės • Skystina gleives • Pasižymi greitu veikimu „RHINOLAYA“ nosies pūrskalas yra kelių rūšių: „RHINOLAYA FORT“ hipertotonis, 50 ml – sloguojanti, peršalus, sinusito metu. „RHINOLAYA KIDS“ izotoninis, 50 ml – užburkusiai ir išsausėjusiai kūdikių nosies gleivinei. „RHINOLAYA PROTECT“, izotoninis, 50 ml – alergenu pažeistai nosies gleivinei. Medicinos priemonės CE 0459 „RHINOLAYA“ – IŠ HIMALAJŲ GELMIŲ PRIEŠ ALERGIJĄ IR SLOGĄ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-40 %

GASTROVAL

MAISTO PAPILDAI

NAUJIENA: GASTROVAL MAX – 4 kartus stipresnė augalinė formulė!

„Gastroval MAX“ – augalinių fermentų, ekstraktų ir prebiotiko kompleksas, padedantis palaikyti: skrandžio virškinimą; lengvumo pojūtį po valgio; žarnyno mikrobiocenozės balansą; normalų virškinimą tiems, kurie patiria stresą.

GASTROVAL FLUXUS padeda palaikyti skrandžio rūgštingumo pusiausvyrą dėl sudėtyje esančių: augalų sėklų ir šaknų ekstraktų, magnio, virškinimo fermentų, bifido- bei lakto bakterijų, inulino.

GASTROVAL HEPAR FORMULA – tik 1 kapsulė per dieną! Geresnio pasisavinimo augalinė formulė – rimtesnė kepenų apsauga nuo oksidacinių pažeidimų, kepenų ląstelių regeneracija, organizmo valymo funkcija, normalaus cholesterolio lygio palaikymas, „Gastroval“ suprantu, ko reikia virškinimui, skrandžio rūgštingumui, kepenų veiklai.

GASTROVAL FORTE – stiprus net 7 augalinių kilmės fermentų ir augalinių ekstraktų derinys virškinimui. Sudėtyje yra didesnis kiekis fermentų – kai reikia stipresnės pagalbos.

GASTROVAL sudėtyje – augalinių fermentų ir ekstraktų derinys, kurio naują lengvą pastuji.

GASTROVAL suprantu, ko reikia virškinimui, kepenų veiklai, skrandžio rūgštingumui.

*Aukšta taikoma geltona etiketė pažymėtomis prekėmis



NUO PILVO PŪTIMO

NUO 3²⁵ €

ESPUMISAN

40 mg, 25 minkštosios kapsulės 3²⁵ €
40 mg, 50 minkštųjų kapsulių 5²⁵ €



NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: 1 minkštojoje kapsulėje yra 40 mg simetikonono. „Espumisan“ vartojamas ligų, kurių metu virškinimo trakte kaupiasi dujos (meteorizmas), būsna pilvo pūtimas, pilnumo pojūtis, simptomams gydyti; prieš pilvo ertmės organų tyrimus, pvz.: rentgenų, ultragarsu. „Espumisan“ skirtas vaikams nuo 6 m., paaugliams ir suaugusiems. „Espumisan“ vartoti draudžiama: jeigu yra alergija veikliajai medžiagai, dažikliui saulėlydzio geltonajam FCF (E110), konservantui metilo parahidroksibenzoatui (E218) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Espumisan“. Jei šiuo virškinimo veiklos sutrikimų atsiranda ar jie trunka ilgai, reikia pasitarti su gydytoju. Jis nustatys, ar nėra kitų ligų, kurias reikia gydyti kitaip. Dozavimas: kai dėl susilaikiusių dujų sutrinka virškinimo trakto veikla: paaugliams, suaugusiems ir 6–14 m. amžiaus vaikams rekomenduojama skirti vartoti po dvi „Espumisan“ 40 mg minkštasias kapsules 3–4 kartus per parą. „Espumisan“ 40 mg minkštasias kapsules galima gerti valgant arba po valgio, prireikus – ir prieš miegą. Vartojimo trukmė priklauso nuo ligos eigos. Prireikus „Espumisan“ 40 mg minkštasias kapsules galima vartoti ilgai. Rengiant pacientus tyrimams, rekomenduojama skirti po dvi „Espumisan“ 40 mg minkštasias kapsules 3 kartus per parą vieną dieną prieš tyrimus ir dvi „Espumisan“ 40 mg minkštasias kapsules tyrimo dienos ryte. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com. LT-ESP-8-2025_MFLOW, 2025/12

JEI PILVE URAGANAS – JUMS PADĖS „ESPUMISANAS“!

NUO 3⁴⁹ €

MEZYM

10000V, 10 skrandyje neiurių tablečių 3⁴⁹ €
20000V, 20 skrandyje neiurių tablečių 7⁴⁹ €



NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 skrandyje neiurių „Mezym 10000V“ tablečių yra 80–110,11 mg kiaušinių kasos miltelių, kurių aktyvumas atitinka ne mažiau kaip 10000 lipazės vienetų, 7500 amilazės vienetų, 375 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. 1 skrandyje neiurių „Mezym 20000V“ tablečių yra 160–222,22 mg kasos miltelių (iš kiaušinių kasos pagaminto pankreatino), kurių minimalus aktyvumas atitinka 20000 lipazės vienetų, 12000 amilazės vienetų, 900 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. „Mezym“ vartojamas tuomet, kai kasos nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentų ir tai sukelia virškinimo sutrikimų. „Mezym“ vartoti negalima: jeigu yra alergija kasos milteliams, kiaušinių baltymams arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; šio vaisto negalima vartoti, jeigu jis serga ūminiu kasos uždegimu (pankreatitu) arba jums pačiamė lėtinis kasos uždegimas, kai ligos požymiai yra stipriai išreikšti. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju ir vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Mezym“. Čistinė fibrozė kartais gali komplikuotis žarnyno nepaieinamumu. Esant simptomams, panašius į žarnyno nepaieinamumo požymius, reikia apsaugoti žarnyno susiaurėjimo galimybę. Jeigu pajutote neįprastą diskomfortą skrandyje ar žarnyme, pasikiltė nusiukindumų pojūtis, būtinai kreipkitės į gydytoją, kuris jus apžiūrės, kad atmetų žarnų pažeidimo galimybę. „Mezym“ sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas yra sakes, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „Mezym“ reikia būtinai nuryti nekrumčius. „Mezym 10000V“ sudėtyje esantis dažiklis azorubinas (E22) gali sukelti alerginių reakcijų. Dozavimas. „Mezym“ vartoti tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. „Mezym“ dozes priklauso nuo virškinimo sutrikimų laipsnio, optimali dozė nustatoma individualiai. Jeigu neuropuodyta kitaip, valgant egeriamas 2–4 plevėle dengtos „Mezym 10000V“ tabletes arba 1–2 plevėle dengtos tabletes. Dienos dozė 15000–20000 lipazės vienetų kilogramui kūno svorio neturėtų būti viršijama. Dozės vaikams turi paskirti gydytojas. Atsivėliagiant į maistą ar virškinimo sutrikimo sunkuma, rekomenduojama dozė gali būti padidinta. Plevėle dengtos tabletes nuryjamas nekramtant ir užsigiant dideliu kiekiu skysčio. Gydančią ilgą laiką, vartojimo trukmę nustato gydytojas. Vartojimo trukmę vaikams taip pat nustato gydytojas. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 1947, LT@berlin-chemie.com. LT-MEZ-3-2025_MFLOW, 2025/12

SALUTIL®

MAISTO PAPILDAI

„SALUTIL“ – probiotikai ir elektrolitai išosų šeimai!

„SALUTIL HYDRA“ – elektrolitai ir gliukozės mišinys, papildytas vitaminais, mineralinėmis medžiagomis ir choliniu. Tinka vartoti po įtemptos veiklos ar jaučiant nuovargį.

„SALUTIL SHOTS“ – gyvybingos bakterijos, prebiotikai ir vitaminai lengvai atidaromuose vienadoziuose flakonėliuose. Vaikams nuo 3 metų.

„SALUTIL FORTE“ – kiekvienoje kapsulėje yra 5 milijardai gyvybingųjų bakterijų.

„SALUTIL PREMIUM 9“ – sudėtyje yra 9 mikroorganizmų padmierių ir vitamino D.

2608_SB_Salutil_V01_LT

„SALUTIL“ – PROBIOTIKAI IR ELEKTROLITAI JŪSŲ ŠEIMAI!

*Aukšta taikoma geltona etiketė pažymėtomis prekėmis



NUO RĖMENS

NUO 6⁹⁹ €

MAALOX

400 mg/400 mg, be cukraus, 40 kramtomųjų tablečių 6⁹⁹ €
40 mg/35 mg/ml, geriamoji suspensija, 250 ml 7⁴⁹ €



NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 kramtomajoje tablete yra 400 mg magnio hidroksido ir 400 mg aluminio hidroksido; 1 ml geriamosios suspensijos yra 40 mg magnio hidroksido ir 35 mg aluminio hidroksido. **Terapinės indikacijos:** rėmens ir skrandžio turinio kilmio į stemplę simptomams mažinti suaugusiems ir paaugliams nuo 15 metų. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suspensiją reikėtų gerti niekščiau, Buteliuko suspensija gerinama po 1 valgomąjį šaukštą (15 ml) pasireiškus rėmeniui ar skrandžio turinio refliksui į stemplę; negalima gerti daugiau kaip 6 valgomųjų šaukštų (90 ml) per parą; šio vaisto negalima vartoti ilgai kaip 10 dienų; sučiulpti arba sukramtyti 1–2 tabletes, pajutęs rėmenį arba atsiradus refliksui; negalima vartoti daugiau kaip 6 kartus per parą ir daugiau kaip 8 tablečių per parą. **Kontraindikacijos:** alergija (padidėjęs jautrumas) magnio hidroksidui ar aluminio hidroksidui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sunki inkstų liga; stiprus pilvo skausmas arba įtarimas žarnų nepaieinamumas. **Specialūs įspėjimai:** vaistą galima vartoti tik pastarais su gydytoju, jeigu mažėja kūno svoris, kraujuoja arba anksčiau yra kraujavę iš virškinimo trakto, sutrinka rijimas arba nuolat jaučiate nemalonų pojūtį pilve, virškinimo sutrikimų atsirado pirmą kartą arba jie neseniai palgti, sergate inkstų liga. Pacientams, kuriems nustatytas inkstų funkcijos sutrikimas, jaunesniems kaip 2 m. vaikams, senyviems pacientams bei kitiems pacientams, kuriems yra fosforo trūkumo pavojus, prieš pradėdami vartoti „Maalox“ reikia kreiptis į gydytoją. Norint išvengti perdozavimo, negalima kartu vartoti vaistinių preparatų, savo sudėtyje turinčių aluminio hidroksido ir magnio hidroksido. Atsargumo dėlei tarp bet kokio per burną vartojamo vaisto ir antacidinio vaisto vartojimo turi būti bent 2 val. (vartojant fluorochinolono – 4 val.) intervalas. Jeigu gydytojas Jums yra sakes, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „Maalox“ (be cukraus) tabletes tinka cukriniu diabetu sergantiems pacientams. **Reklamos teksto parengimo data** 2024-12, 2603_SB_Salutil_V01_LT.

GREITA PAGALBA NUO RĖMENSI!

NUO RĖMENS IR PADIDĖJUSIO RŪGŠTINGUMO

4⁴⁹ €

RENNIE

680 mg/80mg, 24 kramtomosios tabletės

ORANGE. 680 mg/80 mg, 24 kramtomosios tabletės

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 kramtomajoje tablete yra 680 mg kalcio karbonato ir 80 mg sunkiojo magnio subkarbonato. **Terapinės indikacijos:** „Rennie“ veiklioji medžiaga – kalcio karbonatas ir sunkusis magnio subkarbonatas – neutralizuoja skrandžio rūgštį ir sumažina rūgšties dispepsijos sukeliamus negalavimus: rėmenį, skrandžio pilnumo arba sunkumo jausmą, virškinimo sutrikimą, rūgštaus skysčio atpylimą į burnos ertmę, pilvo pūtimą, skrandžio skausmą. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams sučiulpti arba sukramtyti 1–2 kramtomąsias tabletes, praėjus 1 valandai po kiekvieno valgio, prieš miegą ir kai pasireiškia rėmus ar skausmas. Negalima vartoti daugiau kaip 11 kramtomųjų tablečių per 24 valandas. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgai kaip 2 savaites. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jeigu yra sunkus inkstų nepakankamumas arba inkstų akmenligė; jeigu yra padidėjęs kalcio kiekis kraujyje arba sumažėjęs kalcio kiekis kraujyje. **Specialūs įspėjimai:** vaistinių preparatų reikia vengti vartoti ilgai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. „Rennie“ nėštumo ir žindymo laikotarpiu vartoti laikantis rekomendacijų galima, bet reikia vengti vartoti ilgą laiką. Vaistas neturi būti vartojamas su dideliu kiekiu pieno ar jo produktais. Reklamos teksto parengimo data 2026-01, CH-20260104-54



VIDURIAMS LAISVINTI

5⁹⁹ €

REGULAX PICOSULPHATE

7,23 mg/ml, geriamieji lašai, tirpalas, 20 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: natrio pikosulfatas. 1 ml (20 lašų) tirpalo yra 75 mg natrio pikosulfato monohidrato (atitinka 123 mg natrio pikosulfato). **Terapinės indikacijos:** veiklioji vaisto medžiaga natrio pikosulfatas yra lokaliai veikiantis vidurių laisvinamasis medžiaga. Storojoje žarnoje ji, veikiant bakterijoms, sukuria ir skatina storosios žarnos peristaltiką, stimuliuodama jos gleivinę. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** jeigu gydytojo neskirta kitaip, suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams rekomenduojama dozė yra 14–27 lašų (atitinka 2,5–5 mg natrio pikosulfato). „Regulax Picosulphate“ patariama gerti vakare. Jo poveikis pasireiškia po 10–12 val. **Kontraindikacijos:** šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Trumpai vartojant „Regulax Picosulphate“, šalutinis poveikis yra retas ir dažniausiai pasireiškia vidurių pūtimu, silpnu skrandžio skausmu ar padidėjusiu tuštinimuis. **Specialūs įspėjimai:** „Regulax Picosulphate“ vidurių laisvinamąjį poveikį gali silpninti arba naikinti kartu vartojami antibiotikai (bakterijas naikinantys preparatai). Nėštumo metu, rodančių, kad veiklioji „Regulax Picosulphate“ galima vartoti tik pasikyrus gydytojui, kadangi nėščiu moterų gydymo šiuo vaistu patirtis yra nepakankama. Nors duomenų, rodančių, kad veiklioji „Regulax Picosulphate“ medžiaga patenka į motinos pieną, nėra, tačiau šio vaisto vartojandoms moterims kisdio krūtimi maitinti nepatariama.

PASTABA DIABETIKAMS. „Regulax Picosulphate“ lašuose yra cukraus pakaitalai: 1 ml lašų atitinka 0,03 duonos vieneto.

Reklamos teksto parengimo data 2026-05-01.



NUO SKAUSMO

NUO 6⁹⁹ €

DITEL

23,2 mg/g, gelis, 50 g 6⁹⁹ €
23,2 mg/g, gelis, 100 g 9⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga, stiprumas: diklofenako dietilaminas, 23,2 mg/g. **Terapinės indikacijos:** skirtas suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: vietinis skausmo malšinimas, esant ūminiams patempimams ar sumušimams po bukos traumos. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** reikia vartoti 2 kartus per parą (geriausia rytė ir vakarė). Reikia nuo vėšnos iki graikiško riešuto dydžio kiekio, atitinkančio 1–4 g gelio. Didžiausia paros dozė – 8 g gelio. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Anksčiau pasireiškusios padidėjusio jautrumo reakcijos, pavartojus acetilsalicilo rūgšties ar nesteroidinių vaistinių preparatų nuo uždegimo (NVPNU). Vartojimas ant atvirų žaizdų, gleivinių, jei yra odos uždegimas arba infekcija bei egzema. Vartojimas paskutinį nėštumo trimestrą. Vartojimas vaikams ir paaugliams iki 14 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai vartoti pacientams, kurių inkstų, širdies ar kepenų funkcija sutrikusi, taip pat pacientams, kuriems yra aktyvi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos peptinė opa. Vartoti tik ant nepažeistos ir sveikos odos. Vengti, kad nepatektų į akis, ir kontakto su gleivinėmis. Nenaudoti orui neaplaidžių tvarsčių. Jei yra tiesioginių saulės spindulių arba dirbtinės saulės poveikis, kyla odos reakcijų pavojus. Gydymo metu ir dvi savaites po gydymo reikia vengti saulės spindulių ar dirbtinės saulės. Reklamos tekstą parengimo data 2024-04. 2604_SB_Ditel_VOI_LT

„DITEL“ – NUOSPRENDIS SKAUSMUI!

8⁹⁹ €



KAMISTAD N, gelis 10 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Lidokaino hidrochloridas, 20 mg/g, ramunėlių žiedų skystasis ekstraktas, 185 mg/g. **Indikacijos:** gelis vartojamas esant nesunkiam dantenių ir burnos gleivinės uždegimui. **Vartojimas:** suaugusiems ir vaikams, vyresniems nei 12 metų, reikia tepėti 0,5 cm ilgio gelio juostele 3 kartus per parą. Gelis tepamas ant pažeistų vietų ir švelniai įtrinamas. **Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai:** gelio vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Saugoti, kad gelio nepatektų į akis ir ant atvirų žaizdų. Panaudojus gelio, kruopščiai nusiplauti rankas. Pakuotės lapelio peržiūros data: 2022 sausio mėn. Reklamos tekstą parengimo data: 2605_SB_Kamistad_VOI_LT

„KAMISTAD N“ – PAGALBA ESANT BURNOS GLEIVINĖS UŽDEGIMUI!

AUSIMS

7⁹⁹ €



OTINUM, 200 mg/g ausų lašai (tirpalas), 10 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 g ausų lašų (tirpalas) yra 200 mg cholino salicilato. **Terapinės indikacijos.** Ūmaus išorinės, vidurinės ausies ar būgnelio uždegimo sukeltos skausmo malšinimas. Sukietėjusiems sieros kamščiams suminkštinti, prieš šalinant juos iš išorinės ausies landos. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Sergant ūminiu išorinės, vidurinės ausies ar būgnelio uždegimu: 3–4 vaisto lašus lašinti į išorinę ausies landą 3–4 kartus per dieną. Prieš sieros kamščio šalinimo procedūrą: 3–4 vaisto lašus lašinti į išorinę ausies landą 2 kartus per dieną 4 dienas. Vaistai lašinami ant šono gulintiems pacientui. Įlašinus vaisto, žmogus privalo kėlis minutes ramiai pagulėti. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas salicilatams arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Prakiurus ausies būgnelį. Jaunesni nei 1 metų kūdikiai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Kiekvienoje šio vaisto dozėje yra 100 mg alkoholio (etanolio), tai atitinka 100 mg/g. Ant pažeistos odos plotų etanolio gali sukelti deginimo pojūtį. Reklamos tekstą parengimo data 2025-09-25.

RAUMENIMS, SĄNARIAMS IR ODAI

-25%



DR.THEISS PREPARATAI

KOSMETIKOS PRIEMONĖS IR MEDICINOS PRIEMONĖ

KAULAŽOLIŲ PREPARATAI dėl sudėtyje esančio regeneruojančiomis savybėmis pasižymintio alantoino tinka nugarai, raumenims, sąnariams įtrinti. Taip pat sumušimams, patempimams, odos pažeidimams, skilinėjančioms kulnams prižiūrėti. Pagal poreikį galima rinktis kaulažolių tepalą, gelį ar šildantį kremą. DR.THEISS SILDOMASIS PLEISTRAS. Šildo ir malšina skausmą kryžkaulio ir juosmens, reumatinių, raumenų, sąnarių, neuralgių.

„DR.THEISS“ KAULAŽOLIŲ PREPARATAI – SENOLIŲ IŠMINTIS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtos prekės

NUO 5⁹⁹ €

SOLPADEINE

500 mg/8 mg/30 mg, 12 tablečių 5⁹⁹ €
500 mg/8 mg/30 mg, 12 tirpinamųjų tablečių 7⁴⁹ €



NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Kiekvienoje tabletyje ir kiekvienoje tirpinamojoje tabletyje yra 500 mg paracetamolio, 8 mg kodeino fosfato hemihidrato ir 30 mg kofeino. **Terapinės indikacijos.** Šilpo ir vidutinio stiprumo skausmo (sąnarių, nugaros, galvos ir migreninio, neuralginio bei dantų) malšinimas. Peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** **Suaugusiems:** „Solpadeine“ tirpinamosios tabletės– po 2 tabletes (štripti) ne mažiau kaip pusę štiklinės vandens ir gerti iki 4 kartų per parą (pagal poreikį). „Solpadeine“ tabletės– po 2 tabletes, jei reikia, iki 4 kartų per parą. Negalima dozės gerti dažniau nei kas 4 val. ir ne daugiau kaip 8 tablečių per bet kurias 24 val. 12–15 m. paaugliams: po 1 tabletyje kas 6 val. Neviršyti maksimalios paros dozės – 4 tablečių per parą. 16–17 m. paaugliams: po 1–2 tabletes kas 6 val. Neviršyti maksimalios paros dozės – 8 tablečių per parą. Gydymo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 5 paros. **Specialūs įspėjimai.** Pastariktė su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdam vartoti vaistą, jeigu Jūs sergate sunkia inkstų ar kepenų liga; jei sutrikusi žarnyno veikla, įskaitant žarnyno veiklos sustojimą; jei Jums operacijos metu buvo pašalinta tulžies pūsle; jeigu vartojate vaistų nuo depresijos arba kvėpavimo sutrikimų; jei vartojate vaistų nuo pykinimo, vėmimo arba padidėjusio cholesterolio kiekio kraujyje; jei valgote maistą, kuriame yra mažai natrio. Kiekvienoje tirpinamojoje tabletyje yra 427 mg natrio; jeigu esate arba kada nors buvotė priklausomas (-a) nuo opioidų, alkoholio, receptinių vaistų arba neteisėtų cheminių medžiagų. Nevartokite per daug produktų, kuriuose yra kofeino. Kartu su šiuo vaistu nevartokite kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio ar kodeino. Kaip ir kitų opioidų, kodeino reikia vartoti atsargiai, jeigu Jūsų kraujo spaudimas yra žemas ar sergate hipotenzija, patyrėte galvos traumą ar turite padidėjusį intrakranijinį (kaukolės vidaus) spaudimą. Nėdėdami pasakykite gydytojui, jeigu sergate sunkiomis ligomis, įskaitant sunkius inkstų funkcijos sutrikimus arba sepsį, netinkamą mitybą, lėtinį alkoholizmą arba jei vartojate ir /tikloskaciliną. Gulta pranešimų apie sunkių sveikatos sutrikimą – metabolinę acidozė. Gali sukelti mieguistumą ar svajimą, jei taip nutiko, nevaldykite mechanizmų. **Kontraindikacijos.** „Solpadeine“ vartoti draudžiama: jeigu yra alergija veikliosios medžiagos, skausmą malšintiems opioidams arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio; jeigu yra kvėpavimo funkcijos nepakankamumas; jeigu buvo galvos trauma; jeigu yra padidėjęs intrakranijinis spaudimas; jeigu buvo atlikta tulžies latakų operacija; jeigu yra lėtinis vidurių užkietėjimas; jaunesniems kaip 12 m. vaikams, skausmui malšinti vaikams ir paaugliams (0–18 m.) po gerklės ir ryklės migdolų pašalinimo dėl obstrukcinės miego apnėjos sindromo operacijos; jeigu yra žinoma, kad organizme kodeinas labai greitai metabolizuojamas į morfiną, moterims nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Reklamos tekstą parengimo data 2025-06-11.

-25%



PULSAAR ACTIVE

MEDICINOS PRIEMONĖS. I KLASĖ

„Pulsaar Active“ gaminiai sukurti sąnarių ir raumenų funkcijai palaikyti tiek užsimant įprastoms veikloms, tiek fizinio aktyvumo metu. Ergonomiškas dizainas ir pažangi kūno šilumą atspindinti „InfraReflect“ technologija gali padėti aktyvinti vietinę mikrocirkuliaciją ir palaikyti šiluminį komfortą. Tinka tiek aktyviai sportuojantiems, tiek iškantiems komforto po fizinio krūvio ar traumos žmonėms. Medicinos priemonė priskiriama I klasei.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtos prekės

-25% 8^{32€} 11^{99€}



AMEDIPLUS ACTIVE GEL

šaldomasis-šildomasis kūno gelis, 100 ml
KOSMETIKOS PRIEMONĖ

-20% 0^{76€} 0^{95€}



AMEDIPLUS

pipirinis pleistras 12 x 16 cm, 1 vnt.

MEDICINOS PRIEMONĖ

5⁹⁹ €**ACICLOVIR ACTAVIS, 5 % kremas, 5 g****NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 g kremo yra 50 mg acikloviro. **Terapinės indikacijos.** Lokalus odos ir lūpų pūslelinės gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiesiems „Aciclovir Actavis“ 5 % kremo reikia tepti 5 kartus per parą, vidutiniškai kas 4 val.; naktį daroma pertrauka. Gydoma 4 paras. Jei per šį laikotarpį nepasiekiamas, gydymą reikia tęsti dar 6 paras. Jei pažeidimas neišnyksta ir po 10 parų, rekomenduojama kreiptis į gydytoją. „Aciclovir Actavis“ 5 % kremo nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Vartoti ant odos. **Kontraindikacijos.** „Aciclovir Actavis“ 5 % kremo negalima skirti pacientams, kurie yra jautrūs aciklovirui, valaciklovirui, propilenglikoliui ar bet kuriai „Aciclovir Actavis“ 5 % kremo pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Aciclovir Actavis“ 5 % kremo nerekomenduojama tepti gleivinės, pvz., burnos, akių ar lyties organų, nes galimas sudirginimas. Būtina laikytis atsargumo priemonių ir saugoti akis, kad į jas nepatektų kremo. Jeigu įsų imunitetas labai susilpnėjęs, (t. y. Jūsų organizmo gebėjimas kovoti su infekcija yra sumažėjęs), tokiu atveju dėl bet kokios infekcijos gydymo reikia kreiptis į gydytoją ir įvertinti gydymo geriamuoju acikloviru galimybę. Pagalbinės medžiagos celostearilo alkoholis, natrio laurilsulfatas ir propilenglikolis gali sukelti vietinių odos reakcijų. **Teksto peržiūros data.** 2023-04-03. **OTC-LI-00093 Reklamos teksto parengimo data.** 2025-04-01.

GYDO IR APSAUGO ODĄNUO 5⁹⁹ €

BEPANTHEN, 50 mg/g kremas, 30 g 5⁹⁹ €
BEPANTHEN, 50 mg/g tepalas, 30 g 5⁹⁹ €
BEPANTHEN PLUS, 50 mg/5 mg/g kremas, 30 g 6⁴⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 g „Bepanthen“ kremo ir tepalo yra 50 mg dekspantenolio; 1 g „Bepanthen“ Plus kremo yra 50 mg dekspantenolio ir 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos.** „Bepanthen“ kremas ir tepalas: įvairios kilmės paviršinių odos ir gleivinių pažeidimų pagalbinis gydymas drėkinant odą ir atkuriant epidermio barjerą, palaikant epitelizaciją su atitinkamu uždegimo mašinamųjų ir niežėjimą mažinančiu poveikiu, pvz., nedideliams pažeidimams (nedideliams nudegimams arba rubrozėms), odos sudirginimams, išbėrimui nuo sauskelnių, skausmingiems ir įtrūkimams speneliams gydyti. „Bepanthen“ Plus kremas: lokalių įvairių paviršinių žaizdų, pvz., rubrozėms, įpjovimų, įbrėžimų, odos įtrūkių, nudegimų gydymas, kai yra infekcijos pavojus. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** „Bepanthen“ kremas ir tepalas: pažeistą odą tepti plonu sluoksniu preparato 1 ar daugiau kartų per dieną, kai reikia. Skausmingus ir įtrūkusius spenelius tepti po kiekvieno maitinimo, prieš žindant nuplauti. Tepti kiekvieną kartą keičiant sauskelnes, prieš tai odą kruopščiai nuvalyti. Gydymo trukmė priklauso nuo susirgimo pobūdžio ir eigos. „Bepanthen“ Plus kremas: kūdikiams nuo 1 mėn., vaikams, paaugliams ir suaugusiems išvalytą žaizdą arba pažeistą odos vietą reikia tepti plonu kremo sluoksniu 1 arba keliais kartus per dieną, kol žaizda užgis. Venkite tepti didelius odos plotus. **Kontraindikacijos.** „Bepanthen“ kremas ir tepalas: alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. „Bepanthen“ Plus kremas: alergija veikliosios arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; gilios arba stipriai užterštos žaizdos; jei trūkės ausies būgnelis, negalima tepti ausies srityje. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Bepanthen“ kremas ir tepalas: jei sergate kita liga, esate alergiškas arba vartojate kitus vaistus, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Naudojant tepalą ar kremą reikia vengti kontakto su akimis. „Bepanthen“ Plus kremas: saugokitės, kad kremo nepatektų į akis, ausis ir ant gleivinių. Negalima tepti ant sudirgintos, bet neinfekuotos odos. Negalima vartoti kartu su kitomis antiseptinėmis medžiagomis, muilu. Jei pasireiškia sunkios alerginės reakcijos simptomai, vartojimą nedelsdami nutraukite ir pasitarkite su gydytoju. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-11-04-2025104-94

LAIMEI, YRA „BEPANTHEN“.

-20 %

**AMEDIPLUS**

Pleistų rinkinys šeimai, 20 vnt. 4⁴⁵ 3⁵⁶ €
 Vaikiški pleistrai, 6 x 2 cm, 10 vnt. 2³⁸ 1⁹¹ €
 Tamprūs pleistrai, 7 x 2 cm, 10 vnt. 4⁶⁸ 1³⁵ €
 Tamprūs pleistrai, 7 x 2 cm, 200 vnt. 20⁰⁰ 16⁰⁰ €
 Tamprūs pleistrai, 7 x 3,8 cm, 200 vnt. 28⁰⁰ 22⁴⁰ €

MEDICINOS PRIEMONĖS-40 % 9⁸⁹ € 16⁴⁹**AMEDIPLUS**

pleistrai nuo lūpų pūslelinės, 15 vnt.
MEDICINOS PRIEMONĖ

Prisidėkite prie vaistų saugumo

Vaistai mums padeda pasijusti geriau, kai sergame, tačiau kartais jie gali sukelti nepageidaujamų reakcijų.

Apie šalutinį poveikį būtina pranešti **Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai**. Tai galite padaryti patys arba už Jus tai gali padaryti **gydytojas** arba **vaistininkas**.

**Kaip?**

- Užpildykite specialią pranešimo formą internetu arba specialią formą (abi jas rasite adresu **vvkt.lrv.lt/lt**) ir atsiųskite elektroniniu paštu **NepageidaujamaR@vvkt.lt**;
- Paskambinkite nemokamu telefonu **+370 800 73 568**.



-25 %**NARA HEALTH****MAISTO PAPILDAI**

„NARA Health“ **kokteilis**. Bananų skonio augalinės kilmės maisto papildas, skirtas kasdieniui mitybai praturtinti. Be pridėtinio cukraus. 30 g baltymų, gausu skaidulų, 26 vitaminai ir mineralai.

„NARA Health“ **kokteilis**. Braškių skonio augalinės kilmės maisto papildas, skirtas kasdieniui mitybai praturtinti. Be pridėtinio cukraus. 30 g baltymų, gausu skaidulų, 26 vitaminai ir mineralai.

„NARA Health NextGen“ **augaliniai baltymai**. Braškių skonio – be laktozės, alergenų ir keisto poskonio. Porcijos – 24 g augalinės kilmės baltymų, 5,5 g BCAA, DIAAS – 116. 20 porcijų.

„NARA Health NextGen“ **augaliniai baltymai**. Šokolado skonio – be laktozės, alergenų ir keisto poskonio. Porcijos – 23 g augalinės kilmės baltymų, 5,5 g BCAA, DIAAS – 116. 20 porcijų.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

**-40 %****AIDWISE**

Automatinis žastinis kraujospūdžio matuoklis DBP-1358, **64⁹⁵ 38⁹⁷ €**

Bekontaktis skaitmeninis termometras DET-306, **39⁹² 23⁹⁹ €**

Skaitmeninis termometras lankščiu galu, **8⁹² 5⁹⁹ €**

MEDICINOS PRIETAISAI**AKIŲ LAŠAI****IKI -40 %**

NAVIVISION PLUS, PAVARGUSIOMS AKIMS, 15 ml **42⁹² 9⁷³ € -25 %**

NAVIVISION PLUS, PARAUDUSIOMS AKIMS, 15 ml **42⁹² 9⁷³ € -25 %**

NAVIVISION PLUS, SUDIRGUSIOMS AKIMS, 15 ml **42⁹² 9⁷³ € -25 %**

NAVIVISION PLUS KIDS, vaikams nuo 6 m., 15 ml **42⁹² 9⁷³ € -25 %**

NAVITAE PLUS PF, 10 ml **48⁹² 11³⁸ € -40 %**

NAVI INFLA, 15 ml **42⁹² 9⁷³ € -25 %**

MEDICINOS PRIEMONĖS

Navivision akių lašai – stipriai drėkinantys natūralūs akių lašai su natrio hialuronatu 0,3 % pagrindinėms akių problemoms spresti. **Pavargusioms akims** – užtikrina greitą ir ilgalaikį palengvėjimą esant sausų ir pavargusių akių pojūčiui. **Sudirgusioms akims** – akių alergijos simptomams palengvinti bei pagrindinėms akių problemoms spresti. **Paraudusioms akims** – palengvina paraudusių ir pavargusių akių būklę, susijusią su konjunktyvitu (niežėjimas, ašarojimas, deginimas ir t.t.). **Navivision Plus Kids** – gerai toleruojama formulė greitai suteikia komforto pojūtį ir padeda atkurti natūralų gaivumo jausmą pavargusioms ar niežtinčioms akims, vaikams nuo 6 m. **Navitae Plus Pf** – antioksidaciniu poveikiu ir tepamosiomis savybėmis pasižymintys akių lašai su vitaminais A + E. Palengvina sausų akių sindromą ir akių diskomfortą, kurį sukelia: keratitas, šalutinis poveikis po ragenos operacijos, trauminės opos, ragenos uždegimas. Be konservantų. **Navinfla** – antioksidaciniai drėkinamieji akių lašai su natūraliais augaliniais ekstraktais skirti naudoti esant ūminiam, lėtiniam ar alerginiam konjunktyvitui. Lengvina su konjunktyvitu susijusius simptomus: ašarojimą, paraudimą ir niežėjimą.

-60 %**ANTRAI
PIGESNEI
ARBA TOKIAI
PACIAI****AMEDIPLUS**

Šaldantis arklų balzamas, 250 ml **6⁹⁹ €**

Šaldantis arklų balzamas, 250 ml **6⁹⁹ €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS**SAUSOMS, PAVARGUSIOMS, SUDIRGUSIOMS AKIMS BEI LĖTINIAM AKIŲ SAUSUMUI****-20 %****BEPANTHEN® EYE**

akių lašai, 20 x 0,5 ml **44⁴² 11⁵⁸ €**

akių lašai, 10 ml **46⁴² 13¹⁸ €**

INTENSIVE, akių lašai, 10 ml **47⁹² 14³⁸ €**

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Bepanthen“ Eye® akių lašų sudėtyje yra natrio hialuronato ir deksantenolio. „Bepanthen“ Eye Intensive® akių lašų sudėtyje yra ne tik natrio hialuronato ir deksantenolio, bet ir vitaminų A ir E bei fosfolipidų. Natrio hialuronatas suformuoja tolygia, stabilų ir ilgalaikį apsauginę plėvelę ant akies paviršiaus. Dekspantenolis goba prisijungti didelį vandens kiekį, drėkina ir apsaugo akis. Vitaminai A ir E veikia kaip antioksidantai, neutralizuodami laisvuosius radikalus (pvz., UV šviesa). Fosfolipidai palengvina ašarų plėvelės lipidinio sluoksnio regeneraciją. „Bepanthen“ Eye® akių lašai skirti sausoms ir pavargusioms akims. Drėkina ir apsaugo. Tinka esant mechaniniams stresui, stresui dėl aplinkos poveikio arba intensyvaus žiūrėjimo. „Bepanthen“ Eye Intensive® akių lašai skirti labai sausoms, sudirgusioms akims ir lėtiniam akių sausumui. Drėkina, saugo, regeneruoja ir gydo. Tinka ne tik esant mechaniniams stresui, stresui dėl aplinkos poveikio arba intensyvaus žiūrėjimo, bet ir esant smėlio pojūčiui akyse, sumažėjus ašarų gamybai, esant diskomfortui dėl tam tikrų vaistų vartojimo ar išorinių alergenų. Visi lašai tinka nesijungiančioms kontaktiniams lašams. Lašanant kontaktinių lašų šisimti nereikia. Sudėtyje nėra konservantų, todėl lašai labai gerai toleruojami net vartojant ilgą laiką. Lašinti po 1 lašą į akies jungtinės maišelį iki 3-5 kartų per parą. „Bepanthen“ Eye vienadozės akių lašų lašytelės skirtos tik vienkartiniam vartojimui. „Bepanthen“ Eye® buteliuką galima vartoti net 12 mėnesių po jo atidarymo. „Bepanthen“ Eye Intensive® buteliuką galima vartoti 2 mėnesius po jo atidarymo. Jei norite sužinoti daugiau, skaitykite visas vartojimo instrukcijas. Reklamos teksto parengimo data 2025-02. CH-20250227-72

PAŠALINKITE SAUSŲ AKIŲ SIMPTOMUS IŠ KARTO!

-30 %**3⁹¹ €****AMEDIPLUS**

kosmetinis žibalas plaukams, 100 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ**-30 %****OCUSYST**

kontaktinių lęšių tirpalas, 100 ml **5²⁹ 3⁷⁰ €**

kontaktinių lęšių tirpalas, 360 ml **8¹⁹ 5⁷³ €**

intensyviai drėkinantys akių lašai sausoms ir sudirgusioms akims, 15 ml **9⁹⁹ 6⁹⁹ €**

MEDICINOS PRIEMONĖS

-30 %

„NEW NORDIC“ MULTIVITAMINAI

MAISTO PAPILDAI

Skandinavų bendrovės „New Nordic“ multivitaminai – tai puikiai suderinti vitaminų, mineralų, mikroelementų ir augalinių ekstraktų kompleksai imunitetui ir gerai savijautai. „Multivitamin active woman“ – moterims, besirūpinančioms gera savijauta ir grožiu. „Multivitamin active woman 55+“ – vyresnių moterų organizmo poreikiams. „Multivitamin pregnant and breastfeeding woman“ – besilaukiančioms moterims ir žindyvėms. „Multivitamin active man“ ir „Multivitamin active man energy boost“ – vyrams. Nepamiršime ir mažųjų – „Mineralai kaulams“, apelsinų arba miško uogų skonio kramtomosios tabletės – kalcio, magnio ir vitamino D šaltinis augančiam organizmui. Sudėtyje esantys vitaminai A, C, D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

JAUSKITĖS PUIKIAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



-70 %

ANTRAI
PIGESNEI
ARBA TOKIAI
PACIAI

SVEIKAŽOLIŲ ARBATA

„Sveikažolių arbatos“ asortimente gauja kuošpaščiui atrinkti vaistažolių mišiniai bei pavienių žolelių arbatos, svaiginančios gardžių skonių ir šildančių iš vidus.

-15 %



NUTRIDRINK, CUBITAN, FORTINI

SPECIALIOS MEDICININĖS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAI

Turi būti vartojami prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-30 %



BIOGAIA

PROTECTIS, 10 kramtomųjų tablečių su vitaminu D3 ~~40⁹⁹~~ 7²⁷ €

PHARAX, lašai, 5 ml ~~21⁹⁹~~ 15³⁹ €

PROTECTIS BABY, lašai, 5 ml ~~48⁹⁹~~ 13⁰¹ €

MAISTO PAPILDAI

„BioGaia Protectis“ lašai – saugus ir paprastas būdas papildyti kūdikių žarnyno mikroflorą nuo pirmųjų gyvenimo dienų, vos 5 lašai per dieną.

„BioGaia Protectis“ kramtomosios tabletės su vitaminu D3 – patogus būdas palaikyti žarnyno mikroflorą ir imuninę sistemą, 1 apelsinų skonio tabletė per dieną; tinka suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų.

„BioGaia Pharax“ lašai – dviejopa pagalba burnos ir gerklės mikrobiatai; tinka vaikams nuo 6 mėnesių ir suaugusiems, vartoti po 5 lašus 2 kartus per dieną.

NUO ALERGIJOS

4⁹⁹ €

LORATADINE ACTAVIS, 10 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekvienoje tabletėje yra 10 mg loratadino. **Terapinės indikacijos.** Simptominis alerginio rinito ir lėtinis idiopatinės dilgėlinės gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems: 10 mg tabletė 1 kartą per parą, 6 m. ir vyresniems vaikams ir paaugliams, sveriantiems daugiau negu 30 kg: 10 mg tabletė 1 kartą per parą. Jaunesniems kaip 6 m. vaikams arba sveriantiems mažiau negu 30 kg žmonėms vartoti 10 mg tablečių nerekomenduojama. Loratadino saugumas ir veiksmingumas jaunesniems kaip 2 m. vaikams nenustatyti. Pacientams, sergantiems sunkiu kepenų funkcijos nepakankamumu, skiriama pradine 10 mg doze kas antrą dieną. **Kontraindikacijos.** Loratadino tablečių vartoti draudžiama, jeigu padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Loratadine Actavis“, jeigu sergate kepenų liga; Jums numatoma atlikti kokius nors odos mėginius dėl alergijos. Nevartokite „Loratadine Actavis“ 2 dienas iki numatomų alerginių odos mėginių. To reikia, nes šis vaistas gali paveikti šio tyrimo rezultatus. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. OT-LT-00107. Teksto peržiūros data 2024-07-11. Reklamines medžiagas parengimo data 2025-02.

IKI -40 %



„AMEDIPLUS“ MEDICINOS PRIETAISAI

Automatinis žastinis kraujospūdžio matuoklis DBP-6192, ~~85⁹⁹~~ 51⁵⁹ € -40 %

Tinklinis inhalatorius VP-M1, ~~79⁹⁹~~ 55⁹⁹ € -30 %

Kompresorinis inhalatorius VP-D1, ~~65⁹⁹~~ 46¹⁹ € -30 %

MEDICINOS PRIETAISAI

-20 %

5⁴³ €

UNDEVIT, 50 dražečių

MAISTO PAPILDAS

Vitaminų A, C, E, B grupės (B1, B2, B6, B12) ir niacino, rutino, pantoteno rūgšties, folio rūgšties preparatas. Vitaminai C ir A padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo, vitaminas B1 (tiaminas) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, vitaminas B2 (riboflavinas) padeda išsaugoti normalų regėjimą, vitaminas B6 (piridoksinas) padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, vitaminas B12 (cianokobalaminas) padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją, pantoteno rūgštis padeda palaikyti normalią protinę veiklą. Vartojimas: gerti po 1 dražetę per dieną po valgio. Gamintojas: „Technology“, Ukraina. Išskirtinis platintojas Lietuvoje: UAB VERATRUM PHARMA, Jarių g.28, Vilnius

IMUNITETUI, KAULAMS, RAUMENIMS, SVEIKOMS LAŠTELĖMS

IKI -30 %



„OILESEN“ VITAMINAS D3

MAISTO PAPILDAS

„Oileesen D“ – grynas vitaminas D dėl geresnio pasisavinimo išrūpinamas natūraliuose aliejuose lašiuokais arba kapsulėmis. Be konservantų, paprasta vartoti. „Oileesen D 400“ – 1 laše yra 400 TV vitamino D, išrūpinimo extra virgin alyvuogių aliejuje. Tinka kūdikiams nuo pirmos gimimo dienos. Paprasta dužoti pipete.

„Oileesen D 1000“ – 1 kapsulėje yra 1000 TV vitamino D išrūpinimo extra virgin alyvuogių aliejuje. Tinka vartoti vaikams nuo 3 metų.

„Oileesen D3 su juodųjų ąžuolų aliejumi“ – 1 kapsulėje yra 4000TV vitamino D, išrūpinimo juodųjų ąžuolų aliejuje. Iltn vertingas gerai savijautai.

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų būklę, normalią raumenų ir kau funkciją. Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.

Oileesen D3+K2 su kanapių aliejumi N60 – Iltn vertinga sudėtis, apjungianti 3 svarbius gerai savijautai komponentus: 75 mcg vitamino K2 sinergiškai veikiantis su 4000 TV vitaminu D3 ir 500 mg kanapių sėklų aliejumi.

DAUGIAU SAULĖS SU „OILESEN D3“!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

-15 %



MAGNEX

MAISTO PAPILDAS

Magnio maisto papildai pagaminti Suomijoje. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją ir normalią nervų sistemos veiklą. Vartojimas: „Magnex 375 mg“, „Magnex 375 mg + B6“ – suaugusiems 1 tabletė per parą; „Magnex Citrate + B6 Chew“, „Magnex Citrate + B6“ – suaugusiems 2 tabletės per parą.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

-30 %



BF-ESSE

MAISTO PAPILDAS

„Stop Stress“ ir „Stop Stress“ Herbal“ sudėtyje esantis vitaminas B6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. „Stop Stress“ Night“ sudėtyje esantis pasiflorų ekstraktas padeda palaikyti normalią miegą. „Kardio Start“ sudėtyje esantis valgomųjų česnakų ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių funkciją. „Flex“ su gliukozaminu, chondroitinu, MSM ir vitaminu C, kuris padeda palaikyti normalią kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų ir kremzlės funkcijai, susidarymą. „Immuneco“ sudėtyje esantis vitaminas A, D, B₆, B₁₂, cinkas ir selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. „Beautyinol“ pasilyti tuo, kad sudėtyje turi tokių reikalingų kaip peruvinių gvajavų ir vienažiedžių eugenijų vaisių ekstraktų. Varis padeda palaikyti normalią plaukų ir odos pigmentaciją, cinkas padeda palaikyti normalią plaukų, nagų ir odos būklę.

DIENAI BE STRESO, RAMIAM MIEGUI, IMUNITETUI, ŠIRDŽIAI, GROŽIUI IR SĄNARIAMS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

-10 % 6^{02€}

GLICINAS, 50 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Sudedamosios dalys: glicinas (65 % grynojo kiekio), dekstrozės monohidratas, kukurūzų krakmolai, lipnumą reguliuojanti medžiaga riebalų rūgščių magnio druskos. Grynasis kiekis: 7,6 g. Vartojimo būdas: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Tabletes laikyti po liežuviu, kol ištirps. Rekomenduojama suvartoti per parą kiekį (3 tabletes) yra 300 mg glicino. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakeikalas. Laikymo sąlygos. Laikyti sausoje, tamsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Gamintojas: UAB „Medicata Filia“, Jarijų g. 28, Vilnius. Išskirtinis platintojas Lietuvoje: UAB VERATRUM PHARMA, Jarijų g.28, Vilnius

-50 %



FOMAN®

30 kapsulių 15⁹⁹ 8⁰⁰ €

MAISTO PAPILDAS

„Foman“ – maisto papildas, skirtas 3 pagrindinėms vyrų funkcijoms: **prostato, šlapimo sistemos, reprodukcinėi**. Išskirtinėje „Foman“ sudėtyje yra 4 kompleksškai veikiantys elementai: gulsčių sereno vaisių ekstraktas padeda palaikyti šlapimo ir reprodukcinę funkcijas; didžiųjų dilgėlių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią prostatos funkciją; fermentas proteazė papildoma vyro mitų; organinė seleno forma, padeda palaikyti normalią spermatogenezę. Rekomenduojama suaugusiems gerti po 1–2 tabletes per dieną ne valgio metu.

„FOMAN“ – TECHNIŠKAI TVARKINGAM VYRUI.

FOMAN® UP SHOTS

14 x 25 ml 40⁹⁹ 20⁴⁵ €

MAISTO PAPILDAS

„Foman Up Shots“ – skirtas seksualiai aktyviems VYRAMS. Vienoje buteliuke yra koncentruotų veikliųjų medžiagų dozė pritaikyta vyrų: **lytiniam potraukiui, erekcijai, pajėgumui ir energijai**. Natūralių seksualinių aktyvumą ir energiją padeda palaikyti **Peruvinių pipirė (maca)**. Lytinį potraukį ir pajėgumą padeda palaikyti **Gulsčioji ragužė**. **Ženšenis** padeda palaikyti normalią erekcijos funkciją. **Pantoteno rūgštis** (vitaminas B5) padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei padeda palaikyti normalią proteininę veiklą bei normalią energijos apykaitą. Sudėtyje taurinas (natūrali amino rūgštis).

VIRŠYK GALIMYBES SU „FOMAN UP SHOTS“

-15 % 35^{69€}

LIDONIUM®, 700 mg, 42 tabletės

SPECIALIOS MEDICININĖS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAS SU UGNAŽOLE

Tik mišybai reguliuoti esant susijęms ląstelėms imunitetui, **vėžio profilaktikos metu**, siekiant pagerinti onkologinių ligonių gyvenimo kokybę ir esant skrandžio, žarnyno, kepenų ir tulžies pūsės latakų, kvėpavimo takų spazmams, uždegimams.

28⁹⁹ €

NICORETTE, MINT, 2 mg, 80 suslėgtųjų pastilių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas. Kiekvienoje pastilėje yra 2 mg nikotino (nikotino rezinato pavidalu). **Terapinės indikacijos.** Priklausomybės nuo tabako gydymas, palengvinant nikotino nutraukimo simptomus ir palengvinant potraukį nikotinui rūkantiems pacientams nuo 18 metų. Tikslas yra visam laikui nutraukti tabako vartojimą. Geriausia vartoti kartu su elgesio pakeitimo programa. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** **Metant rūkyti iš karto:** pradėkite vartoti nuo 8 iki 12 pastilių per parą. Kai tik pajuntate norą rūkyti, vieną pastilę įsidėkite į burną ir leiskite jai ištirpti. Taip pastiles vartokite iki 6 savaičių, tada palaipsniui mažinkite per parą vartojamųjų pastilių skaičių. Kai suvartosite tik 1–2 pastiles per parą, visiškai nutraukite jų vartojimą. **Metant rūkyti palaipsniui:** pradėkite palaipsniui keisti kai kurias surūkomas cigaretes pastilėmis, vėliau, vartodami pastiles, cigarečių visiškai atsisakykite ir nutraukite pastilių vartojimą. Nevartokite daugiau kaip 15 pastilių per parą. Pastilių negalima vartoti ilgiau kaip 9 mėnesius. 12–17 m. paaugliams galima vartoti tik pastirus su sveikatos priežiūros specialistu. **Kontraindikacijos.** Negalima vartoti niekada nerūkusiems pacientams ir jaunesniems kaip 12 m. vaikams, taip pat esant padidėjusiam jautrumui nikotinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai.** Pasikonsultuokite su gydytoju, jei Jums yra bet kuri iš šių būklių: širdies ir kraujagyslių ligos, cukrinis diabetas, anksčiau yra pasireikšusi angioneurozinė edema ar dilgėlinė, inkstų ir kepenų funkcijos sutrikimai, feochromocitoma, nekontroliuojama hipertenzija, virškinimo trakto ligos, anksčiau yra pasireikšusi epilepsija ar traukuliai. Pastilės gali kelti užspringimo pavojų. Reikiamos teksto parengimo data: 2026 09. LT-NIC-2026-356651.

PASTILĖS MAŽINA POTRAUKĮ RŪKYTI JAU PO 2 MINUČIŲ.

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



AMEDIPUS

Kištukai ausims skrydžiui, S dydis, 1 pora 9⁹⁹ €

-20 %



HÜBNER ORIGINAL SILICEA

MAISTO PAPILDAI, MEDICINOS PRIEMONĖS

SILICEA gali padėti aprūpinti jūsų organizmą svarbiais elementais ir palaikyti Jūsų grožį. Silicis yra antras po deguonies labiausiai žemėje paplitęs elementas. Silicis – natūrali gamtinė medžiaga. Biotinas padeda palaikyti normalią odos ir plaukų būklę. SILICEA LIP HERPES GEL, gelis nuo lūpų pūslelinės, 5 g Natūrali veikioji medžiaga (mineralinis silicio dioksido gelis) itin gerai sutraukia ir džiovina pūsleles, taip greitindama jų gijimą. SILICEA GASTROINTESTINAL GEL DIRECT 15 ml gelio, 15 paketėlių Didesnės silicio koncentracijos med. prekės (CE0297) padeda palengvinti virškinamojo trakto ir skrandžio negalavimus. Periodiškas HÜBNER ORIGINAL SILICEA produktų vartojimas gali padėti rūpinantis jūsų grožiu ir sveikata

„SILICEA“ – IR GROŽIUI, IR SVEIKATAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-20 %



100 METŲ
rūpinamės jūsų sveikata

DOPPELHERZ

MAISTO PAPILDAI

Maisto papildus „Doppelherz“ gamina viena farmacinių produktų gamintojų lyderių Vokietijoje „Queisser Pharma“, todėl produktai kuriama pasitelkiant naujausius technologinius ir gamybos laimėjimus bei laikantis tarptautinių kokybės standartų. Maisto papildai „Doppelherz“ yra vieni perkamiausių Lietuvoje ir jau daugiau kaip 20 metų garantuoja savo klientams gerą savijautą.

„DOPPELHERZ“ – DVIEJŲ ŠIRDŽIŲ JĖGA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

ŽARNYNO MIKROFLORA

-20 %



COMPLIFLORA

MAISTO PAPILDAI

„Compliflora Family“ ir „Compliflora Family“ – formulė „keturi viename“. Bakterijos, kolonizuojančios ir plonąjį, ir storąjį žarnyną. Didelė KSV (kolonijas sudaranti vienetų) dozė. Gamybos metodas: bakterijos atsparios skrandžio rūgštim, todėl gali saugiai pasiekti žarnyną ir ten kolonizuotis. Vartojimas: 1 kapsulė arba 1 paketėlis per dieną. „Compliflora Baby Drops“ – formulė „du viename“. *Bifidobacterium lactis* B501 ir *Lactobacillus rhamnosus* GG ATCC 5301 aliejinės formos kompleksas. Augalinės kilmės medžiagos suteikia malonų skonį, be to, nereikia specialių laikymo sąlygų. Vartojimas: kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – 5 lašai per dieną. „Compliflora Femina“ – formulė „keturi viename“, ją sudaro 4 specialiai atrinktos *Lactobacillus* genties bakterijų atmainos, būdingos natūraliai, sveikai šlapimo ir lyties organų sistemos mikroflorai. „Compliflora Immuno“ yra kompleksinis produktas, sukurtas siekiant palaikyti gerą imuninę organizmo būklę. 1 kapsuleje yra 4 milijardai mikrokapsulių su pieno rūgšties bakterijų, cinko bei vitamino D. Vartojimas: 1 kapsulė per dieną. „Compliflora Kids Gummy Bears“ – guminukai, kurių sudėtyje yra tindalizuotų pieno rūgšties bakterijų, natūraliai aptinkamų žmogaus virškinimo trakte, taip pat naudingo vitamino B6, niacino ir pantoteno rūgšties. Rekomenduojama paros dozė: vyresniems nei 3 m. vaikams ir suaugusiems – 2 guminukai.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-20%**VOCAL****MAISTO PAPILDAI SU SALDIKLIKIAIS**

Pastilių „Vocal“ sudėtyje yra Islandinių kerpenų, vitamino C ir cinko. Islandinės kerpenos padeda palaikyti kvėpavimo takų – gerklės, ryklės gleivinės bei balso stygų – funkcijas. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Cinkas atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese. Rekomenduojamas vartojimas: 1 pastilė 4 kartus per dieną. Vyresniems nei 4 m. žmonėms.

*Klejo taikoma geltona etiketė pažymėtos prekės

-20%**7⁵¹€****VOCAL HOT DRINK**

juodųjų serbentų skonio, milteliai karštam gėrimui ruošti, 10 paketėlių
medaus ir citrinų skonio, milteliai karštam gėrimui ruošti, 10 paketėlių

MAISTO PAPILDAI

„Vocal“ miltelių pakeliose karštam gėrimui ruošti sudėtyje yra islandinių kerpenų gniūzlų, mažalapio liepų žiedų, tikrųjų imbiero šakniastiebių, smulkiąžiedžių tūbių žiedų, juodoųjų šėivamedžių žiedų ekstraktų bei vitamino C. Islandinės kerpenos ir liepų žiedai padeda palaikyti kvėpavimo takų (gerklės, ryklės gleivinės bei balso stygų) funkcijas. Islandinės kerpenos, imbierai, juodojoji šėivamedžiai ir liepų žiedai padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. Paruošimo būdas: paketėlio turinį (miltelius) ištirpinkite 200 ml karšto vandens (ne verdančio, apie 60 °C) ir gerkite. Maisto papildas su saldikliais.

NUO SAUSO IR ŠLAPIO (PRODUKTYVAUS) KOSULIO**-20%****IVEX**

100 ml + 5 ml matavimo indelis **9³³ 7⁵¹ €**

200 ml + 5 ml matavimo indelis **16²⁹ 13⁰³ €**

MEDICINOS PRIEMONĖ

Sudėtyje esantys natūralūs ekstraktai (gebenių (Hedera Helix) ekstraktas (DER 1-ZT), poliflorinis medus, vaistinių svilaržių (Althaea officinalis) ekstraktas (1%), vaistinių čiobrelų (Thymus vulgaris) ekstraktas (0,3%), kurių veiksmingumas įrodytas, suformuoja prie gleivinės prilipnantią plevę, kuri ramina kosulį, apsaugo nuo dirginimo bei pagerina viršutinį kvėpavimo takų funkciją. Tai ypač aktualu žiemą arba kai reikia gydyti išorinių veiksmų (šaltis, smogo, dulkių ir dūmų) sukeltą sudirginimą. Naudinga esant sausam ir šlapiam (produktyviam) kosuliui, ramina dirginimą, saugo gleivinę ir lengvina gleivių šalinimą. Tinka vaikams nuo 1 m. amžiaus.

-20%**SAMBUCUS KIDS**

siropas, 120 ml **16²⁹ 13⁰³ €**

60 guminukų **18²⁹ 15⁰³ €**

MAISTO PAPILDAI, MAISTO PRODUKTAS

Juodojoji šėivamedžiai, čiobreliai, šalavijai padeda palaikyti kvėpavimo sistemos funkciją. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

AUSŲ SIERAI SUMINKŠTINTI IR IŠVALYTI**-15%** **11⁸⁶€****VAXOL, ausų purškalas 10 ml****MEDICINOS PRIEMONĖ**

„Vaxol“ – tai saugus ir veiksmingas būdas suminkštinti ir natūraliai išvalyti ausų sierą: sušvelnina, drėkina ir natūraliai šalina ausų sierą. Tinka vaikams nuo 1 metų, greitai ir lengvai naudojamas. Sumažina ausies praplovimo svirkštų poreikį. Ypač patariama naudoti užsimušantiems vandens sportui, dažnai naudojamiems ausinukams, klausos aparatams, taip pat vyresnio amžiaus žmonėms.

AUSŲ PURŠKALAS SU ALYVUOGIŲ ALIEJUMI**VAIKAMS NUO PIRMŲJŲ GYVENIMO METŲ****-20%** **10³⁶€****HUSTAGIL, balzamas, 30 ml****KOSMETIKOS PRIEMONĖ**

„Hustagil“ balzamas su čiobreliais, eukaliptų ir levandų eteriniais aliejais kvėpavimui palengvinti. Balzamas yra švelnios konsistencijos, lengvai paskirstomas ir įtrinamas į odą. „Hustagil“ švelniai veikia jautrią odą dėl jame esančių migdolų aliejaus, pantenolio ir vitamino E. Naudojimas: balzamu kelis kartus švelniai įtrinkite krūtinę ir nugarą. Malonus eterinių aliejų kvapas atpalaiduoja kvėpavimą.

KVĖPAVIMUI PALENGVINTI!



GROŽIUI, JAI

-40%



BIOCELL

MAISTO PAPILDAI

BIOCELL puoselėja gamtos sukurtą grožį ir sąmoningą gyvenimo būdą, vertina natūralumo estetiką ir skatina moterį pamilti save tokią, kokia ji yra – tobulą. Geriamieji BIOCELL grožio eliksyrai „shots“ su kolagenu ar keratinu, grožio kapsulės, hidrolizuotas kolagenas miltelių forma ir skaidulų puoselėja odos, plaukų bei nagų grožį iš vidaus.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

Sausai odai

IKI -40%



ATODERM BIODERMA

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Sausai odai būdingas tempimo pojūtis ir elastingumo trūkumas, šie simptomai kartais pasireiškia kartu su niežėjimu ir pleiskanojimu „Bioderma“ sprendimas: „Atoderm“ – produktų linija, skirta sausai, labai sausai ar atopiškai odai, naudojama kasdien ir kartu su atopinio dermatito gydymu. Asortimente yra visi būtini produktai, skirti švelniai ir minkštai odai! Po dušo atsiveikink su sausa ir niežtinčia oda!

„NAOS“ EKOLOGIJA – DERMATOLOGIJOS ESMĖ.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

Intymios higienos
prausikliai ir
makšties ovulės

1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra
pigesnė arba tokia pati
– NEMOKAMA!



HI GENIE!

KOSMETIKOS PRIEMONĖS, MEDICINOS PRIEMONĖS

„Hi Genie!“ – tai visapusis intymiai priežiūrai skirtų produktų asortimentas, sukurtas moterims ir jų gerai savijautai kiekviename gyvenimo etape: nuo vaikystės iki brandos ir menopauzės.

Dermatologiškai patikrinti produktai su kruopščiai atrinktomis medžiagomis turi švelnų valomąjį poveikį ir padeda palaikyti natūralų intymios srities balansą.

„Hi Genie!“ sprendimai ne tik atliepia skirtingus poreikius – kasdienio gaivumo, specifinės priežiūros ar priežiūros menopauzės laikotarpiu, bet ir kuriami skiriant ypatingą dėmesį kokybei, saugumui bei švelnumui.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



UŽ 1 CT

Perkant GENTLE DAY
pakuotę, vienkartinės
nosinaitės –
TIK UŽ 1 CT!



GENTLE DAY®

HIGIENOS PRIEMONĖS

„Gentle Day“™ padeda moterims prisijaukinti menstruacijų ciklą.

Lietuviškas prekės ženklas kuriantis saugias intymios higienos priemones, atsižvelgiant į kiekvienos moters kūno poreikius – nuo pirmųjų menstruacijų iki menopauzės. Hipoalergiški, odos nedirginantys produktai sukurti tam, kad apsaugotų net ir pačią jautriausią odą bei suteiktų visą komfortą. Švelnumas ir kokybė, kuria galite pasitikėti kasdien.

Intymiai higienai

-30%



LACTACYD®

PHARMA, intymios higienos prausiklis su prebiotikais, 250 ml **14⁹⁵ 10⁴⁷ €**

CLASSIC, intymios higienos prausimosi losjonas, skirtas naudoti kasdien, 200 ml **14⁰² 7⁷⁶ €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Lactacyd“™ intymios higienos prausikliai, skirti kasdieniai intymių zonų priežiūrai. Paprasta naudoti vonioje ar duše. Nuo pirmųjų mėnesinių iki menopauzės: „Lactacyd“™ siūlo visą intymios higienos prausiklių asortimentą, kad kiekvieną dieną būtumėte žvali ir jautumėtės patogiai.

„Lactacyd“™ gaminiai turi tinkamą pH ir palaiko natūralią makšties rūgštingumą. Jie yra švelnūs, be muilo ir tinkami naudoti kasdien. Produktai yra su natūralia pieno rūgštimi, kuri skatina gerųjų bakterijų dauginimąsi jūsų intymios vietose ir padeda išsaugoti natūralią makšties floros rūgštingumą.

Moterys intymiai
higienai

-20%



MULTI-GYN

KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS

Mūsų produktai suteikia tinkamą intymią higieną ir padeda sumažinti nemalonius pojūčius toje srityje: nepageidaujamą kvapą, niežulį ar deginimo pojūtį. „Multi-Gyn“ puikiai suprantą moterų poreikius, kai atsiranda nepatogumų intymioje zonoje ir kaip tai paveikia jūsų gyvenimą. Todėl mes siūlome produktus, kurie gydo šiuos negalavimus natūraliu būdu, be žinomo šalutinio poveikio („Actigel 2 in 1“, „Liquigel“, „Flora Plus“). Visų produktų sudėtyje esantis unikalus ZOR® kompleksas atkuria ir normalizuoja natūralią makšties mikroflorą.

*ZOR kompleksas – patentuoti biologikai aktyvūs polisacharidai, gaunami iš sudedamųjų alavijų (Barbadosis Miller) medžiagų. www.ZOR.com

ATGAUKITE SAVO ŠVYTĖJIMĄ SU „MULTI-GYN“!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



-40%

AMEDIPUS

Lūpas apsaugantis balzamas su pantenoliu, 4,5 g **5⁵⁹ 3³⁵ €**

Lūpų balzamas jautrioms lūpoms su ramunėlių ekstraktu ir arganų aliejumi, 4,5 g **5⁵⁹ 3³⁵ €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS



-60%

Perkant bent **TRIS** bet kurias pakuotes**ŽIEDĖ**

drėkinamoji veido kaukė su hialuronatu, 15 ml **4⁹⁸ €**
 veido kaukė brandžiai odai su rožių vandeniu ir hialuronatu, 15 ml **5⁹⁸ €**
 veido kaukė su dumbliais ir jūriniu kolagenu, 15 ml **5⁹⁸ €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖSUŽ **1** CT

Perkant ŽIEDĖ dieninį ir naktinį kremus, stangrinamasis veido serumas - **TIK UŽ 1 CT!**

ŽIEDĖ

stangrinamasis dienos veido kremas su dumbliais, 50 ml **19⁹⁹ €**
 stangrinamasis naktinis veido kremas su dumbliais, 50 ml **19⁹⁹ €**
 stangrinamasis veido serumas su dumbliais, 30 ml **19⁹⁸ €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖSIKI **-30%****CUMLAUDE LAB****GINEKOLOGINĖS KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS**

Ispanijos ginekologų sukurti intymios priežiūros produktai, iš kurių kiekviena moteris išsirinks sau tinkantį – nuo kasdienei higienai skirtų pasklaidų iki priemonių lytinių organų nemaloniems simptomams ir uždegimams malšinti bei jų išvengti.

Atraskite intymios higienos ritualą su „Cumlaude Lab“!

„CUMLAUDE LAB“ – NAUJAS POŽIŪRIS Į MOTERS LYTINĘ SVEIKATĄ

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

**1+1**

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – **NEMOKAMAI!**

ŽIEDĖ

drėkinamasis rankų kremas su alavijų sultimis, 50 ml **4⁹⁹ €**
 atkuriamasis rankų kremas su taukmedžių sviestu ir saldžiųjų migdolų aliejumi, 50 ml **4⁹⁹ €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS**13⁹⁷ €****LOMEXIN**

200 mg, 3 makšties minkštosios kapsulės
 600 mg, 1 makšties minkštosios kapsulės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

„Lomexin“ kapsulė yra 200 mg arba 600 mg fentikonazolo nitrato. Skirtas išorinių lyties organų ir makšties kandidozei lokaliai gydyti. „Lomexin“ vartoti j makštį 3 paras iš eilės po vieną 200 mg makšties kapsulę arba 1 kartą vartoti vieną 600 mg makšties kapsulę (prieš miegą). „Lomexin“ nevartojamas vaikams ir paaugliams iki 16 m. gydyti. Vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. „Lomexin“ 600 mg kapsulėje yra su juo leidinio – negalima vartoti pacientėms, kurios yra alergiškos žemės riešutams ar sojomis. Kreipkitės į gydytoją ar vaistininką, jeigu esate nėščia ar maitinate krūtimi, simptomai nepagerėja per 1 savaitę ar pasikartoja daugiau nei 2 kartus per pastaruosius 6 mėnesius. Jūs ar Jūsų partneris kada nors sirgote lytiškai plintančiomis ligomis. Jums daugiau nei 60 metų, yra nustatytas jautrumas imidazolams ar kitiems priešgrybeliniams vaistams, pasireiškia nenormalus ar nereguliarus kraujavimas iš makšties, kraujingos makšties išskyros, vulvos ar makšties žaizdos, opos arba pūslelės, apatinės pilvo dalies skausmas arba sutrikęs šlapinimasis, nepageidaujamas poveikis, toks kaip paraudimas, niežėjimas ar išbėrimas, susijęs su gydymu. Vartoti nerekomenduojama, jeigu naudojate „barjerinį“ kontracepcijos metodą, pagamintą iš latekso, spermicidus, makšties ploviklius ar kitus makšties produktus. Reklamos teksto parengimo data 2026-10. RE_LV_LO_2026_493

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

**-30%****INTIMOHELP****MEDICINOS PRIEMONĖS**

Makšties tabletės „Intimohelp“ atkuria ir palaiko fiziologinį makšties pH, slopina bakterijų plitimą. Priemonės sudėtyje esantis inulinas skatina natūralios bakterinės floros augimą, sugeria pagausėjusias išskyras, naikina blogą kvapą. Sudėtyje yra inulino, hialurono rūgšties ir vitamino E. Naudojimo instrukcija: naudokite po 1 makšties tabletę vieną kartą per parą.

Intymios higienos emulsija „Intimohelp“ su rožių vandeniu ir hialurono rūgštimi padeda atkurti natūralią mikroflorą. Sudėtyje yra pieno rūgšties ir prebiotikų. Rožių vanduo veikia antiseptiškai ir ramina. Nedidelį kiekį emulsijos užtepti ant rankos, nuplauti intymias vietas, paskui nuskalauti šiltu vandeniu.

Drėgnos intymios higienos servetėlės „Intimohelp“ su alavijų lapų ekstraktu ir D-pantenoliu švelniai valo ir nedirgina odos, užtikrina optimalią higieną bet kokiomis aplinkybėmis.

„INTIMOHELP“ – MOTERS INTYMIOS SVEIKATOS RECEPTAS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

**14⁹⁹ €****LENOSTELLA, 1,5 mg, 1 tabletė****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 15 mg levonorgestrelis. **Terapinės indikacijos:** skubi kontracepcija, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms po nesusaugus lytinio akto. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** 1 tabletę reikia išgerti kiek galima greičiau, geriausia per 12 valandų ir ne vėliau kaip per 72 valandas po nesusaugus lytinio santykio. **Kontraindikacijos:** jautrumas levonorgestrelui arba pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** nevartoti, kol nebuvo pirmųjų mėnesinių. „Sandoz Pharmaceuticals d. d.“ filialas, Uab, g. Žilė, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2601069671. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

PADEDA IŠVENGTI NĖSTUMO PO NESAUGAUS LYTINIO AKTO.

Moters higienaiIKI **-30%****LADY ANION****HIGIENOS PRIEMONĖS**

„Lady ANION“ higieniniai paketai ir įklotai su ekologiška medvilne ir anjonine juoste. Medvilnė sukuria komforto pojūtį, anjoninė juostelė kvapo kontrolę, laidūs orai, švelnus paviršius išlieka sausas. Rekomenduojami ginekologų.

„Pantliner“ • (24 vnt. ir 48 vnt.) – ploni įklotai kasdieniniam naudojimui.

„Dayliner“ •• (16 vnt.) – įklotai su sparneliais gausioms išskyroms, negausioms menstruacijoms.

„Active“ ••• (15 vnt.) – ploni paketai idealiai tinka keliaujant, sportuojant, šokant ar menopauzės metu.

„Day Use“ ••••• (10 vnt. ir 20 vnt.) – paketai dienai menstruacijų metu.

„Night Use“ ••••• (8 vnt.) – paketai naktiai menstruacijų metu.

„Post Partum“ ••••• (10 vnt.) – paketai po gimdymo arba esant itin gausioms menstruacijoms.

„LADY ANION“ – TAVO KASDIENIS PASIRINKIMAS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!**ODÖNTE**dantų šepetėlis su sidabru, minkštas, 1 vnt. **4⁹⁹ €**dantų šepetėlis su auksu, minkštas, 1 vnt. **4⁹⁹ €**labai minkštas dantų šepetėlis, 1 vnt. **3⁹⁹ €**balinamoji ir dantenų sauganti dantų pasta, 75 ml **7⁹⁹ €**gaivų burnos kvapą suteikiantis burnos skalavimo skystis, 500 ml **8⁷⁹ €**burnos skalavimo skystis jautriems dantims, 500 ml **8⁹⁹ €****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

-25%

**LACALUT****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

LACALUT dantų priežiūros priemonės – tai 100-ty metų patirtis, sukauptos žinios ir nuolatiniai tyrimai, siekiant sukurti išskirtinio efektyvumo ir aukščiausios kokybės dantų priežiūros priemones. Unikali kompleksinė LACALUT apsauginė formulė garantuoja optimalią dantų ir dantenų apsaugą.

„LACALUT“ – ODONTOLOGAS JŪSŲ NAMUOSE!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-20%

**PARODONTAX****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

PARODONTAX – dantenų sveikatos specialistas. Padeda sumažinti dantenų kraujavimą ir stiprina dantenų, kad būtų išvengta dantų netekimo. Sveikos dantenos – sveikos šypsenos pagrindas. Rūpinkitės savo burnos sveikata kiekvieną dieną.

TARKITE SUDIE KRAUJUOJANČIOMS DANTENOMS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-30%

**LISTERINE****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

Burnos skalavimo skystis LISTERINE padeda saugoti dantis nuo apnašų, palaiko gaivų burnos kvapą. Pasiekia vietas, kurių dantų šepetėlis negali pasiekti.

SU ŠEPETĖLIU TIK PUSĖ DARBO – NAUDOK IR „LISTERINE“

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra
pigesnė arba
tokia pati –
NEMOKAMA!**„TEPE“ DANTŲ PASTOS****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

„TePe“ dantų pastos yra švelnios, su fluoru, neputojančios arba mažai putojančios. Skirtos kūdikiams nuo pirmo dantuko, vaikų pieniniams dantims, suaugusiems kasdienai ar turintiems sausą burnos gleivinę.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra
pigesnė arba
tokia pati –
NEMOKAMA!**JORDAN**FLOSSER 3 - IN - 1, dantų siūlas, 36 vnt. **3⁷⁹ €**GUM PROTECTOR, dantų šepetėlis, 1 vnt. **4⁹⁵ €**dantų pasta vaikams, 6-12 metų, 50 ml **3³⁹ €**dantų pasta vaikams, 0-5 metų, 50 ml **3³⁹ €****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

Platus dantų priežiūros priemonių asortimentas visai šeimai - nuo pirmo dantuko! Rinkitės dantų šepetėlius, pastas bei tarpdančių valymo priemones pagal savo individualius poreikius.

„JORDAN“ RŪPINASI ŠYPSENOMIS NUO 1927-ŲJŲ!Pasiūlymai galioja **2026 11 01 – 2026 11 30**.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Nuolaidos taikomos prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą, kurio galite teirautis kiekvienoje vaistinėje, el. paštu evaistine@nvaistine.lt arba nemokamu tel. +370 800 10008. Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį/informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Daugiau informacijos NORFOS vaistinėje, el. paštu evaistine@nvaistine.lt arba tel. +370 800 10008. Reklaminių tekstų parengimo data – 2026 10 19.





1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMAI!



AMBIO KIDS

GERKLEI SU ČIOBRELIU, 6 aviečių skonio ledinukai 5⁹⁸ €
GERKLEI SU ISLANDINE KERPE, 6 braškių skonio ledinukai 5⁹⁸ €

MAISTO PAPILDAI

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



DIFOLIN, 60 tablečių 9⁹⁹ €
DIFOLIN+, 30 kapsulių 19²⁹ €

MAISTO PAPILDAI

„Difolin+“ – moters gerai savijautai: hemoglobiniui, energijai, nervams, imunitetui. Mikrokapsuluota liposomose geležis + folio rūgštis + vitaminai B12, D3, C + varis. „Difolin+“ sudėtyje naudojama mikrokapsuluota liposomose geležis yra efektyviai pasisavinama organizmo, neturi geležies poskonio, nedingina virškinimo trakto, neturi sąveikos su maistu. Geležis, folio rūgštis, vitaminas B12 – vieni būtinausių kraujo gamybai elementų. Vitaminas B12 padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, geležis – hemoglobino susidarymą, foliatai – kraujodarą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, varis – nervų sistemos veiklą, geležis, varis, vitaminai C, B12 – energijos apykaitą.

„Difolin“ – planuojančioms pastoti, nėščioms, žindančioms moterims: folio rūgštis + vitaminas D3. Folio rūgštis padeda palaikyti normalią kraujodarą, mažinti nuovargį. Mažas foliatų kiekis nėščiosios kraujo eritrocituose yra besivystančio vaisiaus nervinio vamzdelio defektų rizikos veiksnys. Teigiamas poveikis atsiranda per parą papildomai suvartojant 400 µg folio rūgšties ne trumpiau kaip vieną mėnesį iki pastojimo ir iki trijų mėnesių po jo. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, dalyvauja ląstelių dalijimosi procese.

„DIFOLIN“ – MAISTO PAPILDAI MOTERIMS.

Karščiavimui
mažinti ir skausmui
malšinti



NUO 4⁵⁰ €

IBUSTAR

20 mg/ml geriamoji suspensija vaikams, 100 ml 4⁵⁰ €
40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams, 100 ml 7⁷⁵ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Ibustar“ 20 mg/ml, 40 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams. 1 ml geriamosios suspensijos yra 20 mg arba 40 mg ibuprofeno. „Ibustar“ yra uždegimą slopinantis ir skausmą malšinantis vaistinis preparatas (nesteroidinis vaistas nuo uždegimo), turintis karščiavimą mažinančių savybių. „Ibustar“ vartojamas trumpą laiką simptomams gydyti: silpną ar vidutinio stiprumo skausmą, karščiavimą. „Ibustar“ 20 mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams, sveriantiems 5–29 kg (amžius nuo 6 mėn. iki 9 m.). „Ibustar“ 40 mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams, sveriantiems 10 kg ir daugiau (1 m. ir vyresniems), paaugliams ir suaugusiems. Tinka vartoti tik per burną ir trumpai. Jeigu šio vaistinio preparato reikia vartoti ilgiau kaip 3 dienas arba jeigu ligos požymiai sunkėja, būtina kreiptis į gydytoją. Prieš vartojimą buteliuką supurtkite. „Ibustar“ vartoti draudžiama: jeigu yra alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu praėjusio buvo bronchų spazmas, astma, nosies gleivinės paburkimas, angioedema ar odos reakcijos po acetalisalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių prieš uždegiminių vaistų vartojimo; jeigu yra neaiškių kraujodaros sutrikimų; jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; jeigu yra ar buvo praėjusio skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa arba kraujavimas; jeigu yra kraujavimas iš smegenis arba kitoks kraujavimas; jeigu yra sunkus inkstų, kepenų funkcijos ar sunkus širdies nepakankamumas; netekus daug skysčių; jeigu yra paskutinis nėštumo trimestras. Specialios priemonės: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Ibustar“. Šalutinis poveikis gali sumažėti vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką, būtiną simptomų kontrolei. „Ibustar“ reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius. Jeigu atsiranda skrandžio kraujavimas ar išopėjimas, nutraukite „Ibustar“ vartojimą. Nedelsdami informuokite gydytoją, jeigu atsiranda bet koks neįprastas simptomas pilve. Pastebėję bet kurį alerginės reakcijos į šį vaistą odos reakcijų simptomus, nedelsdami nutraukite „Ibustar“ vartojimą ir kreipkitės į gydytoją arba greitosios medicinos pagalbos tarnybą. „Ibustar“ gali slėpti tokių infekcijos simptomus kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl „Ibustar“ gali vėlini tinkamą infekcijos gydymą, ir dėl to gali padidėti komplikacijų rizika. Jei vartojate šį vaistą ilgą laiką infekcine liga ir simptomai išlieka arba blogėja, nedelsdami pasitarkite su gydytoju. Sergant vėžraupiais reikia vengti vartoti „Ibustar“. LT-IBU-2-2026, MFLOW 2026/10 UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTI“ Jasinio g. 16A, LT-03163 Vilnius, LT@berlin-chemie.com Reklaminiu teksto paruošimo data 2024-08.

„IBUSTAR“ – EFEKTYVIAI MALŠINA SKAUSMĄ IR MAŽINA TEMPERATŪRĄ.

Kremas, kuris gydo



-40%

SUDOCREM® MULTI-EXPERT

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Sudocrem“ Multi-Expert“ gydo odos sudirgimus ir pažeidimus. Apsaugo odą aplink žaizdas kraštus. Švelniai gydo sauskelnių dermatitą. Subalansuotos sudėties kremas gydo odos uždegimus, apsaugo odą nuo išorinių dirgiklių suformuojamas apsauginį barjerą. Sudėtyje esantis natūralus emolientas lanolinas gerai sugeria drėgmę ir minkština odą. Kremas išsaugo odos drėgmę ir nepalieka riebiųjų sluoksnio odos paviršiuje, kaip kiti kosmetiniai kremai. Tepkite plonu sluoksniu. Naudoti atsiradus įvairių odos sudirgimų, įvairių kūno vietų išsūtimų, profilaktiškai nuo prapūgų ar odos apsaugai aplink žaizdų kraštus. Skirtas naudoti tik išorškai. SUD-LT-00102.

„SUDOCREM“ – NE TIK KŪDIKIAMS. KIEKVIENAM.

*Klaidą taikoma geltona etiketė pažymėtomis pakuotėms

GAMINAME VAISTUS PAGAL INDIVIDUALIUS RECEPTUS

- Atneškite gydytojo receptą iki 13 val.
- Atsiimkite pagamintą vaistą kitą darbo dieną.

VAISTINĖ
VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS



KAINOS ATRADIMAS

DREAME F02 PRO
elektrinis dantų šepetėlis +
6 papildomos galvutės

-55%

~~54,65-€~~
24,59 €

DREAME T01
burnos irigatorius +
2 papildomi antgaliai

-55%

~~45,95-€~~
20,68 €



Pasiūlymas galioja 2026 11 01-2026 12 31.
Prekių kiekis ribotas.