

TOP RUGPJŪČIO PASIŪLYMAI



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!



AMBIO
VIRŠKINIMUI, 20 tablečių 5⁹⁹ €
VIRŠKINIMO FERMENTAI, 12 kramtomųjų tablečių 4⁹⁹ €
MAISTO PAPILDAS

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!



AMBIO
PATIRANTIEMS ĮTAMPĄ, 15 kramtomųjų tablečių 6⁹⁹ €
MAISTO PAPILDAS

1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra
pigesnė arba tokia pati
– NEMOKAMAI!



ATEROLIP® COMPLEX CAPS
30 kapsulių 16⁴⁹ €
90 kapsulių 39⁹⁹ €
MAISTO PAPILDAS

„Aterolip“ complex caps® sudėtyje esantis ciberžolių ekstraktas padeda palaikyti normalų cholesterolio kiekį kraujyje, širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą, taip pat normalizuoti kepenų lipidų kiekį.

-50%



BEOTEBAL® PLUS, 30 + 10 tablečių 34⁹⁹ 16⁰⁰ €
MAISTO PAPILDAS

„Beotebel“ PLUS plaukams, odai, nagams* rekomenduojamas kasdieni plaukų, odos ir nagų būklės bei išvaizdos priežiūrai. Ypač tinkamas laikotarpiu, kai plaukus, odą ir nagus veikia aplinkos veiksniai (saulė, vanduo, vėjas, šaltis, sniegas, lietus) ar po intensyvių kirpyklos procedūrų (pvz.: dažymo, tiesinimo, džiovimo) ir kosmetinių nagų procedūrų. Sudėtyje yra originalus koncentruotas „NutriAminoBiotinum“ kompleksas, kuriame yra daug aminorūgščių, mineralų ir vitaminų – įskaitant biotiną ir natūralų silicį, turintį naudingą poveikį plaukams, odai ir nagams. Gaminyje nėra glitimo ir laktozės. Tinka vegetarams ir veganams.

GRĖŽIO FORMULĖ TAVO PLAUKAMS, ODAI IR NAGAMS!

NUO 6⁹⁹ €



LIVOSIL
140 mg, 30 kapsulių 6⁹⁹ €
140 mg, 60 kapsulių 10⁹⁹ €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino. **Indikacijos:** papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livosil“ dozė yra 280–420 mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. „Livosil“ rekomenduojama vartoti ilgiau nei 3 mėnesius. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livosil“ medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemija), bei tuos, kurie vartoja preparatų, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. Teksto peržiūros data 2017-07-12.

NATŪRALI KEPENŲ APSAUGA IR GYDYMAS!

6⁹⁹ €



MAGNE B6
geriamasis tirpalas, 10 ampulių
470 mg/5 mg, 60 dengtųjų tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 tablete yra 470 mg magnio laktato dihidrato bei 5 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6). Vienoje 10 ml ampulėje yra 186 mg magnio laktato dihidrato, 936 mg magnio pidolato, 10 mg piridoksino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** MAGNE B6® skirtas magnio trūkumo sukeltiems simptomams gydyti. Magnio trūkumas gali sukelti tam tikrus simptomus ar jų durnius: nervingumą, irzlumą, nedidelį nerimą, trumpalaikį nuovargį, nedidelius miego sutrikimus; mėšlungį, dilgčiojimo pojūtį. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tabletes reikia nuryti užgeriant stikline vandens. Suaugusiems paros dozė yra 6–8 tabletes, kurias reikia išgerti per 2–3 kartus valgant. Vaikams paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno svorio. Geriamojo tirpalo ampulės turinys ištrinamas pusėje stiklinės vandens. Suaugusiems paros dozė yra 3–4 ampulės, kurias reikia išgerti per 2–3 kartus tarp valgių. Vaikams ir kūdikiams, sergantiems daugiausia kaip 10 kg, paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno svorio arba 1–4 ampulės per 2–3 kartus tarp valgių. **Kontraindikacijos:** preparato vartoti negalima, jeigu: yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei MAGNE B6® medžiagai; sergate tam tikra inkstų liga; vartojama levodopa. **Specialūs įspėjimai:** neshumti ir žindymo laikotarpiu vaistą galima vartoti tik tada, jei nurodo gydytojas. MAGNE B6® dengtosios tabletės skirtos suaugusiems žmonėms ir vyresniems nei 6 metų vaikams. MAGNE B6® geriamojo tirpalo negalima duoti mažiau kaip 10 kg svorio (iki 1 metų) kūdikiams. Jeigu sergate inkstų, širdies ir kraujagyslių liga, prieš pradėdami vartoti MAGNE B6® preparatą, reikia pasitarti su gydytoju. Piktnaudžiaujant vitaminu B6, pakenkiami jutiminiai periferiniai nervai: atsiranda tirpimas ir padėties jutojo pablogėjimas, drebulys galūnėse ir koordinacijos sutrikimai. Nustojus vartoti vaistą, pažeidimai paprastai išnyksta. Reklamos teksto parengimo data 2022-08. 2604_Magne_B6_V01_LT

„MAGNE B6“ PADĖS ĮVEIKTI MAGNIO TRŪKUMĄ!

 -50 % pigiau



-50 %

VERSAN STRONG SHOTS

14 geriamųjų dienos dozių po 25 ml **55⁵⁰ 27⁸⁰ €**

MAISTO PAPILDAS

Vienas buteliukas per dieną – viskas, ko reikia tavo sąnariams, kaulams, raumenims, sausgyslėms ir raiščiams. Moksliškai subalansuota formulė su kolagenu, gliukozaminu, MSM, vitaminais C, D, K2 ir augaliniais ekstraktais padeda išlaikyti stiprų judėjimo aparatą. PROFESIONALI PAGALBA SĄNARIAMS



-50 %

B COMPLEX, 40 kapsulių **45⁶⁰ 7⁸⁵ €**

B TOTAL + MAGNE, 60 kapsulių **42⁵⁰ 6³⁰ €**

MAISTO PAPILDAS

„B complex“ – tai įvairių, gerai subalansuotų B grupės vitaminų derinys tiems, kurie jaučia nervinę įtampą bei nuovargį. Mažinti nuovargį, palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą padeda vitaminai B2, B6, B12. Normalią odos būklę padeda palaikyti vitaminai B2, biotinas ir niacinas, o normalią plaukų būklę – biotinas. Normalią proteinę veiklą padeda palaikyti pantoteno rūgštis. „B total + magne“ sudėtis praturtinta ir magniu, kuris padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją bei normalią raumenų funkciją ir padeda mažinti nuovargį. Pakuotėje yra 2 mėnesių kursas.



-50 %

LIUBERIN SUPERIOR, 35 mg, 30 kapsulių **21⁹⁰ 11⁰⁰ €**

LIUBERIN + LUTEIN, 30 kapsulių **23⁹⁰ 12⁰⁰ €**

MAISTO PAPILDAS

Linija „Liuberin“ skirta padėti išsaugoti normalų regėjimą bei palaikyti akies kraujotaką. „Liuberin superior“ net 18 aktyviųjų medžiagų kompleksas sausoms, pavargusioms, daug į skaitmeninių įrenginių ekranus žiūrinčioms akims. Sudėtis praturtinta ginkmedžių, kuris padeda palaikyti akies kraujotaką. O „Liuberin + LUTEIN 35 mg“ – naujausia formulė akims! Šio preparato sudėtis praturtinta karotenoidais: net 35 mg liuteino ir 3 mg zeaksantino, kurių su amžiumi koncentracija akyse mažėja. Gausi sudėtis išskiria ir melynųjų uogų ekstraktą, kuris padeda palaikyti normalią akių funkciją, vaizdo aiškumą ir kraujotaką. Normalų regėjimą padeda išsaugoti vitaminas A ir cinkas. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

RYŠKIOMS GYVENIMO SPALVOMS!



-50 %

NATASPIN CONTROL PRO, 90 kietųjų kapsulių **43⁹⁰ 22⁰⁰ €**

MAISTO PAPILDAS

Teisingai cholesterolio kontrolei rinkintės 90 dienų kursą – „NatAspin Control Pro“. Tai pažangi, daugiakomponentė formulė, kuri sukurta ilgalaikiai cholesterolio kontrolei, padeda palaikyti širdies ir kraujagyslių sistemos bei kepenų veiklą.

„NATASPIN CONTROL PRO“ – TEISINGAI CHOLESTEROLIO KONTROLEI.

Gerklė

-50 %



HERBITASSIN®

MAISTO PAPILDAS, MEDICINOS PRIEMONĖ, MAISTAS

Herbitassin® įvairių skonų pastilės bei ledinukai su augaliniais ekstraktais ir vitaminu C – gerklės ir imunitetui. Islandinės kerpės padeda palaikyti normalią gerklės ir balso stygų funkciją, vitaminas C – normalią imuninės sistemos veiklą. Herbitassin® Iceland moss HYDRO pastilės su hialuronu drėkina gerklės gleivinę, ramina gerklės skausmo jausmą, mažina sauso kosulio ir užkimo simptomus.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



-50 %

ARTHROSTOP PROENZI

MAISTO PAPILDAS

„Arthrostop Proenzi Collagen Shots“ – unikali dviejų tipų kolageno, vitaminų ir mineralų kombinacija sąnariams. Net 11 000 mg hidrolizuoto ir 20 mg nederatūroto II tipo kolageno viename buteliuke! Naujiena – judusių serbentų skonio.

„Arthrostop Proenzi Intensive“ tabletės – sąnariams su gliukozaminu, chondroitinu, bosvelijų žievės ekstraktu ir II tipo kolagenu. Tik 1 tabletė per dieną!

„Arthrostop Proenzi Rapid“ tabletės – kompleksas su gliukozaminu, chondroitinu, bosvelijų žievės ekstraktu sąnariams.

„Arthrostop Proenzi PLUS“ tabletės – sąnariams su MSM, gliukozaminu ir bosvelijų žievės ekstraktu, kuris padeda palaikyti sąnarių lankstumą bei bendrą sąnarių funkciją, 2603_SB_Proenzi_VOI_LIT

JUDEK LAISVA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

Širdžiai, kraujotakai, raumenims

-50 %

ATLANT ŠIRDIS, milteliai geriamajam tirpalui, 28 pakeliai **26⁹⁰ 13⁵⁰ €**

BIOKALIS, milteliai geriamajam tirpalui, 30 pakelių **40⁶⁰ 5³⁵ €**

BIOKALIS FORTE, milteliai geriamajam tirpalui, 30 pakelių **42⁶⁰ 6³⁵ €**

BIOMAGNESIUM FORTE, 500 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 20 pakelių **44⁷⁰ 7⁴⁰ €**

BIOMAGNIS + BIOKALIS FORTE, milteliai geriamajam tirpalui, 20 pakelių **49⁹⁰ 10⁰⁰ €**

VENOLEGS 750:75, 28 pakeliai **49⁹⁰ 10⁰⁰ €**

MAISTO PAPILDAS

„Biofarmacia“ maisto papildų grupė sukurta širdies ir kraujagyslių sistemai, venų funkcijai bei normaliai raumenų ir nervų sistemos veiklai palaikyti. „ATLANT Širdis“ – išskirtinės sudėties kompleksas širdžiai, kraujagyslėms, kraujotakai ir nervų sistemai. Sudėtyje – didžiausias resveratrolis (260 mg) ir likopeno (15 mg) kiekis tarp Lietuvoje platinamų maisto papildų, papildytas kofermentu Q10, vitaminais, mineralais ir augalų ekstraktais. *Nustatyta pagal UAB „Softdent“ 2024 m. duomenis.

„BioKalis 400mg“, „BioKalis forte 750mg“, „BioMagnesium Forte 500mg“, „BioMagnis+BioKalis Forte 500 mg“ – klasikinė „Biofarmacia“ linija – viena populiariausių magnio ir kalio papildų linijų Lietuvoje (2019–2025 m.), pagal UAB „Softdent“ duomenis. Magnis padeda mažinti nuovargį ir palaikyti normalią nervų sistemos bei raumenų funkciją, o kalis padeda palaikyti normalią kraujospūdį. Sudėtyje – natūralios kilmės mineralai iš Negyvosios jūros. Papildai miltelių forma – geresniam medžiagų įsisavinimui.

„VENOLEGS“ – itin stipri „Biofarmacia“ sukurta dviejų veikliųjų medžiagų – diosmino (750mg) ir hesperidino (75mg) – kombinacija efektyviųjų kojų nuovargį mažinti, kojų venoms stiprinti, hemoroidų ir normaliai venų mikrocirkuliacijai palaikyti.



IKI 5 EURŲ

5€



2⁴⁹ €

PARACETAMOL ACTAVIS

500 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 tablete yra 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos.** Trumpalaikis karščiavimo mažinimas. Lengvo ir vidutinio stiprumo skausmo (pvz., galvos, dantų, sąnarių, raumenų, mėnesinių) mažinimas. **Dovavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems: įprastinė dozė yra 500–1000 mg kas 4–6 val., pagal poreikį. Didžiausia paros dozė yra 3 g, didžiausia vienkartinė – 1000 mg. „Paracetamol Actavis“ saugumas ir veiksmingumas vaikams, sveriantiems iki 50 kg, neiširti. Pacientams, kurie nuolat vartoja alkoholį, intervalas tarp dozių vartojimo turi būti bent 8 val. Jiems negalima viršyti 2 g paros dozės. Jeigu praėjus daugiau kaip 3 paroms nuo gydymo pradžios didelis karščiavimas ar infekcijos požymiai išlieka arba jeigu praėjus daugiau kaip 5 paroms nuo gydymo pradžios skausmas išlieka, pacientą reikia ištirti dėl simptomų sunkulios priežasties. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Ilgalais arba dažnas vartojimas nerekomenduojamas, negalima vartoti kartu kitokių paracetamolio turinčių vaistinių preparatų. Visą paros dozę vartojant vienu metu ar perdozavimo atveju, gali pasireikšti sunki kepenų pažeida. Tokiu atveju sąmonės pacienas nepraranda, tačiau jis turi nedelsiant kreiptis į gydytoją. Pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų nepakankamumas, lengvas arba vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumas (įskaitant Gilbert sindromą), sunkus kepenų nepakankamumas ar ūminis hepatitas, vartojantiems kepenų funkciją veikiančių vaistinių preparatų, taip pat tiems, kuriems yra gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės trūkumas, hemolizinė anemija ar dehidracija, sergantiems astma, piktnaudžiaujantiems alkoholiu arba nuolat blogai besimatinantiems, paracetamolio patariama vartoti atsargiai. Po ilgalaikio (> 3 mėn.) gydymo, kurio metu paracetamolio buvo vartota kas antrą parą arba dažniau, gali pasireikšti arba sustiprėti galvos skausmas. Pacientams, kuriems nustatytas mažas glutatono kiekis, paracetamolio vartojimas gali didinti metabolinės acidozės riziką. Dėl sudėtyje esančios laktazės šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. „Paracetamol Actavis“ sudėtyje yra kviečių krakmolo. Tinka sergantiems celiakija. Šio vaistinio preparato negalima vartoti kveičiams alergiškiems pacientams (ši liga skiriasi nuo celiakijos). **Teksto peržiūros data 2025-01-02. Reklamos teksto parengimo data 2025-04-04. OTC-LF-00094**



NUO 2⁴⁹ €

NUROFEN 200 mg, 12 tablečių 2⁴⁹ €

NUROFEN FORTE 400 mg, 12 tablečių 3⁴⁹ €

NUROFEN FORTE EXPRESS 400 mg, 12 tablečių 3⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

NUROFEN dengetoje tablete yra 200 mg ibuprofeno. **NUROFEN FORTE** ir **NUROFEN FORTE EXPRESS** dengetoje tablete yra 400 mg ibuprofeno. **Terapinės indikacijos.** Trumpalaikis silpo ar vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių, mėnesinių sukelto skausmo mažinimas, karščiavimo mažinimas. **Kontraindikacijos.** Trupalaikis silpo ar vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių, mėnesinių sukelto skausmo mažinimas, karščiavimo mažinimas. **NUROFEN dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams pradinė dozė yra 2 tabletės, užgeriant vandeniu. Po to, jei reikia, gerti po 1-2 tabletes kas 4 valandas. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 6 tabletes (1200 mg). **NUROFEN FORTE** ir **NUROFEN FORTE EXPRESS dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams pradinė dozė yra 1 tabletė, užgeriant vandeniu. Po to, jei reikia, gerti po vieną tabletę kas 8 valandas. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 3 tabletes (2400 mg). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai; jei praėtyje yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijų (asma, rinitas, angioneurozinis pabrinkimas, dilgėlinė); sunkus kepenų, inkstų, širdies nepakankamumas; paskutinis trijų mėnesių laikotarpis; esama ar buvusi pepsinė opa (du ar daugiau atskirų įrodymų išopėjimo ar kraujavimo epizodų); buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; kraujavimas į smegenis, virškinimo trakto arba kitos kraujavimas; jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai.** Reikia atsargiai vartoti pacientams, kuriems yra sisteminė raudonoji vilkligė; anksčiau buvo padidėjęs kraujospūdis ir (arba) širdies nepakankamumas; jei yra nesunkus inkstų pakenkimas ar inkstų funkcijos pablogėjimas; jei yra nesunkus kepenų funkcijos sutrikimas; pacientams, kurie sergo opiniu kolitu, Krono liga; pacientams, kurie vartoja kraują skystinančių vaistinių preparatų bei vaistų, galinčių padidinti išopėjimo ar kraujavimo pavojų. Gydant ibuprofenu buvo pranešta apie sunkias odos reakcijas, įskaitant ekfoliacinį dermatitą, daugialopę eritemą, Stivenso-Džonsono sindromą, toksiinę epidermio nekrolizę, vaisto sukelta reakcija su eozinofilija ir sisteminių simptomais (VRESS), ūminę generalizuotą egzanteminę pustuliozę (UGEPE), kuri gali būti pavojinga gyvybei arba mirtina. Jei atsiranda šių reakcijų požymių ir simptomų, ibuprofeno vartojimą reikia nedelsiant nutraukti. Šie vaistai gali būti susiję su nedideliu širdies priepuoliu („miokardo infarktu“) ar insulto pavojaus padidėjimu. Šie vaistiniai preparatai gali maskuoti infekcijos simptomus, dėl to gali būti vėluojama pradėti tinkamą gydymą, o tai gali pabloginti infekcijos gydymo rezultatus. Šių vaistų negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Kiekvienoje tablete yra natrio, būtina atsižvelgti, jei kontroliuojamas natrio kiekis maiste. Reklamos tekstas parengtas 2026-03-18.

Paviršinių odos
pažeidimų gydymas

3⁹⁹ €



RECREOL

50 mg/g, kremas, 50 g
50 mg/g, tepalas, 50 g

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo yra 50 mg deksantenolio. **Terapinės indikacijos:** paviršinių odos pažeidimų (tokių kaip maži nudegimai ir žaizdos, odos nubrozdinimai ir įtrūkimai), odos uždegimo (atsirandantio dėl spindulinio gydymo, fototerapijos ar ultravioletinių spindulių) pagalbiniis gydymas. **Dovavimas ir vartojimo būdas:** vartoti išorinškai. Įprastinis dozavimas yra viena ar kelis kartus per parą plonu sluoksniu tepi pažeista odą. Gydymo trukmė priklauso nuo lėšos kilmės ir eigos. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** reikia vengti atsitiktinio deksantenolio kontakto su akimis. **Vietinis rinkodaros teisės turėtojas:** UAB „Grindeks Kaikės Lietuva“, Kaivarų g. 300, LT-08318 Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2026-03-18.

Nuo alergijos

4⁴⁹ €



CETIRIZIN ACTAVIS

10 mg, 10 dengtyjų tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje plevėle dengetoje tablete yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** suaugusiems žmonėms ir 6 m. amžiaus bei vyresniems vaikams cetirizinas vartojamas sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito simptomams (nosies ir akių) palengvinti bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės simptomams palengvinti. **Dovavimas ir vartojimo metodas:** 6–12 m. vaikams: 5 mg (pusė tabletes) 2 kartus per parą; suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams: 10 mg (1 tabletė) 1 kartą per parą. Esant inkstų funkcijos sutrikimui, dozė reikia mažinti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, hidroksiziniui arba bet kuriam piperazino dariniui. Pacientams, sergantiems sunkia lėtine inkstų liga, kai reikalingos dializės. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju ar vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Cetirizin Actavis“, jeigu sergate inkstų nepakankamumu (jei būtina, Jums reikės vartoti mažesnę vaisto dozę. Reikalinga dozė nustatys gydytojas); jeigu turite šlapimo sistemos problemų (tokių kaip nugaros smegenų problemų arba prostatos ar šlapimo pūslės problemų); jeigu sergate epilepsija ar Jums gali būti traukuliai. Kartu su „Cetirizin Actavis“ vartoti alkoholio nerekomenduojama, kaip ir su kitais antihistaminiais vaistais. Dėl sudėtyje esančios laktazės šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-01. OTC-LF-00089

4⁹⁹ €



LORATIN EXPRESS 10 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 tablete yra 10 mg loratadino. **Terapinės indikacijos:** simptominiis alerginės slogos ir lėtinės idiopatinės dilgėlinės gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems negu 2 m. vaikams gerti po 1 tabletę per dieną. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas loratadinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nevartoti jaunesniems nei 2 m. arba sveriantiems mažiau kaip 30 kg vaikams. **Specialūs įspėjimai:** vaista atsargiai reikia vartoti pacientams, kuriems yra sunkus kepenų veiklos sutrikimas. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 211, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. 852601069675. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

Moderni kapsulė
nuo rėmens

3⁹⁹ €



ESCADRA

20 mg, 7 skrandyje neiros kietosios kapsulės

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: ezomeprazolas, 20 mg. **Terapinės indikacijos:** vaistas skirtas suaugusiųjų gastroezofaginio refliksų simptomų (pvz., rėmens ir skrandžio rūgšties regurgitacijos) trumpalaikiams gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 kapsulė) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, kapsules gali prireikti vartoti 2–3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaites. Simptomams visiška išnykus, gydymą reikia nutraukti. Jeigu per 2 savaitis nepatraukiami gydymą simptomai neišnyksta, pacienas turi kreiptis į gydytoją. Nėra tinkamų „Escadra“ vartojimo rekomendacijų jaunesniui kaip 18 metų vaikų populiacijai indikacija „Trumpalaikis gastroezofaginio refliksų simptomų (pvz., rėmens ir rūgšties regurgitacijos) gydymas“. Kapsulė negalima kramtyti ar smulkinti. Kapsulės galima atidaryti ir granules išmėšyti pusėje stiklinės negazuoto vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pakeistiems benzimidazolams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Ezomeprazolo negalima vartoti kartu su neflinaviru. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pacienas reikia informuoti, kad kreiptis į gydytoją, jeigu jie patiria didelį kūno svorio mažėjimą dėl nežinomų priežasčių, pasikartojantį vėmimą, disfagiją, vėmimą krauju ar melena, arba jeigu įtariama ar diagnozuojama skrandžio opa, būtina ištirti, ar nėra piktvybės ligos, nes gydymas ezomeprazolu gali palengvinti jos simptomus ir uždelsti diagnozės nustatymą; jeigu jie anksčiau sirgo skrandžio opa arba patyrė virškinimo trakto operaciją; jeigu jiems 4 savaites arba ilgiau buvo taikomas nepatraukiamas simptominis nevirškinimo arba rėmens gydymas; jeigu jie serga gelta arba sunkia kepenų liga; jeigu jie yra vyresni kaip 55 metų ir turi naują arba neseniai patiktus simptomus. Pacientai, kurie pasikartojančių nevirškinimo ar rėmens simptomai ilgalaikiai, turi reguliariai intervalais lankytis pas savo gydytoją. Kaip ilgalaikio profilaktinio vaistinio preparato „Escadra“ pacienai neturi vartoti. Pacientai, kuriems reikia atlikti endoskopiją ar ureazės kvėpavimo testą, turi pasitarti su savo gydytoju, prieš pradėdami vartoti šią vaistinį preparatą. Ezomeprazolo skirti kartu su atazanaviru nerekomenduojami. Ezomeprazolo derinimas su klopidogralu nepatvirtintas. Kitų PPI arba H2 receptorių blokatorių kartu su ezomeprazolu pacientams vartoti negalima. „Escadra“ sudėtyje yra sacharozės. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems yra fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2025.04.07.

NUO **2⁹⁹** €



HJERTEMAGNYL

150 mg, 30 plėvele dengtų tablečių **2⁹⁹** €
 150 mg, 90 plėvele dengtų tablečių **4⁹⁹** €
 75 mg, 100 plėvele dengtų tablečių **3⁹⁹** €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga: 1 tablete yra 75 mg arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties. **Indikacijos:** trombozės profilaktika, sergant širdine liga, po miokardo infarkto, širdinio smegenų insulto ar praeinančiojo smegenų išemijos (kraujotakos sutrikimo) priepuolio. Vaistas slopina trombocitų (kraujo plokštelių) agregaciją (sukibimą), todėl jo vartojama krešuliui, susidariusių iš sukibusių kraujo plokštelių, atsiradimo rizikai mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną, užsigeriant stikline vandens; įprastinė dozė ilgalaikeiam vartojimui yra 75 – 150 mg vieną kartą per parą. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, padidėjęs jautrumas kitoms salicilatams; jei neseniai kraujavo į virškinamąjį traktą; yra polinkis į kraujavimą, ūminė pepsinė opa, sunkūs inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, šlapime padaugėję oksalatų, jeigu yra trys paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas; vaikams ir paaugliams, jaunesniams kaip 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai vartoti, jei pacientas serga bronchų astma, šienlige, nosies polipais ar kita lėtine kvėpavimo takų liga, gydytami atsparia hipertenzija, podagra, esant gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stokai, sutrikusiai kepenų ir (ar) inkstų arba virškinimo trakto funkcijai, likus 10 parų iki chirurginės operacijos, senyvo amžiaus pacientams nepatartina ilgai vartoti dėl galimos kraujavimo iš virškinamojo trakto rizikos, esant vaikų ir paauglių virusinėms infekcijoms. Teksto parengimo data: 2022-04-07. LT-HJERT-2200001

NUO **5⁹⁹** €



STREPSILS INTENSIVE

8,75 mg, 16 kietųjų pastilių **5⁹⁹** €
 8,75 mg, 24 kietosios pastilės **10⁹⁹** €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg flurbiprofeno. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikis simptominis gerklės skausmo gydymas suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. amžiaus vaikams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: kas 3–6 val. (kai reikia) lėtai sučiulpti (leisti išsistipri burnoje, čiulpiant reikia jaudinti burnoje, kad būtų išvengta lokalus dirginimo) po 1 kietąją pastilę. Per 24 val. galima suvartoti ne daugiau kaip 5 kietąsias pastiles. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; anksčiau buvusios acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) sukeltos padidėjusio jautrumo reakcijos (pvz., astma, bronchų spazmas, rinitas, angioneurozinė edema ar dilgėlinė); yra ar anksčiau buvo pepsinė opa ar kraujavimas iš opos (nustatyti du ar daugiau nesusijusių opaligės epizodų) bei žarnyno opos; anksčiau buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo perforacija, sunkūs kolitas, kraujavimas ar kraujodaros sutrikimai, susiję su ankstesniu NVNU vartojimu; paskutinis nėštumo trimestras; sunkūs širdies, inkstų, kepenų nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai:** reikia atsargiai vartoti pacientams, kurie serga sisteme raudonoja vilkligė ir mėsra jungiamojo audinio liga, serga tonzilitu (tonzilių uždegimu) ar mano, kad serga bakterijų sukelta gerklės infekcija (liga, turi širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų, sirgo virškinimo trakto ligomis (pvz., opiniu kolitu, Krono liga), jei pasireiškia pirmosios odos reakcijos (išbėrimas, lupimasis, pūslių atsiradimas) arba kitokie alerginės reakcijos požymiai; nešiosiomis pirmuosius 6 mėnesius ar žindymams bei senyviems pacientams. Tokie vaistai gali būti susiję su nedideliu širdies priepuolio (miokardo infarkto) ar insulto rizikos padidėjimu. Vaisto sudėtyje yra gliukozės ir sacharozės (cukraus), į tai turėtų būti atsižvelgta sergant cukriniu diabetu. Jeigu pacientas yra alergiškas (alergišką) kvėčimas (ši liga skiriasi nuo celiakijos), šio vaisto vartoti negalima. Sudėtyje esantys citralai, citonolėlis, d-limonenas, farnesolis, geraniolis ir linalolis gali sukelti alerginių reakcijų, siera dioksidas gali sukelti sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų ir bronchų spazmą, butilhidroksianizolas gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginę akis ir gleivinę. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2026-04-16.

NUO SLOGOS

NUO **4⁹⁹** €



XYMELIN

1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml **4⁹⁹** €
 MENTHOL, 1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml **5⁹⁹** €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Sudėtis: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidroklorido. **Indikacijos:** susirgus peršalimo ligomis, paburkus nosies gleivinei arba pasireiškus nosies ančių uždegimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 10 metų paaugliams (XYMELIN MENTHOL atveju – vyresniems kaip 12 metų paaugliams) 1 įpuskijimas į kiekvieną nosies landą 2–3 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, uždarą kampo glaukoma, sausasis nosies gleivinės uždegimas, atrofinis rinitas (XYMELIN MENTHOL atveju), jei hipofizės ar smegenų operacija atlikta per nosį arba burną; XYMELIN MENTHOL: jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai:** Vartoti atsargiai, jei yra antinksčių navikas (feochromocitoma), sustiprėjusi skydliaukės veikla, sergate cukriniu diabetu ar sutrūkęs šlapinimasis dėl padidėjusios prostatos. Sergant sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis ar ligomis, kurių metu susiaurėja kraujagyslės, vartoti tik su gydytojo leidimu. Ilgiau kaip 7 paras šio vaisto vartoti draudžiama. Dažnai ir ilgai vartojant vaisto gali atsinaujinti nosies gleivinės paburkimas, sustiprėti jo slopinimas ir atsirasti nosies užgulimas. Gali sukelti miego sutrikimų, galvos svaigimą, tremorą, širdies ritmo sutrikimą, aukštą kraujospūdį. XYMELIN nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 10 metų vaikams. XYMELIN MENTHOL: Pastarbi su gydytoju arba vaistininku, jei vartojate arba per paskutines dvi savaites vartojote vaistų nuo depresijos, vadinamų monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI). Reklamos teksto parengimo data: 28.03.2024 LT-XYME-2200004

5⁹⁹ €



IBUMETIN EXPRESS 400 mg, 20 minkštųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga: kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno. **Terapinės indikacijos:** suaugusiems ir paaugliams, sergantiems ne mažiau kaip 40 kg (12 m. ir vyresniems); trumpalaikis lengvo ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip galvos, dantų, raumenų, sąnarių ar sukkelto menstruacijų, malšinimas. Karščiavimo, susijusio su peršalimu, malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** įprasta vienkartinė dozė yra 1 kapsulė. Didžiausia paros dozė yra 1200 mg ibuprofeno (3 kapsulės). Kapsulę reikia užsigerinti stikline vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Anksčiau buvo pasireiškusi acetilsalicilo rūgšties arba kitokių nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) sukelta astma, dusulys, sloga, patinimas ar (niežintis) išbėrimas. Aktyvi arba buvusi pasikartojanti skrandžio opa arba kraujavimas iš skrandžio, su NVNU susijęs kraujavimas iš virškinimo trakto arba virškinimo trakto perforacija. Jei yra sunkūs kepenų, širdies, inkstų funkcijos nepakankamumas, kraujavimas į smegenis arba kitas aktyvus kraujavimas, pasireiškia kraujo krešėjimo sutrikimų arba kitų kraujavimo sutrikimų, sunki skysčių stoka (sukelta vėmimo, viduriavimo arba nepakankamo skysčių vartojimo), paskutiniai trys nėštumo mėnesiai. Netinka vaikams ir paaugliams iki 12 m. **Specialūs įspėjimai:** specialų atsargumo priemonių reikia, jei padidėjęs kraujospūdis, sergate širdies, inkstų ir kepenų liga, turite paveldimą kraujodaros sutrikimą (ūminę kintančią porfiriją), turite arba anksčiau esate turėję žarnyno problemų arba ligų (opinis kolitas, Krono liga), sergate astma, sisteminė raudonoja vilkligė arba mėsra jungiamojo audinio liga, jei jums neseniai buvo atlikta didelės apimties chirurginė operacija, sergate šienlige, turite nosies polipų arba lėtinį obstrukcinį kvėpavimo sutrikimą, ilgai vartojant skausmą malšinamas vaistus nuo galvos skausmo, jis gali pasunkėti. Tai pajutę arba įtardami, turėtumėte nustoti vartoti šį vaistą ir kreiptis į gydytoją. Dažnas (kelių rūšių) skausmą malšinamųjų vaistų vartojimas gali sukelti ilgalaikį sunkių inkstų pažeidimą, ilgai vartojant šio vaisto, būtina reguliariai tirti kepenų ir inkstų veiklą bei atlikti bendrą kraujo tyrimą. Reikia vengti „Ibumetin Express“ vartoti sergant vėžaraupiais ar kartu su kitais NVNU. Vaistai nuo uždegimo ir (arba) skausmo, tokie kaip ibuprofenas, gali būti susiję su nedideliu širdies priepuolio ar insulto rizikos padidėjimu, ypač vartojant dideles dozes. Neviršykite rekomenduojamos dozės ar gydymo trukmės. Pastartikite su gydytoju arba vaistininku, jeigu jums pasireiškia širdies problemų, įskaitant širdies nepakankamumą, krūtinės angina, arba jeigu jums buvo širdies priepuolis, atlikta širdies kraujagyslių jungčių suformavimo operacija, diagnozuota periferinių arterijų liga arba buvo išties bel kokios rūšies insultas; jūsų kraujospūdis yra padidėjęs, sergate cukriniu diabetu, nustatytas didelis cholesterolio kiekis, buvo širdies liga sirgusių giminių arba giminių, kuriuos ištiko insultas, arba jeigu rūkote. Jeigu vartojate šio vaisto sirgami infekcine liga ir jūsų infekcijos simptomai nepaiecia arba pasunkėja, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Buvo pranešta apie alergines reakcijas į šį vaistą požymius, įskaitant kvėpavimo sutrikimus, vėdo ir kaklo sritys patinimą, krūtinės skausmą. Gydant ibuprofenu buvo pranešta apie sunkias odos reakcijas, įskaitant ekzfoliacinį dermatitą, daugiaformę eritemą, Stevenso-Džonsono sindromą, toksiinę epidermio nekrolizę, vaisto sukeltą reakciją su eozinofilija ir sisteminiais simptomais, ūminę generalizuotą egzantemą pustuliozę. Jei pastebėte bet kurį sunkių odos reakcijų ar alergijos simptomų, nutraukite „Ibumetin Express“ vartojimą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Vaisto negalima vartoti, jei nustatytas paveldimas sutrikimas – visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pirmuosius 6 nėštumo mėnesius vartoti negalima, nebent tai neabejotinai būtina ir taip pataria gydytojas. Teksto parengimo data 2025-06-03.

NUO **1⁹⁹** €



IBUMETIN

200 mg, 10 plėvele dengtų tablečių **1⁹⁹** €
 400 mg, 10 plėvele dengtų tablečių **2⁹⁹** €
 400 mg, 20 plėvele dengtų tablečių **3⁹⁹** €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: 1 tablete yra 200 mg arba 400 mg ibuprofeno. **Indikacijos:** trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip galvos, dantų, raumenų, sąnarių ar sukkelto menstruacijų, malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams įprasta vienkartinė dozė yra 1–2 tabletės (s) IBUMETIN 200 mg arba 1 tabletė IBUMETIN 400 mg. Didžiausia paros dozė yra 1200 mg. Tablete reikia užsigerinti stikline vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, acetilsalicilo rūgšties arba kitoms nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU). Ligos anksčiau sirgo acetilsalicilo rūgšties arba kitokių NVNU sukelta astma, angioneurozinė edema, dilgėlinė, rinitas ar kitokia padidėjusio jautrumo reakcija. Aktyvi arba buvusi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, opinis kolitas, kraujavimas iš virškinimo trakto ar kitoks kraujavimas, sunkūs kepenų, širdies, inkstų funkcijos nepakankamumas, hemoraginė diatezė, paskutinių 3 nėštumo mėnesių ar žindymo laikotarpis. Vaikams ir paaugliams iki 12 m. vartoti negalima. **Specialūs įspėjimai:** specialų atsargumo priemonių reikia, jei inkstų, kepenų arba širdies funkcija yra sutrikusi, yra buvę virškinimo trakto pažeidimų, sutrūkęs kraujo krešėjimas arba vartojami antikoagulantai, jei vartojama kita NVNU ar vaistinių preparatų, galinčių padidinti skrandžio opos susidarymo arba kraujavimo pavojų, diuretikų ar nefrotoksinių poveikį turinčių vaistinių preparatų, sergate cukriniu diabetu, raudonoja vilkligė ar kitomis kolagenozėmis, Krono liga, opiniu kolitu, hipertenzija, periferinių arterijų liga, galvos smegenų kraujagyslių liga, astma, šienlige, yra nosies polipų ar lėtinį infekcinį kvėpavimo takų ligų, senyviems žmonėms. Pradėjęs kraujavimą, atsiradus opų ar odos reakcijų, vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir kuo skubiai kreiptis į gydytoją. Negalima vartoti, jei nustatytas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pirmuosius 6 nėštumo mėnesius vartoti negalima, nebent tai neabejotinai būtina ir taip pataria gydytojas. Teksto parengimo data: 2023-03-01.

NUO ALERGIJOS

5⁹⁹ €



TAVEGYL, 1 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje tablete yra 1 mg klemastino fumarato, kuris atitinka 1 mg klemastino. **Indikacijos:** „Tavegyl“ lengvina alerginę slogą (šienligę, ašarojimą, čiaudulį, nosies varvėjimą); alerginę odos reakciją (paraudimą, spuogelius, niežėjimą, patinimą); vabzdžių įgėlimo ir įkandimo sukeltą reakciją. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: 1–2 tabletes 1–2 kartus per dieną. 6–12 m. vaikams: gerti prieš pusryčius ir vakare prieš miegą po 0,5 arba 1 tablete. 3–6 m. vaikams: gerti prieš pusryčius ir vakare prieš miegą po 0,5 tabletes. Tabletes gerti prieš valgį užsigeriant vandeniu. **Kontraindikacijos:** alergija klemastinui, kitokiems antihistamininiams vaistams ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Porfirija. Jaunesniems nei 3 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** atsargiai turi vartoti pacientai, sergantys uždarą kampo glaukoma; stenoze sukeliančia epiglottito opa; dvylikapirštės žarnos obstrukcija; prostatos hipertrofija, dėl kurios susiaukia šlapimas, bei šlapimo pūslės kaklelio obstrukcija. Reikia atsargiai skirti epilepsijai sergantiems arba praėjus traukulius patyrusiems pacientams. Sudėtyje yra laktazės. Reklamos teksto parengimo data 2024-07-2603_SB_Tavegyl_V01_LT

PATIKIMA PAGALBA NUO ALERGIJOS VISAI ŠEIMAI!

NUO RĖMENS

2⁹⁹ €



OMEPRAZOLE INTELI

20 mg, 14 skrandyje neiurių kietųjų kapsulių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Omeprazole Inteli“ sudėtyje yra aktyvios medžiagos omeprazolo. „Omeprazole Inteli“ mažina rūgšties kiekį Jūsų skrandyje. Vaistas vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refluksinio simptomų (rėmens ir rūgšties atpylimo) gydymui. „Omeprazole Inteli“ vartoti negalima, jeigu Jūs esate alergiškas omeprazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (nurodyta informaciniame lapelyje); jeigu Jūs esate alergiškas kitiems vaistams, priklausantiems protonų siurblio inhibitorių grupei (pvz., pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui); jeigu Jūs vartojate vaisto, kurio sudėtyje yra neflinaviro (vartojamo nuo ŽIV infekcijos). Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Omeprazole Inteli“. Ypač jei vartojate informaciniame lapelyje išvardytų vaistų. Neštumas ir žindymo laikotarpis. Prieš vartodama „Omeprazole Inteli“, pasakykite savo gydytojui, jog esate nėščia ar ketinate pastoti. Tokiu atveju gydytojas nuspręs, ar šiuo laiku Jums galima vartoti „Omeprazole Inteli“. Kaip vartoti „Omeprazole Inteli“. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Rekomenduojama dozė yra viena 20 mg kapsulė vieną kartą per parą kol išnyksta simptomai, bet ne ilgiau kaip 14 parų. Kad sumažėtų simptomai, gali tekti kapsulių vartoti 2–3 paros iš eilės. Jei po 14 parų laikotarpio simptomai neišnyksta, kreipkitės į savo gydytoją. Galimas šalutinis poveikis. Šis vaistas, kaip ir kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Nedelsdami nutraukite „Omeprazole Inteli“ vartojimą ir kreipkitės į gydytoją, jeigu pastebite kurį nors iš šio reiškinio, bet sunkaus šalutinio poveikio atveju: staiga prasidėjo švokštimas, lūpų, liežuvių, gerklų ar kūno tinimas, išbėrimas, alpimas ar sutrikio rijimas (sunki alerginė reakcija); paraudo, tapo pūslėta ir lupasi oda. Taip pat gali atsirasti lūpų, akių, burnos ertmės, nosies, lytinių organų pūslėtimas ar kraujavimas (tai gali būti Stevens-Johnson sindromas arba toksinė epidermolizė); pagelto oda, patamsejo šlapimas ir atsirado nuovargis (Šie simptomai gali rodyti sutrikusią kepenų funkciją). Ši informacija paskutinį kartą peržiūrėta 2024.04.29.

AKIŲ LAŠAI

-40 %



SYSTANE

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Systane“ Balance“ drėkinamieji akių lašai yra skirti laikinai palengvinti deginimo ir dirginimo pojūčius asmenims, kuriems pasireiškia akių sausumo simptomai. „Systane“ Balance“ drėkinamieji akių lašai padeda išlaikyti riebalinį ašarų plėvelės sluoksnį ir ašarų plėvelės stabilumą. „Systane“ Ultra MDPP“ drėkinamieji akių lašai BE KONSERVANTŲ apsaugo akies paviršių, palengvina akių sausumo simptomus ir pagerina matomo vaizdo ryškumą, padeda palaikyti kontaktinių lęšių drėgnumą ir juos drėkina. GREITAS SAUSŲ AKIŲ SIMPTOMŲ LENGVINIMAS. „Systane“ Hydration MDPP“ drėkinamieji akių lašai BE KONSERVANTŲ, su hialurono rūgštimi. „Systane“ Hydration MDPP“ drėkinamieji akių lašai apsaugo akių paviršių, pagerina matomo vaizdo ryškumą ir ašarų sulaikymą akies paviršiuje, drėkina, sutepa ir apsaugo kontaktinius lęšius. ILGALAIKIS SAUSŲ AKIŲ SIMPTOMŲ LENGVINIMAS. „Systane“ Gel Drops“ drėkinamieji geliniai akių lašai sutepa akies paviršių, kad apsaugotų nuo pažeidimų, kuriuos sukelia sausų akių simptomai. INTENSIVUS akių sausumo simptomų lengvinimas.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

NUO 8⁹⁹ €



PANANGIN

158 mg/140 mg, 60 plėvele dengtų tablečių, 8⁹⁹ €
316 mg/280 mg, 30 plėvele dengtų tablečių, 10⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 158 mg kalio aspartato ir 140 mg magnio aspartato arba 316 mg kalio aspartato ir 280 mg magnio aspartato. Terapinės indikacijos: „Panangin“ tabletes vartojamas magnio ir kalio trūkumo profilaktikai tuo atveju, jei šių jonų pasisavinama per mažai arba pamelyg daug netenkama, pvz., ilgai vartojant diuretikų. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Panangin 158 mg/140 mg“: paprastai skiriama po 2–3 tabletes 3 kartus per parą. „Panangin 316 mg/280 mg“: paprastai skiriama po 1 tablete 3 kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, ūminis ir lėtinis inkstų nepakankamumas, Addisono liga, hiperkalemija, kali sulaikančių diuretikų vartojimas, atrioventrikulinė III laipsnio blokada, kardiogeninis šokas (kraujospūdis mažesnis negu 90 mm Hg). Specialūs įspėjimai: pacientams, sergantiems ligomis, dėl kurių kraujyje padidėja kalio kiekis, vaistinio preparato būtina vartoti atsargiai ir reguliariai kontroliuoti kalio kiekį kraujyje. Rinkodaros teisės turėtojas: „Gedeon Richter Plc.“, Vengrija. Atstovas Lietuvoje: „Gedeon Richter“ atstovybė, Maironio g. 23-3, LT-01125 Vilnius, tel. +370 5 268 5392. Tekstą peržiūrėta 2023-05-03 („Panangin 158 mg/140 mg“); 2022-07-07 („Panangin 316 mg/280 mg“). Reklaminiio teksto paruošimo data 2026-03-02.

IKI -25 %



TENA

SAUSKELNĖS, IKLOTAI, PAKLOTAI IR KOSMETIKA

Patikimos, odos sveikata užtikrinančios TENA sauskelnės, įklotai ir paklotai greitai sugeria šlapimą, apsaugo nuo pratekėjimo ir nemalonaus kvapo. Papildomai naudojamos TENA odos priežiūros priemonės padeda pasirūpinti odos švara, higiena ir pragulų profilaktika.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

SKAUSMUI MALŠINTI

NUO 4⁹⁹ €



TONZIRIN

8,75 mg, 12 kietųjų pastilių 4⁹⁹ €
8,75 mg, 24 kietosios pastilės 9⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

TONZIRIN 8,75 mg kietosiose pastilėse yra flurbiprofeno. Flurbiprofenas priklauso vaistų, kurie vadinami nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU), grupei. Šie vaistai pasižymi skausmą ir karščiavimą mažinančiu bei priešuždegiminiu poveikiu. TONZIRIN kietosios pastilės yra vartojamos skaudančios gerklės simptomams palengvinti, tokiems kaip gerklės skausmas, skausmingumas ir patinimas, sunkumas nuryti, suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams. Jei po 3 dienų ligos požymiai išlieka ar pasunkėja, kreipkitės į gydytoją. Prieš pradėdami vartoti TONZIRIN, turite atidžiai perskaityti informacinį lapelį. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti TONZIRIN. TONZIRIN vartoti draudžiama: - jeigu yra alergija; jeigu kada nors buvo pasireikusi astma, netikėtas švokštimas ar dusulys, sloga, vėdo patinimas ar niežintis bėrimas (dilgėlinė) pavartojus aspirino ar kitų NVNU; - paskutiniuosius 3 mėnesius; - jeigu Jums yra ar kada nors buvo pasireiškę sunkių širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų. Vairavimas ir mechanizmų valdymas. Tyrimų poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus nebuvo atlika. Tačiau suaugusių ir regos sutrikimų, Jau galimi šalutiniai poveikiai pavartojus nesteroidinių vaistų nuo uždegimo. Jeigu tokių pasireiškių, nevaurokite ir nevaldykite mechanizmų. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: viena kietąją pastilę įdėkite į burną ir lėtai čiulpkite. Čiulpiamo metu nuolat judinkite kietąją pastilę burnos ertmėje. Pastilių gydymas poveikis turėtų pasireikšti po 30 minučių. Jeigu reikia, vartokite po vieną pastilę kas 3–6 valandas. - Vartoti daugiau kaip 5 kietąsias pastiles per 24 valandas negalima. Jaunesniems kaip 12 metų vaikams vartoti negalima. Nutraukite šio vaisto vartojimą ir nedelsiant susisiekiite su gydytoju, jeigu Jums pasireiškia: alerginės reakcijos, vėdo, liežuvių ar gerklės patinimas, širdies ritmo padidėjimas ir kraujospūdžio sumažėjimas, sunkios odos reakcijos. Tekstą paskutinį kartą peržiūrėtas 2025-08-08

2⁹⁹ €



MIALDEX 25 mg, 10 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

„Mialdex“ yra vaistas skausmui malšinti, priklausantis nesteroidinių vaistų nuo uždegimo grupei (NVNU). „Mialdex“ veiklioji medžiaga yra deksketoprofenas (deksketoprofeno trometamolio pavidalu). „Mialdex“ vartojamas lengvo ir vidutinio stiprumo raumenų skausmui, skausmingų mėnesinių, dantų skausmui malšinti. Vartojimas: visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Įprastinė vaisto dozė yra pusė tabletes (12,5 mg) kas 4–6 valandas arba 1 tablete (25 mg) kas 8 valandas, bet ne daugiau kaip 3 tabletes per parą (75 mg). Kontraindikacijos: jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) deksketoprofeno trometamolui arba bet kuriai pagalbinei „Mialdex“ medžiagai. Įspėjimai: jeigu sergate arba sirgote inkstų, kepenų ar širdies ligomis, širdies nepakankamumu, jeigu sergate kraujodaros sistemos ligomis, jeigu sergate sisteminėmis raudonąja vilkige ar mišriomis jungiamojo audinio ligomis, jeigu sergate arba sirgote virškinimo trakto ligomis pasikonsultuokite su gydytoju. Galimas šalutinis poveikis: Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Reklamos teksto parengimo data: 2025.09.17

DRĖKINAMIEJI AKIŲ LAŠAI

-30 %



STARAZOLIN

MEDICINOS PRIEMONĖS

Drėkinamojo, raminamojo ir apsauginio poveikio akių lašai.

„Starazolin sausumas ir sudirgusios akys“ (be konservantų) – akių lašai, skirti padėti sumažinti simptomus, esant lengvam ar vidutinio sunkumo sausų akių sindromui ir (arba) sudirgintam akių paviršiui. Jie greitai palengvina nemalonius pojūčius, tokius kaip sausumas, smėlio pojūtis, niežėjimas, ašarojimas ar akių nuovargis, kuriuos sukelia darbas kompiuteriu, vėjas, saulė ar kontaktinių lęšių nešiojimas. „Starazolin HydroBalance“ (be konservantų) – intensyviai drėkinantys akių lašai, skirti vartoti esant sunkiam sausų akių sindromui, kai jaučiamas stiprus sausumas, aštrus dirginimas ar diskomfortas po chirurginių intervencijų, ilgai dirbant kompiuteriu ar esant sausam orui. „Starazolin Lipid Multi Balance“ (be konservantų) – drėkinamieji akių lašai, ypač tinkami drėkinantys akių simptomams palengvinti. Jie atkuria ir stabilizuoja lipidinį ir kitus ašarų plėvelės sluoksnius, optimaliai drėkina akies paviršių. Tinka tiems, kai yra ryšius akių traškanojimas, vokų sulipimas. „Starazolin BlueLight Protect“ (be konservantų) – akių lašai, drėkinantys ir saugantys akis nuo UV spindulių ir mėlynosios ekrano šviesos poveikio. Tinka daug laiko praleidžiant prie ekrano arba lauke. „Starazolin sausumas ir sudirgusios akys“, „Starazolin Lipid Multi Balance“, „Starazolin HydroBalance PHH“ ir „Starazolin BlueLight Protect“ gali vartoti žmonės, naudojančius visų tipų kontaktinius lęšius. Prieš vartojant „Starazolin HydroBalance PHH“ reikia išimti kontaktinius lęšius. Įprasta dozė – 1–2 lašai 3 kartus per parą į kiekvieną akies junginę maišelį.

*Akių lašai geltona etikete pažymėtos priemonės

NUO SLOGOS

4⁹⁹ €

GALATHENAL

1 mg/50 mg/ml, nosies purškalas, 10 ml

NERCEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido ir 50 mg deksapantenolio. **Terapinės indikacijos:** „Galathenal“ skirtas suaugusiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) ir kaip pagalbinė priemonė odos bei gleivinės pažeidimams gydyti, nealerginės kilmės išsiskyrimo iš nosies (vazomotorinio rinito) mažinti ir kvėpavimui per nosį palengvinti esant nosies užgulimui po nosies operacijos; nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu ir ūminiu prienosiniu ančių uždegimu (rinosinustu). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams – 1 purškalo tirpalo dozė į kiekvieną šnervę pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Dozavimas priklauso nuo individualaus paciento jautrumo ir klinikinio atsako. „Galathenal“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 paras, nebent gydytojas nurodė kitaip. Dėl vaiku gydymo trukmės reikia pasikonsultuoti su gydytoju. **Kontraindikacijos:** šio vaistinio preparato vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliosioms ar pagalbinėms medžiagoms; jeigu yra sausasis nosies gleivinės uždegimas (rhinitis sicca); po chirurginio posmegeninės liaukos pašalinimo per nosį (transfenoidinės hipofizektomijos) arba po kitų chirurginių intervencijų, pažeidžiančių smegenų dangalą; kūdikiams ir jaunesniems kaip 6 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Galathenal“, jeigu esate gydymas monoamino oksidazės (MAO) inhibitoriais; jei yra padidėjęs akispūdis; jeigu sergate sunkia širdies ar kraujagyslių sistemos liga; jeigu yra antinksčių navikas; sergate cukriniu diabetu ar yra suaktyvėjusi skydlaukės veikla; jei yra padidėjęs prostata (prostato hiperplazija). Reklamos teksto parengimo data 2026-02.

ATKĖMŠA NOSĮ IR ATKURIA PAŽEISTĄ NOSIES GLEIVINĘ.

5⁹⁹ €

FENKAROL, 25 mg, 20 tablečių

NERCEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Kiekvienoje tabletėje yra 25 mg kvifenadino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos.** Simptominis alerginės slogos (su konjunktyvitu ar be jo), dermatito (egzemos, dilgėlinės) ir niežulio gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems žmonėms dozė yra 25–50 mg (1–2 tabletės) 2–4 kartus per dieną. Vaikams ir paaugliams: vyresniems negu 12 m. vaikams dozė yra 25 mg (1 tabletė) 2–3 kartus per dieną. „Fenkarol“ netinka vartoti 12 m. ir jaunesniems vaikams. **Vartojimo būdas.** Vartoti per burną. „Fenkarol“ tabletes yra geriamos 8 karto po valgio. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas kvifenadino hidrochloridui arba sacharazės, bulvių krakmolo, kalcio stearatui. Pirmasis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Atsargiai vaistinio preparato reikia vartoti ligoniams, sergantiems sunkiomis širdies ir kraujagyslių sistemos, virškinimo trakto, kepenų ir (arba) inkstų ligomis. Nevartoti, jeigu nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Registravimo liudijimo turėtojas ir gamintojas. JSC „Olpha“, Rūpniecība, LV-214 Oļaine, Latvija. Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje <http://www.vvkt.lt>. Reklamos teksto parengimo data 2025-06-05. FEN3036202SLT

GREITAI NUGALI ALERGIJOS SIMPTOMUS!

NUO GERKLĖS SKAUSMO IR UŽDEGIMO

NUO 6⁹⁹ €

DECATYLEN™

0,25 mg/0,03 mg, 20 kietųjų pastilių 6⁹⁹ €
0,25 mg/0,03 mg, 40 kietųjų pastilių 9⁹⁹ €

NERCEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 pastilė yra 0,25 mg dekvainolio chlorido, 0,03 mg cinchokaino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** burnos ir ryklės uždegimo (gingivito, opinio ir aftinio stomatito, faringito) vietinis gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams kas 2 val. lėtai sučiulpti po 1 pastilę, 4–12 m. vaikams kas 3 val. lėtai sučiulpti po 1 pastilę. Kai uždegimo simptomai sumažėja, vartoti po 1 pastilę kas 4 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai ar kvėpavimams amonio dariniams (pvz., benzalkonio chloridui). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Decatilen“ sudėtyje yra sorbitolio. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurius laisvinantį poveikį. Reklamos teksto parengimo data 2025-01-13. DCL-LT-00019

KAI REIKIA NE TIK MALŠINTI SIMPTOMUS, BET IR GYDYTI GERKLĖS SKAUSMĄ!

5⁹⁹ €

MILGAMMA® N, 20 minkštųjų kapsulių

NERCEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekvienoje minkštąjoje kapsulėje yra 40 mg bentitiamino (riebaluose tirpus vitamino B₁₂ darinio), 90 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B₆) ir 250 µg cianokobalamino (vitamino B₁₂). **Terapinės indikacijos.** Vitaminų B₁₂, B₆, B₁ trūkumo salinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems: po 1 kapsulę 3–4 kartus per parą. Kai liga lengva ir jei vaistinis preparatas padeda, per parą pakanka 1–2 kapsulių. Vartoti per burną. Kapsulę reikia praryti po valgio nesukramtytą, užsigerti trupučiu skysčio. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms, žemės riešutams, sojos arba bet kuriai vaistinio preparato pagalbinei medžiagai. Asmenims, kuriems trūksta vitamino B₁₂, ir kuriems gresia Leberio neuroatrofija. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vartojama ilgiau negu 6 mėn. „Milgamma N“ gali sukelti neuropatiją. Reikia atsivėginti ir adityvų kartu vartojamų vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra sorbitolio (ar fruktozės), ir su maistu vartojamo sorbitolio (ar fruktozės) poveikį. Geriamoji vaistinio preparato sudėtyje esantis sorbitolis gali paveikti kitų kartu vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį priėmimą. Jeigu yra alergija žemės riešutams arba sojomis, šio vaistinio preparato vartoti negalima. **Registravimas.** „Wörwag Pharma GmbH & Co. KG“, Vokietija. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-12.

GYVYBŪŠKAI BŪTINAS GERAI SAVIJAUTAI!

4⁹⁹ €

HELMINTOX SUS

125 mg/2,5 ml, geriamoji suspensija, 15 ml

NERCEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Pirantelis

„Helmintox“ yra parazitines kirmėles veikiantis preparatas. Juo gydomas spalinių, askariidžių ir dvilykapiščių ankilostomų sukeltos parazitinės ligos. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Spalinių sukeltos ligos ir askariidžių gydymas: vidutinė dozė yra 10–12 mg/kg kūno svorio (didžiausia dozė 1 g). Ji geriamą 1 kartą. Dvilykapiščių ankilostomų sukeltos ligos: pasireiškus sunkiai dvilykapiščių ankilostomų sukeltai ligai, 2–3 dienas reikia gerti per 1 ar 2 kartus 20 mg/kg kūno svorio dozė (didžiausia paros dozė 2 g). Jei sergama lengva dvilykapiščių ankilostomų sukelta liga (taip būna vietovėse, kur liga nepaplitusi), gali pakakti vienos 10 mg/kg kūno svorio dozės. **Kontraindikacijos.** „Helmintox“ vartoti negalima: jeigu yra alergija piranteliui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jeigu yra alergija žemės riešutams ir sojomis. **Specialūs įspėjimai.** Jei yra kepenų funkcijos sutrikimas, dozė reikia mažinti, nes nedidelė daliai pacientų buvo pastebėta laikino kepenų fermentų aktyvumo padidėjimo atveju. Reklamos teksto parengimo data 2026-05.

HELMINTOX

125 mg, 6 pėvelės dengtos tabletės
250 mg, 3 pėvelės dengtos tabletės

NERCEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Pirantelis

„Helmintox“ yra parazitines kirmėles veikiantis preparatas. Juo gydomas spalinių, askariidžių ir dvilykapiščių ankilostomų sukeltos parazitinės ligos. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Šis vaistas skirtas suaugusiems žmonėms, vyresniems kaip 6 m. vaikams ir paaugliams, geriamas. Spalinių sukeltos ligos ir askariidžių gydymas: vidutinė dozė yra 10–12 mg/kg kūno svorio (didžiausia dozė 1 g). Ji geriamą 1 kartą. Dvilykapiščių ankilostomų sukeltos ligos: pasireiškus sunkiai dvilykapiščių ankilostomų sukeltai ligai, 2–3 dienas reikia gerti per 1 ar 2 kartus 20 mg/kg kūno svorio dozė (didžiausia paros dozė 2 g). Jei sergama lengva dvilykapiščių ankilostomų sukelta liga, 2–3 dienas reikia gerti per 1 ar 2 kartus 20 mg/kg kūno svorio dozė (didžiausia paros dozė 2 g). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Helmintox“. Jei yra kepenų funkcijos pakenkimas, gali reikėti vartoti mažesnę dozę. Tokiu atveju pasitarkite su gydytoju. Reklamos teksto parengimo data 2026-05.



JAMIESON turi ilgametę patirtį - savo produkciją eksportuoja po visą pasaulį jau nuo 1922 metų. JAMIESON naudoja išskirtinę „360 Pure“ technologiją, kuri apima net 360 gamybos proceso kontrolės etapų.


IKI -50%

„JAMIESON“ MAISTO PAPILDAMS



Pagaminta Kanadoje

NUO SUMUŠIMŲ

9⁹⁹ €

DOLOBENE™, gelis, 50 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 g gelio yra 500 TV heparino natrio druskos, 150 mg dimetilsulfoksido, 25 mg deksantenolio. **Terapinės indikacijos:** patinimo, hematomos ir uždegimo po bukus raumenų, sausgyslių, sausgyslių mąščių, raiščių, sąnarių traumos gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tepiti geliu pažeistą vietą 1–2 kartus per parą. Nereikia įtrinti, tik švelniai užtepti ir paskleisti. Nenaudoti po oro nepažeidžiančiais tvarščiais „Dolobene“ negalima tepėti ant atviro žaizdos, pažeistos odos ir gleivinės. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sergantiesiems raudonąja vilkige; astma; jaunesniems kaip 5 m. vaikams; esant sunkių inkstų ir (arba) kepenų pažeidimų, kraujotakos sutrikimų; negalima vartoti kartu su sulindaku. **Specialūs įspėjimai:** nepatariama tepėti ant pažeistos odos ir gleivinės. Sudėtyje esantis makroglicerolio hidroksisteiratas gali sukelti odos reakcijų. DIBN-LT-00002. Teksto peržiūros data 2024-02-01. Reklamos teksto parengimo data 2026-03.

9⁹⁹ €

ZOVIDUO, 50 mg/10 mg/g kremas, 2 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Indikacijos: lūpų ir odos aplink lūpas pūslelinės anksstyviųjų požymių ir simptomų (pvz., dilgčiojimo, niežėjimo ar paraudimo) gydymas suaugusiems ir 12 m. bei vyresniems paaugliams. **Vartojimas:** vartoti tik ant odos. Tepi ant pažeistos vietos 5 kartus per parą 5 dienas, vidutiniškai kas 3–4 val.; naktį daroma pertrauka. Jeigu per 5 dienas nuo gydymo pabaigos simptomai išlieka arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. **Kontraindikacijos:** alergija aciklovirui, valaciklovirui, hidrokortizonui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai; kitoms nei pūslelinė odos infekcijoms. **Specialūs įspėjimai:** nevartoti prieš pat valgi ar su bet kokiais tvarščiais ar pleistrais. Netepti akių, nosies ir burnos ertmės, lytinių organų. Nevartoti, jei imuninė sistema neveikia tinkamai ar susilpnėjusi. Pasitarti su gydytoju, jei kartojasi sunki pūslelinė ar pasireiškė bet kokių regėjimo sutrikimų. Sudėtyje yra propilenglikolio, cetosteiralo alkoholio ir natrio laurilsulfato. Teksto parengimo data 2023-03. NP-LT-ZOV-23-00001

ŽAIZDŲ PRIEŽIŪRAI IR GYDYMUI

NUO 5⁹⁹ €

OCTEZY

1 mg/20 mg/g, odos purškalas (tirpalas), 50 ml 5⁹⁹ €
1 mg/20 mg/g, odos purškalas (tirpalas), 100 ml 8⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas. Kiekviename g tirpalo yra 1 mg oktenidino dihidrochlorido ir 20 mg fenoksietanolio. **Terapinės indikacijos.** Visų amžiaus grupių pacientų kartotinis trumpalaikis pagalbinis mažų, paviršinių žaizdų antiseptinis gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Suaugusiems žmonėms ir vaikams „Octezy“ vartojamas ant gydymo srities, kol ji bus visiškai sudrekinusi. Pavartojus šį vaistinį preparatą ir prieš imant kitų priemonių, pvz., uždėdant ant žaizdos tvarstį, reikia palaukti mažiausiai 1–2 minutes. „Octezy“ turi būti vartojamas ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Jaunesniems kaip 6 metų vaikams vartojama reikia riboti iki kelių dienų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Octezy“ negalima nuryti, vartoti didesniais kiekiais, nei būtina. Siekiant išvengti audinių pažeidimo, reikia būti atsargiems plaukiant žaizdą ir užtikrinti, kad vaistinis preparatas nebūtų naudojamas su slėgiu ar suleidžiamas į audinius. Esant žaizdai su ertmėmis, reikia užtikrinti, kad bet kuriuo metu būtų užtikrintas vaistinio preparato išleidimas. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. „Octezy“ draudžiama vartoti pilvo ertmei, šlapimo pūslės ir ausies būgneliui plauti. Reklamos teksto parengimo data 2026-07-14.

BAKTERIJŲ AUGIMĄ STABDANTIS ŽAIZDŲ ANTISEPTIKAS

SVORIO MAŽINIMUI

33⁹⁹ €

ORLISTAT POLPHARMA, 60 mg, 42 kietosios kapsulės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Vienoje kietojoje kapsulėje yra 60 mg orlistato. **Indikacijos:** „Orlistat Polpharma“ yra skirtas antsvorio turintiems (kūno masės indeksas KMI ≥ 28 kg/m²) suaugusiems žmonėms svorį mažinti. Vartojant šį vaistinį preparatą reikia laikytis šiek tiek sumažinto kaloringumo ir sumažinto riebalų kiekio dietos. **Dozavimas:** rekomenduojama „Orlistat Polpharma“ dozė yra viena 60 mg kapsulė tris kartus per parą. Per 24 valandas galima išgerti ne daugiau kaip tris 60 mg kapsules. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; kartu taikomas gydymas ciklosporinu; lėtinės malabsorbcijos sindromas; cholestazė; nėštumas; žindymas; kartu taikomas gydymas varfarinu arba kitais geriamaisiais antikoaguliantais. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pacientas turi tvirtai laikytis rekomenduotos dietos. Jei orlistatu gerti sutrikdyti riebaluose tirpių vitaminų (A, D, E ir K) absorbcija. Todėl reikia gerti polivitaminų papildą. Cukriniu diabetu sergantys asmenys, prieš pradėdami gydymą „Orlistat Polpharma“ turi pasitarti su gydytoju. Pacientai, vartojantys „Orlistat Polpharma“ kartu su vaistinėmis preparatais hipertenzijai arba hipercholesterolemijai gydyti, turi pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Amjodaroną, levotiroksiną vartojantys pacientai, prieš pradėdami gydymą „Orlistat Polpharma“, turi pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Pranešta apie kraujavimo iš tiesiosios žarnos atvejus pacientams, vartojantiems orlistatą. Jeigu taip nutinka, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Jeigu prasideda stiprus viduriavimas, geriamieji kontraceptikai gali nesukelti pageidaujamo poveikio, todėl rekomenduojama naudoti papildomas kontracepcijos priemones. Pacientai, sergantys inkstų ligomis, epilepsija prieš pradėdami gydymą „Orlistat Polpharma“, turi pasitarti su gydytoju. Teksto paruošimo data: 2026.05.

SUMAŽINK SVORĮ SAUGIAI.

RŪŠKESNIAI MATYMU

-40% 11^{98€} ~~19⁹⁷~~

CALIMEL® CLEAR

akių lašai be konservantų, 10 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Calimel“ lašų sudėtyje yra natrio hialuronato ir kalio jodido. Lokaliai naudojamas kalio jodidas veikia kaip stiprus antioksidantas, sulaukantis laisvuosius radikalus akies paviršiuje. Jis mažina oksidacinę pažeidimą ir slopina akies lęšuko bei stiklakūnio drumstumą. „Calimel“ lašai naudojami akies paviršiui sudrekinimui ir užkirsti kelią akies lęšuko bei stiklakūnio drumstumui. Produkto tinkamumo naudoti laikas yra 3 mėnesiai nuo pirmo pakutes atidarymo dienos. Produkto negalima naudoti ilgiau kaip 1 mėnesį nepertraukiamai ir ne ilgiau kaip 3 mėnesius, išlašinant kartkartėmis (su kelių dienų pertraukomis).

-30% 7^{68€} ~~10⁹⁷~~

JUNIOR ANGIN

24 čiulpiamosios pastilės

MEDICINOS PRIEMONĖ

Apsauginė plevėle burnos ir gėklės gleivinei, ypač esant gerklės skausmui.

„Junior-angin“ pastilės gerklei yra medicinos priemonė, kuri apsaugo burnos ir gėklės gleivinę, ypač esant gerklės skausmui.

NUO 4⁹⁹ €



NEUROMULTIVIT

20 plėvele dengtų tablečių 4⁹⁹ €
100 plėvele dengtų tablečių 16⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Indikacijos: „Neuromultivit“ yra vitamino B1, vitamino B6 ir vitamino B12, kurie yra ypač svarbūs užtikrinant normalias nervų sistemos medžiagų apykaitos funkcijas, derinys. Vartojant nervų sistemos ligų gydymui B grupės vitaminai atstato jų stoką organizme ir skatina nervinio audinio natūralų gijimo procesą. „Neuromultivit“ vartojamas esant B grupės vitaminų stokos sukeltiems negalavimams. Vitaminas B1 pasižymi skausmą malšinančiu poveikiu. **Vartojimas:** rekomenduojama dozė yra viena tabletė kartą per parą. Pavieniais atvejais paros dozė galima padidinti iki 3 tablečių. Tabletes reikia nuryti nesukramtytas po valgyto ir užsigerti truputį skysčio. **Kontraindikacijos:** retai pasitaiko nespecifinių požymių – vėmimas, galvos skausmas ir svalgys. Mažiau tikėtinos padidėjusio jautrumo reakcijos, kurios vartojant vitaminus B1 arba B12 dažniausiai reiškiasi požymiais odoje. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Neuromultivit“ vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas vitaminui B1, vitaminui B6, vitaminui B12 arba bet kuriai pagalbinei „Neuromultivit“ medžiagai. Negalima vartoti vaikams ir paaugliams (jaunesniems negu 18 metų) dėl per didelio veikliųjų medžiagų kiekio. Nedelsiant pranešti gydytojui, jei yra kontraindikacijų vaisto vartojimui, atsirado šalutinio poveikio požymių ar pastojote. Reikėtų vengti gerti dideles vaisto dozes ilgiau nei 4 savaites. Vitaminas B6 gali sumažinti kartų vartojamos L-dopos poveikį. **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:** G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. **Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį RTT atstovą:** UAB „GL Pharma Vilnius“, A. Jakšto g. 12, Vilnius, tel. (85) 261 0705, el. paštas: office@gl-pharma.lt; www.gl-pharma.lt. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026.07.

KAULAMS STIPRINTI

NUO 3⁹⁹ €



CALCIGRAN

500 mg/200 TV, 30 kramtomųjų tablečių 3⁹⁹ €
500 mg/200 TV, 100 kramtomųjų tablečių 6⁹⁹ €
FORTE 500 mg/400 TV, 60 kramtomųjų tablečių 6⁹⁹ €
FORTE LEMON 500 mg/800 TV, 60 kramtomųjų tablečių 9⁹⁹ €
SINE 500 mg, 100 kramtomųjų tablečių 6⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Sudėtis: 1 tableteje yra 500 mg kalcio (kalcio karbonato pavidalu), o 1 „Calcigran“, „Calcigran Forte“ ir „Calcigran Forte Lemon“ tableteje taip pat yra 200, 400 arba 800 TV vitamino D3 (cholecalciferolio). **Indikacijos:** priklausomai nuo vaistinio preparato sudėties, kalcio arba vitamino D ir kalcio trūkumui išvengti ir gydyti. Kaip papildomas vaistas ligoniams, kurie gydomi specifiniais vaistais nuo osteoporozės ir kuriems yra kalcio arba vitamino D ir kalcio stokos pasireiškimo pavojus. „Calcigran Sine“ taip vartojamas fosfatams surišti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Calcigran“ ir „Calcigran Sine“ suaugusiems pasireiškimo pavojus. „Calcigran Sine“ taip vartojamas fosfatams surišti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Calcigran“ ir „Calcigran Sine“ suaugusiems pasireiškimo pavojus. „Calcigran Sine“ taip vartojamas fosfatams surišti. **Kontraindikacijos:** alergija veikliąjam arba bet kuriai pagalbinei šių vaistų medžiagai. Sunkus inkstų funkcijos sutrikimas. Jeigu padidėjęs kalcio kiekis kraujyje (yra hiperkalcemija) ar (ir) šlapime (yra hiperkalciurija), inkstuose formuojasi akmenys. „Calcigran“, „Calcigran Forte“ ir „Calcigran Forte Lemon“ taip pat negalima vartoti jeigu yra padidėjęs vitamino D kiekis kraujyje. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai vartoti jeigu gydotes ilgą laiką, ir ypač jeigu kartu vartojate diuretikų (vaistų, vartojamų aukštam kraujospūdžiui arba pabrėžiamam gydyti) arba širdį veikiančių glikozidų (vaistų, vartojamų širdies ligoms gydyti); yra inkstų funkcijos sutrikimo požymių arba turite ryškų polinkį inkstų akmenų formavimuisi; sergate osteoporoze ir negalite vaikščioti. „Calcigran“, „Calcigran Forte“ ir „Calcigran Forte Lemon“ taip pat reikia vartoti atsargiai jeigu sergate imuninės sistemos sutrikimu, dėl kurio gali padidėti vitamino D kiekis kraujyje ir jeigu vartojate kitų vaistų, kuriuose yra vitamino D. Sudėtyje yra izomaltos. Jeigu gydoytės Jums yra sares, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „Calcigran“, „Calcigran Forte“ ir „Calcigran Forte Lemon“ sudėtyje taip pat yra sacharozės, kuri gali kelti dantims. Reklamos teksto parengimo data 2025-12-11.

ELEKTROLITAI – NE STEBUKLINGAS GĖRIMAS: kada jie iš tiesų padeda, o kada jų nereikia?



Elektrolitai gali padėti organizmui atkurti skysčių ir mineralinių medžiagų pusiausvyrą po intensyvaus fizinio krūvio, gausiai prakaituojant ar sutrikus virškinimui. Tačiau augantis jų populiarumas turi ir kitą pusę – šie produktai vis dažniau vartojami be aiškaus poreikio, tikintis daugiau energijos, greitesnio atsistatymo ar net mažesnio svorio.

Į vaistinę užsukusi moteris pasakojo mažai valganti, tačiau kasdien gerianti elektrolitus, nes tikėjosi taip gauti reikalingų medžiagų, išlaikyti energiją ir greičiau sulieknėti. Vaistininė Laura Vanagaitė pabrėžia, kad tokia situacija – pavojingas pavyzdys, kaip elektrolitams priskiriamos savybės, kurių jie neturi.

„Elektrolitai nėra maisto pakaitalas ir savaime nepadedą mažinti svorio. Jie neatstoja su maistu gaunamos energijos ir visų reikalingų maistinių medžiagų. Jei žmogus beveik nevalgo, bet geria elektrolitus manydamas, kad taip pasirūpina organizmu, ilgainiui gali atsirasti silpnumas, svajimas ir kiti negalavimai. Norint mažinti svorį, svarbu ne atsisakyti maisto, o pasirūpinti subalansuota mityba“, – pabrėžia ji.

Susidomėjimą skatina ir socialiniai tinklai

Elektrolitų milteliai, tirpiosios tabletės ir sportiniai gėrimai vis dažniau perkami ne tik esant didesniam skysčių netekimui, bet ir profilaktiškai. Pasak vaistininės, žmonės jų dažniausiai ieško po intensyvių treniruočių, gausiai prakaituodami, karštu oru, taip pat po vėmimo ar viduriavimo.

„Dalis gyventojų elektrolitus perka todėl, kad matė juos vartojant kitus žmones ar apie jų naudą išgirdo socialiniuose tinkluose. Tačiau sveikam žmogui, kuris įvairiai maitinasi ir pakankamai geria skysčių, kasdien jų papildomai vartoti nereikia – sveikas organizmas jų kiekį reguliuoja pats“, – sako L. Vanagaitė.

Elektrolitai – tai natrias, kalis, magnis, kalcis, chlori-

dai ir kitos mineralinės medžiagos, svarbios skysčių pusiausvyrai, nervinių impulsų perdavimui, raumenu susitraukimui, širdies veiklai ir kraujospūdžio reguliavimui. Didžiąją jų dalį kasdien gauname su maistu ir gėrimais. Sutrikus elektrolitų pusiausvyrai gali pasireikšti nuovargis, silpnumas, raumenų mėšlungis ar spazmai, galvos skausmas, pykinimas, svajimas ir širdies ritmo sutrikimai. Sunkesniais atvejais galimi sumišimas ar traukuliai.

„Tokie simptomai nėra būdingi tik elektrolitų trūkumui. Pavyzdžiui, silpnumą ar svajimą gali lemti ir nepakankama mityba, skysčių stoka bei daugybė kitų priežasčių. Todėl vien pagal savijautą nuspręsti, kokio mineralo trūksta, negalima – tai parodo kraujotyrinimai“, – aiškina vaistininė.

Po trumpos treniruotės dažniausiai pakanka vandens

Papildomai vartoti elektrolitus naudingiausia tuomet, kai organizmas netenka ne tik vandens, bet ir mineralinių druskų. Taip gali nutikti ilgai ir intensyviai sportuojant, kelias valandas gausiai prakaituojant, dirbant karštyje, vemiant ar viduriuojant. Vis dėlto praktikavimo intensyvumas skiriasi: jam įtakos turi fizinio krūvio trukmė, oro temperatūra, apranga ir individualios organizmo savybės. Todėl vien faktas, kad žmogus sportavo, dar nereiškia, jog jam būtinas elektrolitų gėrimas.

„Dažnai pacientai po 30–60 minučių trukusios treniruotės prašo stipriausių elektrolitų, kad kūnas greičiau atsistatytų, nors sportavo vidutiniu intensyvumu ir gausiai nepakrautavo. Tokiu atveju paprastai pakanka mineralizuoto vandens ir įprastos subalansuotos mitybos“, – pasakoja L. Vanagaitė.

Sportinis gėrimas – ne rehidratacijos tirpalas

Elektrolitų ypač gali prireikti vemiant ar viduriuojant – tokiu atveju tinkamesni geriamieji rehidra-

tacijos tirpalai, kuriuose vandens, mineralinių medžiagų ir gliukozės santykis pritaikytas prarastiems skysčiams atkurti.

Tuo metu sportiniai gėrimai skirti kitoms situacijoms: juose gali būti elektrolitų ir angliavandenių, tačiau kai kuriuose produktuose taip pat yra nemažai cukraus ir kalorijų. Todėl saldus sportinis gėrimas po lengvos treniruotės nebūtinai yra reikalingas pasirinkimas.

„Pirmiausia reikia įvertinti, kam produktas bus vartojamas. Sportinis gėrimas nėra tas pats, kas geriamasis rehidratacijos tirpalas, skirtas vartoti vemiant ar viduriuojant. Renkantis verta pažūrėti, kiek produkto yra natrio, kalio, magnio ir cukraus, kokio dydžio nurodyta porcija“, – pataria vaistininė.

Ji priduria, kad rehidratacijos tirpalo miltelius būtina skiesti tiksliai tokiu vandens kiekiu, koks nurodytas instrukcijoje. Paruošus pernelyg koncentruotą gėrimą, žmogus gaus daugiau mineralinių medžiagų, nei numatyta. Taip pat svarbu neviršyti rekomenduojamos paros dozės ar atsižvelgti į kitus vartojamus papildus.

Daugiau nebūtinai reiškia geriau

Vaistininė pabrėžia, kad elektrolitų preparatai neturėtų būti vartojami principu „kuo daugiau, tuo geriau“. Organizmui nepalankus gali būti ne tik jų trūkumas, bet ir perteklius. Ypač atsargūs turėtų būti žmonės, sergantys inkstų ligomis, širdies nepakankamumu, turintys aukštą kraujospūdį ar vartojantys vaistus, veikiančius kalio, natrio bei skysčių pusiausvyrą.

„Sutrikus inkstų veiklai organizmas gali prasčiau pašalinti kalio perteklių, o per didelis natrio kiekis gali būti nepalankus kraujospūdžiui ir skatinti skysčių kaupimąsi. Tokiems žmonėms elektrolitų preparatą geriausia rinkintis pasitarus su gydytoju ar vaistinininku“, – pažymi L. Vanagaitė.

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMBIO
GELEŽIS LIPOSOMOSE, 30 kapsulių 20⁹⁹ €
MAISTO PAPILDAS

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

VITADAY
KOMPLEKSAS SĄNARIAMS SU GLIUKOZAMINU, 60 tablečių 9⁹⁸ €
MAISTO PAPILDAS

-30% 48^{99€}

VERSAN COLLAGEN COMPLEX

25 porcijos, 435 g 69⁹⁹ 48⁹⁹ € -30 %

MAISTO PAPILDAS

Tai aukščiausios kokybės bioaktyvi formulė, skirta palaikyti sąnarių, kremzlės ir jungiamojo audinio sveikatą. Vienoje porcijoje – 15 000 mg I ir III tipo hidrolizuoto kolageno, II tipo nedenaturuotas kolagenas, gliukozaminas, chondroitinas, hialurono rūgštis ir natūralios kilmės vitaminas C, padedantis formuoti kolageną bei apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. Be pridėtinio cukraus, gliutino, laktozės ir konservantų. Neutralus skonis, puikiai tirpstantys milteliai

PROFESIONALI PAGALBA SĄNARIAMS

IKI -40%

**MICROLIFE**BP B2 BASIC, automatinis kraujospūdžio matuoklis 78⁹⁹ 42⁵⁹ € -40 %BP B3 COMFORT PC, automatinis kraujospūdžio matuoklis 89⁹⁹ 53⁹⁹ € -40 %BP B6 CONNECT, automatinis kraujospūdžio matuoklis 99⁹⁹ 59⁹⁹ € -40 %NEB 200, inhaliatorius 72⁹⁹ 43⁹⁹ € -40 %NEB 400, inhaliatorius, mėšiuokas 79⁹⁹ 47⁹⁹ € -40 %OXY 300, pulsoksimetras 49⁹⁹ 32⁹⁹ € -35 %NC 200, skaitmeninis bekontaktis termometras 47⁹⁹ 28⁷⁹ € -40 %

MEDICINOS PRIETAISAI

„MICROLIFE“ INOVATYVIOS TECHNOLOGIJOS

NUO 6⁹⁹ €**TROXEVASIN**2 %, 40 g gelis 6⁹⁹ €2 %, 100 g gelis 9⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 g gelio yra 20 mg troksuterino. **Terapinės indikacijos:** lėtinio venų nepakankamumo simptomų (kojų skausmo, sunkumo, patinimo) lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems pacientams iš ryto ir vakare ligos pažeistą vietą reikia patepti nedideliu kiekiu gelio ir švelniai masažuoti, kol vaistinis preparatas visiškai įsisąs į odą. Gydymo geliu veiksmingumas daugiausia priklauso nuo vaistinio preparato dozės, vartojimo reguliarumo ir trukmės (patariama vartoti ilgai). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** vartoti tik ant nepažeistos odos, negalima tepti atvirų žaizdų bei gleivinės, pvz., akių. Gelio sudėtyje yra benzalkonio chlorido, kuris gali sudirginti odą. Nesitikiama, kad vartojimas nėštumo ir žindymo laikotarpiu gali būti susijęs su žalingu poveikiu motinai, nes benzalkonio chlorido absorbcija per odą yra minimali. TROX-LT-00034. **Teksto peržiūros data** 2024-11-13. **Reklaminių medžiagų parengimo data** 2026-03.

KAD KOJOS BŪTŲ LENGVIOS: MĖGAUKITĖS TYRINĖDAMI PASAULĮ BE LĖTINIO VENŲ NEPAKANKAMUMO SUKELTŲ SIMPTOMŲ!

NUO 20⁹⁹ €**VIVITON**1000 mg, 30 plėvele dengtų tablečių 20⁹⁹ €1000 mg, 60 plėvele dengtų tablečių 36⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Mikronizuotas diosminas. **Terapinės indikacijos.** „Viviton“ gydomi suaugusieji toliau išvardytais atvejais: su lėtine apatinių galūnių venų liga susijusių simptomų, pvz., tempimo ir sunkumo jausmo kojoje, blauzdų edemos, skausmo ir mėšlungio naktį, palengvinimas; su ūmine hemorojaus liga susijusių simptomų, pvz., skausmo, kraujavimo ir patinimo išangės srityje, gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Lėtinė apatinių galūnių venų liga: 1 plėvele dengta tabletė per parą, kurią reikia išgerti ryte valgio metu (trumpiausia rekomenduojama gydymo trukmė – mažiausiai 4–5 savaitės); ūminė hemorojaus liga: po 1 plėvele dengta tabletė 3 kartus per parą pirmąsias 4 dienas, po to – po 1 plėvele dengta tabletė 2 kartus per parą kitas 3 dienas. Vėliau reikia vartoti palaikomąją dozę – po 1 plėvele dengta tabletė per parą. Tabletes reikia išgerti valgio metu. **Kontraindikacijos.** „Viviton“ vartoti draudžiama: jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) diosminui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Viviton“. Jeigu jūsų kepenų arba inkstų funkcija yra sutrikusi, prieš pradėdami vartoti „Viviton“, pasitarkite su savo gydytoju. Vaistas nėra veiksmingas mažinant kojų patinimą, pasireiškusį dėl širdies, inkstų ar kepenų ligos. Ūminės hemorojaus ligos gydymas šiuo vaistu nepakeičia specifinio kitų išangės sutrikimų gydymo. **Atstovas Lietuvoje.** UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, Lietuva. El. paštas LT@berlin-chemie.com

Reklama paruošta 2026-04.

LT-VIV-2-2026_MFLOW

VISAPUSIŠKA PAGALBA JŪSŲ VENOMS

AMBIO[®]

Vaistininų atrinkti
maisto papildai
geresnei tavo versijai



Maisto papildai



2 UŽ 1 KAINĄ



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMBIO

MULTIVITAMINAI SU ŽENŠENIU, 20 tirpiųjų tablečių **4⁹⁹ €**
AUGALINIAI POLIFENOLIAI, 60 tablečių **35⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAI



1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra
pigesnė arba tokia pati
– NEMOKAMAI!

BIOCELL

MAISTO PAPILDAI

BIOCELL puoselėja gamtos sukurtą grožį ir sąmoningą gyvenimo būdą, vertina natūralumo estetiką ir skatina moterį pamilti save tokią, kokia ji yra – tobulą. Geriamieji BIOCELL grožio eliksyrai „shots“ su kolagenu ar keratinu, grožio kapsulės, hidrolizuotas kolagenas miltelių forma ir skaidulus puoselėja odos, plaukų bei nagų grožį iš vidaus.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

EPITOME

COLLAGEN PEPTIDE COMPLEX, **59⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

Vitamino D3 šaltinis



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

OLIDETRIM®

2000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių **10⁹⁹ €**

4000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių **14⁹⁹ €**

2000 TV, 60 minkštųjų kapsulių **11⁴⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

Imunitetui – vitaminas D 2000 ir 4000 TV.

Sirdžiai, smegenims – DHR+ EPR omega-3 rūgštys.

Kaulams ir raumenims – vitaminai D ir K2.

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Omega-3 riebalų rūgštys DHR (dokozaheksaeno) ir EPR (eikozapentaeno) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą. Siekiant maksimaliai padidinti vitamino D papildų naudą, juos naudinga vartoti kartu su vitaminu K2.

GERIAUSIA GYNYBA – STIPRUS IMUNITETAS.



1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra
pigesnė arba tokia pati
– NEMOKAMAI!

PERFECTIL

MAISTO PAPILDAI

„Perfectil“ – grožio priemonių linija odai, plaukams ir nagams.

Aktyvieji elementai pamaitina giliosios odos, plaukų, nagų sluoksnius. Kitaip nei kremas ar serumai, „Perfectil“ visa darbą rūpestingai atlieka iš vidaus. Naujiene – kolageno geriamai odai ir plaukams „Perfectil Platinum Collagen“. Sudėtyje yra patentuotas hidrolizuotas jūrinio kolageno peptidų kompleksas „Peptan“, kuris dėl itin mažos molekulinės masės išsiskiria aukštu biologiniu prieinamumu ir užtikrina itin gerą pasisavinimą bei efektyvumą.

IŠLAISVINK SAVO GROŽĮ SU „PERFECTIL“!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

Akims



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

OCUTEIN

FORTE, 30 kapsulių **20⁹⁹ €**

BRILLANT, 30 kapsulių **24⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

„Ocutein Forte“ – trejopas poveikis sausoms, daug dirbančioms akims.

„Ocutein Brillant“ – brillantinė apsauga pavargusioms, daug dirbančioms akims.

Vartojimas: 1 kapsulė per parą.

„OCUTEIN“ – DAUG DIRBANČIŲ AKIŲ APSAUGA!



1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra
pigesnė arba tokia pati
– NEMOKAMAI!

HI GENIE!

DAILY FRESH, intymios higienos prausiklis, 200 ml **10⁹⁹ €**

GENTLE FOR GIRLS, intymios higienos prausiklis, 200 ml **10⁹⁹ €**

MENOPAUSE COMFORT, intymios higienos prausiklis, 200 ml **10⁹⁹ €**

SPECIFIC PROTECT, intymios higienos prausiklis, 200 ml **10⁹⁹ €**

KOSMETINOS PRIEMONĖS



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMBIO

MULTIVITAMINAI MOTERIMS PLUS, 60 tablečių **19⁹⁹ €**

NAKVIŠŲ ALIEJUS, 1000 mg, 100 kapsulių **21⁹⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

-40 % PREKIŲ ŽENKLAMS

-40 %



SALDUS MIEGAS

15 kapsulių **44⁹⁹ 6⁹⁹ €**
eliksyras, 150 ml **42⁹⁹ 7⁹⁹ €**
30 kietųjų kapsulių **43⁹⁹ 8⁹⁹ €**

MAISTO PAPILAI

Linija „Saldus miegas“ – viena iš populiariausių maisto papildų linijų Lietuvoje. Greitesniam užmigimui ir kokybiškam poilsui, su fitomelatoninu (augaliniu melatoninu), „Saldus miegas“ – net 7 aktyviųjų medžiagų kompleksas, kurio sudėtyje vaistinių raminių žiedų ekstraktas, padedantis palaikyti normalią miego kokybę. „Saldus miegas fitoMELATONINAS“ preparate yra 1 mg fitomelatonino. „Saldus miegas eliksyras“ karamelės skonio, skystas maisto papildas. Sudėtyje yra GSR (Gama-amino sviesto rūgštis), 5-hidroksitriptofano (5- HTP) ir 1 mg fitomelatonino, kuris padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti).

GERAM POILSIUI – „SALDUS MIEGAS“!

IKI -50 %

Kremzlėms, kaulams,
odai, kepenims



ATLANT MAXIMUS, milteliai geriamajam tirpalui, 28 pakeliai **79⁹⁹ 47⁹⁹ € -40 %**

BIO CA + K + MG + ZN SU VITAMINU D3, milteliai geriamajam tirpalui, 28 pakeliai **44⁹⁹ 7⁹⁹ € -50 %**

COLLAGENA BEAUTY, 10 000 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 20 pakelių **42⁹⁹ 6¹⁵ € -50 %**

COLLAGENA JOINTS, 10 000 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 20 pakelių **40⁹⁹ 5⁵⁰ € -50 %**

SILYMARIN LIPID, 28 pakeliai su milteliais **44⁹⁹ 6⁸⁹ € -40 %**

MAISTO PAPILAI

„ATLANT MAXIMUS“ – dar stipresnė „Biofarmacija“ formulės sudėtis kremzlių, kaulų, odos ir raumenų funkcijoms. Sudėtyje net 15 000 mg kolageno! Komplexas papildytas hialurono rūgštimi (net 500 mg), ciberžolės (500 mg) ir bosvelijų (100 mg) ekstraktas.
„BIO SYLMARIN“ – „Biofarmacija“ ekologiškas silimarino (tikrojo margainio) kompleksas virškinimui ir kepenų funkcijai palaikyti. Padeda kepenų ląstelių regeneracijai, organizmo valymo procesams ir normaliai gliukozės koncentracijai kraujyje. Su skaidulinėmis medžiagomis. Nr. 1 maisto papildas kepenims Lietuvoje! *Nustatyta pagal 2024–2025 m. UAB „Softdent“ duomenis.
„Collagena BEAUTY 10 000“ (su hialurono rūgštimi – grožiui) ir „Collagena JOINTS 10 000“ (sąnariams) – „Biofarmacija“ aukštos kokybės, itin mažos molekulinės masės (800–3000 Da) hidrolizuotas, gerai organizmo toleruojamas kolagenas, išgautas iš jautių. Kolagenas reikalingas normaliai odos, kremzlių, dantų, dantenų, kaulų ir kraujagyslių funkcijai. bioCa+K-Mg-Zn SU VITAMINU D3 – „Biofarmacija“ svarbių mineralų kompleksas. Kalcis, kalis, magnis ir cinkas viename pakelyje, skirtas mineralų papildymui kai norisi palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę, imunitinės sistemos veiklą, vaisingumą ir reprodukciją bei kaulų, odos, plaukų ir nagų būklę, išsaugoti normalų regėjimą! Nr.1 kalcio kategorijos maisto papildas Lietuvoje 2025 m.! * Nustatyta pagal 2025 m. UAB „Softdent“ duomenis.

-40 %



VIRONOX

MAISTO PAPILAI

Maisto papildų linija „Vironox“ – epigenetinė linija, sukurta bendradarbiaujant su Šveicarijos mokslininkais. „Stiprus imunitetas“ – tik 7 dienos organizmo apsaugai ir imunitetui. 1 paketyje yra net 10,4 g aktyviųjų medžiagų. Sudėtyje esantis vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. „Jėgoms atstatyti“ – maisto papildas tiems, kurie siekia greičiau atgauti jėgas. Kininių žirnių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalų organizmo gyvybingumą, vitaminai B6 ir B12 – normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą ir mažinti nuovargį. „Smegenų rūkas“ – protinei veiklai. Rausvųjų roplių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją. Niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą. Balzamo „Jėksminga apsauga“ sudėtyje esantis interferonas, hidrolizuotas kolagenas, licozinas ir eteriniai aliejai veikia smegenis ir padeda suformuoti apsauginį barjerą.

„VIRONOX“ – NELEISK TAVĘS SUSTABDYTI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-40 %



VISIONACE

ORIGINAL, 30 tablečių **25⁹⁹ 15¹¹ €**

PLUS, 28 tabletes / 28 kapsulės **32⁹⁹ 19⁷⁹ €**

MAISTO PAPILAI

VISIONACE – subalansuotas luteino, mėlynių ekstrakto, antioksidantų kompleksas. Sudėtyje esančios medžiagos padeda išsaugoti normalų regėjimą (cinkas, vitaminai A, B2), antioksidantai – manganas, selenas palaiko ląstelių apsaugą nuo oksidacinių pažeidimų. VISIONACE tinka daug laiko praleidžiantiems prie kompiuterių ar TV ekranų, dirbantiems akims reikią darbą, dažnai jaučiantiems akių nuovargį, vyresnio amžiaus žmonėms, devinties kontaktinius lęšius. VISIONACE PLUS sudėtis praturtinta omega-3 rūgštimis ir 12 mg luteino.

VISIONACE – REGĖJIMO JĖGA!

IKI -50 %



FERGLOBIN, FERGLOBIN PLUS

MAISTO PAPILAI

„Ferglobin“ – geležies, vitaminų ir mineralų kompleksas normaliai kraujodarai (foliatai), raudonųjų kraujo kūnelių gamybai (vitaminai B6, B12, geležis), hemoglobino susidarymui (geležis) palaikyti. „Ferglobin“ puikiai papildoma mitybą nėštumo ir laktacijos laikotarpiu, vaikystėje ir paauglystėje, sveikstant po ligos ar operacijos.

„Ferglobin PLUS“ ne tik papildoma geležies atsargas, bet ir padeda mažinti pavargimo jausmą (vitaminai B6 ir B12), palaiko fizinę ir protinę energiją (sibirinis ženšenis).

GELEŽIS, KURIAI NĖRA LYGI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-40 %



MEFLOVAN FORTE 60 kapsulių **34⁹⁹ 20⁹⁹ €**

POTENZINE SUPERIOR 30 tablečių **26⁹⁹ 16¹⁹ €**

PROTOSAN FORTE 30 kapsulių **47⁹⁹ 10⁹⁹ €**

MAISTO PAPILAI

„Meflovan forte“ – trijų augalinių medžiagų derinys, skirtas moterims, siekiančioms maksimalaus komforto ir geros savijautos menopauzės metu. Vartojimas: gerti po 1 tablete per dieną.
„Potenzine superior“ – subalansuotas derinys potencialiai. Šio maisto papildas sudėtyje esantis ženšenio šaknų ekstraktas padeda palaikyti lytinę funkciją, išsivermę ir energingumą. Normalų lytinį potraukį ir seksualinį gyvybingumą padeda palaikyti gulsčios ragūžės vaisių ekstraktas, o normalų vaisingumą ir testosterono koncentraciją kraujyje – cinkas. Sudėtyje taip pat yra L-arginino. Vartojimas: gerti po 1 tablete per dieną, valgio metu.
„Protosan forte“ – pagalba vyresnio amžiaus vyrų prostatai. Sudėtyje esantis sabalpalmių ir rugių žiedadžių ekstraktas padeda palaikyti normalią prostatos funkciją, o afrikinių pigių ekstraktas – normalią šlapimo pūslės funkciją. Kininio ženšenio ekstraktas padeda išlaikyti energingumą. Šio preparato sudėtis taip pat praturtinta vitaminu D3 ir cinku. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 2 kartus per dieną, valgio metu.

IKI -50 %

„MÖLLER'S“ ŽUVŲ TAUKAI IR OMEGA-3 KAPSULĖS

MAISTO PAPILDAI

„Möller's“ – tai šimtmečiui puoselejami žuvų taukai visai šeimai. „Möller's“ žuvų taukų kapsulės išsiskiria kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyviu medžiagų deriniais. Tyri ir gerai išvalyti „Möller's“ žuvų taukai puikiai tinka vartoti kasdien visą gyvenimą, įvairaus skonio krantmosiose žuvelėse „Möller's Junior“ yra omega-3 ir vitamino D – augančiam vaikų organizmui naudingų medžiagų.

OMEGA-3 EKSPERTAI JAU DAUGIAU NEI 170 METŲ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



-40 %



KALICORD 850 FORTE, 30 kapsulių **43⁹⁹ 8³¹ €**
KRIOMEGA+, 30 minkštųjų kapsulių **23⁹⁹ 14³⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

Norintiems papildyti kalcio atsargas organizme, rekomenduojama vartoti „Kalicord 850“ sudėtyje yra 850 mg kalcio citrato, kuris papildoma organizmą trūkstamam kalcio kiekiui. Kalis padeda palaikyti normalią kraujospūdį ir normalią raumenų veiklą. Žuvų taukai „KriOmega+“ yra iš krilių. Kriliai yra laikomi vienu geriausių, veiksmingiausių ir prieinamiausių omega-3 riebalų rūgščių šaltinių. Sudėtyje esantys omega-3 fosfolipidai, gaunami iš vežiagyvių – krilių – ekstrakto, greičiau patenka į audinių ląsteles ir tolygiau pasiskirsto nei omega-3 trigliceridai, randami žuvų taukuose.

IKI -50 %



CARDIOACE, 30 tablečių **24⁹⁹ 12⁵⁰ € -50 %**
CARDIOACE PLUS, 60 kapsulių **44¹⁹ 30⁸⁹ € -25 %**

MAISTO PAPILDAI

CARDIOACE – širdies veikimo kompleksas, kuriame derinamos naudingosios (esnių ekstrakto) savybės su vitaminais, mineralais bei antioksidantais. Sudėtyje yra medžiagų normaliai širdies veiklai (vitaminas B1, EPR, DHR), kraujotakai (cesnakai), ląstelių apsaugai nuo oksidacinio pažeidimo (varis, selenas, vitaminai C, E).

„CARDIOACE“ – KIEKVIENAM ŠIRDIES DŪŽIUI!

KOJŲ VENOMS

19⁹⁹ €


VELIOS 1000 mg, 30 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 1000 mg mikronizuoto diosmido. **Terapinės indikacijos:** suaugusiųjų lėtinio veninės kraujotakos nepakankamumo simptomų gydymas, esant: apatinių galūnių venų varikozei, venų opoms, telangiektazijoms ir retikuliniams varikozėms ar venoms, sunkumui, nuovargiui, diskomfortui ar neramių kojų pojūčiui, kojų skausmui ar deginimo pojūčiui, šaltų kojų pojūčiui, naktiniams kojų mėšlungiui, apatinių galūnių patinimui, niežuliui, parestezijai (odos dilgčiojimui, bėdymui ar niežėjimui), odos eritemai ar cianozei. Suaugusiųjų paūmėjusio hemorojaus simptomų gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** lėtinio venų nepakankamumo simptomais gydymas: 1 tabletė per parą valgio metu, vartoti bent kelias savaites. Ūminio hemorojaus simptomais gydymas: pirmąsias 4 dienas gerti 3 tabletes per parą, 3 vėlesnes dienas – po 2 tabletes per parą, gydymas turi būti trumpalaikis. Vartoti per burną. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija diosminui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** paūmėjus hemorojaus simptomams, reikia prisiminti, kad „Velios“ veikia tik simptomus ir turi būti vartojamas trumpai. Jei simptomai nepraeina, reikia atlikti tiesiosios žarnos tyrimą ir parinkti tinkamą gydymą. „Velios“ nėra veiksmingas gydant su staziniu širdies nepakankamumu susijusią edemą. „Velios“ plėvele dengtų tablečių turi nevartoti pacientai, kuriems yra širdies nepakankamumas. Kai sutrikusi kojų veninė kraujotaka, „Velios“ gydymai poveikį gali sustiprinti saulės bei ilgalaikio stovėjimo vengimas, tinkamo kūno svorio palaikymas, specialioji kojinių nešiojimas. Kai apatinės kojų dalys patinusios dėl širdies, inkstų arba kepenų ligos, šis vaistas nepadeda. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „Velios“ sudėtyje yra saulelydžio geltonjojo dažalo (E110), kuris gali sukelti alerginių reakcijų. **Reklamos teksto parengimo data** 2026-03-23.

PAJUSK KOJŲ LENGVUMĄ.

-50 %



AMBIO

CHOLESTEROL BALANCE COMPLEX, 30 kapsulių **43⁹⁹ 7⁰⁰ €**

MAISTO PAPILDAS

Pasiūlymai galioja **2026 08 01 – 2026 08 31**.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Nuolaidos taikomos prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą, kurio galite teirautis kiekvienoje vaistinėje, el. paštu evaistine@nvaistine.lt arba nemokamu tel. +370 800 10008. Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį/informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Daugiau informacijos NORFOS vaistinėje, el. paštu evaistine@nvaistine.lt arba tel. +370 800 10008. Reklaminio teksto parengimo data – 2026 06 19.



NUO SPAZMINIO SKAUSMO

NUO 6⁹⁹ €

NO-SPA

40 mg, 24 tabletės 6⁹⁹ €
40 mg, 24 plevėle dengtos tabletės 7⁴⁹ €



NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje ir plevėle dengtoje yra 40 mg drotaverino hidrochlorido. **Indikacijos:** lygiųjų raumenų spazmas, susijusiems su tulžies latakų ligomis (tulžies pūslės ir (arba) latakų akmenligė, tulžies pūslės ir (arba) šalia jos esančių audinių, tulžies latakų ar didžiojo dvilypakiprės žarnos spenelio uždegimas), šalinti. Inkstų ir (arba) šlapimtakio akmenligės, inkstų geldelių ar šlapimo pūslės uždegimo sukeltą šlapimo takų lygiųjų raumenų spazmą šalinti, mėšlungiskam norui šlapintis slopinti. Kaip pagalbinis gydymas šalinant skrandžio ir žarnyno lygiųjų raumenų spazmus, jei yra skrandžio ir dvilypakiprės žarnos opa, skrandžio, plonosios ar storiosios žarnos uždegimas, įskrandžio ir prievario spazmas bei esant skausmingoms mėnesinėms. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** reikia vartoti po 1–2 tabletes 1–3 kartus per parą. Įprastinė suaugusio žmogaus paros dozė yra 3–6 tabletės. **Kontraindikacijos:** alergija drotaverinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Sunkus kepenų, inkstų ir širdies nepakankamumas. Negalima vartoti jaunesniems kaip 1 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** vaikams ir paaugliams iki 18 m. vartoti NO-SPA nerekomenduojama. Jei kraujospūdis mažas, vaista reikia vartoti labai atsargiai. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Drotaverino vartojant su levodopa, mažėja pastarojo vaisto poveikis parkinsonizmui, todėl stiprėja drebulys ir raumenų stinglys. Teksto parengimo data 2025-06. 2602_SB_No-spa_V01_LT

PILVO SKAUSMAS? GYDYKITE JĮ TINKAMAI SU „NO-SPA“

VIRŠKINIMO SISTEMAI

NUO 6⁹⁹ €

GUTTALAX

7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 15 ml 6⁹⁹ €
7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml 10⁹⁹ €



NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 ml tirpalo (15 lašų) yra 7,5 mg natrio pikosulfato. **Indikacijos.** „Guttalax“ vartojamas, jei pacientas yra varginamas vidurių užkietėjimu; yra būklė, kai reikia palengvinti tuštinimąsi. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** „Guttalax“ geriamas vakare. Suaugusiems ir vyresniems nei 10 m. vaikams: 10–20 lašų per parą. 4–10 m. vaikams: 5–10 lašų per parą. Vartoti per burną. Rekomenduojama gydymą pradėti nuo mažiausios dozės. Didžiausios rekomenduojamos paros dozės viršyti negalima. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; žarnų nepraeinamumas ar obstrukcija; stiprus pilvo skausmas ir (arba) karščiavimas dėl ūminės pilvo būklės (pvz., apendicito), galimai susijęs su pykinimu, vėmimu; ūminė uždegiminė žarnų liga; sunki dehidracija; jaunesni kaip 4 m. vaikai; retos paveldimos būklės, kurios gali būti nesuderinamos su preparato pagalbine medžiaga. **Specialūs įspėjimai.** Nenustačius vidurių užkietėjimo priežasties, negalima vartoti nepertraukiamai kasdien ar ilgai. „Guttalax“ pavartojusiems žmonėms buvo gelios svajinimų ir (arba) sinkopės atvejų. Vaikams be gydytojo nurodymo „Guttalax“ vartoti negalima. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas fruktozės netoleravimas. Nevartokite šio vaisto norėdami numesti svorio. Teksto peržiūros data 2024-12. 2603_SB_Guttalax_V01_LT.

UŽKIEJTUS VIDURIAMS VEIKIA PATIKIMAI IR NIEKAM NEPASTEBINT.

NUO PILVO PŪTIMO

-20%



SIMETIGAST FORTE, SIMETIGAST FORTE BABY

MEDICINOS PRIEMONĖS

„SIMETIGAST FORTE“ 240 mg kapsulės (simetikonas) skirtos vartoti vyresniems nei 12 m. pacientams, esant pilvo pūtimui, pilnumo jausmui pilve, raugėjimui. Taip pat galima naudoti prieš pilvo ertmės diagnostines procedūras, nes tai pagerina vaizdų kokybę. Vartoti: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. amžiaus jaunuoliai – po 1 kapsulę 2–3 kartus per parą. Prieš diagnostines procedūras: 1 kapsulę vakare dieną tyrimą ir 1 kapsulę ryte tyrimo dieną. „SIMETIGAST FORTE BABY“ geriamieji lašai (simetikonas) skirti kūdikiams nuo 28-os gyvenimo dienos ir vaikams iki 12 metų. Vartoti: kūdikiams (nuo 28-os gyvenimo dienos) ir vaikams iki 2 metų 3 lašai prieš, per ar po kiekvieno valgio. Negalima vartoti daugiau kaip 18 lašų per dieną.

GREITAI PAGALBA IŠPŪSTAM PILVUI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

NUO 7⁹⁹ €

SMECTA

3 g, milteliai geriamajai suspensijai, 10 paketėlių 7⁹⁹ €
3 g, milteliai geriamajai suspensijai, 30 paketėlių 14⁹⁹ €



NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Sudėtis. Kiekviename paketėlyje yra 3 g diosmektilo. **Terapinės indikacijos.** Vaikų nuo 2 m. ir suaugusiųjų ūminiam viduriavimui gydyti, vartojant kartu su geriamaisiais rehidratuojančiais tirpalais, taip pat suaugusiųjų lėtiniam viduriavimui gydyti. Simptominiams suaugusiųjų skausmui, susijusiems su funkciniais žarnyno sutrikimais, gydyti. **Dozavimas.** Ūminio viduriavimo gydymas. **Vaikams nuo 2 m.:** 6 g (2 paketėliai) per parą. Ūminio viduriavimo pradžioje (gimimas 3 dienas) šį dozę gali būti 2 kartus didesnė. **Suaugusiems:** 9 g (3 paketėliai) per parą. Ūminio viduriavimo pradžioje šį dozę gali būti 2 kartus didesnė. Ūminio viduriavimo epizodas paprastai trunka ne ilgiau kaip 7 dienas. Kitų ligų gydymas. **Suaugusiems:** vidutiniškai 9 g (3 paketėliai) per parą. Vartojimo metodas. Vartoti per burną. Paketėlio turinį reikia išstiprinti prieš pat vartojimą. **Vaikams:** paketėlio turinį reikia išstiprinti 50 ml vandens arba sumaišyti su pusiau skystu maistu (pvz., daržovių koše, sriuba, kompotu). **Suaugusiems:** paketėlio turinį reikia išstiprinti pusėje stiklinės vandens. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Smecta“ neskirtas vartoti kūdikiams ir vaikams iki 2 m. amžiaus. Gydyant ūminį viduriavimą slėpiems pacientams ir vaikams nuo 2 m. amžiaus, siekiant išvengti dehidracijos, kartu būtina skirti geriamąsias rehidratuojančias druskas (GRD). **Suaugusiems:** taip pat turi būti taikoma rehidracija, jei ji reikalinga. GRD arba intraveninė rehidracija turi būti skiriama atsižvelgiant į viduriavimo intensyvumą, paciento amžių ir klinikinę situaciją. Reikia apsparstyti tolesnį „Smecta“ vartojimą: jei po 3 ūminio viduriavimo dienų sutrikimas nepaįsėja, jei kartu su karščiavimu ir vėmimu jaučiamas skausmas. Reikia atsargiai skirti diosmektilą pacientams, kuriems praėjusioje buvo sunkių lėtinį vidurių užkietėjimo atvejų. Reikia vengti „Smecta“ vartoti ilgą laiką. „Smecta“ sudėtyje yra gliukozės ir sacharozės. Būtina atsižvelgti cukriniu diabetu sergantiems pacientams. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Šio vaisto sudėtyje yra mažes etanolio kiekis (mažiau kaip 100 mg paros dozėje). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas diosmektilui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Praneškite apie šalutinį poveikį registruotojo vietiniam atstovui „Mayoly Baltics“, UAB, el. paštu vigilance.BAL@mayoly.com. Teksto peržiūros data 2025-01-15. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-02. SME-LT-2026-0022

LENGVAM NERIMUI MALŠINTI IR MIEGUI PALENGVINTI

NUO 6⁹⁹ €

LILANDOR

80 mg, 14 minkštųjų kapsulių 6⁹⁹ €
80 mg, 28 minkštosios kapsulės 11⁹⁹ €



NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Lavandula angustifolia Miller eterinis aliejus

„Lilandor“ yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jeigu simptomai pablogėja šio vaisto vartojimo metu, pasitarkite su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, vartoti nerekomenduojama, nes lavandulio aliejaus sudėties medžiagos daugiausia šalinamos iš organizmo perdirbant jas kepenyse. Kiekvienoje šio vaisto minkštosios kapsulėje yra apytikriai 12 mg sorbitolio. Dozavimas ir vartojimo metodas. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta pakuotės lapelyje arba kaip nurodė gydytojas ar vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: 1 minkštoji kapsulė 1 kartą per parą. Minkštąją kapsulę reikia nuryti nesukramtytą užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio (geriausia stikline vandens). Jeigu simptomai išlieka po vaisto vartojimo dvi savaites, reikia kreiptis į gydytoją arba kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą. LT-LIL-10-2025_MFLOW_2025/12

ATGAUK RAMYBĘ IR RAMŲ MIEGĄ

-40% 11^{39€} 18⁹⁹



TRIPTAN FORTE, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Triptan forte“ sudėtyje esantis 5-hidroksitriptofanas (5-HTP) yra natūrali medžiaga, gaunama iš Afrikoje augančių augalų – Griffonia simplicifolia – sėklų, kuri kartu su vitaminu B6 reikalinga serotonino – geros nuotaikos hormono – gamybai. Serotonino išsiskyrimas suteikia gerą nuotaiką ir energiją. Tai pat sudėtyje esantis simpatinai B1 ir B6 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą. Vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojamas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

-40% 9^{59€} 15⁹⁹



MEMORIL FORTE, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Memiril forte“ – subalansuotas, 11 sudedamųjų dalių kompleksas atminčiai bei kraujotakai. Tinka tiems, kuriems sunku susikaupti bei nolat ką nors pamiršantiems. Vienoje kapsulėje yra 80 mg ginkmedžių ekstrakto, kuris padeda palaikyti normalią atminties funkciją ir kraujotaką. Taip pat sudėtyje yra magnio, vitaminų B, C, E, seleno ir folio rūgšties, kuri padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną.

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



VALERIJONŲ EKSTRAKTAS, 20 mg, 50 tablečių 2⁷⁹ €

MAISTO PAPILDAS

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



AMBIO
IMUNITETUI SU EŽIUOLE, 30 tablečių **11⁹⁸ €**
MAISTO PAPILDAS

-35% **12³⁴ €**
~~18⁹⁸ €~~



AMBIO
HOT HERBAL DRINK, milteliai karštam gėrimui, 20 paketėlių
MAISTO PAPILDAS

-40% **7⁷⁹ €**
~~12⁹⁸ €~~



RUTIN FORTE + C 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
„Rutin forte-C“ sudėtyje yra rutozido, vitamino C, cinko ir seleno. Normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių funkcijai, susidarymą padeda palaikyti vitaminas C. Normalią imuninės sistemos veiklą padeda palaikyti vitaminas C, cinkas ir selenas. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną.

-35% **9⁰⁹ €**
~~13⁹⁸ €~~



AMBIO
SINUREN, 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS

-15% **35⁶⁹ €**
~~41⁹⁸ €~~



LIDONIUM®, 700 mg, 42 tabletės
SPECIALIOS MEDICININĖS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAS SU UGNIAŽOLE
Tik mitybai reguliuoti esant susilpnėjusiam ląsteliniam imunitetui, **vėžio profilaktikos metu**, siekiant pagerinti onkologinių ligonių gyvenimo kokybę ir esant skrandžio, žarnyno, kepenų ir tulžies pūslės latakų, kvėpavimo takų spazmams, uždegimams.

-40% **7⁷⁹ €**
~~12⁹⁸ €~~



VITAMIN C PROLONG, 40 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
„Vitamin C prolong“ kapsulėse yra prailginto veikimo patentuotas vitaminas Ester-C®. Moksliniai tyrimai rodo, kad patentuota Ester-C forma organizme išlieka iki 24 valandų, nedirgina skrandžio, nėra toksiška kepenims, lečiau pašalinama iš organizmo. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, taip pat apsaugoti organizmą nuo oksidacinių pažeidimų bei sumažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: „Vitamin C prolong“ gerti po 1 kapsulę per dieną, užgeriant stikline vandens.

ŪMINIO BRONCHITO SIMPTOMAMS MAŽINTI, ATSIKOSĖJIMUI LENGVINTI

9⁹⁹ €



UMCKALOR®
UMCKALOR® geriamieji lašai (tirpalas), 20 ml
UMCKALOR® 20 mg, 15 plėvele dengtų tablečių
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas. Lašai. 1 g (= 0,975 ml) tirpalo yra 800 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto (1:8-10). Ekstrakcijos tirpiklis: 11 % (m/m) etanolis. Tabletės. 1 plėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg Pelargonium sidoides DC., radix (pelargonijų šaknų) skystojo ekstrakto, džiovinto (1 : 8-10). Ekstrakcijos tirpiklis: 11% (m/m) etanolis. **Indikacijos.** „Umckalor“ yra augalinis vaistas, skirtas ūminio bronchito simptomams mažinti, atsišiosėjimui lengvinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Lašai. Jei gydytojas nepaskyrė kitaip, įprasta dozė yra: a) suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų amžiaus paaugliams gerti po 30 lašų 3 kartus per dieną, b) vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus gerti po 20 lašų 3 kartus per dieną, c) mažiems vaikams nuo 1 iki 5 metų gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną. Lašus gerti su nedideliu vandens kiekiu ryte, dieną ir vakare. Tabletės. Suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų amžiaus paaugliams vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Vartoti nekrmant, užgeriant nedideliu kiekiu vandens. **Kontraindikacijos.** Alergija Pelargonium sidoides ekstraktui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. (Papildomai lašams) jeigu sergate sunkiomis kepenų ligomis, kadangi nėra pakankamai patirties. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Umckalor“; jeigu turite bet kokio pobūdžio kepenų veiklos sutrikimų, jeigu Jūsų būklė nepagerėja per 7 dienas, temperatūra laikosi kelias dienas, pasireiškia bet kokio pobūdžio kepenų veiklos sutrikimas, vargina dusulys arba atkostiše skreplių su krauju, kreipkitės į gydytoją. (Papildomai tabletėms) Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Reklamos teksto parengimo data** 2025.01.31

GAMTOS JĖGA PRIĖS KOSULI!

-30%



SILVANOLS

MAISTO PAPILDAS!

„Faringospray KIDS“ – **NAUJIENA!** Purškalas gerklei vaikams su čiobeliais ir liepžiedžiais. Čiobeliai ir liepžiedžiai padeda palaikyti normalią gerklės, ryklės ir burnos ertmės būklę. Vaikams nuo 4 metų amžiaus. Be etanolio. Be konservantų. Be dirbtinių dažiklių.
„Faringospray“ ir „Faringospray Orange“ – purškalas gerklei su šaltalankiais ir medetkomis. Medetkos padeda palaikyti normalią gerklės, ryklės ir burnos ertmės būklę bei normalią kvėpavimo takų veiklą. Šaltalankiai padeda palaikyti normalią gleivinių būklę. Galima rinktis klasikinį arba apelsinų skonį. Nuo 12 metų. Be etanolio. Be konservantų. Be dirbtinių dažiklių.
„Laringospray“ – purškalas gerklei su propoliu ir medetkų žiedų tinktūra. Propolis padeda palaikyti burnos ir gerklės gleivinės apsaugą. Medetkų žiedai tradiciškai vartojami normaliai gerklės ir burnos ertmės funkcijai palaikyti. Glicerolis užtikrina malonią konsistenciją ir padeda išlaikyti gleivinės drėgmę. Nuo 12 metų. Be dirbtinių dažiklių.
„Faringo“ minkštosios pastilės su hialurono rūgštimi, šaltalankių aliejumi, sviarožėmis, vitaminais B ir C. Minkštosios pastilės sveikina burnos ertmės gleivinę, o kruopščiai atrinktos sudedamosios dalys gali padėti palaikyti normalią gleivinių funkciją. Nuo 4 metų. Be GMO. Be cukrų. Be laktazės.
„Faringo“ ledinukai su šaltalankiais ir vitaminu C – šaltalankiai padeda palaikyti normalią gleivinių būklę. Vitaminas C palaiko tinkamą imuninės sistemos veiklą. Be konservantų. Be dirbtinių dažiklių.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis preklms

ODOS IR LŪPŲ PŪSLELINEI GYDYTI

5⁹⁹ €**ACIC**, 5 % kremas, 2 g**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 g kremo yra 50 mg acikloviro. **Terapinės indikacijos:** odos ir lūpų pūslelinę, kurią sukelia *Herpes simplex* virusas, gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** pažeistą odos vietą tepti plonu sluoksniu 5 kartus per parą kas 4 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas aciklovirui, valaciklovirui, propilenglikoliui arba bet kurioms pagalbinėms medžiagoms. Netepiti ant gleivinės (burnos, akių, makšties). **Specialūs įspėjimai:** vaisto draudžiama nuryti. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2601069662. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSLELINĘ SU „ACIC“!

6⁹⁹ €**FENISTIL**, 1 mg/g gelis, 30 g**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Indikacijos: Niežulio, susijusio su odos išbėrimu, dilgeline, vabzdžių įkandimu arba saulės ar kitokių priežasčių sukeltu paviršinių odos nudegimų, trumpalaikis malšinimas. **Vartojimas:** Pažeistą odos plotą tepti 2-4 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** Alergija dimetindeno maleatui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** Jei niežulys labai sunkus arba oda labai pažeista, jei simptomai per 7 d. nepalengvėja, būtina kreiptis į gydytoją. Jei gelio tepamas didelis odos plotas, ilgai būti saulėje draudžiama. Kūdikiams ir vaikams iki 2 m. didelio odos ploto, ypač apimto uždegimo arba pažeisto, gelio tepti draudžiama. Nevartoti ant gleivinės. Sudėtyje yra propilenglikolio ir benzalkonio chlorido. Teksto parengimo data 2025-02. Prekių ženkliai priklauso HALEON arba HALEON turi jų licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas.

PĖDŲ IR ODOS GRYBELIUI GYDYTI

NUO 6⁹⁹ €**EXODERIL**

10 mg/ml odos tirpalas, 10 ml 6⁹⁹ €
10 mg/ml odos tirpalas, 20 ml 12⁹⁹ €
10 mg/g kremas, 15 g 8⁹⁹ €
10 mg/g kremas, 30 g 10⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 g vaisto yra 10 mg naftifino. **Terapinės indikacijos:** „Exoderil“ tirpalas naudojamas pėdų grybeliui gydyti. „Exoderil“ kremas naudojamas rankų, pėdų, odos grybeliams, įvairiaspalvei dedervinei bei uždegiminiams dermatomikozėms gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** pažeistą odą ir aplink ją esantį plotą tepti 1 kartą per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas naftifinui arba pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** saugoti, kad vaisto nepatektų į akis ir atvirus žaizdas. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2601069669. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

ODOS PAŽEIDIMAMS GYDYTI

-15%

**BISILVALOE® SPRAY**

50 ml 44²³ 9⁶⁰ €
125 ml 46⁰³ 13⁶⁸ €

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Bisilvaloe“ spray – purškiamieji mineraliniai milteliai, kurių sudėtyje yra 2,5 % joninio sidabro ir alavijų. Priemonė skirta žaizdoms, nubrozdinimams, nedidelėms nudegimams ir odos įopijoms gydyti. Reguliuoja žaizdos šlapiavimą, sukuria švarią ir drėgną terpę, lengvinančią natūralų gijimo procesą, saugo žaizdą nuo išorinių bakterijų dauginimosi. Vartojimo būdas: prieš naudojimą žaizdas išvalykite fiziologiniu tirpalu. Telpykė gerai supurtę purškite trumpais laiko intervalais, lengvai paspausdami dozatorių ir nukreipdami purškiklį į pažeistą vietą.

SKUBI PAGALBA PAŽEISTAI ODAI.

-30%

**AMEDIPLUS**Lūpas apsaugantis balzamas su pantenoliu, 4,5 g 5⁵³ 3⁹¹ €Rankų kremas su pantenoliu, 100 ml 6⁵³ 4⁶¹ €**KOSMETIKOS PRIEMONĖS**

-20%

**AMEDIPLUS**Vandeniui atsparūs pleistrai, 7 x 2 cm, 10 vnt. 4⁶³ 1³⁵ €Vandeniui atsparūs pleistrai, 7 x 3,8 cm, 10 vnt. 2⁰³ 1⁶⁷ €Vandeniui atsparūs, permatomi pleistrai, 7 x 2 cm, 10 vnt. 4⁷³ 1⁴³ €Vandeniui atsparūs pleistrai, 2,5 cm, 10 vnt. 4²³ 1⁰³ €Vandeniui atsparūs, karpomas pleistrai, 6 x 100 cm 2¹³ 1⁷⁵ €Pleistrai su alavijų ekstraktu, 7 x 2 cm, 10 vnt. 4⁸⁵ 1⁴⁸ €Juodi aksominiai pleistrai, 7 x 2 cm, 10 vnt. 4⁷³ 1⁴³ €**MEDICINOS PRIEMONĖS**

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!

**AMEDIPLUS**pleistrai nuo lūpų pūslelinės, 15 vnt. 16⁴⁹ €**MEDICINOS PRIEMONĖ**

-30%

**AMEDIPLUS**Propolio aliejus, 15 ml 5³³ 4¹⁹ €Propolio - medetkų kremas, 40 g 6³³ 4⁸⁹ €**KOSMETIKOS PRIEMONĖS**

ODOS PRIEŽIŪRA

-20%

BEPANTHEN® ANTI-EXEM
kremas, 50 g **14⁹² 11⁹⁸ €**

MEDICINOS PRIEMONĖ

Kliniškai patikrintas kremas be hormonų slopina atopinės egzemos (atopinio dermatito), odos išsausėjimo sukeltą niežėjimą ir paraudimą, atstato apsauginę odos barjerą. Numalšina odos niežėjimą vos per 30 minučių, poveikis šiek tiek mažesnis 7 valandas. Kremą galima vartoti tiek gydymo hormoniniais preparatais, tiek pertraukų tarp hormoninio gydymo metu. Tinka kūdikiams, vaikams ir suaugusiems. Galima vartoti nešutimo ir žindymo laikotarpiu, odai apie aks.

BEPANTHEN SENSICONTROL®

prausimosi gelis, 400 ml **17⁹⁸ 14⁹⁹ €**
kremas, 200 ml **17⁹⁸ 14⁹⁹ €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Bepanthen SensiControl“ – kasdienis prausimosi gelis jautriai ir į jėgumą linkusiai odai. Nuramina, drėkina odą, prisitaiko prie jūsų odos pH, saugo natūralią odos barjerą ir mikrobiomą. Sudėtyje yra provitaminų B5 ir prebiotikų. Tinka visai šeimai.
„Bepanthen SensiControl“ – kremas, skirtas jautriai, atopinei, į egzemą linkusiai odai. Kliniškai patikrinta „Demo-Defense“ formulė, papildyta prebiotiku, suteikia kasdienę odos apsaugą: palaiko odos apsauginę mikrofiorą, stiprina odos barjerinę funkciją, užtikrina ilgalaikį, iki 24 val. trunkantį, drėkinimą ir padeda raminti sausą, niežtinčią odą. Greitai įsigeriantis kremas tinka kūnui, veidui ir akių vokams. Tinka visai šeimai.
Reklamos teksto parengimo data: 2026-02. CH-20260209-57

„BEPANTHEN“ PRODUKTŲ LINIJA | EGZEMĄ LINKUSIOS ODOS SVEIKATAI!

NIŽŪLIUI MALŠINTI

5⁹⁹ €



GRIVIX, 1 mg/g gelis, 30 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: kiekviename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato. Pagalbinės medžiagos: benzalkonio chloridas ir propilenglikolis. **Terapinės indikacijos:** dermatozės, dilgėlinės, vabzdžių įkandimo, nudegimo saulėje arba paviršutinio odos nudegimo (pirmojo laipsnio) sukeltą niežėjimo trumpalaikis malšinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** vaikams, suaugusiems ir senyviems pacientams: ant pažeistos ir niežtinčios odos GRIVIX reikia tepti plonu sluoksniu 2-4 kartus per parą. Kūdikiams ir mažiems vaikams (jaunesniems nei 2 metų amžiaus) reikia vengti vartoti ant didelį odos plotu. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Antrojo ir trečiojo laipsnio nudegimai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jei GRIVIX gydymas didelis odos plotas, reikia vengti ilgalaikio šių paviršių saulės apšvietimo. Kūdikiams ir mažiems vaikams (jaunesniems nei 2 metų amžiaus) didelio odos ploto, ypač pažeisto ar apimto uždegimu, gelio tepti reikia vengti. Vaistinio preparato sudėtyje yra benzalkonio chlorido, kuris dirgina, gali sukelti odos reakcijų, ir propilenglikolio, kuris gali sudirginti odą. Reklamos teksto parengimo data: 2026-02.

NURAMINK SUDIRGINĄ IR NIEŽTINČIĄ ODĄ!

ŽAIZDŲ GIJIMUI SKATINTI

-20%



HELP4SKIN

WOUND HEALING, gelis, 20 g **6⁹⁹ 5⁹⁹ €**
WOUND HEALING, gelis, 50 g **12⁹² 10³⁸ €**

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Help4skin Wound Healing“ yra hidrokoloidinis gelis be parabenų, skirtas lokaliai sausų ir šlapų žaizdų priežiūrai bei jų gijimui skatinti. Skirtas gydyti ūminiams ar lėtinėms žaizdoms, tokioms kaip: žaizdos (įskaitant chirurgines); įpjovimai, įbrėžimai; odos nuorodiniai ir įtrūkimai; atviros kojų opos; paviršiniai nudegimai (I ir II laipsnio); pragulos. Galima naudoti vyresniems nei 2 m. vaikams.

PAPRASTA IR EFEKTYVU.

NUO PLEISKANOJIMO

14⁹⁹ €

KETOCONAZOL-RATIOPHARM

20 mg/ml, šampūnas, 120 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Terapinės indikacijos. Galvos seborėjos ir pleiskanojimo (Pityriasis capitis) gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** „Ketoconazol-ratiopharm“ šampūnas skirtas pauguliams ir suaugusiems pacientams. Plaukiant galvą plaukai itinami „Ketoconazol-ratiopharm“ šampūnu ir paliekama veikti 3-5 min., po to nuplaunama vandeniu. Gydymas. Šampūnas naudojamas 2 kartus per savaitę, gydymo kursu trukmė – 2-4 savaites. Profilaktika. Norint išvengti simptomų pasikartojimo, plaukai ir galvos oda šio šampūnu turi būti plaunami kartą per savaitę arba kas antrą savaitę. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Reikia saugotis, kad šampūno nepatektų į akis. Patekus į akis, jas reikia gerai praplauti vandeniu. Pleiskanojimas ir seborėjinis dermatitas dažnai būna susiję su plaukų slinkimu, tai, nors ir retai, tačiau taip pat pasitaiko naudojant „Ketoconazol-ratiopharm“ šampūną. Pacientams, ilgai vartojantiems vienoje odos vietoje vietinių gydymų kortikosteroidus, rekomenduojama tokių gydymų pailginti per 2-3 savaites užbaigti, kad naudojant „Ketoconazol-ratiopharm“ šampūną būtų išvengta ligos pasikartojimo. Šio vaistinio preparato kvapiosios medžiagos sudėtyje yra o-izometiljonono, benzilo alkoholio, benzilbenzoato, citralo, bergamotų citrinmedžių (*Citrus aurantium bergamia*) žievelių eterinio aliejaus, karčaviųjų citrinmedžių žievelių eterinio aliejaus, tikrųjų citrinmedžių (*Citrus limon*) žievelių eterinio aliejaus, kumarino, heksametilindanopirano / galaktozido, heksilcinamaldehidu, imoneno, linalolio, linalilo acetato, pino, terpentino, kurie gali sukelti alerginių reakcijų. Kiekvienam šio vaistinio preparato mililitre yra 100 mg natrio laurilsulfato, kuris gali sukelti vietinių odos reakcijų (gelimo arba deginimo pojūtį) arba sustiprinti odos reakcijas, kurias sukėlė joje pačioje vietoje pavartoti kiti preparatai. **Teksto peržiūros data** 2026-03-19. **Reklaminės medžiagos parengimo data** 2026-05. OTC-11-0017

NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO

NUO 2⁴⁹ €

APAP

500 mg, 12 plevėle dengtų tablečių **2⁴⁹ €**
500 mg, 24 plevėle dengtos tabletės **4⁴⁹ €**
250 mg granulės paketėlyje, vaikams, 10 paketėlių **6⁹⁹ €**
EXPRESS, 500 mg, 10 minkštųjų kapsulių **2⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 plevėle dengtoje tabletėje „APAP 500 mg“ yra 500 mg paracetamolio. 1 minkštojoje kapsulėje „APAP express, 500 mg“ yra 500 mg paracetamolio. 1 paketėlyje „APAP 250 mg“, vaikams“ yra 250 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos:** lengvo ar vidutinio skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** „Apap express, 500 mg“ minkštosios kapsulės: suaugusiems ir pauguliams, sveriantiems daugiau kaip 55 kg (nuo maždaug 15 metų) 1-2 minkštosios kapsulės (500-1 000 mg) vienu metu, ne daugiau kaip 6 kapsulės (didžiausia paros dozė – 3 000 mg) kas 24 val. „Apap, 500 mg“ plevėle dengtos tabletės: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1-2 tabletes kas 4-6 val., ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. „Apap, 250 mg, vaikams“ granuliuose paketėliuose vienkartinė dozė yra 10-15 mg/kg kūno svorio vyresniems nei 4 m. vaikams, ja vartoti ne dažniau kaip kas 4 val. (didžiausia paros dozė – 4 paketėliai). Granulės supilti įsiai į burną ant liežuvio ir praryti neįdegus vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas paracetamolui, žemės riešutams ar sojai, arba bet kuriai vaisto sudėtyje esančiai pagalbinei medžiagai. Sunkus inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai:** prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku, jeigu: yra inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka; piktnaudžiaujantiems alkoholiu, dehidratuotiems arba nuolat blogai besimatinantiems; sergantiems astma; vartojami kai kurie kiti vaistai: nėštumo ir žindymo laikotarpis; hemolizinė anemija. Gydantis šiais vaistais preparatais alkoholio vartoti negalima. Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Teksto parengimo data: 2025-03-31.

„APAP“ – IR TU VĖL SAUG VĖŽES.

NUO SKAUSMO

NUO 7⁹⁹ €

OLFEN®

140 mg, 2 vaistiniai pleistrai **7⁹⁹ €**
140 mg, 5 vaistiniai pleistrai **12⁹⁹ €**
140 mg, 10 vaistinių pleistrų **21⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiaga, stiprumas: 1 vaistiniame pleistre yra 140 mg diklofenako natrio druskos. **Terapinės indikacijos:** lokalus skausmo, sukeltą (pvz., sporto traumas) dėl ūmaus sausgyslių, raščių, sąnarių ar raumenų patempimo, sumušimo ar sąnarių pažeidimo, malšinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems 1 vaistinį pleistrą reikia priklijuoti ant skaudamos vietos 2 kartus per dieną – rytą ir vakarą. Maksimali dienos dozė yra 2 vaistiniai pleistrai, net jeigu pažeista daugiau nei viena vieta. Vienu metu gydoma tik viena pažeista vieta. Naudoti ant odos. Pleistras neturėtų būti dalijamas. Jeigu reikia, pleistras prieš skaudamos vietos gali būti pritvirtinamas elastiniu tvarsčiu. Gydoma ne ilgiau kaip 7 dienas. „Olfen“ pleistro jaunesniems kaip 15 m. pacientams naudoti nerekomenduojama. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei kitiems skausmą ir uždegimą slopinantiems nesteroidiniams vaistiniams preparatams (NVNU) arba acetilsalicilo rūgščiai, astma, dilgėlinė ar ūminis rinitas, kure pasireškę pavartojus acetilsalicilo rūgšties arba kitų NVNU; esama skrandžio ar žarnų opos; atviros žaizdos, nudegimai, odos infekcijos ar egzema; psichiniai trys nėštumo mėnesiai. **Specialūs įspėjimai:** jeigu simptomai keliai ilgiau kaip 3 d. arba pablogėja, reikia kreiptis į gydytoją. Pacientams, kurie serga ar anksčiau sirgo bronchine astma arba alergijomis, gali būti bronchi spazmas. Jeigu pavartojus vaistinio pleistro atsirado išbėrimų, gydymą reikia nedelsiant nutraukti. Gydymą vietą reikia saugoti nuo tiesioginių saulės ir ultravioletinių spindulių (1 diena), kad nepasireikštų padidėjusio jautrumo šviesai reakcija. Vaistinį preparatą atbargiai turi naudoti pacientai, kurių inkstų, kepenų ar širdies funkcija yra sutrikusi arba jeigu praėjusio buvo pėsinė opa, žaizmų uždegimas ar yra polinkis kraujuoti. Preparatą atbargiai reikia naudoti senyviems pacientams, nes yra didesnis nepageidaujamo poveikio pavojus. Sudėtyje esantys propilenglikolis ir butilhidroksitolienas gali sukelti lokalių vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivinę. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-01-22. OLF-11-0048

TEISINGAS ĖJIMAS KOVOJANT SU SKAUSMU!

-60% ANTRAI TOKIAI PACIAI ARBA PIGESNEI

AMEDIPLUS

Pleistrai pūslelms, 6,9 x 4,4 cm, 5 vnt. **5¹⁹ €**
Pleistrai pūslelms, 2 x 6 cm, 5 vnt. **4⁹⁹ €**

MEDICINOS PRIEMONĖS

-20% 0⁷⁶ €

AMEDIPLUS

pipirinis pleistras 12 x 16 cm, 1 vnt.
MEDICINOS PRIEMONĖ





SKIEPAI NUO ERKINIO ENCEFALITO

SU
LOJALUMO
KORTELE

28⁹⁹ €

SKIEPO KAINA
BE KORTELĖS

31⁹⁹ €



Galima išankstinė registracija:

- internetu www.nvaistine.lt/skiepai
- telefonu **+370 800 10 008**



Nuolaidos taikomos
su PC Norfa kortele.
Akcijos „Laimės valandos“
nuolaidos netaikomos.

-35%Perkant bent
DVI bet kurias
pakuotes**„NEW NORDIC“ MULTIVITAMINAI****MAISTO PAPILDAI**

Skandinavų bendrovės „New Nordic“ multivitaminai – tai puikiai suderinti vitaminų, mineralų, mikroelementų ir augalinių ekstraktų kompleksai imunitetui ir gerai savijautai. „Multivitamin active woman“ – moterims, besirūpinančioms gera savijauta ir grožiu. „Multivitamin active woman 55+“ – vyresnių moterų organizmo poreikiams. „Multivitamin pregnant and breastfeeding woman“ – besilaukiančioms moterims ir žindymams. „Multivitamin active man“ ir „Multivitamin active man energy boost“ – vyrams. Nepamiršome ir mažųjų – „Mineralai kaulams“, apelsinų arba miško uogų skonio kramtomosios tabletės – kalcio, magnio ir vitamino D šaltinis augančiam organizmui. „Multi vegan GUMMIES“ – gaivaus vaisių ir uogų skonio multivitaminai guminiukai imunitetui. Tinka visai šeimai, taip pat vegetarams ir veganams. Sudėtyje esantys vitaminai A, C, D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

JAUSKITĖS PUIKIAI!**-25%****SMARTHIT IV****EFEKTYVAUS PASISAVINIMO MAISTO PAPILDAI**

Miosol technologijos dėka pagaminami produktai, kurie pasisavinami itin gerai. Be to, mikrokapsulės sumažina šalutinių poveikių riziką. Efektyvus pasisavinimo maisto papildų **SMARTHIT IV** liniją sudaro:

SMARTHIT IV[®] Lactoferrin. Laktoferrinas – tai geležį surišantis baltymas, dalyvaujantis geležies pasisavinimo procese. Galima vartoti kartu su **SMARTHIT IV[®] Ferrum** kapsulėmis arba **SMARTHIT IV[®] Ferrum Liquid** skysta geležies forma, tinkančia suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų. Geležis padeda palaikyti normalų hemoglobino ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą. **SMARTHIT IV[®] Ferrum Strong** – tai išmanus ir kompleksinis sprendimas, padedantis efektyviai palaikyti geležies atsargas organizme. 2 kapsulėse – 40 mg mikrokapsuliuotos geležies versija su bioaktyvia folio rūgštimi bei aminorūgštimi L-histidinu. **SMARTHIT IV[®] Vitamin D3** – kaulams, dantims, raumenims. **SMARTHIT IV[®] Vitamins D3+K2** – sinerginis, vitaminų D3 ir K2 poveikis kaulams ir kraujotakai; **SMARTHIT IV[®] Vitamin B12** – normaliai kraujodarai bei psichologinei funkcijai palaikyti ypač daug dirbančioms ir besimokančioms; **SMARTHIT IV[®] Polifen** – polifenolių šaltinis gerai savijautai. **SMARTHIT IV[®] Curcumin** – mikrokapsuluota kurkumino forma imūninei sistemai, kepenų funkcijai, normaliam cholesterolio lygiui kraujyje palaikyti. **SMARTHIT Curcumin+Beta-glucans** – mikrokapsuluotas kurkuminas su beta gliukanais nuo siol ir kapsulėmis imūninei sistemai, cholesterolio ir gliukozės kontrolei. Išbandykite!

„SMARTHIT IV“ – MENAS VEIKTI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtos prekės

-30%**ARTILANE****MAISTO PAPILDAI**

Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno susidarymą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. **Cinkas** padeda palaikyti normalią plaukų, nagų, odos būklę, atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese. **Magnis** padeda išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, normalią raumenų funkciją, normalią baltymų sintezę, normalią kaulų būklę, normalią nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtos prekės

-30%**1^{30€}**
1^{18€}**„DINADAX“ KRAMTOMOSIOS LAZDELĖS****MAISTO PAPILDAI**

„Dinadax Active“ – maisto papildas su laktobakterijomis, fruktooligosacharidais, bičių pieneliu, vitaminais B1 ir B6. „Dinadax Energy“ – maisto papildas su bičių pieneliu, želatina ir B grupės vitaminais. „Dinadax Sapiens“ – maisto papildas su cholino bitartratu, omega-3, linolo ir oleino rūgštimis, vitaminais, folio rūgštimi, biotinu ir cinku. **KRIMSK PASIGARDŽIUODAMAS!**

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtos prekės

-25%**VIRIDIAN****MAISTO PAPILDAI**

„Viridian“ – tai natūralūs, aukštos kokybės vitaminai ir maisto papildai, sukurti remiantis mokslu, etiška gamyba ir gryna sudėtimi.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtos prekės

-30%**3^{70€}**
3^{59€}**TRAVELOK, 10 kapsulių****MAISTO PAPILDAS**

Imbieriai padeda palaikyti normalią savijautą keliaujant.

-10%**6^{29€}**
6^{26€}**ELEUTEROKOKŲ SKYSTASIS EKSTRAKTAS, 50 ml****MAISTO PAPILDAS**

Sudedamosios dalys: eleuterokokų šaknų su šakniastiebiais (*Eleutherococcus rhizomata et radices*) etanolinė išstrauka 1:1 (etanolis, eleuterokokų šaknų su šakniastiebiais). Sudėtyje yra ne mažiau kaip 33 tūrio % etanolio. Vartojimas: suaugusiems gerti po 10 lašų 2 kartus per dieną 30 min. prieš valgį. Prieš vartojimą suplakti. Rekomenduojame suvartoti per parą kiekįje (20 lašų) yra apie 0,75 ml eleuterokokų skysto ekstrakto. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Gamintojas: „Ternofarm“, Ukraina. Išskirtinis importuotojas ir platintojas Lietuvoje: UAB „VERATRUM PHARMA“, Žarijų g. 28, Vilnius.

ŠLAPIMO TAKŲ SISTEMAI

-30 %



URINAL

MAISTO PAPILDAS

NAUJENAI „Urinal Cranberry Gummies“ guminukai – sudėtyje yra proantocianidinų: 18 mg PAC viename guminuke. Tinka visi šeimai. Nuo 3 metų.

„Urinal Akut“ tabletės – unikalus spanguolių ekstrakto, paprastųjų rykštenių ir vitamino D derinys normaliai šlapimo takų funkcijai palaikyti. Paprastosios rykštenės padeda palaikyti normalią šlapimo takų funkciją.

„Urinal“ kapsulės – sudarytos iš unikalių maistingų medžiagų kombinacijos: džiovintų spanguolių (*Vaccinium macrocarpon*) sulčių koncentrato, didelės koncentracijos spanguolių (*Vaccinium macrocarpon*) sulčių ekstrakto „Exocyan™“, paprastųjų rykštenių (*Solidago virgaurea*) ekstrakto ir vitamino D. 2605_SB_Urinal_V01_LT

DEGINIMO POJŪTIS? NELAUKITE IR VEIKITE IŠKART!

*Kicija taikoma geltona etikete pažymėtos prekės

URINAL

D-MANNOSE, 2000 mg,
14 šnypščiučių tablečių

20²² 14⁵⁵ €

MEDICINOS PRIEMONĖ

NAUJENAI „Urinal D-Mannose“, 2000 mg, medicinos priemonė. Padeda išvengti pasikartojančių šlapimo takų infekcijų, cistito, kuriuos sukelia bakterija E. coli. Pagalbinė priemonė gydant šlapimo takų infekcijas.

ENERGIJAI, GROŽIUI, VIRŠKINIMUI, SVORIO KONTROLEI

IKI -30 %



ACORUS BALANCE

MAISTO PAPILDAS

„Acorus Balance“ produktų linija skirta subalansuotam gyvenimui.

Asortimente rasite skirtingų produktų, įvairioms organizmo funkcijoms palaikyti: imunitetui, grožiui, virškinimo ir žarnyno funkcijai, svorio kontrolei, sąnariams. Produktai pasižymi išskirtinėmis vartojimo formomis – nuo guminukų ir vienadozių butelių.

*Kicija taikoma geltona etikete pažymėtos prekės

ANTIALERGINIS VAISTAS

5¹⁵ €

OPEXA®, 20 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Terapinės indikacijos: „Opexa“ vartojamas šienligės (kuriai būdingi simptomai yra čiaudulys, niežulys, sloga, užgulta nosis, paraudusios ir ašarojančios akys) ir kitų alerginio rinito formų simptomams slopinti. Jis taip pat gali būti vartojamas niežintiems odos išbėrimams (pūkslėms arba dilgėlinei) gydyti. Kontraindikacijos: „Opexa“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija bilastinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jei Jums nustatytas vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų veiklos sutrikimas ir vartojate kitų vaistų. Neduokite šio vaisto jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Neviršykite rekomenduojamos dozės. Gydymo trukmė priklauso nuo jūsų ligos simptomų, trukmės ir eigos. Nevartokite „Opexa“ ilgiau nei 10 dienų nepasikonsultavę su gydytoju. Jei po 3 dienų jūsų savijauta nepagerėja nuo jūsų lėigos simptomų, kreipkitės į gydytoją. Dozavimas ir vartojimo metodas: rekomenduojama dozė suaugusiems, įskaitant senyves žmones ir 12 m. bei vyresnius paauglius, yra 1 tabletė (20 mg) per dieną. Tabletę reikia nuryti nevalgius, į valandą prieš valgį arba sulčių gerimą, arba praėjus 2 valandoms po valgyto ar sulčių gerimo. Reklama paruošta 2024-10. LT_Ope_15_2024_pharma UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, LT-05163 Vilnius, Lietuva.

SUTRAMDYK ALERGIJĄ!

INKSTAMS IR ŠLAPIMO TAKAMS

-20 %

9^{99€} 12^{40€}

FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Fitolizyna Nefrocaps PLUS“ yra unikalus 7 koncentruotų augalinių ekstraktų mišinys, kuris: – padeda palaikyti normalią inkstų ir šlapimo takų veiklą (petražolių šaknis, dirvinio asišiklio žolę, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, karpotųjų beržų lapai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolę); – padeda palaikyti normalų vandens pašalinimą iš organizmo, todėl skatinamas nepageidaujamų metabolizmo produktų šalinimas su šlapimu (dirvinio asišiklio žolę, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolę). **Rekomenduojamas vartojimas:** 1 kapsulė 2 kartus per parą prieš valgį, užgeriant dideliu kiekiu vandens (ne mažiau kaip ½ stiklinės).

-10 %

2^{96€} 3^{20€}

GINTARO RŪGŠTIS, 20 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Vartojimas: gerti po 1 tabletę 3 kartus per dieną valgant. Rekomenduojamame suvartoti per parą kiekyje (3 tabletės) yra 0,3 g gintaro rūgšties. Gamintojas: UAB „Medicata Filia“, Žarijų g.2B, Vilnius. Išskirtinis platintojas Lietuvoje: UAB „VERATRUM PHARMA“, Žarijų g. 2B, Vilnius

-30 %



SVEIKAŽOLIŲ ARBATA

BRUKNIŲ LAPAI, 1,3g x 20 pak. 2²⁸ 1⁹⁵ €

MEDETKŲ ŽIEDAI, 1,2g x 24 pak. 2⁶⁸ 1⁸⁸ €

MEDETKŲ ŽIEDAI, 40 g 2⁹⁵ 2⁰⁷ €

MEŠKAUOGIŲ LAPAI, 1,3g x 20 pak. 2⁶⁸ 1⁸⁸ €

MEŠKAUOGIŲ LAPAI, 40 g 3⁶⁵ 2⁵⁶ €

RAMIOS DIENOS, 1,5 g, 20 vnt. 3⁴⁹ 2⁴⁴ €

RAMIOS DIENOS SU KANAPĖMIS, 1,5g, 20 vnt. 3⁵⁹ 2⁵¹ €

„Sveikazolių arbatos“ asortimente garuoja kruopščiai atrinkti vaistažolių mišiniai bei pavienius žolelių arbatos, svaiginančios gardžių skonių ir šildančių išidus.

-30 %



ŠALTALANKIŲ ALIEJUS

50 ml 4⁰⁵ 7⁴¹ €

100 ml 4³³ 9³⁷ €

MAISTO PAPILDAS

Šaltalankių aliejus padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir širdies veiklą, normalų virškinimą, normalią odos būklę. Vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą.

Dovana sveikatai



Daugiau informacijos bei vaistinių, kuriose negalima įsigyti
dovanų kuponų ir jais atsiskaityti, sąrašą rasite
www.nvaistine.lt

-40 %



SALVITIS COLLAGEN, 12000 mg, 15 buteliukų po 30 ml **39⁹⁹ 23⁹⁹ €**
MAISTO PAPILDAS

NUO ALERGIJOS

8⁹⁹ €**ALLERGODIL**

0,05 % akių lašai (tirpalas), 6 ml
0,1 % nosies purškimas (tirpalas), 10 ml

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Allergodil“, 0,1 %, nosies purškimas (tirpalas): 1 ml tirpalo yra 1 mg (0,1 %) azelastino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos.** Simptominis nuolatinės alerginės slogos arba sezoninės alerginės slogos (sienligės) gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Suaugusiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams įprastinė dozė yra 1 įpurškimas į šnervę 2 kartus per parą (ryte ir vakare). „Allergodil“ nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 6 m. vaikams. Vartoti į nosį. Purškiant vaistinio preparato į nosį, galvą reikia laikyti tiesiai. Vaistas tinka gydyti ilgą laiką. Nepasitarus su gydytoju, nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 4 savaites. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas azelastinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Nosies purškimas neskirtas vartoti į akis. Vengti kontakto su akimis. Vartojant kartu su alkoholiu, gali pasireikšti papildomas budrumo sumažėjimas. „Allergodil“, 0,05 %, akių lašai (tirpalas): 1 lašas tirpalo yra 0,05 mg azelastino hidrochlorido. 1 ml tirpalo yra 0,5 mg azelastino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos.** Simptominis suaugusiųjų ir vyresnių nei 4 m. amžiaus vaikų sezoninio alerginio konjunktyvito gydymas ir profilaktika. Simptominis suaugusiųjų ir vyresnių nei 12 m. vaikų nuolatinio (nesezoninio) alerginio konjunktyvito gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas. Abiem indikacijoms įprastinė dozė yra 1 lašas į kiekvieną akį 2 kartus per dieną. Smarkaus paūmėjimo metu dozė gali būti padidinta iki 4 kartų per dieną po 1 lašą į kiekvieną akį. Gydymo ciklas neturėtų viršyti 6 savaičių. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas azelastino hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Jaunesni kaip 4 m. vaikai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Allergodil“ netinka akių infekcijoms gydyti. Sudėtyje yra benzalkonio hidrochlorido, kuris gali sukelti akies sudirginimą, sausos akies simptomus ir gali daryti poveikį ašarų plevėlei bei ragenos paviršiui. Turi būti atsargiai vartojamas sergantiesiems akies sausme ir jei yra ragenos pažeidimo pavojus. Prieš „Allergodil“ vartojimą kontaktiniai lęšiai turi būti išimti ir prieš įdėdant juos atgal reikia palaukti mažiausiai 15 minučių. **Reklamos teksto parengimo data 2026-03-09.**

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

**AMBIO**

MAGNIS SU B6 FORTE, 30 tablečių **12⁹⁹ €**
MAISTO PAPILDAS

-30 %

4^{89€} ~~6^{99€}~~**ABC VIT**

VITAMINAS C, 500 mg, 50 braškių skonio tablečių

MAISTO PAPILDAS


Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės, nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

Epitome

GERAI JAUSTIS YRA KELIONĖ




-50% 18^{49€}
~~36^{98€}~~



EPITOME
CARDIOVASCULAR FORMULA, 90 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

-50% 13^{49€}
~~26^{98€}~~



AMBIO
VITAMINAS D3 4000IU, 120 minkštųjų kapsulių
MAISTO PAPILDAS

-35% 10^{00€}
~~15^{39€}~~

NAUJIENA



EPITOME
DIGESTIVE HEALTH & PROBIOTICS COMPLEX, 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

-35%



AMBIO
NERVŲ SISTEMAI, 15 kramtomųjų tablečių ~~7⁹⁹~~ 5¹⁹ €
MAISTO PAPILDAS

1+1 Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!



AMBIO
Ca+Mg+K+Zn+D3, milteliai geriamajam tirpalui, 30 pakelių 13⁹⁸ €
MAISTO PAPILDAS

1+1 Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!



AMBIO
KALCIS SU VITAMINAIŠ K2 IR D3, 60 tablečių 14⁹⁹ €
MAISTO PAPILDAS

1+1 Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!



VITADAY
KOMPLEKSAS KEPENIMS, 30 kapsulių 5⁹⁸ €
MAISTO PAPILDAS

-35%



AMBIO
LIPOSOMINIS VITAMINAS C SU KVERCETINU, 30 kapsulių ~~48⁹⁹~~ 12³⁴ €
MAISTO PAPILDAS

-30 %

**ROYAL DENTA****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

„Royal Denta“ burnos priežiūros priemonės sukurios remiantis mokslu ir odontologijos srities atradimais. Auksu ir sidabru praturtintų dantų pastų savybės ir jų poveikis patvirtintas nepriklausomoje sertifikuojoje laboratorijoje. Taip pat įrodyta, kad dantų šepetėliuose esantis auksas ir sidabras sunaikina iki 99,9% ant šepetėlių besikaupiančių bakterijų, todėl šepetėlį galima naudoti ilgiau. Be to, dviejų ilgų šerėlių pasiekia sunkiai prieinamas tarpdančių vietas, todėl dantys yra išvalomi geriau. Kartą išbandę, klientai ir vėl pasirenka „Royal Denta“. Rekomenduoją odontologai.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

IKI -40 %

**ODONTE**

balinamoji dantų pasta jautriems dantims, 75 ml ~~7⁹⁹~~ 4⁷⁹ € -40 %
 balinamoji ir dantenų sauganti dantų pasta, 75 ml ~~7⁹⁹~~ 4⁷⁹ € -40 %
 balinamoji ir gaivų burnos kvapą suteikianti dantų pasta, 75 ml ~~7⁹⁹~~ 4⁷⁹ € -40 %
 gaivų burnos kvapą suteikiantis burnos skalavimo skystis, 500 ml ~~8²⁹~~ 5²⁷ € -40 %
 regeneruojamasis burnos skalavimo skystis, 250 ml ~~9³⁹~~ 6⁷¹ € -30 %

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

ODONTE – tai patikimas ir dėmesys detalėms, užtikrinantis nepriekaištingą burnos priežiūrą kiekvieną dieną.

-30 %

**ELMEX****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

„Elmex“ produktai padeda kasdien jaustis komfortiškiau – nuo kliniškai patvirtintos kasdienės apsaugos iki specializuotos priežiūros jautriems dantims.

RINKITĖS PATIKIMUMĄ, RINKITĖS „ELMEX“.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

2+2

Keturių bet kurios
pakuotės už
DVIEJŲ KAINĄ!

**ODONTE**

dantų šepetėlis su sidabru, minkštas, 1 vnt. 4⁹⁹ €
 dantų šepetėlis su auksu, minkštas, 1 vnt. 4⁹⁹ €

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**TOBULAI BURNOS HIGIENAI**

-20 %

**CURAPROX****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

„Curaprox“ – tai aukščiausios kokybės šveičiamos burnos higienos priemonės: platus spektras dantų šepetėlių, tarpdančių šepetėlių, dantų pastų. Taip pat kūdikiams ir vaikams skirtos priemonės. „Curaprox“ dantų šepetėlių šerėliai gaminami ne iš nailono, o iš patentuotos „Curen“ medžiagos, todėl šie šepetėliai efektyviai pašalina apnašas, netraumuodami dantenu. Tarpdančių šepetėliai gaminami iš labai plonos, tačiau tvirtos „Cural“ patentuotos medicininės vielutės, todėl tarpdančius išvalysite kruopščiai ir be skausmo. Dantų pastos profilaktikai įvairaus amžiaus grupėms ir antibakterinė „Perio Plus“ linija.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-30 %

**„TEPE“ TARPĐANČIŲ ŠEPETĖLIAI****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

Tarpdančių šepetėliai padeda pasirinkti tinkamą burnos higieną, užtikrinti ne tik dantų, bet ir tarpdančių švarą bei palaikyti normalią dantenu būklę. Visi „TePe“ tarpdančių šepetėliai yra su laikikliu, specialiai pritaikytas šerėliais ir plastikui dengta vielute, todėl tarpdančiai išvalomi labai efektyviai.

„TEPE“ RŪPINASI SVEIKĄ ŠYPSENAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-20 %

**FITYDENT****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

„Fittydent“ – stiprus, ilgai laikantis fiksujamasis kremas, neleidžiantis protezams slįsti ir slankioti. Netirpus vandenyje ir atsparus rūgščiai, todėl neuoplaukamas skysčių ar seilių. „Fittydent“ dantų protezų fiksujamasis kremas garantuoja stiprų dantų protezų ir dantenu sukibimą.

NAUJAS PAKUOTĖS DIZAINAS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-30 %

**CURASEPT ADS****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

Curasept ADS priemonių išskirtinumas – vienintelė pasaulyje patentuota ADS sistema – formulė, kuri patikrins, kad Jūsų natūralių dantų spalva ir burnos receptorių veikla chlorheksidino preparato naudojimo metu nepakistų. Curasept ADS chlorheksidinas pasižymi itin stipriomis antibakterinėmis savybėmis, efektyviai naikina pavojingas bakterijas, taip užkirsdamas kelią ir apnašų deimuisi. Curasept ADS produkcijos sudėtyje nėra alkoholio, SLS, tad išvengsite burnos ertmės sausėjimo, skilėjimo bei dirglumo pojūčių. Curasept ADS sukurta ir subalansuota gingivitui, periodontitui mažinti, kraujaujančioms dantenoms gydyti. Taip pat skatina burnos audinių gijimą prieš ir po intensyvių burnos higienos ar kitų sudėtingų stomatologinių intervencijų. Tikime, kad sveikas kūnas bei turinčias gyvenimas, pirmiausia prasideda nuo sveikos burnos bei spindinčios šypsenos. Mes ne tik kalbame apie unikalumą, mes jį jau sukūrėme. Tu to dar nežinai, bet tai geriausia, kas galėjo nutikti tavo dantims...

PIRMI, NES MUMS RŪPI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-25 %**JORDAN****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

Platus dantų priežiūros priemonių asortimentas visai šeimai - nuo pirmo dantuko! Rinkitės dantų šepetėlius, pastas bei tarpdančių valymo priemones pagal savo individualius poreikius.

„JORDAN“ RŪPINASI ŠYPSENOMIS NUO 1927-ŲJŲ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – **NEMOKAMA!!**

**VELYM****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

„Velym pH neutro“ – klinikiniais tyrimais patikrintas balinamasis dantų kremas. Kasdienė apsauga. Sudėtyje – natūralios kilmės medžiagos ir 1450 ppm fluoro. Skirtas suaugusiems.

„Velym Mineral O3“ sudėtyje – ozono prisotintas alyvuogių aliejus. Daugiau dėmesio dantenoms. Aukštas apnašų valymo koeficientas (angl. Pellicle Cleaning Ratio, PCR).

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

SUAUGUSIŲJŲ IR VAIKŲ DANTŲ PRIEŽIŪRAI**IKI -30 %****ELGYDIUM****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

Dantų pastos „Elgydium“ siūlo specializuotus sprendimus dantų priežiūrai suaugusiems ir vaikams: dantenų problemoms spręsti, dantis balinti, jautriems dantis, dantų apnašų kontrolei bei eduoines prevencijas.

„ELGYDIUM“ - TOBULAI JŪSŲ ŠYPSENAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**

**SUNSTAR GUM, dantų pasta, 75 ml 13⁷⁵ €****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖ**

Jau daugiau kaip 80 metų „Sunstar“ yra viena burnos ertmės higienos priemonių gamybos lyderių.

Fluoridas padeda dantis greičiau įsisavinti mineralus ir saugo emalį nuo rūgščių poveikio. O sudėtyje esantis izomaltas padeda efektyviau įsisavinti fluoridą.

SVEIKOS DANTENOS, SVEIKESNIS GYVENIMAS.

BURNOS SKALAVIMO SKYSČIAI**IKI -30 %****ELUDRIL****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

„ELUDRIL Extra“ (0,2 % CHX, 1 Be alkoholio)

Trumpalaikis Intensyvus burnos higienai, rekomenduojamai po odontologinių procedūrų.

„ELUDRIL Classic“ (0,1 % CHX + chlorobutanolis)

Trumpalaikis burnos higienai, rekomenduojamai po odontologinių procedūrų ar esant padidėjusiam burnos higienos poreikiui.

„ELUDRIL Care“ (0,05 % CHX + 0,05 % CPC | Be alkoholio)

Kasdienis sustiprintas burnos higienai. Ypač tinka po odontologinių procedūrų, nešiojant ortodontinius aparatus ar prižiūrint implantus.

„ELUDRIL“ BURNOS SKALAVIMO SKYSČIAI - SPRENDIMAI SKIRTINGIEMS BURNOS HIGIENOS POREIKIAMS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

ZYLIA


3D WHITE, dantų pasta, 75 ml 8⁵⁵ €

PARODONT, dantų pasta, 75 ml 8⁵⁵ €

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Zylia 3D White“ dantų pasta nepriklaistingai burnos higienai padeda šalinti apnašas, vizualiai šviesina dantis ir suteikia gaivų burnos kvapą.

„Zylia Parodont“ dantų pasta – kasdienė dantų ir jautrių dantų priežiūra.



SKENUOKITE QR KODĄ IR
NORFOS VAISTINĖS
LEIDINIUS VARTYKITE
TELEFONE.





13⁹⁷ €

LOMEXIN

200 mg, 3 makšties minkštosios kapsulės
600 mg, 1 makšties minkštoji kapsulė

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Lomexin“ kapsulėje yra 200 mg arba 600 mg fentikazolo nitrato. Skirtas išorinių lyties organų ir makšties kandidozės lokaliai gydymui. „Lomexin“ vartoti į makštį 3 paras iš eilės po vieną 200 mg makšties kapsulę arba 1 kartą vartoti vieną 600 mg makšties kapsulę (prieš miegą). „Lomexin“ nevartojamas vaikams ir paaugliams iki 16 m. gydyti. Vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. „Lomexin“ 600 mg kapsulėje yra sojų lecitino – negalima vartoti pacientėms, kurios yra alergiškos žemės riešutams ar sojai. Kreipkitės į gydytoją ar vaistininką, jeigu esate nėščia ar maitinate krūtimi, simptomai nepagerėja per 1 savaitę ar pasikartoja daugiau nei 2 kartus per pastaruosius 6 mėnesius. Jūs ar Jūsų partneris kada nors sirgote lytiškai plintančiomis ligomis, Jums daugiau nei 60 metų, yra nustatytas jautrumas imidazolams ar kitiems priešgrybeliniams vaistams, pasireiškia nenormalus ar nereguliarius kraujavimus iš makšties, kraujingos makšties išskyros, vulvos ar makšties žaizdos, opos arba pūslelės, apatinės pilvo dalies skausmas arba sutrikęs šlapinimasis, nepageidaujamas poveikis, toks kaip paraudimas, niežėjimas ar išbėrimas, susijęs su gydymu. Vartoti nerekomenduojama, jeigu naudojate „barjerinį“ kontracepcijos metodą, pagamintą iš latekso, spermicidus, makšties ploviklius ar kitus makšties produktus. Reklamos teksto parengimo data 2026-05-RE_IT_LU_2026_475

Moters sveikatai



-20%

LOTAMILE

MEDICINOS PRIETAISAI, KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Lotamile“ ovulų sudėtyje yra polikarbofilo. Jis ilgiau išlaiko veikiąsias medžiagas makštyje ir taip palgina ovulų veikimą. Ovulės netepla, neišbėga, ilgiau veikia!
„Lotamile Hialuroni“ makšties ovulės su hialuronu rūgštimi, naudojamos esant makšties sausumui, atrofiniam vaginitui. Ovulės mažina niežulį, skausmą lytinių santykių metu, drėkina, sutepa makštį, neleidžia išsausėti, saugo jos ekosistemą.
„Lotamile Borti“ makšties ovulės, naudojamos gydant ar norint išvengti makšties infekcijų, tinka esant niežėjimui, nemaloniui kvapui, pakitusioms išskyroms.
„Lotamile Girls“ švelnus intymios higienos prausiklis, sukurtas mergaitėms nuo 1 metų. Prausiklis patikrintas dermatologu, nedirgina gleivinės, švelnina bei ramina sudirgusią odą, turi drėkinamąjį poveikį, užtikrina natūralią apsauginę gleivinės funkciją, palaiko tinkamą mergaitėlių intymių sričių terpę. Puikiai pakeičia muilą, dušo gelius, kurie gali būti per stiprūs ir dirginantys.
„Lotamile Soft“ intymios higienos prausiklis moterims idealiai tinka naudoti kasdien, turi šlapimo kvapą naikinantį, drėkinamąjį poveikį, užtikrina natūralią apsauginę gleivinės funkciją, palaiko intymių sričių rūgštinę terpę, kurios pH 4. Ypač rekomenduojamas ginekologinio gydymo metu, menstruacijų, nėsimo metu, po gimdymo.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



-70%

Antrai tokiai pačiai
arba pigesniai

HI GENIE!

BACTOR PROTECT, 7 makšties ovulės po 2 g 11²⁹ €
HYDRA INTENCE, 7 makšties ovulės po 2 g 11²⁹ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Hi Genie! Hydra Intence“: su hialuronu rūgštimi (natrio druska), vitaminais A ir E bei alavijų ekstraktu. Turi drėkinamąjį, apsauginį ir raminamąjį poveikį. Lengvina sudirgimą, niežėjimą, deginimo pojūtį, taip pat tinka dispareunijos dėl sumažėjusios ar dingusios sekrecijos atveju. Puiki priemonė makšties sausumui klimako, menopauzės ir pogimdyminiu laikotarpiu, sergant diabetu.

„Hi Genie! Bactor Protect“: su pieno rūgštimi, alavijų ekstraktu, propolio ekstraktu ir hialuronu rūgštimi (natrio druska). Turi apsauginį, atkuriamąjį ir raminamąjį poveikį. Rekomenduojama vaginozės, bakterinio ir grybelinio vaginito prevencijai bei gydymui. Mažina niežėjimą, deginimo pojūtį, šalina nemalonų kvapą. Galima naudoti sergant diabetu ir (arba) patiriant stresą bei siekiant išvengti infekcijų po chirurginių procedūrų.

Skubios pagalbos kontraceptikas



13⁹⁷ €

AVODELE 1,5 mg, 1 tabletė

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Avodele yra skubios pagalbos kontraceptikas, kurį galima pavartoti per 72 valandas (t. y. per tris paras) po lytinio akto, kurio metu kontraceptinės priemonės nebuvo naudotos arba naudota kontraceptinė priemonė nebuvo veiksminga. Avodele sudėtyje yra sintetinio hormono, veikliosios medžiagos, vadinamos levonorgesteliu. Suvartotas per 72 valandas po nesaugaus lytinio akto, jis 79 % atvejų apsaugo nuo nėsimo. Vartojamas šiais atvejais:

- lytinio akto metu nebuvo naudota kontraceptinė priemonė.
- jei kontraceptinė priemonė naudota netinkamai.
- Kaip vartoti Avodele. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Po nesaugaus lytinio akto išgerkite vieną tabletę kuo greičiau, bet ne vėliau kaip po 72 valandų (3 parų). Tablete geriausia išgerti per 12 valandų. Antrą tabletę išgerkite praėjus 12 val. (bet ne daugiau kaip 16 val.) po pirmosios tabletės išgėrimo. Jei žinote arba manote, jog nesate nėščia, Avodele galite vartoti bet kurią ciklo dieną. Tablete nurykite nekramtytą, užsigerkite vandeniu. Ji bus tuo veiksmingesnė, kuo greičiau ją išgėrsite. Avodele vartoti negalima: Jeigu yra alergija levonorgesteliui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos informacinio lapelio 6 skyriuje). Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Prieš vartodama, pasitarkite su gydytoju, nes Avodele, kaip skubios kontracepcijos priemonė, Jums gali netikti. Gydytojas gali Jums skirti kitokią skubios kontracepcijos priemonę. Kaip dažnai galima vartoti Avodele. Avodele vartotina tik neatidėliotinu atveju ir nėra reguliarios kontracepcijos metodos. Galimas šalutinis poveikis. Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Labai dažnas. Šleikštulys (pykinimas); Gali būti nereguliarius pakraujavimas iki prasidėjimo mėnesinėms; Gali skaudėti pilvo apačią; Nuovargis; Galvos skausmas. Dažni Vėmimas; Gali pakisti mėnesinių ciklas; Išgėrus šio vaisto, gali atsirasti krūtų jautrumas, viduriavimas, svajulio pojūtis. Labai retas Bėrimas, dilgėlinė, niežulys, veido patinimas, dubens srities skausmas, skausmingos mėnesinės. Prashome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant informaciniam lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Ši informacija paskutini kartą peržiūreta 2025-07-15.

Intymiai higienai

IKI -30%



VAGISAN

KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS

Priemonės „Vagisan“ su natūralia pieno rūgštimi skirtos tinkamai lytinių organų priežiūrai. Rūgštis aplinka – būtina sąlyga, kad laktobakterijos gautų patos gaminti pieno rūgštį ir dauginamės. Taip užtikrinama optimali natūrali apsauga nuo infekcijos. Intymiosios higienos prausiklis „Vagisan“ tinka kasdienė intymiajai higienai. Drėkinamasis makšties kremas „Vagisan“ sumažina tokius simptomus kaip sausumas, niežulys, deginimo pojūtis ir skausmas. Ovulės su pieno rūgštimi, skirtos natūraliai makšties pH terpei palaikyti ir atkurti.

TAVO INTYMIJAI SVEIKATAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra
pigesnė arba tokia pati
– NEMOKAMAI!

TENA DISCREET

ULTRA MINI, 28 įklotai 5⁹⁵ €

MINI, 20 įklotų 6⁹⁵ €

HIGIENOS PRIEMONĖS

PHARMATEX

18,9 mg, benzalkonio chloridas, 10 ovulių 7⁹⁹ €

20 mg, miristalkonio chloridas, 12 makšties tablečių 4⁹⁹ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Terapinės indikacijos. Lokaloji kontracepcija. Vartojimo būdas ir dozavimas. „Pharmatex“ 18,9 mg ovulės. Vartoti į makštį. Atsigulus ant nugaros, viena ovulė įklesama giliai į makštį prieš kiekvieną lytinį aktą, iki jo likus 5 minutėms. Jei atliekamas kitas lytinis aktas, reikia įsidėti kitą ovulę. Kontraceptinis poveikis trunka 4 valandas. Iš karto po lytinio akto lytinius organus galima apsiplauti švariu vandeniu tik iš šorės. Reikia vartoti sistemingai prieš kiekvieną lytinį aktą, neatsižvelgiant į menstruacijų ciklo dieną. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas benzalkonio chloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Kai naudojami vyriški poliuretano prezervatyvai. „Pharmatex“ 20 mg makšties tabletes. Vartoti į makštį. Įkiskite vieną makšties tabletę giliai į makštį likus 10 minutėms iki kiekvieno lytinio akto, neatsižvelgiant į menstruacijų ciklo dieną, net ir per menstruacijas. Makšties tabletė reikia sudrėkinti, ją geriausia įsidėti gulint, nes taip ją galima įkisti giliai į makštį. Jei atliekamas kartotinis lytinis aktas, prieš kiekvieną lytinį aktą įkiskite kitą makšties tabletę. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai. Tokio tipo kontracepcijos metodos nerekomenduojamas merginoms ir moterims, kurios nesuapnata vartojimo instrukcijų ar nenori jų laikytis. Vaistas neapsaugo nuo lytinių kelių perduodamos infekcijos (LKP) ir ŽIV (AIDS). Reklamos teksto parengimo data 2026-07.

KOSMETIKAI „ŽIEDĖ“

iki **-40%**



GAMINAME VAISTUS PAGAL INDIVIDUALIUS RECEPTUS

- Atneškite gydytojo receptą iki 13 val.
- Atsiimkite pagamintą vaistą kitą darbo dieną.



VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMBIO KIDS

GERKLĖ SU ČIOBRELIU, 6 aviečių skonio ledinukai 5⁹⁹ €
GERKLĖ SU ISLANDINE KERPENĄ, 6 braškių skonio ledinukai 5⁹⁹ €
MAISTO PAPILDAI

Moterims



-40%

DIFOLIN, 60 tablečių 9⁹⁹ 5⁹⁹ €
DIFOLIN+, 30 kapsulių 49⁹⁹ 11⁵⁷ €

MAISTO PAPILDAI

„Difolin+“ – moters gerai savijautai: hemoglobiniui, energijai, nervams, imunitetui. Mikrokapsuliuota liposomose geležis + folio rūgštis + vitaminai B12, D3, C + varis. „Difolin+“ sudėtyje naudojama mikrokapsuliuota liposomose geležis yra efektyviai pasisavinama organizmo, neturi geležies poskonio, nedirgina virškinimo trakto, neturi sąveikos su maistu. Geležis, folio rūgštis, vitaminas B12 – vieni būtinausių kraujo gamybai elementų. Vitaminas B12 padeda palaikyti normalią raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, geležis – hemoglobino susidarymą, foliatai – kraujodarą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, varis – nervų sistemos veiklą, geležis, varis, vitaminai C, B12 – energijos apykaitą.

„Difolin“ – planuojančioms pastoti, nėščioms, žindančioms moterims: folio rūgštis + vitaminas D3. Folio rūgštis padeda palaikyti normalią kraujodarą, mažinti nuovargį. Mažas foliatų kiekis nėščiosios kraujo eritrocituose yra besivystančio vaisiaus nervinio vamzdelio defektų rizikos veiksnys. Teigiamas poveikis atsiranda per parą papildomai suvartojant 400 µg folio rūgšties ne trumpiau kaip vieną mėnesį iki pastojimo ir iki trijų mėnesių po jo. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, dalyvauja ląstelių dalijimosi procese.

„DIFOLIN“ – MAISTO PAPILDAI MOTERIMS.



-35%

AMBIO

MULTIVITAMINAI NĖŠČIOSIOMS IR MAITINANČIOMS MOTERIMS, 30 tablečių 44⁹⁹ 7⁷⁹ €
MAISTO PAPILDAS



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMEDIPLUS

Ovuliacijos testas, 2 vnt. 3⁷⁹ €
MEDICINOS PREKĖ

Kremas, kuris gydo



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

SUDOCREM® MULTI-EXPERT, kremas, 125 g 10⁹⁹ €

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Sudocrem“ Multi-Expert“ gydo odos sudirgimus ir pažeidimus. Apsaugo odą aplink žaizdas ir skruosčius. Švelniai gydo sauskelnių dermatitą. Subalansuotos sudėties kremas gydo odos uždegimus, apsaugo odą nuo išorinių dirgiklių suformuodamas apsauginį barjerą. Sudėtyje esantis natūralus emolientas lanolinas gerai sugeria drėgmę ir minkština odą. Kremas išsaugo odos drėgmę ir nepalieka riebiųjų sluoksnių odos paviršiuje, kaip kiti kosmetiniai kremai. Tepiti plonu sluoksniu. Naudojami atsiradus įvairių odos sudirgimų, įvairių kūno vietų iššutimų, profilaktikai nuo pragulų ar odos apsaugai aplink žaizdų kraštus. Skirtas naudoti tik išoriniam. SUD-TJ-00102.

„SUDOCREM“ – NE TIK KŪDIKIAMS. KIEKVIENAM.



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

MIRAMILE® KIDS, burnos ir gerklės sirupas vaikams, 100 ml 8⁶⁹ €

MEDICINOS PRIEMONĖ

Padeda numalšinti gerklės skausmą ir palengvina kosulį.

Svilvarčių ekstraktas, glicerolis bei ksantano lipai sukuria apsauginę plėvelę, kuri padengia ir saugo sudirgusią gleivinę bei padeda atkurti natūralias jos funkcijas.

Sudėtyje taip pat yra čiobrelių, šėvamedžių ir juodųjų serbentų ekstraktų.

Tinka vaikams nuo 1 metų.

Žarnyno mikroflorai



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

ACIDOLAC® JUNIOR

20 meškiuko formos tablečių 10⁴⁹ €
braškių skonio, 20 meškiuko formos tablečių 10⁴⁹ €

MAISTO PAPILDAI

ACIDOLAC® JUNIOR meškiuko formos tablečių sudėtyje yra gerųjų žarnyno bakterijų *Lactobacillus acidophilus* La-14TH ir *Bifidobacterium lactis* BI-04TH, inulino ir vitamino B6, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vartojamas: vyresniems kaip 3 m. vaikams ir suaugusiems vartoti po 1 meškiuko formos tabletę 2 kartus per parą. Be sacharozės ir gliutimo.



-30%

DOCTOR FISH OMEGA-3 + VITAMINS D & E, 30 kapsulių 42⁹⁹ 9⁰⁷ €

MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIU

Maisto papildas sudėtyje yra omega-3 riebiųjų rūgščių (EPR ir DHR) ir vitaminų D ir E:

EPR (eikozapentaeno rūgštis) ir DHR (dokozaheksaeno rūgštis) padeda palaikyti normalią širdies veiklą;

DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją, išsaugoti normalų regėjimą;

vitaminas D padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų, raumenų, dantų būklę;

vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.

LAIMĖS VALANDOS

I -VI

iki 9 val. ir
14-15 val.*

VII

14-15 val.*

Perkant **3***
ir daugiau prekių

-30%

Perkant **2***
prekes

-25%

Perkant **1**
prekę

-20%



*Nuo 2026 m. gegužės 1 d. NORFOS vaistinėje akcijos LAIMĖS VALANDOS metu perkant 1 prekę taikoma 20 % nuolaida, perkant 2 prekes – 25 % nuolaida, vaistams – 20 % nuolaida, o įsigyjant 3 ir daugiau prekių – 30 % nuolaida, nereceptiniams vaistams – 25 %, receptiniams – 20 % nuolaida.

Taikomos momentinės 20 % dydžio nuolaidos receptiniams vaistams, 20 ar 25 % nuolaidos nereceptiniams vaistams, o kitoms prekėms – 20, 25 arba 30 % nuolaidos, atsižvelgiant į atitinkamo pirkimo metu įsigyjamų prekių bendrą kiekį.

Nuolaida taikoma perkant pilnas prekių pakuotes, kurių kiekvienos vertė arba priemoka ne mažesnė nei 1,50 euro. Prekės, perkamos su kompensuojamuoju receptu, įskaičiuojamos į įsigyjamų (perkamu) prekių krepšelį (kiekį), tačiau joms nuolaida netaikoma.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms (pvz., mėnesinio leidinio nuolaidos; prekės, vaistinėse pažymėtos geltonais kainoženkliais; akcinės prekės, kai nuolaida taikoma įsigyjant ne mažiau kaip 2 nurodytus produktus, ir kt.). Momentinės nuolaidos netaikomos perkant prekes su kompensuojamuoju receptu, mokant už skiepus, taip pat pradinio maitinimo pieno mišiniams, kartiniams (gaminamiems vaistinėje) ir vardinams vaistams, įsigyjant dovanų kuponus, prekių pakavimo maišelius. Momentinės nuolaidos netaikomos perkant www.gintarine.lt, net jei už prekes atsiskaitoma įs atsiimant vaistinėse. Nuolaidos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Informacija apie akcijas ir prekes, kurioms taikomos LAIMĖS VALANDŲ nuolaidos, teikiama kiekvienoje vaistinėje, el. paštu info@nvaistine.lt arba nemokamu tel. +370 800 10008. Visos nuolaidos galioja tik su PC NORFA lojalumo kortele.

Rytinės LAIMĖS VALANDOS vyksta nuo vaistinės atidarymo iki 9 val. ryto. Jei vaistinė pradeda dirbti 9 val. ar vėliau, rytinės LAIMĖS VALANDOS joje nevyksta.