

TOP RUGSĖJO PASIŪLYMAI



-50%



AMBIO
MAGNIS SU B6 FORTE, 30 tablečių **42⁹⁹ 6⁵⁰ €**
MAISTO PAPILDAS

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!



EPITOME
JOINTS BOVINE COLLAGEN, 12.000 mg, milteliai, 30 paketėlių **49⁹⁹ €**
MAISTO PAPILDAS

IKI -50%



FJØRD STRONG OMEGA-3

MAISTO PAPILDAS

Kuo ypatingi?

- **Išskirtiniai stiprios koncentracijos** – su dideliu kiekiu bioaktyvių omega-3 rūgščių (EPR ir DHR).
- **Sertifikuota aukščiausios kokybės žaliava**, atitinka 5* tarptautinio žuvų taukų standarto įvertinimo kriterijus.
- **Ypač gerai pasisavinama** reesterifikuotų trigliceridų forma, išlaikanti natūralią žuvų taukų struktūrą.
- **Iš laukinių, riebių smulkų žuvų** šaltinio. Žaliava sertifikuota pagal FOS (Friend of the Sea) standartą.
- **„FJØRD STRONG OMEGA – 3 Immunity“** – stiprios koncentracijos omega-3 (EPR ir DHR), vitamino D ir ypač gryno (extra virgin) alyvuogių aliejaus derinys, dar geresniam pasisavinimui – jūsių stipriam imunitetui.
- **„FJØRD STRONG OMEGA – 3 SPORT“** – stipriausios koncentracijos žuvų taukai iš visų „FJØRD“, su didžiausiu EPR ir DHR kiekiu – išvermei, fiziniams pajėgumui, nuovargio mažinimui.

„FJØRD STRONG OMEGA-3“ GALI DAUGIAU NEI TIKIESI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-50%



OILESEN FORTE
vitaminas D3 4000, 60 minkštųjų kapsulių **48³⁹ 9²⁰ €**

MAISTO PAPILDAS

„Oileesen D, Forte“ – 1 kapsulėje yra net 4000 TV vitamino D₃, išdirpinto kanapių aliejuje. Tinka vartoti žmonėms, turintiems papildinti vitamino D poreikį, pavyzdžiui, vyresniems.

DAUGIAU SAULĖS SU „OILESEN D3“!

4⁹⁹ €



INOVOX

HONEY LEMON, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, 24 kietosios pastilės

MENTHOL, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, 24 kietosios pastilės

ORANGE, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, 24 kietosios pastilės

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje pastilėje yra 2 mg lidokaino hidrochlorido, 0,6 mg amilmetakrezolio ir 1,2 mg 2,4-dichlorobenzilo alkoholio. **Indikacijos:** gerklės skausmo malšinimas, vietinis antiseptinis gerklės ir burnos ertmės uždegiminių būklių (pvz., paraudimo, patinimo) gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** po 1 kietąją pastilę kas 2-3 val. ir kai reikia, bet ne daugiau kaip 8 kietąsias pastiles per parą (vaikams – ne daugiau kaip 4 pastiles). Vartoti ant burnos gleivinės. Kietąją pastilę reikia lėtai sušluoti laikant burnoje, bet ne už skruos. Vaisto nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosoms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** jei simptomai neišnyksta ilgiau kaip 2 paras, sunkėja, arba atsiranda naujų simptomų, reikia įvertinti paciento klinikinę būklę. Atsargiai vartoti ūminė liga sergantiems, nusilpusiems pacientams. Nevartoti esant ūmioms burnos ir gerklės žaizdoms, prieš valgant ar atsigeriant. Astma sergantys pacientai turi būti prižiūrimi gydytojo. Sudėtyje yra levomentolio terpenų, gliukozės, sacharozės, saulėlydžio geltonojo ir kosenilio raudonojo. **Reklamos teksto parengimo data** 2022-06-09.

„INOVOX“. EFEKTAS – JAU PO 1 MINUTĖS!

4⁹⁹ €



NEURORUBINE FORTE LACTAB, 20 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tablete yra 200 mg ti amino nitrato (vitamino B1), 50 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6), 1 mg cianokobalamino (vitamino B12). **Terapinės indikacijos.** Dėl B grupės vitaminų stokos atsiradusių nervų sistemos ligų gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Per parą reikia išgerti 1-2 tabletes. Vartoti per burną. Kiek laiko vartoti „Neurorubine Forte Lactab“, patars gydytojas. Vėliausiai po 4 savaitių būklė turi įvertinti gydytojas. Jeigu simptomai nepaieina, reikia kreiptis į gydytoją, kad jis parinktų kitą gydymą. **Vaikų populiacija.** Saugumas ir veiksmingumas vaikams dar neištirtas, todėl vaistas neturi būti skiriamas vaikams. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija vitaminams B1, B6 ar B12 arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu sergate žvyneline. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vaisto sudėtyje esanti didelė vitamino B6 dozė gali silpninti L-Dopos poveikį bei pabloginti Parkinsono ligą. Taip pat vitaminas B6 gali silpninti altretamino (vaisto, vartojamo vėžiui gydyti) poveikį. Kartu vartojamo izoniado toksinis poveikis gali stiprėti. Ti os emikarbazonas ir 5-fluorouracilas, būdami ti amino antagonistais, gali trikdyti vitamino B1 poveikį. Kartu su „Neurorubine Forte Lactab“ vartojant vaistus, surišiančius skrandžio rūgštis (antacidus), pablogėja vitamino B1 pasisavinimas. **Teksto peržiūros data** 2024-02-01. **Reklamos teksto parengimo data** 2020-01. NEUR-LT-00012

PALIKITE SKAUSMĄ UŽ NUGAROS!



-40 %, -50 % pigiau



-40%

„LIVOL“ VITAMINAI

MAISTO PAPILDAI

Kviečiame Jus atrasti iš naujo „Livol“ vitaminų prekių ženklą – dabar naujose pakuotėse. Atnaujintas „Livol“ ikvėpas Danijos vertybių, šiaurietiškos estetikos ir Hygge balanso, kuris atspindi harmoningą požiūrį į kasdienę gerą savijautą. Danų kultūroje gyvenimo pusiausvyrą gimsta iš paprastų, bet prasmingų kasdienybės akimirkų – judėjimo, ramybės, artumo, šypsenų bei sąmoningo rūpesčio savimi. Šia filosofija vadovaujasi ir „Livol“ vitaminai, sukurti Danijoje, naudojant pažangias, subalansuotas formules ir efektyvią gamybos technologiją, kuri užtikrina maksimalų pasisavinimą.

„LIVOL“ – GEROS SAVIJAUTOS MEISTRAI IŠ DANIJOS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

Vitaminai ir mineralai visai šeimai



-40%

WALMARK

MAISTO PAPILDAI

NAUJIENA! „Walmart NutriPack Immuno“ – tai keturių vitaminų ir mineralų rinkinys, supakuotas į patogius kasdienius pakėtelius – lengva naudoti ir pasiimti visur su savimi. 1 paketėlyje yra: vitamino D 4000 IU kapsulė, prailginto veikimo vitamino C 600 mg tabletė, cinko tabletė ir seleno su juodųjų pipirų ekstraktu tabletė. Vitaminai D ir C, cinkas bei selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. 1 paketėlis – kasdienis tavo imuniteto skydas! NAUJIENA! „Vitaminai D3 + K2“ – aliejuje mikrokapsuluoti vitaminai D ir K užtikrina gerą bioaktyvumą, stabilumą ir tikslią bei vienodą maistingųjų medžiagų dozę kiekvienoje kapsulėje. Vitaminų poveikis išlieka ilgai, nes jie veikia palaipsniui ir ilgesnį laiką. Patentuota vitamino K2 technologija „MenaQ“.

„Super Vitaminas C“ – prailginto veikimo vitaminas imunitetui. Papildytas erškėtuogių vaisių milteliais, kurie padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir kvėpavimo takų veiklą.

„Mega Vitaminas D 4000 IU“ – didelė dozė vitamino D imunitetui, kaulams ir dantims. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei normalią kaulų ir dantų būklę. Taip pat padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą. 2601_SB_Walmart_V01_LT.

„WALMARK“ – ŽYDĖK SAVIKAITA! VITAMINAI IR MINERALAI VISAI ŠEIMAI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

IKI -50%



BIOCELL

MAISTO PAPILDAI

BIOCELL puoseleja gamtos sukurtą grožį ir sąmoningą gyvenimo būdą, vertina natūralumo estetiką ir skatina moterį pamilti save tokią, kokia ji yra – tobulą. Geriamieji BIOCELL grožio eliksyras „shots“ su kolagenu ar keratinu, grožio kapsulės, hidrolizuotas kolagenas miltelių forma ir skaidulos puoseleja odos, plaukų bei nagų grožį iš vidaus.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

IKI -50%



MARSIEČIAI®

MAISTO PAPILDAI

NAUJIENA! „Marsiečiai“ gumukai su vitaminais, cinku ir beta gliukanais! Vitaminai C, D ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

„Marsiečiai“ gumukai su ežiuolėmis, vitaminais C, D ir cinku, kurie padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

„Marsiečiai“ gumukai su šaltalankiais, vitaminais C, D ir cinku, kurie padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

„Marsiečiai BoneActive“ gumukai su vitaminais D ir K, kurie padeda palaikyti normalią kaulų būklę.

„Marsiečiai Imunactiv“ tabletės su beta gliukanais bei vitaminais ir mineralais vaikų imunitetui. Vitaminai C, D ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Jodas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.

Beukris „Marsiečiai“ ledinukas su islandinių kepenų ekstraktu, padedančiu palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Aviečių skonio.

2601_SB_Marsiečiai_V01_LT

„MARSIEČIAI“ GUMUKAI – KASDIEN, KAD VIENĄ DIENĄ VAIKAI MUS PRAAUGT!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-50%



GASTROVAL

15 kietųjų kapsulių 5⁹⁹ 255 €

HEPAR FORMULA, 30 kapsulių 40⁹⁹ 535 €

MAISTO PAPILDAI

GASTROVAL HEPAR FORMULA – tik 1 kapsulė per dieną! Geresnio pasisavinimo augalinė formulė – rimtesnė kepenų apsauga nuo oksidacinių pažeidimų, kepenų ląstelių regeneracija, organizmo valymo funkcija, normalaus cholesterolio lygio palaikymas. „Gastroval“ suprantu, ko reikia virškinimui, skrandžio rūgštingumui, kepenų veiklai.

GASTROVAL sudėtyje – augalinių fermentų ir ekstraktų derinys, kurio nauda lengva pajusti.

GASTROVAL suprantu, ko reikia virškinimui, kepenų veiklai, skrandžio rūgštingumui.

-40%



LECLER

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Kuo „Lecler“ kaukės išskirtinės?

• Dvigubas hialurono kompleksas ir net 30 ml serumo kiekvienoje kaukėje.

• Nėlipnus, greitai susigeriantis serumas, po naudojimo paliekantis malonų švelnumo pojūtį.

• Pagal japonišką technologiją pagamintas labai plonas, tankios struktūros kaukės lakstas padeda ilgai sulaukyti serumą ir drėgmę ant odos.

• „Lecler“ kaukių efektyvumas patvirtintas moksliniais tyrimais – nuo intensyvaus drėkinamojo poveikio su „Intense Hydration“ iki stangresnės odos pojūčio su „Anti-Aging“ ir greito spindesio efekto su „Express Refresh“.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-40%



RHINOLAYA

MEDICINOS PRIEMONĖS

Himalajų druskos purškalas Jums ir Jūsų kūdikiui

Vienintelis Himalajų druskos nosies purškalas. Be konservantų.

• Natūraliai išvalo, drėkina ir padeda atkurti užburkusią nosį

• Tinka šalčio, vėjo ir alergenų (namų dulkių, oro taršos, gyvūnų plaukų, žiedadulkių) pažeistai nosies gleivinei

• Nedingina ir nesusausina nosies gleivinės

• Skystina gleives

• Pasirūpina greitu veikimu

„RHINOLAYA“ nosies purškalas yra kelių rūšių:

„RHINOLAYA FORT“ hipertoniškas, 50 ml – sloguojant, peršalus, sinusito metu.

„RHINOLAYA KIDS“ izotoninis, 50 ml – užburkusiai ir išsausėjusiai kūdikių nosies gleivinei.

„RHINOLAYA PROTECT“, izotoninis, 50 ml – alergenų pažeistai nosies gleivinei.

Medicinos priemonės CE 0459

„RHINOLAYA“ – IŠ HIMALAJŲ GELMIŲ PRIEŠ ALERGIJĄ IR SLOGĄ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

Antiperspirantai nuo prakaitavimo

-50%



PERSPIREX

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Itin veiksmingi antiperspirantai „Perspirex“ skirti tiems, kam reikia specialių priemonių prakaitavimui mažinti. „Perspirex“ užtikrina geriausią rezultatą, siekiant apsaugoti nuo padidėjusio prakaitavimo ir prakaito kvapo. Klinikiniai tyrimai patvirtina, kad antiperspirantai „Perspirex“ užtikrina ypatingą ilgalaikę apsaugą nuo prakaitavimo ir gali padėti išspręsti prakaitavimo bei prakaito kvapo keliamas problemas.

GYVENIMĄ KEIČIANČI APSAUGA.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

IKI 5 EURŲ

5€



2⁴⁹ €

PARACETAMOL ZENTIVA, 500 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekvienoje tabletėje yra 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos.** Trumpalaikis simptominis lengvo ar vidutinio stiprumo skausmo ir (arba) karščiavimo malšinimas. „Paracetamol Zentiva“ 500 mg tabletės skirtos suaugusiems, paaugliams ir 6 metų bei vyresniams vaikams, sveriantiems daugiau kaip 21 kg. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Reikia vartoti mažiausia veiksminga dozė kiek galima trumpesni laiką. Didžiausios paros dozės viršyti negalima. Paracetamolis dozuojamas atsižvelgiant į kūno svorį ir amžių, paprastai skiriant vienkartinę 10-15 mg/kg kūno svorio dozę, neviršijant didžiausios paros dozės – 60 mg/kg kūno svorio. Tabletes reikia nuryti užgeriant pakankamu kiekiu skysčio, vartoti valgio metu arba nevalgius. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbine medžiagai. Sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas. Ūminis hepatitas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Paracetamol Zentiva“ nevartokite kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio. Vartojant didesnes nei rekomenduojama vaisto dozes, padidėja sunkaus kepenų pažeidimo pasireiškimo rizika. Vartodami šį vaistą negerkite alkoholinių gėrimų. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025. rugpjūtį mėn. ID:000785499

Nuo skausmo ir karščiavimo

2⁹⁹ €



IBUPROM

200 mg, 10 dengtųjų tablečių 2⁹⁹ €
200 mg, 20 dengtųjų tablečių 4⁴⁹ €
400 mg, 10 dengtųjų tablečių 3⁴⁹ €
400 mg, 20 dengtųjų tablečių 4⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg ir 200 mg. **Terapinės indikacijos:** skausmo (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimo mažinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Ibuprom, 400 mg“: suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 1 tabletę 3 kartus per parą, „Ibuprom, 200 mg“: 6-9 m. vaikams (kūno svoris 20-29 kg) gerti po 1 tabletę kas 6-8 val. (negerti daugiau nei 3 tablečių per parą); 10-12 m. vaikams gerti po 1 tabletę kas 6 val. (negerti daugiau nei 4 tablečių per parą); suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams pradinė dozė yra 2 tabletės, po to galima gerti po 1-2 tabletes kas 4 val. (negerti daugiau nei 6 tablečių per parą). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, taškinis kraujavimas, ūminis skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligės stadija; anksčiau buvusi alergija acetoilsalicilo rūgščiai ir kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; sergant sunkiu širdies nepakankamumu; esant trečiam nėštumo trimestrai. **Specialūs įspėjimai:** vartoti neparatina, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu, bronchų astma. Reklamos teksto parengimo data 2026-03-23. **RENKUOSI „IBUPROM“. RENKUOSI LAISVĖ.**

Intensyvaus poveikio šildomasis pleistras

-20%



PYRALGINA TERMO HOT

šildomasis pleistras, 1 vnt. 2⁴² 1⁹⁸ €

MEDICINOS PRIEMONĖ

PYRALGINA TERMO HOT yra intensyvaus poveikio šildomasis pleistras, kuris veiksmingai ir natūraliai atpalaiduoja giliosius raumenis ir dėl to lengvina nugaros, pečių, strėnų, kaklo, sausgyslių bei reumatinį skausmą. PYRALGINA TERMO HOT veikia iki 14 valandų. Šis vaistinis preparatas ypač tinka skausmui, kuriam reikia stipresnės analgezijos nei vartojant vien ibuprofeną ar paracetamolį. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems gerti po 1 tabletę ne dažniau kaip 3 kartus per parą valgio metu užgeriant vandeniu. Tarp dozių išlaikyti ne mažiau kaip 6 valandų tarpą. Jei, vartojant po 1 tabletę, simptomai neišnyksta, daugiausia galima vartoti po 2 tabletes ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių per bet kurį 24 valandų laikotarpį. „Metafenex“ negalima vartoti ilgiau kaip 3 dienas. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų asmenims. **Kontraindikacijos.** Šio vaistinio preparato vartoti negalima pacientams, kuriems yra padidėjęs jautrumas ibuprofenui, paracetamolui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio ar kitų NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius ir didesnes kaip 75 mg acetoilsalicilo rūgšties paros dozes; jei anksčiau buvo padidėjusio jautrumo reakcija, susijusi su acetoilsalicilo rūgštimi arba kitais nesteroidiniais vaistais; jei pacientas serga infekcine liga, pacientas yra senovo amžiaus; serga ar anksčiau sirgo astma; yra inkstų, širdies, kepenų arba žarnyno sutrikimas; serga sisteminė raudonajai vilkligė; yra virškinimo trakto sutrikimų arba lėtinė uždegiminė žarnos liga; pacientė neššia pirmuosius 6 nėštumo mėnesius arba žindo. Reklamos teksto parengimo data 2026-02.

PAPRASTA IR EFEKTYVU!

Nuo skausmo

4⁴⁹ €



METAFENEX, 200 mg/500 mg, 10 plevėle dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Kiekvienoje plevėle dengtoje tabletėje yra 200 mg ibuprofeno ir 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos.** „Metafenex“ skirtas trumpalaikiam lengvo ar vidutinio stiprumo skausmui, siejamam su migrena, galvos skausmu, nugaros skausmu, mėnesinių skausmu, dantų skausmu, reumatinio bei raumens skausmu, nestiprio artrito skausmu, peršalimo ir gripo simptomais, gerklės (ryklės) skausmu bei karščiavimu, malšinti. Šis vaistinis preparatas ypač tinka skausmui, kuriam reikia stipresnės analgezijos nei vartojant vien ibuprofeną ar paracetamolį. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems gerti po 1 tabletę ne dažniau kaip 3 kartus per parą valgio metu užgeriant vandeniu. Tarp dozių išlaikyti ne mažiau kaip 6 valandų tarpą. Jei, vartojant po 1 tabletę, simptomai neišnyksta, daugiausia galima vartoti po 2 tabletes ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių per bet kurį 24 valandų laikotarpį. „Metafenex“ negalima vartoti ilgiau kaip 3 dienas. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų asmenims. **Kontraindikacijos.** Šio vaistinio preparato vartoti negalima pacientams, kuriems yra padidėjęs jautrumas ibuprofenui, paracetamolui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio ar kitų NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius ir didesnes kaip 75 mg acetoilsalicilo rūgšties paros dozes; jei anksčiau buvo padidėjusio jautrumo reakcija, susijusi su acetoilsalicilo rūgštimi arba kitais nesteroidiniais vaistais; jei pacientas serga infekcine liga, pacientas yra senovo amžiaus; serga ar anksčiau sirgo astma; yra inkstų, širdies, kepenų arba žarnyno sutrikimas; serga sisteminė raudonajai vilkligė; yra virškinimo trakto sutrikimų arba lėtinė uždegiminė žarnos liga; pacientė neššia pirmuosius 6 nėštumo mėnesius arba žindo. Reklamos teksto parengimo data 2026-02.

SKAUSMĄ KEISKI „METAFENEX“!

Esant viduriavimui

4⁴⁹ €



LOPERAMIDUM PPH, 2 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga: loperamido hidrochloridas. **Indikacijos:** simptominis suaugusių ir vyresnių negu 12 metų paauglių ūminio viduriavimo gydymas tokiu atveju, jei negalima pašalinti viduriavimą sukėlusios priežasties. **Dozavimas:** pradžioje geriama 2 tabletės (4 mg), vėliau – po 1 tabletę (2 mg) po kiekvieno išsiskyrimo nesuformuotomis išmatomis. Draudžiama per parą gerti daugiau kaip 6 tabletes (12 mg). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas loperamidui hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jaunesni negu 12 metų pacientai; paralyžinis žarnų nepraeinamumas; vidurių užkietėjimas, pilvo pūtimas; organizme per mažai skysčių; pseudomembraninis kolitas, kurį dažniausia sukelia plataus poveikio antibiotikai; ūminė bakterinė disenterija, bei kitoks bakterinis viduriavimas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** loperamido hidrochlorido gydymas pacientams turi vartoti pakankamai vandens bei mineralinių medžiagų. Šio vaistinio preparato reikia atsargiai vartoti ligoniams, kuriems yra kepenų nepakankamumas. Sergant Krono liga, loperamido hidrochlorido reikia vartoti atsargiai. Jeigu pasireiškia vidurių užkietėjimas, pilvo pūtimas ar atsiranda pirmųjų žarnyno obstrukcijos simptomų, šio vaistinio preparato vartojimą būtina nutraukti. Jeigu ligonis karščiuoja bei jo išmatose yra kraujo, prieš pradėdant vartoti loperamidą hidrochloridą, būtina išsiaiškinti tokio viduriavimo priežastį. Vartojant loperamidą hidrochloridą, gali pasunkėti šlapinimasis. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp faktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Reklamos teksto parengimo data 2025-01.

NUO **3⁹⁹** €



IBUPROM EXPRESS

400 mg, 10 minkštųjų kapsulių **3⁹⁹** €
400 mg, 20 minkštųjų kapsulių **4⁹⁹** €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg. **Indikacijos:** skausmo (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimo mažinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems pacientams ir vyresniems nei 12 m. vaikams kaip trumpalaikis pagalbinis gydymas kas 4 val. geriant 1 kapsulę (negerti daugiau kaip 3 kapsulių per parą). Kapsulių negalima kramtyti. Kapsulę reikia užgerti stikline vandens. **Kontraindikacijos:** alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, praėjusio buvusio padidėjusio jautrumo reakcijos vartojant kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo, sunkus kepenų, inkstų ar širdies funkcijos nepakankamumas, esama (ar praėjusio buvusio) pepsinės opa, buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakurimas, kraujavimas iš smegenis, virškinimo trakto arba kitoks kraujavimas, sisteminė raudonoji vilkligė, paskutinis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai:** specialų atsargumo priemonių reikia, jeigu sutrikus inkstų, kepenų, širdies ir virškinimo trakto veikla, vartojama kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo, sergama bronchine astma, alerginėmis ligomis ar sisteminė raudonoji vilkligė, senyviems žmonėms. Reklamos teksto parengimo data 2024.11.29.

RENKUOSI „IBUPROM“. RENKUOSI LAISVĖ.

NUO **3⁹⁹** €



DICLAC

1 % gelis, 50 g **3⁹⁹** €
5 % gelis, 50 g **5⁹⁹** €
5 % gelis, 100 g **11⁹⁹** €
5 % gelis, 150 g **15⁹⁹** €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 g „Diclac“ 5 % gelio yra 50 mg, 1 g „Diclac“ 1 % gelio yra 10 mg diklofenako natrio druskos. **Terapinės indikacijos:** lokaliu skausmu malšinti, uždegimui slopinti ir patinimui mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** ploną „Diclac“ 5 % gelio sluoksnį tepti 2 kartus per dieną, „Diclac“ 1 % gelį tepti 3–4 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** jautrumas diklofenakui ar pagalbinėms medžiagoms, jaunesni kaip 14 m. vaikai, 3 paskutiniai nėštumo mėnesiai. **Specialūs įspėjimai:** negalima tepti burnos, nuryti. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 763 6037, El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2601069663. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

STIPRUS ATIKRIS SKAUSMUI!

4⁹⁹ €



WINTROZEN

600 mg, 10 šnypščiučių tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekviena šnypščiučių tabletė yra 600 mg acetilcisteino.

Terapinės indikacijos. „Wintrozen“ skirtas gleivinės skystinti ir atskosėjimo lengvinti sergant peršalimo sukeltu bronchitu, suaugusiems ir vyresniems kaip 14 metų paaugliams. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems ir vyresniems kaip 14 metų paaugliams: rekomenduojama dozė yra 1 tabletė (600 mg) 1 kartą per parą, vakare. Jūsų gydytojas gali pakeisti vartojimo dažnį ir dozę, nevirsdydamas 600 mg didžiausios paros dozės. „Wintrozen“ negali būti vartojamas ilgiau nei 5 dienas. **Vartojimo metodas.** 1 šnypščiąją tabletę ištirpinti stiklinėje vandens. Paruoštą tirpalą reikia išgerti per kelias minutes. Rekomenduojama nemašyti „Wintrozen“ su kitais vaistais. **Kontraindikacijos.** „Wintrozen“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija acetilcisteinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Dėl didelio veiklosios medžiagos kiekio „Wintrozen“ negalima vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 14 metų paaugliams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Wintrozen“, jeigu: atsiranda naujų odos ir gleivinės pokyčių. Labai retai gauta pranešimų apie sunkių odos reakcijų, sergate uždegimine brochemine liga, netoleruojate histamino, yra ar anksčiau buvo skrandžio ar žarnyno problema, vadinamų skrandžio ar dvilypkapištes žarnos opomis, ypač kai kartu su „Wintrozen“ vartojami kiti skrandžio gleivinę dirginantys vaistai. Jeigu jaučiate sėjos kvapą, nesijaudinkite, nes tai yra acetilcisteino savybė ir nereikia, kad vaistas pakito. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025 m. gegužės mėn. ID:000729217

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati —
NEMOKAMAI!



ACONITUM

MAISTO PAPILDAI

ACONITUM nuo 1999 metų kuria ir gamina augalinius vaistus, maisto papildus ir biomedicinius preparatus. Kiekviena formulė gimsta iš žinių, patirties ir atsakingo požiūrio į žmogaus sveikatą, o kokybę užtikrina griežti Geros gamybos praktikos (GMP) standartai ir nuosekli žaliavų kontrolė.

AUKŠTOS KOKYBĖS LIETUVIŠKI PREPARATAI, KURIUOS SUKŪRĖME JUMS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati —
NEMOKAMAI!



SALDUS MIEGAS

15 kapsulių **11⁴⁹** €
30 kietųjų kapsulių **13⁴⁹** €
eliksyras, 150 ml **12⁴⁹** €

MAISTO PAPILDAI

Linija „Saldus miegas“ – viena iš populiariausių maisto papildų linijų miegui Lietuvoje. Greitesniam užmigimui ir kokybiškam poilsui, su fitomelatoninu (augaliniu melatoninu), „Saldus miegas“ – net 7 aktyviųjų medžiagų kompleksas, kurio sudėtyje vaistinių ramunėlių žiedų ekstraktas, padedantis palaikyti normalią miego kokybę, „Saldus miegas fitoMELATONINAS“ preparate yra 1 mg fitomelatonino. „Saldus miegas eliksyras“ karamėles skonio, skystas maisto papildas. Sudėtyje yra GABA (gamma-amino sviesto rūgštis), 5-hidroksitriptofano (5-HTP) ir 1 mg fitomelatonino, kuris padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti).

GERAM POILSIUI – „SALDUS MIEGAS“!

NUO **3⁹⁹** €



OTRIVIN

1 mg/ml nosies purškalo (tirpalas), 10 ml **4⁹⁹** €
MENTHOL, 1 mg/ml nosies purškalo (tirpalas), 10 ml **5⁹⁹** €
0,5 mg/ml nosies lašai (tirpalas), 10 ml **3⁹⁹** €
1 mg/ml nosies lašai (tirpalas), 10 ml **3⁹⁹** €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Ksilotmetazolino hidrokloridas. **Terapinės indikacijos.** Nosies gleivinės paburkimo mažinimas, sergant sinusitu, šienlige ar kitokia alergine sloga. Nosiarakies gleivinės paburkimo mažinimas, gydant vidurines ausies uždegimą. Nosies ertmės apžiūros atlikimo lengvinimas. **Vartojimas.** „Otrivin 0,5 mg/ml“ nosies lašai. 2–5 m. vaikai: po 1–2 lašus į kiekvieną nosies landą 1–2 kartus per parą (kas 8–10 val.). 6–11 m. vaikai ir paaugliai: po 2–3 lašus į kiekvieną nosies landą 2–3 kartus per parą, kai reikia. „Otrivin 1 mg/ml“ nosies lašai. Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: po 2–3 lašus į kiekvieną nosies landą, kai reikia. „Otrivin Menthol 1 mg/ml“ nosies purškalo ir „Otrivin 1 mg/ml“ nosies purškalo. Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: po 1 įpurškimą į kiekvieną nosies landą, kai reikia. Negalima lašinti / purkšti daugiau kaip 3 dozių per parą į kiekvieną nosies landą. **Kontraindikacijos.** Alergija ksilotmetazolui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; pacientams, kuriems neseniai buvo atlikta operacija per nosį, sergantiems uždarą kampo glaukoma (padidėjęs akispūdis), lėtinio nosies uždegimo (sausumo arba atrofiniu rinitu). **Specialūs įspėjimai.** Negalima vartoti ilgiau kaip 7 d. iš eilės. Negalima viršyti rekomenduojamos dozės, ypač vaikams ir pagyvenusiems žmonėms. Atsargiai vartoti, jeigu yra padidėjęs kraujospūdis, širdies liga (pvz., palgijusio QT intervalo sindromas), cukrinis diabetas, padidėjęs skydliaukės aktyvumas, padidėjusi prostata, yra gerybinis antinksčių auglys, jei vartojate tricitilį ir tetraicitilį antidepresantų, jeigu vartojate arba per pastarąsias 2 sav. vartojote vaistų nuo depresijos ar Parkinsono ligos, vadinamųjų MAOI. Labai jautriems pacientams gali sukelti miego sutrikimą, galvos svaigimą, tremorą. Sudėtyje yra benzalkonio chlorido. Reklamos teksto parengimo data 2025-02. Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi jų licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas.

NUO **9⁹⁹** €



HESIO

500 mg, 30 plėvele dengtų tablečių **9⁹⁹ €**
500 mg, 60 plėvele dengtų tablečių **17⁹⁹ €**
500 mg, 120 plėvele dengtų tablečių **33⁹⁹ €**
1000 mg, 30 plėvele dengtų tablečių **17⁹⁹ €**

NERECIPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Kiekvienoje „Hesio“ 500 mg tablečių yra 500 mg mikronizuotų flavonoidų (atitinka 450 mg diosmino ir 50 mg kitų flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną). Kiekvienoje „Hesio“ 1000 mg tablečių yra 1000 mg mikronizuotų flavonoidų (atitinka 900 mg diosmino ir 100 mg kitų flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną). **Terapinės indikacijos.** „Hesio“ skirtas suaugusiųjų: lėtinio venų nepakankamumo simptomams (kojų sunkumui, kojų patinimui, skausmui, naktiniam kojų mėšlungiui) lengvinti; paūmėjusio hemorojaus simptomams (skausmui, kraujavimui ir patinimui išangės srityje) lengvinti. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** „Hesio“ 500 mg tabletes: lėtinis venų nepakankamumas: rekomenduojama dozė suaugusiems yra 2 tabletės per parą 2 mėnesius: 1 tabletė vidurdienį ir 1 tabletė vakare valgio metu. Jei simptomai išlieka, gydymas gali būti tęsiamas dar 2 mėnesius; hemorojaus paūmėjimas: pirmas 4 gydymo dienas rekomenduojama dozė suaugusiems yra 3 tabletės 2 kartus per parą (6 tablečių per parą). Kitas 3 dienas – 2 tabletės 2 kartus per parą (4 tabletes). Tabletes vartokite valgio metu. „Hesio“ 1000 mg tabletes: lėtinis venų nepakankamumas: rekomenduojama dozė suaugusiems yra 1 tabletė per parą 2 mėnesius valgio metu. Jei simptomai išlieka, gydymas gali būti tęsiamas dar 2 mėnesius; hemorojaus paūmėjimas: pirmas 4 gydymo dienas rekomenduojama dozė suaugusiems yra 3 tabletės 2 kartus per parą (1 tabletė 3 kartus per parą arba 1 tabletė pirmą kartą ir 2 tabletės antrą kartą per parą). Kitas 3 dienas – 1 tabletė 2 kartus per parą (2 tabletes). Tabletes vartokite valgio metu. **Kontraindikacijos.** „Hesio“ vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vaikams ir paaugliams „Hesio“ vartoti nerekomenduojama. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025 m. vasario mėn. ID: 000829964

1+1

Perkant vieną pakuotę, antrą pigesnę arba tokią patį – **NEMOKAMAI!**



BIOFARMACIJA

MAISTO PAPILDAI

„Biofarmacija“ – kruopščiai atrinktos formulės kasdieniams organizmo poreikiams. „Biofarmacija“ maisto papildai sukurti atsižvelgiant į įvairius kasdienio organizmo poreikius – nuo energijos, fizinio aktyvumo ir raumenų iki širdies, nervų sistemos, imuniteto, kaulų bei odos, plaukų ir nagų priežiūros. **Kiekvienoje formulėje – kruopščiai atrinktos formulės, aukštos kokybės žaliavos, be nereikalingų priedų.** Daugelyje produktų naudojamos gerai toleruojamos mineralų formos, o magnis išgaunamas iš **Negyvosios jūros**. „BIOFARMACIJA“ – TIK TAI, KO ORGANIZMUI IŠ TIKRŲJŲ REIKIA.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

AKIMS

IKI **-50%**



OCUTEIN

MAISTO PAPILDAI

„Ocutein Kristal“ – kristolo tyrimo rezultatai!
„Ocutein Retin“ – patobulinta formulė daug dirbančių akių mikrocirkuliacijai.
„Ocutein Brillant“ – brillantinė apsauga pavargusioms, daug dirbančioms akims.
„Ocutein Forte“ – trejetas poveikis sausoms, daug dirbančioms akims.
Vartojimas: 1 kapsulė per parą.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

PERŠALIMUI IR KARŠČIAVIMUI, BŪKLEI, PANAŠIAI Į GRIPĄ, GYDYTI

7⁹⁹ €



INFLUCID, 40 tablečių

NERECIPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Homeopatinis vaistas. **Veikliosios medžiagos:** Aconitum D3, 25 mg, Gelsemium D3, 25 mg, Ipecacuanha D3, 25 mg, Phosphorus D5, 25 mg, Bryonia D2, 25 mg, Eupatorium perfoliatum D1, 25 mg. **Terapinės indikacijos:** „Influcid“ yra homeopatinis vaistas, skirtas peršalimui ir karščiavimui, pvz., būklei, panašiai į gripą, gydyti. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** visada vartokite šį vaistą tiksliai, kaip aprašyta informaciniame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Suaugusiems imtinės ligos metu vartoti po 1 tabletę kas valandą (iki 12 tablečių per dieną), kol pagerėja. Toliau po 1–2 tabletes 3 kartus per dieną. Iki 12 m. vaikams: imtinės ligos po 1 tabletę kas 2 valandas (iki 8 tablečių per dieną), kol pagerėja. Toliau vartoti po 1–2 tabletes 3 kartus per dieną. Nerekomenduojama vartoti šio vaisto su maistu ir gėrimais. Tabletes vartoti mažiausiai pusę valandos prieš valgį ar pusę valandos po jo. Rekomenduojama leisti tabletes ištirpti burnoje. Mažiams vaikams tabletes galima ištirpinti nedideliame kiekyje vandens. **Kontraindikacijos.** Alergija veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju, jeigu temperatūra nekrenta 3 dienas ar pakyla virš 39 °C, arba atsiranda neaiškių negalavimų, arba sąvijausta negerėja. Visa tai gali būti ligos, kurią turėtų įvertinti gydytojas, požymiai. Kadangi šio vaisto preparato vartojimas kodikiams nėra pakankamai ištyrta, jo neturėtų vartoti jaunesni kaip 1 metų vaikai. **Reklamos teksto parengimo data** 2024-11-11.

NUO GERKLĖS SKAUSMO

6⁹⁹ €



NEO-ANGIN

1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg, 24 kietosios pastilės
be cukraus, 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg, 24 kietosios pastilės

NERECIPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas. Vienoje kietojoje pastilėje yra: „neo-angin“ – 120 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio, 0,60 mg amilmetakrezolio ir 5,90 mg levomentolio, „neo-angin“ be cukraus – 120 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio, 0,60 mg amilmetakrezolio ir 5,72 mg levomentolio. **Indikacijos.** „neo-angin“ sukelia vietinį mikrobų naikinantį ir skausmą malšinantį poveikį. 2,4-dichlorbenzilo alkoholis ir amilmetakrezolis turi dezinfekuojamąjį, levomentolis – saldumynų ir skausmą malšinantį savybių. „neo-angin“ kietosios pastilės vartojamos vietiniam ryklės gleivinės uždegimo gydymui. Jeigu per 3–4 dienas Jūsų sąvijausta nepagerėja arba net pablogėja, kreipkitės į gydytoją. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Suaugę žmonės, paaugliai ir vyresni nei 6 metų vaikai kas 2–3 valandas turi lėtai sušluoti po vieną kietąją pastilę. Didžiausia paros dozė yra 6 pastilės. Nepasitarus su gydytoju, „neo-angin“ vartoti ilgiau nei 3–4 dienas negalima. **Kontraindikacijos.** Alergija bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „neo-angin“. **Reklamos teksto parengimo data** 2025.01.31.

NUO **1⁹⁹** €



IBUPROFEN LANNACHER

400 mg, 10 plėvele dengtų tablečių **1⁹⁹ €**
400 mg, 20 plėvele dengtų tablečių **3⁹⁹ €**

NERECIPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Vienoje plėvele dengtoje tablečių yra 400 mg ibuprofeno. **Indikacijos:** „Ibuprofen Lannacher“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos ibuprofeno. Ibuprofenas malšina uždegimo sukeltą skausmą, patinimą ir karščiavimą, vartojamas trumpą laiką silpno ar vidutinio stiprumo skausmui, tokiu kaip mėnesinių, galvos, dantų, raumenų, sąnarių, malšinti. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** tabletes reikia nuryti valgio metu arba pavargus, užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: 0,5–1 plėvele dengtą tabletę 3 kartus per parą. Negalima viršyti didžiausios paros dozės 1200 mg ibuprofeno (3 plėvele dengtų tablečių). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijos, vartojant kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo, acetalisalicilo rūgšties darinius. Sunkus kepenų, inkstų ar širdies funkcijos nepakankamumas. Paskutinių trijų mėnesių menstruacijų laikotarpis. Pepsinė opa. Kraujavimas į smegenis, virškinimo traktą arba kt. Sisteminė raudonoji vilkligė. Jaunesni nei 12 m. vaikai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai skirti pacientams, sergantiems astma ar kraujagyslių, smegenų kraujagyslių ligomis, cukriniu diabetu ir jungiamojo audinio ligomis, senyviems pacientams. Pacientams, sergantiems bronchine astma ar alerginėmis ligomis, gali išsivystyti bronchų spazmas. Virškinimo trakto sutrikimai ir lėtinis uždegiminis žarnyno ligos gali paūmėti. Atsiradus virškinimo trakto kraujavimui ar išopėjimui, gydymas turi būti nedelsiant nutrauktas. Vartojimas gali mažinti moters vaisiingumą. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas reatas paveldimas sutrikimas – lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Pakuotė:** 10 ir 20 plėvele dengtų tablečių. **Farmakoterapinė grupė:** nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo. **ATC kodas:** M01AE01. **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:** „G.L. Pharma GmbH“, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. **Paskutinio teksto peržiūros data:** 2024-10-18. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026.08.12.

NUSIMESK SKAUSMO KAUKĘ!

NUO **5⁹⁹** €

SOLPADEINE

500 mg/8 mg/30 mg, 12 tablečių **5⁹⁹** €
500 mg/8 mg/30 mg, 12 tirpinamųjų tablečių **6⁹⁹** €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Kiekvienoje tablete ir kiekvienoje tirpinamojoje tablete yra 500 mg paracetamolio, 8 mg kodeino fosfato hemihidrata ir 30 mg kofeino. **Terapinės indikacijos.** Silpno ir vidutinio stiprumo skausmo (šnarių, nugaros, galvos ir migreninio, menstruacinio, neuralginio bei dantų) malšinimas. Persalimo ir gripo simptomų lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Suaugusiems: „Solpadeine“ tirpinamosios tabletės – po 2 tabletes ištirti per mažiau kaip pusę stiklinės vandens ir gerti iki 4 kartų per parą (pagal poreikį). „Solpadeine“ tabletės – po 2 tabletes, jei reikia, iki 4 kartų per parą. Negalima dozės gerti dažniau nei kas 4 val. ir ne daugiau kaip 8 tablečių per bet kurias 24 val. **12–15 m. paaugliams:** po 1 tabletę kas 6 val. Neįvyti maksimalios paros dozės – 4 tablečių per parą, **16–17 m. paaugliams:** po 1–2 tabletes kas 6 val. Neįvyti maksimalios paros dozės – 8 tablečių per parą. Gydymo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 3 paros. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti vaistą; Jeigu Jūs sergate sunkia inkstų ar kepenų liga; jei sutrikusi žarnyno veikla, įskaitant žarnyno veiklos sustojimą; jei Jums operacijos metu buvo pašalinta tulžies pūsle; jeigu vartojate vaistų nuo depresijos arba kvėpavimo sutrikimų; jei vartojate vaistų nuo pykinimo, vėmimo arba padidėjusio cholesterolio kiekio kraujyje; jei valgoite maistą, kuriame yra mažai natrio. Kiekvienoje tirpinamojoje tablete yra 427 mg natrio; jeigu esate arba kada nors buvotė priklausomas (-a) nuo opioidų, alkoholio, receptinių vaistų arba neteisėtų cheminių medžiagų. Nevartokite per daug produktų, kuriuose yra kofeino. Kartu su šiuo vaistu nevartokite kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio ar kodeino. Kaip ir kitų opioidų, kodeino reikia vartoti atsargiai, jeigu Jūsų kraujo spaudimas yra žemas ar sergate hipotenzija, patyrėte galvos traumą ar turite padidėjusį intrakranijinį (kaukolės vidaus) spaudimą. Nedelsdami pasakykite gydytojui, jeigu sergate sunkiais ligomis, įskaitant sunkius inkstų funkcijos sutrikimus arba sepsį, netinkamą mitybą, lėtinį alkoholizmą arba jei vartojate ir flukloksaciną. Gulta pranešimų apie sunkų sveikatos sutrikimą – metabolinę acidozę. Gali sukelti mieguistumą ar svaigimą. Jei taip nutiko, nevaldykite mechanizmų. **Kontraindikacijos.** „Solpadeine“ vartoti draudžiama: jeigu yra alergija veikliosios medžiagos, skausmą malšinantiems opioidams arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio; jeigu yra kvėpavimo funkcijos nepakankamumas; jeigu buvo galvos trauma; jeigu yra padidėjęs intrakranijinis spaudimas; jeigu buvo atlikta tulžies latakų operacija; jeigu yra lėtinis vidurių užkietėjimas; jaunesniems kaip 12 m. vaikams; skausmą malšinti vaikams ir paaugliams (0–18 m.) po gerklės ir ryklės migdolų pašalinimo dėl obstrukcinės miego apnėjos sindromo operacijos; jeigu yra žinoma, kad organizme kodeinas labai greitai metabolizuojamas į morfiną; moterims nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Reklamos teksto parengimo data 2026-08-17.



NUO **3⁹⁹** €

ASPIRIN CARDIO

100 mg, 28 skrandyje neirios tabletės **3⁹⁹** €
100 mg, 98 skrandyje neirios tabletės **8⁹⁹** €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje tablete yra 100 mg acetilsalicilo rūgšties. **Indikacijos:** kraujo krešėjimui slopinti esant nestabiliai krūtinės angina, ūminiam miokardo infarktui, pakartotinio miokardo infarkto profilaktikai, po chirurginės vainikinių arterijų operacijos, trumpalaikį smegenų išemijos priepuolių ir smegenų insulto profilaktikai, pacientų, kuriems yra daug rizikos veiksnių, koronarijų arterijų trombozės profilaktikai, venų trombozės ir plaučių embolijos profilaktikai po ilgalaikio galinės įtėrimo. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** gerti mažiausiai 30 minučių prieš valgį, užgeriant dideliu kieku vandens. Vartoti 100–300 mg/parą priklausomai nuo indikacijos. **Kontraindikacijos:** alergija acetilsalicilo rūgščiai, kitiems salicilatams ar pagalbinei medžiagai; jei anksčiau vartojant salicilatų ar panašių medžiagų pasireiškė astma; ūmi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa; hemoraginė diatezė, sunkūs kepenų/inkstų funkcijos/sirdies nepakankamumas; jei vartojate 15 mg ar didesnę metotreksato dozę/sav.; paskutinis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai:** Nepasitarus su gydytoju, negalima vartoti vaikų ir paauglių virusinės infekcijos (ypač gripo ir vėjaraupio), pasireiškiančios su karščiavimu arba be jo, gydyti dėl Reye sindromo rizikos. Jei išprovokuoti podagros priepuoli, Nerekomenduojama vartoti jaunesniams kaip 18 metų vaikams. Vartojant kartu su alkoholiu didėja virškinamojo trakto gleivinės pažeidimo ir kraujavimo rizika. Prieš vartojant ar vartojant kartu su kitais vaistais, pvz. nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU), kraujo krešėjimą mažinančiais vaistais, kai kuriais vaistais nuo padidėjusio kraujospūdžio, metanizolu ar kt., pasakykite gydytojui ar vaistininkui. Nėštumas: pirmus 6 nėštumo mėnesius „Aspirin Cardio“ vartoti negalima, išskyrus atvejus, kai tai neabejotinai būtina ir taip pataria gydytojas. Informacija sutrumpinta! Reklamos teksto parengimo data: 2024-08. PP-ASP-LT-0032-1, MA-ASP-LT-0004-1



■ SLENKA PLAUKAI? PASITIKĖK VAISTO GYDOMĄJĄ GALIA!

NUO **11⁹⁹** €

BEOTEBAL

10 mg, 30 tablečių **11⁹⁹** €
10 mg, 60 tablečių **22⁹⁹** €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

BEOTEBAL 10 mg tabletės. **Kokybinė ir kiekybinė sudėtis.** Kiekvienoje tablete yra 10 mg biotino. **Terapinės indikacijos.** „BEOTEBAL“ priklauso B vitaminų preparatų grupei ir vartojamas biotino trūkumo gydymui suaugusiems. Biotino trūkumas gali sukelti plaukų retėjimą, plaukų slinkimą, nagų ir plaukų augimo sutrikimus bei padidėjusį trapumą, dermatitą (odos uždegimą, kuriame paprastai būdingas niežulys ir paraudimas) aplink akis, nosį, burną, ausis ir kirkšnį, konjunktyvitą (akies junginės uždegimą, dėl kurio akys atrodo paraudusios), nuovargio, parastizijos (nenormalaus odos pojūčio, pasireiškiančio tokiais simptomais kaip dilgčiojimas, peršėjimas, šalimas, deginimas, tirpimas) simptomus. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems, įskaitant sergčius pacientus, vartoti 10 mg biotino, t.y. 1 tabletę „BEOTEBAL“ per parą. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu yra numatoma atlikti laboratorinius tyrimus, turite pasakyti savo gydytojui arba laboratorijos darbuotojams, kad vartojate arba neseniai vartojote „BEOTEBAL“, nes biotinas gali turėti įtakos tokių tyrimų rezultatams. Atsivėlgiant į tai, koks tyrimas atliekamas, dėl biotino poveikio tyrimų rezultatai gali būti klaidingi didesni arba klaidingi mažesni. Reklamos teksto parengimo data 2025-02.

*Slenkantis, silpnas, trapūs plaukai yra viena iš biotino trūkumo išraiškų. „Beotebal“ yra nereceptinis vaistas skirtas biotino trūkumo gydymui.



■ SKAUSMUI, TINIMUI IR UŽDEGIMUI MAŽINTI

8⁹⁹ €



DIFORTAN, 100 mg/g, gelis, 100 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekviename „Difortan“ gelio grame yra 100 mg etofenamato. **Terapinės indikacijos:** lengvų arba vidutinio stiprumo raumenų skausmų, kraujosruvų, potrauminio skausmo, lengvo arba vidutinio stiprumo raumenų skausmo (osteoartrozės / osteoartrito), lengvo arba vidutinio stiprumo šnarių skausmo, sinovito, (neinfekcinio) artrit, bursito, tendinito, vidutinio sunkumo su raumenų ir skeleto sistema susijusio uždegimo, t.y. potrauminio ar reumatinės kilmės, lokalus gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems kasdien 3–4 kartus per parą, 14 parų, dozės kiekis atitinka nuo 2,5 iki 5 cm išpausto gelio. **Kontraindikacijos:** vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai ar ant egzemos pažeistų paviršių, atvirų žaizdų, vietų su opomis ar pažeidimais. **Specialūs įspėjimai:** „Difortan“ negalima tepti ant gleivinių arba ant akių. Galimas padidėjęs jautrumas dėl kryžinės reakcijos su kitais uždegimus malšinančiais vaistiniais preparatais rizikos. Kontaktinės fotoalergijos rizika, todėl saugoti nuo saulės spindulių. Negalima atvesti sisteminio poveikio reikšmingų galimybių, todėl pacientams, kuriems yra inkstų ar kepenų nepakankamumas, šį vaistinį preparatą reikia vartoti atsargiai. Pasitarti su gydytoju, jeigu būklė nepagerėja arba jei po 7 parų būklė pablogėja. Reklamos teksto parengimo data 2025-05-19.

NUO **2⁹⁹** €

MEZYM

10000V, 10 skrandyje neirių tablečių **2⁹⁹** €
20000V, 20 skrandyje neirių tablečių **6⁹⁹** €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 skrandyje neirioje „Mezym 10000V“ tablete yra 80–110,11 mg kaulių kasos miltelių, kurių aktyvumas atitinka ne mažiau kaip 10000 lipazės vienetų, 7500 amilazės vienetų, 375 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. 1 skrandyje neirioje „Mezym 20000V“ tablete yra 160–222,22 mg kasos miltelių (š kaulių kasos pagaminto pankreatino), kurių minimalus aktyvumas atitinka 20000 lipazės vienetų, 12000 amilazės vienetų, 900 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. „Mezym“ vartojamas tuomet, kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentų ir tai sukelia virškinimo sutrikimų. „Mezym“ vartoti negalima: jeigu yra alergija kasos milteliams, kaulių baltymams arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; šio vaisto negalima vartoti, jeigu Jūs sergate ūminiu kasos uždegimu (pankreatitu) arba Jums padidėjo lėtinis kasos uždegimas, kai ligos požymiai yra stipriai išreikšti. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju ir vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Mezym“. Cistinė fibrozė kartais gali komplikuoti žarnyno nepažeidimą. Esant simptomų, panašių į žarnyno nepažeidimą požymius, reikia apsvaistyti žarnyno susiaurėjimo galimybę. Jeigu pajutote neįprastą diskomfortą skrandyje ar žarnyne, pasikvėkite nusišalinti pūtimą, būtinai kreipkitės į gydytoją, kuris jus apžiūrės, kad atstumtų žarnų pažeidimo galimybę. „Mezym“ sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas yra sakes, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „Mezym“ reikia būtinai nuryti nekrakmus. „Mezym 10000V“ sudėtyje esantis dažiklis azorubinas (E122) gali sukelti alerginių reakcijų. Dozavimas: „Mezym“ visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. „Mezym“ dozės priklauso nuo virškinimo sutrikimų laipsnio, optimali dozė nustatoma individualiai. Jeigu nenurodyta kitaip, valgant išgeriamas 2–4 plevės dengtos „Mezym 10000V“ tabletės arba 2–4 plevės dengtos „Mezym 20000V“ tabletės. Dienos dozė 15000–20000 lipazės vienetų kilogramo kūno svorio neturėtų būti viršijama. Dozės vaikams turi paskirti gydytojas. Atsivėlgiant į maistą ar virškinimo sutrikimo sunkumą, rekomenduojama dozė gali būti padidinta. Plevės dengtos tabletės nurijamos nekrakmus ir užgeriant dideliu kieku skysčiu, gydant ilgą laiką, vartojimo trukmę nustato gydytojas. Vartojimo trukmę vaikams taip pat nustato gydytojas. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, I. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 1947, LT@berlin-chemie.com. LT-MEZ-3-2025, MFLOW, 2025/12

„MEZYM“ PADEDA PAGERINTI SUTRIKUSĮ VIRŠKINIMĄ!

■ SAUSOMS AKIMS ARTELAC®

-30%



ARTELAC®

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Artelac“ Splash® – vienas populiariausių mūsų produktų su hialuronu, skirtas sausoms akims nedelsiant nuraminti ir sudrėkinti. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius. „Artelac“ Rebalance® užtikrina stiprų drėkinamąjį poveikį ir palengvėjimą, esant nuolat pasikartojančiam akių sausumui. Drėkina akis ir apsaugo jų paviršių, papildoma ašarų plevės puoselėjančiais jonais, vitaminu B12, sureguliuoja osmosinį akies paviršiaus balansą ir taip padeda ilgam sustabdyti sauso akių simptomų pasireiškimą. „Artelac“ TripleAction® pažangus tirpalas, sukurtas taip, kad išliktų ant akies paviršiaus, ir intensyviai drėkina akis greitai ir ilgai numalšintu sauso akių simptomus. Sudėtyje esantys komponentai (hialuronas, glicerolis, karbomeras, lipidiniai komponentai) atkuria visą ašarų plevės sudedamąsias. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius. „Artelac“ Nighttime Gel® atkuria ašarų plevės nakties metu. Produktas suteikia papildomą apsaugą tiems, kam pasireiškia didesnis ir nuolatinis akių sausumas. 2026-03-23

„ARTELAC“ – PAŽANGŲ SPRENDIMAI SAUSOMS AKIMS.

*Akcia taikoma geltona etiketė pažymėtais prekėmis

NUO SLOGOS, SINUSŲ SKAUSMO, KARŠČIAVIMO

NUO 4⁹⁹ €



COLDREX HOTREM

LEMON, 750 mg/10 mg/60 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 5 paketėliai 4⁹⁹ €
LEMON, 750 mg/10 mg/60 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 10 paketėlių 8⁹⁹ €
HONEY & LEMON, 750 mg/10 mg/60 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 10 paketėlių 8⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Terapinės indikacijos: trumpalaikis persalimo ir gripo simptomų (karščiavimo, dogos ir skausmo) lengvinimas. **Vartojimo būdas:** suberti 1 paketėlio turinį į stiklinę, pripilti karšto vandens (maždaug 125 ml), gerai išmaišyti, kol milteliai ištirps. Pagal poreikį pripilti šalto vandens. **Dozavimas:** suaugusiems (įskaitant senyvo amžiaus) ir 16 m. bei vyresniems paaugliams, kurių svoris didesnis nei 54 kg, po 1 paketėlį kas 4–6 val., jei reikia. „Coldrex Hotrem Lemon“, „Coldrex Hotrem Honey & Lemon“: didžiausia paros dozė – 5 paketėliai per 24 val., jei reikia. **Specialūs įspėjimai:** nevartokite kartu jokių kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio, taip pat vaistų nuo kosulio arba persalimo, gripo ir nosies gleivinės paburkimo ar užguliusios nosies. Per didelės paracetamolio dozės gali sukelti sunkių kepenų pažeidimą. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti, jei padidėjusi prostata arba jums sunku šlapintis; sergate kraujagyslių liga, vadinama Reino (Raynaud) sindromu; sergate inkstų liga; yra lėtinis mitybos nepakankamumas; reguliariai vartojate alkoholi; sergate Žilbero (Gilbert) sindromu; vartojate kitų vaistų, kurie veikia kepenų funkciją; jums trūksta fermento gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės; sergate hemolizine anemija; yra dehidratacija; esate senyvo amžiaus, suaugęs ar paauglys, kurio kūno svoris mažesnis nei 54 kg; yra šlapimo susilaikymas ar šlapimo takų akmenų; sergate astma arba jums yra padidėjęs jautrumas acetylsalicilo rūgščiai, pasireiškiantis bronchu spazmu; sergate sunkia infekcija, nes gali padidėti metabolinės acidozės rizika. Vartojant negalima gerti alkoholinių gėrimų dėl galimo kepenų pažeidimo. Nešumuo metu ir žindymo laikotarpiu vartoti negalima. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliosios arbat bet kuriai pagalbinei medžiagai; padidėjęs kraujo spaudimas; padidėjęs kraujagyslių aktyvumas; sergate cukriniu diabetu; sergate širdies liga; sergate uždaro kampo glaukoma; sergate feochromocitoma; sergate kepenų ar sunkia inkstų liga; esate nėščia ar žindote kūdikį; vartojate vaistus, mažinančių nosies paburkimą, slėpiančių apetitą, vaistus nuo persalimo ar apėtią didinančių vaistų; vartojate tokius vaistus deproksilą gydyti kaip triciklinius antidepresantus, betalokatorius arba monomooksidazės inhibitorius (MAOI) bei dvi savaites po MAOI vartojimo; jaunesniems kaip 16 m. vaikams ir paaugliams. **Reklamos teksto parengimo data** 2026-04-01.

PAVIRŠINĖMS ŽAIZDOMS IR ODOS DEZINFEKCIJAI PRIEŠ NECHIRURGINES PROCEDŪRAS

6⁹⁹ €



DUOSEPTIC, 1 mg/20 mg/ml odos purškalo (tirpalas), 50 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml „DuoSeptic“ odos purškalo (tirpalo) yra 1 mg oktenidino dihidrochlorido, 20 mg fenoksietanolio. **Terapinės indikacijos:** mažų paviršinių žaizdų antiseptinis gydymas ir odos dezinfekcija prieš nechirurgines procedūras; karlotinis trumpalaikis gleivinių ir gretimų audinių antiseptinis gydymas prieš diagnostines procedūras šangės ir lyties organų srityje, įskaitant makštį, moters išorinius lyties organus ir varpos galvutę, taip pat prieš šlapimo pūslės kateterizaciją; laikinas ribotas pagalbinis antiseptinis tarpinurštinės mikozės (gybelinei infekcijos tarp rankų ar kojų pirštų) gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti ant odos. Ant gydymų sričių užpurškite 1 kartą per dieną taip, kad jos visiškai sudrėktų. Kitu atveju galite užpurksti ant tampono ir gydymą vietą patrinti (ne mažiau nei dviem „DuoSeptic“ supurkštais tamponais), kad visiškai sudrėktų. Tinkamiausias būdas – naudojant tamponus. Palaukite, kol „DuoSeptic“ visiškai išdžius, prieš aprėšdami ar užklijuodami žaizdą. Naudojant gybelinei infekcijai gydyti – purkšti ryte ir vakare. **Kontraindikacijos:** nenaudokite, jei padidėjęs jautrumas oktenidino dihidrochloridui, fenoksietanolio ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. „DuoSeptic“ neturėtų būti naudojamas pilvo ertmei (pvz., atliekant operaciją), šlapimo pūslės ar ausies membranos skaldyti. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** nenurykite, ypač didelio kiekio, ir neleiskite patekti į kraujotakos sistemą, pvz., dėl atsitiktinio įsivirkimo. Naujagimiams, ypač neišnešiotiems, vartoti atsargiai, nes „DuoSeptic“ gali sukelti sunkių odos pažeidimų. Pasalinkite vaistinio preparato perteklių ir užtikrinkite, kad tirpalo neliktų ant odos ilgiau, nei reikia. Venkite patekimo į akis. Patekus – nedelsdami gerai praskalaukite vandeniu. Neleiskite svirkštų į giliuosius raumenis. Naudoti tik išorškai. Po gilių žaizdų praplovimo svirkštų buvo pranešama apie nuolatinę odos (patinimą), eritemą (paraudimą), audinių nekrozę; kai kuriais atvejais prireikė chirurginės intervencijos. **Reklamos teksto parengimo data** 2026-03-23.

BE KONSERVANTŲ

-30 %



OCUTEARS

ALO+, 0,2 %, oftalmologinis tirpalas, 10 ml 4⁵² 11¹⁸ €
HYDRO+, 0,2 % lašai, 10 ml 4⁴² 10⁴⁸ €

AKIŲ LAŠAI

„Ocutears“ ALO+“ sudėtyje esantys alavijai turi akių paraudimą ir paburkimą mažinančių, antimikrobinių, priešūždegiminių, žaizdų gijimą skatinančių, antioksidacinių poveikį. Alavijai stiprina hialurono drėkinamąjį ir regeneracinį poveikį, užtikrindami dar ilgiau trunkantį komfortą ir akies paviršiaus apsaugą.

„OCUTEARS“ ALO+“ IR „OCUTEARS“ HYDRO+“ – EFEKTYVI IR ILGALAIKE APSAUGA SAUSOMS AKIMS BE KONSERVANTŲ.

3⁴⁹ €



NEOCITRAMONAS

240 mg / 200 mg / 30 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje tabletyje yra 240 mg acetylsalicilo rūgšties, 200 mg paracetamolio ir 30 mg kofeino. **Terapinės indikacijos:** vaistas vartojamas trumpalaikiam lengvo ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių ir menstruacijų skausmui malšinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tabletes reikia vartoti nekrantant, užgeriant ne mažesniu kaip 250 ml kiekiu vandens. Atsivėlgiant į ligos sunkumą, vartoti po 1 tablete 1–4 kartus per dieną. Didžiausia paros dozė – 4 tabletės. Negalima vaisto vartoti dažniau kaip kas 6 valandas ir ilgiau kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arbat bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, esanti ar buvusi virškinimo trakto opa ir (arba) kraujavimas iš virškinimo trakto, buvusi bronchu astma, kurią sukėlė salicilatai ar kitokie nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, pacientas jaunesnis negu 12 metų, 3 paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas, ligos, kurių metu yra padidėjęs kraujavimo pavojus, kraujo krešėjimo sutrikimas, vartojama 15 mg ar didesnė metotretsato savaitės dozė, sunkūs širdies, kepenų, inkstų nepakankamumas, labai sunki aukšto kraujo spaudimo liga, kamuoja nemiga, padidėjęs nervingumas, dirglumas, nerimas, baimė, susijaujinimas ar panašūs simptomai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergate podagra, bronchu astma, kolagenozėmis ar kraujodaros sistemos ligomis, yra sustiprėjusi skydliaukės veikla ar sergate cukriniu diabetu, yra virškinimo trakto, inkstų, kepenų ar širdies funkcijos sutrikimų, yra buvusi alergija kitoms nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, planuojama chirurginė operacija, pacientas yra jaunesnis kaip 16 metų ir serga virusinėmis ligomis, pacientas yra senyvo amžiaus, planuojama pastoti, pakinta šlapimo kiekis, pasireiškia paburkimų ar skausmas juosmens srityje, pagelsta oda ar akys, patamsėja šlapimas, atsiranda bendras silpnumas, yra nerimo sutrikimas, panikos sutrikimas ar nemiga. Sudėtyje esantis kofeinas gali sukelti drebulį, dažną širdies plakimą, viduriavimą, susijaujinimą, stiprų širdies plakimą, nemigą, galvos skausmą, raumenų trūkčiojimą ir šlapimo išskyrimo padidėjimą. **Reklamos teksto parengimo data** 2026-03-23

-30 %



NAVIVISION, NAVITAE, NAVI INFLA

MEDICINOS PRIEMONĖS

Navivision akių lašai – stipriai drėkinantys natūralūs akių lašai su natrio hialuronatu 0,3 % pagrindinėms akių problemoms spręsti. **Pavargusių akims** – užtikrina greitą ir ilgalaikį palengvėjimą esant sausų ir pavargusių akių pojūčiui. **Sudirgusių akims** – akių alergijos simptomams palengvinti bei pagrindinėms akių problemoms spręsti. **Paraudusių akims** – palengvina paraudusius ir pavargusius akių būklę, susijusius su konjunktyvitu (niežėjimas, ašarojimas, deginimas ir t.t.). **Navitae** Plus PF – antioksidacinio poveikio ir tepamosios savybės pasižymintys akių lašai su vitaminais A + E. Palengvina sausų akių sindromą ir akių diskomfortą, kurį sukelia keratitas, uždegiminis poodos po ragenos operacijos, trauminės opos, ragenos uždegimas. Be konservantų. **Naviflaim** – antioksidaciniai drėkinamieji akių lašai su natūraliais augaliniais ekstraktais skirti naudoti esant ūmiam, lėtiniam ar alerginiam konjunktyvitui. Lengvina su konjunktyvitu susijusius simptomus: ašarojimą, paraudimą ir niežėjimą.

*Akcija taikoma gėtos etiketė pažymėtomis prekėmis

NUO RĖMENS IR PADIDĖJUSIO RŪGŠTINGUMO

NUO 2⁹⁹ €



ELFIMEST

20 mg, 7 skrandyje neiros tabletes 2⁹⁹ €
20 mg, 14 skrandyje neirių tablečių 4⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Kiekvienoje skrandyje neiroje tabletyje yra 20 mg ezomeprazolo (atitinkanti 21,75 mg ezomeprazolo magnio druskos dihidrato). **Terapinės indikacijos.** „Elfimest“ skirtas suaugusioms žmonių gastroezofaginio refliuks simptomams (pvz., rėmens ir skrandžio rūgšties regurgitacijos) trumpam laikui gydyti. **Dozavimas.** Rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 tablete) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, tabletes gali prireikti vartoti 2–3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaites. Simptomams visiškai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Reikia nuryti visą tablete, užgeriant puse stiklinės vandens. Tablečių negalima nei kramtyti, nei traukti. Kitoks pasirinkimas – tablete galima ištrinti pusę stiklinės negazuoto vandens, kitokios skysčiai netinka. **Kontraindikacijos.** Jeigu yra alergija ezomeprazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu yra alergija bet kuriam kitam protonų siurblio inhibitoriui (pvz., pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, omeprazolui); jeigu po „Elfimest“ ar kitų panašių vaistų vartojimo kada nors pasireiškė sunkūs odos išsiverimai arba odos lupimasis, pūsles ir (arba) burnos opos; jeigu vartojate vaistinių preparatų, kuriuose yra neflinavio (vaistas ŽIV infekcijai gydyti). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu anksčiau sirgote skrandžio opa arba patyrėte skrandžio operaciją; jeigu 4 savaites arba ilgiau nepertaukiamai gydėtės dėl refliuksio arba rėmens; jeigu yra gelta (odos arba akių pageltimas) arba sunkių kepenų sutrikimų; jeigu turite sunkių inkstų veiklos sutrikimų, jeigu esate vyresnis negu 55 metų ir pasireiškė nauji ar neseniai pakito refliuksio simptomai, arba jeigu kasdien jums reikia vartoti nereguliuojamų vaistų nuo nevirškinimo ar rėmens; jeigu jums kada nors pasireiškė odos reakcija po gydymo vaistu, panašiu į „Elfimest“, kuriuo mažinamas skrandžio rūgštingumas; jeigu bus atliekama endoskopija arba šlapalo kvėpavimo testas, arba specialus kraujo tyrimas (dėl chromogranino A). Reikia kreiptis į gydytoją, jeigu netekote daug kūno svorio dėl nežinomų priežasčių; rydami juntate sunkumą arba skausmą; patariate skrandžio skausmą arba nevirškinimo požymius, pvz., pykinimą, pilnumą, vidurių pūtimą, ypač pavale; pradėjote vemti maistu arba krauju, kuris vėmalose gali atrodyti kaip tamsūs kavos tirščiai; pasitvirtino juodumėnis išmatomis (kraujui nudažytos išmatos); patariate stiprų arba nuolatinį viduriavimą; ezomeprazolo vartojimas siejamas su nedidele infekcinio viduriavimo padidėjimo rizika; jeigu jums išbėrė oda, ypač saulės apšviestoje vietoje, nuo skubiau pasakykite apie tai savo gydytoju, nes jums gali tekti nutraukti gydymą „Elfimest“. Taip pat nepamirškite pasakyti, jeigu jums pasireiškia bet koks kitas šalutinis poveikis, pvz., sąnarių skausmas. **Reklamos teksto peržiūros data** 2025-03-03. **Reklamos parengimo data** 2025-07. ELF-11-00010

GREITA IR INOVATYVI PAGALBA NUO RĖMENS!

5⁹⁹ €

SEPTANAZAL

SUAUGUSIESIEMS, 1 mg/50 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml
 VAIKAMS, 0,5 mg/50 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Ksilometazolino hidrochloridas / Dekspantenolis „Septanazal“ nuo 6 metų amžiaus vartojamas - nosies gleivinės pažeidimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) bei gleivinės pažeidimo gijimui skatinti - nealerginiams nosies gleivinės uždegimui (vazomotoriniam rinitui) lengvinti; - kvėpavimo nosį pasunkėjimui po nosies operacijos šalinii. Rekomenduojama dozė 6 metų bei vyresniems vaikams yra po vieną įpurškimą į kiekvieną šnervę iki 3 kartų per parą. **Kontraindikacijos.** „Septanazal“ suaugusiems vartoti negalima, jeigu yra alergija ksilometazolino hidrochloridui, dekspantenoliui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu jums arba jūsų vaikui yra sausūs nosies gleivinės uždegimas ir atsiranda šašų (sausas rinitas), jeigu jums arba jūsų vaikui buvo chirurginių būdų pašalinta posėginė liauka arba buvo atlikta kita operacija, susijusi su smegenų dangalais. **Specialūs įspėjimai.** „Septanazal“ galima vartoti tik atidžiai įvertinus rizikos ir naudos santykį, jeigu pacientas yra gydomas monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI) ar kitokiais kraujospūdį didinančiais vaistais, jeigu padidėjęs akispūdis (ypač) jei sergama uždarą kampo glaukoma), pacientas serga sunkia širdies ir kraujagyslių liga, yra feochromocitoma, yra metabolinių sutrikimų, yra porfirija, yra prostatos hiperplazija. **Teksto peržiūros data:** 2023.11.20.

ATKĖMSA UŽGLUSIĄ NOSĮ IR ŠVELNIAI GYDO ĮSAUSUSIĄ NOSIES GLEIVINĘ.

KAI VARGINA HEMOROJAUS SIMPTOMAI

-30% 7^{48€} 10^{59€}

HEMAGEL® PROCTO

5 rektalinės žvakutės

MEDICININĖS PASKIRTIES PREKĖ

PASKIRTIS: skatinti ūmį ir lėtinį tiesiosios žarnos gleivinės žaizdų gijimą pacientams, kenčiantiems nuo įtrūkimų ir hemorojus, taip pat pacientams po Barono operacijos. Mažina kraujavimą, atsiradusį dėl hemorojus, padeda pašalinti diskomforto pojūtį, ypač deginimą ir perėjimą tiesiosios žarnos sritį. **SUDĖTIS:** miltelių pavidalo kopolimeras HEMA-HAS ir kietųjų riebiųjų apvalkalas. **NAUDOJIMAS:** Kartą per parą, geriausia prieš einant miegoti, žvakutę įdėti į tiesiąją žarną suvalpinant galut. **GAMINTOJAS:** VH Pharma a.s., Lėkijos Respublika.

SĄNARIAMS

6⁹⁹ €

GLUCOSAMIN-RATIOPHARM

1,5 g, milteliai geriamajam tirpalui, 20 paketėlių 9⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 paketėlyje yra 1,5 g gliukozamino sulfato, tai atitinka 1,884 g gliukozamino sulfato natrio chlorido arba 1,178 g gliukozamino. **Terapinės indikacijos:** lengvo ar vidutinio sunkumo kelio osteoartrito sukelty simptomų lengvinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** paketėlio turinį ištirpinti stiklinėje vandens ir gerti 1 kartą per parą. Gliukozaminas netinka vartoti ūminio skausmo simptomams slopinti. Simptomų palengvėjimas (ypač skausmo) gali pasireikšti vartojant kelias savaites, kartais ir dar ilgiau. Jei simptomai nepalengvėja po 2–3 mėnesių vartojimo, reikia iš naujo spręsti, ar gydymą gliukozaminu tęsti toliau. Miltelius galima vartoti tiek valgio metu, tiek nevalgiant. Gliukozaminas negalima vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas gliukozaminui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. „Glucosamin-ratiopharm“ negalima skirti ligoniams, alergiškiems kiaušiniams, žuvių produktams, nes iš jų išgaunama preparato veiklioji medžiaga. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jei pacientui yra sutrikęs gliukozės toleravimas, prieš skiriant gydymą ir vėliau periodiškai rekomenduojama stebėti gliukozės kiekį kraujyje ir, jei reikia, insulino poreikį. Jei pacientai turi širdies ir kraujagyslių ligų rizikos faktorių, rekomenduojama stebėti lipidų kraujyje, nes vartojantiems gliukozaminą ligoniams buvo nustatyti keli hipercholesterolemijos atvejai. Buvo aprašytas atvejis, kai, pradėjus gliukozaminą terapiją, pablogėjo astmos simptomai. Gliukozaminas negalima vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams, nes neištyrta vartojimo saugumas ir veiksmingumas. Atsargumas reikalingas, jei pacientui yra fenilketonurija. Šio vaistinio preparato paketėlyje yra 151 mg natrio, tai atitinka 8 % didžiausios PSO rekomenduojamos paros normos suaugusiems, kuri yra 2 g natrio. Dėl sudėtyje esančio sorbitolio šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems yra įgimtas fruktozės netoleravimas. Taip pat sorbitolis gali paveikti kitių kartų vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį prieinamumą. Reklamos teksto parengimo data 2025-01-22. GLR-LT-00006

JUDĖJIMUI BE SKAUSMO!

NUO 6⁹⁹ €

NUROFEN

ORANGE, 12 kramtomųjų minkštųjų kapsulių 6⁹⁹ €
 FORTE ORANGE, 40 mg/ml, geriamoji suspensija, 100 ml 8⁹⁹ €
 FORTE STRAWBERRY, 40 mg/ml, geriamoji suspensija, 100 ml 8⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 ml „Nurofen Forte Orange“, 40 mg/ml, ir „Nurofen Forte Strawberry“, 40 mg/ml, geriamosios suspensijos yra 40 mg ibuprofeno. Kiekviena „Nurofen Orange“, 100 mg, kramtomosios minkštosios kapsulės yra 100 mg ibuprofeno. **Terapinės indikacijos:** „Nurofen Forte Orange“ ir „Nurofen Forte Strawberry“ - trumpalaikis silpno ir vidutinio skausmo malšinimas. Trumpalaikis karščiavimo mažinimas. „Nurofen Orange“ - karščiavimo mažinimas, persilimo ir gripo simptomų, silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip gerklės, dantų, ausies, galvos, nedidelio maudimo ir pastėmpimo, malšinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** „Nurofen Forte Orange“ ir „Nurofen Forte Strawberry“ - naudojant pakaušulį esant dozavimo švirkštui dozuoti, kaip nurodyta toliau: suaugusiems daugiau nei 5 kg (5–5 metų) kūdikiams gerti po 1,25 ml 3 kartus per parą, 7–9 kg (6–11 metų) kūdikiams - po 1,25 ml 3–4 kartus per parą, 10–15 kg (1–3 metų) vaikams - po 2,5 ml 3 kartus per parą, 16–19 kg (4–5 metų) vaikams - po 3,75 ml 3 kartus per parą, 20–29 kg (6–9 metų) vaikams - po 5 ml 3 kartus per parą, 30–40 kg (10–12 metų) vaikams - po 7,5 ml 3 kartus per parą. „Nurofen Orange“ - vaikams ibuprofeno dozė priklauso nuo kūno svorio, paprastai vienkartinė dozė yra 5–10 mg/kg kūno svorio. Didžiausia „Nurofen Orange“ paros dozė yra 20–30 mg/kg kūno svorio. Rekomenduojama paros dozė gali būti pasiekta remiantis šiais nurodymais: 20–29 kg svieriantiems vaikams - 200 mg ibuprofeno (atitinka 2 kapsules), didžiausia paros dozė - 600 mg ibuprofeno (atitinka 6 kapsules); 30–40 kg svieriantiems vaikams - 300 mg ibuprofeno (atitinka 3 kapsules), didžiausia paros dozė - 900 mg ibuprofeno (atitinka 9 kapsules). Jei reikia, dozės turėtų būti skiriamos maždaug kas 6–8 val. (mažiausias laiko tarpas tarp dozių yra 6 val.). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofeniui arba bet kuriai vaisto pagalbinei medžiagai; jei praėjusio laiko buvo padidėjusio jautrumo reakcija (astma, rinitas, angioneurozinis patrinkimas, dilgėlinė) vartojant ibuprofeną, kita nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU), pakeičiant ir acetilsalicilo rūgšties darinius; anksčiau buvus su NVNU vartojimu susijęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar virškinimo trakto perforacija; aktyvi ar anksčiau buvusi psichomotorinė pėsinė opa arba opa su kraujavimu (du ar daugiau atskirų patvirtintų opų susidariusių ar kraujavimo epizodų); kraujavimas į smegenis arba kitoks kraujavimas; sunkūs kepenų, inkstų arba širdies nepakankamumas; neišgydytas ūmus kraujodaros sutrikimas; paskutinis nėštumo trimestras laikotarpis; jeigu pasireiškė sunki dehidracija (dėl vėmimo, viduriavimo ar nepakankamo skysčių kiekio). **Specialūs įspėjimai:** šiuo vaistu reikia atsargiai vartoti pacientams, sergantiems sisteminėmis raudonąja vilkige, taip pat tiems, kurie serga mirtina jungiamojo audinio liga, nes didėja aspiptinio meningito rizika, kuriems yra įgimtas porfino metabolizmo sutrikimas (paveldybi, ūminė intermituojanti porfirija), virškinimo trakto sutrikimai ir lėtinis uždegiminis žarnyno ligos (opinis kolitas, Krono liga), serga vėžyvais; jei anksčiau buvo padidėjęs kraujospūdis ir (arba) širdies nepakankamumas, yra inkstų, kepenų veiklos sutrikimas; skirti po didelės apimties chirurginės operacijos; jei yra šienligė, nosies polipai arba lėtinis obstrukcinis kvėpavimo sutrikimas; jei anksčiau buvo pasireiškusi alerginių reakcijų į kitas medžiagas, nes dėl to padidėja alerginių reakcijų pasireiškimo rizika vartojant šiuos vaistus. Gydant ibuprofenu būna prasta arba sunkias odos reakcijas, pakeičiant ekfoliacinį dermatitą, daugiaformę eritemą, Stevenso-Johnsono sindromą, toksiškę epidermio nekrolizę, vaisto sukelta reakcija su eozinofilija ir sisteminėmis simptomais (VRESS). ūminė generalizuota egzantematinė pustuliozė (UGEP), kuri gali būti pavojinga gyvybei arba mirtina. Jei atsiranda šių reakcijų požymių ir simptomų, ibuprofeno vartojimą reikia nedelsiant nutraukti. Šie vaistai gali būti susiję su nedideliu širdies priekubio (miokardo infarkto) ar insulto pavojaus padidėjimu. „Nurofen Forte Orange“ ir „Nurofen Forte Strawberry“ negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas - fruktozės netoleravimas. Geriamosios suspensijos sudėtyje yra skytyto maltitolio, kuris gali trupučiui lašinti vidurius, natrto - būtina atsisakyti, jei kontroliuojamas natrto kiekis maiste. „Nurofen Orange“ negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas - fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos tekstas parengtas 2026-08-10.

6⁹⁹ €

NUROFLEX, 200 mg, 2 vaistiniai pleistrai

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Kiekviamame vaistiniame pleistru yra 200 mg ibuprofeno. **Farmacinė forma.** Vaistinis pleistras: baltas, lipnus vaistinio preparato sluoksnis, paskirstytas ant 10 cm x 14 cm dydžio lankstaus kūno spalvos austo pagrindo, ir padengtas nuimamu apsauginiu sluoksniu. **Terapinės indikacijos.** Nuroflex skirtas trumpalaikiam lokalaus skausmo, sukelto ūminio raumenų patempimo arba lengvų viršutinių ar apatinių galūnių sąnario aplinkos audinių traumų, simptominiams gydymui suaugusiems ir 16 metų ar vyresniems paaugliams. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems ir 16 metų ir vyresniems paaugliams: viena dozė yra lygi vienam vaistiniam pleistru. Didžiausia dozė per vieną 24 valandų laikotarpį yra vienas vaistinis pleistras. Pleistrai gali būti vartojamas bet kurio dienos ar nakties metu, tačiau ji reikia nuimti ir naują pleistrą vėl užklijuoti kitą dieną tuo pačiu laiku. Vartoti ant odos ir tik trumpą laiką. Vaistinis pleistras turi būti naudojamas visas, jo negalima karpyti. Klijuojama tik ant sveikos odos. Gydymasis pleistrais neturi būti vartojamas kartu su okliuziniu tvarslu. Prieš užklijuojant vaistinį pleistrą rekomenduojama kruopščiai nuplauti ir išdžiovinti gydymąjį kūno paviršių. Pirmiausia pašalinkite centrinę apsauginio sluoksnio dalį, skirtą apsaugoti lipniam pagrindui paviršiui, ir uždekite pleistrą šia lipnia pusė ant skaudančio ploto. Kai pleistras yra reikiamoje vietoje, pašalinkite apsauginio sluoksnio dalį, esančią pleistro kraštuose. Vaistinis pleistras yra lankstus ir pašalintas, todėl prireikus gali būti užklijuojamas ant arba šalia sąnario, tokiu būdu leisdamas jam normaliai judėti. Venkite vaistinio pleistro drėkinimo. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai vaisto pagalbinei medžiagai. Jeigu praėjusio laiko buvo padidėjusio jautrumo reakcija (pvz., astma, bronchų spazmas, rinitas, angioneurozinė edema ar dilgėlinė) vartojant ibuprofeną, acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistinių preparatų nuo uždegimo (NVNU). Vartojimas ant įtrūkusių ar pažeistų odos. Trečiasis nėštumo trimestras. Vartojimas ant akių, liūpų ar gleivinių. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei simptomai išlieka ilgiau nei 5 paras arba pablogėja, reikia pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu. Bronchų spazmas gali pasireikšti pacientams, vartojantiems ibuprofeną, kurie serga arba anksčiau sirgo bronchine astma ar alergija. Gydymą reikia nedelsiant nutraukti, jei užklijuojamas vaistinis pleistras atsiranda odos išbėrimas. Pacientai turi būti įspėjami apie gydymo zonos reakciją stipriems natralais ir (arba) dirbtinio apšvietimo šaltiniams (pvz., įdėto lempos) gydymo metu ir vieną dieną po vaistinio pleistro pašalinimo, siekiant sumažinti jautrumą šviesai riziką. Pacientams, kuriems yra sutrikusi inkstų, širdies ir kepenų funkcija, buvo arba yra peptinė opa, žarnų uždegimas ar hemoraginė diatezė, prieš pradėdami vartoti šį vaistinį preparatą, reikia kreiptis į gydytoją. Senyviems pacientams nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo turėtų būti vartojami atsargiai, nes jiems yra didesnė nepageidaujamų poveikių tikimybė. Reklamos tekstas parengtas 2026-08-10.

AKIŲ VOKŲ HIGIENAI

-30%

BLEPHACLEAN, drėgnos servetėlės akių srities ir akių vokų valymui, 20 vnt. 47⁹⁹ 12⁵⁸ €

BLEPHAGEL, gelis akių vokų ir blakstienų higienai, 30 g 24⁹⁹ 15³⁸ €

BLEPHADEMODOX, sterili servetėlė akių higienai, 30 vnt. 27⁹⁹ 19⁵⁸ €

MEDICINOS PRIEMONĖS, KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Blephademox“ – tai sterilios servetėlės, impregnuotos lojono, skirtos kasdieninei akių higienai, sergant Demodex erkutėmis sukeliamą infekciją. Padeda sumažinti Demodex erkutės, galinčių sukelti akių dirginimą, uždegimą (blefaritą) ir sausumą pojūtį, kiek. Be konservantų!
„Blephaclean“ – švelni ir veiksminga akių vokų priežiūra, sergant blefaritu, sausų akių sindromu ar po akių operacijų. Taip pat esant akių alergijai ar infekcijai. Tinka kodikiams nuo 3 mėn., vaikams, suaugusiems ir vyresnio amžiaus žmonėms! Be konservantų!
„Blephademox“ – lipnolis sterilus gelis, skirtas kasdieninei akių vokų ir blakstienų higienai, sergant blefaritu, kai akys sausos dėl Meibomo liaukų funkcijos sutrikimo, kai akis ir akies vokas pažeisti rožinės aknės ar seborinjo dermatito. Be konservantų!

KOMPLEKSINĖ AKIŲ VOKŲ PRIEŽIŪRA BE KONSERVANTŲ!

EFEKTYVUS IR PATOGUS NAGŲ GRYBELIO GYDYMAS

NUO 19⁹⁹ €



POSAMYK

78,22 mg/ml, vaistinis nagų lakas, 3,3 ml 19⁹⁹ €
78,22 mg/ml, vaistinis nagų lakas, 6,6 ml 29⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 ml vaisto yra 78,22 mg terbinafino. **Terapinės indikacijos:** suaugusiųjų, sergančių lengva ar vidutiniu sunkumo nagų grybeline infekcija, gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** per pirmąsias 4 gydymo savaites „Posamyk“ ant pažeistų nagų reikia tepti 1 kartą per parą, vėliau – 1 kartą per savaitę. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas terbinafinui arba pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** vartoti tik išorškai. „Sandoz Pharmaceuticals Ltd.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS260107978. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-07.

INOVACIJAI EFEKTYVUS IR PATOGUS NAGŲ GRYBELIO GYDYMAS

NUO 3⁹⁹ €



NOLPAZA

20 mg, 7 skrandyje neiros tabletės 3⁹⁹ €
20 mg, 14 skrandyje neiuriu tablečių 5⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiaga, stiprumas: Kiekvienoje skrandyje neiurioje tableteje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidrato pavidalu). **Terapinės indikacijos:** trumpalaikis suaugusių žmonių gastroezofaginio refliksų simptomų (pvz., rėmens, rūgšties regurgitacijos) gydymas. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** Rekomenduojama pantoprazolo paros dozė yra 20 mg (viena tabletė). Kad simptomai palengvėtų, tablečių gali reikėti gerti 2-3 dienas iš eilės. Kai simptomai visiškai išnyksta, gydymas turi būti nutraukiamas. Nepastebėjus gerėjimo, gydymą negali trukti ilgiau kaip 4 savaites. „Nolpaza“ nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nepakanka. „Nolpaza“ 20 mg skrandyje neiuriu tablečių negalima kramtyti arba smulkinti, jas reikia nuryti nesmulkintas užgeriant skysčiu prieš valgį. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nerekomenduojama pantoprazolo vartoti kartu su ŽIV proteazės inhibitoriais, pvz., atazanaviru, neflavinu, nes reikšmingai sumažėja tokių vaistinių preparatų biologinis prieinamumas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Pacientui turi būti paaiškinta, kad toliau išvardytas atvejais jis privalo kreiptis į gydytoją: netikėtai mažėja kūno svoris, yra anemija, kraujavimas iš virškinimo trakto, dispagija, nuolatinis vėmimas ar vėmimas krauju. Tokie simptomai gali palengvėti, todėl sunki liga gali būti diagnozuojama vėliau. Tokiu atveju būtina paneigti vėžinio susirgimo diagnozę; yra buvusi skrandžio opa arba operuotas virškinimo traktas; 4 savaites ar ilgiau nuolat vartojama nevirškinimo ar rėmens simptomus lengvinančių vaistinių preparatų; yra gelta, kepenų funkcijos sutrikimas arba kepenų liga; yra bet kokia kita sunki liga, bloginanti bendrąją savijautą; pacientas vyresnis kaip 55 metų ir anksčiau simptomų nebuvo arba buvo simptomai pasikėtę. Simptomai gali pradėti lengvėti po maždaug vienos gydymo pantoprazolo dienos, tačiau kad būtų išvengta visiško, vaistinio preparato gali tekti vartoti 7 dienas. Pantoprazolo pacientai negali vartoti profilaktikai. Del padidėjusios chromogranino A (CgA) koncentracijos gali būti sunkiau atlikti neuroendokrininių navikų tyrimus. „Nolpaza“ tabletešė yra sorbitolio ir natrlio. Geriamojo vaistinio preparato sudėtyje esantis sorbitolis gali paveikti kitų kartu vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį prieinamumą. Šio vaistinio preparato tableteje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrlio, t. y. jis beveik neturi reikšmės. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025.04.07.

„NOLPAZA“ UŽGESINA RĖMENĮ ILGAMI!

NUGAROS, SĄNARIŲ SKAUSMAMS IR RADIKULITUI GYDYTI

6⁹⁹ €



KAPSIKAM®

vaistinis šildomasis tepalas, 50 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo yra 50 mg dimetilsulfoksido, 30 mg raceminio kamparo, 30 mg terpentino eterinio aliejaus, 20 mg benzilnikotinato, 2 mg nonivamido. **Terapinės indikacijos:** vietinis raumenų ir sąnarių skausmo malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** ant skaudamos vietos, naudojant aplikatorių, užtepama 1-3 g tepalo 2-3 kartus per parą, atsivėlgiant į skausmo intensyvumą. Norint ilgiau išlaikyti šildantį tepalo poveikį, ant skaudamos vietos reikia uždėti tvarstį. Didžiausia vienkartinė dozė – 3 g. Didžiausia paros dozė – 9 g. Po kiekvienos procedūros reikia nusiplausti rankas šaltu vandeniu su muilu. Vartoti ant odos. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Odos opos, žaizdos bei ligos, kai yra pažeistas odos paviršius. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Nerekomenduojama naudoti karštų procedūrų (girties, vonios ir kt.) prieš ar iš karto po Kapsikam pavartojimo. Kapsikam tepalo negalima tepti ant pažeistos odos, atvirų žaizdų, egzemos pažeistų vietų. **Vietinis rinkodaros teisės turėtojas atstovs:** Grindeks Kačeks Lietuva UAB, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026-03-12.

MANO JĖGA JUDEJIMAI!

NUO 7⁹⁹ €



ENTEROL®

250 mg kietosios kapsulės, 10 kapsulių 7⁹⁹ €
250 mg kietosios kapsulės, 20 kapsulių 11⁹⁹ €
250 mg kietosios kapsulės, 30 kapsulių 15⁹⁹ €
250 mg milteliai geriamajai suspensijai, 10 paketėlių 7⁹⁹ €
250 mg milteliai geriamajai suspensijai, 20 paketėlių 11⁹⁹ €


NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Saccharomyces boulardii CNCM I-745.

„Enterol“ vartojamas kaip pagalbinė ūminio viduriavimo priemonė kartu su kitais vaistais nuo viduriavimo. „Enterol“ vartojamas su antibiotikų vartojimu susijusio viduriavimo profilaktikai. **Vartojimo būdas:** kapsulės nuryti užgeriant gurkšniu vandens arba atidarytos kapsulės turinį supilti į nedidelį kiekį šaldinto gėrimo ar į maistą. Mažiems (iki 6 m.) vaikams kapsulių negydyti, kad vaikas neužspringtų, bet jas atidaryti turinį supilti į gėrimą ar maistą. Miltelių geriamajai suspensijai paketelio turinį supilti į nedidelį kiekį vandens ar šaldinto gėrimo, sumaišyti ir išgerti. Miltelius taip pat galima maišyti su maistu. Vaisto vartoti dar kelias paras, pasibaigus viduriavimo simptomams. **Dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems nei 2 m. amžiaus vaikams rekomenduojama dozė yra 1 kapsulė arba 1 paketelis vartojami 1-2 kartus per parą. **Specialūs įspėjimai:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Enterol“. Pacientams, kuriems įstatytas centrinės venos kateteris, pasitaikę pavienių sisteminių grybelinės infekcijos atvejai. Šis vaistas nepakeičia rehidracijos (normalaus organizmo skysčio tūrio ir sudėties palaikymo), jei jos reikia. Kietųjų kapsulių sudėtyje yra laktozės monohidrata. Miltelių geriamajai suspensijai sudėtyje yra laktozės monohidrata, fruktozės ir sorbitolio. „Enterol“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu yra alergija mielių grybeliui, ypač *Saccharomyces boulardii*; jeigu nusilpusi imuninė sistema ar esate gydymas ligoninėje; jei esate kritinės sveikatos būklės arba jums yra įstatytas centrinės venos kateteris; jeigu pacientas yra jaunesnis kaip 2 m. amžiaus vaikas. ID 1bc0a5f4. Reklamos teksto parengimo data: 2025-12-17.

ESANT AKIŲ UŽDEGIMUI

-40% 14^{98€} 24^{99€}



DESODROP® akių lašai, 8 ml

MEDICINIS PREPARATAS

Liposominis ozonuotas tirpalas akims su „LipozonEye“.

Ozonas – galintis natūralus antiseptikas, turintis plataus spektro antibakterinį, antivirusinį, priešgrybelinį poveikį. Preparatas skirtas uždegimo simptomams gydyti, taip pat ir infekcinės kilmės (konjunktyvitui, keratitui, blefaritui ir pan.), sergantiems pasikartojančiomis akių infekcijomis, infekcijų profilaktikai po chirurginių intervencijų, traumų. Apsaugo ragenos epitelį, skatina gijimą, stabilizuoja ašarų plevę.

2026-03-23

OZONO TERAPIJA AKIES PAVIRŠIAUS LIGOMS.

DIENAI BE STRESO, GERESNIAI MIEGIO NAKTĮ

8⁹⁹ €



NEUREXAN, 50 tablečių

HOMOPATINIS NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tableteje yra veikliųjų medžiagų: 0,6 mg Avena sativa D2, 0,6 mg Coffea arabica D2, 0,6 mg Passiflora incarnata D2, 0,6 mg Zincum isovalerianicum D4. **Indikacijos. Miego sutrikimų ir nerastingumo lengvinimas.** Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Suaugusiems žmonėms ir paaugliams nuo 12 metų vartoti po 1 tablete 3 kartus per dieną. Pradžioje, jei simptomai stiprios, galima vartoti po 1 tablete kas 0,5-1 val., neviršyti 12 tablečių per dieną. Simptomams palengvėjus, gydymą tęsti įprastine doze. „Neurexan“ saugomas ir veiksmingas jaunesniems kaip 12 metų vaikams neįsitra. Duomenų nėra. Prieš nuryjant tablete reikia išgerti 100 ml vandens. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Neurexan“ sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktozės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. „Neurexan“ nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Registruotojas.** „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). **Registruotojo atstovas.** UAB „Farmahel“, www.heel.lt. Teksto parengimo data 2026-02-12.

EFEKTYVI PAGALBA ESANT SUMUŠIMUI, PATEMPIMUI, PANIRIMUI

NUO **10⁹⁹** €

TRAUMEEL S
tepalas, 50 g **10⁹⁹** €
tepalas, 100 g **18⁹⁹** €

HOMEOPATINIS NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

100 g tepalo yra veikliųjų medžiagų: *Arnica montana* D3 15 g, *Calendula officinalis* D 0,45 g, *Hamamelis virginiana* D 0,45 g, *Echinacea angustifolia* D 0,15 g, *Echinacea purpurea* D 0,15 g, *Chamomilla recutita* D 0,15 g, *Symphytum officinale* D4 0,1 g, *Bellis perennis* D 0,1 g, *Hypericum perforatum* D6 0,09 g, *Achillea millefolium* D 0,09 g, *Aconitum napellus* D1 0,05 g, *Atropa belladonna* D1 0,05 g, *Mercurius solubilis Hahnemanni* D6 0,04 g, *Hepar sulfuris* D6 0,025 g. **Terapinės indikacijos.** Buikų traumų (pvz., raiščių patempimo, sumušimo, panirimo, mėlynių), kaulų ir sąnarių degeneracijos simptominių gydymas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: vartoti 2 kartus per dieną arba, jei reikia, dažniau. 0–2 m. vaikams: vartoti 2 kartus per dieną arba, jei reikia, dažniau. 2–6 m. vaikams: vartoti 2 kartus per dieną arba, jei reikia, dažniau. 6–12 m. vaikams: vartoti 2 kartus per dieną arba, jei reikia, dažniau. Vartoti ant odos. Patepti plonu sluoksniu pažeistą vietą. Ant gydymo vietos galima uždėti tvarstį. „Traumeel S“ tepalą negalima tepti didelio ploto, vartoti ilgai arba tepti tiesiai ant atvirų žaizdų. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos, pvz., kalninei arnikai (*Arnica montana*), vaistinei ramūnei (*Chamomilla recutita*), paprastajai kraujažolei (*Achillea millefolium*), kitiems astirinių (graizažiedžių) šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Tepalą sudėtyje yra cetosteario alkoholio. Cetosteario alkoholis gali sukelti lokalią (vietinę) odos reakciją (pvz., kontaktinį dermatitą). Sudėtyje yra 13,8 % (V/V) etanolio. Kiekviename šio vaistinio preparato gramme yra 111 mg alkoholio (etanolio), tai atitinka 11,7% m/m. Ant pažeistos odos etanolis gali sukelti deginimo pojūtį. Reikia saugotis, kad tepalo nepatektų į akis, ant gleivinės, atvirų žaizdų ar pažeistos odos. Netepti tepalu didelio ploto. **Registruotojas.** „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). **Registruotojo atstovas.** UAB „Farmahelis“. Reklamos teksto parengimo data 2026-08-07.

AKIŲ DIRGINIMO, AŠAROJIMO, PERVERGIMO, VOKŲ KRAŠTŲ UŽDEGIMO LENGINIMAS

11⁹⁹ €

OCULOHEEL

akių lašai (tirpalas), 3 pakėteliai po 5 viendozės talpykles

HOMEOPATINIS NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 talpykėlė (0,45 ml tirpalo) yra veikliųjų medžiagų: *Euphrasia* D5 110,7 mg, *Cochlearia officinalis* D5 110,7 mg, *Pilocarpus* D5 110,7 mg, *Echinacea* D5 110,7 mg. **Terapinės indikacijos.** Akių dirginimo, ašarojimo, smėlio akys pojūčio, pervargimo, įtraumo šviesai ir vokų kraštų uždegimo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Vaikams nuo 6 m. ir suaugusiems žmonėms paprastai reikia lašinti į pažeistą akį po 1 lašą 3 kartus per dieną. Jei vartojama ir kitokių akių lašų, tarp jų ir „Oculoheel“ akių lašų vartojimo rekomenduojama daryti 15 minučių pertrauką. Kadangi šio vaistinio preparato sudėtyje yra ežiuvolės (*Echinacea*), prieš skiriant jį ilgesniams kaip 8 savaites laikotarpiui, rekomenduojamas individualus įvertinimas. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, arba astirinių (graizažiedžių) šeimos augalams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pagalbinės medžiagos. Fosfatiniai buferiai. Kiekviename šio vaistinio preparato viendozėje talpykėlėje yra 2,81 mg fosfatų, tai atitinka 6,25 mg/g. Kadangi šio vaistinio preparato sudėtyje yra ežiuvolės (*Echinacea*), prieš skiriant jį pacientams, turintiems imuninės sistemos funkcijų sutrikimų (pvz., progresuojančių sisteminių sutrikimų, autoimuninių ligų, imunodeficitų, imunosupresijos ir baltųjų kraujo ląstelių sistemos ligų atvejais), rekomenduojamas individualus įvertinimas. Talpykles turinį galima vartoti tik 1 kartą, t. y. kartą lašinti į kairiąją ir (arba) dešiniąją akį tiek, kiek reikia. Talpyklę reikia atidaryti tik prieš pat vaisto vartojimą. Naudotą talpyklę reikia išmesti, net jeigu joje yra vaistinio preparato likučių. **Registruotojas.** „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). **Registruotojo atstovas.** UAB „Farmahelis“. Reklamos teksto parengimo data 2025-06-16.

NUO GALVOS SVAIGIMO

8⁹⁹ €

VERTIGOHEEL, 50 tablečių

NERECEPTINIS HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tabletyje yra veikliųjų medžiagų: *Anamirta cocculus* D4 210 mg, *Conium maculatum* D3 30 mg, *Ambra grisea* D6 30 mg, *Petroleum rectificatum* D8 30 mg. **Terapinės indikacijos.** Dėl įvairių priežasčių atsiradęs galvos svaigimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Suaugusiems žmonėms, 12 m. ir vyresniems vaikams: paprastai reikia vartoti po 3 tabletes 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps). Ūmiai atsiradus galvos svaigimui ir pykinimui, pradžioje (pirmas 2 valandos) vartoti po 1 tabletes kas 15 min. „Vertigoheel“ saugomas ir veiksmingas jaunesniems nei 12 m. vaikams neištri. Duomenų nėra. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas lėtas paveldimas sutrikimas – Lapp laktozės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Registruotojas.** „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). **Registruotojo atstovas.** UAB „Farmahelis“. Reklamos teksto parengimo data 2024-08-01.

NUO RĖMENS

5⁹⁹ €

MAALOX

400 mg/35 mg/ml, be cukraus, 40 kramtomųjų tablečių
40 mg/35 mg/ml, geriamoji suspensija, 250 ml

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kramtomąją tabletyje yra 400 mg magnio hidroksido ir 400 mg aliuminio hidroksido; 1 ml geriamosios suspensijos yra 40 mg magnio hidroksido ir 35 mg aliuminio hidroksido. **Terapinės indikacijos:** rėmens ir skrandžio turinio kilimo į stemplę simptomams malšinti suaugusiems ir paaugliams nuo 15 metų. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suspensiją reikėtų gerti nekeičiant. Buteliuko suspensija geriama po 1 valgomąjį šaukštą (15 ml) pasireiškus rėmeniui arba skrandžio turinio refliksui į stemplę; negalima gerti daugiau kaip 6 valgomųjų šaukštų (90 ml) per parą; šio vaisto negalima vartoti ilgiau kaip 10 dienų: sučiulpti arba sukramtyti 1–2 tabletes, pajutęs rėmenį arba atsiradus refliksui; negalima vartoti daugiau kaip 6 tabletes per parą ir daugiau kaip 8 tablečių per parą. **Kontraindikacijos:** alergija (padidėjęs jautrumas) magnio hidroksidui ar aliuminio hidroksidui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sunki inkstų liga; stiprus pilvo skausmas arba ilgamasis žarnų nepraeinamumas. **Specialūs įspėjimai:** vaistą galima vartoti tik pasitarus su gydytoju, jeigu mažėja kūno svoris, kraujuoja arba anksčiau yra kraujavę iš virškinimo trakto, sutrikęs rijimas arba nuolat jaučiate nemalonų pojūtį pilve, virškinimo sutrikimų atsirado prieš pat ar po valgymo, sergate inkstų liga. Pacientams, kuriems nustatytas inkstų funkcijos sutrikimas, jaunesniems kaip 2 m. vaikams, senyviems pacientams bei kitiems pacientams, kuriems yra fosforo trūkumo pavojus, prieš pradėdami vartoti „Maalox“ reikia kreiptis į gydytoją. Norint išvengti perdozavimo, negalima kartu vartoti vaistinių preparatų, savo sudėtyje turinčių aliuminio hidroksido ir magnio hidroksido. Atsargumo dėlei tarp bet kokių per burną vartojamo vaisto vartojimo turi būti bent 2 val. (vartojant fluoridų šniūką – 4 val.) intervalas. Jeigu gydytojais Jums yra sausak, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „Maalox“ (be cukraus) tabletes tinka cukriniu diabetu sergantiems pacientams. **Reklamos teksto parengimo data** 2024-12-2603_SB_Maalox_V01_L1.

GREITA PAGALBA NUO RĖMENS!

4⁹⁹ €

GRINITE, 12 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletyje yra 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudoeferidino hidrochlorido, 15 mg dekstrometorfano hidrochlorido, 2 mg chlorfenamino maleato. **Terapinės indikacijos:** peršalimo ar gripo simptomų (ryklės, galvos ir raumenų skausmo, karščiavimo, nosies užgulimo, sauso kosulio) lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams 1 arba 2 tabletes 1 kartą per parą, prieš miegą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai; labai sutrikusi inkstų ar kepenų veikla; vaikas yra jaunesnis nei 12 m.; bronchių astma; labai padidėjęs kraujospūdis; cukrinis diabetas; uždarąjį kampo glaukoma; hipertirozė; antinksčių navikas (feochromocitoma); įgimtas gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės trūkumas; ilgalaikis piktnaudžiavimas alkoholiu; šlapimo susilaikymas; sunki širdies ir kraujagyslių liga; epilepsija; nėštumo ar žindymo laikotarpis; mišrios nepakankamumas; vartojama kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio; vartojama ar per pastarąsias 2 savaites vartota monoaminooksidazės inhibitorių. **Specialūs įspėjimai:** pasitarus su gydytoju arba vaistininku, jei kosulys tęsiasi ilgiau ar atkrisdo daug gleivių; esant neįsivaizduojamai mišrybei; jeigu kepenų ir (ar) inkstų veikla sutrinka; jeigu sergate širdine liga, širdies ritmo sutrikimas arba padidėjęs kraujospūdis; sergate emfizema, lėtiniu bronchitu; epilepsija; padidėjęs akispūdis; padidėjęs prostatas; vartojant kraują krešinančius vaistus; buvęs piktnaudžiavimas vaistais ar psichotropiniais medžiagomis; paaugliams, jauniems suaugusiems, senyviems žmonėms; vartojant CYP2D6 fermento aktyvumą slopinančių vaistų; vaistų nuo depresijos ar psichozės. Gali sukelti priklausomybę. Jeigu per 3 dienas saviąjauta nepagerėja arba net pablogėja, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2025-05-22.

PERŠALIMO IR GRIPO SIMPTOMAMS LENGINTI

5⁹⁹ €

GRINITE THERMAL

milietaliai geriamajam tirpalui, 8 pakėteliai

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 pakėtelėje yra 650 mg paracetamolio, 60 mg pseudoeferidino hidrochlorido, 20 mg dekstrometorfano hidrochlorido ir 4 mg chlorfenamino maleato. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikis peršalimo ar gripo simptomų (karščiavimo, nosies užgulimo ir gleivių išsiskyrimo, viruso, eriziano kosulio, galvos, ryklės ir kaulų bei sąnarių skausmo) lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir paaugliams, vyresniems nei 12 m., – 1 pakėtelis kas 4–6 val., ne daugiau kaip 4 pakėteliai per dieną. Pakėteliai turinį išstipinti stiklinėje karšto vandens ir išgerti. **Kontraindikacijos:** alergija bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai; anemija; labai sutrikusi inkstų ar kepenų veikla; vaikas yra jaunesnis nei 12 m.; kosulys, lydimas didelio atkosmų skreplių kiekio; bronchių astma ir kosulys, susijęs su astma; labai padidėjęs kraujospūdis; diabetas; uždarą kampo glaukoma; hipertirozė; antinksčių navikas (feochromocitoma); įgimtas gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės trūkumas; ilgalaikis piktnaudžiavimas alkoholiu; šlapimo susilaikymas; sunki širdies ir kraujagyslių liga; cistinė fibrozė; nėštumo ar žindymo laikotarpis; mišrios nepakankamumas; vartojama kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio, pseudoeferidino, dekstrometorfano, chlorfenamino, vaistų, vadinamų simpatomimetikais; antihistamininių vaistų; vartojama ar per pastarąsias 2 savaites vartota monoaminooksidazės inhibitorių. **Specialūs įspėjimai:** pasitarus su gydytoju arba vaistininku, esant nusilpimui ar ilgalaikiam nejudumui; jeigu kepenų ir (ar) inkstų veikla sutrinka; pasunkėjęs kvėpavimas; emfizema; astma; lėtinis bronchitas; padidėjęs prostatas; pernelyg aktyvi skydliaukė; širdies ar arterijų liga; buvęs piktnaudžiavimas vaistais ar psichotropiniais medžiagomis; paaugliams, jauniems suaugusiems, senyviems žmonėms; vartojama vaistų nuo nemigos, raminamųjų vaistų, CYP2D6 fermento aktyvumą slopinančių vaistų; vaistų nuo depresijos ar psichozės. Gali sukelti priklausomybę. Gali būti teigiamas dopingo testo rezultatas. Sudėtyje yra sacharozės. Jeigu per 3 dienas saviąjauta nepagerėja arba net pablogėja, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2024-05-10.

NUO RĖMENS

NUO 2⁹⁹ €



RANIGAST S-O-S

12 kramtomųjų tablečių 2⁹⁹ €
24 kramtomosios tabletės 4⁹⁹ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Ranigast S-O-S“ yra skirtas gastroezofaginio refliksio simptomams (rėmeniui, skrandžio skausmui, dispepsijai) malšinti.

- Veikia akimirksniu – nuo to momento, kai tik sučiulpste ar išgersite tabletes.
- Dėl ypatingos sudėties apsaugo skrandžio gleivinę ir sumažina rėmens epizodų skaičių.
- Tinka naudoti ir kaip papildoma priemonė sergantiems gastritu, peptine opa.
- Galima naudoti nėštumo ir žindymo metu, prieš tai pasitarus su gydytoju.

Suaugusiems ir vaikams nuo 12 metų rekomenduojama pavalgis vartoti 2 tabletes. Vaikams (6–12 metų): rekomenduojama pavalgis vartoti 1 tabletę.

2⁹⁹ €



AMBROLAN, ambroksolio hidrochloridas, 30 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido. „Ambrolan“ yra labai veiksmingas vaistas, kurio veiklioji medžiaga ambroksolis yra bromheksino metabolitas. „Ambrolan“ mažina susikaupusių skreplių klampumą, gerina viršamojo epitelio aktyvumą ir taip skatina sekretą pašalinti iš bronchų, skystina pėmelys klampias gleives ir palengvina jų išsiskyrimą, vartojamą sergantiems ūmine arba lėtine bronchų ir plaučių liga, kurių metu sutrinka sekreto išsiskyrimas ir šalinimas, kvėpavimo takų sekretui skystinti. **Vartojimas.** Suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams įprastinė dozė yra 1 tabletė tris kartus per parą. Vartojama po valgio, užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Ambrolan“ vartoti negalima, jeigu yra: alergija ambroksoliui; skrandžio ir (arba) žarnyno opa; pirmuosius 3 nėštumo mėnesius ir maitinant krūtimi; jaunesniems nei 12 metų vaikams. Kiekvienoje tabletėje yra 100 mg laktozės (pieno cukraus). **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas.** „G.L. Pharma GmbH“, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026 02 13.

NUGALĖKITE KOSULĮ!

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!



EPITOME

SPRIT MELATONIN, 385 papurškimai, 50 ml 17⁵⁸ €
BEAUTY MARINE COLLAGEN, 12.200 mg, milteliai, 30 paketėlių 59⁹⁹ €

MAISTO PAPILAI

NUO 6⁹⁹ €



VOLTAREN EMULGEL

23,2 mg/g gelis, 50 g 6⁹⁹ €
23,2 mg/g gelis, 100 g 12⁹⁹ €
23,2 mg/g gelis, 150 g 16⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Diklofenako dietilaminas. **Terapinės indikacijos.** Suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: skausmo ir uždegimo mažinimas, kai yra minkštųjų audinių sužalojimas (sausgyslių, raiščių, raumenų ir sąnarių trauma, pavyzdžiui, patempimas, sumušimas); vietinis minkštųjų audinių uždegimas (nugaros skausmas, tendinitas, bursitas). Tik suaugusiems (18 m. ir vyresniems): sąnarių (pvz., kelių) degeneracinės ligos sukeltam skausmui malšinti. **Vartojimas.** Vartoti ant odos. Tepiti 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje. **Kontraindikacijos.** Alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitoms vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo; paskutinis nėštumo trimestras; jaunesniems kaip 14 m. paaugliams. **Specialūs įspėjimai.** Netepti ant pažeistos odos, atviros žaizdos, odos išbėrimo ar egzemos vietos, didelių odos plotų, saugoti, kad nepatektų į akis ir ant gleivinės, pvz., burnos, nenuryti. Jeigu pasireiškia bėrimas, gydymą nutraukti; nenaudoti su oro nepralaidžiančiais tvarštais. Sudėtyje yra propilenglikolio ir butilhidroksitolueno. Teksto parengimo data 2025-03. Prekių ženklai priklauso „Haleon“ arba „Haleon“ turi jų licenciją. ©2025 „Haleon“ arba licencijos turėtojas.

SKAUSMUI MALŠINTI

3⁹⁹ €



DICUNO, 25 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: diklofenako kalio druska, 25 mg. **Terapinės indikacijos:** simptominiams ūminio silpno ir vidutinio stiprumo skausmo gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems rekomenduojama dozė yra 25–50 mg (1–2 tabletės). Vartoti ne daugiau kaip 150 mg (6 tablečių) per parą. Tabletes nurykite užgeriant stikline vandens. Tablečių negalima vartoti su maistu ar iškart po jo. **Kontraindikacijos:** „Dicuno“ vartoti draudžiama: jeigu yra alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu Jums kada nors buvo ar yra skrandžio ar žarnyno opa; jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto arba jo prakiurimas dėl skausmą mažinančių vaistų vartojimo (NVNU). (du ar daugiau patvirtintų opų ar kraujavimo atvejų); jei yra padidėjęs polinkis kraujuoti; jeigu yra labai sutrikusi kepenų funkcija; jei sergate porfrija (medžiagų apykaitos liga); jeigu Jums nustatyta širdies liga ir (arba) galvos smegenų kraujagyslių liga, pavyzdžiui, jeigu Jūs patyrėte širdies smūgį, insultą, „mikroinsultą“ (praeinantį smegenų išemijos priepuolį) arba Jums buvo užsikimšusios širdies ar galvos smegenų kraujagysles, arba Jums buvo atlikta operacija siekiant išvalyti arba šuntuoti užsikimšusias kraujagysles; jeigu Jums yra arba anksčiau buvo sutrikusi kraujotaka (periferinių arterijų liga); jeigu sergate sunkia inkstų liga; per paskutinius tris nėštumo mėnesius; jei pacientas yra jaunesnis kaip 18 metų; jei manote, kad Jūs galite būti alergiškas (-a) diklofenako kalio druskai, aspirinui, ibuprofenui arba kuriam nors kitam nesteroidiniam vaistui nuo uždegimo arba bet kuriai pagalbinei „Dicuno“ medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš pradėdami vartoti „Dicuno“, jeigu sergate arba esate sirgę bet kuria iš toliau išvardintų ligų: uždegiminė žarnų liga (opinis kolitas, Krono (Crohn) liga), astma, širdies liga, kepenų ar inkstų liga; lėtinė obstrukcinė plaučių liga arba lėtinis kvėpavimo takų uždegimas (ligos, kurios sukelia kvėpavimo takų susiaurėjimą ir oro praeinamumo apribojimą, apskunkinantį kvėpavimą), nosies gleivinės uždegimas, sisteminė raudonoji vilkligė (jungiamojo audinio liga), dilgėlinė arba angioneurozinė edema (periodiškai pasireiškiantis vietinis tinimas), ligos, sukeliančios padidėjusį polinkį kraujuoti; kepenų porfrija (medžiagų apykaitos liga); jeigu pavartojus „Dicuno“ arba kitų vaistų nuo skausmo, Jums kada nors yra pasireiškęs sunkus odos bėrimas arba lupimasis, ant odos atsirado pūslių ir (arba) burnos ertmėje atsirado opų; jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti. Reklamos teksto parengimo data: 2026-05-14.

-40%



ECOSH

BIOAKTYVUS CINKAS, 90 kapsulių 49⁹⁹ 11⁹⁹ €
BIOAKTYVI GELEŽIS FERROCHEL, 90 kapsulių 24⁹⁹ 14⁹⁹ €
ECOBOTIC, pieno rūgšties bakterijos, 90 kapsulių 32⁹⁹ 19⁷³ €
MAGNESIUM COMPLEX+ MUMIO, 90 kapsulių 36⁹⁹ 22¹⁹ €

MAISTO PAPILAI

„Ecosh“ – Estijos maisto papildų gamintojas, siekiantis gaminti kuo natūralesnius, kokybiškus ir efektyvius maisto papildus. Naudojamas veganais, augalines kilmės kapsulės, maisto papildai yra be konservantų, dauguma tinkami vegetarams ir veganams.

-35 %

**AMBIO**Ca+Mg+K+Zn+D3, milteliai geriamajam tirpalui, 30 pakelių **4³⁸ 9⁰⁹ €**KALIS, milteliai geriamajam tirpalui, 15 pakelių **4⁸⁸ 3²⁴ €**

MAISTO PAPILDAI

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMA!!

**COREGA**ULTIMATE, fiksuojamasis dantų protezų kremas, 40 g **9⁵⁵ €**BIO FORMULA, dantų protezų valymo tabletės, 30 vnt. **6⁹⁵ €****BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

COREGA – visapusiška dantų protezų priežiūra. Tvirtinimo priemonės užtikrina saugų laikymą ir komfortą visą dieną, o valymo tabletės efektyviai pašalina dėmes, naikina bakterijas ir padeda palaikyti gaivą.

ŠVARA IR PASITIKĖJIMAS – KIEKVIENAI ŠYPSYSENAI.NUO 2⁹⁹ €**THROMBO ASS**50 mg, 100 skrandyje neiurių tablečių **2⁹⁹ €**75 mg, 100 skrandyje neiurių tablečių **3⁹⁹ €**100 mg, 100 skrandyje neiurių tablečių **4⁹⁹ €****NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Veiklioji medžiaga: acetylsalicilo rūgštis. **Terapinės indikacijos:** miokardo infarkto rizikos mažinimas sergantiesiems krūtinės angina. Antrinė miokardo infarkto profilaktika. Trombozės profilaktika po vainikinių arterijų nuosūvio operacijos. Antrinė praeinančiojo smegenų išemijos priepuolio (PSIP) ar insulto profilaktika. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti po 1 tabletę 1 kartą per dieną (patariama vakare). Skrandyje neiurių tablečių reikia nuryti nesukramtytą, užsigeriant pakankamu skysčiu valgio metu arba tarp valgių tuo pačiu paros metu. Įprastinė paros dozė ilgalaikiam vartojimui yra 50–150 mg. Dalyti į dalis „Thrombo ASS“ skrandyje neiurių tabletes negalima, nes bus pažeista skrandyje neiurių plėvelė. Norint, kad tikti individualiam vartojimui, reikia rinktis atitinkamo stiprumo preparatą (50 mg, 75 mg ir 100 mg). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei salicilatams ir kitiems NVNU; bronchų spazmas; ūminė pepsinė opa; polinkis į kraujavimą, hemofiliją; sunkūs inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; sunkūs, nepakankamai kontroliuojamas širdies nepakankamumas; nėštumas; vaikai ir paaugliai iki 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Atsargumo reikia laikytis šiais atvejais: sergant bronchine astma, šienlige, esant nosies gleivinės paburkimui ir esant kito pobūdžio alergijai; vartojant kartu su vaistais, mažinančiais kraujo krešumą; sergant hemolizine anemija; esant skrandžio ir žarnų sutrikimams, esant anamnezėje duomenims apie opalę ar kraujavimą iš virškinimo trakto; esant inkstų ligoms ir (arba) kepenų funkcijos sutrikimui; turintiems polinkį podagrai. Prieš numatytą operaciją 10 dienų acetylsalicilo rūgštis reikia nevartoti. Šio vaisto sudėtyje yra laktozės monohidrato, todėl vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas lėpų laktozės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pakuotė: 50 mg, 75 mg arba 100 mg; 100 skrandyje neiurių tablečių. Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas. G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lammach, Austrija. Teksto peržiūros data: 2020 05 13. Reklamos parengimo data: 2020 08 12.

ATMINČIAI IR DĖMESIO KONCENTRACIJAI PAGERINTINUO 11⁹⁹ €**GINGIUM**120 mg, 30 plėvele dengtų tablečių **11⁹⁹ €**120 mg, 60 plėvele dengtų tablečių **19⁹⁹ €****NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje tabletyje yra 120 mg dviskiaučio ginkmedžio lapų ekstrakto. **Terapinės indikacijos:** vyresnio amžiaus žmonių lengvo ir vidutinio sunkumo smegenų kraujotakos nepakankamumo, protarpinio šlavimo, galvos svaigimo simptomams mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** 1 tabletė 1–2 k/d. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai ar pagalbinėms medžiagoms, nėštumas. **Specialūs įspėjimai:** neskirtas vartoti jaunesniems nei 18 metų žmonėms. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, Vilnius LT-08126, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El.paštas: info.lithuania@sandoz.com. BS260106970. Reklamos teksto parengimo data: 2020 01 06.

PIC MATUOKLIAI / INHALIATORIAI / TERMOMETRAI

IKI -40 %

**PIC SOLUTION****MEDICINOS PRIETAISAI**

„PIC Solution“ jau daugiau nei 50 metų yra vienas žinomiausių Italijos medicinos priemonių prekių ženklų. Kiekvienas PIC sprendimas yra daugiau nei kraujospūdžio matuoklis, inhaliatorius ar termometras. Tai paprastas būdas parodyti rūpestį ir paklausti „Kaip jautiesi?“. Savo laboratorijose kuriame pažangius prietaisus, skirtus inhaliacijai, širdies darbai ar temperatūrai stebėti. Visi prietaisai turi 5 metų garantiją ir jų tikslumas patvirtintas klinikiniais tyrimais**.

* Išskyrus termometrus, matuoklių „LiteRapid“, inhaliatorių „AirCure“.

** Taikoma kraujospūdžio matuokliams

KIEKVIENA ŠIRDIS TURI SAVO RITMĄ!

*Akcija taikoma gėtona etiketė pažymėtomis prekėmis

NERVINĖS ĮTAMPOS MAŽINIMAS IR UŽMIGIMO LENGVINIMAS4⁹⁹ €**PERSEN**40 dengtų tablečių
FORTE, 20 kietųjų kapsulių**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Veikliosios medžiagos, stiprumas. PERSEN tabletyje yra 35 mg valerijonų šaknų sausio alkoholinio ekstrakto, 175 mg melisų lapų sausio ekstrakto, 175 mg pipirmėčių lapų sausio ekstrakto. PERSEN FORTE kapsulėje yra 875 mg valerijonų šaknų sausio alkoholinio ekstrakto, 175 mg melisų lapų sausio ekstrakto, 175 mg pipirmėčių lapų sausio ekstrakto. **Indikacijos.** Vartoti laikinus nedidelės nervinės įtampos mažinimui, pasunkėjusio užmigimo lengvinimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** PERSEN: Nervinės įtampos atveju reikia gerti po 3-4 PERSEN tab. 3 kartus per parą. Pasunkėjusio užmigimo atveju reikia gerti 3-4 PERSEN tab. 1 kartą per parą 1 val. prieš miegą. Tabletes reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai nuo valgyimo laiko. PERSEN FORTE: Nervinės įtampos mažinimui reikia gerti po 2 PERSEN FORTE kaps. 2 kartus per parą. Pasunkėjusio užmigimo atveju reikia gerti 2 PERSEN FORTE kaps. 1 kartą per parą 1 val. prieš miegą. Kapsules reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai nuo valgyimo laiko. PERSEN ir PERSEN FORTE pradeda veikti palaipsniui, kad gydymo veiksmingumas būtų optimalus, vaisto rekomenduojama gerti mažiausiai 14 dienų. Gydymo trukmė neribojama. PERSEN ir PERSEN FORTE nėra skirtas jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** PERSEN tablečių sudėtyje yra laktozės ir sacharozės. PERSEN FORTE kapsulių sudėtyje yra laktozės. Reklamos teksto parengimo data: 2025 m. gegužės mėn. ID:000746625

„PERSEN“ – NURAMINK SAVO RŪPESČIUS!

NUO 4⁴⁹ €

NALGESIN S

Natrio naproksenas, 10 dengtųjų tablečių 4⁴⁹ €
Natrio naproksenas, 20 dengtųjų tablečių 6⁴⁹ €



NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: natrio naproksenas – 275 mg. **Indikacijos:** galvos, dantų, mėnesinių, sąnarių, raumenų, potrauminių, pooperacinių skausmams malšinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 18 metų vaikams įprastinė paros dozė skausmui malšinti – 550–1100 mg. Iš pradžių vartojama 550 mg, vėliau – po 275 mg kas 6–8 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bet kuriai sušedamajai preparato medžiagai, buvusi alerginė reakcija, kurią sukėlė nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, aktyvi ar atšaukianti skrandžio ar dvilypakrūstės žarnos opa, kraujavimas iš virškinamojo trakto, sunkus širdies nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai:** naprokseno gydymą pacientai, sergantį epilepsija ar porfirią, kuriam buvo ar yra virškinamojo trakto sutrikimų, ypač opinis kolitas ar Krono liga, privalo stebėti gydytojas. Naprokseno draudžiama vartoti, jei yra sunki nesena žaizda arba iki didelės operacijos liko mažiau kaip 48 valandos. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024 07 12.

MAŠINA SKAUSMĄ IR UŽDEGIMĄ.

NUO SKAUSMO

NUO 6⁹⁹ €

DITEL

23,2 mg/g, gelis, 50 g 6⁹⁹ €
23,2 mg/g, gelis, 100 g 9⁹⁹ €



NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga, stiprumas: diklofenako dietilaminas, 23,2 mg/g. **Terapinės indikacijos:** skirtas suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: vietinis skausmo malšinimas, esant ūminiams patempimams ar sumušimams po bukus traumas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** reikia vartoti 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Reikia nuo vėsnos iki graikiško riešuto dydžio kiekio, atitinkancio 1–4 g gėlio. Didžiausia paros dozė – 8 g gėlio. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Anksčiau pasireiškusių padidėjusio jautrumo reakcijos, pavartojus acetilsalicilo rūgšties ar nesteroidinių vaistinių preparatų nuo uždegimo (NVPNU). Vartojimas ant atvirų žaizdų, gleivinių, jei yra odos uždegimas arba infekcija bei egzema. Vartojimas paskutinį nėštumo trimestrą. Vartojimas vaikams ir paaugliams iki 14 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai vartoti pacientams, kurių inkstų, širdies ar kepenų funkcija sutrikusi, taip pat pacientams, kuriems yra aktyvi skrandžio ar dvilypakrūstės žarnos peptinė opa. Vartoti tik ant nepažeistos ir sveikos odos. Vengti, kad nepatektų į akis, ir kontakto su gleivinėmis. Nenaudoti orui nepralaidžių tvarščių. Jei yra tiesioginių saulės spindulių arba dirbtinės saulės poveikis, kyla odos reakcijų pavojus. Gydymo metu ir dvi savaites po gydymo reikia vengti saulės spindulių ar dirbtinės saulės. Reklamos teksto parengimo data 2024-04. 2604_SB_Ditel_VOI_LT

„DITEL“ – NUOSPRENDIS SKAUSMUI!

-25%



AMEDIPLUS

Pleistrai pūslėms, 2 x 6 cm, 5 vnt. 4³⁹ 3⁷⁴ €

Pleistrai pūslėms, 6,9 x 4,4 cm, 5 vnt. 5¹³ 3⁸⁹ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

RAUMENIMS IR SĄNARIAMS

-30%



AXANOVA

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Axanova“ priemonių pagrindas – eteriniai aliejai. Atsižvelgiant į priemonės sudėtį, šildo arba vėšina, gali būti naudojamos esant sumušimams, patempimams, maudžiant sąnarius ar raumenis. Pagaminta Šveicarijoje.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

6⁹⁹ €

DEEP RELIEF

50 mg / 30 mg/g gelis, 50 g



NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 g gėlio yra 50 mg ibuprofeno ir 30 mg levomentolio. Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: 1 g gėlio yra 100 mg propilenglikolio. Visos pagalbinės medžiagos išvardytos pakuotės lapelyje. **Terapinės indikacijos:** lokalus sąnario aplinkos audinių uždegimo ir (arba) traumas (pvz., patempimo, išnirimo) sukeltos skausmo malšinimas. **Dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: gėli vartoti iki 3 kartų per parą, bet ne dažniau kaip kas 4 valandas. Tepti reikia apie 1–4 cm gėlio. 1 cm gėlio iš 50 g tubelės yra vidutiniškai 50 mg ibuprofeno. 4 cm gėlio iš 50 g tubelės yra vidutiniškai 125 mg ibuprofeno. Neviršyti nurodytų dozių. Jeigu simptomai nepaieina per penkis dienas, kreiptis į gydytoją. **Vaičių populiacija:** duomenų apie „Deep Relief“ saugumą ir veiksmingumą jaunesniems kaip 12 metų vaikams nėra. Senyviems pacientams ir pacientams, kurių inkstų ir (arba) kepenų funkcija sutrikusi: dozės keisti nereikia. **Vartojimo metodas:** plonu gėlio sluoksniu tepti skaudamą vietą ir švelniai masažuoti, kol susigs. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai, aspirinui ar kitiems nesteroidiniams vaistiniams preparatams nuo uždegimo (NNU), įskaitant ir vartojamus per burną. Draudžiama vartoti astma sergantiems pacientams, kuriems aspirinas arba kiti nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo gali sukelti astmos priepuolį, niežėjimą, rininitą ar dilgėlinę. Nubrozidinta, pažeista infekcijos ar uždegimo oda arba plotai be viršutinio odos sluoksnio. Kiti lože pacijoje vietoje ir tuo pačiu metu lokaliai vartojami vaistiniai preparatai. Vartojimo vietoje esanti infekcija. Trečiasis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Deep Relief“ gėlio sudėtyje yra propilenglikolio, kuris gali sukelti odos sudirginimą. Gėlio netepti ant (arba) šalia gleivinės ir akių. Saugotis, kad vaistinio preparato nepatektų ant nubrozidintos, uždegimo pažeistos odos. Jeigu atsiranda odos bėrimas ar sudirginimas, vaistinio preparato nebervartoti. Netinka tepti po sandarinamųjų tvarščių. Pirmą kartą išbandyti ant mažo odos ploto. Vartoti tik ant odos. **VĖSINANTIS IR GREITAI VEIKIANTIS GELIS NUO SKAUSMO.**

12⁹⁷ €

PROCTO-GLYVENOL

10 žvakūčių
tiesiosios žarnos kremas, 30 g



NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Procto-Glyvenol“ skirtas lokaliai simptomaišiai vidiniam ir išoriniam hemoroidui gydyti. Vartoti į tiesiąją žarną po 1 žvakutę 2 kartus per parą arba kremu tepti išangės srity 2 kartus per parą, ryte ir vakare, kol ūminiai ligos požymiai išsnyks, paprastai 7–10 dienų. Po to dozė galima sumažinti ir vartoti 1 kartą per parą ne ilgiau kaip 3 savaites, jei reikia. Vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Procto-Glyvenol“ medžiagai. Atsargiai vartoti pacientams, sergantiems sunkia kepenų liga. Saugotis, kad nepatektų į akis, negalima nuryti. Nerekomenduojama vartoti vaikams. Reklamos teksto parengimo data 2026-05. RE_IT_Pg_2026_476

-25%

8^{32€} 1^{19€}



AMEDIPLUS ACTIVE GEL

šaldomasis-šildomasis kūno gelis, 100 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

AUSIMS

7⁹⁹ €



OTINUM, 200 mg/g ausų lašai (tirpalas), 10 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 g ausų lašų (tirpalo) yra 200 mg cholinio salicilato. **Terapinės indikacijos:** ūmaus išorinės, vidurinės ausies ar būgnelio uždegimo sukeltos skausmo malšinimas. Sukėlėjusiems siros kamščiams suminkštinti, prieš šalinant juos iš išorinės ausies landos. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Sergant ūminiu išorine, vidurine ausies ar būgnelio uždegimu: 3–4 vaisto lašus lašinti į išorinę ausies landą 3–4 kartus per dieną. Prieš siros kamščio šalinimo procedūrą: 3–4 vaisto lašus lašinti į išorinę ausies landą 2 kartus per dieną 4 dienas. Vaistai lašinami ant šono gulintiam pacientui. Įlašinus vaisto, žmogus privalo kelias minutes ramiai pagulėti. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas salicilatomis arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Prakiurus ausies būgnelį. Jaunesni nei 1 metų kūdikiai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Kiekvienoje šio vaisto dozėje yra 100 mg alkoholio (etanolio), tai atitinka 100 mg/l g. Ant pažeistos odos plotų etanolis gali sukelti deginimo pojūtį. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-09-25.

1+1

2 UŽ 1 KAINĄ

1+1

KASDIENAI. KIEKVIENAM

OILESEN D₃ – perkamiausias vitaminas D Lietuvoje!*

OILESEN D₃ 1000 – kiekvienoje kapsulėje yra 1000 TV vitamino D₃, ištirpinto pirmojo spaudimo tyrame alyvuogių aliejuje. Ieškantiems didesnės vitamino D dozės skirtas

OILESEN D₃ su juodųjų ąkrių aliejumi. Vienoje kapsulėje yra 4 kartus daugiau vitamino D, ištirpinto juodųjų ąkrių aliejuje.

*Remiantis SoftDent 2025 metų duomenimis.



1+1

OILESEN D₃ produktai sukurti galvojant apie tai, ko reikia gerai savijautai palaikyti.

OILESEN D₃ – tai, ko reikia gerai savijautai.

*Remiantis SoftDent 2025 metų duomenimis.

SKLANDŽIAM JUDĖJIMUI

1+1



VERSAN SHOTS. Išbandykite geriamas skystas dienos dozes sąnariams, sklandžiam jų darbui [1]. Vienas buteliukas per dieną padeda aprūpinti sąnarius reikalingomis medžiagomis: kolagenu, hialurono rūgštimi, gliukozaminu, chondroitinu, vitaminais C ir D₃.

Versan – profesionali pagalba jūsų sąnariams!

MOTERS GERAI SAVIJAUTAI

1+1



9.99 €

DIFOLIN – planuojančioms pastoti, nėščiosioms ir žindinėms: folis + vitaminas D₃ [3].



19.29 €

DIFOLIN+ – geležies įsisavinimui, hemoglobino, nuovargio mažinimui, energijai [3].

LAKTO IR BIFIDO BAKTERIJOS

1+1

BIFOVAL® FORTE – milijardai lacto ir bifidobakterijų. Sudėtyje 3 bakterijų padermės.

Visai šeimai.
Vaikams nuo 5 metų.



10.79 €



10.49 €

BIFOVAL® BABE – braškių skonio kramtomos tabletės, kurių sudėtyje yra 4 rūšių Lacto ir Bifido bakterijų kompleksas. Vaikams nuo 3 metų.

KALCIKINON – tai, ko reikia kaulams ir dantims:

- Optimalus kalcio kiekis;
- Didesnis vitamino D₃ kiekis;
- Ypač svarbus kaulams vitaminas K₂. [2]

1+1



16.49 €

Pasiūlymai galioja 2026 09 01 – 2026 09 30. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą ir vaistinėje pažymėtoms geltona kainų etikete. Prekių kiekis ribotas.

MAISTO PAPILDAL. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvyri ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

[1] Vitaminas C padeda palaikyti normalią kolageno, kuris reikalingas normaliai odos funkcijai, susidarymą bei apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. [2] Kalcis reikalingas normaliai kaulų ir dantų būklei palaikyti. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę. Vitaminas D padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą. [3] Foliatas padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

1+1

2 UŽ 1 KAINĄ

1+1

NERVŲ SISTEMAI IR MIEGUI

1+1

7⁹⁹ €

RAMEVAL® – ramybės augalų puokštė jaučiantiems lengvą nervinę įtampą. Padeda atsipalaiduoti ir palaikyti normalią nervų sistemos būklę, miego kokybę [4].

Tinka vaikams nuo 5 metų!

Nuo šiol čiulpiamosios **NEUROMED** tabletės – ne tik kokybiškam miegui, bet ir ramiai dienai!

11⁹⁹ €11⁹⁹ €

Išbandykite **NEUROMED ANTI STRESS** – greičiau įsisavinamas, čiulpiamos tabletės, kurios padeda nusiraminti, suvaldyti stresą ir mėgautis akimirka be įtampos jausmo [5].

O ypač greitam užmigimui ir kokybiškam miegui [6] rinkitės **NEUROMED SLEEP FORTE!**

Kartu į ramybę su **NEUROMED!**

IMUNITETUI IR GERKLEI

IMUNITAL FORTE+ – didelės vitaminų D, C ir cinko dozės vienoje kapsulėje su vertingais beta gliukanais ir augaliniais ekstraktais.

1+1



Komponentai veikdami kartu padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą, apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo bei mažinti nuovargį [7].

19⁹⁹ €34⁷⁹ €

IMUNITAL SHOTS – stipri biologiška aktyvių ingredientų programa Jūsų nepriekiaistingai veikiančiam imunitetui [8]. Sukurtas taip, kad imuninės ląstelės laiku gebėtų atpažinti patogenus, juos sunaikinti ir įsiminti informaciją atečiai.

5¹⁹ €4⁹⁹ €

MIRAMILE augalinės pastilės 3IN1: gerklei, kvėpavimo takams ir imunitetui [9]. Sudėtyje: augaliniai ekstraktai, eteriniai aliejai, vitaminas C. Rinkis iš 4 skirtingų skonių!

Suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų.

5⁴⁹ €4⁹⁹ €4⁹⁹ €

1+1

Bičių jėga gerklei ir imunitetui!

PROPODEZAS – tai propolis (bičių pikis) su vitaminu C ir augaliniais ekstraktais, naudingas ne tik gerklei ir imunitetui [10], bet ir gaiviai skanus.

Rinkis iš 4 skirtingų skonių arba stipresnę versiją – **PROPODEZAS FORTE** su šėivamedžiu ir bičių pieneliu.

Net 50 čiulpiamų tablečių!

Suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų.

Pastiloms galioja 2026 09 01 – 2026 09 30. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą ir vaistinėje pažymėtoms geltona kainų etike. Prekių kiekis ribotas.

MAISTO PAPILDAL. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvyri ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

[4] Paprastieji apyniai padeda palaikyti normalų užmigimą ir normalią nervų sistemos veiklą. [5] Pasifloros padeda palaikyti atsparumą stresui. [6] Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti trukmę. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino. [7] vitaminas C padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų ir imuniteto veiklą. [8] Tikrinis blizgutis (reishi grybas) padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. [9] Gvazdikmedis, imbiasas ir mentolis padeda palaikyti kvėpavimo takų veiklą. Cinkas ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. [10] Imbiasas, šėivamedžio uogų ekstraktas, vitaminas C padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų ir imuniteto veiklą.





1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

JAMIESON

VITAMINAS C, 500 mg, 100 kramtomųjų tablečių 17²⁹ €
VITAMINAS C, 500 mg, 120 kramtomųjų tablečių 18⁴⁹ €
VITAMINAS C, 1000 mg, 10 tirpiųjų tablečių 7¹⁹ €

MAISTO PAPILDAI



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

JAMIESON

VITAMINAS D3, kramtomasis, 1000 IU, 100 tablečių 9¹⁹ €
BABY-D3, 400 TV, lašai kūdikiams, 11,4 ml 16⁴⁹ €

MAISTO PAPILDAI



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

JAMIESON

HAIR SKIN NAILS, biotinas, 5000 µg, 60 kramtomųjų tablečių 18⁴⁹ €
KOLAGENAS SU CIBERŽOLE, 60 tablečių 19⁹⁹ €

MAISTO PAPILDAI



1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra
pigesnė arba tokia pati
– NEMOKAMAI!

„EMILI“ ŽOLELIŲ ARBATOS

„EMILI“ ŽOLELIŲ ARBATOS – DARBINGAI DIENAI IR JAUKIAM VAKARUI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtos prekės



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMEDIPLUS

Lūpas apsaugantis balzamas su pantenoliu, 4,5 g 5⁹⁹ €

KOSMETIKOS PRIEMONĖ



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

ODÒNTE

Balinamoji ir dantenų sauganti dantų pasta, 75 ml 7⁹⁹ €
Tarpdančių siūlas su laikikliu, 50 vnt. 3⁹⁹ €

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMEDIPLUS

Kampero kremas, 20 g 3⁹⁹ €

KOSMETIKOS PRIEMONĖ



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMEDIPLUS

Kištukai ausims skrydžiui, S dydis, 1 pora 9⁹⁹ €

NUO KOSULIO

NUO 4⁹⁹ €

HEDELIX

S.A. 40 mg/ml geriamieji lašai, tirpalas, 50 ml 4⁹⁹ €
8 mg/ml sirupas, 100 ml 8⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Gebenių lapų tiršasis ekstraktas.

Vartojamas atškosėjimui lengvinti, sergant peršalimo ligomis ar lėtininiu bronchitu. „Hedelix“ sirupo vartojimas: suaugusiems ir vyresniems nei 10 m. vaikams: 5 ml sirupo 3 kartus per parą; 4–10 m. amžiaus vaikams: 2.5 ml sirupo 4 kartus per parą; 1–4 m. amžiaus vaikams: 2.5 ml sirupo 3 kartus per parą; vaikams iki 1 metų: 2.5 ml sirupo 1 kartą per parą. Vartojimo būdas: vaistas vartojamas per burną. Sirupo neskiestie, bet užgerkite dideliu kiekiu skysčio. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija gebenių lapams arba bet kuriai pagalbinei „Hedelix“ medžiagai; jeigu yra argininsukcinsintetazės trūkumas (metabolinė šlapalo ciklo liga). **Specialūs įspėjimai:** „Hedelix“ sudėtyje yra sorbitolio, propilenglikolio ir makrogoliglicerolio hidroksistearato. Makrogoliglicerolio hidroksistearatas ir sorbitolis gali sukelti skrandžio sutrikimų ir viduriavimą. „Hedelix s.a.“ geriamųjų lašų vartojimas: suaugusiems ir vyresniems nei 10 m. vaikams: po 31 lašą 3 kartus per parą; 4–10 m. amžiaus vaikams: po 21 lašą 3 kartus per parą; 2–4 m. amžiaus vaikams: po 16 lašų 3 kartus per parą. Vartojimo būdas: vaistas vartojamas per burną. „Hedelix s.a.“ reikia vartoti su pakankamu kiekiu vandens. Rekomenduojama, kad maži vaikai „Hedelix s.a.“ suvartotų įmaišytą į arbatą ar vaisių sultis. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija gebenių lapų ekstraktui arba bet kuriai pagalbinei „Hedelix“ medžiagai; jeigu yra argininsukcinsintetazės trūkumas (metabolinė šlapalo ciklo liga); kūdikiams ir vaikams iki 2 m. amžiaus didėję laringospazmo pavojus; jeigu Jūs sergate bronchine astma ar kita kvėpavimo takų liga, dėl kurios yra padidėjęs kvėpavimo takų jautrumas. **Specialūs įspėjimai:** šio vaisto 1 ml (31 laše) yra 837 mg propilenglikolio. Reklamos teksto parengimo data 2024-09.

JEI VARGINA KOSULYS, GAMTA JUMS PATARIA: „HEDELIX“.



-15%

HUMER

MEDICINOS PRIEMONĖS

„HUMER“ nosies higienos ekspertas jau daugiau nei 20 metų. „HUMER“ nosies purškalai nosies higienai ir užguliusiai nosiai, tai 100% neskiestas jūros vanduo, skirtas kasdieninei nosies higienai, drėkina išsausėjusią gleivinę, suskystina sekretą, palengvina jo tekėjimą bei nosies išpūtimą. Natūraliai atkūrus užguliusią nosį esant peršalimui, alerginiam rinitui ar sinusitui. „HUMER“ labai užsikimšusiai nosiai – natūralus, iš augalinių ekstraktų, trejopo poveikio nosies purškalas labai užsikimšusiai nosiai, sergant sinusitu ar peršalimu. „HUMER“ monodozės skirtos kasdieninei kūdikio nosies gleivinės priežiūrai bei kompleksiniam slogos gydymui, esant peršalimui ar alerginiam rinitui.

„HUMER“ – POVEIKIS TIESIAI IŠ GAMTOS. TINKA VISAI ŠEIMAI.

*Akcija taikoma geltona etiketė pažymėtomis prekėms



-20% 7^{11€} 8⁹⁹

ALPIKOL HOTFLUX DRINK, 10 paketėlių

MAISTO PAPILDAS

Šio vitamino C, cinko, seleno, augalinių ekstraktų ir saldiklių. Aviečių skonio tirpus milteliai paketėliuose. Maisto papildas sudėtyje yra medžiagų, kurios padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą: vitaminas C, cinkas ir selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. **Rekomendacijos:** maisto papildą rekomenduojama vartoti kaip papildomą biologinių medžiagų šaltinį normaliai imuninės sistemos veiklai palaikyti. (Vitaminas C ir cinkas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. Vitaminas C, cinkas ir selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.)

ŠILTAS PALENGVĖJIMAS PERŠALUS – „ALPIKOL HOTFLUX DRINK“.



NUO NOSIES, AUSŲ, GERKLĖS PRIEŽIŪRAI

-20%

OTOSAN

MEDICINOS PRIEMONĖS

Jūsų nosies, gerklės ir ausų sausėjimą leiskite pasirodinti medicinos priemonėms „Otosan“, sukurtooms augalinių medžiagų pagrindu.

„OTOSAN“ – PATIKIMAS PASIRINKIMAS!

*Akcija taikoma geltona etiketė pažymėtomis prekėms



3⁹⁹ €

OMEPEX UNO, 20 mg, 14 skrandyje neirų kietųjų kapsulių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje yra 20 mg omeprazolo. **Terapinės indikacijos:** suaugusių žmonių trumpalaikis refluksų simptomų gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti po 1 kapsulę per parą, ryte. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas omeprazolui (taip pat pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, ezomeprazolui) ar pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** sudėtyje yra sacharozės. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Ugės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. B52601079717. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-07.



NUO 6⁹⁹ €

MICROLAX

625 mg/90 mg/9 mg/ml, tiesiosios žarnos tirpalas, 4 x 5 ml 6⁹⁹ €
625 mg/90 mg/9 mg/ml, tiesiosios žarnos tirpalas, 12 x 5 ml 16⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas. 1 ml tirpalo yra 625 mg sorbitolio, 90 mg natrio citrato ir 9 mg natrio laurilsulfato. **Terapinės indikacijos.** Trumpalaikis vidurių užkietėjimo ar būklių, kai reikia palengvinti ištuštinimą, gydymas. Žarnų ištuštinimas prieš diagnostines ar gydymą procedūras galinę žarnyno dalį. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusieji ir vyresni kaip 3 metų vaikai: „Microlax“ 1 tubelės turinys suleidžiamas į tiesiąją žarną. Jaunesni kaip 3 metų vaikai: „Microlax“ 1 tubelės turinys suleidžiamas į tiesiąją žarną, ikišus į ją pusę antgalio. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Pacientams, sergantiems hemoroidais, norint išvengti sužeidimo, vaistą reikia vartoti atsargiai. Vengti ilgalaikio vartojimo. Gali sukelti lokalią odos reakciją (pvz., kontaktinį dermatitą). Reklamos teksto parengimo data 2025-10. LT-MCX-2025-241032.



IKI -50%

SALUTIL®

MAISTO PAPILDAS

„SALUTIL“ – probiotikai ir elektrolitai Jūsų šeimai!
„SALUTIL HYDRA“ – elektrolitų ir gliukozės mišinys, papildytas vitaminais, mineralinėmis medžiagomis ir cholinu. Tinka vartoti po įtemptos veiklos ar jaučiant nuovargį.
„SALUTIL SHOTS“ – gyvybingosios bakterijos, prebiotikai ir vitaminai lengvai atidaromuose vienadoziuose flakonėliuose. Vaikams nuo 3 metų.
„SALUTIL FORTIS“ – kiekvienoje kapsulėje yra 5 milijardai gyvybingųjų bakterijų.
„SALUTIL PREMIUM 9“ – sudėtyje yra 9 mikroorganizmų padėmių ir vitamino D.
2608_ŠB_Salutil_V01_LT

„SALUTIL“ – PROBIOTIKAI IR ELEKTROLITAI JŪSŲ ŠEIMAI!

*Akcija taikoma geltona etiketė pažymėtomis prekėms



-20%

REFLUXAID®

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Refluxaid“ – inovatyvus medicinos prietaisas, skirtas gastroezofaginio refluksu (GERL) bei ezofagito simptomams mažinti. Vartojant šį medicinos prietaisą, susilpnėja tokie simptomai kaip: deginimo pojūtis (rėmuo), atsiroginimas, pasunkėjęs rijimas (disfagija), skausmingas rijimas (odinofagija), kosulys, užkimas. „Refluxaid“ sirupo vartojimas. Prieš naudojimą supurti. Suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams rekomenduojama vartoti po 10–20 ml sirupo po valgio arba prieš miegą. Jaunesniems nei 12 metų vaikams rekomenduojama vartoti pusę dozės (5–10 ml) po valgio arba prieš miegą. „Refluxaid“ tabletes vartojimas. Suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams rekomenduojama vartoti 1–2 tabletes po valgio ir / arba prieš miegą. „Refluxaid“ Niplo“ vartojimas. Prieš naudojimą supurti. Kūdikiams iki 5 kg svorio: rekomenduojama dozė yra 1 ml sirupo, praėjus 5–10 minutėms po maitinimo. Atsiradus vėmimui, rekomenduojama papildomai suvartoti 1 ml sirupo. Iki 3 metų amžiaus vaikams (6–15 kg svoris) rekomenduojama dozė yra 4 ml po valgio ir prieš miegą.

*Akcija taikoma geltona etiketė pažymėtomis prekėms



IKI -40%



SCHOLL

PĖDŲ IR NAGŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

Turėdamas daugiau nei 100 metų patirtį pėdų priežiūros srityje, prekų ženklas „Scholl“ įsitvirtino kaip vienas pėdų priežiūros sprendimų lyderių. Visi „Scholl“ produktai, įskaitant vidpadžius, dezodorantus, pėdų kaukes ir pleistrus, nagų grybelio ir karpų gydymo priemonės, buvo sukurti taip, kad padėtų spresti jūsų pėdų problemas – nuo sausos odos iki pavargusių ir skaudančių pėdų.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

RANDŲ PROFILAKTIKAI IR PRIEŽIŪRAI

-20%



DERMATIX® ULTRA

gelis, 6 g **29⁹⁹ 23⁹⁸ €**
gelis, 15 g **54⁹⁹ 43⁹⁸ €**

MEDICINOS PRIEMONĖS

Vietinio vartojimo silikonų gelis šviežiai užgijusių žaizdų randų susiformavimo profilaktikai ir apsaugai nuo iškilimų, matomų randų atsiradimo. „Dermatix® Ultra“ yra vietiškai vartojamas skaidrus silikonų gelis, kuris greitai išdžiūsta ir padeda išlaikyti odos drėgmės balansą. Skirtas odos randams, susidariusiems po chirurginių procedūrų, nudegimų ir kitų sužalojimų, prižiūreti. Nustatyta, kad „Dermatix® Ultra“ gelis lygina, minkština ir mažina randus, naikina niežulį ir diskomforto jausmą rando vietoje, taip pat mažina dėl randų atsiradusių odos spalvos nelygumus. „Dermatix® Ultra“ taip pat tinka ir vaikams. „Dermatix® Ultra“ negalima vartoti ant atvirų ar šviežių žaizdų. „Dermatix® Ultra“ negalima tepti ant gleivinių arba arti prie akių.

5⁹⁹ €

ACICLOVIR ACTAVIS, 5% kremas, 5 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas. 1 g kremo yra 50 mg acikloviro. **Terapinės indikacijos.** Lokalus odos ir lūpų pūslelinės gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiesiems „Aciclovir Actavis“ 5% kremo reikia tepti 5 kartus per parą, vidutiniškai kas 4 val.; naktį daroma pertrauka. Gydoma 4 paras. Jei per šį laikotarpį nepasveikstama, gydymą reikia tęsti dar 6 paras. Jei pažeidimas neišnyksta ir po 10 parų, rekomenduojama kreiptis į gydytoją. „Aciclovir Actavis“ 5% kremo nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Vartoti ant odos. **Kontraindikacijos.** „Aciclovir Actavis“ 5% kremo negalima skirti pacientams, kurie yra jautrūs aciklovirui, valaciclovirui, propilenglikoliui ar bet kuriai „Aciclovir Actavis“ 5% kremo pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Aciclovir Actavis“ 5% kremo nerekomenduojama tepti gleivinėms, pvz., burnos, akių ar lyties organų, nes galimas sudirginimas. Būtina laikytis atsargumo priemonių ir saugoti akis, kad į jas nepatektų kremo. Jeigu Jūsų imunitetas labai susilpnėjęs, (t. y. Jūsų organizmo gebėjimas kovoti su infekcija yra sumažėjęs), tokiu atveju dėl bet kokios infekcijos gydymo reikia kreiptis į gydytoją ir įvertinti gydymo geriamuoju acikloviru galimybę. Pagalbinės medžiagos cetosteirilo alkoholis, natrio laurilsulfatas ir propilenglikolis gali sukelti vietinių odos reakcijų. **Teksto peržiūros data.** 2023-04-03, OTČ-LT-00093 **Reklamų teksto parengimo data.** 2025-04-01.

NUO 12⁹⁹ €

NIZORAL

20 mg/g šampūnas, 60 ml **12⁹⁹ €**
20 mg/g šampūnas, 100 ml **16⁹⁹ €**
20 mg/g šampūnas, 200 ml **22⁹⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 g šampūno yra 20 mg ketokonazolio. **Terapinės indikacijos:** „Nizoral“ šampūnas yra vaistas, vartojamas infekcinės odos ligoms, kurias sukelė grybeliai, gydyti: sėleniniam galvos odos pleiskanėjimui (*Pityriasis capitis*); seborėjiniam dermatitui (rausvai rudos dėmės, padengtos gelsvomis arba baltomis pleiskanomis); įvairiapalvei derdervinei (*Pityriasis versicolor*) (ant liemens esančios mažos rudos ar baltos spalvos, nelygiais kraštais dėmės). „Nizoral“ šampūnas tinka *Pityriasis capitis* ir seborėjinio dermatito profilaktikai. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Nizoral“ šampūnas skirtas vartoti paaušgiams ir suaugusiems. Patežta odą reikia sudrėkinti „Nizoral“ šampūnu ir palaikyti 3–5 minutes, kad įsijėtų (paprastai 1 kartui užtektu 1 saujos šampūno). Po to odą ir plaukus reikia gerai nuplauti vandeniu. Odos drėkinimo šampūnu dažnis priklauso nuo grybelių rūšies ir nuo to, ar vaistas vartojamas ligai gydyti, ar jos profilaktikai. Gydant galvos odos seborėjinį dermatitą ir pleiskanojimą; odą „Nizoral“ šampūnu reikia plauti 2 kartus per savaitę 2–4 savaites, profilaktikai, kad ligos neatsinaujintų, – 1 kartą per savaitę arba kas 2 savaites. Gydant įvairiapalvę derdervinę odą „Nizoral“ šampūnu reikia plauti 1 kartą per dieną 1 dieną. **Kontraindikacijos:** „Nizoral“ šampūno vartoti negalima, jeigu yra alergija ketokonazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (sudėkinta šampūno oda parausta, pradeda niežėti). **Specialūs įspėjimai:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Nizoral“. Reikia saugotis, kad „Nizoral“, kaip ir kitokio šampūno, nepatektų į akis. Jeigu taip atsitinka, jas reikia plauti vandeniu. **Reklamų teksto parengimo data** 2022-11-2601_SB_Nizoral_V01_LT

NUGALĖJ PLEISKANAS SU „NIZORAL“

GYDO IR APSAUGO ODA

NUO 5⁹⁹ €

BEPANTHEN, 50 mg/g kremas, 30 g **5⁹⁹ €**
BEPANTHEN, 50 mg/g tepalas, 30 g **5⁹⁹ €**
BEPANTHEN PLUS, 50 mg/5 mg/g kremas, 30 g **6⁴⁹ €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g „Bepanthen“ kremo ir tepalo yra 50 mg dekspantenolio; 1 g „Bepanthen“ Plus kremo yra 50 mg dekspantenolio ir 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** „Bepanthen“ kremas ir tepalas: įvairios kilmės paviršinių odos ir gleivinių pažeidimų pagalbinis gydymas drėkinant odą ir atkuriant epidermio barjerą, paliekant epitelizaciją su atitinkamu uždegimo malšinamuoju ir niežėjimą mažinančiu poveikiu, pvz., nedideliams pažeidimams (nedidelėms nudegimams arba nubrozdinimams), odos sudirginimams, šiburimui nuo sausulio, skausmingiems ir įtrūkusiems speneliams gydyti. „Bepanthen“ Plus kremo: lokalis įvairių paviršinių žaizdų, pvz., nubrozdinimų, įpjūimų, įbrėžimų, odos įtrūkių, nudegimų gydymas, kai yra infekcijos pavojus. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Bepanthen“ kremas ir tepalas: patežta odą tepti plonu sluoksniu preparato 1 ar daugiau kartų per dieną, kai reikia. Skausmingus ir įtrūkusius spenelius tepti po kiekvieno maitinimo, prieš žindant nuplauti. Tepti kiekvieną kartą keičiant sauskelnes, prieš tai odą reikia nuo kruopščiai nuvalyti. Gydymo trukmė priklauso nuo susirgimo pobūdžio ir eigos. „Bepanthen“ Plus kremo: kūdikiams nuo 1 mėn., vaikams, paaušgiams ir suaugusiems išvalyti žaizdą arba patežta odą reikia tepti plonu kremo sluoksniu 1 arba kelių kartų per dieną, kol žaizda užgis. Venkite tepti didelius odos plitrus. **Kontraindikacijos:** „Bepanthen“ kremas ir tepalas: alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. „Bepanthen“ Plus kremo: alergija veikliosios arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; gylis arba stipriai užtežtas žaizdos, jei trūkės ausies būgnelis, negalima tepti ausies srities. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Bepanthen“ kremas ir tepalas: jei sergate kita liga, esate alergiškas arba vartojate kitus vaistus, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Naudojant tepalą ar kremą reikia vengti kontakto su akimis. „Bepanthen“ Plus kremo: saugokitės, kad kremas nepatektų į akis, ausis ir ant gleivinių. Negalima tepti ant sudirgintų, bet neinfekuotų odos. Negalima vartoti kartu su kitomis antiseptinėmis medžiagomis, muilu. Jei pasireiškia sunkios alerginės reakcijos simptomai, vartojimą nedelsdami nutraukite ir pasitarkite su gydytoju. **Reklamų teksto parengimo data** 2025-11-01-20250104-84

LAIMEI, YRA „BEPANTHEN“

-25%



DERMATONICS

DRY SKIN, balzamas, 60 ml **9⁹⁹ 7⁴⁹ €**
ULTRAWEEN ITCH RELIEF, kremas, 60 ml **9⁹⁹ 7⁴⁹ €**

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Dermatonic Itch Relief Cream“ ramina sudirgintą odą ir efektyviai mažina niežėjimą, todėl gali būti siūlomas kaip alternatyva atopinių dermatitų sergantiems žmonėms. Specialioje kremo sudėtyje yra 3% koloidinių avižinių dribsnių ir 5% šlapalo. „Dermatonic Dry Skin Balm“ greitai ir itin efektyviai padeda gerinti odos drėkinimą ir bendrą jos būklę. Sudėtyje yra 10% karbamido ir kitų paltaiokomųjų emolientų. Tinka kūno, rankų ir pėdų odai drėkinti. Tinka cukriniu diabetu sergantiems žmonėms.

-25% 12^{37€} 16^{16€}

AMEDIPLUS

pleistras nuo lūpų pūslelinės, 15 vnt.

MEDICINOS PRIEMONĖ

-20% 15^{19€} 18^{18€}

AMEDIPLUS

odos priežiūros pleistras su Arnikos ir Bosvelijos ekstraktais, 9x14 cm, 10 vnt.

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

-30%



VIZIK

ALLERGY, 10 ml 16⁹² 11⁸⁸ €Pavargusioms ir sausoms akims, 10 ml 12⁹² 9⁰⁸ €Sudirgusioms ir paraudusioms akims, 10 ml 12²⁸ 8⁹⁵ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

Be konservantų.

ATIDARIUS BUTELIUKUS GALIMA NAUDOTI NET VIENERIUS METUS!

SAUSOMS, PAVARGUSIOMS, SUDIRGUSIOMS AKIMS BEI LĖTINIAM AKIŲ SAUSUMUI

NUO 13⁴⁷ €

BEPANTHEN® EYE

akių lašai, 20 x 0,5 ml 13⁴⁷ €akių lašai, 10 ml 15⁴⁷ €INTENSIVE, akių lašai, 10 ml 16⁹⁷ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Bepanthen“ Eye“ akių lašų sudėtyje yra natrio hialuronato ir deksantenolio. „Bepanthen“ Eye Intensive“ akių lašų sudėtyje yra ne tik natrio hialuronato ir deksantenolio, bet ir vitaminų A ir E bei fosfolipidų. Natrio hialuronatas suformuoja tolygią, stabilią ir ilgalaikę apsauginę plėvelę ant akies paviršiaus. Dekspantenolis geba prisijungti didelį vandens kiekį, drėkina ir apsaugo akis. Vitaminai A ir E veikia kaip antioksidantai, neutralizuodami laisvuosius radikalus (pvz., UV šviesa). Fosfolipidai palengvina ašarų plėvelės lipidinio sluoksnio regeneraciją. „Bepanthen“ Eye“ akių lašai skirti sausoms ir pavargusioms akims. Drėkina ir apsaugo. Tinka esant mechaniniams stresui, stresui dėl aplinkos poveikio arba intensyviaus šilumos. „Bepanthen“ Eye Intensive“ akių lašai skirti labai sausoms, sudirgusioms akims ir lėtiniam akių sausumui. Drėkina, saugo, regeneruoja ir gydo. Tinka ne tik esant mechaniniams stresui, stresui dėl aplinkos poveikio arba intensyviaus šilumos, bet ir esant smėlio pojūčiui akyse, sumažėjus ašarų gamybai, esant diskomfortui dėl tam tikrų vaistų vartojimo ar išorinių alergenų. Visi lašai tinka nešiojantiems kontaktinius lęšius. Lašanant kontaktinių lęšių išimti nereikia. Sudėtyje nėra konservantų, todėl lašai labai gerai toleruojami net vartojant ilgą laiką. Lašinti po 1 lašą į akies junginės maišelį iki 3-5 kartų per parą. „Bepanthen“ Eye vienadozės akių lašų talpyklės skirtos tik vienkartiniam vartojimui. „Bepanthen“ Eye“ buteliuką galima vartoti net 12 mėnesių po jo atidarymo. „Bepanthen“ Eye Intensive“ buteliuką galima vartoti 2 mėnesius po jo atidarymo. Jei norite sužinoti daugiau, skaitykite visas vartojimo instrukcijas. Reklamos teksto parengimo data 2025-02. CH-20250227-72

PAŠALINKITE SAUSŲ AKIŲ SIMPTOMUS IŠ KARTO!

-30%



OCUSYST

kontaktinių lęšių tirpalas, 100 ml 5²⁸ 3⁷⁰ €kontaktinių lęšių tirpalas, 360 ml 8¹⁸ 5⁷³ €

MEDICINOS PRIEMONĖS

ALERGIJOS SIMPTOMAMS LENGVINTI

4⁴⁹ €

BILASTINE STADA, 20 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje tabletėje yra 20 mg bilastino. **Terapinės indikacijos:** vartojamas šienligės (kuriai būdingi simptomai yra čiaudulys, niežulys, sloga, užgulta nosis, paraudusios ir ašarojančios akys) ir kitų alerginės slogos formų simptomams lengvinti. Taip pat gali būti vartojamas niežintiems odos bėrimams (pūklės, dilgėlė) gydyti. Skirtas suaugusiems ir 12 m. bei vyresniems paaugliams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** rekomenduojama dozė yra 1 tabletė per parą. Tabletę reikia nuryti nevalgius, 1 val. prieš valgį arba sulčių gėrimą, arba praėjus 2 val. po valgyto arba sulčių gėrimo. Nuryti tabletes užsigeriant stikline vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** esant vidutinio sunkumo arba sunkiam inkstų funkcijos sutrikimui, jei vartojami kiti vaistai (pvz., ketokonazolas, eritromicinas, diltiazemas, ciklosporinas, ritonaviras, rifampicinas), reikia vengti vartoti kartu su bilastinu. Reklamos teksto parengimo data 2024-12. 2604. Bilastine_V01_LT

PALENGVINKITE ALERGIJĄ IR MĖGAUKITĖS GYVENIMU!

ALERGINIO RINITO SIMPTOMŲ GYDYMUI IR PROFILAKTIKAI

-30%

9⁷⁸ €

ECTOGARD®

nosies purškalkas nuo alergijos, 20 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

Medicinos priemonė „Ectogard“ yra hipertoniškas nosies purškalkas, skirtas alerginiam rininui būdingų simptomų, tokių kaip sloga, nosies niežulys, čiaudulys ir nosies užgulimas, gydymui ir profilaktikai. ECTOGARD nosies purškalkas natūraliai mažina gleivinės paburkimą, uždegimą ir palaido alergenų sudirgintos gleivinės regeneracijos procesą. Tinka ir vaikams iki 2 metų. ECTOGARD nesukelia pripratimo ir gali būti vartojamas iki 50 dienų.

PATIKĖKITE SAVO ALERGIJĄ „ECTOGARD“.

4⁹⁹ €

ACETERIN EXPRESS, 10 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės simptomams palengvinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vyresniems kaip 12 metų asmenims – po 1 tabletę per dieną, 6-12 metų vaikams – po pusę tabletės 2 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pagalbinei medžiagai, hidroksizinui arba bet kuriam piperazino darinui. Pacientai, kuriems smarkiai sutrikusi inkstų funkcija. **Specialūs įspėjimai:** atsargiai vartoti sergantiems epilepsija ir pacientams, kuriems yra traukulių pavojus. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2601069661. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

Pasiūlymai galioja 2026 09 01 – 2026 09 30.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Nuolaidos taikomos prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą, kurio galite teirautis kiekvienoje vaistinėje, el. paštu evaistine@nvaistine.lt arba nemokamu tel. +370 800 10008. Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį/informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvktu.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Daugiau informacijos NORFOS vaistinėje, el. paštu evaistine@nvaistine.lt arba tel. +370 800 10008. Reklaminio teksto parengimo data – 2026 08 19.



IKI -30 %

**OMRON****MEDICINOS PRIETAISAI**


Japonų prekių ženklui „Omron“ medicinos prietaisai tiksliai išmatuos kraujospūdį, kūno temperatūrą, inhaliatorių palengvins kvėpavimą. „OMRON“ – PATIKIMAS SVEIKATOS PARTNERIS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

ŠIRDŽIAI IR JOS APSAUGAI

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

**NATASPIN CARDIO PROTECT, 30 kapsulių 20⁹⁹ €****MAISTO PAPILDAS**

„NatAspin“ **CARDIO PROTECT**® – tai japonų ilgaamžiškumo filosofijos įkvėpta, daugiakomponentė formulė širdžiai ir jos apsaugai. Ypač stiprus, skirtingi antioksidantai, suderinti su kraujotakai naudingais komponentais taip, kad padėtų palaikyti esmines, nuo sveikos širdies veiklos neatsiejamas funkcijas:

- širdies ir kraujotakos sistema,
- apsaugą nuo oksidacinės pažaidos,
- normalų ląstelių senėjimą ir energijos apykaitą,
- cholesterolio balansą,
- nervų sistemą.

Sudėtyje naudojami išskirtinai tik standartizuoti, bioaktyvūs ekstraktai.

APSAUGOTA ŠIRDIS – SVEIKA ŠIRDIS SU „NATASPIN“ CARDIO PROTECT®.

-20 %

**LYSI****MAISTO PAPILDAS**

Tai nepakeičiamųjų omega-3 riebalų rūgščių ir vitaminų šaltinis visai šeimai. „Lysi“ žuvų taukai užtikrins Jums vitamino D paros normą ir didelį kiekį svarbiausių omega-3 riebalų rūgščių.

„LYSI“ – ŽUVŲ TAUKŲ EKSPERTAI IŠ ISLANDIJOS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-15 % 22^{09€} 25^{25€}**OLP APOFERIN, 30 kapsulių****MAISTO PAPILDAS**

„OLP Apoferin“ – geležies kompleksas su laktoferinu hemoglobininui ir kraujodarai.

Efektivesnis geležies įsisavinimas ir transportavimas organizme.

Neturi sąveikos su maistu.

Nesukelia įprastai geležiai būdingų šalutinių reiškinių.

Tinka vartoti nėščiosioms ir maitinantioms.

7⁹⁹ €**MAGNEROT, 500 mg, 50 tablečių****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Kiekvienoje tablete yra 500 mg magnio orotato dihidrato (atitinka 32,8 mg magnio). **Terapinės indikacijos.** Magnio trūkumo, jeigu jis sukelia raumenų veiklos sutrikimą (pvz., mėšlungį), šalinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems žmonėms: jei nepaskirta kitaip, magnio atsargoms papildyti pirmą savaitę reikia gerti po 2 tabletes 3 kartus per parą, po to – po 2–3 tabletes per parą. **Vaikų populiacijai.** „magnerot“ nėra skirtas vaikams iki 18 metų. Vartoti per burną. Tablete reikia nuryti visą arba sukratytą prieš valgį ar valgant, užgeriant nedideliu kiekiu skysčio. Tablete reikia vartoti mažiausiai 6 savaites. Galima vartoti ir ilgą laiką. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Inkstų funkcijos sutrikimas ir polinkis formuotis kalcio, magnio ir amonio fosfatų akmenims. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatyta retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktozės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Jei kartu vartojama geležies vaistinių preparatų, magnis gali sutrikdyti geležies absorbciją. Tokiu atveju geležies vaistinių preparatų reikia gerti ne anksčiau, kaip praėjus 2–3 val. po magnio vaistinio preparato pavartojimo (arba atvirkščiai). Taip turi būti vartojami ir tetraciklinai bei natrio fluoridas. Nepageidaujamas poveikis. Didelės dozės gali sukelti viduriavimą arba išmatų suminkštėjimą. Sumažinus dozę, toks poveikis išnyksta. **Pakuotė.** 50 tablečių. **Teksto peržiūros data.** 2024.09.26. **Registruotojas.** Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Vokietija. **Reklamos teksto parengimo data** 2025-09-29.

ORGANINĖ MAGNIO DRUSKA, LENGVAS PASISAVINIMAS.

9⁹⁹ €**FORLAX FAST 6 mikrokлизmos****MEDICINOS PRIEMONĖ**

Medicinos priemonė „Forlax Fast“ – tai mikrokлизma, skirta suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams, esant retkarčiais pasitaikančiam vidurių užkietėjimui. Jos sudėtyje yra glicerolio, vandens ir polisacharidų iš vaistinių slyvarozų, turinčių šalinamąjį, minkštinamąjį, drėkinamąjį ir raminajamą poveikį. Priemonė minkština išmatas, palengvina išmatų pašalinimą ir mažina diskomfortą užkietėjus viduriams. Naudoti į tiesiąją žarną. Suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams. Pagal poreikį naudokite 1 mikrokлизmą. Jei vidurių užkietėjimas nepažeina, skirkite 2 dozes iš eilės. Praneškite apie bet kokį rimtą įvykį, susijusį su medicinos priemone, vietiniam atstovui „Mayoly Baltics“, UAB, el. paštu vigilance.BAL@mayoly.com. Teksto peržiūros data 2024-07. Reklamos teksto parengimo data 2026-04-07. FFAST-LT-2026-0002

-30 %

**BIOGAIA**

PROTECTIS, 10 kramtomųjų tablečių su vitaminu D3 46³⁹ 727 €

PHARAX, lašai, 5 ml 24⁵⁰ 15³⁹ €

PROTECTIS BABY, lašai, 5 ml 48⁵⁰ 130¹ €

MAISTO PAPILDAS

„BioGaia Protectis“ lašai – saugus ir paprastas būdas papildyti kūdikių žarnyno mikroflorą nuo pirmųjų gyvenimo dienų, vos 5 lašai per dieną.

„BioGaia Protectis“ kramtomosios tabletės su vitaminu D3 – patogus būdas palaikyti žarnyno mikroflorą ir imuninę sistemą, 1 apelsinų skonio tablete per dieną; tinka suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų.

„BioGaia Pharaoh“ lašai – dvejoja pagalba burnos ir gerklės mikrobiotai; tinka vaikams nuo 6 mėnesių ir suaugusiems, vartoti po 5 lašus 2 kartus per dieną.

NEPAKANKAMAI MITYBAI

IKI -25 %

**FRESUBIN****SPECIALIOS MEDICININĖS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAI**

„Fresubin“ produktai su dideliu kiekiu baltymų reguliuoti esant mitybos nepakankamumui ar jo rizikai, padidėjusiam energijos ir baltymų poreikiui užtikrinti, ribojant skysčių vartojimą, esant išsekimui. Rekomenduojami po ligos, operacijos, sergant. Tinka vartoti nuo 3 metų. Vartoti prižiūrint medikams.

„Fresubin 2 kcal Crème“ – kremėnų tekstūros žemuogių skonio šaukštų valgomas produktas. Tinka esant rijimo sutrikimui (disfagijai). Galima maišyti su maistu.

„Fresubin 2 kcal Drink“ neutralaus skonio ir „Fresubin 2 kcal Fibre Drink“ vanilės skonio (su skaidulinėmis medžiagomis) skysti geriamieji produktai. Galima maišyti su maistu.

„Fresubin Original“, „Fresubin Original Fibre“, „Fresubin HP Energy“, „Fresubin HP Energy Fibre“ produktai skirti mitybai per zoną.

„FRESUBIN“. ATGAUK APETITĄ GYVENIMUI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

ENERGIJAI, IMUNINEI SISTEMAI, ATSIGAVIMUI PO VAKARĖLIO

-30%**GREENIFY****MAISTO PAPILDAS**

„Greenify“ – tai maisto papildų linija su kruopščiai atrinktomis sudedamosiomis dalimis, skirta įvairiems kasdieniams poreikiams. Patogi skysta forma – lengva įtraukti į kasdienę rutiną.
Grožio rutina – „Greenify Collagen Beauty Shots“.
Greitesnis užmigimas ir geresnis miegas – „Greenify Deep Sleep Shots“.
Protinė veikla ir koncentracija – „Greenify Brain Booster Shots“.
O kai reikia greitos pagalbos virškinimo ar imuninei sistemai, išbandykite „Greenify Detox After Party“ arba „Greenify Immunity Booster“.

*Klijų taikoma geltona etiketė pažymėtos prekės

**IKI -40%****„OILESEN“ VITAMINAS D3**

D3+K2 su kanapių aliejumi, 60 minkštųjų kapsulių **24⁶² 14⁸¹ € -40%**
400, geriamieji lašai, 10 ml **4⁴⁸ 3³⁷ € -25%**

MAISTO PAPILDAS

„OileSEN D3+K2 su kanapių aliejumi“ – itin vertinga sudėtis, apjungianti 3 svarbius gerai savijautai komponentus: 75 mcg vitamino K2 sinergiškai veikiantis su 4000 TV vitaminu D3 ir 500 mg kanapių sėklų aliejumi.

„OileSEN D3 400“ – 1 laše yra 400 TV vitamino D, išrūpinto extra virgin alyvuogių aliejuje. Tinka kūdikiams nuo pirmos gimimo dienos. Paprasta dozuoti pipete.

DAUGIAU SAULĖS SU „OILESEN D3“!**IKI -50%****NEUROZAN, 30 tablečių 34⁴⁸ 15⁷⁵ € -50%****NEUROZAN PLUS, 28 kapsulės + 28 tabletės 50⁹⁸ 38²⁴ € -25%****MAISTO PAPILDAS**

NEUROZAN – platus ir subalansuotas kompleksas normaliai proteinei (pantoteno rūgštis) ir nervų sistemos (jodas, magnis, ir kt.) veiklai palaikyti. Vitaminai B1, B3 ir kt. palaiko normalią psichologinę būklę, o geležis ir cinkas – pažinimo funkciją. Sudėtis papildyta ginkmedžių ekstraktu ir kofermentu Q10.

-20%**AMEDIPLUS**

Vaikiški pleistrai, 6 x 2 cm, 10 vnt. **2³⁸ 1⁹¹ €**

Pleistrai rinkinys šeimai, 20 vnt. **4⁴⁵ 3⁵⁶ €**

Pleistrai nuospaudoms, 7 x 2,2 cm, 10 vnt. **2³⁹ 2³⁹ €**

Tamprūs pleistrai, 7 x 2 cm, 200 vnt. **20⁰⁰ 16⁰⁰ €**

Tamprūs pleistrai, 7 x 3,8 cm, 200 vnt. **28⁰⁰ 22⁴⁰ €**

Tamprūs pleistrai, 7 x 2 cm, 10 vnt. **4⁴⁸ 1³⁵ €**

ULTRA SENSITIVE pleistrai, 10 vnt. **3⁴⁸ 2⁷⁹ €**

MEDICINOS PRIEMONĖS**-40%****ABC VIT**

VITAMINAS D3, 50 mg (2000 TV), 60 kapsulių **8⁸⁸ 5³³ €**

VITAMINAS D3, 100 mg (4000 TV), 60 kapsulių **8¹⁸ 4⁹¹ €**

VITAMINAS A, 60 kapsulių **7²⁸ 4³⁷ €**

MAISTO PAPILDAS

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, padeda palaikyti normalią kaulų, dantų būklę, normalią raumenų funkciją, padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą.

Vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą, palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, taip pat palaikyti normalią odos būklę.

-10%**6⁰² €****GLICINAS, 50 tablečių****MAISTO PAPILDAS**

Sudedamosios dalys: glicinas (65 % grynojo kiekio), deksrozės monohidratas, kukurūzų krakmolai, lipnumą reguliuojanti medžiaga riebalų rūgščių magnio druskos. Grynasis kiekis: 7,6 g. Vartojimo būdas: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Tabletes laikyti po liežuviu, kol ištirps. Rekomenduojamame suvartoti per parą kiekyje (3 tabletės) yra 300 mg glicino. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Laikymo sąlygos. Laikyti sausoje, tamsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Gamintojas: UAB „Medicata Fila“, Jarijų g. 28, Vilnius. Išskirtinis platintojas Lietuvoje: UAB VERATRUM PHARMA, Jarijų g.28, Vilnius

-20%**5⁴³ €****UNDEVIT, 50 dražečių****MAISTO PAPILDAS**

Vitaminų A, C, E, B grupės (B1, B2, B6, B12) ir niacino, rutino, pantoteno rūgšties, folio rūgšties preparatas. Vitaminai C ir A padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinių pažeidimų, vitaminas B1 (tiaminas) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, vitaminas B2 (riboflavinas) padeda išsaugoti normalų regėjimą, vitaminas B6 (piridoksinas) padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, vitaminas B12 (dibakobolaminas) padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją, pantoteno rūgštis padeda palaikyti normalią protinę veiklą. Vartojimas: gerti po 1 dražetę per dieną po valgio. Gamintojas: „Technolog“, Ukraina. Išskirtinis platintojas Lietuvoje: UAB VERATRUM PHARMA, Jarijų g.28, Vilnius

-30 %

FOMAN®30 kapsulių ~~45⁹⁹~~ 11¹⁹ €**MAISTO PAPILDAS**

„Foman“ – maisto papildas, skirtas 3 pagrindinėms vyriškosios funkcijoms: **prostato, šlapimo sistemos, reprodukcinės**. Išskirtinėje „Foman“ sudėtyje yra 4 kompleksškai veikiantys elementai: gulsčiųjų serenojų vaisių ekstraktas padeda palaikyti šlapimo ir reprodukcinę funkcijas; didžiųjų dilgėlių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią prostatos funkciją; fermentas proteazė padidina vyro mitybą; organinė seleno forma, padeda palaikyti normalią spermatogenezę. Rekomenduojama suaugusiems gerti po 1-2 tabletes per dieną ne valgio metu.

„FOMAN“ – TECHNISKAI TVARKINGAM VYRUI.

FOMAN® UP SHOTS, 14 x 25 ml ~~40⁹⁹~~ 28⁶² €

MAISTO PAPILDAS

„Foman Up Shots“ – skirtas seksualiai aktyviems VYRAMS. Viename buteliuke yra koncentruotų veikliųjų medžiagų dozė pritaikyta vyrų: **lytiniam potraukimui, erekcijai, pajėgumui ir energijai**. Natūralių seksualinių aktyvumą ir energiją padeda palaikyti **Peruvinė pipirinė (maza)**. Lytinį potraukį ir pajėgumą padeda palaikyti **Gulsčioji ragužė**. Ženšenis padeda palaikyti normalią erekcijos funkciją. **Pantoteno rūgštis** (vitaminas B5) padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei padeda palaikyti normalią proteinę veiklą bei normalią energijos apykaitą. Sudėtyje taurinas (natūrali amino rūgštis). **VIRŠYK GALIMYBES SU „FOMAN UP SHOTS“**

NERVAMS, RAUMENIMS, ENERGIJAI

-30 %

**MAGIC MAGNESIUM™****MAISTO PAPILDAI**


Jaučiatės pavargę, trūksta energijos dienos išsūkiams, norite palaikyti nervų sistemos veiklą ar papildyti organizmą magniu? „Magic Magnesium™“ iš „New Nordic“ gali būti tai, ko ieškojote, nes tabletėse yra gerai pasisavinamo magnio, kuris reikalingas daugybei organizmo funkcijų.

- „Magic Magnesium“ Citrat – nervų sistemos veiklai palaikyti.
- „Magic Magnesium“ Glycinat – raumenims ir kaulams.
- „Magic Magnesium“ Citrat – nuovargiui mažinti ir energijai palaikyti.
- „Magic Magnesium“ Taurat – širdžiai ir kraujotakai.

Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą, palaikyti normalią raumenų funkciją, nervų sistemos veiklą ir energijos apykaitą. Tiaminas padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Pajūrinis pušų žievės ekstraktas padeda palaikyti normalią kraujagyslių sienelių būklę ir kraujotaką.

„MAGIC MAGNESIUM™“ – INDIVIDUALIEMS JŪSŲ POREIKIAMS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-20 % 13^{51€} 16^{16€}

ALKYMER, 60 minkštųjų kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„ALKYMER“ – maisto papildas, kurio sudėtyje yra alkilglicerolai, gaunami iš ryklių kepenų aliejaus. Alkilglicerolai – tai natūralūs lipidai. Kiekvienoje „ALKYMER“ kapsulėje (410 mg) yra 250 mg ryklių kepenų aliejaus, kuriame alkilglicerolių kiekis sudaro ne mažiau 20 % (50 mg). Pagaminta Švedijoje.

IŠSAUGOKITE GYVENIMO KOKYBĘ!

-30 %



VALERIJONAS FORTE, 50 tablečių ~~7²⁹~~ 5⁴⁵ €
VALERIJONŲ EKSTRAKTAS, 20 mg, 50 tablečių ~~2⁷⁹~~ 1⁹⁵ €

MAISTO PAPILDAI

Valstinis valerijonas padeda atsipalaiduoti, palaiko normalią miego funkciją.

IKI -40 %

**VITABIOTICS WELL LINIJA****MAISTO PAPILDAI**

WELLWOMAN – nakvišu, agurkių, vitaminų ir mineralų kompleksas moterims. WELLMAN – sibirinių ženšenių, amino rūgščių, vitaminų ir mineralų kompleksas vyrams. WELLTEEN – subalansuota paaugliams, o WELLKID – patiems mažiausiems.

GERA SAVIJAUTA VISAI ŠEIMAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

IKI -40 %

**AIDWISE**

Automatinis žastinis kraujospūdžio matuoklis DBP-1358, ~~64⁹⁹~~ 38⁹⁷ € -40 %

Termometras skaitmeninis lanksčiu galiuku, ~~7⁹⁹~~ 5⁵⁹ € -30 %

Bekontaktis skaitmeninis termometras DET-306, ~~39⁹⁹~~ 27⁹⁹ € -30 %

MEDICINOS PRIETAISAI-30 % 6^{50€} 9^{99€}

FITOLIZIN, valgomoji pasta, 100 g

MAISTO PAPILDAS

-30 %

**BF-ESSE****MAISTO PAPILDAI**

„Stop Stress“ ir „Stop Stress“ Herbal sudėtyje esantis vitaminas B6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. „Stop Stress“ Night sudėtyje esantis pasiflorų ekstraktas padeda palaikyti normalų miegą. „Kardio Start“ sudėtyje esantis valgomųjų česnakų ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių funkciją. „Flex“ su gliukozaminu, chondroitinu, MSM ir vitaminu C, kuris padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų ir kremzlių funkcijai, susidarymą. „Immuneco“ sudėtyje esantys vitaminai A, D, B, B₆, cinkas ir selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. „Beautynot“ pasižymi tuo, kad sudėtyje turi tokių retų augalų kaip peruvinių gvajavų ir vienžiedžių eugenijų vaisių ekstraktų. Varis padeda palaikyti normalią plaukų ir odos pigmentaciją, cinkas padeda palaikyti normalią plaukų, nagų ir odos būklę.

DIENAI BE STRESO, RAMIAM MIEGUI, IMUNITETUI, ŠIRDŽIAI, GROŽIUI IR SĄNARIAMS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-30 %**„NEW NORDIC“ MULTIVITAMINAI****MAISTO PAPILDAI**

Skandinavų bendrovės „New Nordic“ multivitaminai – tai puikiai suderinti vitaminų, mineralų, mikroelementų ir augalinių ekstraktų kompleksai imunitetui ir gerai savijautai. „Multivitamin active woman“ – moterims, besirūpinančioms gera savijauta ir grožiu. „Multivitamin active woman 55+“ – vyresnių moterų organizmo poreikiams. „Multivitamin pregnant and breastfeeding woman“ – besilaukiančioms moterims ir žindydėms. „Multivitamin active man“ ir „Multivitamin active man energy boost“ – vyrams. Nepamiršome ir mažųjų – „Mineralai kaulams“, apelsinų arba miško uogų skonio kramtomosios tabletės – kalcio, magnio ir vitamino D šaltinis augančiam organizmui. „Multi vegan GUMMIES“ – gaivaus vaisių ir uogų skonio multivitaminai guminukai imunitetui. Tinka visai šeimai, taip pat vegetarams ir veganams. Sudėtyje esantys vitaminai A, C, D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

JAUSKITĖS PUIKIAI!

*Akcija taikoma geltona etiketė pažymėtomis prekėmis

**-15 %****VITABALANS****MAISTO PAPILDAI**

LACTO SEVEN „Lacto Seven“ sudėtyje yra septynių skirtingų rūšių pieno rūgšties bakterijų. Maisto papildai pagaminti Suomijoje, taikant aukštus kokybės standartus! Vartojimas. „Lacto Seven Kids“: vyresniems kaip 3 metų vaikams – 1 tabletė per dieną, „Lacto Seven Chew“, „Lacto Seven Irin“, „Lacto Seven Original“: suaugusiems – 1–2 tabletės per dieną, vyresniems kaip 3 metų vaikams – 1 tabletė per dieną, „Lacto Seven Strong“: suaugusiems – 1 kapsulė per dieną.

MAGNEX Magnio maisto papildai, pagaminti Suomijoje. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją ir normalią nervų sistemos veiklą. Vartojimas: „Magnex 375 mg“, „Magnex 375 mg + B6“, „Magnex 375 mg + B6“ šnypščiosios tabletės – 1 tabletė per parą, „Magnex Citrate + B6 Chew“, „Magnex Citrate + B6“ – 2 tabletės per parą.

MULTI B STRONG B grupės vitaminų tabletės. Dauguma B grupės vitaminų (B1, B2, B6, B12, niacinas, pantoteno rūgštis) padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vitaminai B1, B6, B12 ir niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją. Vitaminai B2, B6, B12, niacinas ir pantoteno rūgštis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: suaugusiems – 1–2 tabletės per parą. Nuryti užsigeriant vandeniu.

VITA B12 „Vita B12“ – metų skonio vitamino B12 pastilės. Vitaminas B12 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją, normalią nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. „Vita B12 + folio rūgštis“ – vitamino B12 ir folio rūgšties pastilės su saldikiu. Vartojimas: suaugusiems – 1 pastilė per dieną. Leiskite pastilei lėtai ištirpti burnoje. **UNITAL** „Unital“ sudėtyje yra 1 mg melatonino. Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti). Melatoninas padeda mažinti subjektyvų laiko jausmą skirtingu pajutimą (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant ne mažiau kaip 0,5 mg prieš einant miegoti pirmą kelionės dieną ir kelias dienas po atvykimo į kelionės tikslą vietą). Vartojimas: suaugusiems rekomenduojama vartoti 1/2–1 tabletę. Dozė visada turėtų būti suvartota tuo pačiu metu vakare.

*Akcija taikoma geltona etiketė pažymėtomis prekėmis

IKI -40 %**„AMEDIPLUS“ MEDICINOS PRIETAISAI**

Automatinis žastinis kraujospūdžio matuoklis DBP-6192, **85^{aa} 51⁵⁹ € -40 %**

Tinklinis inhalatorius VP-M1, **79⁹⁹ 55⁹⁹ € -30 %**

Kompressorinis inhalatorius VP-D1, **65⁹⁹ 46¹⁹ € -30 %**

MEDICINOS PRIETAISAI**-15 %****NUTRIDRINK, CUBITAN, FORTINI****SPECIALIOS MEDICININĖS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAI**

Turi būti vartojami prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams

*Akcija taikoma geltona etiketė pažymėtomis prekėmis

-30 %**DR. PAKALNS****MAISTO PAPILDAI**

Prekių ženklas „Dr. Pakalns“ – tai pagarba mokslui, gamtai ir žmogui. Įkvėptas vaistinio ir biologijos mokslų daktaro Dailionio Pakalno palikimo, jis jungia tradicijas, mokslą ir rūpestį žmogui.

Produktai:

• **BETA IMMUNE balzamas** – su beta gliukanais ir šėvamedžių uogomis. Šėvamedžių vaisių ekstraktas, vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Sudėtyje – itin grynų beta gliukanai. Tinka vaikams nuo 3 metų. **Be gliitimo. Be GMO. Be alkoholio. Kokybė patvirtinta GMP standartu.**

• **GYSLOČIŲ balzamas** – su siauralapių gysločių ekstraktu, padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų funkciją ir gerklės komfortą. Tinka vaikams nuo 3 metų. **Be gliitimo. Be GMO. Be alkoholio. Kokybė patvirtinta GMP standartu.**

• **PINI PLUS sirupas** – su pušų pumpurais ir čiobreliais, tradicškai vartojamas kvėpavimo takų funkcijai palaikyti, padeda išlaikyti gerklės komfortą ir natūralų atsikojimo procesą. Tinka vaikams nuo 4 metų. **Be gliitimo. Be GMO. Kokybė patvirtinta GMP standartu.**

• **ISLANDINIŲ KERPENŲ sirupas** – su pipirmėčių tinktūra. Padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų funkciją ir gerklės komfortą. Tinka vaikams nuo 12 metų. **Be gliitimo. Be GMO. Kokybė patvirtinta GMP standartu.**

„DR. PAKALNS“ – GAMTOS GALIA.

*Akcija taikoma geltona etiketė pažymėtomis prekėmis

-15 %**OILEDIXIN****MAISTO PAPILDAI**

„Oiledixin vitaminai A+E“ vitaminas A padeda palaikyti normalią odos būklę. Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

„Oiledixin vitaminas D3“ skirtas papildyti mitybą vitaminu D3 (cholekaliferoliu). Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir normalią kaulų būklę.

„Oiledixin Niam-Niam“ skirtas papildyti vaikų ir suaugusių mitybą vitaminais ir mineralais. Geležis padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą.

„Oiledixin Vitaminas C“ pagaminamas specialiai vaikams lašų forma, todėl jame esanti vitamino C patogu dozuoti mažoms, t.y. vaikams skirtoms, dozėmis.

„Oiledixin B grupės vitaminai“ skirti papildyti kasdieninę mitybą B grupės vitaminais ir GABA. Vitaminai B6, B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.

*Akcija taikoma geltona etiketė pažymėtomis prekėmis

-20%**7^{51€}**
9^{39€}**VOCAL HOT DRINK**

juodųjų serbentų skonio, milteliai karštam gėrimui ruošti, 10 paketėlių
medaus ir citrinų skonio, milteliai karštam gėrimui ruošti, 10 paketėlių

MAISTO PAPILDAI

„Vocal“ miltelių pakeliose karštam gėrimui ruošti sudėtyje yra islandinių kerpenų gniūžulų, mažalapų liepų žiedų, tikrųjų imbierių šakniastiebių, smulkiažiedžių tūbių žiedų, juoduogių šėvamedžių žiedų ekstraktų bei vitamino C. Islandinės kerpenos padeda palaikyti kvėpavimo takų (gerklės, ryklės gleivinės bei balso stygų) funkcijas. Islandinės kerpenos, imbierai, juoduogiai šėvamedžiai ir liepų žiedai padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. Parušimo būdas: paketėlių turinį (miltelius) ištirpinkite 200 ml karšto vandens (ne verdančio, apie 60 °C) ir gerkite. Maisto papildas su saldikliais.

-20%**VOCAL****MAISTO PAPILDAS SU SLDIKLIAIS**

Pastilių „Vocal“ sudėtyje yra islandinių kerpenų, vitamino C ir cinko. Islandinės kerpenos padeda palaikyti kvėpavimo takų – gerklės, ryklės gleivinės bei balso stygų – funkcijas. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Cinkas atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese. Rekomenduojamas vartojimas: 1 pastilė 4 kartus per dieną. Vyresniems nei 4 m. žmonėms.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėmis

NUO SAUSO IR ŠLAPIO (PRODUKTYVAUS) KOSULIO**-20%****IVEX**

100 ml + 5 ml matavimo indelis **9³⁹ 7^{51€}**

200 ml + 5 ml matavimo indelis **16²⁹ 13^{93€}**

MEDICINOS PRIEMONĖ

Sudėtyje esantys natūralūs ekstraktai (gebenų (Hedera Helix) ekstraktas (DER 1-2:1), poliflorinis medus, vaistinių svilarožių (Althaea officinalis) ekstraktas (1%), vaistinių čiobrelių (Thymus vulgaris) ekstraktas (0,3%), kurių veiksmingumas įrodytas, suformuoja prie gleivinės prilipancią plevę, kuri ramina kosulį, apsaugo nuo dirginimo bei pagerina viršutinių kvėpavimo takų funkciją. Tai ypač aktualu žiemą arba kai reikia gydyti išorinių veiksmų (šalčio, smogo, dulkių ir dūmų) sukeltą sudirginimą. Naudinga esant sausam ir šlapiam (produktyviam) kosuliui, ramina dirginimą, saugo gleivinę ir lengvina gleivių šalinimą. Tinka vaikams nuo 1 m. amžiaus.

VAIKAMS NUO PIRMŲJŲ GYVENIMO METŲ**-20%****10^{36€}**
12^{36€}**HUSTAGIL, balzamas, 30 ml****KOSMETIKOS PRIEMONĖ**

„Hustagil“ balzamas su čiobreliais, eukaliptų ir levandų eteriniais aliejais kvėpavimui palengvinti. Balzamas yra švelnios konsistencijos, lengvai paskirstomas ir įtrinamas į odą. „Hustagil“ švelniai veikia jautrią odą dėl jame esančio migdolų aliejaus, panthenolio ir vitamino E. Naudojimas: balzamu kelis kartus švelniai įtrinkite krūtine ir nugarą. Malonus eterinių aliejų kvapas atpalaiduoja kvėpavimą.

KVĖPAVIMUI PALENGVINTI!**-20%****SAMBUCUS KIDS**

sirupas, 120 ml **16²⁹ 13^{93€}**

60 guminukų **18²⁹ 15^{93€}**

MAISTO PAPILDAS, MAISTO PRODUKTAS

Juoduogiai šėvamedžiai, čiobreliai, salavijai padeda palaikyti kvėpavimo sistemos funkciją. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

AUSŲ SIERAI SUMINKŠTINTI IR IŠVALYTI**-15%****11^{86€}**
13^{86€}**VAXOL, ausų purškalkas 10 ml****MEDICINOS PRIEMONĖ**

„Vaxol“ – tai saugus ir veiksmingas būdas suminkštinti ir natūraliai išvalyti ausų sierą: sušvelnina, drėkina ir natūraliai šalina ausų sierą. Tinka vaikams nuo 1 metų, greitai ir lengvai naudojamas. Sumažina ausies praplovimo svirkio poreikį. Ypač patinama naudoti užsimanantiems vandens sportu, dažnai naudojančioms ausinukus, klausos aparatus, taip pat vyresnio amžiaus žmonėms.

AUSŲ PURŠKALKAS SU ALYVUOGIŲ ALIEJUMI

-20 %



HÜBNER ORIGINAL SILICEA

MAISTO PAPILDAL, MEDICINOS PRIEMONĖS

SILICEA gali padėti aprūpinti jūsų organizmą svarbiais elementais ir palaikyti jūsų grožį.

Silicis yra antras po deguonies labiausiai žemėje paplitęs elementas. Silicis – natūrali gamtinė medžiaga. Biotinas padeda palaikyti normalią odos ir plaukų būklę.

SILICEA LIP HERPES GEL, gelis nuo lūpų pūslelinės, 5 g

Natūrali veikioji medžiaga (mineralinis silicio dioksido gelis) itin gerai sutraukia ir džiovina pūsleles, taip greitindama jų gijimą.

SILICEA GASTROINTESTINAL GEL DIRECT 15 ml gėlio, 15 paketėlių

Didesnės silicio koncentracijos med. prekės (CE0297) padeda palengvinti virškinamojo trakto ir skrandžio negalavimus.

Periodiškas HÜBNER ORIGINAL SILICEA produktų vartojimas gali padėti rūpinantis jūsų grožiu ir sveikata

„SILICEA“ – IR GROŽIUI, IR SVEIKATAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-20 %



100 METŲ
Doppelherz
rūpinamės jūsų sveikata

DOPPELHERZ

MAISTO PAPILDAL

Maisto papildus „Doppelherz“ gamina viena farmacinių produktų gamintojų lyderių Vokietijoje „Queisser Pharma“, todėl produktai kuriami pasitelkiant naujausius technologinius ir gamybos laimėjimus bei laikantis tarptautinių kokybės standartų. Maisto papildai „Doppelherz“ yra vieni perkamiausių Lietuvoje ir jau daugiau kaip 20 metų garantuoja savo klientams gerą savijautą.

„DOPPELHERZ“ – DVIEJŲ ŠIRDŽIŲ JĖGA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

ŽARNYNO MIKROFLORA

-20 %



COMPLIFLORA

MAISTO PAPILDAL

„Compliflora Family“ ir „Compliflora Family“ – formulė „keturi viename“. Bakterijos, kolonizuojančios ir plonąjį, ir storąjį žarnyną. Didelė KSV (kolonijas sudaranti vienetų) dozė. Gamybos metodas: bakterijos atsparios skrandžio rūgštim, todėl gali saugiai pasiekti žarnyną ir ten kolonizuotis. Vartojimas: 1 kapsulė arba 1 paketėlis per dieną.

„Compliflora Baby Drops“ – formulė „du viename“. *Bifidobacterium lactis B501* ir *Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 5301* aliejinės formos kompleksas. Augalinės kilmės medžiagos suteikia malonų skonį, be to, nereikia specialiojo laikymo sąlygų. Vartojimas: kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – 5 lašai per dieną.

„Compliflora Femina“ – formulė „keturi viename“, ją sudaro 4 specialiai atrinktos *Lactobacillus* genties bakterijų atmainos, būdingos natūraliai, sveikai šlapimo ir lyties organų sistemos mikroflorai.

„Compliflora Immuno“ yra kompleksinis produktas, sukurtas siekiant palaikyti gerą imuninę organizmo būklę. 1 kapsuleje yra 4 milijardai mikrokapsulių pieno rūgšties bakterijų, cinko bei vitamino D. Vartojimas: 1 kapsulė per dieną.

„Compliflora Kids Gummy Bears“ – guminukai, kurių sudėtyje yra tindalizuotų pieno rūgšties bakterijų, natūraliai aptinkamų žmogaus virškinimo trakte, taip pat naudingo vitamino B6, niacino ir pantoteno rūgšties. Rekomenduojama paros dozė: vyresniems nei 3 m. vaikams ir suaugusiems – 2 guminukai.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



GROŽIUI, JAI



UŽ 1 CT

Perkant bet kurį ŽIEDĖ šampūną, plaukų kaukę - TIK UŽ 1 CT!

ŽIEDĖ

atkuriamasis šampūnas su migdolais ir kinrozėmis, 300 ml 10⁹⁹ €
drėkinamasis šampūnas su bergamotėmis ir medetkomis, 300 ml 10⁹⁹ €
atkuriamoji plaukų kaukė su arganų aliejumi ir ryžių ekstraktu, 200 ml 12⁹⁹ €

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Priemonės plaukams ir galvos odos priežiūrai

IKI -50%



PHARMACERIS

SEBOPURIN, šampūnas riebiems plaukams ir odai, linkusiai į sudirgimus, 250 ml 20⁹⁹ 10⁹⁹ € -50 %
SENSITONIN, šampūnas jautriai galvos odai, 250 ml 19⁹⁹ 13⁹⁹ € -30 %
PURIN SPECIAL, šampūnas pleiskanojančiai galvos odai, 250 ml 17⁹⁹ 9⁹⁹ € -45 %
KERATINEUM, šampūnas nusilpusiems plaukams, 250 ml 18⁹⁹ 12³⁴ € -35 %
STIMUPURIN, šampūnas slenkantiems plaukams, 250 ml 24⁹⁹ 11⁰⁰ € -50 %
„PHARMACERIS“. SVEIKOS ODOŠ ABĖCĖLĖ.

-40%



FORCAPIL

MAISTO PAPILDAI IR KOSMETIKOS PRIEMONĖS PLIAUKAMS

„Forcapil“ – tai pažangios plaukų ir nagų priežiūros priemonės iš Prancūzijos, jungiančios mokslą ir natūralių ingredientų galią. „Forcapil“ išskirtinumas – jų sudėtyje, kuriose derinami vitaminai, mineralai, augalų ekstraktai ir didelę dozę sieros turinčios aminorūgštys, kad jūsų plaukai taptų gražūs ir gyvybingi.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



UŽ 1 CT

Perkant GENTLE DAY pakuotę, vienkartinės nosinaitės - TIK UŽ 1 CT!



GENTLE DAY®

HIGIENOS PRIEMONĖS

„Gentle Day“ – produktai – moterims, kurios myli save, saugo savo sveikatą ir rūpinasi aplinka. Hipoalerginės „Gentle Day“ higienos prekės itin tinkamos, kurių oda linkusi sudirgti ar alergiška. Lietuviškas prekių ženklas „Gentle Day“ garantuoja aukštą produktų kokybę, yra draugiškas Jums ir gamtai. Produktai yra sertifikuoti „Oeko-Tex“ 100“, „Made for Helath“, VEGAN sertifikatais.

Moters higienai

IKI -30%



LADY ANION

HIGIENOS PRIEMONĖS

„Lady ANION“ higieniniai paketai ir įklotai su ekologiška medvilne ir anjonine juostele. Medvilnė sukuria komforto pojūtį, anjoninė juostelė kvapo kontrolei, laidos orui, švelnus paviršius išlieka sausas. Rekomenduojami ginekologų.

„Pantliner“ • (24 vnt. ir 48 vnt.) – ploni įklotai kasdieniniam naudojimui.
„Dayliner“ •• (16 vnt.) – įklotai su sparnelais gausioms išskyroms, negausioms menstruacijoms.
„Active“ ••• (15 vnt.) – ploni paketai idealiai tinka keliaujant, sportuojant, šokant ar menopauzės metu.
„Day Use“ •••• (10 vnt. ir 20 vnt.) – paketai dienai menstruacijų metu.
„Night Use“ ••••• (8 vnt.) – paketai naktiai menstruacijų metu.
„Post Partum“ ••••• (10 vnt.) – paketai po gimdymo arba esant itin gausioms menstruacijoms.

„LADY ANION“ – TAVO KASDIENIS PASIRINKIMAS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

Intymiai higienai

-30%



LACTACYD

PHARMA, intymios higienos prausiklis su prebiotikais, 250 ml 14⁹⁵ 10⁴⁷ €
CLASSIC, intymios higienos prausimosi losjonas kasdieniam naudojimui, 200 ml 44⁰⁸ 77⁶ €

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

LACTACYD PHARMA, intymios higienos prausiklis su PREBIOTIKAIS, 250 ml
LACTACYD CLASSIC, intymios higienos prausimosi losjonas, skirtas naudoti kasdien, 200 ml
„Lactacyd“ intymios higienos prausikliai, skirti kasdieniai intymijų zonų priežiūrai. Paprasta naudoti vonioje ar duše. Nuo pirmųjų mėnesinių iki menopauzės, „Lactacyd“ siūlo visą intymios higienos prausiklių asortimentą, kad kiekvieną dieną būtumėte žvali ir jautumėte patogumą.
„Lactacyd“ gaminiai turi tinkamą pH ir palaiko natūralų makšties rūgštingumą. Jie yra švelnūs, be muilo ir tinkami naudoti kasdien. Produktai yra su natūralia pieno rūgštimi, kuri skatina gerųjų bakterijų dauginimąsi jūsų intymiose vietose ir padeda išsaugoti natūralų makšties floros rūgštingumą.

IKI -50%



BELLA

HIGIENOS PRIEMONĖS

„Bella“ higieniniai paketai ir kasdieniai įklotai – ypač ploni, diskretiški, laidos orui, su kvapo kontrolės sistema. Vatos gaminiai – iš 100% medvilnės. UŽTIKINTA APSAUGA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

URIAGE

lūpų pieštukas, 4 g **12⁹⁹ €**
 BARIEDERM CICA, lūpų balzamas, 15 ml **10⁴⁹ €**
 XEMOSE, lūpų pieštukas, 4 g **10⁹⁹ €**
 PRURICED SOS, priemonė po įgėlimų, 15 ml **10⁹⁹ €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Lūpų pieštukai „Uriage“ skirti sausai, pažeistai, suskilinėusiai lūpų odai prižiūrėti. Drėkina, maitina, minkština, padeda palaikyti normalią lūpų odos būklę. **PRURICED SOS** priemonė po įgėlimų skirta odai raminti, niežėjimo pojūčius malšinti. Kūdikiams, vaikams, suaugusiesiems.



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMBIO

BIOTINAS, 90 kapsulių **19³⁸ €**
MAISTO PAPILDAS



1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra
pigesnė arba tokia pati
– NEMOKAMA!

URIAGE DEPIDERM

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

URIAGE DEPIDERM priemonių linija – tai puikius pasirinkimus odai, linkusiai į pigmentacijos pokyčius ar praradusiai skaidumą. Lengvos produktų tekstūros, tinka visų tipų odai.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



9⁹⁹ €

CAGYNOL, 300 mg, ovulė, 1 vnt.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Ovulė vietiniam makšties kandidozės gydymui. Kiekvienoje ovulėje yra 300 mg sertakonazolo nitrato. **Terapinės indikacijos.** Vietiniam makšties grybelinės Candida infekcijos gydymui. „Cagynol“ skirtas suaugusiems. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Dozavimas. Viena ovulė vakare prieš miegą, vienkartiniam vartojimui, įterpiama giliai į makštį, geriausia gulint. Gydymo trukmė – vienkartinė dozė. Didžiausia vienkartinė dozė yra viena ovulė (300 mg sertakonazolo). Jei klinikiniai požymiai išlieka, antroji ovulė vartojama 7 dienų intervalu. Vartojimo metodas. Vartoti į makštį. Vartojant šį vaistinį preparatą negalima naudoti tamponų ir intravaginalinių dušu. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas priešgrybeliniams imidazolo klasės vaistiniams preparatams arba bei kuriai pagalbinei medžiagai. Latėksio prezervatyvų arba diafragmų naudojimas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei kandidozė patvirtinta, reikia atidžiai ieškoti ekologinių veiksmų, kurie sudaro sąlygas ir skatina grybelinės infekcijos vystymąsi. Norint išvengti atkryčių, labai svarbu nustatyti ir eradikuoti infekciją bei atsivelti į ją skatinančius veiksniai. Patarina vienu metu gydyti visą grybelinės infekcijos židinį, pripažintą sukėlėją, partnerį. Nėštumas. Tyrimais su gyvūnais teratogeninis poveikis nenustatytas. Sertakonazolo vartojimas nėštumo metu turėtų būti svarstomas tik esant būtinybei. Teksto peržiūros data: 2022 m. gegužės 30 d. Reklamos parengimo data: 2025.08.11.

VIENOS OVULĖS SĖKMĖS ISTORIJA



14⁹⁹ €

LENOSTELLA, 1,5 mg, 1 tabletė

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 1,5 mg levonorgestrelis. **Terapinės indikacijos:** skubioji kontracepcija, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms po nesaugaus lytinio akto. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** 1 tabletė reikia išgerti kiek galima greičiau, geriausia per 12 valandų ir ne vėliau kaip per 72 valandas po nesaugaus lytinio akto. **Kontraindikacijos:** jautrumas levonorgestrelui arba pagalbineis medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** nevartoti, kol nebuvo pirmųjų mėnesinių. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6057. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2601069671. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

PADEDA IŠVENGTI NĖŠTUMO PO NESAUGAUS LYTINIO AKTO.

Odai ir plaukams



-20%

BEOTEBAL HAIR & SKIN COLLAGEN BOOSTER, 30 paketėlių 62⁹⁹ 50³⁹ €

MAISTO PAPILDAS

Augalinės kilmės prokolagenas su vitaminu C padeda palaikyti normalų kolageno, reikalingo normaliai odos funkcijai, susidarymą. Klinikiniai tyrimai įrodė efektyvumą: raukšlių sumažėjimas iki 22 % jau po 4 savaitių vartojimo. Į sudėtį įtrauktas patentuotas kompleksas „VeColla™“, kuriame yra 19 aminorūgščių, vitamino C, kitių žemųjų saknų ir azijinių centelių lapų ekstraktų. Dėl biomimetinių savybių jis yra suderinamas su natūraliu odos kolagenu. „VeColla™“ aprūpina organizmą 19 aminorūgščių, kurios yra būtinos I tipo kolageno gamybai žmogaus organizme. Dėl mažos molekulinės masės yra lengvai pasisavinamas. Produkto sudėtyje esantis biotinas padeda palaikyti normalią plaukų ir odos būklę, 100 % veganškas, be gyvūninės kilmės alergienų, be cukraus.

100% VEGANIŠKAS PROKOLAGENAS ODAI IR PLAUKAMS.




-30%

ISEREN CR30 tabletė 45⁹⁹ 11¹⁹ €

MAISTO PAPILDAS

Maisto papildas su gauruotosios sojos ekstraktu, kuriame gausu natūralių izoflavonų. **Vartojimas:** po vieną tabletę per dieną.



-25%

DRICLOR, rutulinis dezodorantas-antiperspirantas, 20 ml 49⁹⁹ 14⁹⁹ €

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

„Driclor“ antiperspirantas specialiai sukurtas apsaugoti nuo gausaus prakaitavimo. Jis sudaro gelio matricą, kuri, veikdama prakaito liauką, mažina ir ilgiamu sustabdo prakaitavimą.

PRIEMONĖS SLAUGAI

IKI -40 %

SENI

HIGIENOS PRIEMONĖS

SENI sauskelinės ir sauskelnės kelnaitės – orui laidžios, su kvapo kontrolės sistema. SENI apsauginiai paklotai – tai papildoma apsauga, kuri išsaugo švarią patalynę. SENI kosmetika odos priežiūrai – nuvalo, naikina kvapus, maitina ir apsaugo odą nuo dirgiklių. SENI urologiniai įklotai ypač greitai sugeria, komfortiški ir diskretiški.

*Sauskelnės negalioja nuolaida su kompensuojamųjų vaistų pasu.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



-30 %



LISTERINE

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Burnos skalavimo skysčiai LISTERINE padeda saugoti dantis nuo apnašų, palaiko gaivų burnos kvapą. Pasiekia vietas, kurių dantų šepetėlis negali pasiekti.

SU ŠEPETĖLIU TIK PUSĖ DARBO – NAUDOK IR „LISTERINE“

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-40 %



ODONTE

dantų šepetėlis su sidabru, minkštas, 1 vnt. 4⁹⁹ 2⁹⁹ €

dantų šepetėlis su auksu, minkštas, 1 vnt. 4⁹⁹ 2⁹⁹ €

burnos skalavimo skystis jautriems dantis, 500 ml 8⁹⁹ 5³⁹ €

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

1+1

Perkant vieną pakuotę, antra pigesnė arba tokia pati – NEMOKAMA!!



TEPE

DAILY, kasdieninė dantų pasta (mėtų skonio), 75 ml 6⁹⁵ €

DAILY BABY, dantų pasta vaikams, 0-6 metų (be skonio), 50 ml 6⁹⁵ €

DAILY KIDS, dantų pasta vaikams, 0-6 metų (mėtų skonio), 75 ml 6⁹⁵ €

PURE, dantų pasta jautriai-sausai burnai (mėtų skonio), 75 ml 10⁹⁵ €

PURE, dantų pasta jautriai-sausai burnai (be skonio), 75 ml 10⁹⁵ €

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„TePe“ dantų ir tarpdančių šepetėliai yra kasdienės dantų higienos pagrindas. „TePe“ siūlo didelį dantų ir tarpdančių šepetėlių pasirinkimą kasdieniai dantų priežiūrai ir turintiems specialiųjų poreikių. „TePe“ dantų pastos yra švelnios, su fluoru, neputojančios arba mažai putojančios. Skirtos kūdikiams nuo pirmo dantuko, vaikų piniams dantis, suaugusiems kasdienai ar turintiems sausą burnos gleivinę.

-20 %



PARODONTAX

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

PARODONTAX – dantų sveikatos specialistas. Padeda sumažinti dantenų kraujavimą ir stiprina dantenų, kad būtų išvengta dantų netekimo. Sveikos dantenos – sveikos šypsenos pagrindas. Rūpinkitės savo burnos sveikata kiekvieną dieną.

TARKITE SUDIE KRAUJUOJANČIOMS DANTENOMS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

IKI -30 %



ABENA


HIGIENOS PRIEMONĖS

Danijos gamintojo ABENA produktai, skirti šlapimo nelaikymui, yra aukščiausios kokybės, atitinkantys skandinaviskus standartus. Produktai itin gerai sugeria ir sulauko skydus bei „užrakina“ nemalonius kvapus su „Odour system“ sistema. Diskretiški, švelnūs ir orui pralaidūs, todėl tinka net ir jautriausiai odai bei užtikrina komfortą. Pagaminti nenaudojant jokio balinimo ir latekso, pažymėti NORDIC ECO LABEL ženklu, garantuojančiu tvarumą ir ekologiją.

AKTYVIOMS DIENOMS IR RAMIOMS NAKTIMS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-25 %



BLEND-A-DENT

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Fiksuojamasis dantų protezų kremas „Blend-a-dent“ – puikus pasirinkimas, jei nenorite galvoti apie savo protezus. Nesvarbu, ka darote ar valgate, galite pasitikėti savimi, nes dantų protezai savo vietoje laikosi tvirtai ir patogiai. „Blend-a-dent“ suteikia stiprią fiksaciją visą dieną, užtikrina komfortą, sukurdamas pagalvėlę tarp dantų bei dantų protezų, ir apsaugo nuo maisto dalelių patekimo po protezus. Galite atsipalaiduoti ir mėgautis gyvenimu nesivarždami.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMBIO KIDS
MULTIVITAMINAI VAIKAMS, 50 guminukų **16⁹⁹ €**
MAISTO PAPILDAS



-40%

AMBIO KIDS
VITAMINAS C, 60 guminukų **13⁸⁸ 8³³ €**
MAISTO PAPILDAS


7⁹⁹ €

PANADOL
24 mg/ml, geriamoji suspensija kūdikiams ir vaikams, 100 ml
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Paracetamolis
Terapinės indikacijos. Simptominis silpno ir vidutinio stiprumo skausmo mažinimas, trumpalaikis karščiavimo mažinimas vaikams nuo 1 mėnesio iki 12 metų. **Vartojimas.** Nėgalima vartoti dažniau kaip kas 4 val. arba daugiau kaip keturių dozių per 24 val. Dozavimą žr. pakuotės lapelyje. Vartoti per burną. **Kontraindikacijos.** Alergija paracetamoliiui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai.** Nevartoti kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio. Pastariktė su gydytoju, jei vaikas yra per mažo svorio ar nepakankamai maitinamas, serga sunkia inkstų ar kepenų liga, sunkia infekcine liga, vartoja kitų vaistų. Neviršyti nurodytos dozės. Sudėtyje yra maltitolio, sorbitolio, metilo, propilo parahidroksibenzoato ir natrio. Nevartoti, jei vaikas netoleruoja angliavandenių arba jam nustatytas retas genetinis sutrikimas gimtas fruktozės netoleravimas. Gali sukelti alerginių reakcijų, kurios gali būti uždeistos. Jei 1-3 mėn. kūdikiui karščiavimas tęsiasi ilgiau nei 24 val., kreipkitės į gydytoją. Jeigu per 3 dienas vyresnio nei 3 mėnesių kūdikio ar vaiko savijauta nepagerėja arba net pablogėja, kreipkitės į gydytoją. **Reklamos teksto parengimo data** 2024-10. Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi jų licenciją. ©2024 HALEON arba licencijos turėtojas.



-40%

HAPPY
HIGIENOS PRIEMONĖS
Vaikškos sauskelnės „Happy“ puikiai priglunda, greitai ir daug sugeria, užtikrina kūdikio judėjimo laisvę. Orui laidžios, su kvapo kontrolės sistema. Liniją papildoma apsauginiai vienkartiniai paklotai. Dėgnos servetėlės - be alkoholio, su įvairiais ekstraktais. Išsirinkite pagal poreikį.
HAPPY – SU MEILE JŪSŲ MAŽYLIUI!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



-20%

REDULEX KIDS, geriamasis tirpalas pilviui, 50 ml **9⁴⁸ 7⁹⁹ €**
MAISTO PAPILDAS
„Redulex Kids“ – skystas maisto papildas su augaliniais ekstraktais, skirtas vaikams. Paprastieji pankoliai padeda palaikyti normalią virškinimo sistemos veiklą ir normalią dujų pusiausvyrą virškinimo trakte. Vaistinės ramunės, pipirinės mėtės ir vaistinės melisos padeda palaikyti normalią virškinimo sistemos veiklą.

Nuo karščiavimo ir
skausmo

7⁹⁹ €

IBUPROM
40 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams, 100 ml
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 ml „ibuprom“ 40 mg/ml geriamosios suspensijos yra 40 mg ibuprofeno. **Indikacijos:** trumpalaikis silpno ir vidutinio skausmo mažinimas, karščiavimo mažinimas. „ibuprom“ skirtas 3 mėn. ir vyresniems kūdikiams ir vaikams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. 3-6 mėn. kūdikiams (> 5 kg) gerti po 1,25 ml 3 k. per parą, 6-12 mėn. kūdikiams (8-10 kg) – po 1,25 ml 3-4 k. per parą, 1-3 m. vaikams (10-15 kg) – po 2,5 ml 3 k. per parą, 3-6 m. vaikams (15-20 kg) – 3,75 ml 3 k. per parą, 6-9 m. vaikams (20-30 kg) – po 5 ml 3 k. per parą, 9-12 m. vaikams (30-40 kg) – po 7,5 ml 3 k. per parą. Nurodytą vaisto dozę reikia skirti maždaug kas 6-8 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofenui, kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU) ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitų NVNU vartojimas, kraujo krešėjimo sutrikimai, paskutinis nėštumo trimestras, tromboticopatija, sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas, praeityje buvusios padidėjusio jautrumo reakcijos (astma, rinitas, angioneurozinis pabrinkimas, dilgėlinė) vartojant kitą NVNU, įskaitant ir acetilsalicilo rūgšties darinius, esama ar buvusi pepsinė opa / hemoragija, buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu, kraujavimas į smegenis, virškinimo trakto ar kitos kraujavimas, sisteminė raudonoji vilkligė. **Specialūs įspėjimai:** senyviems pacientams, pacientams, turintiems inkstų, kepenų, žarnyno, virškinimo trakto problemų, pacientams, kuriems anksčiau buvo virškinimo trakto opa ar infarktas, sergantiems diabetu, sisteminė raudonoji vilkligė, širdies nepakankamumu, virškinimo trakto opa, hipertenzija, bronchų astma, rūkantiems pacientams, taip pat pacientams, kuriems padidėjęs cholesterolio kiekis, yra gimtas porfirino apykaitos sutrikimas, dehidracija, vartojantiems vaistus, galinčius padidinti opų ar kraujavimo pavojų, ibuprofeną reikia vartoti atsargiai. **Reklamos teksto parengimo data** 2024-12-12.
RENKUOSI „IBUPROM“. RENKUOSI LAISVĖ.

Nuo kosulio



-30%

THERATUS PRONATURAL, sirupas, 128 g **44⁹² 10⁴⁸ €**
MEDICINOS PRIEMONĖ
„Theratus ProNatural“ – tai medicinos prietaisas, kuris palengvina sausą ir drėgną kosulį, saugo viršutinį kvėpavimo takų gleivinę. **Indikacijos.** Sausam ir drėgnam kosuliui gydyti suaugusiems ir vaikams nuo 1 m. amžiaus. Tinka tiek ūmiam, tiek ir užsitęsiam kosuliui. **Vartojimas.** Vaikams nuo 1 iki 6 m.: 1 matavimo šaukštėlis 2 kartus per parą. Vyresniems nei 6 m. vaikams: 2 matavimo šaukštėliai 2 kartus per parą. Suaugusieji: 2 matavimo šaukštėliai 2-3 kartus per parą. Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi jų licenciją. ©2024 HALEON arba licencijos turėtojas.

IKI -40%



PREGNACARE
MAISTO PAPILDAS

„Pregnacare“ – maisto papildų linija, sukurta mitybai papildyti planuojant nėštumą, nėštumo bei žindymo laikotarpiams. „Pregnacare Him&Her“ – sukurta pastojimą planuojančiai porai. „Pregnacare“ – vitaminų ir mineralų kompleksas, rekomenduojamas nuo pirmo nėštumo mėnesio. „Pregnacare Plus“ papildyta omega-3 riebiųjų rūgštimis (DHR ir EPR). „Pregnacare Breast Feeding“ pritaikyta žindymo laikotarpiui, sudėtis papildyta kalciumu ir omega-3. „Pregnacare New Mum“ sukurta mamų kūdikiui ir energijai palaikyti.

TVIRTAI KŪDIKIO IR MAMYTĖS DRAUGYSTEI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

LAIMĖS VALANDOS

I -VI

iki 9 val. ir
14-15 val.*

VII

14-15 val.*

Perkant **3***
ir daugiau prekių

-30%

Perkant **2***
prekes

-25%

Perkant **1**
prekę

-20%



*Nuo 2026 m. gegužės 1 d. NORFOS vaistinėje akcijos LAIMĖS VALANDOS metu perkant 1 prekę taikoma 20 % nuolaida, perkant 2 prekes – 25 % nuolaida, vaistams – 20 % nuolaida, o įsigyjant 3 ir daugiau prekių – 30 % nuolaida, nereceptiniams vaistams – 25 %, receptiniams – 20 % nuolaida.

Taikomos momentinės 20 % dydžio nuolaidos receptiniams vaistams, 20 ar 25 % nuolaidos nereceptiniams vaistams, o kitoms prekėms – 20, 25 arba 30 % nuolaidos, atsižvelgiant į atitinkamo pirkimo metu įsigyjamų prekių bendrą kiekį.

Nuolaida taikoma perkant pilnas prekių pakuotes, kurių kiekvienos vertė arba priemoka ne mažesnė nei 1,50 euro. Prekės, perkamos su kompensuojamuoju receptu, įskaičiuojamos į įsigyjamų (perkamu) prekių krepšelį (kiekį), tačiau joms nuolaida netaikoma.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms (pvz., mėnesinio leidinio nuolaidos; prekėms, vaistinėse pažymėtoms geltonais kainoženkliais; akcinėms prekėms, kai nuolaida taikoma įsigyjant ne mažiau kaip 2 nurodytus produktus, ir kt.). Momentinės nuolaidos netaikomos perkant prekes su kompensuojamuoju receptu, mokant už skiepus, taip pat pradinio maitinimo pieno mišiniams, kartiniams (gaminamiems vaistinėje) ir vardinams vaistams, įsigyjant dovanų kuponus, prekių pakavimo maišelius. Momentinės nuolaidos netaikomos perkant www.gintarine.lt, net jei už prekes atsisikaitoma įs atsiimant vaistinėse. Nuolaidos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Informacija apie akcijas ir prekes, kurioms taikomos LAIMĖS VALANDŲ nuolaidos, teikiama kiekvienoje vaistinėje, el. paštu info@nvaistine.lt arba nemokamu tel. +370 800 10008. Visos nuolaidos galioja tik su PC NORFA lojalumo kortele.

Rytinės LAIMĖS VALANDOS vyksta nuo vaistinės atidarymo iki 9 val. ryto. Jei vaistinė pradeda dirbti 9 val. ar vėliau, rytinės LAIMĖS VALANDOS joje nevyksta.