

TOP SAUSIO PASIŪLYMAI



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMBIO NERVŲ SISTEMAI,
15 kramtomųjų tablečių **5⁴⁸ €**

**AMBIO PATIRIANTIEMS
ĮTAMPA**

mikstūra, 100ml **8⁴⁸ €**

20 kapsulių **7⁴⁸ €**

MAISTO PAPILDAI



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMBIO

Lakto-bifidobakterijų kompleksas

Extra, 20 kapsulių **8⁹⁸ €**

Lakto-bifidobakterijos su S.boulardi,

20 kapsulių **14⁴⁸ €**

MAISTO PAPILDAI



-40%

GASTROVAL

GASTROVAL, 15 kapsulių **4⁸⁵ 2⁹¹ €**

GASTROVAL FLUXUS rūgštingumui, 15 kapsulių **6⁸⁵ 3⁶³ €**

GASTROVAL FORTE, 12 kapsulių **5⁸⁵ 3⁵⁹ €**

GASTROVAL HEPAR FORMULA, 30 kapsulių **9⁸⁵ 5⁵³ €**

MAISTO PAPILDAI



1+1

Perkant vieną
pakuotę, antra
tokia pati arba
pigesnė –
NĖMOKAMAI!

GASTROVAL – jau 11 metų populiariausias* maisto papildas virškinimui Lietuvoje. Sudėtyje net 7 augaliniai fermentai ir ekstraktų derinys, kurio naudą lengva pajusti. **GASTROVAL FORTE** – stipresnis net 7 augalinių kilmės fermentų ir augalinių ekstraktų derinys virškinimui. Sudėtyje padidintas kiekis fermentų – kai reikia stipresnės pagalbos. **GASTROVAL FLUXUS** – inovacija su DGL saldymedžiu. Išmaniai palaiko skrandžio rūgštingumo pusiausvyrą dėka plačios sudėties augalų sėklų ir šaknų ekstraktai, magnis, virškinimo fermentai, bifido bei lakto bakterijos, inulinas. **GASTROVAL HEPAR FORMULA** – geresnio pasisavinimo augalinė formulė – rimtesnė kepenų apsauga nuo oksidacinės pažeidimo, kepenų ląstelių regeneracija, organizmo valymo funkcija, normalaus cholesterolio lygio palaikymas.

GASTROVAL – SUPRANTA, KO REIKIA VIRŠKINIMUI SKRANDŽIO RŪGŠTINGUMUI, KEPENŲ VEIKLAI.

Celofono gėrybomis tradiciškai vartojamas virškinimui palengvinti. Ūsagalių sėklų ekstraktas padeda palaikyti normalią skrandžio rūgštinę terpę. Dažinės ciberžolės padeda apsaugoti kepenis nuo oksidacinės pažeidimo, palaikyti normalų cholesterolio lygį kraujyje.

* - GASTROVAL yra populiariausias maisto papildas virškinimui Lietuvoje, remiantis SoftDent Pharma2000 LT duomenų baze, 2011-2022 m. pardavimai didmeninėmis kainomis ir pakuočių.



ATEROLIP® COMPLEX CAPS

MAISTO PAPILDAI

„AteroLip® complex caps“ sudėtyje esantis ciberžolės ekstraktas padeda palaikyti normalų cholesterolio kiekį kraujyje, širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą, taip pat normalizuoti kepenų lipidų kiekį. **Vartojimas:** rekomenduojama „AteroLip® complex caps“ paros dozė suaugusiems – 1 kapsulė per dieną.

*Akcija taikoma 1+1 skirtuku pažymėtomis prekėmis

-40%

VIZIK AKIŲ LAŠŲ LINIJA

VIZIK ALLERGY, 10 ml **15⁸⁵ 9⁵⁹ €**

VIZIK Lašai pavargusioms ir sausoms

akims, 10 ml **11⁸⁵ 7¹⁹ €**

VIZIK Lašai sudirgusioms ir

paraudusioms akims, 10 ml **12⁸⁵ 7³⁷ €**

MEDICINOS PRIEMONĖS



1⁹⁹ €

**PARACETAMOL
ZENTIVA 500 MG,**

20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekvienoje tabletėje yra 500 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos.** Trumpalaikiai simptomai lengvo ar vidutinio stiprumo skausmo ir (arba) karščiavimo malšinimas. Paracetamol Zentiva 500 mg tabletės skirtos suaugusiems, paaugliams ir 6 metų bei vyresniems vaikams, sveriantiems daugiau kaip 21 kg. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Reikia vartoti mažiausią veiksmingą dozę kiek galima trumpesni laiką. Didžiausios paros dozės viršyti negalima. Paracetamolis dozuojamas atsivėlgiant į kūno svorį ir amžių, paprastai skiriant vienkartinę 10-15 mg/kg kūno svorio dozę, neviršijant didžiausios paros dozės – 60 mg/kg kūno svorio. Tabletes reikia nuryti užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio, vartoti valgio metu arba nevalgius. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbine medžiagai. Sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas. Ūminis hepatitas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Paracetamol Zentiva nevartokite kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio. Vartojant didesnes nei rekomenduojama vaisto dozes, padidėja sunkaus kepenų pažeidimo pasireiškimo rizika. Vartodami šį vaistą negerkite alkoholinių gėrimų. **Reklamos teksto parengimo data:** 2022 m. gruodžio mėn. ID00056231

Be konservantų
ATIDARIUS BUTELIUKUS GALIMA NAUDOTI NET VIENERIUS METUS!



NUO **2⁹⁹** €



THROMBO ASS

THROMBO ASS 50 mg, 100 skrandyje neįsijaušiančių tablečių **2⁹⁹** €
THROMBO ASS 75 mg, 100 skrandyje neįsijaušiančių tablečių **3⁹⁹** €
THROMBO ASS 100 mg, 100 skrandyje neįsijaušiančių tablečių **4⁹⁹** €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: acetylsalicilo rūgštis. **Terapinės indikacijos:** miokardo infarkto rizikos mažinimas sergantiems krūtinės angina. Antrinė miokardo infarkto profilaktika. Trombozės profilaktika po vainikinių arterijų nuostovių operacijų. Antrinė praeinančiojo smegenų išemijos priepuolių (PSIP) ar insulto profilaktika. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti po 1 tabletę 1 kartą per dieną (patartama vakare). Skrandyje nėra tabletė reikiama nuryti nesukramtyti, užsigeriant pakankama skysčio kiekiu valgo metu arba tarp valymų tuo pačiu paros metu. Įprastinė paros dozė ilgalaikiam vartojimui yra 50–150 mg. Dalyti į dvi. „Thrombo ASS“ skrandyje neįsijaušiančios tabletės negalima, nes bus pažeista skrandyje neripielevė. Norint, kad tikty individualiam vartojimui, reikia rinktis atitinkamo stiprumo preparatą (50 mg, 75 mg ir 100 mg). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei salicilatams ir kitiems NVNU; bronchių spazmas; ūminė pepsinė opa; polinkis į kraujavimą, hemofilija; sunkūs inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; sunkūs, nepakankamai kontroliuojamas širdies nepakankamumas; nėštumas; vaikai ir paaugliai iki 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Atsargumo reikia laikyti šiais atvejais: sergant bronchine astma, šienlige, esant nosies gleivinės paburkimui ir esant kito pobūdžio alergijai; vartojant kartu su vaistais, mažinančiais kraujo krešumą; sergant hemofiline anemija; esant skrandžio ir žarnų sutrikimams; esant anamnezėje duomenims apie opslę ar kraujavimą iš virškinimo trakto; esant inkstų ligoms ir (arba) kepenų funkcijos sutrikimui; turintiems polinkį podagrai. Prieš numatytą operaciją 10 dienų acetylsalicilo rūgšties reikia nevartoti. Šio vaisto sudėtyje yra laktozės monohidratu, todėl vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas lėp laktozės stūgys arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pakuotė: 50 mg, 75 mg arba 100 mg; 100 skrandyje neįsijaušiančių tablečių. Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas: G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria. Paskutinė teksto peržiūros data: 2020-05-13.

NUO **3⁹⁹** €



IBUPROM EXPRESS

IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 10 minkštųjų kapsulių **3⁹⁹** €
IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 20 minkštųjų kapsulių **5⁹⁹** €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg. Indikacijos: skausmo (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimas mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems pacientams ir vyresniems nei 12 m. vaikams kaip trumpalaikis pagalbinis gydymas kas 4 val. geriami 1 kapsulė (negeriti daugiau kaip 3 kapsulės per parą). Kapsulių negalima kramtyti. Kapsulė reikiama užsigeriti stikline vandens. Kontraindikacijos: alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, praėtyje buvusios padidėjusio jautrumo reakcijos vartojant kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo, sunkūs kepenų, inkstų ar širdies funkcijos nepakankamumas, esama (ar praėtyje buvusio) pepsinė opa, buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, kraujavimas į smegenis, virškinimo trakto arba kitoks kraujavimas, sisteminė raudonoji vilkligė, paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai: specialiai atsargumo priemonių reikia, jeigu sutrikusi inkstų, kepenų, širdies ir virškinimo trakto veikla, vartojama kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo, sergama bronchine astma, alerginėmis ligomis ar sisteminė raudonoji vilkligė; senyviems žmonėms. Reklamos teksto parengimo data 2023-01-13.

YRA „IBUPROM“. NĖRA SKAUSMO.

MODERNI KAPSLĖ NUO RĖMENS

2⁹⁹ €



ESCADRA 20 mg

7 skrandyje neįsijaušiančios kapsulės

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga, stiprumas: ezomeprazolas, 20 mg. **Terapinės indikacijos:** vaistas skirtas suaugusiųjų gastroezofaginio refliksinio simptomo (pvz., rėmens ir skrandžio rūgšties reguliacijos) trumpalaikiam gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 kapsulė) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, kapsulę gali prireikti vartoti 2–3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaites. Simptomams išnykus, gydymą reikia nutraukti. Jeigu per 2 savaites nepertraukiamai gydymą simptomai neišnyksta, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Nėra linkimų „Escadra“ vartojimo rekomendacijai jaunesniui kaip 18 metų vaikų populiacijoje indikacijai, trumpalaikis gastroezofaginio refliksinio simptomo (pvz., rėmens ir rūgšties reguliacijos) gydymas. Kapsulių negalima kramtyti ar smulkinti. Kapsulės galima alidaryti ir kapsles išsiaišyti pusėje stiklinę negazuoto vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pakeičiems benzimidazolams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Ezomeprazolo negalima vartoti kartu su nelfinaviru. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pacientai reikia informuoti, kad kreiptis į gydytoją, jeigu jie patiria didelį kūno svorio mažėjimą dėl nežinomų priežasčių, pasikartojantį vėmimą, disfagiją, vėmimą krauju ir melėną, arba jeigu įtariama ar diagnozuojama skrandžio opa, būtina iširti, ar nėra piktųbinės ligos, nes gydymas ezomeprazolu gali palengvinti jos simptomus ir uždelsti diagnozės nustatymą; jeigu jie anksčiau sirgo skrandžio opa arba patyrė virškinimo trakto operaciją, jeigu jiems 4 savaites arba ilgiau buvo taikomas nepertraukiamas simpatinis nevirškinimo arba rėmens gydymas; jeigu jie serga gelta arba sunkia kepenų liga; jeigu jie yra vyresni kaip 55 metų ir turi naujų arba neseniai pakitusių simptomų. Pacientai, kurių pasikartojantis nevirškinimo ar rėmens simptomai ilgalaikiai, turi reguliariais intervalais lankytis pas savo gydytoją. Kaip ilgalaikio profilaktinio vaistinio preparato „Escadra“ pacientai neturi vartoti. Pacientai, kuriems reikia atlikti endoskopiją ar ureazės kvėpavimo testą, turi pasitarti su savo gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistinį preparatą. Ezomeprazolo skirti kartu su atazanaviru nerekomenduojama. Ezomeprazolo derinimas su klopidogreliu nepatvirtintas. Kiti PS arba H2 receptorių blokatoriai kartu su ezomeprazolu pacientams vartoti negalima. „Escadra“ sudėtyje yra sacharozės. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems yra fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stūgys. Reklamos teksto parengimo data 2023-12-12.

NUGAROS, SPRANDO SKAUSMAMS IR RADIKULITUI GYDYTI

5⁹⁹ €



KAPSIKAM® vaistinis šildomasis tepalas, 50 g

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 g tepalo yra 50 mg dimetilsulfoksido, 30 mg raceminio kamparo, 30 mg terpentino eterinio aliejaus, 20 mg benzilnitolino, 2 mg nonivamido. **Terapinės indikacijos:** vietinis raumenų ir sąnarių skausmo malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** ant skaudamos vietos, naudojant aplikatorių, užtepama 1–3 g tepalo 2–3 kartus per parą, atsivėlėjant 1 skausmo intensyvumui. Norint ilgiau išlaikyti šildantį tepalo poveikį, ant skaudamos vietos reikia užtepti šaltą. Didžiausia vienkartinė dozė – 3 g. Didžiausia paros dozė – 9 g. Po kiekvienos procedūros reikia nusiplauti rankas šaltu vandeniu su muilu. Vartoti ant odos. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Odos opos, žaizdos bei ligos, kai yra pažeistas odos paviršius. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Nerekomenduojama naudoti karštų procedūrų (girties, vonios ir kt.) prieš ar iš karto po Kapsikam pavartojimo. Kapsikam tepalo negalima tepti ant pažeistos odos, atvirų žaizdų, egzemos pažeistų vietai. **Vietinis rinkodaros teisės turėtojo atstovas:** AB „Grindeks“ filialas, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2023-10-06. **MANO JĖGA JUDEJIME!**

4⁹⁹ €



WINTROZEN

600 mg, 10 šnypščiosių tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Kiekvienoje šnypščiosioje tabletėje yra 600 mg acetilsalicilo rūgšties.

Terapinės indikacijos: „Wintrozen“ skirtas gleivinės skystinti ir atsislojęs lengvinti sergant persalimo sukeltu bronchitu, suaugusiems ir vyresniems kaip 14 metų paaugliams. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems ir vyresniems kaip 14 metų paaugliams: rekomenduojama dozė yra 1 tabletė (600 mg) 1 kartą per parą, vakare. Jūsų gydytojas gali pakeisti vartojimo dažnį ir dozę, neviršydamas 600 mg didžiausios paros dozės. „Wintrozen“ negali būti vartojamas ilgiau nei 5 dienas. **Vartojimo metodas.** 1 šnypščiosią tabletę išstiprinti stikline vandens. Paruoštą tirpalą reikia išgerti per kelias minutes. Rekomenduojama nemaišyti „Wintrozen“ su kitais vaistais. **Kontraindikacijos.** „Wintrozen“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija acetilsalicilui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Del didelio veikliosios medžiagos kiekio „Wintrozen“ negalima vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 14 metų paaugliams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Wintrozen“, jeigu: atsiranda naujų odos ir gleivinės pokyčių. Labai retai gauta pranešimų apie sunkių odos reakcijų, sergate uždegimine bronchiu liga, netoleruojate histaminą, yra ar anksčiau buvo skrandžio ar žarnyno problema, vadinamą skrandžio ar dvilypkibiršties žarnos opomis, ypač kai kartu su „Wintrozen“ vartojami kiti skrandžio gleivinę dirginantys vaistai. Jeigu jaučiate sėros kvapą, nesijaudinkite, nes tai yra acetilsalicilo savybė ir nereiškia, kad vaistas pakito.

Reklamos teksto parengimo data: 2022 m. gruodžio mėn. ID 000551327

NUO **3⁹⁹** €



ALIFLUSIN

ALIFLUSIN 500 mg/200 mg/4 mg šnypščiosios tabletės, 10 tablečių **3⁹⁹** €
ALIFLUSIN 500 mg/200 mg/4 mg šnypščiosios tabletės, 20 tablečių **6⁹⁹** €
ALIFLUSIN 500 mg/200 mg/4 mg šnypščiosios granulės, 10 paketėlių **4⁹⁹** €
ALIFLUSIN 500 mg/200 mg/4 mg šnypščiosios granulės, 20 paketėlių **7⁹⁹** €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

paracetamolis / askorbo rūgštis / chlorfenamino maleatas

„Aliflusin“ sudėtyje yra 3 veikliosios medžiagos: paracetamolis, turintis skausmą malšinantį ir karščiavimą mažinantį poveikį, chlorfenamino maleatas, mažinantis išsiskyrimą iš nosies, slopinantis čiaudėjimo refleksą ir akių ašarojimą, bei askorbo rūgštis, papildanti vitamino C trūkumą organizme. Vaistas skirtas trumpalaikiam gripo, persalimo ir į gripą panašios būklės simptomų, tokių kaip galvos skausmas, karščiavimas, ryklės (gerklės) skausmas, ypač lydimas slogos gydymui. Negalima vartoti kartu su kitais vaistais persalimui ir gripui gydyti. Vartojimas suaugusiems ir vyresniems kaip 15 metų paaugliams: rekomenduojama vienkartinė dozė yra 1 šnypščiosios tabletė arba 1 paketėlis šnypščiosių granulių (500 mg paracetamolio, 200 mg askorbo rūgšties ir 4 mg chlorfenamino maleato) iki 3 kartų per parą pagal poveikį, tarp dozių išlaikant bent 4 valandų tarpą. Negalima viršyti didžiausios paros dozės 3 šnypščiosių tablečių arba 3 paketėlių šnypščiosių granulių (1500 mg paracetamolio, 600 mg askorbo rūgšties ir 12 mg chlorfenamino maleato) per 24 valandas. Vartoti per burną. Nepasitarus su gydytoju šio vaisto negalima vartoti ilgiau kaip 3 dienas mažinant karščiavimą ir 5 dienas mažinant skausmą (vyresniems kaip 15 metų paaugliams – 3 dienas). Šį vaistą reikia vartoti, kai atsiranda skausmas ir karščiavimas. Jei jie pranyksta, vaisto vartojimą reikia nutraukti. Šnypščiąją tabletę arba paketėlį šnypščiosių granulių reikia išstiprinti stikline šilto vandens. Išgerti iškart po paruošimo. Gamintojo atstovas UAB „Natur Produkt Vilnius“, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius.

4⁹⁹ €



SEPTABENE

3 mg/1 mg, 16 kietųjų pastilių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Septabene“ dezinfekuoja burną ir ryklę bei lengvina ryklės uždegimo požymius: skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. Kietosios pastilės „Septabene“ vartojamos uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti: jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas; sergant dantenų uždegimu (gingivitu), ryklės uždegimu (faringitu) ir gerklų uždegimu (laringitu); prieš dantų traukimą ir po jo. **Dozavimas:** suaugusiems rekomenduojama paros dozė yra 3-4 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia ištirpinti burnoje kas 3-6 valandas. 6-12 m. vaikams rekomenduojama paros dozė yra 3 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia ištirpinti burnoje kas 3-6 valandas. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 m. vaikas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Septabene“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydymo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Sąveika su kitais vaistinėmis preparatais ir kitokia sąveika. „Septabene“ negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Kietųjų pastilių negalima vartoti kartu su pienu, nes jis silpnina cetilpiridinio chlorido antimikrobinį poveikį. Reklamos teksto parengimo data 2022 10 12.

TAVO GERKLE – TAVO JĖGA!

7⁹⁹ €



SEPTABENE 1,5 mg/5 mg/1 ml burnos gleivinės purškalo, 30 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Septabene dezinfekuoja burną ir ryklę bei lengvina ryklės uždegimo požymius: skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. Septabene vartojamas uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti.

- jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas;
- sergant dantenų uždegimu (gingivitu), ryklės uždegimu (faringitu) ir gerklų uždegimu (laringitu);
- prieš dantų traukimą ir po jo.

Dozavimas suaugusiems. Vienkartinė dozė yra suvartojama puršktuvo galvutę paspaudus vieną arba du kartus. Tokią dozę kartotina galima vartoti kas 2 valandas 3-5 kartus per parą. **6-12 metų vaikams.** Vienkartinė dozė yra suvartojama puršktuvo galvutę paspaudus vieną kartą. Tokią dozę kartotina galima vartoti kas 2 valandas 3-5 kartus per parą. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 metų vaikas. Septabene negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydymo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Septabene negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Vaistinio preparato negalima įkepti. Teksto peržiūros data: 2023 08 09.

TAVO GERKLE – TAVO JĖGA!

4⁹⁹ €



SEPTANAZAL 1 mg/50 mg/ml

nosies purškalo (tirpalas), 10 ml

Suaugusiems

Ksilometazolino hidrochloridas / Dekspantenolis

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Septanazal nuo 6 metų amžiaus vartojamas:

- nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) bei gleivinės pažeidimo gijimui skatinti;
- nealerginiam nosies gleivinės uždegimui (vazomotoriniam rinitui) lengvinti;
- kvėpavimo pro nosį pasunkėjimui po nosies operacijos šalinti.

Rekomenduojama dozė 6 metų bei vyresniems vaikams yra po vieną įpurškimą į kiekvieną šnervę iki 3 kartų per parą. **Kontraindikacijos.** Septanazal suaugusiems vartoti negalima, jeigu yra alergija ksilometazolino hidrochloridui, dekspantenoliui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu Jums arba Jūsų vaikui yra sausasis nosies gleivinės uždegimas ir atsiranda šašų (sausasis rinitas), jeigu Jums arba Jūsų vaikui buvo chirurginiu būdu pašalinta posneginė 1 lauka arba buvo atlikta kita operacija, susijusi su smegenų dangalais. **Specialūs įspėjimai.** Septanazal galima vartoti tik atidžiai įvertinus rizikos ir naudos santykį, jeigu: pacientas yra gydomas monoaminoksidazės inhibitoriais (MAOI) ar kitokiais kraujospūdį didinančiais vaistinėmis preparatais, yra padidėjęs akispūdis (ypač jei sergama uždarą kampo glaukoma), pacientas serga sunkia širdies ir kraujagyslių liga, yra feochromodoma, yra metabolinių sutrikimų, yra porfrija, yra prostatos hiperplazija. Teksto peržiūros data: 2023 11 20.

ATKĖMŠA UŽGULUSIĄ NOSĮ IR ŠVELNIAI GYDO IŠSAUSĘJUSIĄ NOSIES GLEIVINĘ.

IKI -40%



„MÖLLER'S“ ŽUVŲ TAUKAI IR OMEGA-3 KAPSULĖS

MAISTO PAPILDAI

„Möller's" – tai šimtmečiais puoselėjami žuvų taukai visai šeimai. „Möller's" žuvų taukų kapsulės išsiskiria kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyviu medžiagų deriniais. Tyri ir gerai išvalyti „Möller's" žuvų taukai puikiai tinka vartoti kasdien visai gyvenimui. Įvairaus skonio kramtomosios žuvėlės „Möller's Junior" yra omega-3 ir vitamino D – augančiam vaikų organizmui naudingų medžiagų.

TRADICINIS BŪDAS RŪPINTIS SAVIMI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

SŖNARIAMS

9⁹⁹ €



GLUCOSAMIN-RATIOPHARM

1,5 g milteliai geriamajam tirpalui, 20 paketėlių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Viename paketėlyje yra 1,5 g gliukozamino sulfato, tai atitinka 1,884 g gliukozamino sulfato natrio chlorido arba 1,178 g gliukozamino. **Indikacijos.** Lengvo ar vidutinio sunkumo kelio osteoartrito sukeltų simptomų lengvinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Paketėlio turinį ištirpinti stiklinėje vandens ir gerti vieną kartą per parą. Gliukozaminas netinka vartoti ūminio skausmo simptomų slopinimui. Simptomų palengvėjimas (ypač skausmo) gali pasireikšti tik po kelių savaičių, kartais ir dar ilgesnio, vartojimo. Jei simptomai nepalengvėja po 2-3 mėnesių vartojimo, reikia iš naujo spręsti, ar gydymą gliukozaminu tęsti toliau. Miltelius galima vartoti tiek valgio metu, tiek nevalgant. Gliukozaminą negalima vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas gliukozaminui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Gliukosamin-ratiopharm negalima skirti ligoniams, alergiškiems kiaušiniams vėžėjusiems, nes iš jų gausama preparato veiklioji medžiaga. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei pacientui yra sutrikusi gliukozės tolerancija, prieš skiriant gydymą ir vėliau periodiškai rekomenduojama stebėti gliukozės kiekį kraujyje ir, jei reikia, insulino poreikį. Jei pacientai turi širdies ir kraujagyslių ligų rizikos faktorių, rekomenduojama stebėti lipidų kiekį kraujyje ir, jei reikia, cholesterolio lygį. Jei pacientai turi hipercholesterolemijos atvejais. Buvo aprašytas atvejis, kai pradėjus gliukozamino terapiją, pablogėjo astmos simptomai. Gliukozaminą negalima vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams, nes neįtirtas vartojimo saugumas ir veiksmingumas. Atsargumas reikalingas, jei pacientui yra fenilketonurija. Šio vaistinio preparato paketėlyje yra 151 mg natrio, tai atitinka 8 % diėdžiausios P50 rekomenduojamos paros normos suaugusiems, kuri yra 2 g natrio. Dėl sudėtyje esančio sorbitolio šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems yra įgimtas fruktozės netoleravimas. Taip pat sorbitolis gali paveikti kilių kartų vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį prieinamumą. **Reklamos teksto parengimo data:** 2023 02 27. GLR-LI-00003

JUDEJIMUI BE SKAUSMO!

NUO PERŠALIMO

4⁹⁹ €



EUCABAL-BALSAM S, 40 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g kremo yra 100 mg eukaliptų eterinio aliejaus ir 30 mg paprastųjų nušų eterinio aliejaus. Indikacijos: negalavimų, atsiradusių sergant kvėpavimo organų ligomis, kurių metu būna klampus sekretas, lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartojamas ant odos: 2-3 kartus per parą ant krūtinės ir nugaros tepis suaugę žmonės ir vyresni kaip 12 m. paaugliai – 3-5 cm ilgio, 2-11 m. vaikai – 3-4 cm ilgio kremo juostele ir gerai įtrinti. 6-23 mėn. vaikams galima tepti tik ant nugaros: 2-3 kartus per parą 2-3 cm ilgio kremo juostele ir gerai įtrinti. Jaunesniems kaip 6 mėn. vaikams šio vaisto vartoti draudžiama. Įtrintas vietas būtina nedeisiant uždegti (ypač kodikiams ir maziems vaikams), pvz., marškinėliais. Būtina užtikrinti, kad po įtrynimo vaiko rankos nesiliestų prie vietų, kur buvo įtrinta kremo. Po kremo įtrynimo būtina gerai nusiplauti rankas, kad vaistinio preparato nepatektų ant veido (ypač akių). Garų inhaliavimas: suaugę žmonės ir vyresni kaip 12 m. paaugliai – 4-6 cm kremo juostele, 6-11 m. vaikai – 4 cm kremo juostele, 3-4 kartus per parą įmaišoma į 1-2 l karšto vandens, inhaliuojama garų. Vaistinio preparato vartojama tol, kol išnyksta simptomai. Dėl nuderėjimo rizikos vaikų inhaliavimo metu negalima palikti be priežiūros. Jaunesniems kaip 6 m. vaikams „Eucabal-Balsam S" kremo inhaliuoti draudžiama. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Odos pažeidimas, pvz., nudegimas ar sužalojimas. Bronchių spazmas. Kosulius. Krūpis. Reikšmingas kvėpavimo takų judrumo padidėjimas, pvz., balso klostų disfunkcija. **Specialūs įspėjimai:** negalima tepti ant akių, nosies ir veido sritys. „Eucabal-Balsam S" kremo negalima vartoti ant gleivinės.

[TRYNUMAMS IR INHALACIJOMS PERŠALUS!]

VENOMS

NUO **8⁹⁹** €



HESIO

HESIO 500 mg, 30 pėlėve dengtų tablečių **8⁹⁹** €

HESIO 500 mg, 60 pėlėve dengtų tablečių **16⁹⁹** €

HESIO 500 mg, 120 pėlėve dengtų tablečių **32⁹⁹** €

NERECIPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI Kiekvienoje tabletyje yra 500 mg mikronizuotų flavonoidų (atitinka 450 mg diosmino ir 50 mg kitų flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną). **Terapinės indikacijos.** Hedio skirtas suaugusiųjų lėtinio kojų venų nepakankamumo simptomams (kojų sunkumui, kojų patinimui, skausmui, naktiniam kojų mėšlungiui) lengvinti; paūmėjusio hemorojaus simptomams (skausmui, kraujavimui ir patinimui išangės srityje) lengvinti. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Lėtinis venų nepakankamumas. Rekomenduojama dozė suaugusiems yra dvi tabletės per parą 2 mėnesius: viena tabletė vidudienį ir viena tabletė vakare, valgio metu. Jei simptomai išlieka, gydymas gali būti tęsiamas dar 2 mėnesius. Jeigu po 6 savaitių Hedio vartojimo lėtinio venų nepakankamumo gydymui simptomai nepalengvėja arba pasunkėja, pasitarkite su gydytoju. Hemorojaus paūmėjimas. Pirmas 4 gydymo dienas rekomenduojama dozė suaugusiems yra 3 tabletės du kartus per parą (6 tablečių per parą). Kitas 3 dienas – 2 tabletės du kartus per parą (4 tablečių). Tabletės vartokite valgio metu. Jeigu vartojate Hedio paūmėjusio hemorojaus gydymui ir po 7 dienų simptomai nepalengvėja arba pasunkėja, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. **Kontraindikacijos.** Hedio vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vaikams ir paaugliams Hedio vartoti nerekomenduojama. **Reklamos teksto parengimo data:** 2022 m. gruodžio mėn. ID00056234

SKAUSMO IR/BEI KARŠČIAVIMO MALŠINIMUI

6⁹⁹ €



UPSARIN C 330 mg/200 mg,
20 šnypščiujų tablečių

NERECIPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos stiprumas: 330 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg askorbo rūgšties. **Indikacijos:** silpno arba vidutinio stiprumo skausmo malšinimas ir (arba) karščiavimo mažinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir 16 m. bei vyresniems paaugliams po 1-2 šnypščiasias tabletes, ne dažniau kaip kas 4 val., ne daugiau kaip 9 tabletes per parą. Senyviems pacientams po 1-2 šnypščiasias tabletes, bet ne daugiau kaip 6 tabletes per parą. Vartoti per burną. Prieš vartojimą ištrinti tabletes stiklinėje vandens ir nedelsiant išgerti. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija acetilsalicilo rūgščiai, askorbo rūgščiai, kitiems salicilatais arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu acetilsalicilo rūgšties, kiti salicilatai arba nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo anksčiau buvo sukėlę astmos (dusulio) priepuoli, jeigu sergate skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa/ligia, sunkia kepenų, inkstų ar širdies liga, paskutinius 4 nėštumo mėnesius, negalima vartoti daugiau kaip 100 mg per parą, jeigu inkstuose yra akmenų (negalima vartoti < 1 g vit. C / parą). Negalima vartoti kartu su metotretaksu, jeigu metotretaksu dozė viršija 20 mg per savaitę, arba jei acetilsalicilo rūgšties dozė yra priešūdeginė (>1g vienkartinė ir (arba) >5g paros) arba analgetinė / antipiretinė (>500 mg vienkartinė ir <5g paros), kartu su geriamaisiais antikoaguliantais, jeigu acetilsalicilo rūgšties dozė yra priešūdeginė arba analgetinė / antipiretinė, ir jeigu pacientui anksčiau yra buvę skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa, nerekomenduojama mažinti ir viršutinių infekcijų gydyti vaikams iki 16 metų. **Specialūs įspėjimai:** vartoti atsargiai jeigu ilgai ir dideliais dozėmis vartojant analgetikų skauda galva (tuomet galvos skausmo negalima malšinti dar didesniems šio dozėmis), anksčiau sirgote skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, skrandžio uždegimu arba buvo kraujavimas iš virškinimo trakto, sutrikusi Jūsų inkstų, kepenų arba širdies veikla, mėnesinės yra gausios, kraujavimas iš gimdos ne mėnesinių metu arba jeigu į gimdą įdėta spirale, esant G6PD trūkumui, sergate podagra arba anksčiau sirgote šlapimo takų akmenlige, esate servyvo anaižius arba Jums yra dehidratacija, jeigu Jūsų kūno svoris yra mažas. Nerekomenduojama vartoti sergant astma ar jei yra bėrimas (dilgėlinė), susijęs su nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo acetilsalicilo rūgštimi. Vartojimą reikia nutraukti vos pastebėjus odos išbėrimą, gleivinės žaizdų. Daugiau informacijos apie specialius įspėjimus žr. vaistinių preparatų charakteristikų santraukose. Reklamos teksto parengimo data 2023.03.01. PM-11-2023-3-783.

NUO SKAUSMO

5⁹⁹ €



PERSEN

PERSEN, 40 dengtų tablečių.

PERSEN FORTE, 20 kietųjų kapsulių.

NERECIPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas. **PERSEN** tabletyje yra 35 mg valerijonų šaknų sausiojo alkoholinio ekstrakto, 17,5 mg melisy lapų sausiojo ekstrakto, 17,5 mg pipirmėčių lapų sausiojo ekstrakto. **PERSEN FORTE** kapsulėje yra 87,5 mg valerijonų šaknų sausiojo alkoholinio ekstrakto, 17,5 mg melisy lapų sausiojo ekstrakto, 17,5 mg pipirmėčių lapų sausiojo ekstrakto. **Indikacijos.** Vartoti laikinos nedidelės nervinės įtampos mažinimui, pasunkėjusio užmigimo lengvinimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** **PERSEN:** Nervinės įtampos atveju reikia gerti po 3-4 PERSEN tab. 3 kartus per parą. Pasunkėjusio užmigimo atveju reikia gerti 3-4 PERSEN tab. 1 kartą per parą 1 val. prieš miegą. Tabletės reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai nuo valgymo laiko. **PERSEN FORTE:** Nervinės įtampos mažinimui reikia gerti po 2 PERSEN FORTE kaps. 2 kartus per parą. Pasunkėjusio užmigimo atveju reikia gerti 2 PERSEN FORTE kaps. 1 kartą per parą 1 val. prieš miegą. Kapsulės reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai nuo valgymo laiko. **PERSEN ir PERSEN FORTE** pradedama velti palaipsniui, kad gydymo veiksmingumas būtų optimalus, vaisto rekomenduojama gerti mažiausiai 14 dienų. Gydymo trukmė neribojama. **PERSEN ir PERSEN FORTE** nėra skirtas jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** **PERSEN** tablečių sudėtyje yra laktozės ir sacharozės. **PERSEN FORTE** kapsulių sudėtyje yra laktozės. Reklamos teksto parengimo data: 2022 m. gruodžio mėn. ID000557059

PERSEN - NURAMINK SAVO RŪPESĮ!

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis



NUO **2⁹⁹** €



FLAVAMED

FLAVAMED 30 mg, 20 tablečių **2⁹⁹** €

FLAVAMED 60 mg, 10 šnypščiujų tablečių **4⁹⁹** €

FLAVAMED 15 mg/5 ml, geriamasis tirpalas, 100 ml **3⁹⁹** €

FLAVAMED 30 mg/5 ml, geriamasis tirpalas, 100 ml **4⁴⁹** €

NERECIPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Flavamed 30 mg tabletes. Flavamed 60 mg šnypščiosias tabletes. Flavamed 30 mg/5 ml geriamasis tirpalas. Flavamed 15 mg/5 ml geriamasis tirpalas. **Terapinės indikacijos.** Flavamed vartojamas sergant plaučių ir bronchių ligomis, kai susidaro klampus gleivės. Suktyrina klampus gleivės ir jos gali lengviau pašalinti. **Vartojimo būdas.** Geriamasis tirpalas vartojamas po valgio naudojant matavimo šauktelį. Šnypščiosias tabletes ištrinamas stiklinėje vandens ir tirpalas geramas po valgio. 30 mg tabletes reikia nuryti nesukramtytas po valgio, užsigeriant pakankama skysčio kiekiu. Suaugusiems ir vaikams vyresniems kaip 12 metų po 30 mg ambrosolio hidroklorido 3 kartus per parą pirmąsias 2 ar 3 dienas, vėliau – po 30 mg ambrosolio hidroklorido 2 kartus per parą, 6-12 metų vaikams po 15 mg ambrosolio hidroklorido 2-3 kartus per parą, 2-5 metų vaikams po 7,5 mg 3 kartus per parą. Be gydytojo nurodymo ligiai kaip 4 - 5 dienas Flavamed vartoti negalima. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Flavamed 30 mg tablečių negalima vartoti vaikams iki 6 metų. Flavamed 60 mg šnypščiujų tablečių negalima vartoti vaikams iki 12 metų. Flavamed 30mg/5ml ir 15 mg/5ml geriamojo tirpalo negalima vartoti vaikams iki 2 metų. **Specialūs įspėjimai.** Atsargiai reikėtų vartoti pacientams sutrikus bronchių epitelio motorikai ir esant gausiai sekrecijai sutrikus inkstų funkcijai arba sergant sunkia kepenų liga, praėjusiu buvus pepsinė opa, esant histaminu netoleravimui. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Flavamed, jeigu jums praėjusie pastakė labai sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų (Stivenso-Džonsono sindromas ir Lajelo sindromas). Kiekvienam Flavamed 30 mg/5 ml geriamojo tirpalo matavimo šauktelį (5 ml geriamojo tirpalo) yra 1,75 g sorbitolio. Jeigu gydytojas jums yra sakęs, kad Jūs (ar Jūsų vaikas) netoleruojate kokių nors angliavandenių arba Jums (ar Jūsų vaikai) nustatytas retas genetinis sutrikimas gimtas fruktozės netoleravimas (FNI), kurio atveju organizmas negali suskaidyti fruktozės, prieš vartodami šio vaisto (ar prieš duodami Jūsų vaikui), pasakykite gydytoju. Kiekvienam šio vaisto - matavimo šauktelį (5 ml geriamojo tirpalo) yra 5,75 g benzenkarboksirūgšties. Kiekvienoje šio vaisto preparato šnypščiosioje tabletyje yra 29,29 mg sorbitolio ir 126,5 mg natrso. Šio vaisto preparato kiekvienoje šnypščiosioje tabletyje yra 0,78 mg benzilo alkoholio. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengva vidurių laisvinantį poveikį. Benzilo alkoholis gali sukelti alerginių reakcijų. Dėl susikaupimo ir toksinio poveikio rizikos (metabolinės acidozės) dideli kiekiai turi būti vartojami atsargiai ir tik tuo atveju, jeigu būtina, ypač neščioms ar žindančioms moterims, asmenims, kuriems yra kepenų arba inkstų pažeidimas. Galimos odos alerginės reakcijos. Atsiradus odos arba gleivinių naujų pūtimui, naktinai ambrosolio vartojimą. Vartoti labai atsargiai sunkius bronchių motoriką ir esant gausiai sekrecijai, Atsiradus astmos ar žindančioms moterims, asmenims, kuriems yra kepenų arba inkstų pažeidimas, didelių kiekių vartoti atsargiai. **Atstovs Lietuvoje:** UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, Vilnius LT-01363. Tel. +370 5 269 19 47, el. paštas LT@berlin-chemie.com LT_Fla_01_2023_VI_print Reklama paruošta 2023m. sausio mėn.

GERKLĖS UŽDEGIMUI GYDYTI

5⁹⁹ €



FURASOL 1 g, 5 paketėliai

NERECIPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma: „Furasol 100/900 mg“ gargalas (milteliai tirpalui). **Kokybinė ir kiekybinė sudėtis:** 1 mililiteliu paketylėje yra 100 mg furagino kalcio druskos ir 900 mg natrso chlorido. **Terapinės indikacijos:** vietinis infekcijos sukeltos burnos ertmės ir ryklės uždegimo gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 4 m. vaikams. Tirpalą reikia ruošti prieš pat vartojimą. Paketylėje esančius miltelius reikia ištrinti stiklinėje karšto virinto vandens ir šiltu tirpalu 2-3 kartus per dieną skalauti šiu burną arba gargaliuoti. Tirpalą reikia suvartoti iš karto. Jo laukyti negalima. Sergant burnos ertmės ligomis ir vengiant ryklės ligomis – gargaliuoti apie 20-30 sekundžių, po to tirpalą išspjauti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas furaginui, nitrofurano grupės junginiams. Pacientas yra jaunesnis negu 4 m. vaikas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** tirpalą burnai ir ryklėi skalauti reikia ruošti prieš pat vartojimą. Nesuvalytus vaisto likučius reikia išplinti. Savykta su kitais vaistinėmis preparatais ir kitokia savykta: jokios kliniškai reikšmingos savykos nepastebėta. Nėštumo ir žindymo laikotarpis: nežinoma, ar saugu vartoti šį preparatą nėštumo ir žindymo laikotarpiu, nes tokių tyrimų neatlikta. Todėl nėščiosios ar žindydėms jo vartoti nerekomenduojama. **Nepageidaujamas poveikis:** kiekvienoje organų sistemoje pasireiškiantis nepageidaujamas poveikis apibūdinamas taip: labai dažnas: ≥ 1/10, dažnas: nuo ≥ 1/100 iki < 1/10, nedėžnas: nuo ≥ 1/1000 iki < 1/100, retas: nuo ≥ 1/10000 iki < 1/1000, labai retas: < 1/10000, dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis). Odos ir poodinio audinio sutrikimai: labai reti. Alerginė reakcija. **Nereceptinis vaistinis preparatas. Registravimo liudijimo turėtojas ir gamintojas:** JSC „Olanfarm“, Rupnicų 5, LV-214 Olsaine, Latvija. **Vietinis registravimo liudijimo turėtojas:** UAB „Corpus Medica“, Suklėlių pr. 61, LT-49333 Kaunas, Lietuva. Teksto peržiūros data 2013-09-30. Reklamos teksto parengimo data 2020-01-10.

NUO RĖMENS

2⁹⁹ €



GASEC, 20 mg, 14 skrandyje neirijų kietųjų kapsulių

NERECIPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: vienoje „Gasec 20 mg“ skrandyje neirijoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo. Terapinės indikacijos: suaugusiųjų gastroezofaginio refliksio simptomų (pvz., rėmens, skrandžio rūgšties atpylimo) trumpalaikis gydymas. Vartojimas: rekomenduojama dozė suaugusiems – viena „Gasec 20 mg“ kietoji kapsulė 1 kartą per parą, 14 parų. „Gasec“ rekomenduojama vartoti ryte, nevalgius, nuryti nepažeistas, užsigeriant šiek tiek vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, „Gasec“ negalima vartoti kartu su neflinavimu. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „Gasec“ gali maskuoti kitų ligų simptomus, todėl, atsiradus naujų simptomų, atidžiai perskaitykite pakutes lapelį ir pasitarkite su gydytoju. „Gasec“ sudėtyje yra sacharozės. **„GASEC“ – GREITĖSIS SKRANDŽIO GAISRINĖ!**

Flavamed®

Ambroksolio hidrochloridas

Sprendimas šlapio kosulio gydymui

- Vartojamas sergant ūmiomis ar lėtinėmis plaučių ir bronchų ligomis, kai kosulio metu susidaro klampios gleivės.
- Suskystina klampias gleives ir jos gali lengviau kosulio metu pašalinti.
- Aviečių skonio.



Nereceptinis vaistas. Flavamed 30 mg/5 ml geriamasis tirpalas. Kiekviename matavimo šaukšte su 5 ml geriamojo tirpalo yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido. **Flavamed 15 mg/5 ml geriamasis tirpalas.** Kiekviename matavimo šaukšte su 5 ml geriamojo tirpalo yra 15 mg ambroksolio hidrochlorido. **Terapinės indikacijos.** Flavamed vartojamas sergant plaučių ir bronchų ligomis, kai susidaro klampios gleivės. Suskystina klampias gleives ir jos gali lengviau pašalinti. **Vartojimo būdas.** Geriamasis tirpalas vartojamas po valgio naudojant matavimo šaukštą. 6–12 metų vaikams po 15 mg ambroksolio hidrochlorido 2–3 kartus per parą, 2–5 metų vaikams po 7,5 mg 3 kartus per parą. Be gydytojo nurodymo ilgiau kaip 4–5 dienas Flavamed vartoti negalima. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams po 30 mg 3 kartus per parą pirmąsias 2 ar 3 dienas; vėliau — po 30 mg 2 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Flavamed 30mg/5ml ir 15 mg/5ml geriamojo tirpalo negalima vartoti vaikams iki 2 metų. **Specialūs įspėjimai.** Atsargiai reikėtų vartoti pacientams sutrikus bronchų epitelio motorikai ir esant gausiai sekrecijai; sutrikus inkstų funkcijai arba sergant sunkia kepenų liga; praeityje buvus pepsine opa; esant histamino netoleravimui. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Flavamed šnypščiasias tabletes, jeigu jums praeityje pasitaikė labai sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų (Stivenso-Džonsono sindromas ir Lajelio sindromas). Kiekviename šio vaisto matavimo šaukšte (5 ml geriamojo tirpalo) yra 1,75 g sorbitolio. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad Jūs (ar Jūsų vaikas) netoleruojate kokių nors angliavandenių arba Jums (ar Jūsų vaikui) nustatytas retas genetinis sutrikimas įgimtas fruktozės netoleravimas (IFN), kurio atveju organizmas negali suskaidyti fruktozės, prieš vartodami šio vaisto (ar prieš duodami jo Jūsų vaikui), pasakykite gydytojui. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurių laisvinantį poveikį. Kiekviename šio vaisto – matavimo šaukšte (5 ml geriamojo tirpalo) yra 5,75 g benzenkarboksirūgšties.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie LR SAM el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, nurodytais jos interneto svetainėje www.vvkt.lt

Dolmen®

deksketoprofeno trometamolis

GREITAI MALŠINA
SKAUSMĄ,
KAI TO LABIAUSIAI REIKIA!



Geriamas
iš pakėtelio

**BERLIN-CHEMIE
MENARINI**

UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“
Jasinskio g. 16a, Vilnius LT-03163
Tel. +370 5 269 19 47
LT@berlin-chemie.com



SKAUSMINGŲ MĖNESINIŲ, RAUMENŲ IR KAULŲ, DANTŲ SKAUSMO MALŠINIMAS

Dolmen. **Nereceptinis vaistas. Veiklioji medžiaga.** Deksketoprofeno trometamolis (dexketoprofenum). Vienoje plevėle dengtoje tabletėje / granulių geriamajam tirpalui paketėlyje / geriamojo tirpalo paketėlyje yra 25 mg deksketoprofeno. **Vaisto forma.** Plevėle dengtos tabletės / granulės geriamajam tirpalui / geriamasis tirpalas paketėlyje. **Pakuotė.** Po 10 tablečių / po 10 paketėlių granulių / po 10 geriamųjų tirpalų paketėlyje. **Indikacijos.** Dolmen vartojamas trumpalaikiam simptominiams lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų, sąnarių ir kaulų skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorejos), dantų skausmui malšinti. **Dozavimas.** Atsižvelgiant į skausmo priežastis ir intensyvumą, rekomenduojama gerti: po 1 tabletę / paketėlį / geriamąjį tirpalą paketėlyje 1-3 kartus per parą kas 8 valandas. Didžiausia paros dozė neturi būti didesnė kaip 3 tabletės / paketėliai / geriamieji tirpalai paketėlyje. Jei esate senyvo amžiaus ar sergate inkstų, kepenų ligomis, pradėkite vartoti ne daugiau kaip 2 tabletes / paketėlius / geriamuosius tirpalus paketėlyje per parą. **Vartojimo būdas.** Jei vartojate granules, visą paketėlio turinį ištirpinkite stiklinėje vandens, suplakite. Išgerkite nedelsiant. Geriamasis tirpalas paketėlyje gali būti geriamas tiesiai iš paketėlio. Jeigu jaučiate intensyvų skausmą ir reikia jį greičiau nuslopinti, vaistą vartokite prieš valgymą (ne vėliau kaip prieš 15-30 min.). Poveikis prasideda po 30 min. pavartojus vaisto. Skausmą malšinantis poveikis trunka 4-6 valandas. Šio vaisto neturėtų vartoti vaikai ir paaugliai (jaunesni kaip 18 metų). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas deksketoprofenui, kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aspirinui; vartojant ketoprofeno ar fi bratų buvę fotoalerginės ar fototoksinės reakcijos; pepsinė opa, buvęs kraujavimas iš virškinamojo trakto, lėtiniai virškinimo sutrikimai bei lėtinės virškinamojo trakto ligos; sunkus širdies nepakankamumas, vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų funkcijos, sunkus kepenų veiklos sutrikimas; esant sunkiai dehidratacijai; nėštumas bei žindymo laikotarpis. **Įspėjimai.** Vaistą atsargiai turi vartoti vyresnio amžiaus ligoniniai, sergantieji alergija, astma, širdies, inkstų, kepenų ligomis, hipertenzija, sisteminė raudonąja vilklige, cukriniu diabetu, įvairiomis jungiamojo audinio ligomis, sutrikus kraujodarai; vartojant šlapimo išsiskyrimą skatinančius vaistus ar netekus daug skysčių. Pasitarkite su gydytoju jei vartojate kitų vaistų: geriamųjų steroidinių, nuo depresijos, apsaugančių nuo kraujo krešumo. Dolmen geriamojo tirpalo paketėlyje ir granulių geriamajam tirpalui paketėlyje yra sacharozė, todėl jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti Dolmen granules geriamajam tirpalui ar geriamąjį tirpalą paketėlyje. Į tai turėtų atsižvelgti pacientai, sergantys cukriniu diabetu. Deksketoprofenas gali paslėpti tokių infekcijų požymius kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl gali būti, kad vartojant šį vaistą gali būti vėluojama pradėti tinkamą gydymą, o dėl to gali padidėti komplikacijų rizika.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt

Reklama paruošta: 2021 m. birželio mėn.

LT_Dol_10_2021_V1_press

PERŠALIMUI

NUO 4⁹⁹ €



COLDREX HOTREM

COLDREX HOTREM LEMON 750 mg/10 mg/60 mg milteliai geriamajam tirpalui, 5 pak. 4⁹⁹ €
COLDREX HOTREM LEMON 750 mg/10 mg/60 mg milteliai geriamajam tirpalui, 10 pak. 7⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Terapinės indikacijos. Trumpalaikis peršalimo ir gripo simptomų (karščiavimo, slogos ir skausmo) lengvinimas. **Vartojimo būdas.** Vartoti per burną. Suberti vieno paketelio turinį į stiklinę, pripilti karšto vandens (maždaug 125 ml), gerai išmaišyti, kol milteliai ištirps. Pagal poreikį pripilti šalto vandens. **Dozavimas.** Suaugusiems (įskaitant senyvo amžiaus) ir 16 metų bei vyresniems paaugliams, kurių svoris didesnis nei 54 kg. Rekomenduojama dozė yra 1 paketelis kas 4-6 valandas, jei reikia. Nevartokite daugiau kaip 5 paketelių per parą. Nevartokite dažniau nei kas 4 valandas. Negalima viršyti nurodytų dozių. **Specialūs įspėjimai.** Pastartikite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti vaistą, jeigu padidėjusi prostata arba Jums sunku šlapintis; sergate kraujagyslių liga, vadinama Raynaud fenomenu; sergate inkstų liga; yra lėtinis mitybos nepakankamumas; reguliariai vartojate alkoholi; sergate Žilberto sindromu; vartojate kitų vaistų, kurie veikia kepenų funkciją; Jums trūksta fermento gliukozės 6-fosfato; sergate hemolizine anemija; yra dehidratacija; esate senyvo amžiaus, suaugęs ar paauglys, kurio kūno svoris mažesnis nei 54 kg; yra šlapimo susilaikymas ar šlapimo takų akmenys (negalima vartoti daugiau kaip 1 g vitamino C per parą); sergate astma arba Jums yra padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, pasireiškiantis bronchų spazmu; sergate sunkia infekcine liga, nes gali padidėti metabolinės acidozės rizika. Nevartokite kartu jokių kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio, ar vaistų nuo kosulio ar peršalimo, gripo ir nosies gleivinės paburkimo ar užguliosios nosies. Per didelės paracetamolio dozės gali sukelti sunkių kepenų pažeidimą. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu padidėjęs kraujo spaudimas; jeigu padidėjęs skydliaukės aktyvumas; jeigu sergate cukriniu diabetu; jeigu sergate širdies liga; jeigu sergate uždarą kampo glaukoma; jeigu sergate feochromocitoma; jeigu sergate kepenų ar sunkia inkstų liga; jeigu esate nėščia ar žindote kūdikį; jeigu vartojate vaistų, mažinančių nosies paburkimą, slopinančių apetitą, vaistų nuo peršalimo ar apėtią didinančių vaistų; jeigu vartojate tokius vaistus depresijai gydyti kaip trichilius antidepresantus, betablockatorius arba monaminooksidazės inhibitorius (MAOI) bei dvi savaites po MAOI vartojimo; jaunesniems kaip 16 metų vaikams ir paaugliams. **Reklamos teksto parengimo data:** 2022-08-01

2⁹⁹ €



AMBROLAN, 30 mg, 20 tablečių

Ambroksolio hidrochloridas

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tablete yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido. „Ambrolan“ yra labai veiksmingas vaistas, kurio veiklioji medžiaga ambroksolis yra bromheksino metabolitas. „Ambrolan“ mažina susikaupusių skreplių klampumą, gerina virpamojo epitelio aktyvumą ir taip skatina sekretų išsiskyrimą iš bronchų, skystina pernelyg klampius gleives ir palengvina jų išsiskyrimą, vartojamas sergantiems ūmine arba lėtine bronchų ir plaučių liga, kurios metu sutrinka sekretų išsiskyrimas ir šalinimas, kvėpavimo takų sekretų skystinti. **Vartojimas.** Suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams įprastinė dozė yra 1 tabletė tris kartus per parą. Vartojama po valgio, užsigeriant pakankamiu kiekiu skysčio. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Ambrolan“ vartoti negalima, jeigu yra: alergija ambroksoliui, skrandžio ir (arba) žarnyno opa; pirmuosius 3 mėnesius ir maitinant krūtimi; jaunesniems nei 12 metų vaikams. Kiekvienoje tablete yra 100 mg laktozės (pieno cukrus). Teksto peržiūros data 2016-08-29. Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas: „G.L. Pharma GmbH“, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria.

NUGALĖKITE KOSULĮ!

KRAUJOTAKAI IR ATMINČIAI

9⁹⁹ €



GINKOBIL 120 mg, 40 kietųjų kapsulių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos stiprumas: 1 kietojije kapsulėje yra 120 mg rafinuoto ir kiekybiškai įvertinto ginkmedžių lapų sausosios ekstrakto. Indikacijos: lengvo ir vidutinio smegenų kraujotakos nepakankamumo, pasireiškiančio susilpnėjusia atmintimi ir dėmesio koncentracija, spengimu ar ūzimu ausyse, sąvaigulių ar galvos skausmu, simptominiams gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: gerti po 1 kapsulę 2-3 kartus per dieną (atitinka 160-240 mg dienos dozės). **Kontraindikacijos:** vartoti negalima, jei yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Ginkobil“ medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** kadangi dviskiaučių ginkmedžių lapų ekstraktas poveikis depresinei nuotaikai ir galvos skausmui, neušijusiems su silpnąprotystės sindromu, kol kas nėra pakankamai ištyrta, medikamentu gydyti šiuos simptomus galima tik laikantis visų būtinų atsargumo priemonių. Teksto peržiūros data 2017-05-22 **VEIKSMINGAI GERINA SUTRIKUSIĄ KRAUJOTAKĄ!**

NUO 9⁹⁵ €



NICORETTE

Nicorette coolmint 1 mg/išpurškime burnos gleivinės purškalas (tirpalas), 150 išpurškimų 21⁹⁵ €

Nicorette invisipatch 10 mg/16 h (15 mg/16 h; 25 mg/16 h) transderminis pleistras, 7 transderminiai pleistrai 22⁹⁵ €

Nicorette freshfruit 2 mg (4 mg) vaistinė kramtomoji guma, 30 vienetų 9⁹⁵ €

Nicorette freshmint 2 mg (4 mg) vaistinė kramtomoji guma, 30 vienetų 9⁹⁵ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje gumoje yra 2 mg (4 mg) nikotino (žr. žemiau pavaičiavimą); viename pleistre yra 15,75 mg (25,62 mg; 39,37 mg) nikotino; kiekviename išpurškime (0,07 ml tirpalo) yra 1 mg nikotino. 1 ml tirpalo yra 13,6 mg nikotino. **Indikacijos:** vaistinė kramtomoji guma, transderminiai pleistrai: priklausomybės nuo tabako gydymui, lengvinant nutraukimo simptomus, kad būtų lengviau laikinai susilaikyti nuo rūkymo, o aspišperndus - mesti rūkyti; purškalas: priklausomybės nuo tabako gydymas, sumažinant potraukį nikotinui ir palengvinant nutraukimo simptomus, kurie atsiranda metant rūkyti staiga ar palaipsniui. Tikslas yra visam laikui nutraukti tabako vartojimą. Nicorette coolmint geriausia vartoti kartu su elgesio pakeitimo programa. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** paprastai pakanka kramtyti 8-12 tam tikro stiprumo vaistinių kramtomųjų gumų per dieną. Pleistrą reikia priklijuoti ant odos ryte, o vakare į naktį. Purškalo reikia išpurškėti 1-2 vaisto dozes tuo laiku, kai paprastai rūkoma, arba jeigu jaučiamas poreikis rūkyti. Galima vartoti iki 4 išpurškimų per valandą. Negalima puršksti daugiau kaip 2 išpurškimus 8 karto, per 24 valandas neviršyti 64 išpurškimų (4 purškimo per valandą, 16 valandų periodo). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas nikotinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Gumos negalima kramtyti vaikams iki 12 metų. Purškalo negalima vartoti jaunesniems kaip 18 m. pacientams, nerūkantiems pacientams. **Specialūs įspėjimai:** prieš vartodami nicorette, pastartikite su gydytoju, jeigu turėjote širdies infarkto, insultą, sergate nestabilia arba progresuojančia krūtinės angina, sunkiomis širdies aritmijomis, yra reikiantis hipertenzija. Pacientai, sergantys cukriniu diabetu, pradėję naudoti nikotiną pakeičiamąją terapiją, turi atidžiai sekti savo cukraus kiekį kraujyje. Galima rūkyti ir laukiamu gydymo nuda turėti apasirūdyti gydytoju, jeigu pacientai serga inkstų ir kepenų nepakankamumu, feochromocitoma ir reikiantis hipertenzija, vėsinimo traktų ligomis. Jeigu sergate žvyneline, lėtinu dermatitu ar dilgėline, nekvalifikuotie pleistrai ant pažeistos odos. Norint išvengti nudegimų rūkos, pleistrą reikia nuimti prieš atliekant magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą. Kramtomoji guma gali prikliuti prie dantų protezo ir jį sugadinti. Kramtomųjų gumų ir purškalo sudėtyje yra buhidriksolito, kuris gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivinę. Kramtomųjų gumų sudėtyje yra ksilitolio, kuris gali laisvinti vidurius. Reklamos teksto parengimo data: 2021-04-12, LT-N-2000003.

LENGVAM NERIMUI MALŠINTI IR MIEGUI PALENGVINTI

NUO 5⁹⁹ €



LILANDOR 80 MG, 14 minkštųjų kapsulių 5⁹⁹ €

LILANDOR 80 MG, 28 minkštųjų kapsulės 9⁹⁹ €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Lilandor 80 mg minkštųjų kapsulės, Lavandula angustifolia Miller, eterinis aliejus. Lilandor yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jeigu simptomai pablogėja šio vaisto vartojimo metu, pastartikite su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, vartoti nerekomenduojama, nes lavandų aliejaus sudėties medžiagos daugiausiai šalinamos iš organizmo perdirbant jas kepenyse. Kiekvienoje šio vaisto minkštąjoje kapsulėje yra apytikriai 12 mg sorbitolio. Dozavimas ir vartojimo metodas. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta pakuotės lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: viena minkštąji kapsulė vieną kartą per parą. Minkštąją kapsulę reikia nuryti nesukramtytą užsigeriant pakankamu kiekiu (geriausia stikline vandens). Jeigu simptomai išlieka po vaisto vartojimo dvi savaites, reikia kreiptis į gydytoją arba kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą. Paruošta 2023 m. sausio mėn. LT_Lil_04_2023_V1_print

LILANDOR - PASINERK Į RAMYBĘ!

1+1 Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



BIOCELL VEIDO KAUKĖS

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

BIOCELL pristato inovaciją - 2 in 1 retinolio veido kaukę ir vitamino C serumą - tai pažangi dviejų žingsnių veido odos priežiūra vakarui ir rytiui. 2 in 1 liposominis technologijos veido kaukės lakšto ir vitamino C serume esančios liposomos leidžia sudedamąsias dalis pernesti į giliosius odos sluoksnius ir užtikrinti intensyvią poveikį. Rezultatas - atsilaujusi, jaunatviškesnė, stangresnė, labiau švytinti oda. Išbandykite! **TUBOLA ESI TU. BIOCELL TAI IŠSAUGO.**

*Akcija taikoma 1+1 skirtuoms pažymėtoms prekėms.

1⁹⁹ €**IBUPROFEN LANNACHER**

400 mg, plėvelės dengtos tabletės, 10 tablečių

Vienoje plėvelės dengtoje tabletėje yra 400 mg ibuprofeno.

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**Indikacijos:** „Ibuprofen Lannacher“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos ibuprofeno. Ibuprofenas mažina uždegimo sukeltą skausmą, patinimą ir karščiavimą, vartojamas trumpą laiką silpno ar vidutinio stiprumo skausmui, tokiame kaip mėnesinių, galvos, dantų, raumenų, sąnarių, mialginių.**Dozavimas ir vartojimo būdas:** tabletės reikia nuryti valgio metu arba pavalyjus, užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: 0,5–1 plėvelės dengtą tabletę 3 kartus per parą. Negalima viršyti didžiausios paros dozės 1200 mg ibuprofeno (3 plėvelės dengtų tablečių).**Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofeni arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijos, vartojant kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo, acetalilsalicilo rūgšties darinius. Sunkus kepenų ir širdies funkcijos nepakankamumas. Paskutinių trijų nėštumo mėnesių laikotarpis. Pepsinė opa. Kraujavimas į smegenis, virškinimo traktą arba kt. Sisteminė raudonoji vilkligė. Jaunesni nei 12 m. vaikai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai skirti pacientams, sergantiems širdies ir kraujagyslių, smegenų kraujagyslių ligomis, cukriniu diabetu ir jungiamojo audinio ligomis, senyviems pacientams. Pacientams, sergantiems bronchine astma ar alerginėmis ligomis, gali išsivystyti bronchų spazmas. Virškinimo trakto sutrikimai ir lėtinis uždegiminis žarnyno ligos gali padėti. Atsiradus virškinimo trakto kraujavimui ar išopėjimui, gydymas turi būti nedelsiant nutrauktas. Vartojimas gali mažinti moters vaisiugumą. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Pakuotė:** 10 plėvelės dengtų tablečių. **Farmakoterapinė grupė:** nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo. **ATC kodas:** M01AE01. **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:** „Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.“, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. **Paskutinė teksto peržiūros data:** 2021-04-22.**NUSEMESK SKAUSMO KAUKĘ!****NUO PERŠALIMO**NUO 4⁹⁹ €**DALERON COLD3**DALERON COLD3, 12 plėvelės dengtų tablečių 4⁹⁹ €DALERON COLD3, 24 plėvelės dengtų tablečių 7⁹⁹ €**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**Vienoje plėvelės dengtoje tabletėje yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudofedrinio hidrochlorido ir 15 mg deksketorfanono hidrobrodimo. **Terapinės indikacijos.** Peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, sąnarių, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Įprasta dozė suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vaikams yra 2 tabletės. Tokia dozė galima gerti daugiausia 4 kartus per parą. Tarp dozių vartojimo turi būti praėjusios mažiausiai 4 valandos. Didžiausia paros dozė yra 8 tabletės. **Kontraindikacijos, specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Sunki hipertenzija ar išeminė širdies liga. Vartojama MAO inhibitorių, guanetidino arba jo darinių, beta blokatorių arba vartojama kitų vaistinių preparatų, kuriuose yra paracetamolio. Sunkus kepenų arba inkstų funkcijos sutrikimas. Kartu vartojama kitų kraujagyslių sutraukiančių vaistinių preparatų nosies gleivinės paburkimui mažinti, įskaitant vartojamus per burną ar į nosį. Anksčiau persirgęs miokardo infarktas, buvęs insultas arba šiuo metu esantis insulto rizikos faktorai. Sergama lėtiniu alkoholiu, glaukoma, feochromocitoma, sisteminė raudonoji vilkligė, cukrinis diabetas, hipertiroidizmas ar badaujama. Esant prostatos padidėjimui ar anksčiau buvo traukuliai. Reklamos teksto parengimo data: 2023 10 17.**PRADEDA VEIKTI JAU PER 20 MINUČIŲ!**6⁹⁹ €**PROSPAN**

PROSPAN 7 mg/ml sirupas, 100 ml

PROSPAN 65 mg šnypščiosios tabletės, N10

PROSPAN 26 mg kietosios pastilės, N20

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 ml sirupo yra 7 mg Hederæ helios L. folium (gebečių lapų) sausio ekstrakto (5–75:1); 1 šnypščioje tabletėje yra 65 mg Hederæ helios L. folium (gebečių lapų) sausio ekstrakto (5–75:1); 1 kietioje pastilėje yra 7 mg Hederæ helios L. folium (gebečių lapų) sausio ekstrakto (5–75:1). **Terapinės indikacijos:** ūminio bronchito sukeltos kosulio lengvinimas, atskleidimo gerinimas. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** Prospan 7 mg/ml sirupas: Prospan 7 mg/ml sirupas vartoti po 2,5 ml 2 kartus per dieną, 6–12 m. vaikams – po 5 ml 2 kartus per dieną, suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams – po 15 ml 3 kartus per dieną. Sirupui mažinti naudoti matavimo laurėlę, esančią pakuotėje. Prieš vartojimą buteliuką gerai supurtyti. Prospan 65 mg šnypščiosios tabletės: suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams vartoti po 1 šnypščiąją tabletę 2 kartus per parą, 4–12 m. vaikams – po pusę tablečių 3 kartus per parą, tabletės išs tirpinant vandenyje (apie 200 ml kiekio), jas galima tirpinti tiek karštime, tiek šaltame vandenyje. Prospan 26 mg kietosios pastilės: suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų paaugliams – 1 kietoji pastilė 4 kartus per parą; vaikams ir paaugliams nuo 6 iki 12 metų – 1 kietoji pastilė 2 kartus per parą. Vaistinis preparatas nes skirtas jaunesniems kaip 6 metų vaikams. Vartoti ant burnos gleivinės. Kietasias pastiles reikia suvalgyti. Vartoti po valgio. **Kontraindikacijos:** Prospan sirupo, šnypščiojų tablečių, kietųjų pastilių vartoti draudžiama, jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) gebečių lapų ekstraktui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** Prospan 7 mg/ml sirupo sudėtyje yra etanolio ir sorbitolio. Nerekomenduojama vartoti vaikams iki 1 metų amžiaus. Prospan 65 mg šnypščiojų tablečių sudėtyje yra natrio sorbitolio, makropolimerinio hidroksietilato ir laktozės. Nerekomenduojama vartoti vaikams iki 4 metų amžiaus. Prospan 26 mg kietųjų pastilių sudėtyje yra skystojo sorbitolio (neskandizuojamo) ir skystojo maltozės. Neskraktas vartoti jaunesniems nei 6 metų vaikams. Daugiau informacijos apie specialius įspėjimus žr. vaistinių preparatų charakteristikų santraukose. Reklamos teksto parengimo data: 2023-08-17, PM-17-2023-8-3020.**HERBION**HERBION, 16 kietųjų pastilių 4⁹⁹ €HERBION 7 mg/ml sirupas, 150 ml 3⁹⁹ €**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Kiekvienoje kietioje pastilėje yra 35 mg Hederæ helios L. folium (gebečių lapų) sausio ekstrakto (5–75:1). Augalinis vaistas, kurio vartojama atskleidimui lengvinti pasireiškus drėgnam kosuliui suaugusiems, paaugliams ir 6 metų bei vyresniems vaikams. Įprasta dozė 6–11 metų vaikams yra 1 kietoji pastilė du kartus per parą. Suaugusiems, senyviems žmonėms, 12 metų ir vyresniems paaugliams yra 1 kietoji pastilė tris kartus per parą. Jei yra kepvėgimo pasunkėjimas, karščiavimas ar atkosima pilnųjį skreplį, būtina padidinti su gydytoju arba vaistininku, jei simptomai po 7 vaisto vartojimo dienų nepalengvėja, būtina kreiptis į gydytoją. Gydymo šiuo vaistu metu be gydytojo leidimo vartoti kosulį slopinančių vaistų (vaistų nuo kosulio, tokių kaip kodeinas ar deksketorfanas) nerekomenduojama. Jeigu yra skrandžio sutrikimų (gastritas ar skrandžio opa), vaisto reikia vartoti atsargiai. Reklamos teksto parengimo data: 2022-09-07.

Herbion 7 mg/ml sirupas, 1 ml sirupo yra 7 mg Hederæ helios L. folium (gebečių lapų) sausio ekstrakto (5–75:1). Herbion yra augalinis vaistinis preparatas, kurio vartojama atskleidimui lengvinti pasireiškus drėgnam kosuliui. **Suaugę žmonės, vaikai, 12 metų paaugliai ir vyresni.** Du kartus per parą gerti 5 ml sirupo (atitinka 10 105 mg gebečių lapų sausio ekstrakto paros dozės). **6–12 metų vaikai.** Du kartus per parą gerti 5 ml sirupo (atitinka 10 mg gebečių lapų sausio ekstrakto paros dozės). **2–5 metų vaikai.** Du kartus per parą gerti 2,5 ml sirupo (atitinka 5 mg gebečių lapų sausio ekstrakto paros dozės). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, kitiems Araliaceae (gebečių) šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Pacientas yra jaunesnis kaip 2 metų vaikas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** 2–4 metų vaikų naudoti ar paskartojant kosulį galima pradėti gydyti tik nustatęs tikslinę diagnozę. Jei pasireiškia dispnėja, karščiavimas arba atkosima pilnųjį skreplį, pacientas privalo pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Gydymo Herbion metu be gydytojo leidimo vartoti kosulį slopinančių preparatų, tokių kaip kodeinas ar deksketorfanas, nerekomenduojama. **Reklamos teksto parengimo data:** 2022-03-21.**NUO RĖMENS**2⁹⁹ €**PANZILAN® 20 mg, 14 skrandyje neiurių tablečių****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**Pantoprazolas. Vienoje tabletėje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidrato pavidalu). **Indikacijos.** „Panzilan“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos pantoprazolo, kuri blokuoja skrandžio rūgšties gamtinį „siurbimą“, todėl skrandyje sumažėja rūgšties kiekis. „Panzilan“ vartojamas trumpalaikiam gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens, rūgščių atpylimo) suaugusiems pacientams gydymui. Refliuksas yra rūgščių iš skrandžio atgalinis patekimas į stemplę, kurioje gali prasidėti uždegimas ir sukelti skausmą. Dėl to gali atsirasti tokių simptomų, kaip skausmingas deginimo pojūtis krūtineje kylantis iki ryklės (rėmuo) ir rūgšties skonis burnoje (rūgšties atpylimas). **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Gerti po 1 tabletę per parą prieš valgių tuščiu skrandžiu 3–5 dienas iš eilės, užsigeriant vandeniu. Tabletės reikia nuryti, negalima kramtyti ar laužyti. Neviršykite rekomenduojamos 20 mg pantoprazolo dozės per parą. **Nutraukite „Panzilan“ vartojimą,** kai visi pranyks ligos simptomai. Nepasitarus su gydytoju vartoti „Panzilan“ ilgiau kaip 4 savaites negalima. **Kontraindikacijos.** Jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) pantoprazolui, sojų lecitinui arba bet kuriai pagalbinei „Panzilan“ medžiagai; kartu vartojami vaistai, kurių sudėtyje yra atazanavirio; antrius iki 18 metų; nėštumas arba kūdikio žindymas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu dėl rėmens arba virškinimo sutrikimo gydotes ilgiau kaip 4 savaites; esant vyresniems kaip 55 metų ir kasdien vartojant nереceptinius vaistus dėl sutrikusio virškinimo; atsirado naujų simptomų arba simptomai neseniai pasikėlė; anksčiau sirgo skrandžio opa arba buvo atlikta skrandžio operacija; sutrikusi kepenų veikla arba atsirado gelta; numatoma atlikti endoskopiją arba C-šlapalo mėginį. Jeigu numatyta atlikti kraujo mėginį, pasakykite gydytojui, kad vartojate šį vaistą. Atsiragino ir rėmens simptomai gali palengvėti pavartojus „Panzilan“ vos vieną dieną, tačiau šis vaistas neturi sukelti pagerėjimo nedelsiant. Jo negalima vartoti profilaktikai. Jei jums gydymoje sakė, kad netoleruojate kai kurių angliavandenių, prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su gydytoju. „Panzilan“ sudėtyje yra sojų lecitino. Jei esate alergiškas žemės riešutams ar sojai, vaisto vartoti negalima. **UŽGESINK GAISRĄ SKRANDYJE!**4⁹⁹ €**MILGAMMA N, 20 minkštųjų kapsulių****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**Kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 40 mg benfotamino (riebaluose tirpus vitamino B1 darinys), 90 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6) ir 250 mikrogramų cianokobalmino (vitamino B12). **Terapinės indikacijos.** B1, B6, B12 vitaminų trūkumo šalinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems žmonėms: po 1 kapsulę 3–4 kartus per parą. Kai liga lengva ir jei vaistinis preparatas padeda, per parą pakanka 1–2 kapsulių. Vartoti per burną. Kapsulę reikia praryti po valgio nesukramtyti, užsigeriti trupučiu skysčio. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, žemės riešutams, sojos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas sojos arba sojų pupelių produktams, pvz., lecitinui. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vartojama ilgiau negu 6 mėn. gali sukelti neuropatiją. **Sąveika su kitais vaistais: vaistiniai preparatai ir kitokia sąveika.** Gydymosiomis dozėmis vartojamas vitaminas B6 gali susilpninti levodopos poveikį. Be to, pastebėta sąveika su izoniazidu, D penicilaminu ir cikloserinu. **Nepageidaujamas poveikis.** Imuninės sistemos sutrikimai. Reti: alerginės reakcijos (odos išbėrimas, dilgėlinė). **Pakuotė.** 20 minkštųjų kapsulių. **Registruotojas.** „Worwag Pharma GmbH & Co. KG“, Vokietija. Teksto peržiūros data: 2021-10-18. **Nereceptinis vaistinis preparatas. Reklamos teksto parengimo data.** 2023-01-03.**„MILGAMMA“ – JUDEK LAISVAI!**

GAMINAME VAISTUS PAGAL INDIVIDUALIUS RECEPTUS

- Atneškite gydytojo receptą iki 13 val.
- Atsiimkite pagamintą vaistą kitą darbo dieną.



VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS



NORFOS VAISTINĖJE GALITE PASISKIEPYTI NUO



GRIPO

18⁹⁹ €

SKIEPO KAINA
be kortelės

19⁹⁹ €

PNEUMOKOKO

77⁰⁰ €

SKIEPO KAINA
be kortelės

84⁰⁰ €

Galima išankstinė registracija internetu www.nvaistine.lt/skiepai
Telefonu: **8 800 10 008**
Nuolaida taikoma su **PC NORFA** kortele.



1+1

Perkant vieną pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė – NEMOKAMAI!



LIVOL VITAMINAI

MAISTO PAPILDAI

Skandinaviški **LIVOL multivitaminai vyrams, moterims** sukurti remiantis holistiniu požiūriu į Jūsų organizmo sveikatą, todėl maksimaliai veiksmingi. Moterų, vyrų organizmai veikia skirtingai, tad skiriasi ir būtinų mikroelementų kiekiai bei santykiai. Maisto papildai LIVOL gaminami Danijoje nuo 1959 m. laikantis saugių dozių ir efektyvaus pasisavinimo su EC gamybos technologija principo. Pakuotės ekonomiškos – užtenka 2 mėnesiams. Vaikams skirtos **LIVOL EXTRA Colostrum** pastilės gerkliai ir imunitetui su priešpieno galia. Jose gausu antikūnų, su vitaminais C, D ir niacinu. Kiekvienas, kuris vartoja LIVOL, gali būti tikras, kad gauna tai, ko imunitetui labiausiai reikia.

LIVOL – NR.1 SKANDINAVIŠKI MULTIVITAMINAI LIETUVOJE!*

* Lietuvoje Nr.1 multivitaminų kat., vaistinėse 2022 01 – 2023 10 (Šaltinis: UAB „SoftDent“ duomenų bazė PharmaZOOM, duomenys pagal kiekį ir vertę).

* Akcija taikoma 1+1 skirtuku pažymėtoms prekėms

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



VITAMIN C PROLONG, 40 kapsulių **11⁴⁵ €**

VITAMIN C PRO FORTE, 30 kramtomųjų tablečių **11⁹⁹ €**

VITAMIN C PROLONG 1000, 14 paketėlių **21⁶⁹ €**

RUTIN FORTE+C, 30 kapsulių **10⁴⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

„**Vitamin C prolong**“ kapsulės, „**Vitamin C PRO forte**“ greitųjų skonio kramtomosios tabletės ir „**Vitamin C prolong 1000**“ miško uogų skonio milteliai, kuriose yra ir prailginto veikimo patentuoto vitamino Ester-C[®]. Moksliniai tyrimai rodo, kad patentuota Ester-C[®] forma organizme išlieka iki 24 valandų, nedirgina skrandžio, nėra toksiška kepenims, lėčiau pašalina iš organizmo. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, apsaugoti organizmą nuo oksidacinės pažeidimo bei sumažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. „**Rutin forte+C**“ – stiprūs kraujagyslės. Sudėtyje yra rutozido, vitamino C, cinko ir seleno.

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



VIRONOX JEGOMS ATSTATYTI+, 14 vnt. **33⁹⁹ €**

VIRONOX VEIKSMINGA APSAUGA, 10g **10⁰⁴ €**

VIRONOX STIPRUS IMUNITETAS+, 7 vnt. **19⁹⁹ €**

VIRONOX SMEGENŲ RUKAS, 14 vnt. **31⁴⁹ €**


MAISTO PAPILDAI

„**Vironox**“ epigenetinė linija, sukurta Šveicarijos ir Lietuvos mokslininkų. „**Stiprus imunitetas+**“ – greitas 7 dienų kursas organizmo apsaugai bei imunitetui. Vitaminas C, cinkas bei dygliuotųjų šaltalankių vaisių ekstraktas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Natūralus energijos šaltinis – „**Jegoms atstatyti+**“. Kininių ženšenio šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią organizmo gyvybingumą, vitaminas B6 – normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą bei mažinti nuovargį. Naujiena protinei veiklai – „**Smeegenų rukas**“. Rausvųjų rodiolių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją. Niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją bei nervų sistemos veiklą. Vartojimas: 1 paketėlis per dieną. Balzamas „**Veiksminga apsauga**“ su interferonu padeda suformuoti apsauginį barjerą.

„**VIRONOX**“ – NELEISK TAVĘS SUSTABDYTI!

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



SOLI-D, 20 kramtomųjų tablečių **7⁴⁰ €**

Maisto papildas

„**Soli-D**“ – puikaus ananasų skonio kramtomosios tabletės, kurių sudėtyje yra net 4000 TV vitamino D3! Būtent tokia vitamino D dozė per dieną yra efektyvi ir saugi. Tinka ir nešioms bei krūtimi maitinančioms moterims. Vitaminas D3 padeda palaikyti normalią dantų, kaulų būklę, taip pat normalią raumenų funkciją bei imuninės sistemos veiklą. Vartojimas: sukramtyti po 1 tabletę per dieną.

REIKALINGAS KAIP SAULĖ!

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!




AKTYVINTOJI ANGLIS, 100 tablečių **6⁰⁰ €**

MAISTO PAPILDAI

AKTYVINTOJI ANGLIS PADEDA SUMAŽINTI PER DIDELĮ DUJŲ KAUPIMĄSI PAVALGIUS.

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



ATEROLIP®

MAISTO PAPILDAI

„**Aterolip D**“ sudėtyje esantis cinamonas ir chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją. **Vartojimas:** rekomenduojama „**Aterolip D**“ paros dozė suaugusiems – 1 kapsulė per dieną. „**Aterolip Fiber**“ sudėtyje yra aviųžirnių baltymų, kurie išgaunami iš aviųžirnių bei vartojami su maistu padeda mažinti padidėjusią gliukozės koncentraciją kraujyje ir karto pavalius. Baiskšvieji gysočiai padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje. **Vartojimas:** paketėlio turinį išstipinti vandenyje ar sultyse, suaugusiems vartoti po 1 paketėlį 3 kartus per dieną 15–20 min. prieš valgį.

¹ Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant ne mažiau kaip 4 g baltymų iš aviųžirnių 30 g angliavandenių, esančių kiekviškai išreikštoje maisto produkto porcijos.

* Akcija taikoma 1+1 skirtuku pažymėtoms prekėms

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



HERBASTRESS®, 30 tablečių **13⁹⁹ €**

Dienai

MAISTO PAPILDAS

Standartizuotų augalų ekstraktų ir B grupės vitaminų derinys nervų sistemai.

Vartojimas: 1 tabletė per dieną.

KVĖPAVIMO SISTEMAI

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už VIENOS KAINĄ!



COSINUS NOSE AND SINUSES

purškalas, 60 ml **6¹⁹ €**

Purškalas drėkina nosies gleivinę dėl jo sudėtyje esančių aktyvių komponentų: **raudondumlių ekstrakto**, **krūminės perlitės sėklų ekstrakto**, **pipirmėčių aliejaus bei gelicirino**, taip pat padeda padidinti sekreto perteklių, pasizymi švelniu antibakteriniu poveikiu, padeda mažinti nosies užgulimą. Reguliarus vartojimas padeda išsaugoti sveiką nosies gleivinę, sinusus.

KIEKVIENAS RŪPESTIS GALI TURĖTI SAVO AUSĮ

Emocinės ir psichologinės pagalbos kontaktai



Sidabrinė linija

sidabrinelinija.lt

☎ 8 800 80020



I-V 8-22 val.
VI-VII 11-19 val.

SENJORAMS

Paramą teikia profesionalūs konsultantai, kalbasi savanoriai, kiti senoliai.

Jaunimo linija

jaunimolinija.lt

☎ 8 800 28888

I-VII visą parą

JAUNIMUI

Paramą teikia savanoriai.

Vaikų linija

vaikulinja.lt

☎ 116 111

I-VII 11-23 val.

VAIKAMS

Paramą teikia savanoriai.

Pagalbos vaikams linija

pagalbavaikams.lt

☎ 116 111

I-V 11-19 val.

VAIKAMS IR TĖVAMS PATIRIANTIEMS IŠŠŪKIŲ

Paramą teikia savanoriai.

Linija „Doverija“

☎ 8 800 77277

II-VI 16-20 val.

JAUNIMUI RUSŲ KALBA

Paramą teikia savanoriai moksleiviai.

Vilties linija

viltieslinija.lt

☎ 116 123

I-VII visą parą

SUAUGUSIEMS

Paramą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai.

Pagalbos moterims linija

pagalbosmoterimslinija.lt

☎ 8 800 66366

I-VII visą parą

MOTERIMS

Paramą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai.

Tėvų linija

tevulinija.lt

☎ 8 800 90012

I-V 9-13 val. ir
17-21 val.

TĖVAMS PATIRIANTIEMS IŠŠŪKIŲ

Paramą teikia profesionalūs psichologai.

Vyrų linija

vyrulinija.lt

☎ 8 670 00027

I-V 10-14 val.

VYRAMS

Paramą teikia savanoriai, psichologai, psichoterapeutai, priklausomybių konsultantas, teisininkas.

Pagalbos vyrams linija

„Nelik vienas“

nelikvienas.lt

☎ 8 604 11119

I-VII 18-21 val.

VYRAMS

Paramą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai.

Aktualią ir patikimą informaciją apie emocinę sveikatą bei šalyje prieinamą psichologinę pagalbą rasite

www.pagalbasau.lt

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!



AMBIO

Ambio Vitaminų B kompleksas Forte, 90 tablečių **13⁹⁸ €**

Ambio Nervų sistamai (mikstūra), 100ml **7⁴⁸ €**

MAISTO PAPILDAI

-30%

6^{99€}



AMBIO

Ambio Magnio citratas (milteliai geriamajam tirpalui ruošti), 30 paketėlių

Ambio Magnis (milteliai geriamajam tirpalui ruošti), 30 paketėlių

MAISTO PAPILDAI

-30%



SPORT & BASIC BIOMAGNIS + BIOKALIS, 14 pakelių **12⁵⁹ 8⁸¹ €**

SPORT & JOINTS BIOMAGNIS + BIOKALIS, 14 pakelių **13⁹⁹ 9⁷⁹ €**

BIOMAGNESIUM FORTE 500 MG, 20 pakelių **13⁵⁵ 9²¹ €**

MAISTO PAPILDAI

Maisto papildai milteliais geriamajam tirpalui ruošti. „Sport&Joints“ – elektrolitai su kalciumu ir gliukozaminu. Gliukozaminas yra sąnario kremzlės struktūrinė dalis. Kalcis reikalingas normaliai kaulų ir dantų būklei palaikyti. „Sport&Basic“ – šarminiai elektrolitai su vitaminu C! Elektrolitų tirpalai naudingi ne tik sportuojant ar fizinio krūvio metu, bet ir kasdien intensyviai dirbant, mokantis ar poilsiaujant. „bioMAGNESIUM forte“ – net 500 mg gryno magnio 1 paketyje. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą, palaikyti normalią energijos apykaitą ir raumenų funkciją. Produktų sudėtyje nėra konservantų, stabilizatorių ar dažiklių. Magnis išgaunamas iš Negyvosios jūros. Pagaminta Izraelyje!

NEPRARASK MINERALŲ – NEPRARASK ENERGIJOS!

-40%



SILDUS MIEGAS


Linija „Saldus miegas“ – dvejetainio poveikio, skirta padėti greičiau užmigti ir atsikelti pailsėjus. „Saldus miegas“ – net 7 aktyviųjų medžiagų kompleksas. Preparatė „Saldus miegas melatoninas“ yra 1 mg melatonino. „Saldus miegas eliksyras“ – malonaus karamėlių skonio, skystas maisto papildas. Sudėtyje yra GASR (gamma-amino sviesto rūgštis), 5-hidroksitriptofano (5-HTP) ir 1 mg melatonino, kuris padeda mažinti laiką, reikalingą norint užmigti, trukmę (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti). Taip pat melatoninas padeda mažinti subjektyvų laiko juostų skirtumų pajutimą (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant ne mažiau kaip 0,5 mg melatonino prieš einant miegoti pirmą kelionės dieną ir kelias dienas po atvykimo į kelionės tikslą vietą).

GERAM POILSIUI – SILDUS MIEGAS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-40%

4^{39€}



ACOSSEDUM+, 50 ml

MAISTO PAPILDAI

„Acosedum“ – skystas maisto papildas vandens pagrindu (be etanolio) jautriai nervų sistemai. Sudėtyje esantis vaistinio valerijono ekstraktas padeda palaikyti normalią psichologinę būseną bei atsparumą stresui. Normalią miego kokybę padeda palaikyti vaistinių ramunių ir tikrųjų levandų žiedų ekstraktai, o nervų sistemos veiklą – vitaminas B6. Tinka ir vaikams nuo 3 metų. Vartojimas: 3-6 metų vaikams po 5 lašus, 6-12 metų vaikams po 10 lašų, nuo 12 metų ir suaugusiems po 20 lašų 2 kartus per dieną.

-40%



MEMORIL FORTE, 30 kapsulių **12⁶⁹ 7⁶¹ €**

B TOTAL + MAGNE 60 kapsulių **12⁶⁹ 7⁵⁵ €**

MAGNIS + B6 COMPLEX, 30 kapsulių **11⁹⁹ 7¹⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

„Memoril forte“ – subalansuotas, 11 sudedamųjų dalių kompleksas atminčiai bei kraujotakai. Tinka tiems, kuriems sunku susikaupti bei nuolat ką nors pamiršantiems. Vienoje kapsulėje yra 80 mg ginkmedžių ekstrakto, kuris padeda palaikyti normalią atminties funkciją ir kraujotaką. Taip pat sudėtyje yra magnio, vitamino B, C, E, seleno ir folio rūgšties, kuri padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną. „B total + magne“ sudėtis praturtinta ir magniu, kuris padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją bei normalią raumenų funkciją ir padeda mažinti nuovargį. Pakuotėje yra 2 mėnesių kursas.

-30%



VALERIJONŲ EKSTRAKTAS 20 MG, 50 tablečių **2⁴⁹ 1⁷⁴ €**

VALERIJONAS FORTE, 50 tablečių **6⁹⁹ 4⁸⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

Vaistinis valerijonas padeda atsipalaiduoti, palaiko normalią miego funkciją.

-40%



TRIPTAN FORTE, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Triptan forte“ sudėtyje esantis 5-hidroksitriptofanas (5-HTP) yra natūrali medžiaga, gaunama iš Afrikoje augančių augalų – *Griffonia simplicifolia* – sėklų, kuri kartu su vitaminu B6 reikalinga serotonino – geros nuotaikos hormono – gamybai. Serotonino išsiskyrimas suteikia gerą nuotaiką ir energiją. Tai pat sudėtyje esantis vitaminas B1 ir B6 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą. Vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

TAI, KO REIKIA GYVENIMUI BE STRESO!



NUO SLOGOS

NUO **3⁹⁵** €

OLYNTH®

OLYNTH® HA, 0,5 mg/ml, nosies purškimas (tirpalas), 10 ml **6²⁵** €

OLYNTH® HA, 1 mg/ml, nosies purškimas (tirpalas), 10 ml **6²⁵** €

OLYNTH®, 1 mg/ml, nosies purškimas (tirpalas), 10 ml **5⁷⁵** €

OLYNTH®, 1 mg/ml, nosies lašai (tirpalas), 10 ml **3⁹⁵** €



NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 0,5 mg arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: trumpalaikis simptominių nosies gleivinės paburkimų lengvinimas, sergant rinitu ar sinusitu. „Olynth“ HA, 1 mg/ml ir „Olynth“, 1 mg/ml skiriamas vartoti suaugusiems, 12 m. ir vyresniems vaikams. „Olynth“ HA, 0,5 mg/ml skiriamas vartoti 2-12 m. vaikams. Vartojimo būdas ir dozavimas: purkšti po 1 įpurškimą arba lašinti po 1 lašą į kiekvieną nosies landą ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; padidėjęs akispūdis, ypač pacientams, sergantiems uždarą kampo glaukoma; sausasis arba vazomotorinis nosies gleivinės uždegimas; pacientai, kuriems atlikta transfenoidinė hipofizektomija; monoamino oksidazės inhibitorių vartojimas šiuo metu arba per pastarąsias 2 savaites; vaistų, galinčių padidinti kraujospūdį, vartojimas; pacientai, sergantys atrofiniu arba vazomotoriniu rinitu. Specialūs įspėjimai: jei gydytojo nepaskirta kitaip, negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Atsargiai vartoti pacientams, kurie jautriai reaguoja į simpatomimetikus, serga širdies ir kraujagyslių ligomis, hipertenzija, hipertiroze, cukriniu diabetu, esant prostatos hipertrofijai ar sergant feochromocitoma. Reklamos teksto parengimo data 2021-02-02. IT-01-2000006

GREITAS PALENGVĖJIMAS NOSIAI IR SINUSAMS.

SKAUDANČIAI GERKLĖ

9⁹⁹ €

POLOVOX

8,75 mg dozėje burnos gleivinės purškimas (tirpalas), 15 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: Vienoje dozėje (3 įpurškimuose) yra 8,75 mg flurbiprofeno. **Indikacijos:** skaudančios gerklės simptomų, tokių kaip gerklės skausmas, skausmingumas, sunkumas nuryti ir patinimas, trumpalaikiam malšinimui 18 metų ir vyresniems suaugusiems. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusieji nuo 18 metų ir vyresni: viena dozė (3 įpurškimai) į gerklę kas 3-6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 dozių per 24 valandas. Per įpurškimą neįkvėpti. Polovox skirtas vartoti tik trumpą laiką. **Kontraindikacijos.** Polovox vartoti negalima pacientams, kuriems: yra alergija (padidėjęs jautrumas) flurbiprofenui, ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aspirinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; anksčiau buvo pasireiškę alerginės reakcijos, pavojingos nesteroidinių vaistų nuo uždegimo ar aspirino; yra arba buvo du ar daugiau skrandžio opos arba kraujavimo arba žarnų opos atvejų; anksčiau po nesteroidinių vaistų nuo uždegimo vartojimo pasireiškė kraujų krešėjimo arba kraujavimo sutrikimų; jeigu yra sunkių širdies, inkstų ar kepenų sutrikimų; paskutiniai 3 mėnesiai. Šio vaisto negalima vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vartojant mažiausią veiksmingą vaistinio preparato dozę trumpiausią simptomų kontrolę būtina laiką, galima sumažinti nepageidaujamus poveikius. Pasitarti su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėjant vartoti Polovox: jeigu jau yra vartojamas bet kuris kitas nesteroidinis vaistas nuo uždegimo ar aspirinas; jei yra bakterinis tonzilių uždegimas; jeigu pacientas servy amžiaus; jeigu pacientas serga arba sirgo astma, sistetine raudonąja vilkige ar mėsra jungiamojo audinio liga; hipertenzija; žarnyno ligomis (opinis kolitas, Krono liga); jeigu yra širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų; pacientė nėščia pirmuosius 6 mėnesius arba maitina krūtimi. Reklamos teksto parengimo data - 2020 m. 07 mėn.



NUO SLOGOS

5³⁵ €

GALANAS 1 mg/50 mg/ml, nosies purškimas, 10 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido ir 50 mg deksantenolio. **Indikacijos:** „Galanas“ skirtas suaugusiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) ir kaip pagalbinę priemonę odos bei gleivinės pažeidimams gydyti, ne alerginės kilmės išskyros iš nosies (vazomotorinis rinitas) mažinti ir kvėpavimui per nosį palengvinti esant nosies užgulimui po nosies operacijos; nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu ir imunito prienosinių ančių uždegimu (sinusitu). Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams 1 purškalo tirpalo dozė į kiekvieną šnervę pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Dozavimas priklauso nuo individualaus paciento jautrumo ir klinikinio atsako. „Galanas“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas, nebent gydytojas nurodė kitaip. Dėl vaikų gydymo trukmės reikia pasikonsultuoti su gydytoju. **Kontraindikacijos:** šio vaistinio preparato vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas veiklioms ar pagalbinėms medžiagoms; jeigu yra sausasis nosies gleivinės uždegimas (rinitis sicca); po chirurginio posmegeninės liaukos pašalinimo per nosį (transfenoidinės hipofizektomijos) arba po kitų chirurginių intervencijų, pažeidžiančių smegenų dangalą; kūdikiams ir jaunesniems kaip 6 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** pasitarti su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėjant vartoti „Galanas“, jeigu esate gydymas monoamino oksidazės (MAO) inhibitoriais; jei yra padidėjęs akispūdis; jeigu sergate sunkia širdies ir kraujagyslių sistemos liga; jeigu yra antinksčių navikas; sergate cukriniu diabetu ar yra suaktyvėjusi skydliaukės veikla; jei yra padidėjusi prostata (prostatos hipertrofija). Reklamos teksto parengimo data 2021-08.

ATKĖMSA NOSĮ IR ATKURIA PAŽEISTĄ NOSIES GLEIVINĘ.



IMMUNACE

IMMUNACE su ežiulėmis, 30 tablečių **22⁸⁹ 14⁹⁴** € -35 %

IMMUNACE EXTRA, 30 tablečių **28⁸⁹ 19⁸⁰** € -30 %

MAISTO PAPILAI

„Immunace“ – subalansuotas ežiulių ir antioksidantų kompleksas. Ežiulės palaiko natūralią organizmo apsaugą. Antioksidantai – cinkas, selenas, vitaminas C ir kiti – padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. Geležis, folio rūgštis ir kitos medžiagos palaiko normalią imuninės sistemos veiklą. „Immunace Extra“ sudėtis papildyta inovatyviomis medžiagomis – resveratrolu, askantiniu, alfa-lipo rūgštimi, likopenu. Pakanka 1 tabletė per dieną.

„IMMUNACE“ – NĖMATOMAS IMUNITETO RŪBAS!



NOSIES GLEIVINĖS PABURKIMUI MAŽINTI

4⁴⁹ €

RHINO-STAS nosies purškimas, tirpalas, 10 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 ml nosies purškalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. **Indikacijos:** „Rhino-stas“ yra simpatikomimetikas. Purškimas siaurina kraujagysles, todėl mažina nosies gleivinės paburkimą. Vartojamas trumpalaikiam nosies gleivinės paburkimui mažinti, sergant sloga arba prienosinių ančių uždegimu (sinusitu). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 10 m. vaikams bei paaugliams reikia purkšti po 1 įpurškimą tirpalo „Rhino-stas“ į kiekvieną nosies landą 1-3 kartus per parą tada, kada reikia. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu yra sausasis nosies gleivinės uždegimas (sausasis rinitas); pacientams, kuriems pro nosį neseniai buvo atlikta smegenų operacija; jaunesniems kaip 10 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** „Rhino-stas“ galima vartoti tik atidžiai įvertinus jo vartojimo riziką ir galimą naudą šiais atvejais: pacientams, kurie vartoja ar vartoja vaistų nuo depresijos (monoamino oksidazės inhibitorių) arba kitų vaistų, kurie gali labai padidinti kraujospūdį; kai padidėjęs akispūdis, ypač sergant uždarą kampo glaukoma; sergant sunkia širdies ir kraujagyslių sistemos liga (pvz., vainikinių širdies arterijų liga, hipertenzija); sergant feochromocitoma (antinksčių naviku); sergant porfirija; sergant medžiagų apykaitos ligomis (pvz., hipertiroze, cukriniu diabetu). Pakuotės lapelio peržiūros data 2018-10-23. Reklamos teksto parengimo data 2020-02-03.

PURŠKALAS „RHINO-STAS“ – PIRMOJI PAGALBA SERGANT SLOGA AR SINUSITU!



-20%

HUMER

Humer – nosies higienos produktas, iš natūralių vaistinių medžiagų, ekspertas. Sprendimas kiekvienai užgulusiai nosiai.

„Humer“ naujienos kūdikiams ir vaikams

„Humer“ hipertenzinis jūros vanduo užsikimšusiai kūdikių ir vaikų nosyčiai – atkėmsa nosį ir padeda pašalinti gleives, pasireiškus peršalimui, sinusitui bei alerginiam rinitui nuo 3 mėnesių ir vyresniems kūdikiams bei vaikams.

„Humer Day / Night“ tabletės padeda palaikyti normalią nosies ir gerklės būklę visą parą, dėl sudėtyje esančio eukalipto ramina burnos gleivinę ir gerklę. „Humer“ – DAUGIAU NEI JŪROS VANDUO. „HUMER“ JUS IŠLAISVINA!

*Akcija taikoma geltona etiketė pažymėtomis prekėmis.



NUO KOSULIO

-20% **11^{59€}** ~~14⁴⁹~~

IVEX, 200 ml + 5 ml matavimo indelis

MEDICINOS PRIEMONĖ

Dėl sudėtyje esančių natūralių ekstraktų (gebenių (Hedera Helix) ekstraktas (DER 1-2:1), poliflorinis medus, vaistinių svilvorių (Althaea officinalis) ekstraktas, 1 %, vaistinių čiobrelų (Thymus vulgaris) ekstraktas, 0,3 %), kurių veiksmingumas įrodytas, suformuoja prie gleivinės prilipantį plėvelę, kuri ramina kosulį, saugo nuo dirginimo bei gerina viršutinių kvėpavimo takų funkciją. Tai ypač aktualu žiemą arba kai reikia gydyti išorinių veiksmų (šaltis, smogas, dulksės ir dūmai) sukeltą dirginimą. Naudinga esant sausam ir šlapiam (produktyviam) kosuliui, ramina dirginimą, saugo gleivinę ir lengvina gleivių šalinimą. Tinka vaikams nuo 1 metų amžiaus.



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!



AMBIO

Vitaminas C, 20 tirpiųjų tablečių **4⁹⁸ €**

Vitaminas C, 56 kramtomosios tabletės **8⁹⁸ €**

MAISTO PAPILDAI

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!



AMBIO GERKLEI

Gerklei Aviečių skonio, 20 tablečių **5⁴⁹ €**

Gerklei Citrinų skonio, 20 tablečių **5⁹⁸ €**

Gerklei Pipirmėčių skonio, 20 tablečių **5⁴⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

-35%



AMBIO

Liposominis Vitaminas C su kvercetinu, 30 kapsulių **16⁹⁸ 11⁰⁴ €**

Vitaminas C su citrusinių vaisių bioflavonoidais, 30 tablečių **6⁹⁸ 4⁵⁴ €**

MAISTO PAPILDAI

-40%

5⁰⁹ €
~~8⁴⁸~~



AMBIO GERKLEI SU ISLANDINE KERPENA SIRUPAS, 150ml

MAISTO PAPILDAS

-40%

6⁸⁹ €
~~11⁴⁸~~



AMBIO VITAMINAI C 1000 IR D SU CINKU, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

-30%

5¹⁰ €
~~7²⁸~~



AMBIO GERKLEI SU ISLANDINE KERPENA (purškalas), 20ml

MAISTO PAPILDAS

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!



AMBIO SINUREN COMPLEX, 120 ml **5⁹⁸ €**

MAISTO PAPILDAS

-30%



AMBIO

Ambio Broncho complex, 20 tablečių **5⁹⁸ 4¹⁹ €**

Ambio Hot herbal drink su islandine kerpene, 10 pakatelių **8⁹⁸ 6²⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

**AMBIO PAU
D'ARCO
ekstraktas, 50ml**
~~10⁴⁸ €~~


-50%

5²⁴ €


MAISTO PAPILDAS

**AMBIO
CHOLESTEROL
BALANCE
COMPLEX,
30 kapsulių**

1+1

13⁹⁸ €


MAISTO PAPILDAS

**AMBIO
MULTIVITAMINAI SU
ELEUTEROKOKU,
30 tablečių**
~~13⁴⁸ €~~

-40%

8⁰⁹ €


MAISTO PAPILDAS

**AMBIO
ŠAŅARIAMS SU
CIBERŽOLE,
30 tablečių**
~~11⁴⁹ €~~

-40%

6⁸⁹ €


MAISTO PAPILDAS

**AMBIO
GUDOBELĖ SU
ĀLYVMEDŽIU IR
ČESNAKU,
30 kapsulių**
~~9⁹⁸ €~~

-30%

6⁹⁹ €



MAISTO PAPILDAS

**AMBIO SELENAS
IR CINKAS SU
VITAMINAIŠ,
90 tablečių**
~~12⁹⁸ €~~

-30%


9⁰⁹ €


MAISTO PAPILDAS



**AMBIO VITAMINAS
D3 3200,**
30 kapsulių

1+1

10⁴⁸ €

MAISTO PAPILDAS

**AMBIO
IMUNITETUI SU
ŠEIVAMEDŽIU IR
EŽIUOLE,**
20 tablečių

1+1

10⁴⁸ €

MAISTO PAPILDAS

**AMBIO
REGĖJIMUI,**
30 kapsulių

-40%

~~11⁹⁸ €~~
7¹⁹ €

MAISTO PAPILDAS

**AMBIO
KOMPLEKSAS
VIRŠKINIMUI SU
GEROSIOMIS
BAKTERIJOMIS,**
20 kapsulių

-30%

~~6⁹⁸ €~~
4⁸⁹ €

MAISTO PAPILDAS

**AMBIO GERKLEI
VAIKAMS**
(sirupas), 150ml

1+1

6⁴⁹ €

MAISTO PAPILDAS

**AMBIO GERAM
POILSIUI,**
30 kapsulių

-40%

~~8⁹⁸ €~~
5³⁹ €

MAISTO PAPILDAS



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMBIO ŠIRDŽIAI, 30 kramtomųjų tablečių **8²⁸ €**
MAISTO PAPILDAS

-30%

**AMBIO**KALIS (milteliai geriamajam tirpalui ruošti), 30 pakučių **8²⁹ 5⁸⁰ €**KALIS IR MAGNIS, 60 tablečių **11⁴⁸ 8⁰⁴ €**KALIS IR MAGNIS (milteliai geriamajam tirpalui ruošti), 30 pakučių **12⁹⁸ 9⁰⁹ €**
MAISTO PAPILDAS

PIC MATUOKLIAI / INHALIATORIAI / TERMOMETRAI

IKI -35%

**PIC SOLUTION****MEDICINOS PRIETAISAI**

„PIC Solution“ jau daugiau nei 50 metų yra vienas žinomiausių Italijos medicinos priemonių prekių ženklų. Kiekvienas PIC sprendimas yra daugiau nei kraujospūdžio matuoklis, inhaliatorius ar termometras. Tai paprastas būdas parodyti rūpestį ir paklausti „Kaip jautiesi?“. Savo laboratorijose kuriame pažangius prietaisus, skirtus inhaliacijai, širdies darbui ar temperatūrai stebėti. Visi prietaisai turi 5 metų garantiją* ir jų tikslumas patvirtintas klinikiniais tyrimais**.

* Išskyrus termometrus, matuoklį „LiteRapid“, inhaliatorių „AirCube“.

** Taikoma kraujospūdžio matuokliams

KIEKVIENA ŠIRDIS TURI SAVO RITMĄ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!**AMBIO ŽUVŲ TAUKAI**, 250 kapsulių **17⁹⁸ €**

MAISTO PAPILDAS

-30%

**BIOFERRUM ACEROLA**, 28 pak. **17⁶⁹ 12³⁸ €****VENOLEGS 750:75**, 28 pakeliai **19¹⁹ 13⁴³ €****MINERALVIT CARDIO**, 20 pakučių **9⁴⁹ 6⁶⁴ €****COR4 COMPLEX**, 28 pakeliai **18⁹⁸ 13²² €****MAISTO PAPILDAS**

Maisto papildai milteliais geriamajam tirpalui ruošti. Išsirkintie reikalingiausia: „COR4 Complex“ – širdžiai ir kraujotakos sistamai. Mineralai kalis ir magnis, vitaminas B1 ir augalinės kilmės medžiagos padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir kraujospūdį, cholesterolio koncentraciją kraujyje, gerina kraujo kokybę ir kraujotaką. „mineralvit CARDIO“ – viename miltelių pakelyje gausu mineralų, vitaminų ir net 200 mg gudobelų ekstrakto! Produkto sudėtyje esantis vitaminas B1 ir gudobelės padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių funkcijai, susidarymą. „VENOLEGS 750:75“ – didelio kiekio flavonoidų (750 mg diosminio ir 75 mg hesperidino), mineralų, vitaminų, kolageno ir 4 augalų ekstraktų kompleksas pavargusioms kojomis, kojų venoms stiprinti, hemoroidui ir normaliai venų mikrocirkuliacijai. „bioFERRUM ACEROLA“ – geležis su vitaminu C hemoglobino ir imuninei sistemai. Sudėtyje yra ekologiškų džiovintų plikųjų malpigių (acerola) ekstraktas. Sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos!

-30%

**AMBIO**Omega-3, 60 kapsulių **9⁹⁸ 6⁹⁹ €**Žuvų taukai citrinų skonio 250ml **12⁹⁸ 9⁰⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

-30%

1⁰⁴€
~~1⁴⁵~~**VALIDOL SU GLIUKOZE**, 10 poliežuvių tablečių**MAISTO PAPILDAS****Vartojimas:**

Suaugusiems rekomenduojama tabletę laikyti po liežuviu tol, kol ji visiškai ištirps. Tabletes nekramtyti ir nenuryti. Maksimali paros dozė – 2-3 tabletės.

-30%

13⁹⁹€
~~19⁹⁹~~

NAUJIENA

**GLUCOPIL**, 60 dengtųjų tablečių**MAISTO PAPILDAS**

Normaliai gliukozės koncentracijai kraujyje.

„Glucopil“ yra baltųjų šilkmedžių lapų, vaistinių ąžuolų sėklų ir mišinių pokštenių lapų ekstraktų derinys, papildytas B grupės vitaminais. Šilkmedžių lapų ekstraktas padeda palaikyti normalią angliavandenių apykaitą organizme. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą ir normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminai B6 ir B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

Vartojimas: 2 tabletes per dieną nuryti užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio.

KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIAI, INHALIATORIAI, TERMOMETRAI

IKI **-35%**



OMRON KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIAI, INHALIATORIAI, TERMOMETRAI BEI SKAUSMO MALŠINIMO PRIETAISAS

Japonų prekių ženklo „Omron“ aparatai tiksliai išmatuos jūsų kraujospūdį, kūno temperatūrą, inhaliatoriai palengvins kvėpavimą, o skausmo malšinimo prietaisai sumažins bei palengvins raumenų ir sąnarių skausmą.

„OMRON“ - PATIKIMAS SVEIKATOS PARTNERIS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-20%



FERGLOBIN, FERGLOBIN PLUS

MAISTO PAPILDAI

„Ferglobin“ – geležies, vitaminų ir mineralų kompleksas normaliai kraujodarai (foliatai), raudonųjų kraujo kūnelių gamybai (vitaminai B6, B12, geležis), hemoglobino susidarymui (geležis) palaikyti. „Ferglobin“ puikiai papildė mitybą nėštumo ir laktacijos laikotarpiu, vaikystėje ir paaugulytėje, sveikstant po ligos ar operacijos.

„Ferglobin Plus“ ne tik papildė geležies atsargas, bet ir padeda mažinti pavargimo jausmą (vitaminai B6 ir B12), palaiko fizinę ir protinę energiją (sibirinis ženšenis).

GELEŽIS, KURIAI NĖRA LYGIU!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

NERVŲ SISTEMAI, NUOVARGIUI MAŽINTI, RAUMENIMS

1+1

Dvi tokios pačios pakuotės už **VIENOS KAINĄ!**



BIOMAGNIS 300 MG + BIOKALIS 300 MG, 30 pakuelių 137€

MAISTO PAPILDAI

Magnio ir kalio citrato maisto papildai mielai geriamajam tirpalui ruošti. Magnis ir kalis reikalingas normaliai nervų sistemos veiklai ir raumenų funkcijai palaikyti. Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą, palaikyti normalią energijos apykaitą. Be konservantų, be stabilizatorių. Magnis išgaunamas iš Negyvosios jūros. Pagaminta Izraelyje.

MAGNIS, CITRATO MAISTO PAPILDAI IŠ NEGYVOSIOS JŪROS!

IKI **-35%**



AMEDIPLUS

KRAUJOSPŪDŽIO MAT. AUTOM.ŽASTINIS DBP-1358 **64⁹⁵ 42²² € -35%**

MANŽETĖ KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIUI, XL (22-42 cm) **15⁹⁹ 13⁵⁹ € -15%**

MANŽETĖ KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIUI, XXL (32-48 cm) **15⁹⁹ 13⁵⁹ € -15%**

KRAUJOSPŪDŽIO MAT. ADAPTERIS **10⁹⁹ 9³⁴ € -15%**

MEDICINOS PRIETAISAI

-40%



RAMI ŠIRDIS

MAISTO PAPILDAI

„Rami Širdis“ – gausios sudėties dviejų poveikio maisto papildai, pripažinti Lietuvos vartotojų. Šios linijos preparatai pasižymi puikiai suderinta sudėtimi, kuri, be vitaminų ir mineralų, papildyta natūraliais augaliniais ekstraktais, šimtmečius naudojamais medicinoje. „Rami Širdis“ maisto papildai padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir psichologinę funkciją, taip pat padeda mažinti nuovargį.

„Rami Širdis cholesterol balansui“ sudėtyje esantis patentuotas ABC25+ juodojo česnakų ekstraktas padeda palaikyti normalų cholesterolio kiekį kraujyje. Plunksnapių gudobelių ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Vaistinių valerijonų šaknų ekstraktas padeda atsipalaiduoti ir palaikyti normalią psichologinę būseną. Folio rūgštis, B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Sudėtis praturtinta berberinu.

RAMIAME KŪNE-RAMI ŠIRDIS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-40%



KALICORD 850 FORTE, 30 kapsulių **10⁹⁵ 6²⁹ €**

CORDISOL, 60 kapsulių **11⁹⁵ 7¹⁹ €**

CORDISOL FORTE, 30 kapsulių **12⁹⁵ 7⁴⁹ €**

KRIOMEGA+, 30 minkštųjų kapsulių **18⁹⁵ 11³³ €**

MAISTO PAPILDAI

Kalis bei magnis reikalingi normaliai raumenų ir nervų sistemos veiklai, o kalis – ir normaliam kraujospūdžiui palaikyti. Preparatų sudėtyje esantis magnis yra magnio oksido pavidalu, o kalis – kalio citrato pavidalu. Norintiems papildyti kalio atsargas organizme, rekomenduojama vartoti „Kalicord“, kurio sudėtyje yra net 300 mg kalio. Esant mineralų trūkumui organizme rekomenduojama vartoti „Cordisol“, kurio sudėtyje yra 100 mg kalio ir 157 mg – magnio, bei „Cordisol forte“, kurio sudėtyje – NET 200 mg kalio ir 187,5 mg magnio žuvų taukai „KriOmega+“ yra iš krilių. Kriliai yra laikomi vienu geriausių, veiksmingiausių ir preinamiausių omega-3 riebiųjų rūgščių šaltinių. Sudėtyje esantis omega-3 fosfolipidai, gaunami iš vėlyvųjų – krilių – ekstrakto, greitai patenka į audinių ląsteles ir tolygiau pasiskirsto nei omega-3 trigliceridai, randami žuvų taukuose.

-30%

3 49€



KORVALOOL-M tirpalas, 25ml

MAISTO PAPILDAS

Pipirmėčių ir apynių aliejaus žaliava – pipirmėtės lapai ir apynių spurgai. Pipirmėtės lapai padeda atsipalaiduoti, o kartu su apynių spurgais padeda palaikyti normalų miegą.

Vartojimas: suaugusiems vartoti po 20 lašų 3 kartus per dieną, užgeriant puše stiklinės vandens.

-40%

0 89€



VALIDOL, 10 čiulpiamųjų tablečių

MAISTO PAPILDAS

Sudėtyje esantis vaistinių valerijonų ekstraktas padeda atsipalaiduoti bei palaikyti gerą psichologinę būseną. Vartojimas: Tablete reikia laikyti po liežuviu tol kol ji visiškai ištirps. Vartojama po 1 tablete 2-4 kartus per dieną.

VALIDOL ACONITUM – JŪSŲ GERAI SAVIJAUTAI!



-40%

**AMBIO**Lakto-bifidobakterijos su inulinu, 30 kapsulių **9⁴⁸ 5⁶⁹ €**Lakto-bifidobakterijų kompleksas forte, 10 pakelių **10⁴⁸ 6²⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

5⁹⁹ €**LINEX®** 16 kietųjų kapsulių**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje „Linex“ kapsulėje yra ne mažiau kaip 12 x 10⁷ KSV liofilizuotų gyvybingų bakterijų (*Lactobacillus acidophilus* (sp. L. gasseri), *Bifidobacterium infantis*, *Enterococcus faecium*). **Indikacijos:** „Linex“ vartojamas viduriavimui, pilvo pūtimui ar kitokiam virškinimo sutrikimui gydyti kaip pagalbinė priemonė. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** mažiems kaip 2 metų vaikams gerti po 1 kapsulę 3 kartus per parą (kapsulės turinį išberti į šaukštą ir sumaišyti su skysčiu); 2–12 metų vaikams – po 1–2 kapsules, o vyresniems nei 12 metų pacientams – po 2 kapsules 3 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** „Linex“ vartoti negalima, jei yra padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pieno baltymams ar bet kuriai vaisto pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** specialų atsargumo priemonių reikia, jei išmatose yra kraujo ar gleivių; jei sergama lėtine liga arba imunitinė sistema susilpnėjusi (pvz., jei yra ŽIV, AIDS). „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Seimyniškių g. 3A, LT-09512 Vilnius, Lietuva. B5212097785. Teksto patvirtinimo data: 2022.12.08.

NORMALIZUOJA ŽARNYNO VEIKLĄ

-30%

**AMBIO**Ambio Skaidulos su Lacto-bifidobakterijomis, 180 kapsulių **25⁹⁶ 18¹⁹ €**Ambio Laxative complex, 10 kapsulių **3⁹⁶ 2⁷⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

-20%

**RANIGAST S-O-S**, 12 krantomųjų tablečių **4⁸⁹ 3⁹¹ €****RANIGAST S-O-S**, 24 krantomosios tabletės **5⁷⁹ 4⁶³ €****MEDICINOS PRIEMONĖ**

„Ranigast S-O-S“ yra skirtas gastrozofaginio refliukso simptomams (rėmeniui, skrandžio skausmui, dispepsijai) malšinti.

- Veikia akimirniui – nuo to momento, kai tik suvalgo ar išgerite tabletę.
 - Dėl ypatingos sudėties apsaugo skrandžio gleivinę ir sumažina rėmens epizodų skaičių.
 - Tinka naudoti ir kaip papildoma priemonė sergantiems gastritu, peptine opa.
 - Galima naudoti nėštumo ir žindymo metu, prieš tai pasitarus su gydytoju.
- Suaugusiems ir vaikams nuo 12 metų: rekomenduojama pavalgis vartoti 2 tabletes. Vaikams (6–12 metų): rekomenduojama pavalgis vartoti 1 tabletę.

2⁷⁹ €**PANZYNORM 20 000 V** skrandyje neiros kietosios kapsulės, 10 tablečių**VAISTINIS PREPARATAS**

Veikliosios medžiagos: lipazė 20000 V, amilazė 12000 V, proteazė 900 V. Panzynorm vartojamas ilgalaikio kasos nepakankamumo, kurio metu sutrinka jos sekreto išskyrimas į virškinimo traktą, gydymui. Vartoti po 1 tabletę pagrindinių valgių metu užgeriant dideliu kiekiu skysčio. Tablečių reikėtų nuryti nepažeistą, jos negalima kramtyti arba smulkinti. Kontraindikacijos: paūmėjęs pankreatitas, alergija bet kuriai sudedamajai vaisto medžiagai. Vaisto nereikėtų vartoti jaunesniems nei 15 m. vaikams. Kartu vartojami vaistai, blokuojantys H₂ receptorių arba slopinantys protonų siurbli, gali padidinti kasos fermentų veiksmingumą. Reklamos teksto parengimo data: 2023.09.06.

PUIKUS SPRENDIMAS GERAM VIRŠKINIMUI!

-30%

4^{19€} ~~5⁹⁹~~**SORBEX®** 396 mg, 20 kapsulių**MAISTO PAPILDAI**

1 kapsulėje – net 300 mg aktyviosios anglies.

Padeda sumažinti per didelį dujų kaupimąsi pavalgis**.

Aktyvintoji anglis „Sorbex“ išgaunama iš kokosų riešutų ąžuolų.

Rekomenduojama paros norma – 1–3 kapsulės.

** Teigiamas poveikis dujų kaupimuisi pasireiškia tada, kai 1 g aktyviosios anglies suvartojama ne mažiau kaip 30 min. prieš valgį ir 1 g aktyviosios anglies – iškart po valgio.

ESANT VIDURIAVIMUI3⁹⁹ €**LOPERAMIDUM WZF POLFA**

2 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga: loperamido hidrochloridas. **Indikacijos:** simptominiams suaugusiems ir vyresnių negu 12 metų paauglių ūminio viduriavimo gydymas tokiu atveju, jei negalima pašalinti viduriavimą sukelusios priežasties. **Dozavimas:** pradžioje geriama 2 tabletės (4 mg), vėliau – po 1 tabletę (2 mg) po kiekvieno išstūtinimo nesulomuotomis išmatomis. Draudžiama per parą gerti daugiau kaip 6 tabletes (12 mg). **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas loperamidui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jaunesni negu 12 metų pacientai; paralyžinis žarnų nepažeidimas; vidurių užkietėjimas; pilvo pūtimas; organizme per mažai skysčių; pseudomembraninis kolitas, kurį dažniausiai sukelia plataus poveikio antibiotikai; ūminė bakterinė dizenterija, bei kitoks bakterinis viduriavimas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** loperamido hidrochloridu gydymas pacientams turi vartoti pakankamai vandens bei mineralinį medžiagų. Šio vaistinio preparato reikia atsargiai vartoti ligoniams, kuriems yra kepenų nepakankamumas. Sergant Krono liga, loperamido hidrochloridu reikia vartoti atsargiai. Jeigu pasireiškia vidurių užkietėjimas, pilvo pūtimas ar atsiranda pirmųjų žarnyno obstrukcijos simptomų, šio vaistinio preparato vartojimą būtina nutraukti. Jeigu ligonis karščiau bei jo išmatose yra kraujo, prieš pradėdami vartoti loperamido hidrochlorido, būtina išsiskirti tokiu viduriavimu priežastį. Vartojant loperamido hidrochlorido, gali pasunkėti šlapinimasis. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Reklamos teksto parengimo data: 2017-01.

GREITAI SUSTABDYS VIDURIAVIMĄ.

-30%

16^{79€} ~~23⁹⁹~~ **NAUJIENA****IBESAN**, 60 kapsulių**MAISTO PAPILDAI**

Kapsulės nuo dirgliosios žarnos sindromo yra medicinos priemonė, lengvinanti simptomus, atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi pilve, ir su tuo susijusį skausmą pacientams, sergantiems dirgliosios žarnos sindromu (DŽS), kaip antai: pilvo pūtimu, pilnumo jausmą, meteorizmą, ragėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos. Vaistų nuo DŽS nėra iki šiol, o kapsulės nuo dirgliosios žarnos sindromo palengvina ji lydinčius simptomus. Mašina skausmingus žarnyno spazmus ir pilvo pūtimą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos. Mašina pilvo skausmą pacientams, sergantiems dirgliosios žarnos sindromu, esant viduriavimui. Normalizuoja peristaltiką, mažina skausmą, padeda išvengti žarnyno nepažeidimo. Rekomenduojama dozė suaugusiems ir vaikams nuo 12 metų yra 2 kapsulės, geriamos iki 3 kartų per dieną 4 savaites. Kapsulės reikia gerti valgant arba po valgio. Kapsulę nuryti viš, užgeriant didele stikline skysčio (200 ml).

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms



SAUSOMS, SUDIRGUSIOMS IR PAVARGUSIOMS AKIMS

NUO **12⁹⁷ €**

BEPANTHEN® EYE

BEPANTHEN® EYE akių lašai, 10 ml **13⁹⁷ €**
BEPANTHEN® EYE akių lašai, 20 x 0,5 ml vienadozių talpyklių **12⁹⁷ €**

MEDICINOS PRIEMONĖS

Bepanthen® Eye akių lašų sudėtyje yra 0,15 % natrio hialuronato ir 2 % dekspanthenolio. Bepanthen® Eye saugo ir drėkina akies paviršių ir padaro jį slidžiu. Tokiu būdu ilgam sumažėja diskomfortas, susijęs su mechaniniu stresu, stresu dėl aplinkos poveikio arba intensyvaus žiūrėjimo. Sudėtyje nėra konservantų, todėl šie lašai gerai toleruojami, net jei vartojami ilgą laiką. Lašinti po 1 lašą į akies junginės maišelį 3–5 kartus per parą. Joje yra alergija bet kuriai sudėtyje esančiam medžiagai arba akių uždegimas ar pažeidimas, vartoti negalima. Akių lašų vartojimo metu kontaktinių lęšių išimti nereikia. Vienadozių akių lašų talpyklės skirtos tik vienkartiniam vartojimui. Bepanthen® Eye buteliukas yra ekonomiškas sprendimas: ypatinga akių lašų buteliuko technologija leidžia produktą suvartoti net per 12 mėnesių po jo atidarymo. Jei norite sužinoti daugiau, skaitykite pilną Bepanthen® Eye vartojimo instrukciją. Reklamos teksto parengimo data: 2022-06, GH-20220601-09

PASALINKITE SAUSŲ AKIŲ SIMPTOMUS IŠ KARTO!



DAUG DIRBANČIOMS AKIMS

-20%

OCUTEIN

OCUTEIN RETIN, 30 kapsulių **19⁹⁷ 15⁶¹ €**
OCUTEIN BRILLANT, 30 kapsulių **22⁹⁹ 18³⁹ €**
OCUTEIN FORTE, 30 kapsulių **19⁹⁷ 15⁵⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

OCUTEIN RETIN – patobulinta formulė daug dirbančių akių mikrocirkuliacijai.
OCUTEIN BRILLANT – brillantinė apsauga pavargusioms, daug dirbančioms akims.
OCUTEIN FORTE – trejetas poveikis sausoms, daug dirbančioms akims.
„OCUTEIN“ – DAUG DIRBANČIŲ AKIŲ APSAUGA!



KONTAKTINIŲ LĘŠIŲ PRIEŽIŪRAI

-20%

6⁷⁸ €

OPTI-FREE EXPRESS, 355 mL

MEDICINOS PRIEMONĖ

Kasdienis komfortas

Daugiafunkcis dezinfekuojamasis tirpalas

Silikonas hidrogelio ir minkštiesiems (hidrofiliniams) kontaktiniams lęšiams

OPTI-FREE EXPRESS tirpalas paskirtas yra kasdienis silikono hidrogelio ir minkštųjų (hidrofilinių) kontaktinių lęšių valymas, baltymų nuosėdų šalinimas, nuoplovimas, cheminė (ne karščių atliekama) dezinfekcija ir laikymas, kaip rekomenduojama akių priežiūros specialistas. OPTI-FREE EXPRESS tirpalas yra sterilus, buferinis vandeninis tirpalas, kuriame yra natrio chlorido, sorbitolio, dinatrio edetato, boro rūgšties, aminometilpropanolio, natrio citrato ir TETRONIC 1304 kaip valomųjų medžiagų bei POLYQUAD (polikvaternio-1) 0,001% ir ALDOX (mirstamidopropilo dimetilamino) 0,0005%.



-30%

ABC VIT VITAMINAS A, 60 kapsulių **6³⁹ 4⁸⁹ €**

OPTIC BIOLUTEINA 25, 30 tablečių **7⁹⁹ 5⁵⁹ €**

OPTIC TOTAL, 30 tablečių **5⁹⁹ 3⁶³ €**

OPTIC SENIOR, 30 tablečių **6³⁹ 4⁴⁷ €**

MAISTO PAPILDAS



LIUBERIN

Liuberin + lutein 35mg, 30 kapsulių **15⁴⁹ 9²⁹ €**

Liuberin superior, 30 kapsulių **17⁹⁹ 10⁷⁹ €**

MAISTO PAPILDAS

Linija „Liuberin“ skirta padėti išsaugoti normalią regėjimą bei palaikyti akies kraujotaką. „Liuberin superior“ net 18 aktyviųjų medžiagų kompleksas sausoms, pavargusioms, daug į skaitmeninių įrenginių ekranus žiūrinčioms akims. Sudėtis praturtinta ginkmedžiu, kuris padeda palaikyti akies kraujotaką. O „Liuberin + LUTEIN 35 mg“ – naujusia formulė akims! Šio preparato sudėtis praturtinta karotenoidais: net 35 mg luteino ir 3 mg zeaksantino, kurių su amžiumi koncentracija akyse mažėja. Gausi sudėtis išsiskiria ir melynų uogų ekstraktu, kuris padeda palaikyti normalią akių funkciją, valo aiskumą ir kraujotaką. Normalią regėjimą padeda išsaugoti vitaminai A ir cinkas. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

RYŠKIOMS GYVENIMO SPALVOMS!



VITAMINAI AKIMS

-25%

18²² €

SUPEROPTIC 60 minkštųjų kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Sudėtyje gausu omega-3 riebalų rūgščių, taip pat yra vitaminų (A, B grupės, C, E) ir mikroelementų (cinko, mangano, vario, seleno). Maisto papildas turi luteino ir zeaksantino, kurių natūraliai yra akių geltonosios dėmės. Dėl sudėdamausių dalių „SuperOptic“ padeda išsaugoti normalią regėjimą ir apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės žalos. 1 kapsulė per parą nuryti užsigeriant nedideliu kiekiu skysčio. Rekomenduojama produktą vartoti valgio metu.

VISAPUSĖ APSAUGA TAVO AKIMS.



AKIMS

Gera rega ir sveikos akys padeda mums optimaliai funkcionuoti namie, universitete, darbe, prie vairo ir kitur, todėl itin svarbu kuo ilgiau išlaikyti jas geros būklės. Dauguma žmonių įsitikinę, kad prastėjanti akių sveikata – neišvengiamas senėjimo ir akių nuovargio padarinys. Tačiau tiesa yra optimistiškesnė. Pasitelkus sveiką mitybą, įmanoma pristabdyti senėjimo procesus

ir gerokai sumažinti akių sveikatos problemų tikimybę. Omega-3 riebalų rūgštys, liuteinas, cinkas, vitaminai A, C ir E – sąvokos, kurias turėtumėte įtraukti į savo sveikos mitybos žodyną bei valgiaraštį, norėdami atitolinti su amžiumi susijusių regos problemų riziką. Tad drąsiai kraukitės į pirkinių krepšį žalias lapines daržoves, lašišas, tunus ir kitas riebias žuvis, morkas, citrusinius vaisius ir baltymų gausius produktus, tokius kaip kiaušiniai, riešutai, pupos. Tiems, kuriems reikiamo šių maistingųjų

medžiagų kiekio nepavyksta gauti vien su maistu, derėtų pasikonsultuoti su gydytoju dėl maisto papildų vartojimo. Sveiki įpročiai ir subalansuota mityba daro ne tik tiesioginę įtaką mūsų akių sveikatai, bet ir gali padėti sumažinti diabeto, padidėjusio kraujo spaudimo ir kitų ligų bei diagnozių, prisidedančių prie pablogėjusios regos ir akių būklės, riziką.

Neužmirškite – gera akių sveikata prasideda nuo maisto jūsų lėkštėje!

Šildantis arklių balzamas, 250 ml
Šaldantis arklių balzamas, 250 ml
MEDICINOS PREKĖS

Onkologinės ligos - tikras iššūkis.

KARTU MES STIPRESNI



Su POLA kortele nuolaidos:

15% vaistams*

20% kitoms prekėms*



*Nuolaidos netaikomos perkant su kompensuojamuoju receptu, vardinius, kartinius vaistus, pradinio maitinimo mišinius, administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Nuolaidos nesumuojamos ir galioja perkant fizinėse NORFOS vaistinėse.



VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!**AMBIO**

Spanguolių ekstraktas su lakto-bifidobakterijomis, 20 kapsulių **10⁹⁸ €**
 Cranberry complex, 30 kapsulių **11⁴⁸ €**

MAISTO PAPILDAI

IKI -40%

**AMBIO**

Ambio Gerai nuotaikai, 30 kapsulių **15⁴⁸ 9²⁹ € -40 %**

Ambio Pasiflora, 60 tablečių **9⁹⁸ 5⁹⁹ € -40 %**

Ambio Valerijonas plus, 50 tablečių **5⁹⁸ 4¹⁹ € -30 %**

Ambio Patiriantiems įtampą, 15 tablečių **5⁹⁸ 3⁵⁹ € -40 %**

VITADAY Kompleksas nervų sistemai, 20 kapsulių **5⁴⁸ 3²⁹ € -40 %**

MAISTO PAPILDAI

-40%

**INOLAB**

Inolab Atsparumas stresui, 30 kapsulių **26⁹⁹ 15⁶⁵ €**
 Inolab Stiprus magnis milteliai, 20 paketėlių **22⁹⁹ 13⁷⁹ €**
 Inolab Širdžiai ir cholesterolio balansui, 30 kapsulių **18⁹⁹ 11³³ €**

MAISTO PAPILDAI

„Inolab Atsparumas stresui“ – tai 8 veikliųjų medžiagų kompleksas nervų sistemai ir gerai nuotaikai. „Affron“ šafrono ekstraktas padeda palaikyti psichinę sveikatą, teigiama nuotaiką ir atsipalaiduoti. Vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną. **„Inolab Stiprus magnis“** – tai magnio, kurkumino ir piperino derinys aktyvių gyvybinių būdų. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją ir išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą. „Cavacurmin“ kurkuminas padeda palaikyti normalią kaulų ir sąnarių būklę. Vartojimas: gerti po 1 paketėlį per dieną. **„Inolab Širdžiai ir cholesterolio balansui“** – tai 4 veikliųjų medžiagų kompleksas jūsų širdžiai, kraujagyslėms ir cholesterolio balansui. ABG25+ juodųjų ęsnačių ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies veiklą, normalų cholesterolio kiekį kraujyje. Resveratrolis „Veri-te“ padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos funkciją. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

SVETARISKAS PRECIZIŠKUMAS IR SINERGINIS POVEIKIS!

-30% 4^{47€}**URAGIN**, 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

-60%

ANTRAI
TOKIAI PAČIAI
PAKUOTEI

ASKORBO RŪGŠTIS, 50 mg, 200 dražežės **2⁴⁹ €**

MUKALTIIN, 30 tablečių **2⁹⁹ €**

RHINOSOL aliejiniai nosies lašai, 10 ml **5¹⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

4⁴⁹ €**ACETERIN EXPRESS**, 10 mg tablečių, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje „Aceterin express“ 10 mg plevėle dengtoje tablečių yra 10 mg cetirizino dihydrochlorido. **Indikacijos:** sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės simptomams palengvinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams reikia vartoti po 1 tabletę per dieną, vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus – po pusę tablečių du kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliąjai medžiagai, pagalbinei medžiagai, hidroksiziniui arba bet kuriam piperazino dariniui. Pacientai, kuriems smarkiai sutrikusi inkstų funkcija (kreatinino klirensas mažesnis negu 10 ml/min.). **Specialūs įspėjimai:** atsargiai vartoti sergantiems epilepsija ir pacientams, kuriems yra traukulių pavojus. „Aceterin express“ slopina odos alerginių mėginių reakcijas, todėl, prieš juos atliekant, reikia tris paras šių vaistų nevartoti. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Seimyniškių g. 3A LT-09312 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 2636057. El. paštas: info.lithuania@sandoz.com. BS2212097789. Teksto patvirtinimo data: 2022.12.09.

-50%

NAUJIENA

**LACTOFLORENE**

PANCIA PIATTA, 20 paketėlių **29⁹⁹ 15⁰⁰ €**

CIST, 20 paketėlių **39⁹⁹ 20⁰⁰ €**

COLESTEROLO, 20 paketėlių **29⁹⁹ 15⁰⁰ €**

COLESTEROLO, 30 tablečių **29⁹⁹ 15⁰⁰ €**

MAISTO PAPILDAI

🍁 **Jamieson Stress Plex, 90 tablečių**

Maisto papildas



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

15⁹⁹ €

🍁 **Jamieson Salmon oil 1000mg, 90 kapsulių**

Maisto papildas



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

24⁴⁹ €



Pagaminta Kanadoje

🍁 **Jamieson Selenas 100mcg, 100 tablečių**

Maisto papildas



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

12⁹⁹ €

🍁 **Jamieson Coenzyme Q10 30mg, 60 kapsulių**

Maisto papildas



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

21⁴⁹ €



Pagaminta Kanadoje

-20%**FLORADIX****MAISTO PAPILDAI**

„Floradix“ – svarbiausi mineralai ir vitaminai gerai savijautai. „Floradix“ natūralios sudedamosios dalys užtikrina gerą organizmo svarbiausių vitaminų ir mikroelementų pasisavinimą. Skystos formos medžiagos greičiau rezorbuojasi nei esančios tablete, o dėl puikaus skonio juos noriai geria maži vaikai ir yra tinkami vartoti nešioms moterims.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

-15%**NUTRIDRINK, CUBITAN, NUTRIKID****SPECIALIOS MEDICININĖS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAI**

Turi būti vartojami prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

INKSTAMS IR ŠLAPIMO TAKAMS**-20%****9^{27€}**
~~11⁵⁹~~**FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS, 30 kapsulių****MAISTO PAPILDAS**

„Fitolizyna Nefrocaps PLUS“ yra unikalus 7 koncentruotų augalinių ekstraktų mišinys, kuris:

- padeda palaikyti normalią inkstų ir šlapimo takų veiklą (petražolių šaknis, dirvinių asiūklių žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, karpotųjų beržų lapai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė);
- padeda palaikyti normalų vandens pašalinimą iš organizmo, todėl skatinamas nepageidaujamų metabolizmo produktų šalinimas su šlapimu (dirvinių asiūklių žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė).

Rekomenduojamas vartojimas: 1 kapsulė 2 kartus per parą prieš valgį, užgeriant dideliu kiekiu vandens (ne mažiau kaip ½ stiklinės).

-20%**VITABALANS****MAISTO PAPILDAI IR VITAMINAI**

„Vitabalans“ vitaminų ir maisto papildų linija – auštos kokybės produktai, pagaminti Suomijoje. Mūsų tikslas yra gaminti aukštos kokybės, protingos kainos gerai žinomus produktus, palaikančius žmonių gerovę ir sveikatą. Dauguma gaminamų maisto papildų ir vitaminų yra be laktozės, glitimo ir cukraus, tinkami veganams. Maisto papildai „Vitabalans“ – tai skandinaviskos kokybės maisto papildai Jūsų puikiai savijautai.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms

NUO ALERGIJOS**4⁴⁹ €****LORATADINE ACTAVIS 10 mg, 10 tablečių****NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Kiekvienoje tabletėje yra 10 mg loratadino. **Terapinės indikacijos.** Simptominis alerginio rinito ir lėtinės idiopatinių dilgėlinės gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusieji ir vyresni kaip 12 metų vaikai: 10 mg 1 kartą per parą. 2 iki 12 metų vaikai: sveriantiems daugiau kaip 30 kg – 10 mg 1 kartą per parą. Tabletes galima vartoti nepriklausomai nuo valgymo laiko. Pacientams, sergantiems sunkiu kepenų funkcijos nepakankamumu, skiriama pradinė 10 mg dozė kas antrą dieną. **Kontraindikacijos.** Loratadino tablečių vartoti negalima, jeigu padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pastarūkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Loratadine Actavis, jeigu yra sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas (tokiems pacientams gydymas gali skirti vartoti šio vaisto kas antrą dieną). Antihistamininiai vaistiniai preparatai gali susilpninti odos hiperergines reakcijas arba neįsijoms pasireikšti, todėl loratadino tablečių vartojimą reikėtų nutraukti mažiausiai prieš 48 valandas iki alerginių odos mėginių. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktozės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Reklamos peržiūros data 2022 m. balandis. OTC-LT-00036

-30%**DOCTOR FISH OMEGA-3 + VITAMINS D & E, 30 kapsulių 14⁹⁹ 8³⁹ €****MAISTO PAPILDAS SU ŠALDIKLIU**

Maisto papildas sudėtyje yra omega-3 riebalų rūgščių (EPR ir DHR) ir vitaminų D ir E:

- EPR (eikozapentaeno rūgštis) ir DHR (dokozaheksaeno rūgštis) padeda palaikyti normalią širdies veiklą;
- DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją, išsaugoti normalų regėjimą;
- vitaminas D padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų, raumenų, dantų būklę;
- vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.

**KALCIO GLUKONATAS 500 MG, 10 tablečių 1³⁹ 0⁹⁷ €****MAISTO PAPILDAS**

Kalcis padeda palaikyti normalią raumenų veiklą, reikalingas normaliai kaulų bei dantų būklei palaikyti.

-60%**ANTRAI TOKIAI PAČIAI PAKUOTEI****ŠALTALANKIŲ ALIEJUS, 50 ml 7¹⁹ €**
ŠALTALANKIŲ ALIEJUS, 100 ml 9⁸⁹ €**MAISTO PAPILDAS**

Šaltalankių aliejus padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir širdies veiklą, normalų virškinimą, normalią odos būklę. Vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą.

-30%**BF-ESSE****MAISTO PAPILDAI**

Pasimėgauk gyvenimo akimiromis su BF-ESSE...

JŲSŲ GERAI SAVIJAUTAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.



SAUSAI ODAI

-25%



ATODERM BIODERMA

KOSMETIKOS PRIEMONĖS


Sausai odai būdingas tempimo pojūtis ir elastingumo trūkumas, šie simptomai kartais pasireiškia kartu su niežėjimu ir pleiskanojimui. „Bioderma“ sprendimas: „Atoderm“ – produktų linija, skirta sausai, labai sausai ar atopiškai odai, naudojama kasdien ir kartu su egzozomų gydymu... Asortimente yra visi būtini produktai, skirti švelniai ir minkštai odai! Po dušo atsivėikink su sausa ir niežtinčia oda!

BIOLOGIJOS MOKSLAS DERMATOLOGIJAI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

SVORIO KONTROLEI

-40%

7^{85€}
~~13^{95€}~~

TALIJA S 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

„Talija S“ – subalansuotas augalinių medžiagų derinys, norintiems turėti grakščias kūno linijas. Šio maisto papildas sudėtyje esantys gvarinių pulvinių ir kambridinių garcinijų vaisių ekstraktai padeda palaikyti normalią kūno svorį. Tikrųjų imbierių šaknų ekstraktas padeda palaikyti tonusą, energingumą ir mažinti nuovargą, o chromas – palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Cholinai padeda palaikyti normalią lipidų apykaitą. Vartojimas: gerti po 1 tabletę 2 kartus per dieną 30 min. prieš valgį užgeriant stikline vandens.

DAILU. ŽAVU. GRAKŠTU

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!BEOTEBAL® PLUS plaukams, odai, nagams, 30 tablečių 30^{39€}

MAISTO PAPILDAS

„Beotebal® PLUS“ plaukams, odai, nagams rekomenduojamas kasdienieji plaukų, odos ir nagų būklės bei išvaizdos priežiūrai. Ypač tinkamas laikotarpiu, kai plaukus, odą ir nagus veikia aplinkos veiksniai (saulė, vanduo, vėjas, šaltis, sniegas, lietus), ar po intensyvių kirpyklos procedūrų (pvz., dažymo, tiesinimo, džiovinimo) ir kosmetinių nagų procedūrų.

Sudėtyje esantis originalus koncentruotas „NutriAminoBiotinum“ kompleksas, kuriame yra daug aminorogėsių, mineralų ir vitaminų (įskaitant biotiną ir natūralią silicį), turi naudingą poveikį plaukams, odai ir nagams. Gaminyje nėra gliutimo ir laktozės. Tinka vegetarams ir veganams.

-40%



OPTIHEPAN CHOLESTEROL,

60 dengtųjų tablečių 16⁹⁹ 10^{07€}

MAISTO PAPILDAS

KEPENIMS IR NUO CHOLESTEROLIO

- Augaliniai steroliai padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje.
- Cholinai padeda palaikyti normalią kepenų veiklą.
- Vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalią raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą ir normalią imuninės sistemos veiklą. Foliatai, vitaminai B6 ir B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
- Vartojimas: 2 tabletes per dieną, nuryti užgeriant pakankamu kiekiu skysčio.

OPTIHEPAN SLIM, 30 kapsulių 11⁹⁹ 7^{19€}

MAISTO PAPILDAS

KEPENIMS IR KŪNO LINIJOMS

- Cholinai padeda palaikyti normalią kepenų veiklą.
- Tikrieji margainiai padeda palaikyti normalią kepenų funkciją.
- Dažinės iberžolės padeda palaikyti normalią virškinimo funkciją.
- Juodieji pipirai padeda palaikyti normalią virškinimo trakto bei kepenų funkciją ir padeda palaikyti normalią kūno svorį.
- Chromas padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų apykaitą.
- Vartojimas: 1–2 kapsules per dieną prieš valgį.

DOVANA

PERKANT VEIDO
KREMA, PAAKIŲ
KREMAS -
NEMOKAMAI

DOVANA



ŽIEDĖ

ŽIEDĖ veido kremas normaliai odai su abrikosų kauliukų aliejumi, 50 ml 19^{99€}DOVANA! ŽIEDĖ paačių kremas su šilku, 20 ml 19^{99€}

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!ŽIEDĖ KREMINIS VEIDO SERUMAS SU KERAMIDAI, 30 ml 20^{99€}

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

-40%



AMBIO

Ambio Hydro Control complex, 30 kapsulių 9⁹⁹ 5^{69€}Ambio Fit complex, 60 kapsulių 15⁹⁹ 9^{99€}

MAISTO PAPILDAS

-25%



MILLY

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

5⁹⁹ €



ACICLOVIR ACTAVIS 5 % kremas, 5 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Aciclovir Actavis 5 % kremas. 1 g kremo yra 50 mg acikloviro. **Terapinės indikacijos.** Lokalus odos ir lūpų pūslelinės gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems Aciclovir Actavis 5% kremo reikia tepti 5 kartus per parą, vidutiniškai kas 4 valandas; naktį daroma pertrauka. Gydoma 4 paras. Jei per šį laikotarpį nepasiekstama, gydymą reikia tęsti dar 6 paras. Jei pazeidimas neišnyksta ir po 10 parų, rekomenduojama kreiptis į gydytoją. Aciclovir Actavis 5 % kremo nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Var-totoji ant odos.** **Kontraindikacijos:** Aciclovir Actavis 5% kremo negalima skirti pacientams, kurie yra jautrūs aciklovirui, valaciklovirui, propilenglikoliui ar bet kuriai Aciclovir Actavis 5 % kremo pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Aciclovir Actavis 5 % kremo nerekomenduojama tepti gleivinės, pvz., burnos, akių ar lyties organų, nes galimas sudirginimas. Būtina laikytis atsargumo priemonių ir saugoti akis, kad į jas nepatektų kremo. Jeigu Jūsų imunitetas labai susilpnėjęs, (t. y. Jūsų organizmo gebėjimas kovoti su infekcija yra sumažėjęs), tokiu atveju dėl bet kokios infekcijos gydymo reikia kreiptis į gydytoją ir įvertinti gydymo geria-mųjų aciklovirų galimybę. Pagalbinės medžiagos cetosteirilo alkoholis, natrio laurilsulfatas ir propilenglikolis gali sukelti vietinių odos reakcijų. **Reklamos teksto parengimo data.** 2023 02 15. OT-CT-00047

-35%



AMBIO

Ambio Prostatai, 30 kapsulių **11⁹⁸ 7⁷⁹ €**

Ambio Multivitaminai Vyrams PLUS, 60 tablečių **16⁹⁸ 11⁰⁴ €**

MAISTO PAPILDAI

PAVIRŠINĖMS ŽAIZDOMS IR ODOS DEZINFEKCIJAI PRIEŠ NECHIRURGINES PROCEDŪRAS

5⁹⁹ €



DUOSEPTIC, 1 MG/20 MG/ML ODOS PURŠKALAS (TIRPALAS), 50 ml

NERECEPTINIS VAISTAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml „Duoseptic“ odos purškalo (tirpalo) yra 1 mg oktenidino dihidrochlorido, 20 mg fenoksietanolio. **Indikacijos:** mažų paviršinių žaizdų antiseptinis gydymas ir odos dezinfekcija prieš nechirurgines procedūras; kartotinis trumpalaikis gleivinių ir gretimų audinių antiseptinis gydymas prieš diagnostines procedūras išangės ir lyties organų srityje, įskaitant makštį, moters išorinius lyties organus ir varpos galvutę, taip pat prieš šlapimo pūslės kateterizaciją; laikinas ribotas pagalbinis antiseptinis tarpinurštinės mikozės (grybelinės infekcijos tarp rankų ar kojų pirštų) gydymas. **Var-tojimo būdas ir dozavimas:** vartoti ant odos. Ant gydymui sričių užpurškite 1 kartą per dieną taip, kad jos visiškai sudrėktų. Kitu atveju galite užpurškiti ant tampono ir gydymą vietą patrinti (ne mažiau nei dviem „Duoseptic“ supurktais tamponais), kad visiškai sudrėktų. Tinkamiausias būdas – naudojant tamponus. Palaukite, kol „Duoseptic“ visiškai išdžiūvis, prieš apsidami ar užklijuodami žaizdą. Naudojant grybelinei infekcijai gydyti – purškite ryte ir vakare. **Kontraindikacijos:** nenaudokite, jei padidėjęs jautrumas oktenidino dihidrochloridui, fenoksietanolui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. „Duoseptic“ neturėtų būti naudojamas pilvo ertmei (pvz., atliekant operaciją), šlapimo pūslei ar ausies membranai skalauti. **Specialūs įspėjimai:** nenurykite, ypač didelio kiekio, ir neieskite patekti į kraujotakos sistemą, pvz., dėl atsitiktinio įsivirkimo. Naujagimiams, ypač neišnešiotiems, vartoti atsargiai, nes „Duoseptic“ gali sukelti sunkių odos pazeidimų. Pašalinkite vaistinio preparato perteklių ir užtikrinkite, kad tirpalo neliktų ant odos ilgiau nei reikia. Venkite patekimo į akis; patekus – nedelsiant gerai praskalaukite vandeniu. Neieskite švirkšto į giliuosius raumenis. Naudoti tik išoriskai. Po gilių žaizdų praplovimo švirkštu buvo pranešama apie nuolatinę edemą (patinimą), eritemą (paraudimą), audinių nekrozę; kai kuriais atvejais prireikė chirurginės intervencijos. Teksto parengimo data 2023-12.

12⁹⁹ €



CANESBALANCE makšties ovulės, 7 vnt.

MEDICINOS PRIEMONĖ

Canesbalance veiksmingai sumažina dėl bakterinės vaginozės atsiradusį nemalonų kvapą, neįprastas išskyras ir nemalonių pojūčius intymioje zonoje. Natūralios gydymosi medžiagos (pieno rūgštis ir gliukogenas) atstato normalią šarmų ir rūgščių pusiausvyrą (pH) ir makšties mikroflorą. Canesbalance tinka ir neščiosioms. Be konservantų. Be hormonų. Be kvapiųjų medžiagų. Reklamos teksto parengimo data: 2022.02 CH-2020210-84

-20%



FOMAN® UP SHOTS 14 x 25 ml **37⁹⁹ 26⁵⁹ €**

MAISTO PAPILDAI

NAUJIENA Foman Up Shots – skirtas seksualiai aktyviems VYRAMS. Viename buteliuke yra koncentruotų veikliųjų medžiagų dozė pritaikyta vyrų: **lytiniam potraukiui, erekcijai, pajėgumui ir energijai.** Natūralių seksualinį aktyvumą ir energiją padeda palaikyti **Peruvinė pipirė (maca).** Lytinį potraukį ir pajėgumą padeda palaikyti **Gulščioji ragutė. Ženšenis** padeda palaikyti normalią erekcijos funkciją. **Pantoteno rūgštis** (vitaminas B₅) padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei padeda palaikyti normalią protinę veiklą bei normalią energijos apykaitą. Sudėtyje taurinas (natūrali amino rūgštis).

VIRŠYK GALIMYBES SU FOMAN UP SHOTS

FOMAN® 30 kapsulių **12⁹⁸ 86⁷ €**

MAISTO PAPILDAI

„Foman“ – maisto papildas, skirtas 3 pagrindiniams vyriškoms funkcijoms: **prostatai, šlapimo sistemos, reprodukcinei.** Išskirtinėje „Foman“ sudėtyje yra 4 kompleksškai veikiantys elementai: gulščioji serenojų vaisių ekstraktas padeda palaikyti šlapimo ir reprodukcinę funkcijas; didžiųjų dilgėlių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią prostatos funkciją; fermentas proteazė padidina vyro mitybą; organinė sele-nio forma, padeda palaikyti normalią spermatogenezę. Rekomenduojama suaugusiems gerti po 1–2 tabletes per dieną ne valgio metu.

FOMAN – TECHNIŠKAI TVARKINGAM VYRUI.

14⁹⁹ €



LENOSTELLA 1,5 mg tabletė


NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje „Lenostella“ tabletėje yra 1,5 mg levonorgestrelio. **Indikacijos:** skubioji kontracepcija, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms po nesaugaus lytinio akto. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vieną tabletę reikia išgerti kiek galima greičiau, geriausia per 12 valandų ir ne vėliau kaip per 72 valandas po nesaugaus lytinio santykių. **Kontraindikacijos:** alergija levonorgestrelui arba bet kuriai šio vaisto pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** „Lenostella“ netinka vartoti kol nebuvo pirmųjų mėnesinių. Jei 4 savaitę laikotarpio buvo vartojami vaistai nuo epilepsijos, tuberkuliozės, ŽIV, grybelių sukeltų ligų arba žoliniai preparatai, kurių sudėtyje yra jonažolės, „Lenostella“ poveikis gali susilpnėti. Tokiu atveju vartojtos 2 „Lenostella“ tabletės. Vaisto nepamartina vartoti sergant plonosios žarnos liga, sunkiu kepenų sutrikimu, patyrus negimdinį nėštumą, sirgus savigigitu. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Seimyniškių g. 3A LT-09312 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El.paštas: info.lituanian@sandoz.com. 852209237259. Teksto patvirtinimo data: 2022 09 25.

SOS TABLETĖ – PADEDA IŠVENGTI NĖŠTUMO PO NESAUGAUS LYTINIO AKTO

-20%

1^{59€} ~~1⁹⁹~~



AMEDIPLUS AROMATINIS PLEISTRAS, 5 vienetai

MEDICINOS PREKĖ

PLEISTRAS NUO LŪPŲ PŪSLELINĖS, 15 vnt.

MEDICININĖ PREKĖ





PRIEMONĖS SLAUGAI

IKI -40%



SENI

SENI sauskelnės ir sauskelnės keitaitės – orui laidūs, su kvapo kontrolės sistema.

SENI apsauginiai paketai – tai papildoma apsauga, kuri išsaugo švarią patalynę.

SENI kosmetika odos priežiūrai – nuvalo, naikina kvapą, maitina ir apsaugo odą nuo dirgiklių.

*Sauskelnėms negalioja nuolaida su kompensuojamųjų vaistų gausu.

PROFESIONALUS UROLOGINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAI

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

IKI -30%



JORDAN

Visi esame skirtingi. Turime unikalius dantis, naudojame unikalią jų valymo techniką, renkames dantų šepetėlius pagal savo individualius poreikius. „Jordan“ burnos higienos priemonės sukurtos siekiant užtikrinti maksimalių dantų priežiūros rezultatą. Platus asortimentas apima dantų šepetėlius, tarpdančių siūlus bei šepetėlius, dantų pasta suaugusiems ir vaikams.

JORDAN RŪPINASI ŠYPSENOMIS NUO 1927-UJŲ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

IKI -30%



BELLA

BELLA moterų higienos linija – orui laidūs kasdieniai įklotai, higieniniai paketai ir vatos gaminiai.

Higienos priemonės – plonos ir diskretiškos, su kvapo kontrolės sistema. BELLA BIO BASED – ekologiškos, su natūralaus bambuko paviršiumi. Vatos gaminiai – iš 100% medvilnės.

UŽTIKRINTA APSAUGA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

IKI -25%



PARODONTAX

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

TARKITE SUDIE KRAUJUOJANČIOMS DANTENOMS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

BURNOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

-25%



LACALUT

LACALUT dantų priežiūros priemonės – tai 90-ies metų patirtis, sukauptos žinios ir nuolatiniai tyrinėjimai, siekiant sukurti išskirtinio efektyvumo ir aukščiausios kokybės dantų priežiūros priemones. Unikali kompleksinė LACALUT apsauginė formulė garantuoja optimalią dantų ir dantenų apsaugą. LACALUT – ODONTOLOGAS JŪSŲ NAMUOSE!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

9⁹⁹ €

NAUJIENA



CAGYNOL 300 MG OVULĖ, 1 vnt.

NERECEPTINIS VAISTAS


Kiekvienoje ovulėje yra 300 mg sertakonazolo nitrato.

Terapinės indikacijos. Vietiniam makšties grybelinės Candida infekcijos gydymui. Cagynol skirtas suaugusiems. Dozavimas ir vartojimo metodas. Dozavimas. Viena ovulė vakare prieš miegą, vienkartiniams vartojimui, įterpiama giliai į makštį, geriausia gulint. Gydymo trukmė - vienkartinė dozė. Didžiausia vienkartinė dozė yra viena ovulė (300 mg sertakonazolo). Jei klinikiniai požymiai išlieka, antroji ovulė vartojama 7 dienų intervalu. Vartojimo metodas. Vartoti į makštį. Vartojant šį vaistinį preparatą negalima naudoti tamponų ir intravaginalinių dušų. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas priešgrybeliniams imidazolo klasės vaistiniams preparatams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Latekso prezervatyvų arba diafragmų naudojimas.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jei kandidozė patvirtinta, reikia atidžiai ieškoti ekologinių veiksnių, kurie sudaro sąlygas ir skatina grybelinės infekcijos vystymąsi. Norint išvengti atkryčių, labai svarbu nustatyti ir eradikuoti infekciją bei atsivėlgti į ją skatinančius veiksnius. Patartina vienu metu gydyti visą grybelinės infekcijos židinį, pripažintą sukelėją, partnerį. Nėštumas. Tyrimais su gyvūnais teratogeninis poveikis nenustatytas. Sertakonazolo vartojimas nėštumo metu turėtų būti svarstomas tik esant būtinybei. Teksto peržiūros data: 2022 m. gegužės 30 d. Reklamos parengimo data: 2023.12.15. CAGYN/2023/12/03

OVULĖ VIETINIAM MAKŠTIES KANDIDOZĖS GYDYMUI

VIENOS OVULĖS SĖKMĖS ISTORIJA



SKENUOKITE QR KODĄ IR
NORFOS VAISTINĖS
LEIDINIUS VARTYKITE
TELEFONE.



1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMBIO MULTIVITAMINAI VAIKAMS, 150ml 7⁹⁹ €
MAISTO PAPILDAS

-30%


HAPPY

Visos **HAPPY** sauskelnės yra orui laidžios, su natūralios kilmės žaliosios arbatos ekstraktu (lot. *Camelia sinensis*), kuris veikia antibakteriškai ir neutralizuoja nemalonius kvapus.

Mažiausią dydžių sauskelnės turi specialų iškarpimą bambutei ir yra putlėsnes – teisingai kodkio kojyčių padėčiai išlaikyti. Didesnių dydžių – plonesnės, su elastine juosmens dalimi ir paaugūntais apsauginiais krašteliais.

Drėgnos servetėlės – be alkoholio ir parabenų, su skirtingais ekstraktais – išsirink pagal poreikį. Ir nepamirškite vatų pagaliukų su apsauga!

* Sauskelnės negalioja nuolaidai su kompensuojamų vaistų pasu.

HAPPY – SU MEILE JŪSŲ MAŽYLIUI!

* Akcija taikoma geltona etikete pažymėtomis prekėms.

-30%

4^{89€}

AMBIO BIFIDOBakterIJOS VAIKAMS, 16 šokolado skonio tablečių
MAISTO PAPILDAS

6⁹⁹ €

KAMISTAD N gelis 10g

Liobokaino hidrochloridas, 20 mg/g, ramunėlių žiedų skystasis ekstraktas, 185 mg/g.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Indikacijos: gelis vartojamas esant nesunkiam dantenu ir burnos gleivinės uždegimui.

Vartojimas: suaugusiems ir vaikams, vyresniems nei 12 metų, reikia tepėti 0,5 cm ilgio gelio juostele 3 kartus per parą. Gelis tepamas ant pažeistų vietų ir švelniai įtrinamas.

Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai: gelio vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Saugoti, kad gelio nepatektų į akis ir ant atvirų žaizdų. Panaudojus gelio, kruopščiai nusiplauti rankas.

Pakuotės lapelio peržiūros data: 2022 sausio mėn.

Reklamos teksto parengimo data:

2201_SB_Kamistad_N_V01_LT

„KAMISTAD N“ – PAGALBA ESANT BURNOS GLEIVINĖS UŽDEGIMUI!
TEMPERATŪRAI MAŽINTI IR SKAUSMUI MALŠINTI

NUO 4⁴⁹ €

IBUGARD

100 mg/5 ml geriamoji suspensija, 120 ml 4⁴⁹ €
200 mg/5 ml geriamoji suspensija, 100 ml 8⁴⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: **5 ml IBUGARD 100 mg/5 ml** geriamosios suspensijos yra 100 mg ibuprofeno, 5 ml **IBUGARD 200 mg/5 ml** geriamosios suspensijos yra 200 mg ibuprofeno. Terapinės indikacijos. Įvairios kilmės karščiavimas, įvairios kilmės silpno ir vidutinio stiprumo skausmo, tokio, kaip virusinės ar kitokios infekcijos sukeltos galvos, gerklės ir raumenų skausmai; sąnarių ir kaulų skausmai; pooperacinio skausmo; danties skausmo, galvos skausmo; ausies skausmo, esant vidurinės ausies uždegimui, mažinimui. Vartojimo būdas ir dozavimas: nustatant ibuprofeno dozę, reikia atsižvelgti į paciento kūno svorį ir amžių. Paprastai vienkartinė ibuprofeno dozė yra 7–10 mg/kg kūno svorio, maksimali paros dozė yra 20–30 mg/kg kūno svorio. Dozė galima kartoti kas 6–8 valandas, tarp dozių turi būti ne mažesnis nei 4 valandų intervalas. Tik trumpalaikiam vartojimui. Kontraindikacijos: Padidėjęs jautrumas ibuprofenui, aspirinui ar kitam nesteroidiniam vaistui nuo uždegimo (NVNU), arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei sergate ar sirgote skrandžio ir (arba) dvylikapirštės žarnos opa ar kraujavimu iš virškinamojo trakto; sergate sunkiu kepenų, širdies ar inkstų funkcijos sutrikimu. Yra polinkis į kraujavimą. Specialūs įspėjimai: specialų atsargumo priemonių reikia, jei inkstų, kepenų ar širdies funkcija yra sutrikusi, sutrikęs kraujo krešėjimas arba vartojami antikoaguliantai, sergama cukriniu diabetu, raudonoja vilkligė, krono liga, opiniu kolitu, hipertenzija, astma, šienlige, yra nosies polipų ar lėtinų infekcinių kvėpavimo takų ligų. Teksto paruošimo data 2017 01 mėn.

ŽARNYNO MIKROFLORA

-25% 7^{72€}

ACIDOLAC® JUNIOR, 20 meškiuko formos tablečių

ACIDOLAC® JUNIOR braškių skonio, 20 meškiuko formos tablečių

MAISTO PAPILDAI
Acidolac® Junior meškiuko formos tablečių sudėtyje yra gerųjų žarnyno bakterijų *Lactobacillus acidophilus* La-14TM ir *Bifidobacterium lactis* BI-04TM, inulino ir vitamino B6, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vartojimas: vyresniems kaip 3 m. vaikams ir suaugusiems vartoti po 1 meškiuko formos tabletę 2 kartus per parą. Be sacharozės ir gliutino.

Pasiūlymai galioja **2024 01 01 – 2024 01 31**.

Leidinyje nurodytos maisto papildų, kosmetikos, medicininės paskirties prekių ir medicinos prietaisų kainos fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortele, o vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Nuolaidos taikomos prekėms, įtrauktoms į UAB „Norfos vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą. Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį/informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt.

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Daugiau informacijos NORFOS vaistinėje, tel. 8 800 10008, www.nvaistine.lt MAŽYLIUI IR MAMAI skirtas prekes ypatingomis kainomis greičiau ir patogiau užsisakykite internetinėje vaistinėje www.nvaistine.lt. Užsisakius prekių (išskyrus vaistinius preparatus) už 28,96 € ir daugiau – pristatymas NEMOKAMAS! Reklaminių teksto parengimo data – 2023 11 17.




LAIMĖS VALANDOS

Darbo dienomis ir šeštadieniais
8-9 val. ir 14-15 val.*

Sekmadieniais
14-15 val.*



-30%

Perkant 3**
ir daugiau
prekių

-25%

Perkant
2* prekes

-20%

Perkant
1 prekę

**nereceptiniams vaistams -25%
receptiniams vaistams -20%

* vaistams -20%

Nuo 2023 m. spalio 23 d. NORFOS vaistinėje akcijos LAIMĖS VALANDOS metu perkant 1 prekę taikoma 20 % nuolaida, perkant 2 prekes – 25 % nuolaida, vaistams – 20 % nuolaida, o įsigyjant 3 ir daugiau prekių – 30 % nuolaida, nereceptiniams vaistams – 25 %, receptiniams – 20 % nuolaida.

Taikomos momentinės 20 % dydžio nuolaidos receptiniams vaistams, 20 ar 25 % nuolaidos nereceptiniams vaistams ir vaistiniams preparatams, o kitoms prekėms – 20, 25 arba 30 % nuolaidos, atsižvelgiant į atitinkamo pirkimo metu įsigyjamų prekių bendrą kiekį. Nuolaida taikoma perkant pilnas prekių pakuotes, kurių kiekvienos vertė arba priemoka ne mažesnė nei 1,50 euro. Prekės, perkamos su kompensuojamuoju receptu, įskaičiuojamos į įsigyjamų (perkamų) prekių krepšelį (kiekį), tačiau joms nuolaida netaikoma.

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaidos netaikomos perkant su kompensuojamuoju receptu, mokant už skiepus, taip pat pradinio maitinimo pieno mišiniams, kartiniams (gaminamiems vaistinėje) ir vardiniam vaistams, įsigyjant dovanų kuponus, pakavimo maišelius. Nuolaidos netaikomos perkant www.gintarine.lt, net jei už prekes atsiskaitoma jas atsiimant vaistinėse. Nuolaidos netaikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Visos nuolaidos galioja tik su PC NORFA lojalumo kortele.

Informaciją apie kitu nei nurodyta laiku vykstančias LAIMĖS VALANDAS rasite www.nvaistine.lt. Informacija apie kitas akcijas ir prekes, kurioms netaikomos akcijos LAIMĖS VALANDOS nuolaidos, suteikiama kiekvienoje vaistinėje, el. paštu info@nvaistine.lt arba nemokamu tel. 8 800 10008.

NVAISTINĖ
VAISTINĖ PRAKTIŠKIEMS ŽMONĖMS